



A 1 2 3 4 5 6 MI 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



奇正方
全

武
318



門 賦 9
第 318
卷

賀古公山著

不評翻所

奇正方

浪華 雪巖居藏

雪巖

序

序

四格在
永
日

恬菴子奇正方脫稟將鏤板行
之或問其名詰詰其內人曰是以兵
喻醫其說必陳腐門人曰目病之
常變及示方之奇正釋仲景氏書
古來未有如此之明且切者子盍

同治
年
月
日

嘗讀馬詰者曰孫子云戰以正合
以奇勝善出奇者無窮如天地不
竭如江海夫奇者臨機制變之謂
然可預示其可不者皆正耳恬菴
乃歎并示正與奇不亦異乎門人
不能對以質于余曰吾不知醫又


不知兵然以吾所問想之醫方有
奇正亦猶吾道有經權事之常
變固不可名經權則亦何異乎方
者奇正以應病之常變也今夫男
女有別道之正也嫂溺手援道之
奇也直道而行道之正也父子相

音正九
隱道之奇也。吾喪哀歎而病則酒
內明哲保身而殺身成仁其於六
藝也。書正而詩七。禮正而樂。奇
春秋。兼奇正以誅亂賊。亦猶良醫
黃奇正以治百病。因此推之。天下無
往不正。亦莫不奇。矧於兵乎。矧於醫

乎。何奇正之不可少也。雖然。吾道也。
主常兵也。醫也。主變。主變者
貴乎奇。主常者。貴乎正。有定而
奇。無窮。仲景氏之論。經備矣。恬
菴之所不確。明且切矣。豈能悉天
地江海之奇乎哉。舉一反之運。而

用之如在其人則以誥者之意讀恬
菴之書其益於醫術也必大矣恬
菴問余言喜曰然矣請題卷端遍
告讀者於是年書

文政庚寅良月小竹散人彼崎彌撰



音正方序


願言別一而二之已之加一未嘗
不次也於二也願言別一而二之
省二未嘗不物於一也必志一二
之夏固能一自一二自一二而亦
關者如友以陳一序就之刻正色

音正本
四
三之二子正之均角聽後代為
應之者按之其書之異為之
後嘗有人而合吾觀之亦
仲之東方書編自其書編自
亦如云卷之一而執二名可卷二
而執一之可一二時執而時未造

又之可也按之亦二之中括
二於一之書不類其異而統書同
夫然後以為不可矣改之病戲亂
原一換而恬莽如昔明其台功
亦偉矣抑亦少其無惑焉
莽子原吾所去莽之族也子

撰南乃其人也而今事遊苑
去舊業不誼乃措法醫者
者三可施於今日昇平者
之以為醫者而已亦將之細
費姑措法之所遇而己乎者
亦風習武矣

文政康寧仲冬以波南孫象
步安及撰於大阪梶本坊幸海
老漁書卷



海山人所書



每部必有印記
若無者係偽刻

Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

方目次

桂枝湯 一ウ

桂枝加桂湯 二ウ

桂枝加芍藥湯 二ウ

桂枝加芍藥大黃湯 二ウ

桂枝加葛根湯 二ウ

桂枝加黃耆湯 二ウ

桂枝加附子湯 三ウ

桂枝附子湯 三ウ

桂枝附子去桂加朮湯 三ウ

桂枝甘艸附子湯 四ウ

烏頭桂枝湯 四ウ

桂薑艸棗黃辛附湯 五ウ

桂枝加龍骨牡蠣湯 五ウ

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 五ウ

桂枝加芍藥生薑人參湯

六ウ

桂枝麻黃各半湯

六ウ

小建中湯

六ウ

黃耆建中湯

七ウ

當歸建中湯

七ウ

當歸四逆湯

八ウ

同加吳茱萸生薑湯

八ウ

黃耆桂枝五物湯

九ウ

黃耆桂枝苦酒湯

九ウ

桂枝甘艸湯

九ウ

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯

十

人參湯

十ウ

桂枝人參湯

十一ウ

茯苓杏仁甘艸湯

十一ウ

茯苓乾薑白朮甘艸湯

十一ウ

茯苓桂枝白朮甘艸湯

十二

茯苓桂枝甘艸大棗湯

十二

茯苓桂枝五味甘艸湯

十三ラ

茯苓五味甘艸干薑細辛湯

十三ウ

同加半夏湯

十三ウ

同加杏仁湯

十三ウ

苓甘薑味辛夏仁黃湯

十三ウ

茯苓澤瀉湯

十四ラ

澤瀉湯

十四ラ

猪苓湯

十四ウ

葛根湯

十五ラ

葛根加半夏湯

十五ラ

葛根黃連黃芩湯

十五ウ

麻黃湯

十六ラ

麻黃加朮湯

十六ウ

麻黃附子細辛湯

十六ウ

麻黃附子甘艸湯

十七ラ

麻黃杏仁甘艸石膏湯

十七

麻黃杏仁薏苡甘艸湯

十七

牡蠣湯

十七ウ

小青龍湯

十八ヲ

小青龍加石膏湯

十八ウ

大青龍湯

十八ウ

越婢湯

十九ヲ

越婢加朮湯

十九ヲ

越婢加半夏湯

十九ヲ

小柴胡湯

十九ウ

柴胡太半夏加括蕒湯

二十ヲ

柴胡加芒硝湯

二十一ウ

柴胡桂枝湯

二十一ウ

柴胡桂枝乾薑湯

二十一ウ

大柴胡湯

二十一ウ

柴胡加龍骨牡蠣湯

二十四ヲ

白虎湯

二十四ウ

白虎加桂枝湯

二十五ヲ

蒼朮白虎湯

二十六ヲ

白虎加人參湯

二十六ヲ

厚朴大黃湯

二十七ヲ

厚朴三物湯

二十七ヲ

厚朴七物湯

二十七ヲ

小承氣湯

二十八ヲ

大承氣湯

二十九ヲ

瀉心湯

三十ヲ

附子瀉心湯

三十一ウ

大黃附子湯

三十一ウ

大黃甘遂湯

三十二ヲ

抵當湯

三十二ヲ

橘皮大黃朴硝湯

三十三ヲ

大黃硝石湯

三十三ヲ

大黃牡丹皮湯

三十三ウ

大黃甘艸湯

三十四ヲ

調胃承氣湯

三十四ウ

桃仁承氣湯

三十五ヲ

桔梗湯

三十六ヲ

排膿湯 三十六ウ

芍藥甘艸湯 三十七ウ

芍藥甘艸附子湯 三十七ウ

甘遂半夏湯 三十七ウ

甘麥大棗湯 三十七ウ

甘艸粉蜜湯 三十八ウ

甘艸乾薑湯 三十八ウ

四逆湯 三十八ウ

通脈四逆湯 三十九ウ

通脈四逆加猪膽汁湯 三十九ウ

四逆加人參湯 三十九ウ

茯苓四逆湯 四十ウ

乾薑附子湯 四十ウ

附子粳米湯 四十ウ

大烏頭煎 四十一ウ

烏頭湯 四十一ウ

眞武湯 四十二ウ

附子湯 四十二ウ

梔子豉湯 四十三ウ

同甘艸豉湯 四十四ウ

同生薑豉湯 四十四ウ

枳實梔子豉湯 四十四ウ

梔子大黃豉湯 四十四ウ

茵陳蒿湯 四十四ウ

梔子蘘皮湯 四十四ウ

梔子厚朴湯 四十五ウ

大陷胸湯 四十五ウ

小陷胸湯 四十六ウ

凡薑薤白酒湯 四十六ウ

大半夏湯 四十六ウ

小半夏湯 四十七ウ

生薑半夏湯 四十七ウ

小半夏加茯苓湯 四十七ウ

半夏厚朴湯 四十八ウ

半夏瀉心湯 四十八ウ

甘艸瀉心湯 四十九ウ

生薑瀉心湯 四十九ウ

吳茱萸湯 四十九ウ

厚朴生薑甘艸半夏人參湯 五十ウ

黃連湯 五十ウ

乾薑黃連黃芩人參湯 五十ウ

大建中湯 五十ウ

黃連阿膠湯 五十ウ

黃芩湯 五十ウ

白頭翁湯 五十ウ

木防已湯 五十ウ

木防已石膏加茯苓芫花硝湯 五十二ウ

防已茯苓湯 五十二ウ

枳朮湯 五十三ウ

桂枝枳實生薑湯 五十三ウ

枳實薤白桂枝湯 五十三ウ

橘皮枳實生薑湯 五十四ウ

橘皮竹茹湯 五十四ウ

橘皮湯 五十四ウ

竹葉石膏湯 五十四ウ

芎歸膠艾湯 五十五ウ

旋覆花代赭石湯 五十六ウ

赤石脂禹餘糧湯 五十六ウ

桃花湯 五十七ウ

酸棗仁湯 五十七ウ

黃土湯 五十七ウ

桂枝芍藥知母湯 五十八ウ

升麻鼈甲湯 五十八ウ

射干麻黃湯 五十八ウ

厚朴麻黃湯 五十九ウ

葶藶湯 五十九ウ

炙甘艸湯 五十九ウ

十棗湯 六十ウ

走馬湯 六十一ウ

附方

茯苓飲 一ウ

延年茯苓飲 一ウ

溫膽湯 一ウ

六物黃芩湯 二ウ

黃連解毒湯 二ウ

大黃湯 二ウ

五蒸湯 三ウ

溫脾湯 三ウ

檳榔湯 四ウ

唐侍中檳榔湯 四ウ

烏頭檳榔湯 四ウ

黑豆湯 五ウ

犀角吳茱萸湯 五ウ

續命湯 五ウ

大續命湯 六ウ

小續命湯 六ウ

二物黃芩湯 七ウ

三黃湯 七ウ

木茱湯 七ウ

三和散 七ウ

涼膈散 八ウ

升麻散 八ウ

犀角地黃湯 九ウ

逍遙散 九ウ

加味道遙散 九ウ

葶苈湯 十ウ

透膿湯 十ウ

搜風解毒湯 十ウ

赤小豆湯 十一ウ

琥珀湯 十一ウ

赤小豆煎 十一ウ

抵當丸 十二ウ

大陷胸丸 十三ウ

麻子仁丸 十三ウ

方目欠

六

八味丸 十四ウ

括蔞瞿麥丸 十四ウ

赤丸 十四ウ

乾薑人參半夏丸 十五ウ

桂枝茯苓丸 十五ウ

大黃虜蟲丸 十六ウ

已椒藶黃丸 十六ウ

備急圓 十六ウ

礬石丸 十八ウ

歸母苦參丸 十八ウ

紫圓 十八ウ

硝石大圓 十九ウ

平水丸 二十ウ

滾痰丸 二十ウ

控涎丹 二十一ウ

左經丸 二十二ウ

十棗丸 二十二ウ

五苓散 二十二ウ

茵陳五苓散 二十三ウ

猪苓散 二十三ウ

牡蠣澤瀉散 二十四ウ

葵子茯苓散 二十四ウ

土瓜根散 二十四ウ

凡蒂散 二十四ウ

薏苡附子敗漿散 二十六ウ

天雄散 二十六ウ

排膿散 二十六ウ

當歸芍藥散 二十七ウ

蜀漆散 二十七ウ

桔梗白散 二十七ウ

四逆散 二十七ウ

消礬散 二十八ウ

蛇床子散 二十八ウ

不吐不下心煩者等之類是也其別正者假令其病始出於桂枝湯之正治終入其殊途異域者乃如桂枝加芍藥湯同加大黃湯小建中湯之類是也其別奇者乃如桂枝甘艸湯之於發汗過多云云證桂枝甘艸龍骨牡蠣湯之於火逆之類但治其一變證而不可移用於他者是也

凡醫法之隨證亦有奇正其正者乃如桂枝湯之於病人臟無他病云云證及病常自汗出云云等證服藥後不須歎粥溫覆但任其藥性和榮衛或大

小青龍湯之於傷寒服後必溫覆以助藥力之類是也其奇者乃如桂枝湯之於中風服後必歎熱粥溫覆以助藥力或大青龍湯之於溢飲麻黃加朮湯之於濕家不須溫覆而取汗之法或承氣湯十棗湯之於傷寒一快利則止後服消息斟酌以觀後變之類是也

凡傷寒論金匱要略中之方有二類焉蓋古聖鑿爲治一傷寒而設之范曄所謂風寒熱病論中之遺方者仲景氏取以錄之傷寒論中麻黃柴胡白虎

音正考
青龍等是一類也二者撰擇古昔治雜病之方以備傷寒正治後及誤治後不虞之變證者其方即承氣抵當十棗湯等是一類也

凡方後曰得快利止後服曰得快吐則止後服曰得小便利餘勿服者單示傷寒治法而已夫傷寒之爲病變化百出無有定極而非一吐一下之可愈故雖施發散之輕劑猶周時觀之以候其後變之機况於吐下之法乎以故其汗之制流漓其下之戒大泄其吐之慎暴劇唯要臨機應變以收全効

爾是仲景氏治傷寒之法而非治雜病之例也若夫治雜病不期小快而欲其病毒盡脫故下之吐之不中止以愈爲限焉

凡醫事以陰陽五行司天在泉引經報使等爲之說者皆妄誕也夫支那醫流自唐宋而下舍條理而騖空理其論可喜其實則戾其論傷寒也以經絡爲受病之地以陰陽分風寒以蕞爾之人身配當無涯之天地支離荒唐實誤後進經年之久舊染難除我皇國五七十年來唱古鑿方者雖不

音正方
乏其人亦唯踵支那鑿風之弊而不能改其輟略
作之辨而已或改太陽陽明少陽經絡附會之說
以爲熱毒所屯之營塞或以六經爲病位之記號
或以中風傷寒爲病之狀態以三陽爲陽氣盛微
實之三名義此皆一時之建言奇論而已獨東洞
吉益氏斷然不惑其可疑者圈而不取可謂東漢
以來一人矣余此編亦書中妄誕者皆圈以示學
者

傷寒論中以六經分編立病之部位論邪熱之傳經
者王叔氏之妄誕也宋後數百年莫識破其妄者
嗚呼何鑿之乏其人獨明吳有可不憑六經別建
熱病之論可謂豪傑之士也繼而興者我 邦吉
益東洞而已嗚呼何鑿之乏其人往歲東洞氏作
類聚方圈六經而刪之然世醫讀傷寒論者若斥
六經則如瞽者之於文章聾者之於鐘鼓茫然不
知所向故今存其名目所係之大略如左

所謂太陽者邪毒侵入筋骨肉分當發汗者乃如
桂枝湯各半湯葛根湯麻黃湯大小青龍湯等證

是也所謂少陽者邪毒結着胸脇心下口苦咽乾
目眩耳聾乃如大小柴胡湯柴胡姜桂湯黃蓮湯
等證是也所謂陽明者邪毒充漲于胃中腸內乃
三承氣湯白虎湯等證是也所謂太陰者乃太陽
之反對而腹滿吐食或自利乃如桂枝加芍藥湯
同加大黃湯及四逆輩之證是也所謂少陰者乃
少陽之反對而脈微細或發熱脈沈或惡寒四肢
逆冷心中煩或嗜寐或吐利或咽痛乃如黃連阿
膠湯麻黃附子細辛湯附子湯真武湯猪苓湯證

是也所謂厥陰者乃陽明之反對而手足厥冷心
中疼熱內拘急脈沈而遲或脈微細或欲絕或下
利清穀或吐衄乃如四逆湯白通湯烏梅圓等證
是也夫反對者乃變化也或因誤治而為脫陽之
證或因病人氣化衰弱而精氣不能抗邪毒熱陽
變化遂為寒陰之謂也

凡方後攬舉諸書所載之方證者欲以廣其方之奇
而益明其正之所存也而其中徃徃有妄妖虛誕
者大柰其真而余不肯議而圈之舉以存舊而已

學者能明竒正之條理則妖誕何能害

凡證先於方者所謂正而證後於方者竒也蓋仲景氏之作傷寒論也特爲治一傷寒而已故專論古方治傷寒之竒而其正乃略者間亦有焉今就外臺千金及雜書中取其可證者而補焉夫外臺千金者本摺載古代名醫面命之方論及當時民間口碑之藥方之書也故其方劑論說邪正相混雅俗相依今取其正而雅者耳

凡此編本傷寒論金匱要略之方以分其竒正然而其中多有似闕其竒正者其實非闕如也何則其似無正無竒者多是淡泊平易之藥不足以論竒正也世醫概以爲傷寒金匱要略中之方藥求必合正義而後世之方劑悉皆杜撰者此我邦僞古方鑿之弊也蓋傷寒金匱中之方劑其能味淡泊者不爲不多雖然有物有則有輕微之病則有輕易之藥又有一方止治一證而不能泛治他病者疑是仲景氏臨時所製也

凡編中曰辨誤曰發明曰試効曰方意者是余所嘗

考試辨明也其間曰說具于傷寒論系傳者亦余
所嘗著述之書名也後單稱系傳者略辭也若夫
方意之解概論其大略以發童蒙而已

凡附方者所嘗親試之方也若金匱要略中附外臺
千金等方雖非仲景氏之舊而其利于病者豈可
捨耶今更增附數方于此者欲弘先哲之意以供
于今日之用非添蛇足也

凡丸散之功亦偉矣而其爲用有先隨證處湯藥時
兼用之以拔其毒者乃如抵當丸控涎丹滾痰丸
等之類是也又有先投之以丸散殺其大勢而後
與湯液者乃如瓜蒂散備急圓白散等之類是也
又有嘔惡不容藥汁者換之以丸散者乃如五苓
散之於水逆干姜人參半夏丸之於惡阻之類是
也又有單用之者乃如八味丸之於消渴當歸芍
藥散之於妊娠牡蠣澤瀉散之於差後腫之類是
也又有應病之機而丸散湯液交相用者有常服
湯液時別用丸散類以拔滌病之根源者此用丸
散之要法也

每章於證傍加圈亦欲使其正與奇瞭然于一瞬之中也其例如左

○○○○○ 為緊圈是緊要正證

○○○○○ 為母圈象母腹受胎汗吐下及誤

治所以生種種奇證

、、、、、、 為子點凡加母圈下文必施此點

以示證之奇

庚寅秋重陽日 恬菴賀古壽誌

奇正方

阿波

賀古壽公山甫 著

桂枝湯 病人臟無他病時發熱自汗出而不愈者

此衛氣不和也○病常自汗出者此為榮氣和榮

氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾右二章桂

枝湯常候但不須歡
粥溫覆未發汗者也

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗二十枚

右伍味咬咀以水柒升煮取三升去滓適寒温服
 一升此服法之正也服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥
 力温覆令一時計遍身熱熱微似有汗者益佳不
 可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後
 服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小
 促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜
 服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若不
 汗出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒
 酪臭惡等物此活用桂枝湯於中風者乃法之奇也

太陽中風千金方作中風其脉陽浮而陰弱陽浮者熱自發

陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翁翁發熱鼻
 鳴乾嘔者○太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯本

和解衛氣鬱結此乃常也若夫活用之於中風則
 穀粥助藥力温覆求發汗此乃法之奇也又運用
 之於裏證則和解拘攣腹痛等證乃如桂枝加芍
 藥湯同加大黃湯等之類所謂別正而其始出於
 桂枝湯之正治終入其殊途異域者是也

桂枝加桂湯於桂枝湯方加桂枝二兩

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者欲作奔豚氣
 從少腹上衝心者

桂枝加芍藥湯

本太陽病。發及下之。因爾腹滿時痛者。屬太陰也。

桂枝加芍藥湯。主之。大實痛者。桂枝加大黃湯。主之。

因誤下之。變邪氣。縛筋脈。故腹拘急而時痛。因加倍芍藥以緩之。若夫大實痛者。更加大黃以

通之。

桂枝加葛根湯 於桂枝湯方加葛根四兩

太陽病。項背強几几。反汗出。惡風者。中風。桂枝湯

几几者。瘰葛根湯證。故斷曰反汗出。以明桂枝湯之證也。

桂枝加黃耆湯 於桂枝湯方加黃耆二兩

黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗

出。又身常暮盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發

熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若

身重汗出已。輒輕者。久久必身潤。即胸中痛。又從

腰以上。必汗出。下無汗。腰體弛痛。如有物在皮中

狀。劇者。不能食。身疼重。煩躁。小便不利。此為黃汗

○發明 此條分作三段。則劇易輕重。其證自分明矣。

桂枝加附子湯 於桂枝湯方加附子一枚

太陽病。發汗遂漏不止。其人惡風。小便難。四肢微

急難以屈伸者說具于傷寒論系傳

桂枝附子湯 傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者若其人大便

鞕小便不利者去桂加木湯主之

桂枝四兩 附子三枚 生薑三兩 甘草二兩 大棗

十二枚

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服○千

金方云治婦人產後風虛汗出不止小便難四肢

微急難以屈伸者方中有芍藥無大棗○三因方木附湯治

冒雨溼着肌膚與胃氣搏或腠間汗出因浴得之

即於此方加木苓各二兩○試効微毒骨疼偏枯口眼過斜寒痲腹中冷痛者

桂枝甘草附子湯 風溼相搏骨節疼煩掣痛不得

屈伸近之則疼劇汗出短氣小便不利惡風不欲

更衣或身微腫者

甘草二兩 附子一枚 朮二兩 桂枝四兩

右四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三

服○方意桂枝附子湯證曰身體疼煩不能自轉側桂枝甘草附子湯證曰骨節疼煩不

得屈伸其曰身體曰不能自轉側較之骨節疼煩不得屈伸者則其證重故彼用附子三枚此用附

子二枚

烏頭桂枝湯

寒。痼。腹。中。逆。冷。手。足。不。仁。若。身。疼。痛。

灸刺諸藥不能治抵當用此方

烏頭五枚

右一味以蜜二斤煎減半太滓以桂枝湯五合解

之得一升後初服二合不知即服三合又不知復

加至五合其知者如醉狀得吐者為中病○試効

治一切逆冷不仁痿痺等證

○方意

蓋烏頭之為能運動寒固之毒和之以桂枝湯者欲

令烏頭之氣順達患窠也類聚方集覽曰烏頭之得蜜猶龍之得雲感應奏効如神者安誕也夫古

人以蜜煎烏頭者欲緩其剛悍之氣以令不奔逸而已

桂薑艸棗黃辛附湯

氣分心下堅大如盤邊如旋

杯水飲所作

桂枝三兩

生薑三兩

甘艸二兩

大棗十二枚

麻黃二兩

細辛二兩

附子一枚

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二

升分溫三服當汗出如虫行皮中即愈○方意附子

細辛運寒飲餘藥散之若證而惡寒劇者毒深矣互加倍附子細辛麻黃以厚運散之力

桂枝加龍骨牡蠣湯

於桂枝湯方加龍骨牡蠣各二兩

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脉極虛孔遲為清穀亡血失精脉得諸孔動微緊男子失精

女子夢交此條分作二段證自分明○小品云夢交失精諸脉

浮動心悸小腹急陰處寒目眶痛頭髮落深師云

療虛勞喜夢與女邪交接精自出醫通云虛勞

夢泄惡寒發熱○方意蓋此方桂枝加芍藥湯變方也故證曰少腹弦急曰

心悸少腹急夫失精家必驚動而氣逆加龍骨牡蠣所以鎮其悸動也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝三兩 甘艸二兩 生薑三兩 牡蠣五兩

蜀漆三兩 龍骨四兩 大棗十二枚

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥

煮取三升去滓溫服一升○傷寒脉浮醫以火迫

劫之囚陽必驚狂起臥不安者驚悸最劇故○火

邪者火邪之為證必驚躁悸動即龍骨牡蠣所主治

桂枝加芍藥生薑人參湯於桂枝湯方加芍藥生薑各一兩人參三兩

發汗後身疼痛脉沈遲者○方意因發汗過多之變氣血澁滯而

身疼痛脉亦沈遲桂枝加芍藥湯以和其澁滯人參生薑鼓舞虛氣以添活潑之力蓋此方桂枝湯

之變方特主汗後之變證爾他病則不與焉

桂枝麻黃各半湯 太陽病得之八九日如瘧狀發

熱惡寒熱多寒少其人不可嘔清便欲自可一日二

三度發脈微者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽

俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者

未欲解也以其不能得少汗出身必痒痒當作痛字○

方意此其初當行桂枝湯之證而輕慢不藥歷八

九日邪毒遂瀰肉分是以桂枝湯力不及

黃湯則過矣故更取二方之半以作之小建中湯 虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢酸

痛手足煩熱咽乾口燥○男子黃小便利裏急

證 ○婦人腹痛

桂枝三兩 甘艸三兩 芍藥六兩 大棗十二枚

生薑三兩 膠飴一斤

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微

火消解溫服一升日三服○傷寒陽脈澁陰脈弦

法當腹中急痛者○傷寒二三日心中悸而煩者

右二章仲景氏活用小建中湯於傷寒之妙處說具于系傳○易簡方云大治

婦人血疼男子心腹疝痛○準繩云治痢不分赤

白新久但腹中大痛者神効

黃耆建中湯

於小建中湯方加黃耆一兩半

虛勞裏急諸不足

小建中湯證而自汗盜汗出者

○易簡方云男

子婦人諸虛不足少腹急痛脇肋臙脹臙下虛滿胸中煩悸面色萎黃唇口乾燥少力身重胸滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復

當歸建中湯

於小建中湯方加當歸四兩

治婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止吸吸少氣苦少腹中急摩痛引腰不能食飲○易簡方云婦

人一切血氣虛損四肢怠惰及產後勞傷虛羸不

足腹中疔痛吸吸少氣少腹虛急痛引腰背自汗

出不思飲食者若產後半日每日二服令人丁壯

又曰產後血虛虛羸不足腹中刺痛少腹急或感

寒發熱又曰崩傷內衄不止加地黃六錢阿膠二

錢○方意

建中湯緩化氣血澁滯之毒故治裏急腹痛悸衄酸疼煩熱等證仲景氏活用

之於傷寒虛狀氣血澁滯之證黃耆建中湯當歸建中湯證皆曰虛損不足者蓋指氣血澁滯百脉

弦急而自汗盜汗者

當歸四逆湯

手足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯

主之。若其人內有久寒者，加吳茱萸、生薑湯主之。

當歸 三兩 芍藥 三兩 桂枝 三兩 細辛 二兩

通州 二兩 甘州 二兩 大棗 二十個

右七味以水八升煮取三升，分溫服一升，日三

服。○丹溪心法云：治霍亂多寒，身冷脈絕，即於當

加吳茱萸湯方，太棗加附子各通脈四逆湯。○辨誤：俗醫以此方載在

為治厥陰云云，證者誤也。何則？其證單曰手足厥

寒而不曰厥陰病者，蓋此方本在雜病論中，而誤

者，故手足厥寒四字，遽移入于厥陰編者乎？抑此

方當歸、中湯之類方也。夫當歸建中湯解血氣

澀滯之證，今更加木通、細辛者，備利寒飲而其厥

寒者，示血氣沈滯澀枯而且厥且寒而已，非特有

傷寒轉變厥陰危劇之證也。故此方主治上

衝下冷手足疼痺或不遂，或腰腳弛痛等證。

黃耆桂枝五物湯 血痺之病從何得之？師曰：夫尊

榮人骨弱肌膚盛，重因疲勞汗出，臥不時動搖，加

被微風，遂得之。但以脈自微，濇在寸口，關上小緊

左，鍼引陽氣，令脈和緊去，則愈。血痺陰陽俱微，寸

口關上微，尺中小緊，外證身體不仁，如風痺狀。

黃耆 三兩 芍藥 三兩 桂枝 三兩 生薑 六兩

大棗 十二枚 右五味以水六升煮取二升，溫服七合，日三服。

黃耆桂枝苦酒湯 黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如藥汁脉自沈

黃耆五兩 芍藥三兩 桂枝三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服

一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以

苦酒阻故也

桂枝甘艸湯

桂枝四兩 甘艸二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服○發汗過

多其人叉手自冒心心下悸欲得按者○方意發

過多太吐津液虛氣急迫心下悸得按之而稍安

桂枝甘艸緩之此但備汗後邪太虛氣急迫之一

證耳世醫以為萬病心下悸欲得按者皆主之者誤也

桂枝二兩 甘艸二兩 龍骨二兩 牡蠣二兩

右為末恐以龍骨牡蠣以水五升煮取二升半去

滓溫服八合日三服○火逆下之因燒鍼煩躁者

人參湯作丸名理中丸證治同 霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲

飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

○大病差後喜唾久不了了者○胸痺心中痞留氣結在胸胸下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

人參

甘艸

朮

乾薑

各三兩

右四味以水八升煮取三升太滓溫服一升日三

服○易簡方云治為寒氣濕氣所中者理中加附

子湯主之○明鑿指掌云祛寒止嘔逆泄利心腹

冷痛

即附子理中湯

○方意

此方理中焦不化故治諸病差後虛氣鬱滯枯液凝心胸

喜唾久不止者

桂枝人參湯

於理中湯方加桂枝四兩

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不

止心下痞鞭表裏不解者

說具于系傳

○辨誤

後世以人參為

補綴元氣之聖藥者妄誕爾世鑿用廣東人參以為補藥者愚之甚也蘭山小野氏曰廣東古昔南粵之地未聞產人參明一統志亦不記其地產人參或曰往歲廣東呂大珪者來崎陽時官吏話及廣東人參大珪答以不知矣壽竊謂本艸綱目三七條李時珍曰味微甘而苦頗似人參之味又名金不換其多能不換于金王之美稱也所謂廣東人參蓋此物也此物能止瀉散血產婦金瘡吐血下血用之多效故廣東人巧製其形謾命之名以欺愚人於萬里之外耳又或曰和名抄云人參和名久萬能伊此以其味之苦烈髣髴熊膽云爾其能特治心下痞鞭之毒乃有以和產直根竹節等

人參充之者然源順延喜年間人其時人參未來
我邦何以徵其果為何物夫仲景氏所用韓參
也代以偽參余不知其始於何世何人耳聞述世
韓參產乏而清人責求以故來少而價騰不使貧
民我邦諸國植韓參之種累年蓓蓓昂昂味
佳而有効唐山賈舶交易載還互以充用焉

茯苓杏仁甘艸湯 胸痺心下氣塞短氣茯苓杏仁

甘艸湯主之。橘枳薑湯亦主之

茯苓 三兩 杏仁 五十個 甘艸 一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不

差更服○試効 胸痛咯血或痰喘悸動短氣者
以此方合小陷胸湯分量各半

茯苓乾薑白朮甘艸湯 腎着之病其人身重腰中

冷如坐水中形如水狀反不渴小僂自利飲食如

故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以

下冷痛腰重如帶五千錢此條為二段
證治自分明

甘艸 各二兩 乾薑 各四兩 茯苓 各四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服○婦人良

方云治妊娠腰腳腫者方中有杏仁

茯苓桂枝白朮甘艸湯 心下有痰飲胸脇支滿○

夫短氣有微飲當從小僂去之苓桂朮甘湯主之

腎氣丸亦主之

茯苓^{四兩} 桂枝^{三兩} 朮^{二兩} 甘艸^{二兩}

右四味以水六升煮取三升分溫三服○傷寒若

吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沈緊

者發汗則動經身為振振搖者○辨誤此方載在傷寒論而

方今病傷寒者不見一有如此證非可怪乎蓋因世醫之術之拙也夫仲景氏之治傷寒也專主用

吐下之方苟能盡吐下之術大邪既除而後見此證者多矣故曰若吐若下後世醫乃畏吐下之藥

如虎狼徒淫虛名無實之方劑不省仲景之深意以故凡傷寒以吐下之術可愈者皆以誤之互乎

今之病傷寒者殊不見有此證也

茯苓桂枝甘艸大棗湯

茯苓^{半斤} 甘艸^{三兩} 大棗^{十五枚} 桂枝^{四兩}

右四味以水一斗先煮茯苓減二升內諸藥取三

升去滓溫服一升日三服○發汗後其人臍下悸

者欲作奔豚

茯苓桂枝五味甘艸湯

茯苓^{四兩} 桂枝^{四兩} 甘艸^{三兩} 五味子^{半升}

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服○欬

逆倚息不得臥小青龍湯主之青龍湯下已多唾

口燥手足厥逆氣從少腹上衝胸

咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰股小便
難時復冒者與苓桂五味甘艸湯治其氣衝○衝
氣即低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘艸湯太
桂加細辛干薑以治欬滿○欬滿即止而更復渴
衝氣復發者以細辛干薑為熱藥故也服之當逐
渴而渴反止者為支飲也支飲者法當冒冒者嘔
嘔者復內半夏以太其水○水太嘔止其人形腫
者加杏仁半斤○若面色如醉此胃熱上薰其面加
大黃三兩以利之

茯苓澤瀉湯 胃反吐而渴欲飲水者

茯苓 半斤 澤瀉 四兩 甘艸 二兩 桂枝 二兩 朮 二兩

生薑 四兩

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

霍亂吐利煩躁渴欲飲水 ○方意 此方於苓桂朮

生薑其分量雖稍異其主治蓄飲也而此證重於

苓桂朮甘湯一等故證曰吐而渴蓋吐者飲毒逆

于上也渴者已吐盡而復招 新水也治唯在通利蓄水爾

澤瀉湯 心下有支飲其人苦冒眩

澤瀉 五兩 白朮 二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服○方意眩者飲毒上行之所致澤瀉白朮洩之胃苦

猪苓湯 發熱渴欲飲水小便利者娠七八箇月面目浮腫

小便少者俗謂之子胎猪苓湯主之

猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉各等分

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱消溫服七合日三服○少陰病下利六七日

欬而嘔渴心煩不得眠者○試効尿血膿淋加海金沙大黃甘艸

外佳

葛根湯 太陽中風項背強几几無汗惡風○太陽

與陽明合病者必自下利葛根湯主之不下利但

嘔者葛根加半夏湯主之右二章說吳干系傳

葛根四兩 桂枝二兩 麻黃三兩 芍藥二兩

甘艸二兩 生薑三兩 大棗十二枚

右七味以水七升先煮麻黃葛根減二升去

上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似

汗不須欬粥餘如桂枝法將息及禁忌○辨誤東

氏嘗於葛根湯方加大黃治一切肌表之瘡毒俚醫雷同以為外發內洩兼解之上手段者誤矣東

洞之加大黃也其分量僅僅要在使大黃附葛根湯發散之騏尾以解毒於肌表耳

葛根黃連黃芩湯

葛根 半斤 黃連 三兩 黃芩 二兩 甘艸 二兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升太滓分溫再服○太陽病桂枝證醫反下之

利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者說具于系傳

○發明 世鑿以此方為治協熱利者安也又以為治項背強急而心煩心下痞者誤也蓋葛根之為能融化強急之毒故配之桂麻則治項背強几几者配之芩連則治熱毒內陷而胸肺強急之證曰胸中之強急何以徵之曰喘也汗也是胸肺強急之邪迫于上薰于外之兆所謂病應見于

大表者是也夫葛花之解酒毒亦在治強急之毒而已蓋酒氣之瀰淪人身也氣血奔騰逆而亦蹶苟蹶則沈滯而為身體強急之證察葛花能解酒毒而葛根配諸藥之能可知矣

麻黃湯 太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡

風無汗而喘者○太陽與陽明合病喘而胸滿者

○陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈右三章說具于系傳

麻黃 三兩 桂枝 二兩 甘艸 一兩 杏仁 七十個

右四味以水九升先煮麻黃減二升太上沫內諸藥煮取二升半太滓溫服八合覆取微似汗不須歠粥餘如桂枝法將息○濕家身煩疼可與麻黃

加朮湯於麻黃湯方○三因方云治寒濕身體疼

煩無汗惡寒發熱者○方意千金方云麻黃通肉

能發散肉分之邪則當覆取汗是乃正也若夫通

散肉中壅滯之水濕則麻黃加朮湯之所之乃不

須覆取汗是乃奇也

麻黃附子細辛湯

說吳于系傳麻黃二兩 細辛二兩 附子一枚

少陰病始得之反發熱脉沈者

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

麻黃附子甘艸湯

於麻黃附子細辛湯方

少陰病得之二三日麻黃附子甘艸湯微發汗以

二三日無裏證故發汗也說吳于系傳

麻黃杏仁甘艸石膏湯

麻黃四兩 杏仁五十個 石膏半斤 甘艸二兩

右四味以水七升先煮麻黃減二升去沫內諸

藥煮取二升去滓溫服一升諸壯熱效逆喘促小兒熱渴喘急加蘇子

菜白皮佳○發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大

熱者說吳于系傳

麻黃杏仁薏苡甘艸湯 病者一身悉痛發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久取冷所致也

麻黃兩半 甘艸兩一 薏苡兩半 杏仁個十

右四味以水五升煮取二升分溫再服○外臺云

濕家始得病特可與薏苡麻黃湯即此方也

牡蠣湯 治牡瘰

牡蠣兩四 麻黃兩四 甘艸兩二 蜀漆兩三

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去沫內諸藥

煮取二升溫服若吐則勿更服凡瘰疾服常山蜀漆之類得吐則多

瘰毒截斷故止服若夫吐而後仍疾不去者可更數服

小青龍湯 傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而

欬或渴或利或噎或小便利少腹滿或喘者○

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴

者此寒太欲解也說見于系傳

麻黃兩三 芍藥兩三 乾薑兩三 甘艸兩三

桂枝兩三 半夏兩半 五味子兩半 細辛兩三

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥者取三升太滓溫服一升○病溢飲者當發其

汗○欬逆倚息不得臥○肺脹欬而上氣煩躁而

喘脉浮小青龍加石膏湯主之○此方發輪傷寒外邪內感者固

有之水飲者是乃正也若夫治溢飲及欬逆上氣肺脹等證者乃奇也

大青龍湯 太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不

汗出而煩躁者○傷寒脉浮緩身不疼但重乍有

輕時無少陰證者大青龍湯發之右二章說具于系傳

麻黃六兩 桂枝二兩 甘草二兩 杏仁四十個

生薑三兩 大棗十二枚 石膏雞子大

右七味以水九升先煮麻黃去沫內諸藥煮取

三升太滓溫服一升取微似汗○病溢飲者當發

其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之當有面部四肢微腫

咳逆喘嗽等證

越婢湯 風水惡風一身悉浮腫不渴續自汗出無

大熱者○裏水一身面目黃腫其脉沈小便利

越婢加朮四兩湯主之○欬而上氣此為肺脹其人

喘目如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯主之

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩 大棗十二枚 甘草二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取

三升分溫三服○千金方云治風痺腳弱又云治

妊娠腫滿喘息小便不利於本方內加附子一枚蒼朮四兩○辨

誤世鑿每值水腫之病輒用此方兼與他丸散駿

能主治濕熱發越于一身而腫者耳何能悉治一切之腫滿

小柴胡湯

傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿

默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴

或腹中痛或胸下痞鞭或心下悸小便不利或不

渴身有微熱或欬者○太陽病十日已太脉浮細

而嗜臥者外已解也設胸滿胸脅痛者小柴胡湯主

之○血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結

於胸下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲

飲食或嘔者○傷寒四五日身熱惡風頸項強胸下

滿手足溫而渴者○傷寒五六日嘔而發熱者○

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者

○陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者胎

者熱未實小柴胡湯主之若黃胎熱已實則大小承氣湯主之○本太陽病不解

因轉入少陽胸下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚

未吐下脉沈緊者以上八章說具于系傳

柴胡斤半 黃芩兩三 人參兩三 半夏升半

生薑兩三 大棗枚十二 甘草兩三

右七味以水一斗二升者取六升太滓再煎取三升溫服一升日三服○得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫鑿三三下之不能食而胸下滿面目及身黃頸項強小便難者與小柴胡湯○嘔而發熱者是汎指雜病非專為傷寒而言○諸黃腹痛而嘔者○婦人在草褥自發露得風四肢苦煩熱頭痛者○瘧病

發渴者柴胡兩 枳實兩 芍藥兩 黃芩兩 甘草兩 半夏升 湯主之○證治要

訣云傷寒胸脇俱痛頭痛耳聾口苦或渴或嘔大小便或利或不利往來寒熱如瘧○蘓東坡云近歲此藥大行患傷寒不問陰陽表裏皆令服之此甚誤也此藥傷寒論雖主數十證大要其間有五證最的當服之必愈一者身熱心中逆或嘔吐者可服傷寒此證最多正當服小柴胡湯若因渴飲水而嘔者不可服身體不溫熱者不可服仍當識此二者寒熱往來者二者發潮熱可服四者心煩

胸下滿或渴或不渴皆可服五者傷寒已差後復

發熱者可服此五證但有一證可服○辨誤論曰傷寒

中風有柴胡證但見一證便是不必悉具者如坡翁之說也若夫以胸脇苦滿之一證當之者妄矣

柴胡加芒消湯於小柴胡湯方加芒消六兩傷寒十三日不解胸

脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證

下之不得利今反利者知鑿以丸藥下之非其治

也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡

加芒消湯主之○世鑿以為加於大柴胡湯者誤也說具于系傳

柴胡桂枝湯 傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼

大微嘔心下支結外證未去者○心腹中痛

柴胡四兩 人參一兩 黃芩一兩 甘草一兩

半夏二合 芍藥一兩 大棗六枚 桂枝一兩

生薑一兩半

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三

服○發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡加桂湯

說具于系傳 ○外臺云治寒疝腹中痛○辨誤世鑿以此方為

兼解表裏之邪氣者妄也豈有同滾同沸之藥汁且下咽入胃之後各自分賦于其經其臟之理

乎不思之甚也說具于系傳

柴胡桂枝乾薑湯

瘧寒多微有熱或但寒不熱者

東洞曰當有胸動及渴證

柴胡

斤半

黃芩

兩三

桂枝

兩三

乾薑

兩三

括蕒根

兩四

牡蠣

兩三

甘艸

兩二

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服○傷寒五六日已發汗而復

下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出

往來寒熱心煩者說見于系傳

大柴胡湯

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者

○傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者

當下之○按之心下滿痛者此為實也

柴胡

斤半

黃芩

兩三

芍藥

兩三

半夏

升半

枳實

枚四

甘艸

兩二

大棗

枚十二

大黃

兩二

生薑

兩五

右九味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

方中恐脫甘艸二兩四字論曰與大柴胡湯下之則愈而

脫大黃二兩主藥且有脫落於甘艸何怪也蓋傷寒論中柴胡劑皆有甘艸其無之者唯此一方耳

不可不察焉○太陽病過經十餘日反二三下之後四

五日柴胡謔仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者與大柴胡湯下之則愈○外臺云療傷寒八九日不解心腹緊滿身體疼痛內外有煩熱嘔不安○救正論云治傷寒自眩且聾舌有黃胎煩渴索水絕食兩日少動呼胸腹脇肋皆痛大便下赤水小便赤澁脉沈緩囊未縮者○和劑云治外感風寒內傷飲食鬱結在裏身熱煩躁語言謔妄大便不通繞臍刺痛○丹溪心法附錄云治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便秘澁

腹滿脹痛語言謔妄心中痞鞅飲食不下口生白胎不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱或發熱汗出脉有力者可服○試効痢疾壯熱臍腹絞痛或乾嘔或吐逆者又急患積聚二便不利上搶心腹脹滿害食者皆主之柴胡加龍骨牡蠣湯

- 柴胡_{四兩} 半夏_{二合} 大棗_{六枚} 生薑 人參
- 龍骨 鈇丹 桂枝 茯苓_{各一兩半} 大黃_{二兩}
- 牡蠣_{一兩半}

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如博碁

子更煮一二沸太滓溫服一升○傷寒八九日下
之胸滿煩驚小便不利譫語一身悉重不可轉側

者說見于系傳

○傷寒類方云此方能下肝胆之驚疾

以之療癩癩必効○經驗集錄云小兒連日壯熱

實滯不忒寒熱往來驚悸○方意

此方鎮錘邪毒結滯心胸而迫

于上者本艸鉛丹條云治吐逆反胃驚癩癩疾又云治驚悸狂走由之求方意思過半矣

白虎湯

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而

面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手

足逆冷若自汗出者○傷寒脉滑而厥者右二章說見于

系傳

知母

六兩

石膏

一斤

甘草

二兩

粳米

六合

右四味以水一斗煮米熟湯成太滓溫服一升日

三服○宜明方云治傷風自汗桂枝證表未解半

入於裏中暑自汗脉虛弱傷寒自汗脉滑數而實

表裏俱實三陽合病腹滿身重口燥面垢譫語發

黃厥逆自汗和解兩感解頭痛止自汗雜病時疫

煩渴發斑兼治小兒疱疹疹伏熱

白虎加桂枝湯

於白虎湯方加桂枝三兩

溫瘧者其脉如平身

無寒但熱骨節煩疼時嘔白虎加桂湯主之○聖劑總錄云治溫瘧骨節疼痛時嘔朝發暮解暮發朝解白虎加桂湯主之○明鑿指掌云姪婦傷寒身自汗出煩渴唇焦○證治要訣云若初得病頭痛心熱外別有陽證至五日方發厥其人雖厥或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤多昏憤者此熱厥也宜白虎湯熱厥雖手足不若寒厥並指甲俱冷而指甲暖○活人書云其人傷濕因而中暑名濕溫兩脛遂冷胸滿頭目疼重妄言多汗

脈陽濡而弱陰脈小而急及煩渴引飲者切不可

汗之汗之必死蒼朮白虎湯主之○發明世鑿以搜本為

益氣和胃止煩止渴者誤也白虎證曰煩渴曰大煩渴曰身熱而渴曰渴欲飲水數升此伏熱之所為而石膏消解之方此時與冷粥汁亦必飲數盞何賴一匕之糗米益之和之止之為竊按石膏性降沈蕘之釜中為殷殷之聲不與水親故使糗米粘石氣以混成藥汁此古人製方之微意也

○試効 白虎湯證而心煩悶亂或潮熱狂躁罵詈踰垣上屋者加黃連

白虎加人參湯於白虎湯方加人參三兩 傷寒無大熱口燥渴

心煩背微惡寒者○傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水口乾舌燥者○服

桂枝湯。大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。白虎加人參湯主之。○傷寒若吐若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。舌上乾燥而渴。欲飲水數升者。東洞曰千金外臺同作白虎湯主之。而曰傷寒論方今從之。此說是也。

大陽中熱者。暍是也。汗出惡寒。身熱而渴。右四章說見于

系傳。○徐同知曰。治伏暑發渴嘔吐身熱。脈虛自汗。

○辨誤。世鑿見白虎加人參湯證曰汗後吐後下後乃以為加人參補益虛陽者妄也。又曰

治白虎湯證而心下痞鞅者亦誤也。蓋人參之為能鼓舞虛氣。今於白虎湯方加人參者。即欲使人

參。伏白虎湯以鼓舞虛氣。助消散伏熱之力也。學者思諸。

厚朴大黃湯 支飲胸滿者

厚朴尺一 大黃兩六 枳實枚四

右三味以水五升煮取二升分溫再服

厚朴三物湯 痛而閉者

厚朴兩八 大黃兩四 枳實枚五

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃

煮取三升溫服一升○鑿通云痛而閉塞無雷鳴

嘔逆之證者當下之

厚朴七物湯 病腹滿發熱十日脈浮而數飲食如

故。

厚朴 半斤

大黃 三兩

枳實 五枚

甘艸 三兩

大棗 十二枚

桂枝 二兩

生薑 五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服○

千金云治腹滿氣脹○試効腹滿不大便而嘔者痢疾發熱脈數或手足怠惰或腹中刺痛者加芍藥

辨誤世鑿以為發熱脈浮數者腹滿者厚朴三物湯之所治故合此二方以製方者矣也蓋曰發熱十日者示病之未深也夫腹滿日淺者未至大滿而精氣仍能抗之故必發熱也若夫腹滿數十日滿脹稍大者精氣衰弱而不能抗於毒是以不復發熱飲食不如故也故舉發熱之日數以見病之淺曰發病僅十日示其腹滿將

漸大之機也又曰飲食如故示未至妨食道也

小承氣湯

大黃 四兩

厚朴 二兩

枳實 三兩

已上三味以水四升煮取一升二合太滓分溫二

服○陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短

氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足

濇然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗

多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承

氣湯若大便不通者可與小承氣湯微和胃氣勿

令大泄下○傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當發汗

○陽明病其人汗出多以津液外出胃中燥大便

必鞕鞕則譫語小承氣湯主之○陽明病譫語發

潮熱脈滑而疾者○太陽病若吐若下若發汗微

煩小便數大便因鞕者○下利譫語者有燥屎也

○大便不通噦數譫語右二章不問何病皆主之○發明傷寒論金

匱要略中有同方而三名者焉厚朴三物湯厚朴

大黃湯小承氣湯是也但其分量或厚朴減於枳

實或枳實減於厚朴要之皆以大黃為主若方中

缺大黃則不成方或缺枳實或缺厚朴皆無損於

治病苟無損於治病則無論二物之增減而可也

壽按本是厚朴三物湯仲景氏當活用之於傷寒

之時夏命承氣之名而已夫承者順也傷寒純熱

閉實於腸胃大黃厚朴枳實并蕩滌之力承順其

結實之氣以導之於尿道其劇者加芒硝以強藥

力是仲景氏所以革三物之名夏命承氣之名也

學者欲知承氣湯之正

互就三方之條而求焉

大承氣湯

病腹中滿痛者○下利三部脈皆平按

之心下鞕者急下之○下利瘥後至其年月日時

復發者以病不盡故也當下之

大黃

四兩

厚朴

半斤

枳實

五枚

芒硝

三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃

煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服得下則勿服者是傷寒之治法而候下後之變者也至若治佗病以瘥為度○傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀人若劇者發則不知人循衣摸床惕而不安微喘直視譫語者○陽明病譫語有潮熱反不能食者有燥屎也若能食者但鞭爾○汗出譫語者有燥屎須下之○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳繫汗出大便難而譫語者○病人煩熱汗出則解

又如瘧狀日晡所發熱脈實者○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥屎也○傷寒五六日目中不了了睛不和大便難身微熱者急下之○陽明病發熱汗出者急下之○少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者右十二章說○瘕之為病胸滿口禁臥不着席脚攣急必齟齒○產后七八日少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱譫語者少腹堅痛惡露不盡者互桃仁承氣湯以

逐血氣而今有煩躁者是胃家實也與大承氣湯以瀉其實則惡露墮而盡也○必讀云

治傷寒八九日以來口不能言目不能視躄不能

動四肢俱冷六脉皆無以手按腹兩手護之皮皺

作楚跌陽脉大而有力乃腹有燥屎也遂下之得

燥屎六七枚口能言躄能動○鑿通云病人熱甚

脉未數實欲登高棄衣罵詈不避親疎蓋陽盛則

四肢實四肢實則能登高也大承氣湯主之又云

胃中有燥屎大熱錯謔喘滿神昏不得眠胃中只

臟內而言耳○辨誤世鑿以為此方特下結糞之藥者誤也夫仲景氏之論燥屎及大便

鞞難也蓋有故矣故於下利之證亦用大承氣湯是古方之妙境不可以不知焉若其說具于系傳

瀉心湯 心氣不足一作吐血衄血○心下痞按之

濡其脉關上浮者

大黃二兩 黃連 黃芩各一兩

右三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再

服○婦人吐涎沫墜及下之心下即痞○得効方

云治心受積熱譫語發狂踰牆上屋○鑿方考云

心火胸膈實熱面赤狂走者○試効卒倒昏眩不省人事或痰

壅氣急小兒發驚搐搦瘦癡者皆主之

附子瀉心湯

於瀉心湯煎汁內和
附子煎汁分溫再服

心下痞而復惡寒者說具于○辨誤世鑿曰瀉心湯治心下痞

今此證其初因汗下之變陽脫津故加附子補虛復津者誤也附子能運動固滯之毒加之瀉心湯者為佐瀉心之力爾凡人心中鬱結痞塞則外見惡寒振栗厥逆等之證此證曰惡寒者乃心下痞塞之劇證也夫瀉心湯本瀉心下痞塞其劇者不可不添運動之力故加附子

大黃附子湯

胸下偏痛發熱其脉弦緊

大黃三兩

附子三枚

細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服○方意偏痛

者是乃寒飲固滯胸下之應附子細辛運逐之大黃受而通之

大黃甘遂湯

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不

渴經後者經舊作生是也此為水與血俱結在血室也

大黃四兩

甘遂二兩

阿膠二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之○甘遂經火煮則耗性

互末用也先煮大黃如法太滓受上火內膠烱消下火內甘遂未攪之頓服

抵當湯

經水不利者○千金方云治月經不調或

一月再來兩月三月一來或月前或月後閉塞不

通

水蛭三十個

蟅蟲三十個

大黃五兩

桃仁二十個

右四味為末以水五升煮取三升太滓溫服○發

明此煎法恐撰者之誤也凡藥火煮者不必未也今此乾蟲微物既未且煮豈得不損性乎且以

大黃桃仁同末之者亦不審其故當作右四味二

味為末以水五升先煮大黃桃仁取三升內水蛭

蠱蟲末更上火纔一二沸太滓頓服一升○太陽病六七日表證仍在

脈微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少

腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太

陽隨經瘀熱在裏故也○太病病身黃脈沈結少

腹鞕小便不利者為無血也小便自利其人如狂

者血證諦也○陽明病其人喜忘者必有畜血所

以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易

其色必黑○病人無表裏證發熱七八日雖脈浮

數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善

饑至六七日不大便者有瘀血說具于系傳

橘皮大黃朴硝湯 鱸食之在心胸間不化吐復不

出速除之諸宿食有事于心胸間者

橘皮一兩 大黃二兩 朴硝二兩

右三味以水一大升煮至小升頓服

大黃硝石湯 黃疸腹滿小便不利而赤自汗出

大黃 黃蘗 硝石各四兩 梔子十五枚

右四味以水六升煮取三升太滓內硝石煮取一

升頓服○試効黃疸身熱心煩不大便者

大黃牡丹皮湯 腸癰者少腹腫痞按之即痛如淋

小便自調時時發熱自汗出復惡寒其脈遲緊者

膿未成也可下之當有血脈洪數者膿已成不可

下也

大黃四兩 桃仁五十個 瓜子半斤 牡丹皮二兩

芒硝三合

右五味以水六升煮取一升太滓內芒硝再煎沸

頓服之有膿當下無膿當下血○千金方云腸癰

之病少腹痞堅或在膀胱左右其色或白堅大如

掌發熱小便欲調時自汗出其脈遲緊者未成膿

可下之○產育云產后血暈悶絕狼狽若口禁則

拗開灌之

大黃甘艸湯 食已即吐者

大黃四兩 甘艸一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服○肘後云

治胃反不受食食輒吐出○試效惡心嘈雜大便不快然者不通食積心下

調胃承氣湯 大。便。不。通。胃。氣。不。和。者。○醫通云常。有。熱。而。痛。此。為。積。熱。

大黃四兩 甘艸二兩 芒硝半

右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服○發汗後惡寒者虛故也。不惡寒但熱者實也當和胃氣○太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溱腹微

滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯

若不爾者不可與○陽明病不吐不下心煩者○

太陽病二日發汗不解蒸蒸發熱者○傷寒吐後

腹脹滿者右五章說具于系傳

桃仁承氣湯 療一切宿血及損傷瘀血在腹內不

問新久並婦人月經不通產後惡血傷寒論中舉桃仁承氣湯

之奇而略其正今假千金方以示正

桂枝三兩 桃仁五十個 大黃四兩 芒硝二兩

甘艸二兩

右五味以水七升煮取二升半太滓內苾消更上火微沸下火溫服五合日二服○太陽病不解熱

結膀胱其人如狂血自下下者愈下血是解熱之兆故曰愈乃隨

證處但少腹急結者乃可攻之是活用桃仁承氣湯於傷寒血熱瘀

滯之證○壽世云治吐血覺胸中氣塞上吐紫血○

寧生傳云迫血上行為衄數升餘面赤脉躁疾神

恍恍如癡○傳信充易方云治血淋○救正云治

一女適因行經浣衣受寒發熱喘渴少腹脹痛脉

寸關浮數兩尺沈結者此蓄血傷寒也○儒門事

親云凡婦人月事沈滯數月不行肌肉漸減內經

曰小腸熱已滿移熱瘦為沈沈者月事沈滯不行

也故曰伏瘕○鑿通云心下滿而微鞭不可按其

人善忘小便反利而不渴者是結血也又云當汗

失汗譫語善饑漱水身黃腹滿如狂者屬瘀血也

○明鑿指掌云治蓄血脹滿大實大痛手不可近

者

桔梗湯 欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾

腥臭久久吐膿如米粥

桔梗一兩 甘艸二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分溫服五合日

再服○小陰病二三日咽痛者可與甘艸湯不差

者與桔梗湯說具于系傳

排膿湯 主治同前

甘艸二兩 桔梗三兩 生薑二兩 大棗十二枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服○

此方與桔梗湯主治大同小異此方於桔梗湯方加薑棗且桔梗分量二倍於桔梗湯蓋桔梗湯證而毒一等深者宜用此方

芍藥甘艸湯

芍藥四兩 甘艸四兩

右以水三升煮取一升半去滓分溫再服○

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急說具

于系傳

芍藥甘艸附子湯

芍藥三兩 甘艸三兩 附子一枚

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

○發汗病不解反惡寒者虛故也說具于系傳

甘遂半夏湯 病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也

甘遂三枚 半夏十二枚 芍藥五枚 甘艸指大二枚

右四味以水四升煮取半升去滓以蜜半升和藥

汁煎取八合頓服之○發明 甘遂完煮損性無效當作以蜜半升和藥

汁煎取八合內甘遂未攪而頓服之

甘麥大棗湯 婦人臟躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸東洞曰急迫而狂驚者

甘艸三兩 小麥一升 大棗十枚

右三味以水六升煮取三升分溫二服

甘艸粉蜜湯 蛇蟲為病令人吐涎心痛發作有時

毒藥不止

甘艸二兩 粉一兩 蜜四兩

右三味以水三升先煮甘艸取二升去滓內粉蜜

攪令和煎如薄粥溫服一升○方意 此方以緩急為主所謂苦

急以甘緩之者是也其吐涎心痛者是急迫之所為世鑿單為蛔蟲之所為者妄也○辨誤

方中粉諸說紛紛或曰胡粉或曰輕粉皆妄誕也粉米粉也而加此粉也非為治疾苦但使病人便

服用爾蓋蜜甘艸濃甜煎汁人不堪飲喫故加米粉再煎如薄粥以使藥味調和易飲喫也余故曰

若無米粉則以小麥粉或蕎麥粉之類代之而可也

甘艸干薑湯 肺痿吐喘沫而不效者其人不可必遺尿小便數

甘艸 四兩 干薑 二兩

右以水三升煮取五合太滓分溫再服○傷

寒誤治後手足厥咽中乾燥吐逆者說具于系傳○試

効虛氣急迫而噦逆者

四逆湯 下利腹脹滿身體疼痛者○吐利汗出發

熱惡寒四肢拘急手足厥冷者○既吐且利大便

復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者

○下利清穀裏寒外熱汗出而厥者右四章四逆湯之正證苟

有此證則萬病皆可服

甘艸 二兩 乾薑 一兩 附子 一枚

右二味以水三升煮取一升二合去滓分溫

再服○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛

者○病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛○脈

浮而遲表熱裏寒下利清穀者○大汗出熱不

內拘急四肢厥又下利厥逆而惡寒者

通脉四逆湯

於四逆湯方加倍乾薑一兩半

下利清穀裏寒外

熱汗出而厥者○小陰病下利清穀裏寒外熱手

足厥冷脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹

痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者

通脉四逆加猪膽汁湯

於通脉四逆湯方加猪膽汁半合

○諸病

湯證而病一等深者主之或霍亂吐下已斷汗出云云證又通脉四逆湯證而四肢拘急其病極深者此方皆主之

四逆加人參湯

惡寒脉微而復利利止亡血也

右

章說具辨誤俗鑿以四逆輩為溫脾補虛之聖劑者妄矣蓋彼意以為甘艸引干

薑附子辛熱大溫之藥入于脾以溫補其虛丹溪曰附子性走而不守無補益之効可以見其妄矣

茯苓四逆湯

此四逆湯之變方說具于系傳

茯苓六兩

人參一兩

甘艸二兩

乾薑一兩半

附子一枚

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三

服○發汗若下之病仍不解煩躁者○千金方云

霍亂轉筋肉冷汗出嘔哕者無茯苓名四順湯○

試効凡病人精氣虛脫手足逆冷心悸煩躁或下利者主之

乾薑附子湯

奇正方

四十一

乾薑一兩 附子一枚

右二味以水三升煮取一升去滓頓服○下之後

復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無

表證脉沈微身無大熱者說見于系傳○易簡方云中

寒口禁四肢強直失音不語或卒然暈倒口吐涎

沫狀如暗風手足厥冷或復煩躁兼治中脘虛寒

久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆

附子粳米湯 腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

附子一枚 半夏半升 甘州二兩 大棗十二枚

粳米半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日

三服○外臺云主治寒疝氣心腹如刺繞臍腹中

悉痛自汗出欲絕於本方加蜀椒又療肺虛勞損

腹中寒雷鳴切痛胸脇逆滿氣喘於本方加白朮

乾薑○千金云霍亂四逆吐多者○方意附子性走而不

守能運動寒固之毒此證病毒在胸脇而逆滿故

以粳米粘附子走運之氣響雷胸腹間以治寒痛

○試效 此證而與此方數日荏苒不愈者加良薑延胡索取驗甚多矣

大烏頭煎

寒疝繞臍痛若發則自汗出手足厥逆

四十二

其脉沈弦者

烏頭 大者五枚

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣

盡取二升○試効

久年腹痛或疝痛飲痛諸藥無効者用此方運動其固毒時用

吐下之劑以拔去其毒根

烏頭湯 病歷節不可屈伸疼痛○脚氣疼痛不可

屈伸○寒疝腹中絞痛拘急不得轉側發作有時

使人陰縮手足厥逆

麻黃 芍藥 黃耆 各三兩 甘草 三兩

○烏頭 五枚以蜜二升煎取一升即出烏頭

右五味以水三升煮取一升去滓內蜜

煎中更煮之服七合不知盡服之○試効 四肢百節疼痛

如虎咬者此名歷節風此方神驗○方意 烏頭芍藥運和

又治脚氣一身悉痛或四肢痺者

其毒麻黃黃耆扇散之張珞王曰烏頭以蜜煎取緩其性使之留連筋骨以利其屈伸壽按蓋烏頭得蜜奔氣沈着故仲景氏之使用烏頭也必以蜜煎之令其剛悍之氣不奔逸是古人用藥妙處

真武湯 少陰病二三日不已至四五日腹痛小便

不利四肢沈重疼痛自下利者其人或欬或小便

利或下利或嘔者

茯苓^{三兩} 芍藥^{三兩} 生薑^{三兩} 白朮^{二兩}

附子^{一枚}

右五味以水八升煮取三升太泔溫服七合日三服○太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者○易簡方云此藥不惟陰證傷寒可服若虛勞之人增寒壯熱咳嗽下利者互服之

附子湯 少陰病得之二三日口中和其背惡寒者

○少陰病身體痛手足寒骨節疼痛脉沉者說具于系

傳

附子^{二枚} 茯苓^{三兩} 人參^{二兩} 芍藥^{三兩}

白朮^{四兩}

右五味以水八升煮取三升太泔溫服一升日二服○千金云治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刺刀割方中有桂枝甘艸又治寒濕脚氣疼痛不仁脉沈細者○易簡方云治風寒濕合痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著四肢緩縱腰脚酸痛兼治疲極筋力氣虛倦怠偏體酸疼

梔子鼓湯

梔子十四枚 香豉四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進一服○發汗後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣○發汗後若下之而煩熱胸中窒者○傷寒大下之後身熱不忤心中結痛者○心中懊懣舌上胎者○陽明病下之其外有熱手足溫心中懊懣不能食但頭汗出者○下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也

○若少氣者梔子甘艸鼓湯主之於梔子鼓湯方加甘艸二兩

○若嘔者梔子生薑鼓湯主之於梔子鼓湯方加生薑五枚

枳實梔子鼓湯於梔子鼓湯方加枳實三枚 大病差後勞復者

○若有宿食者加大黃切如博碁子大五六枚

梔子大黃鼓湯即枳實梔子大黃湯也 酒黃疸心中懊懣或

熱痛以上三方梔子大黃其分量雖稍異要之亦只一途之方也

茵陳蒿湯 寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發

黃爲穀疽

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 大黃二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取
 三升去滓分溫三服○陽明病發熱汗出此為熱
 越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便
 不利渴引水漿者此為痰熱在裏身必發黃○傷
 寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者右
 章說具于系傳
 梔子蘄皮湯 傷寒身發黃者

梔子 十個
 甘州 兩
 黃蘄 二兩

右二味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

梔子厚朴湯

梔子 十四枚
 厚朴 四兩
 枳實 四枚

已上三味以水三升半煮取一升半去滓分二服

溫進一服○傷寒下後心煩腹滿臥起不安者

大陷胸湯 心下滿而鞭痞者凡百雜病水結而鞭痛者皆可用

大黃 六兩
 芒硝 一升
 甘遂 一錢

右二味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝
 煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服○
 太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動則為

痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也。豎反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊懣。陽氣內陷。心下因鞕。則為結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸自還。小便不利。身必發黃。○傷寒六七日。結胸。熱實。脈沉而緊。心下痛。按之石鞕者。○傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胸無大熱者。此為水結在胸脇也。但頭微汗出者。○太陽病重發汗而復下之。不大便五六

日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹

鞕滿而痛不可近者。右四章說。具于系傳。○方意。此方本蕩

而鞕痛之毒蓋陷胸者。傷寒外邪誤治後邪熱陷入胸膈。結水塊之謂也。仲景氏以此古方備結胸

證故更命陷胸之名者乎。

小陷胸湯 寒實結胸無熱證者。寒實者言寒痰結滯於胸中心下也。

黃連一兩 半夏半斤 栝蒌實大者一個

右三味以水六升先煮栝蒌取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服。○小結胸病正在心下按之則痛。脈浮滑者。○千金方云治胸中心下結

積飲食不消 方中有大黃
甘艸無半夏

括蕞薤白酒湯 胸痺之病喘息欬唾胸肺痛短

氣寸口脉沈而遲關上小緊數

括蕞實一枚 薤白半斤 白酒七合

右三味同煮取二升分溫再服○胸痺不得臥心

痛徹背者括蕞薤白半夏湯主之 於本方加
半夏半升

大半夏湯 胃反嘔吐者

半夏二升 人參三兩 白蜜一斤

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮

取二升半溫服一升餘分再服○千金方云胃反

不受食食入則吐○外臺云治嘔心下痞鞭者

小半夏湯 嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下

有支飲故也○諸嘔吐穀不得下者 諸病嘔吐甚
者不論寒熱

虛實先與此方嘔吐
定而後隨證治之

半夏一升 生薑半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

生薑半夏湯 病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦

不噦徹心中憤憤然無奈

半夏半升 生薑汁一升

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁再煎取一升半小冷分四服日三夜一服嘔止停後服小半夏加茯苓湯 卒嘔吐心下痞胸間有水眩悸者○先渴後嘔為水停心下此屬飲家

半夏一升 生薑半升 茯苓四兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服小半夏湯 以下三方水率至少或分四服者 蓋令徐徐喫之以不至激嘔吐 ○千金方云治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐方中加桂心

半夏厚朴湯 婦人咽中如有炙臍

半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩 乾蘇葉二兩 生薑五兩

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一 ○千金云胸滿心下堅咽中帖帖如有炙臍吐之不出吞之不下 ○易簡云治氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下又云中脘痞滿氣不舒快或痰喘壅盛上氣喘急或痰飲中節嘔吐惡心

半夏瀉心湯 嘔而腸鳴心下痞鞅者

半夏半升 黃芩 乾薑 人參各三兩

黃連一兩 大棗十二枚 甘草三兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出解若心下滿而鞅痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之半夏瀉

心湯主之說具于系傳 ○千金方云老少下利水穀不

消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安者

甘草瀉心湯於半夏瀉心湯方加倍甘草一兩 傷寒中風墜及

下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下

痞鞅而滿乾嘔心煩不得安說具于系傳 ○外臺云婦

人霍亂嘔逆吐涎墜及下之心下痞當先治其涎

沫可服小青龍湯次治其痞可與此方

生薑瀉心湯於半夏瀉心湯方減干薑二兩加生薑四兩 傷寒汗出

解之後胃中不和心下痞鞅乾噫食臭腸下有水

氣腹中雷鳴下利者○方意半夏瀉心湯主治心下鬱痞方之正也仲

景氏活用之傷寒汗下後變證此乃奇也世有區別三瀉心湯配之氣血水而作之說者穿鑿之甚也仲景氏之於三瀉心湯也無佗但半夏瀉心湯證而乾嘔下利者加生薑心煩不得安者加信甘

兩

吳茱萸湯 乾嘔吐涎沫頭痛者○嘔而胸滿者

吳茱萸一斤 人參三兩 生薑六兩 大棗十二枚

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三

服○食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯

劇者屬上焦也○少陰病吐利手足厥冷煩躁欲

死者右三章說吳不系傳○外臺云療食訖醋咽多噫○肘

后方云治噫醋及醋心○東垣曰濁陰不下厥氣

上逆咽膈不通膈塞氣不得上下○千金云治久

寒胸脇逆滿不能食方中加甘艸小麥桂心半夏

又云治胸中積冷心嘈煩滿汪汪不下飲食心胸

應背痛方中有半夏桂心甘艸

厚朴生薑甘艸半夏人參湯

厚朴一斤半 生薑一斤半 人參一斤 半夏一斤半

甘艸二兩

右五味以水一斗煮取三升太滓溫服一升日三

服○發汗後腹脹滿者說具于系傳

黃連湯 傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者

黃連 甘艸 乾薑 桂枝 人參

半夏 大棗

右七味以水一斗煮取六升太滓溫服一升日三

服夜三服○方意

此方於半夏瀉心湯方太黃芩加桂枝而其方意大異黃連分量二併於半夏瀉心湯說具于系傳

乾薑黃連黃芩人參湯 治胃虛客熱痞滿右出玉函假以

示

乾薑 黃連 黃芩 人參

右四味以水六升煮取二升太滓分溫再服○傷

寒本自寒下鑿復吐下之寒格變逆吐下若食入

小即吐○試效心中煩悸及心下痞鞅而乾嘔下利者

大建中湯 心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上

衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近

蜀椒 乾薑 人參

右三味以水四升煮取二升太滓內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服

黃連阿膠湯 少陰病得之二三日以上心中煩不

得臥說具于系傳

黃連四兩

黃芩一兩

芍藥二兩

阿膠三兩

鷄子黃二枚

右五味以水五升先煮二物取二升太滓內膠烱

盡少冷內鷄子黃攪令相得服七合日二服

黃芩湯

治泄利腹痛或後重身熱久不愈脈洪疾

及下利膿血稠粘按菝

黃芩三兩

甘艸二兩

芍藥二兩

大棗十二枚

右四味以水一斗煮取三升太滓溫服一升日再

夜一服○太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯

若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

於本方加半夏半斤生薑三兩

○說具于系傳

白頭翁湯

下利欲飲水者以有熱故也○熱利下

重者

白頭翁二兩

黃連

黃蘗

秦皮各三兩

右四味以水七升煮取二升太滓溫服一升不愈
更服一升○產後下利虛極心煩不得眠白頭翁

加甘艸阿膠各二兩湯主之煎法以水七升煮取二升半肉膠消盡分溫三

服○明鑿指掌曰協熱自利身熱脉數小僂赤澁

木防已湯 胸間支飲其人喘滿心下痞堅面色鵝

黑其脉沈緊得之數十日鑿吐下之不愈木防已

湯主之虛者即愈吐下之後病勢脫而精氣虛者與此方則愈實者二

日復發復與不愈者互木防已石膏加茯苓芫

硝湯主之

木防已三兩 石膏雞子大 桂枝二兩 人參四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服○木防已

太石膏加茯苓芒硝湯於本方內太石膏加茯苓四兩芒硝三合以水六升

煮取二升太滓內芒硝再煎分溫再服

防已茯苓湯 皮水為病四肢腫水氣在皮膚中聶

聶動者

防已三兩 黃耆三兩 桂枝三兩 茯苓六兩

甘艸二兩

右五味以水六升煮取一升分溫三服

枳朮湯 心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

枳實七枚 朮二兩

右三味以水五升煮取三升分溫三服

桂枝枳實生薑湯 心中痞諸逆心懸痛

桂枝兩 生薑各二兩 枳實五枚

右三味以水六升煮取三升分溫三服

枳實薤白桂枝湯 胸痺心中痞雷氣結在胸胸滿胸下逆搶心

枳實四枚 厚朴四枚 薤白半斤 桂枝一兩

括蕒實二枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內

諸藥煮數沸分溫三服

橘皮枳實生薑湯 胸痺氣塞短氣茯苓杏仁甘艸

湯主之枳橘薑湯亦主之

橘皮一斤 枳實三兩 生薑半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服○肘后方

云胸痺胸中幅幅如滿噎塞習習如痒喉中海唾燥沫

橘皮竹筍湯

噦逆者。

橘皮 二斤

竹筍 一斤

大棗 三十枚

生薑 半斤

甘艸 五兩

人參 一斤

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日二服○

鑿通云手足厥冷乾嘔及噦而煩滿者

橘皮湯

乾嘔噦手足厥者。

橘皮 四兩

生薑 半斤

右二味以水七升煮取三升溫服一升

竹葉石膏湯

竹葉 二把

石膏 一斤

半夏 半升

人參 三兩

甘艸 二兩

粳米 半斤

麥門冬 一斤

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去滓溫服一升日三服○太病差後虛羸少

氣氣逆欲吐者

說見于系傳

○千金云發汗後表裏虛

煩不可攻者○經驗云小兒傷寒久不除瘥後復劇瘦脊骨立者又云骨蒸唇乾口燥欲得飲水者○丹溪曰伏暑內外發熱煩躁大渴又曰傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶得汗已解內無

津液虛羸少氣欲吐及諸虛煩熱與寒相似但不
 惡寒身不疼頭不痛不可汗下者○鑿通云衄血
 而渴欲飲水水入即吐者先服五苓散次用此方
 又云差後虛煩不得眠○本艸綱目云石膏主治
 心下逆氣狂喘口乾舌焦不能息又云骨蒸勞病
 外寒內熱附骨而蒸也其根在五臟六腑中必因
 患後得之骨肉日消飲食無味或皮燥而無光蒸
 盛之時四肢漸細足跌腫氣云云

芎歸膠艾湯 婦人有漏下者有半產後因續下血

都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞

疽

芎藭 阿膠 各二兩 甘艸 二兩 艾葉

當歸 各二兩 芍藥 四兩 乾地黃 六兩

右七味以水五升清酒五合者取三升太滓內膠
 令消盡溫服一升日三服○外臺云療頓仆失路
 胎動不安腹痛又治陷經下血孕婦胎漏不止○
 經驗云小產下血不止者○和劑云治勞傷血氣
 衝任虛損月水過多淋瀝不斷及妊娠調攝失宜

胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之

旋覆花代赭石湯

旋覆花三兩 人參二兩 生薑五兩 半夏半升

代赭石一兩 大棗十枚 甘呶三兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服日三服○傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞅噫氣不除者○經驗云治姙娠阻病心中煩悶虛煩吐逆惡聞食臭者

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂一斤 禹餘糧一斤

已上二味以水六升煮取二升去滓二服○傷寒服湯藥下之下利不止心下痞鞅服瀉心湯已復以他藥下之利不止鑿以理中與之利益甚理中者理中魚此利在下魚

桃花湯 下利便膿血者

赤石脂一斤 乾薑一兩 粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓內赤石脂末方寸匕溫服七合日三服○少陰病二三日至四五

日腹痛小便利下利不止優膿血者認具于系傳

方意此方及赤石脂禹餘糧湯皆主止澁裏虛而下利漏洩者

酸棗仁湯 虛勞虛煩不得眠

酸棗仁二升 甘艸一兩 知母二兩 茯苓二兩

芎藭二兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服○千金云治虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠者方中有人參桂心生薑無芎藭

黃土湯 下血先優後血此遠血也○王治吐血衄

血

乾地黄 甘艸 朮 附子 阿膠

黃芩各三兩 竈中黃土半斤

右七味以水八升煮取三升分溫二服

桂枝芍藥知母湯 諸肢節疼痛身體羸脚腫如

脫頭眩短氣溫溫欲吐

桂枝 知母 防風各四兩 芍藥三兩 甘艸

麻黃各二兩 生薑 白朮各五兩 附子二枚

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

升麻鱉甲湯 陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血

升麻 甘艸 各二兩 當歸 一兩 蜀椒 一兩

鱉甲 手拮大 一片 雄黃 兩半

右六味以水四升煮取一升頓服之○陰毒之為病面目赤身痛如被杖咽喉痛升麻鱉甲太雄黃蜀椒主之

射干麻黃湯 欬而上氣喉中水鷄聲

射干 三兩 麻黃 四兩 生薑 四兩 細辛 紫苑

欬冬花 各三兩 五味子 半斤 大棗 七枚 半夏 半斤

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去沫內諸藥煮取三升分溫三服○千金云小兒咳逆喘息如水鷄聲方中無五味細辛欬冬方後云水煎太滓內蜜五合一沸溫服

厚朴麻黃湯 欬而脈浮者

厚朴 五兩 麻黃 四兩 石膏 雞子大 杏仁 半升

細辛 二兩 小麥 一斤 五味子 半斤 半夏 半升

乾薑 二兩

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥
煮取三升溫服一升日三服○千金云大逆上氣
胸滿喉中不利如水鷄聲其脉浮者

葶藶湯 治效有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰

葶藶 二升 薏苡仁 半升 桃仁 五十枚 凡辨 半升

右四味以水一斗先煮葶藶得五升去滓內諸藥
煮取二升服一升再服當吐如膿

炙甘草湯 治虛勞不足汗出而悶脉結悸行動如

常不出一百日危 千金翼

甘草 四兩 桂枝 生薑 各二兩 麥門冬 半斤

麻仁 半升 人參 阿膠 各二兩 大棗 十二枚

生地黃 一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓
內膠消盡溫服一升日三服○傷寒脉結代心動
悸者

十棗湯 病懸飲者○欬家其脉弦緊為有水

芫花 甘遂 大戟 各等分

右三味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗

肥者十枚取八分太萍內藥末服一錢七○太陽
中風下利嘔逆表解者乃可攻也其人熱熱汗出
發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣
汗出不惡寒者此表解裏未和也說具于系傳○千金
云夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日
一歲可與十棗湯又云欬而引胸下痛者又云懸
飲者若下後不可與也凡上氣汗出而欬者爲飲
○外臺云療久病僻飲停痰不消在膈上液液時
頭眩痛苦攣眼睛身體手足十指甲盡黃又療胸

下支滿飲輒引胸下痛○二因方云水腫喘急小
便不通○李時珍云支飲令人欬唾引飲盆兩脇
伏飲令人胸滿嘔吐寒熱眩暈痰飲令人腹鳴吐
水胸脇支滿或作泄瀉忽肥忽瘦溢飲令人沈重
注痛或作水氣跗腫芫花大戟甘遂之性逐水洩
濕能直達水飲窠囊隱僻之處但可徐徐用之取
効甚捷○丹溪曰兼下水腫腹脹并酒食積腸垢
積滯痰癖堅積蓄熱暴痛瘧氣久不已或表之正
氣與邪熱並甚於裏極熱似陰反寒戰表氣入裏

陽極深脉微而絕并風熱躁甚結於下焦大小便不通實熱腰痛又曰小兒熱結乳癖積熱作發驚風潮搐云云

走馬湯 中惡心痛腹脹大便不通

巴豆二枚 杏仁二枚

右二味以綿纏搥令研熱湯二合捻取白汁飲之當下老少量之通治飛尸鬼擊病○外臺云卒得諸疝少腹及陰中相引絞痛自汗出欲死此名寒疝亦名陰疝走馬湯主之

附方

茯苓飲外臺 治心胸中有停痰宿水自吐出水後心

胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食

茯苓三兩 人參三兩 蒼朮三兩 枳實二兩

橘皮二兩半 生薑四兩

右六味以水六升煮取一升八合分溫三服

延年茯苓飲千金作茯苓神散 療心虛不得眠多不食

茯苓一錢二分 人參五分 甘艸二分 生薑五分

橘皮六分 酸棗仁八分

附方

右六味水煎溫服

溫膽湯^干

治大病後虛煩不得眠此寒膽也○心

膽怯弱怔忡易驚者

半夏

竹茹

枳實

各二錢

生薑

四錢

陳皮

三錢

甘枞

一錢

右水煎溫服○丹溪曰病後血氣未復精神未全

多於夢寐中不覺失聲如魘此不係謔語鄭聲互

溫膽湯○易簡云心膽虛怯觸事易驚膽懾氣鬱

生涎涎與氣變諸證或短氣悸乏或復自汗或四

肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安者悉主之
又大治傷寒後虛煩及一切病後虛煩夜睡不安
者并互用之

六物黃芩湯^外

臺

乾嘔下利

心下痞鞅不能飲食者

黃芩

人參

各二兩

乾薑

三兩

桂枝

一兩

大棗

十二枚

半夏

半斤

右六味以水七升煮取三升分溫三服

黃連解毒湯^外

臺

崔氏曰前將軍督護劉車者得時

疫三日已汗解因飲酒劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟

附方

錯語不得臥余思作此方

黃連八分 黃芩五分 黃柏三分 山梔子四分

右四味水煎溫服○仲文仲云療天行若已五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食方中有大黃無黃芩名大黃湯○集驗云治小腸淋瀝出血疼痛難忍○明鑿指掌云治三焦實火內外皆熱煩渴溲赤口舌生瘡便祕脉數者○鑿通云治濕熱邪毒內盛而利不止者○宣明方云治傷寒雜病熱毒煩躁乾嘔口渴喘滿陽厥極深蓄熱內甚

世俗妄傳為陰毒者及汗吐下後寒涼諸藥不能退其熱勢者或加柴胡連翹○外科正宗云療疔毒入心內熱口乾煩悶恍惚脉實者加惡實連翹

甘艸
五蒸湯外臺 療虛勞骨蒸五心煩熱手足煩疼口乾

唇燥者

茯苓三兩 人參二兩 竹葉二兩 石膏半斤
粳米四合 知母一兩 黃芩一兩 甘艸二兩
地黃三兩 直鑿一本有葛根

右九味以水八升煮米熟湯成去滓分三服

溫脾湯外臺

脾胃中冷結實頭痛壯熱但苦下利或

冷滯赤白如魚腦又云治下久赤白連年不止及

霍亂脾胃冷實不消

大黃

四兩

人參

甘艸

干薑

各一兩

附子

一枚

右五味以水七升煮取三升分溫三服○玉函云

下利至隔年日月不期而發者此為有積互下之

止用溫脾湯充佳如難取者可佐干薑圓

壽曰即備急圓

○本事方云治冷痛在腸胃間連年腹痛泄瀉休

作無時服諸熱藥不効互先取太而調易差不可

恐虛以養病也○方意

人參附子干薑甘艸鼓舞運動冷結積滯之毒大黃

泄之蓋溫字互作運字看

檳榔湯

外臺

治腳氣心頭冷癢結痛下氣

檳榔

六兩

木香

二兩

橘皮

二兩

枳實

甘艸

生薑

各二兩

大黃

三兩

右七味以水六升煮取三升日三夜一服

唐侍中檳榔湯

外臺

療腫滿小使少者又曰療苦脚

氣攻心此方散腫氣極驗

檳榔 一錢二分

生薑 六分

橘皮 五分

吳茱萸 四分

木瓜 四分

紫蘇 三分

右六味水煎溫服○衛生良劑方云療風濕毒氣

中於足經遂為腳氣下注兩腳腫脹疼痛履地不得及內攻心腹手足脉絕悶亂煩躁不得息極有神効性全萬安方

烏頭檳榔湯外

治腳氣遍身洪腫者

烏頭 六兩

桑白 一錢

檳榔 一錢

商陸 三錢

大黃 六分

生薑 七分

右六味以水三合先煮烏頭減一合去滓內諸藥煮取一合太滓服○方意此方運動水毒以洩之緩其剛悍之性以親着病毒也

黑豆湯外

治腳氣衝心周身洪腫者

黑豆 八錢

桑白皮 一錢半

郁李仁 一錢

檳榔 一錢半

右四味以水四合先煮黑豆減二合去滓內諸藥煮取一合○發明壽曰世鑿以桃花營實之類下水毒雖其應如響徒瀉浮水爾故不日復聚特郁李仁能破腸中結氣取盡水毒拔病根神驗無類

犀角吳茱萸湯外臺

治腳氣冷毒心下堅背縛痛上

氣欲死效能破毒氣

吳茱萸

六分

檳榔

一錢二分

木香

三分

犀角

五分

半夏

六分

生薑

七分

右六味水煎服

續命湯

古今錄驗

治中風痺身體不能自收口不能言

冒昧不知痛處或拘急不得轉側又治但伏不得臥效逆上氣面目浮腫

麻黃

桂枝

當歸

人參

甘艸

芍藥

石膏

各一兩

乾薑

三兩

杏仁

三十枚

右九味以水一斗煮取四升溫服一升○外臺云

深師大續命湯療毒風賊風身體不能自收咽中

卒不得語若拘急腰痛目眩反張恍惚恐惶上氣

嘔逆面腫方中有黃芩無人參又云主治手足攣

急及不隨又療中風四肢壯熱如火攣急或縱不

隨氣衝胸中方中有黃芩芍藥防風名大續命湯

○千金方增損續命湯條云治小兒卒中風惡毒

及久風四肢角弓反張不隨并躄瘦痺不能行步

又西州續命湯條云治肉極虛熱肌膚活活如鼠
走身上津液開泄或痺不仁四肢急痛

小續命湯千金

治卒中風身體緩急口目不正舌強

不語神情奄忽悶亂又治腳弱又有疹家天陰節
變服之防暗風

麻黃 防已 人參 黃芩 桂枝 芍藥

甘艸 芎藭 杏仁各二兩

防風一兩半

附子一枚 生薑五兩

右十二味以水一斗煮取四升溫服一升

三物黃芩湯千金

婦人在草褥自發露得風四肢苦

煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者

黃芩一兩 苦參二兩 乾地黄四兩

右三味以水六升煮取二升溫服一升

三黃湯千金

治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂

惡寒經日不欲飲食

麻黃五錢 獨活四錢 細辛二錢 黃芩二錢

黃芩三錢

右五味以水六升煮取二升分溫三服

木茱湯千金

治腳氣入腹困悶欲死腹脹○治腳氣

上衝心悶亂不知人事手足脉絕又毒氣攻心手足脉絕此難濟不得止作此湯十愈七八

吳茱萸一錢 木凡一錢二分

右二味以水二合煮取八分一方加青木香犀角

三和散和劑 皆胸痛妨食及腳氣上攻胸腹滿悶不

大便者

羌活 紫蘼 沈香各一錢 木凡 大腹皮

芎藭 白朮 橘皮 木香 檳榔各八分

甘州二分 生薑一分

右十二味水煎服○直指云治水蟲氣脹腹腫腎

腫面浮○局方云治三焦不和心腹痞悶大便秘

難及腳氣上攻腹脹○試効諸疝胸腹刺痛者去白朮川芎羌活加大

黃其驗如神

涼膈散局方 治大人小兒臟腑積熱煩躁多渴面熱

頭昏唇焦咽燥口舌腫閉目赤鼻衄頰頰結礮口

舌生瘡痰實不利涕唾稠粘睡臥不寧譫語狂妄

腸胃燥澁便溺秘結一切風壅并互服之

大黃錢一 連翹 梔子各三分 薄荷

黃芩各四分 甘艸二分 芒硝六分或八分

右七味以水二合煮取一合太淳內芒硝上微火

一二沸空心頓服○正宗云濕熱上攻致牙根腮

項作腫多痛○試効風蟲牙痛常出血至崩落口臭者又走馬疳齒齲腐蝕或

出血牙齒欲落者

升麻散聖濟 治傷寒一日便成陽毒或服藥發汗吐

下之後毒氣不解身重背強煩躁狂言或走或見

鬼神面赤班班狀如錦文咽喉痛及下膿血

升麻錢一 當歸五分 黃芩四分 犀角三分或五分

射干四分 黃連三分 甘艸二分 地骨皮三分

右八味以水二合煮取一合頓服○試効熱病中後吐血

衄血下血及咽喉腫痛者照證服之

犀角地黄湯千金 治傷寒溫病應發汗而不得汗內

蓄瘀血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便血面黃

或中脘作痛

犀角五分 地黃一錢半 芍藥八分 牡丹皮六分

或加當歸川芎

右四味以水二合煮取八勺

逍遥散

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目

昏重心怯頰赤口乾咽燥發熱盜汗寒熱如瘧又

療室女血弱榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成

骨蒸

茯苓

錢一

白朮

分六

當歸

分六

芍藥

分八

柴胡

錢一

甘艸

分二

直棗一本有薄荷何生薑二味

右六味以水二合煎取一合頓服○正宗云治減

食嗜臥及血熱相搏月水不調膈腹脹滿加牡丹

皮山梔子名加味逍遥散○婦人良方云治肝脾

血虛有熱遍身搔痒或口乾咽燥發熱盜汗食少

嗜臥小便澁滯等證又治瘰癧流注虛熱等證

薄荷湯

儒門事親

治諸風癰疥癩病

薄荷

分八

荊芥

分四

麻黃

分六

川芎

分四

甘艸

分二

或加防風大黃

直棗同煮有雷陽芍藥

右五味以水二合煮取一合頓服○經驗云治小

兒病風瘙痒痛如疥搔之汁出偏身痞癩如麻豆

者

透膿湯正宗

治癰疽諸毒膿已成不穿破者

黃耆一錢

穿山甲五分

當歸七分

皂角刺八分

川芎五分

右五味以水二合煮取一合頓服

搜風解毒湯

本脚綱目

治楊梅瘡不犯輕粉病深者月

餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨痛癰瘡不能動

履服之亦効

土茯苓四錢

薏苡仁

金銀花

防風

木此

木通

白蘚皮

各五分

皂莢子

四分

右八味以水三合煮取一合半○外料纂要云治

男婦一切下疳疔疳蝕疔內疔外疔爛疔無有不

効下疳日久不瘥必生楊梅瘡此方預服可使不

起已發可使速愈雖是結毒并歷神効

赤小豆湯

東洋山脇氏製方見干漫遊雜記

主治諸毒內攻腫滿者

赤小豆五錢

商陸二錢

大黃六分

麻黃八分

連翹四分

猪苓六分

木通六分

反鼻三分

鷄舌二分

右九味以水三合先煮赤小豆減一合去滓內諸

藥煮取一合○方意赤小豆商陸木通皆利水之強通竅之力也其以大黃者厚通利之勢也此方之所發動運輸陷結之毒以奏神效也不知者乃曰此方且發且利且瀉一舉三得之良劑者矣也蓋此證毒內攻而結水氣水氣浸毒毒滯水氣於是乎毒與水混合皆毒豈有以此一方除之於三途之理哉

琥珀湯同治產后水腫或諸毒內攻生腫

琥珀一錢 雞舌二分 反鼻三分 大黃六分

猪苓六分 木通六分 商陸二分

右七味以水二盞煮取一盞

赤小豆煎 脚氣疝脹產後腫滿水腫脹滿不論虛

實喫之皆有驗實濟世奇劑

芫花各八分 桑白皮一分 葶藶子一分

商陸二十錢 生薑五錢 赤小豆一合

右七味以水八合先煮六物取四合三勺去滓內

赤小豆更煮令熟一日一夜喫盡○禁忌千金方

云喪孝產乳音樂喧戲并一切魚內生冷醋滑蒜

粘食米豆油并須戒忌三年慎之永不復發不爾

者雖愈必復發不可更治也○余友橘春菴阿波勝瑞

村善鑿特善治腫滿起死回生歲以百數余所親

耳目也乃懇請受其奇方乃赤小豆煎也後周遊四方過尾州名古屋時一男子患腫滿命懸旦夕諸醫束手余欲與往昔所受于橘氏之方以救之失其方書蓋為人所奪也深以為憾苦思終日遂作此方與之十有餘日病脫然復故爾後活幾十人皆用此方凡病水腫者喫之如法則無不有神効者若不可起者則必不能喫之也文化某年余歸舊里偶會春菴言及此話質以此方則與其所傳大同小異後數旬書報日以兄方試諸數十人

十舉十全比之舊方効最速矣

方

抵當丸 婦人經水不利

水蛭 二十個 蠱蟲 二十個 桃仁 二十個 大黃 三兩

右四味杵分為四丸○傷寒有熱少腹滿應小便利今反利者為有血也當下之不可餘藥壽日抵當

湯證而緩者主之本有煎法今不取

大陷胸丸 結胸者項亦強如柔痙狀下之則和吳

方

于系傳

大黃半斤

葶藶半斤

芒硝半斤

杏仁半斤

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢七煉蜜丸

麻子仁丸 大。便。堅。其。脾。為。約。

麻子仁二升

芍藥半斤

枳實一斤

大黃一斤

厚朴一斤

杏仁一斤

右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十九日三〇

試効腸胃粘燥大便不通者

八味丸

脚氣上入少腹不仁。〇虛勞腰痛少腹拘

急小便利者。〇夫短氣有微飲當從小便去之。

苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之。〇男子消渴小

便不利以飲一斗小便一斗。〇婦人病飲食如故

煩熱不得臥而反倚息者何也曰此名轉胞不得

溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈

乾地黄八兩

山茱萸

薯蕷各四兩

澤瀉

茯苓各三兩

牡丹皮三兩

桂枝

附子各一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日再

服○千金方云治虛不足大渴欲飲水腰痛小腹
拘急小僂不利又云腎氣不足羸瘦日劇吸吸少

氣體重耳聾目暗百病 方中有半夏無
附子山茱萸

括蕒瞿麥丸 小僂不利者有水氣其人苦渴

括蕒根 二兩 茯苓 薯蕷 各二兩 附子 一枚

瞿麥 一兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三九日三服
赤丸 寒氣厥逆

茯苓 四兩 半夏 四兩 烏頭 二兩 細辛 一兩
方用桂

右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大先食
酒飲下三九日再夜一服 心胸滿微痛或吐水飲
或寒疝胸腹痛者皆主
之

乾薑人參半夏丸 姪娠嘔吐不止 惡阻不入
水藥者

乾薑 人參 各一兩 半夏 二兩

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲服十
九日三服

桂枝茯苓丸 婦人宿有癥病經斷未及三月而得
漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害姪娠六月動

者前二月經水利時胎下血者後斷三月不血也
所以血不止者其癥不忒故也當下其癥

桂枝 牡丹皮 茯苓 桃仁 芍藥 各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一
丸不知加至三丸○大全良方云專療婦人小產
下血至多子死腹中其人憎寒手指唇爪甲青白
面色黃黑或胎上搶心則悶絕欲死冷汗自汗喘
滿不食或食毒物胎尚未投服之可安已死服之
可下○萬病回春云候產母腹痛腰痛見漿水下

服方○經驗云小產瘀血心腹疼痛而發熱惡寒

者以上三條皆為湯液用焉按日子死腹中曰胎

日當下其癥
皆當加大黃

大黃廕蟲丸 五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷

憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內有

乾血肌膚甲錯面目黧黑緩中補虛

大黃 十分 蒸 黃芩 二兩 甘艸 三兩 桃仁 一升

杏仁 一升 芍藥 四兩 乾地黄 十兩 乾漆 一兩

廕蟲 一升 水蛭 百枚 鱗鱒 一升 廕蟲 半升

右十二味末之煉蜜丸小豆大酒服五九日三服

○壽日藥品多味恐非古意不如以桃仁大黃乾漆水蛭蟲蠱六味末之蜜丸酒服取効之速也又曰所謂緩中補虛者言太乾血則腹中緩舒氣血精液漸復也

已椒薑黃丸 腹滿口舌乾燥此腸間有水氣

防已 椒目 葶藶 大黃 各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一九日三服稍增口中有津液渴者加芫硝半兩

備急圓 主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹滿卒如錐刺氣急口禁停死卒死者

大黃一兩 乾薑一兩 巴豆一兩

右藥各須精新先擣大黃乾薑為末研巴豆內中合治一千杵用為散蜜和丸亦佳密器中貯之莫令歇氣○用法以煖水若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令下咽須臾當差如未差更與三九當腹中鳴即吐下便差若口禁亦須折齒灌之○外臺云乾霍亂大小便不通煩冤欲死又云乾霍亂腹脹滿攪刺疼痛煩悶不可忍手足逆冷甚者流汗如水大小便不通求吐不出求下不下須

更不救便。有性命之慮。急與云云。○錄驗云。療人
 卒上氣。呼吸氣不得。下喘逆。差後已為常用。○肘
 后云。治大熱行極。及食熱餅。竟飲冷水。過多衝咽。
 不即消。仍以發氣。腸內一切卒暴百病。○鑿通云。
 下利差後。至其年月復發者。○得効方云。妊婦熱。
 而大便秘。脉實。死胎。不知人。溫水下。七圓即活。○
 宋王碩曰。巴豆治垂死之病。藥至病差。其効如神。
 真衛生代病之妙劑。參朮雖號為善良。卻能為害。
 每見尊貴之人。服藥只參朮。平穩而於有眩眩之

功者不敢輒服。鑿雖知其當用。亦深慮其相信之
 不篤。稍有變證。恐歸咎於已。姑以參朮等藥迎合
 其意。倘有不虞。亦得以籍口。而不知養病喪身。莫
 不由此。○方意。心痛大便秘。或手足厥冷。六脉沈
 伏者。及赤白痢疾。臍腹疔痛。多由
 腸胃間積滯之所致。先以此圓下之。又主惡心嘔
 吐。不納食物。而大便閉者。又治痿痺。奔豚。脚氣。攻
 刺入
 腹者
 礬石丸 婦人經水閉。不利。藏堅。癖不止。中有乾血

下白物

礬石 三分

杏仁 一分

方

方

右一味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者再內之

歸母苦參丸 姪。娠。小。便。難。飲。食。如。故。

當歸 貝母 苦參 各四兩

右二味末之煉蜜和丸如小豆大飲服三九加至十九

紫圓千金 治小兒身熱頭痛飲食不消小兒無異疾

唯飲食過度不知止哺乳失節或驚悸寒熱又云

紫圓無所不療雖下不虛人又云小兒變蒸發熱

不解并挾傷寒濕熱汗後熱不歇及腹中有痰僻
哺乳不進乳則吐哕食癩先寒後熱又云食癩當
下乃愈

巴豆三錢 代赭石 赤石脂 各二錢半 杏仁 四錢

右先搗代赭石赤脂為末研巴豆杏仁內中合治
糊丸○千金方芑硝紫圓條云治小兒宿食癖氣
痰飲往來寒熱不欲食消瘦者又雙紫圓條云夜
啼不眠是腹內不調又順流紫圓條云治心腹積
聚兩脇脹滿留飲痰癖大小便不利切痛又午黃

紫圓條云治小兒結實乳食不消心腹痛又治小兒宿乳不消腹痛驚啼以上四章皆用此丸藥佳
 ○嬰兒指要云凡有臍風撮口胎風撮口鎖肚撮口瘡腸撮口卵疝撮口皆出結鬱于腸胃閉不得通腹中滿脹肚上青筋撮口不乳最為惡候一臘內見之充急用紫圓子利之纔通疾去兒和○經驗云療纏喉風及喉脾卒然倒仆失音不語或牙關緊急不省人事

硝石大圓金千 治十二癥瘕及婦人帶下絕產無嗣

硝石七錢 大黃九錢 人參三錢 當歸三錢

甘艸二錢

右五味為末和煉蜜糊丸○試効腹中有堅塊者勿論男子婦人

皆用之

平水丸金千 治水腫通身洪腫或脚氣脚弱悸動升

逆者

吳茱萸 芫花 芫硝各三錢 商陸四錢

甘遂二錢

右五味為細末糊丸

滾痰丸

本脚附方

治痰為百病唯水瀉胎前產後不可

服又云溫水吞下即臥勿動候藥逐痰滯次日先

下糟粕次下痰涎

大黃

黃芩

各五錢

消石

二錢半

青礞石

二錢燒金

色為度

沉香

五錢

右五味為末糊丸每服自三五分至一錢○養生

主論云治濕熱痰積變生百病○試効

諸喘欬上氣胸痛

梅核氣痰核及諸肩背縛痛者皆主之

○辨誤

近世醫家有公沈香

奪病之弊也按此方降痰氣化粘液取之穀道太若加甘遂則藥性走而急反薄降氣化痰之能不

可不察焉

控涎丹

三因方

治痰留在胸膈上下變為諸病或頸

項胸背腰脇手足膝蹠隱痛不可忍節骨攣引鈞

痛走易及皮膚麻痺似乎癱瘓又治頭痛不可舉

或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心竅并互此藥

數服痰涎自失諸疾尋愈

甘遂

大戟

白芥子

各等分

右三味為末和煉蜜為丹○得効方云凡人忽患

胸背手足腰膝隱痛不可忍乃是痰涎伏在心膈

上互此藥○經驗云暴喘俗傳馬脾風大小便難
互急下之又云小兒心下痞痠癥結聚腹大脹滿
身體壯熱不欲哺乳者○鑿通云及乎五旬內外
氣血向衰漸至食少體倦或肢體煩悶嘔逆甚至
上下不通者須乘初起元氣未衰急投控涎丹十
餘粒不下少頃再服當此危急之時不下必死下
之庶幾可生○李時珍曰痰涎之爲病隨氣升降
無處不到入于心則逆竅而成癲癩妄言妄見入
于肺則塞竅而成欬唾稠粘喘急背冷入于肝則

留伏蓄聚而成胸痛乾嘔寒熱往來入于經絡則
麻痺疼痛入于骨節則頸項胸背腰脇手足攣引
隱痛陳無擇二因方并以控涎丹主之殊有奇効
左經丸 蘇沈良方 治筋骨諸疾手足不隨不能行步運
動

木鼈子 艸烏頭 白膠香 五靈子 各三兩

當歸 一兩 斑猫 一百個

右爲細末用黑豆衣皮生杵粉一斤醋煮糊爲圓
如雞實大每服一丸酒磨下筋骨疾但不曾針灸

傷經絡者四五丸必効云云又曰此藥能通榮衛
導經絡又曰服後小便少淋瀝乃其驗也

十棗丸

丹溪
心法

治水氣四肢浮腫上氣喘急大小便

不利

甘遂

大戟

芫花

各等分

右為末煮棗肉為丸桐子大清心熱湯下二十九

五苓散

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者○

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸

主之脉浮小便不利微熱消渴者五苓散主之○

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而顛眩○渴欲飲水

水入則吐者名曰水逆五苓散主之

猪苓

十八銖

澤瀉

一兩六銖半

茯苓

十八銖

桂枝

半兩

白朮

十八銖

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服○太陽

病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水

者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利

微熱消渴者○發汗已脉浮數微熱消渴者○本

以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口

燥煩小便不利者

茵陳五苓散

黃疸病當有小便不利渴證

茵陳蒿末十分

五苓散五分

右二物和先食飲服方寸匕日三服

猪苓散

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之後

思水者

猪苓

茯苓

白朮

各等分

右三物和先食飲服方寸匕日三服

牡蠣澤瀉散

牡蠣

澤瀉

括蔘根

蜀漆

葶藶

高陸根

海藻

各等分

右七味異擣下篩為散入臼中治之白飲服方寸

匕○大病差後從腰以下有水氣者

說具于系傳

葵子茯苓散

姪娠有水氣身重小便不利洒淅惡

寒起即頭眩

葵子

一斤

茯苓

三兩

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

土瓜根散

帶下經水不利少腹滿經一月再見者

○陰痿腫壽日婦人陰門腫是瘀血所致

土瓜根

芍藥

桂枝

麈尾各三兩

右四味杵為散酒服方寸匕日三服

瓜蒂散 病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞅氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之○病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中當須吐之○宿食在上脘者當吐之

瓜蒂一分

赤小豆一分

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香

豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止○外臺云療急黃心下堅鞅渴欲得水喫氣息喘粗但有一候相當即須服之吐則差○辨正錄云人有食河豚舌麻心悶腹脹氣難舒口關聲不出療法宜吐其肉○證治大還云痰厥者因氣逆痰壅故忽然昏迷卒倒咽中涎潮如拽鋸聲互先以瓜蒂散吐之○儒門事親云凡婦人頭風眩暈登車乘船眼澁手足麻髮脫健忘皆胸中宿痰所致又云一切沈

積或有水不能食使頭目昏眩不能清利涕唾效
嗽喘滿時發潮熱○金匱鉤玄云痰在經絡中者
非吐不可出吐方中就其發散之義也又云氣實
痰熱結在上者則吐又云膠固者必用吐之又云
哮喘必用薄滋味專主於痰互大吐云云亦有虛
而不可吐者又云喉中有物咯不出嚔不下此是
老痰重者吐之又云痰壅盛者口眼過斜者不能
言者皆當吐○明鑿指掌云吐痰之聖藥治在膈
上○丹溪心法云小兒急慢驚風發熱口禁手心

伏熱痰熱效嗽痰喘此證類并用湧法吐之重劑
此蒂散輕劑用苦參赤小豆末云云又云驚有二
證一者痰熱主急驚當吐瀉之一者脾虛乃爲慢
驚所以多死云云又云用吐方必緊勒於無風之
處行之○丹溪心法附錄獨聖散條云治中風痰
迷心竅顛狂煩亂人事昏沈又治五癩心風
蕙苡附子敗漿散 腸癰之爲病其身甲錯腹皮急
按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此爲腸內
有癰膿

方
方

薏苡仁十分 附子二枚 敗漿五分

右三味杵為末飲服方寸匕本有煎法今不取

天雄散 失精者下部冷結衝逆而失精者

天雄三兩 朮八兩 桂枝六兩 龍骨三兩

右二味杵為末服方寸匕日三服并主癰膿以麥

汁下之

排膿散 諸毒腫有膿者互服之以排膿

枳實十六枚 芍藥六分 桔梗二分

右三味杵為散取鷄子黃一枚以藥散與雞子黃

相等揉和令得飲和服之日二服

當歸芍藥散 婦人妊娠腹中疝痛

當歸三兩 芍藥一斤 茯苓四兩 蒼朮四兩

澤瀉四兩 芎藭半斤一作三兩

右六味杵為散取方寸匕酒和三服○經驗云妊

娠身體浮腫四肢脹急小便不利者又妊娠胎間

有水氣而身微腫者

蜀漆散 瘧寒多者名曰牡瘧

蜀漆 雲母 龍骨各等分

右三味搗為散未發前以漿水服半錢

桔。樓。白。散。欬。而。胸。滿。振。寒。脉。數。咽。乾。不。渴。時。出。濁。

唾。醒。臭。久。久。吐。膿。如。米。粥。者。為。肺。癰。○寒。實。結。胸。

無。熱。證。者。與。三。物。小。陷。胸。湯。白。散。亦。可。服。

桔。樓 貝。母 各。三。兩 巴。豆 一。分

右三味為散強人服半錢七羸者減之病在膈上

者吐膿血在膈下者瀉出若下多不止飲冷粥一

盃則止

四逆散 少陰病四逆其人。或。欬。或。悸。或。小。便。不。利。

或。腹。中。痛。或。泄。利。下。重。者。

柴。胡 芍。藥 枳。實 甘。枙

右四味各十分搗篩白飲服方寸七日三○按此大柴

胡湯方內太半夏黃芩大棗則大柴胡湯證中無結實嘔吐證者互用之說具干系傳 ○明

醫指掌云寒邪變熱傳裏腹痛便秘而厥者

消。礬。散 黃。家。日。晡。所。發。熱。而。惡。寒。此。為。女。勞。得。之。

膀。胱。急。少。腹。滿。身。黃。額。上。黑。足。下。熱。因。作。黑。疸。其。

腹。脹。如。水。狀。大。便。必。黑。時。澹。此。女。勞。之。病。非。水。也。

滑。石 礬。石 各。等。分

右二味為末以大麥粥汁和服方寸七日三服病
隨大小便太小便正黃大便黑是其候也

蛇床子散 溫陰中坐藥

蛇床子

右一味末以白粉少許和令相得如大棗綿囊內
之自然溫

奇正方畢

刺奇正方小引
公山賀古先生志存濟恤業執鑿瘡藥
驗諸今而方書稽諸古潛研之久不覺家
書數編矣已而自歎曰著述收名以售其
術世固有之吾豈尤而效之乎乃悉焚其
編稿矣而易竊騰寫奇正方及傷寒論系
傳二書於未焚之帙巾箱於襲先生曾不

之知也有一老翁與先生相親善翁謂先生曰人生此世飽食暖衣每報天恤物之心者所謂馬牛而襟裾意者草木之微尚着華結實以供人而徒同腐朽可乎我齒既垂八旬室廬足以安一族餼廩足以給數口而耳不聞道義蠢蠕逸居寔愧草木之不如也我聞先生有著述數編請

給費以梓之亦報天濟世之一端吾儻以兔馬牛襟裾之識先生搔首曰嘗有之而今則無矣翁為之俛然易仄聞此言也乃奉嚮所騰寫竒正方於先生曰有有不終無也先生莞爾而笑曰著述之傳否亦有數乎翁亦冑而喜之速授互以公于世云於戲先生之每求於名也固矣而翁之忠

告實有不可默者蓋天之末喪斯文也
竊寫幸免火勸刻又有人子夏子有言維
曰末學吾必謂之學矣翁之敦篤斯其人
歟翁陰德不欲稱其名姓此併先生皆無
求於名之學也

門人 阿波 春塘易揚亭謹撰



奇正方跋

紙鳶者兒戲也當青帝顓令風塵飛颺也
童子群戲線以放之於彼東郊夫風勁而
狂則伸以扶其顛慢而衰則縮以持其墜
伸縮與奪必期之於扶搖戾天抃喜舞蹈
竟日而止蓋日日然也一日會檢官巡部
狼狽失錯委線莽艸而避之既而至則鳶

悉墜於地於是乎衆始見醫理之寓於微
物也何也蓋紙鳶之戾天也者人得其所
也風勁而顛衰而墜也者六淫六疾也而
制之伸縮與奪者醫之應機變也其抃喜
舞躍竟日而止也者人之盡天年也而或
避道委莽艸者醫之不及制與奪也此即
醫之有補於生而不可以一日闕也夫醫

之有補於生而不可以一日闕也如是如
是而錯其施失其制醫之誤人固數數豈
止一時避道委墜之比乎此賀古君不可
不有奇正之一著也賀古君者州人也家
原祿仕於藩皇祖了齋君坐事罷官皇父
桺阿君僻處白屋嗜學業醫庭訓又有方
君少好游適京如尾中還阿今又徙居於

浪華君螢雪不倦四十年一日所著述亦
多矣而今首公此書於世且問跋於余余
即君之舊好也故為作紙鳶說以注其著
意於卷末云文政庚寅冬至後十日

阿波 速 陳人堀江藝君對撰



奇正方跋

奇者為者功也 裁也 南其木也
頽之風蓬四起也 產子十萬
人爭放之於波東郊也 夫風
勁而狂也 與線而制之頽衰
而悖也 奪線以提之墜扶搖

庚天而後之以此竟日之親昏
 至乃思善日之然也一日忽遭
 檢官巡部道出於此狼狽失
 措託線子木而去功而反至焉
 乃此後矣於是始見堅理之寓
 於物也夫紙寫之庚天也其人

之有乎者也風動而歎者而墜也
 也者六淫之為六疾也因而施與
 奪之權也者以重之在機之反也
 信矣日之親日昏乃善也者人之
 者之善也而此之如彼而合之如此
 者豈非因與奪之權乎論至於

此固位望之有補於生而所以
一曰竊也然流握之權一措之施
則誤人之百年也必矣其責將誰
歸此賀古氏之所以為奇正方也
賀古氏者物人也家世祿官拉薩
至乃祖了當貝子之子孫官乃考

柳阿莫白屋僻處嗜學喜方道
使君從子於法云少好游適京
如尾中或在於阿古又造居於坂
其勉學不倦者四十年一日矣
其多著書此特其心之身而首公
之世者將使知與奪之權之所

在也遂使余亦有所考以于时
文政庚寅冬至後一日

阿波 江藝君樹撰



Faint cursive text bleed-through from the reverse side of the page.

天保三_{壬辰}歲仲春葭兌

皇都書林

三條通麩屋町

吉野屋仁兵衛

東都書林

日本橋通油町

鶴屋喜右衛門

浪花書林

心齋橋通北久太郎町

河內屋喜兵衛

同安土町

河內屋宗兵衛

