



門 賦 0  
323  
卷 1



一本堂家方

香川先生撰

鳴好文軒  
英萬笈堂  
升川泰山堂

醫事說約

鳴谷良知先生閱



醫事說約序

醫之為醫古之與今均之皆不學無術也哉  
而本邦醫家愈益甚斐所深惡也是故耻  
為醫雖然世醫也至於斐之身而反之不可  
思之又思卧不安席食不可味癸亥之歲聞  
脩菴先生以一本之道倡乎平安興曰盍歸  
乎來千里負擔列弟子籍於是乎出於幽谷  
遷于高木人或有不非先生稱儒醫者斐曰何  
其傷也服堯之服誦堯之言行堯之行是堯  
而已矣先生之祖述語孟憲章孔孟而成一  
家言而服儒服是非儒醫何也與夫不學無  
術之醫黑白冰炭豈可同日而論哉斐雖不

醫事言終一序  
敏親多有日、僅得窺其一斑、今年孟夏閱禮  
菴先生醫事說約、轉寫日久、豕亥不少矣、斐  
乃與池子刪其不正以歸乎正、嗚呼先生活  
人手段、盡於此書乎、何其盡也、孟子曰、梓匠  
輪輿能與人規矩、不能使人巧、惟先生亦然、  
著述是書、使門人小子知治體如此耳、巧則  
在其人矣、勿膠柱而鼓瑟也、先生之所命也、  
讀者鑒之、  
延享元年甲子仲冬朔豐州森都管斐希父  
拜書於一本堂

序  
大哉一本之道也、彼沉沉于五行配當之說  
者、誰能知之、其居常所施之術、救人於短期  
之間、盧扁之所不敢當也、而天下之士、懷痾  
來者、雲合霧集、魚鱗雜襲、飄至風起、大哉一  
本之道也、往昔禮菴先生撰醫事說約、而此  
書也、固無意於致之遠、備之一不朽之具、但  
欲使門人小子便治療之方也、惜哉、本書既  
埋滅、其誤落于坊間者、猥以吐五里霧、於是  
乎人各欲復其初者、無一盡力者、吁、其不盡  
力乎、又將力之不及乎、今茲甲子之夏、管池  
二子合力正之、遂以廓如也、當今有志于此

道者由于此書罄控則伯樂在其身焉耳而  
欲得此書者引領凝凝不但吾黨天下皆然  
誠南海之羽出疆而後珍况於此乎  
延享甲子仲冬既望阿波宮成鳳韶選

新刻醫事說約序

本邦正德年間香川秀菴先生以醫名于京  
師醫家至謂先生為太山北斗先生信京醫  
之最高手也哉其所著藥選行餘醫言行世  
而藥論病因中天但未見其集方頗為遺憾  
矣頃者書肆平吉刻禮菴所輯醫事說約成  
請序于余余取而讀之即先生日用之方始  
自湯液丸散終于餌食酒醪殆如一編食次  
冊六味八珍並陳于其中則先生和劑之妙  
所謂劑如羹之和者耶後之染指于先生之  
鼎者必嘗味而旨之亦必帳秘是書以臨病  
人其應見症可辛甘可酸苦不過為一披閱

之勞而瞭然在目此禮菴纂輯之功誠不淺小矣惟未梓行為小缺陷耳今也平吉得古寫本之正且善者精校再三梓而行于世其功不在禮菴之下四方醫家必且嘉尚之是為序

文化五年戊辰七月

江戶 鈴木維正良知甫 序



德洲 武田信任書

凡例

一 斯書本以寫本行帝帛烏鳥之謬不一而足矣此以古寫本尤善者為藍本更集數本為釐正衍字者刪之脫文者補之兩可難裁者附註其下不敢一毫苟且賜覽君子應自知之

一 菅宮二子不善文辭故其序率語意不通本應從刪然微二子之序何以知禮菴先生所以纂輯是書之意故姑依舊存之

一 書中藥名率從省略急遽之際多有迷謬者焉今詳其中一字從者茯苓也亦作苓朴者厚朴也亦作厚而樸樹亦曰樸與朴

同音而易混。枳者枳實也，亦作實，亦作殼。姜者生姜也，亦混干姜。一本乾姜从干，傍姜作穰字，今从之。大者大黃也，亦作虎，亦作將，芒者芒硝也，亦作硝，陳者陳皮也，亦作橘，瓜者枯樓人也，亦从木，邊舌作括字，而瓜子人亦曰瓜，易混而區別，諸如此類，不可勝舉。世之大方，幸正諸。

一斯書刻為巾箱小字本者，要其易提攜也。當今醫家藥篋中，必貯方彙，方選方極類，聚方等，未及是書，誠為闕典。斯書發兌之日，大方購焉，貯于篋中，以供異日疾疢之用，則必有大裨益矣。

目錄

家方四劑

中寒	傷風寒	中濕	瘧疫
<small>風毒腫、脚痺、雀膝痺、手痺</small>	<small>瘧疾</small>	<small>痢疾</small>	<small>蝦蟆瘧、大頭瘧</small>
痛痺	瘧疾	痢疾	
<small>傷食、帶食</small>	骨蒸勞	痢疾	
傷食	<small>咳嗽、自汗、盜汗、內傷、遺精、渴症</small>	痢疾	
鼓脹	噎	痢疾	
<small>石痕</small>	蟲症	痢疾	
痞癥	癲狂癩	眩暈	<small>暈非健忘、卒倒、蘇後</small>
<small>驚悸、不寐</small>	嘔吼	翻胃	<small>嘔吐、惡心、吞酸、嗜酸、吐酸</small>
水腫	消渴	泄瀉	<small>疝瀉</small>
黃胖	結毒	黃疸	
<small>頭痛、腹痛、胸痛、脇痛、腰痛</small>	<small>淋疾、疝瘕、癰瘡、腫毒、疥癩</small>		
諸痛			

痔漏 脫肛 諸失血 吐血、咳血、衄血、下血、溺血 小便閉

眼目、耳、鼻、口、舌、牙齒、咽喉

大便閉 秘結 癰疽 腸癰 疔 打撲

瘰癧 結核 金瘡 破傷風 帶下

經閉 血塊 血崩 惡阻 娠咳 死胎

轉胞 小兒門 催生 娠咳

臍風 撮口 口瘡 重舌 夜啼 客忤

急驚 慢驚 疳癖 痘瘡 麻疹 水痘

附丸散方 經驗方

醫事說約

家方四劑

順氣劑

茯苓 大半 半 壳 或代陳 厚 中 草 少

姜 三五或五多

右以水二合煮取一合分溫二服不堪多服者三四服以茯苓半夏湯為立方之主吾門以順氣為治療第一義順氣者承氣也蓋取於仲景承氣湯意也苟能識得此方臨機應變以活用之則處劑治病可運於掌上矣

加減法風邪加圭芍升瘡加柴芩圭升痢  
加芍將後或加賓連木隨症出入一切痞  
不思湯藥者加莪木槎咽痛加桔凡疫邪  
不可久升疝積痛加桂芍索烏附菜類泄  
瀉去壳厚加水槎木滯食傷食加藿木益  
吐瀉後厥冷加接附咳嗽如果槎苓味喘  
加卜杏為主或莢接莪果瀝隨症進退一  
應輕症宜用此方消息

解毒劑

茯苓通忍大芎大中甘小  
右水二合煮取一合分溫二服勝藥氣者  
互頓服加土狀五錢則水四合煮取二合

作癰一

或用坻十錢則水八合煮取四合惡湯稠  
者六合煮取三合一升煮取五合亦可也  
若用大劑水率須準其方大小微瘡家一  
切必用之要劑療微瘡便毒下疳結毒發  
漏筋骨疼痛諸壞症及癬賺瘡諸惡瘡膿  
淋加減法坻樸萃將膝升隨症出入弱人  
或泄瀉家胃虛者方中將代枳胃實大便  
秘結或骨痛甚者須用將咽喉痛喉痺加  
桔膿淋或有水氣加莪有水銀輕粉毒坻  
最可也藥選坻條下辨正可參考

排毒劑

茯苓獨大桔芎中枳柴小或代升



甘小 姜三分或五分

右水二合，煮取一合，分温二服。勝藥氣者，  
至頓服。治痛痺風毒瘟疫類，一切眼疾，咽  
喉痛，一切瘡腫疥癬，加減法。痛痺防通忍  
桂附隨症出入。足痛加膝骨節痛甚，加將  
咽喉痛枯為主。眼疾血多加危藥菊類，痛  
甚，加將羔風眼加倍，升結毒眼加將。

潤涼劑

茯苓 果大 苓 知 膠中 甘小

姜三分或五分

右水二合，煮取一合，分温二服，或三服。療  
吐血下血咳血，或勞瘵欲用湯藥，為冬助。

則至用此方，消息加減法。吐血加艾艾，無  
艾代百，下血加水，穰或歸芍，桂隨症進。  
退勞效潮熱往來，加柴，嘔加半姜，自汗盜  
汗加牡，瀉減苓，知加水，金瘡產後諸失血  
非此方所主也。

○傷風寒

桂枝加減方

風邪輕症，脈浮數，頭痛惡風發熱，或鼻涕  
出者。

桂芍 半升 陳甘

家方順氣劑

夏月加藳

一本  
無結

又方

兼溫疫、或咽痛者、

桂 芍 半 桔 升 甘

家方排毒劑

風濕兼中、通身重痛、或咽痛者、

桂枝湯

脈浮發熱、汗出、惡風、鼻鳴、乾嘔者、加半升

桂 芍 甘 姜

葛根湯

項背強几几、無汗惡風、或自下利者、嘔加

半升

桂 芍 葛 麻 甘 姜

麻黃湯

脈浮弦、頭痛發熱、身痛、腰痛、骨節疼痛、惡

風、無汗而喘者、

麻 桂 杏 甘 姜

大青龍湯

脈浮緊、發熱惡寒、身疼痛、汗不出而煩躁

者、取微似汗、汗出多者、溫粉撲之、明理論

水並藜蘆、以上四味等分、細末、一兩、米粉、方

三兩、不入藜蘆亦可也、又方、牡蛎、一味、撲

麻 桂 甘 杏 羔 姜 棗

小青龍湯

表不解、心下有水氣、乾嘔發熱、而咳、或利、

或噎或小便不利小腹滿或喘者

麻芍 味桂半辛甘 稷

加減法渴者去半加果微利者去麻加薑

噎者去麻加附小便不利小腹滿者去麻

加茯苓喘者去麻加杏

厚朴生姜甘草半夏人參湯

發汗後腹脹滿者

茯苓四逆湯

發汗若下之病仍不解煩躁者

茯苓 瀉 稷 附 甘

加減益氣劑

發汗後二三日脈芤面赤惡熱或下利二

三行舌上有苔或無苔而赤不欲飲食喜

熱飲食難進重者不寐間有譫語妄言眼

目赤如是者加附加倍瀉腹滿者去莖

近年時疫多有此症麻黃桂枝發無效

莖胡白虎亦不能解重者七八日斃症不

甚者在再引日終至于死束手受敗播磨

同志試用此劑得效云不顧他証只管與

數十貼稍知期十四五日予亦試用間得

效故記以備後考

著 菱 水 歸 橘

五苓湯

發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得

飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者

猪澤 茯苓 桂 朮

茯苓甘草湯

汗出渴者五苓湯主之不渴者與此湯

茯苓 桂 甘草 姜

猪苓湯

汗出多而渴者不可與脈浮發熱渴欲飲水小便不利者

猪茯苓 膠 滑 澤 朮

梔子豉湯

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆

顛倒心中懊憹或煩熱胸中窒者

梔子 豉

小柴胡湯

傷寒中風五六日往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸或小便不利或不渴身有微熱或效者此湯主之凡用柴胡湯但見一症便是不必悉具加減法若胸中煩而不嘔去半加果實渴者去半加倍葦加果腹中痛者去芍加芍脇下痞鞭去棗加蛭心下悸小便不利者去芍加茯苓不渴外有微熱者去葦加桂

欬者去葶藶姜加味棗

柴 芩 葶 半 甘 姜

大柴胡湯

十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈

建中湯

脈溢弦法當腹中急痛者或心中悸而煩者嘔家難用以甜故也

桃核承氣湯

熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但小腹痛急結者乃可攻之

桃 桂 將 芒 甘

抵當湯

傷寒六七日表症仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血則愈所以然者瘀熱在裡故也喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑身黃脈沉結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦

也 蛭 蠱 桃 將

大陷胸湯

脈遲、膈內拒痛、胃中空虛、客氣動、胸膈短、氣煩躁、心中懊憹、陽氣內陷、心下因鞅、則為結胸。傷寒六七日、結胸熱內實、脈沉而緊、心下痛、按之如石、鞅者、結胸無大熱者、此為水結在胸脇也。但頭微汗出者、重發汗而復下之、不大便五六日、舌上燥而渴、日晡所小有潮熱、從心下至小腹、鞅滿而痛、不可近者、脈浮大者、不可下、將芒遂

十棗湯

下利嘔逆、表解者、乃可攻之、其人熱、熱汗出、發作有時、頭痛、心下痞、鞅滿、引脇下痛、乾嘔、短氣、汗出不惡寒者、此表解裏未和也。

芫 遂 戟 棗

小陷胸湯

結胸病正在心下、按之則痛、脈浮滑者、

連 半 果

半夏瀉心湯

心下鞅痛者、此為結胸也。大陷胸湯主之、但滿而不痛、宜此湯。心下鞅、下利不止、水

漿不下其人心煩者

半 芩 朮 連 甘

大黃瀉心湯

心下痞按之濡脈浮者

大黃 黃連

生姜瀉心湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞅乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

姜 半 朮 連 甘 芩

附子瀉心湯

心下痞而復惡寒汗出者

將 連 芩 附

甘草瀉心湯

下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞅而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中空虛客氣上逆故使鞅也

芩 連 朮 半 甘

赤石脂禹餘糧湯

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞅服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦此湯主之

赤 糧 若無糧則土器一味細末稀糊丸代禹餘糧湯

白虎湯

傷寒脈浮滑表裏有熱或舌上乾燥譫語  
渴欲飲冷水者

知 甘 米 羔 姜

人參白虎湯

傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏  
俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲  
水數升渴無表症者

知 米 羔 漫 甘 姜

小承氣湯

多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則  
譫語若服湯譫語止更勿復服譫語發潮

熱者手足濇然而汗出者此大便必鞭也  
傷寒若吐若下後不解不大便五六日至  
十餘日晝晡所發潮熱不惡寒獨語如見  
鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而  
不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但  
發熱譫語者與之若一服利止後服心中  
懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初  
頭鞭後必漉者不可攻之不大便五六日  
繞臍痛躁煩發作有時者此有燥屎也

將 朴 枳 芒

調胃承氣湯

發汗後胃中不和譫語者十餘日不解大



便鞭者熱譫語者  
將 甘 芒

蜜煎導

蜜一味入銅器中微火煎之稍凝似飴狀  
投水中以鞭為度攪之勿令焦著欲可丸  
併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當  
熱時急作冷則硬以內穀道中小便自利  
欲大便秘結與之

麻仁丸 蜜丸

大便秘結與之  
摩 芍 杏 將 朴 枳

茵陳湯

頭汗出身無汗劑頭而還小便不利渴引  
水漿者此為癰熱在裏身必發黃 傷寒  
七八日身黃如橘下已小便不利腹微滿  
者

茵 卮 將

卮子藥皮湯

傷寒身黃發熱者

卮 藥 甘

附子湯

仲景所謂少陰病脈微細但欲寐者口  
中和背惡寒者 身體痛手足寒骨節痛

脈沉者

附 茯苓 葶 水 止

真武湯

仲景所謂少陰病二三日不已至四五日  
腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者  
此為有水氣其人或欬或小便利或嘔者  
茯苓 芍 水 附 姜  
加減法欬者加味辛棧小便利者去茯苓下  
利去芍加棧嘔者去附加倍姜

白通湯

仲景所謂少陰病下利脈微者  
棧 附 葱

桔梗湯

仲景所謂少陰病二三日咽痛  
桔 甘

半夏散

仲景所謂少陰病咽中痛者 搗篩白飲  
和服方寸匕不能散服者水煎令小冷少  
少燕之

半 桂 草

四逆湯

脈浮而遲表熱下利清穀者手足厥脈微  
欲絕身反不惡寒面赤或腹痛或乾嘔  
或咽痛或利止脈不出者 加減法面赤

色者加葱腹中痛者加芍利止脈不出者加瀉自利不渴者傷寒論所謂太陰病也當溫之宜此湯一名通脈四逆湯

甘附棗

瀉姜湯

元氣頓虛脫者

瀉棗

理中湯

調胃虛理中焦下利清穀難止大病差後喜睡久不了了者宜理中丸或加附

瀉水棗甘

竹葉石膏湯

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

竹羔半甘麥

瓜蒂散

病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞞氣上衝咽喉不得息者此為有邪也當吐之

瓜棗豉

○瘟疫 蝦蟆瘟 大頭瘟

家方排毒劑 頭大腫如瓜瓠及面或腮頰云大頭瘟咽

喉腫痛失音頭筋張大者俗云蝦蟆溫遍身紅腫發塊如瘤者或頭上成磊塊者云疣瘡瘰又所稱山瘟胸脇高起者所稀有也以上症皆時行之氣使然有此症則舉家傳染故屬瘟疫以下四劑互擇用之不<sub>可</sub>久升何則以主疫也或加葶防柴桂湯

白虎湯

熱壯而渴者或咽喉腫痛飲食難下者加<sub>桔</sub>主之

小柴胡湯

續命湯

麻 桂 歸 葶 羨 穰 甘 芎

杏 中 歸 葶 羨 穰 甘 芎

甘桔湯

咽喉腫痛者痛甚腫塞水漿不下者加<sub>鼠</sub>霜或加<sub>皂</sub>莢礬石

○中寒

主方

葶 朮 桂 附 木 姜

附子理中湯

冬月中嚴寒身疼痛洒洒惡寒翁翁發熱

面赤或有汗重則口禁失音四肢強直泄利或清穀者

四逆湯

衝突道途一時為寒氣所中昏不知人口禁失音四肢僵直厥冷者或自利不渴者

建中湯

四肢攣急腹疼痛者

葇附湯

元氣脫手足厥冷脈微者

灸

天樞 中脘 足三里 三陰交

入參白虎湯

○中暑 暈症身熱煩渴口燥舌上有苔者甚則昏不知人手足厥冷

五苓湯

小便不利渴者

一方

中熱輕症 茯苓 甘草 或加果知

又方

暈症手足熱身體倦怠頭重或小便赤而頻數

茯苓 半 薤 朴 橘 升 甘

尉方

急症卒倒，以熱湯加鹽酒浸帛，慰臍上，急無湯，則代以小便。

○中濕

五苓湯

小便不利，四肢浮腫，而渴者。

家法排毒劑

風濕蒸中，發熱身體重，牽掣痛者。

一方

霖雨所襲，或卧身濕之地，新造之宅，或遠行，侵雨，波水，或山澤蒸氣，所中傷，腰痛，身重，小便澀，四肢倦怠，不舉者。  
茯苓 水 附 桂 芍 甘 或加升

○痛痺

風毒腫 鶴膝風 手痺 脚痺

家方排毒劑

或加已半桂，或加附將，初發如風邪，惡寒發熱，頭痛，遍身筋骨走注疼痛，俗所謂痛風也。又痛甚，則歷節疼痛，如虎咬狀，故名白虎歷節風是也。並治醫書所謂風毒。

腫、鶴膝風、脚氣、手氣

家方解毒劑

或加牽桂、痛甚加將、熱解後、歷節疼痛  
不止、痛處為腫、小便不利、

小續命湯

初發痛甚、宜與此湯、發汗、

麻桂歸漢羔芎杏甘  
姜

桂麻各半湯

治難發汗、

桂芍麻杏甘姜

建中湯

或加薑治風毒腫

神祐丸

以水九、但散尤有、効痛甚與三十九、或五  
十九、取瀉下、實人宜之、勿施、虛人

一方

通芍獨忍桂芎附將

甘

右治痛痺尤良

牽牛丸

頭末一味糊丸

溫泉 但馬城崎新湯

治瘡疾、手足拘牽、及鶴膝風、風毒腫、脚氣

手氣

硫黃湯 風毒腫痛痺頰浴此湯

蒸方

槐花或酒糟或紅花熱湯蒸熱裹帛布温痛處汗出為度日數通用此法以知為期

灸

食療

乾過臘魚

雞 野雞

琪鍼法

雀膝風

風毒腫並宜之

琪即

也令吸患處往年京師有琪工

○瘡

桂枝加升麻湯

瘡疾初發惡寒發熱頭痛狀如傷風寒疑似難辨先與此湯

家方順氣劑

加桂此芍苓瘡疾不論虛實輕重有汗

無汗脈自弦與此湯以下二方隨症選用

不可早用截藥期邪氣稍減可行灸或截

藥也

小柴胡湯

柴胡桂枝合湯

桂芍 此芍 苓 蔓 甘 姜

蔓姜湯

此方疑脫半夏



老人瘧疾元氣難勝宿癥發動口失五味  
飲食難下諸藥不効及虛脫者薑姜各一  
錢煎湯發前二時或發日五更連進二貼  
無力者以水代薑或送下黑丸子

白虎湯

加桂夏月熱甚渴欲飲水者

截瘧方

一味常山飲發日早夫空腹頓服啜稀粥  
少許取吐

一方

擲知常

又方

朴椒目若無椒目則用枳亦可也

五六發後可灸自九至十六及章門微腹  
瘧久不愈及有瘧癥者無如灸瘧後勞  
瘵脹滿多灸僅得萬一之幸

○痢

家方順氣劑

痢初發大便一二行瀉下後出腸垢臍下  
疼痛裡急後重身涼脈緩者加芍稍重症  
加將去茯苓有嘔加倍半姜嘔家之聖藥

也三日五日後芍藟連木枳類隨症加減

大承氣湯

臍下痛旁及少腹者輕若中腕鳩尾痛者  
是劇症頻併窘困痛甚者二三日元氣  
未虛時急瀉大小承氣疏滌四五日後加  
減治之小承氣湯

大柴胡湯

初發熱甚用大小柴胡瘦痢加升桂

小柴胡湯

加芍枳朴

黃連解毒湯

大黃黃連黃芩湯

將連芩甘

半夏瀉心湯

以上三方有熱似狹熱利者或有毒難疏  
滌者小兒最選

建中湯

主形氣衰弱腹痛一二日手足冷者老人  
難用劇劑者加附將

理中湯

或加桂去芩亦可或加附肉豆或加茯苓  
主痢日久腹痛裡急後重微者

建理湯

或加茯苓或加木

此方有  
此方無  
疑

桂 芍 芩 苓 薤 朮 姜

五苓湯

口乾咽燥少水難分利

藜姜湯

送下黑丸子或香連丸主急利煩虛噤口  
乾嘔者或用熊膽可也又主治產後日近  
有歲加下

一方

茯苓 半 姜 木 藿 或加桂

又方

茯苓 半 姜 木 蓮 姜

生鮓魚鱠 形氣并實能食者初發喫之為佳

黑丸子 熊膽

香連圓

木中連大 右二味細末糊丸或加茱萸少

牛扁丸

一名關牛兒草連采莖葉燒存性細末糊  
丸初不分輕重當與數十丸下利穢物

治中散

或加木 主久痢無努責腸滑或休息痢者

赤石脂禹餘糧湯

主腸滑肛脫者

中脫 天樞 腰眼 自十一至十六

食療

初發食最可也、素有宿癥惡藥氣者莫如  
食、努力甚、腰力罷者兼治疝痢不了者  
痢後元氣難復、羸瘦或壞作鶴膝者及小  
兒疳利皆可用也、鰻鱺魚、雞卵

○食傷 滯食

損湯方

傷食、腹痛吞酸、不吐不瀉、揮霍撩亂、急以  
三味損湯取吐、吐瀉後煎湯可也、  
益木、藿

枇杷葉湯

木 藿 梔 挂 枳 莪

家方順氣劑

加益木宿藿、枳麥之類、手足冷、加接附傷、  
食吐後、用此劑、滯食並治

大承氣湯

滯食、痛在下部、不瀉、用大小承氣、吐後  
痛不止、胃中不和者、調胃承氣亦可也

小承氣湯

理中湯

滯食吐瀉後、下不止者、

附子理中湯

吐瀉後手足厥冷瀉下不止者

四逆湯 或加瀉

瀉附湯

右四方脈伏四肢厥冷者吐瀉後元氣虛脫者不問四肢厥冷者用之

黑丸子 備救急

備急圓 絞痛窘迫瀉急用之取下

慰方 鹽酒熱湯慰臍腹

溫鹽湯 欲吐不吐欲瀉不瀉非隔升降不通急用鹽湯取吐

灸

吐後兼疝腹痛湯藥入口即吐者灸為最

要背部自十一至十四徹腹亦可也傷食無吐下腹痛甚者灸灼數百壯以吐而痛止為度

天樞 上腕 中腕

○骨蒸勞 內傷 欬嗽 自汗 盜汗 遺精 濁症

家方 順氣劑

加水芍 煖莖 或歸 柴 芩 知 貝 麥 果 味 膠 桑 之類 選用 骨蒸初發似風邪

家方 潤涼劑

加桑 麥 味 歸 芪 半 之類 有自汗盜汗者加

壯水者，瀉者，加水，穰。主勞熱吐白沫，有  
效。血者，酒客，或用心，生理者，及內傷者，凡  
如此，証非灸，無以開鬱，溫養氣血。若夫湯  
藥，則應接之具耳。

小柴胡湯

有寒，熱往來者，隨症加減。

生津丹

主效。莎 茯 接 練蜜搗和。

黑丸子

灸

自九俞至腰部膏肓，或七九脊際，亦可也。  
如骨蒸勞效，灸至數百千萬，以愈為度。

獺肝丸 金匱要畧云，治冷勞，謂熱少也。

加水牡龍 主自汗盜汗。

食療 鹿 鱉 雞 牡蠣肉 鰻 鱸魚

建中湯

加 蛎龍或連水 主遺精。

家方順氣劑

癥疝動者，滋兼用黑丸子。食療同盜汗。

家方潤涼劑

濁症大抵治方與遺精同，或用此劑。

○鼓脹 腸覃 石瘕

家方順氣劑

擇加稷、水、我芍、腹、沉、桂、附、果之類、朴、果為  
主。肚腹脹起、中空、似鼓、是也。已成、鼓、勢  
者、難治、稍見其機、則速灸、以此方為應接、  
有得間治、並主瘰癧、後大病後之脹、

小承氣湯

急脹用此湯、取下、服湯、失氣、頻頻發者、可  
治、腹肚膨脹、硬大、見青筋、臍凸、四肢枯瘦、  
有水氣、呼吸短促者、不可治、

挑仁承氣湯

屬血症者、或腸覃、石瘕、日久、形體、味衰者、

黑丸子  
蟾連丸

屬蟲者、小兒、服最可也、

噎

家方順氣劑

擇用果、牡、膠、或加附、常人偶噎者、非疾、  
五十以上、噎、固、死症、無術之可施、但方將  
崩之時、省思慮、廢家事、艾灼、數萬肉、養不  
怠、而以此劑為應接、則可免其患也、

燒酒

少間快、胸膈、沸鬱、

食療 鱧鱻魚 雞卵

○ 痲 瘰癧 健忘  
卒倒 蘇後

建中湯 或加附

家方順氣劑 加桂附 接我芍之類

桂椒酒 醇酒一升貯瓷器中投桂椒蟻此密封三  
十日而成返節飲之

小續命湯

主瘰癧

和方

治諸脫血發瘰癧

過刺 葛刺 過葛 葛窠

桂枝湯 四逆湯 附子理中湯 建中湯

溫泉 硫黃湯 灸

反鼻交感丹

桂三錢 芍 艾實

蛇一冬 丁五錢

桃仁承氣湯 有舊疾兼血證互之

參附湯 卒倒互之



三生飲 或加木菱

星鳥附

人參半夏湯

枳實厚朴湯 兼滯食者互之

小承氣湯 加枳子

家方順氣劑 加木

熊膽

灸丹田氣海

建中湯 蘇後互之

挂枝湯 加半稔附木或姜菱

痞癥痞

家方順氣劑

擇加烏附朮茱萸桂芍之類

建中湯

黑丸子 惡苦味者以順氣丸代之 婦人尤

可也

慰方

芍藥煎 溫慰痛處

灸溫泉藥湯 腰湯

通滯丸 疝積便秘

○蟲症

家方順氣劑

擇加<sub>二</sub>水<sub>一</sub>接我椒連之類

一方

乾漆 並莫糊丸

黑丸子 蟾連丸

熊膽

食療 鰻鱺魚 山蛤 臭梧桐蟲

灸

○眩暈

