

癸 卯 申 羊 齋

東 洲 書 軒

蘇 林 宗 杰 圖

書 宋 用 好 共 主 著

文 時 堂
文 堂
齋 王 堂

明
326
卷
1

寬政庚申年鑄

清朱用汲先生著

疹科治法綱

東都書肆

瑞玉堂
博文堂
文刺堂

翻刻疹科治法綱序

疾之倉卒危急不異於五傷寒者莫如痘
瘡與麻疹也蓋其死生之期甚速而補瀉
溫涼一髮有謬誤則不可得而挽回也古
人謂痘為兒童之劫數不亦宜乎方今痘
書行世者凡數十部足以備醫家檢尋而



序
麻疹一科乃專書絕艸總附錄于方書中
耳豈不關典乎朱用汲此編多稽古徵今
二門治疹之方法莫不該盡焉題曰治法
緬洵不虛也醫官吉田長達將翻刻此編
以廣流布而乞余一言以弁卷首余謂疹
書乏於世既如前言今此編一出猶暗室

之燈指南之車其有益於理療豈淺淺乎
哉當與金鏡之錄痘科之鍵傳于不朽無
疑矣

寬政庚申四月既望

醫官

杉本良仲温撰



武信任書
信
信

毓麟芝室疹科治法細目錄

卷一 稽古

惺惺散 一

備急丸 二

瀉青丸 二

牛黃清心丸 四

抑青丸 五

地黃丸 六

宣風散 七

通膈丸 八

消毒散 九

黃檗膏 十

當歸六黃湯 附

黃連湯 十一

玄參地黃湯

十二

茅花湯

十三

桂枝葛根湯

十四

桂枝解毒湯

十五

黃連解毒湯

十六

升麻湯

十七

人參白虎湯

十八

防風解毒湯

十九

荊防敗毒散

二十

人參敗毒散

廿一

李氏敗毒散

廿二

胡荽酒

廿三

麻黃湯

廿四

檉葉散

廿五

七物升麻丸

廿六

黃芩湯

廿七

香連丸

廿八

六一例

廿九

退火丹

三十

加味黃芩湯

三十一

銅壁山人黃芩湯

三十

養血化癰湯

三十三

養榮湯

三十四

保赤大青湯

三十五

準繩大青湯

三十六

玄參解毒湯

三十七

消毒飲

三十八

升麻葛根湯

三十九

甘桔湯

四十

射干鼠粘子湯

四十一

甘露飲子

四十二

十全散

四十三

玉鑰匙 四十四

葛根麥門冬散 四十五

白虎合黃連解毒湯 四十六

四順清涼飲 四十七 柴胡橘皮湯 四十八

柴胡麥門冬散 四十九 柴胡四物湯 五十

導赤散 五十一 安神丸 五十二

馬鳴散 五十三 人中白散 五十四

化蠱丸 五十五 瀉白消毒飲 五十六

瀉白散 五十七 門冬清肺湯 五十八

清熱除疳丸 五十九 當歸養血湯 六十

黃連安心丸 六十一

卷二 警古 節錄萃英諸方

解毒防風湯 六十二 四聖散 六十三

補肝丸 六十四 鎮肝丸 六十五

瀉腎丸 六十六 阿膠散 六十七

瀉心湯 六十八 益黃散 六十九

瀉黃散 七十 白朮散 七十一

生犀湯 七十二

異功散 七十三

涼驚丸 七十四

黃耆散 七十五

連翹散 七十六

化毒湯 七十七

紫草木通湯 七十八

鼠粘子湯 七十九

活血散 八十

如聖飲子 八十一

犀角地黃湯 八十二

當歸丸 八十三

棗變百祥丸 八十四

補方

連翹升麻湯 八十五

四君子湯 八十六

八正散 八十七

柴胡飲子 八十八

河間涼膈散 八十九

東垣涼膈散 九十

枳朮丸 九十一

連翹防風湯 九十二

荊芥防風甘草湯 九十三

防風芍藥甘草湯 九十四

防風蒼朮湯 九十六

桃仁承氣湯 九十五

地骨皮鼠粘子湯 九十八

神應丸 九十七

建中堂藏

醫和治法綱目 卷三 建中堂辨

升麻紫草湯 九十九 解毒丸 一百

紫雪 一百一

紫草茸甘草枳殼湯 一百二

桔梗甘草梔子湯 一百三

桔梗甘草防風湯 一百四

卷三 徵今

王損菴方論

瀉白消毒飲 八十五 加味金沸草散 八十八

三豆湯 七

代天官化丸 八

加味地骨皮散 六 大無比散 六

小無比散

繆仲淳方論

摠宜 摠忌

咳嗽 林黃 疹後咳嗽

清揚飲子 苦梗飲

喘

卷三 治法綱目 建中堂辨

竹葉石膏湯

檉前葛根湯

不得透

加麻黃

熱勢盛

白虎湯

獨聖散

蠱虎湯

三黃石膏加檉葉湯

泄瀉

疹後泄瀉

升連飲子

升麻芍藥湯

便膿血

疹後元氣不復

加滑石

青蓮國老湯

疹後下積滯

痧後痢

連石薯蕷丸

糖調檉葉散

痧後瘰

清涼健脾散

養脾開胃飲

附痘後見疹

參柳湯

疹後牙疳

生犀地黃湯

黃龍散

龍朋散

連翹生地飲

毓麟芝室疹科治法網目錄終

毓麟芝室疹科治法網卷一 警古

菰中朱之黥用汲訂錄

痧疹辨

準繩曰麻疹浮小而頭粒隨出即收
不結膿疱北人謂之糠瘡南人謂之麩
瘡吳人謂之痧越人謂之瘡古所謂麻
聞人氏所謂膚疹是也與痘所謂脾為
疹者不同小兒有出一二次者出輕而



日數少者名奶疹子出稍重而日數稍多者名正疹子又出于痘前者名奶疹子出于痘後者名正疹子初出亦與痘相似但痘發于藏麻發于府藏屬陰其病本深故難出難收而藥于温平為宜府屬陽其病本淺故易出易收而藥于清涼為宜

保赤曰陽主氣故有形而無漿其症多

實熱而無寒也治忌內實只宜解散

心法曰疹小而碎密者少陰君火也陰

道常乏故小而密治疹專以肺為主

心肺屬陽而位乎上心火旺則肺受之

觀其咳嗽者火炎則肺葉焦舉也

鼻流清涕者鼻為肺之竅以火鑠金而

液自流也目中淚出者肺熱則移于

肝肝之竅在目也或手搯眉目唇鼻

及面者肺熱證也

疹發熱之初多似傷寒惟疹子則咳嗽噴嚏鼻流清涕眼泡腫其淚汪汪面浮腫髮腮赤惡心乾嘔爲異耳一見此候即宜謹避風寒戒葷腥厚味用藥以表散之使皮膚通暢腠理開豁而疹毒易出大忌誤作傷寒而妄施汗下汗之則增其熱爲鼻衄爲欬血

爲口瘡咽痛爲目赤痛爲煩躁爲大小便不通下之則虛其裏爲滑泄爲滯下多至不救慎之麻疹初全類傷風發熱咳嗽鼻塞面腫涕唾稠粘有末傳泄利者有_下一起即兼泄利者不可觸冒風寒及于正蒸熱時嗽食能變輕爲重不可不慎

河間云小兒壯熱昏睡傷風皆相

似未能辨認間服升麻葛根湯海藏云

也明惺惺散風熱咽不利脾不小柴胡湯

海藏云往來寒熱也甚驗蓋此數藥通治

之不致誤也惟傷食則大便酸臭不消

化畏食或吐宜以藥下之海藏云傷

食宜以藥下之者當詳所傷何物有生

硬寒熱不等不可遽用巴豆之類大毒

之藥下之心法曰如手足稍微冷惡寒而無汗面

色青慘而不舒左額有青紋者傷寒之

熱也手足稍微温發熱有汗面赤而

者傷風之熱也並宜惺惺散發散之

惺惺散治傷寒時氣風熱痰壅欬嗽

及氣不和

苦桔梗 細辛去葉 人參 甘草炒

參斗台去罔 卷一 建中堂

癰疽疔毒
癰疽疔毒
癰疽疔毒
癰疽疔毒

白茯苓去皮 栝蒌根 白朮各一兩半

為細末每服二錢水一盞入薄荷二葉

同煎至三分去渣溫服要和氣入薑煎

用防風一分此又一法

損菴曰如壯熱未退切不可與通利大

便及涼藥恐是瘡疹服藥則誤矣身雖

熱大便自利者不可服

海藏云外加減四味亦各隨經證也如

目胞腫而右頰有青筋發熱而頭額腹
肚最甚或兼嘔吐腹疼者傷食之熱也
備急丸下之

備急丸

木香二錢半 大黃 牽牛末各五錢

右為細末神麩糊丸棗豆大每服五七

丸食前山查煎湯下

如面色青紅額正中有紋手掌心有汗

參斗台法

卷一

五

是口

和濟生方 卷一 建中堂

時作驚惕手絡脉微動而發熱者此驚熱也瀉青丸牛黃清心丸主之

瀉青丸

當歸焙去芦 龍膽草焙 川芎 山梔人

羌活 防風去芦 川大黃濕帑裹煨各等分

右為末煉蜜丸如芡實大每服半丸至

一九煎竹葉湯同砂糖水化下沙一人云

海藏云東垣先生治癱後風熱毒翳膜

氣暈遮睛以此劑瀉之大效初覺易治

薛立齋云此足厥陰經解散肌表疏通

內熱之藥也若大便秘結煩渴飲冷飲

食如常者屬形病俱實宜用此以瀉之

若大便調和煩渴飲冷目淡青色屬

病氣實而形氣虛宜用抑肝散蜜丸即抑青丸

平之若大便不實作渴飲湯飲食少

思肢體倦怠者屬形病俱虛宜用地黃

參科台去綱 卷一 建中堂

丸補之

牛黃清心丸 四

黃連 生五錢 山梔人 黃芩 各三錢 鬱金 二錢

辰砂 一錢半 牛黃 二分半

共研細末臘雪水調麩糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯下

抑青丸 五

軟柴胡 生甘草 各五錢 川芎 八錢 當歸

釣藤鈎 白朮 炒 茯苓 各一兩 為末蜜丸

地黃丸 六 治腎虛解顛即眩病也治脉

毛而虛 熟地黃 八錢 山茱萸 懷山藥

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各四錢

為末煉蜜丸梧子大三歲已下一二丸

或三五丸空心溫水下如身熱而倍能食唇紅頰赤大小便秘脇下汗者此風熱也官風散主之

官風散 七

檳榔 二箇

橘皮

甘草 各五錢

牽牛 四兩半生半炒

取頭末二兩

為細末二三歲蜜湯調下半錢已上一

錢食前服 海藏云與通膈丸相類上

下氣血藥也

通膈丸 八

大黃

牽牛

木通 各等分

為細末滴水丸粟粒大每服三五十九
量人虛實加減

以上諸熱久而不去內外感發則所蘊
瘡疹之毒亦能乘間而出矣 前藥宜斟酌不可妄

也 過用也
萃英曰小兒耳冷翫冷手足乍煖乍涼
面赤時嗽時嚏驚悸此瘡疹欲發也未
能辨認間服升麻湯十七消毒散已發

建中堂

未發皆宜服仍用胡荽酒廿三黃檗膏十

消毒散九治瘡疹已出未出未能勻遍

又治一切瘡涼膈去痰治咽喉痛

牛蒡子二兩甘草半兩荊芥穗二錢

為麤末每服三錢水一盞半去滓溫服

海藏云溫平之劑一法加薄荷防風

又云太陽藥也

黃檗膏十治瘡疹已出用此塗面次用

胡荽酒外治法

黃檗一兩新葦豆一兩甘草四兩

右為細末生油調從耳前至眼匡竝厚塗之

日三兩次如早用瘡不至面縱有亦少

暑月煩躁食後與白虎湯治身熱不得臥

陽明之藥也正玉露散肺腎藥也石膏

熱甚與紫雪天門冬麥冬為氣劑咽喉或

生瘡與甘桔湯少陰藥也甘露飲肺腎藥也餘依

外科台法綱 卷一 九

錢說大人小兒同治法惟劑大小不同耳

發熱之時遍身汗出者此毒從汗散玄府開疹易出也有鼻中衄血者此毒從衄解也俱不可遽止之若汗出太多血出不止者此又火甚逼迫太過致液妄流血妄行矣保赤曰止汗當歸六黃湯加浮小麥附十

當歸

生地黃

黃檗

黃連

黃芪

黃芩

熟地黃

浮小麥

損菴曰汗太多人參白虎湯合黃連

解毒湯四十六或

黃連湯十一

黃芩

黃連

黃檗

黃耆

麥門冬

生地黃

當歸

水煎調敗蒲灰服之

損菴曰衄太多，玄參地黃湯茅花湯
主之

玄參地黃湯 十二

生地黃 梔子人 牡丹皮 玄參 各一錢半

白芍藥 一錢 升麻 甘草 各五分

剉細加蒲黃炒五分 水煎溫服

茅花湯 十三

茅花 川鬱金 梔子人 黃芩

生地黃

水煎調百草霜服 保赤有歸頭丹皮

無扼人鬱金然以準繩方為正 遲則

汗出而元氣虛血出而精神散為不治
症矣

發熱之時未有不口渴者但當以燈心豆

炒米湯飲之 人參白虎 佐之以生津解

熱而已若恣飲冷水恐生水畜之症

水入于肺為喘為咳宜用葶藶以洩肺中之水

水入于脾為腫為脹為自利

水入于胃為嘔為噦為利宜用猪苓澤瀉茯苓以洩之

水入于心為悸為驚宜用赤茯苓以洩心下之水

水入于肝為脇痛宜用芫花以洩肝水

水入于腎與膀胱為小便不利陰囊腫

宜用棗前子以洩膀胱之水

麻疹形症有如發風癩疔瘡擁起雲頭色赤成斑隨見隨沒者有如粟米頭

梳三番但見而不沒至三日後方收漸沒者欲出未出之際當用發表藥發之

疹喜清涼然初出亦須和煖則易出善治者無過熱無過寒溫涼適宜陰陽自

和是爲得之

疹子只怕不得出若出盡則毒便解所以發苗之初只要發出得盡非若痘必苗而秀秀而實而後毒解也

疹子未有不由天行癘氣而發者故治疹者發熱之時當察時令寒暄以藥發之

如大寒之時以辛溫熱之藥發之

桂枝葛根湯加淡豆豉 十四

桂枝 升麻 葛根 赤芍藥

甘草 防風 各一錢

姜 三片 水 一鍾 煎七分

桂枝解毒湯 十五

桂枝 防風 甘草 赤芍藥

麻黃 荊芥 桔梗 牛蒡子

羌活 川芎 人參 性補斟酌用之

姜 三片煎

右二方辛温之劑表有寒邪者宜之
如大熱之時以辛寒之藥發之

黃連解毒湯 十六

黃連

黃芩

黃檗

知母

防風

桔梗

玄參

荊芥穗

石膏

大青

木通

梔子人

甘草

服此則毒火不致內鬱痧自出透而解矣

升麻湯

海藏云大陽陽明之藥

十七

升麻

芍藥

葛根

甘草

為粗末每二錢水一盞煎半去滓不抱
時候亦可為細末湯調 身心煩熱即
温服 寒多即熱服

陳文身熱腹痛者

身熱泄瀉者

各科台去罔

卷一

十四

建中堂藏

身熱驚悸者

身熱汗出者

身熱足冷者

但不宜服

人參白虎湯 一加黃連 十八

人參 甘草 各一錢 石膏 五錢 粳米 一合

知母 三錢

剉細水二盞煎米熟為度

右二方辛寒而兼補斂神衛傷于暄熱者宜之

原本關
知母三
錢今補

如溫煖之時以辛涼之藥發之

防風解毒湯 十九

防風 荊芥穗 知母 甘草

連翹 牛蒡子 薄荷 石膏

桔梗 淡竹葉 木通 枳殼

此藥允辛涼用之恰合毒當自透如不寒不熱以辛平之藥發之

荊防敗毒散 二十

和利... 卷一

前胡 防風 甘草 桔梗

柴胡 川芎 枳殼 羌活

荊芥 獨活 茯苓 人參各等分

劉細加薄荷五葉水一盞煎七分温服

如兼疫癘之氣以辛温平之藥發之

人參敗毒散即前方無荊防

李氏敗毒散即前散子減羌活前胡加

升麻 蟬蛻 紫草 牛蒡子

山查子 荊芥穗 地骨皮 紫蘓

熱甚加黃芩夏加香薷冬加麻黃瀉加

猪苓 澤瀉

右三方以李氏方為正恐邪藉補而熾毒不得敗也

如盡一劑不出再作本湯發之外用

麻蘓胡荽酒遍身憂之務令亟出如三

四作更不出加腹中脹痛氣上喘促昏

各科治法綱 卷一

悶譫妄必死證也

胡荽酒 廿三

胡荽

四兩細切好酒 二盞

煎一二沸入

胡荽

再煎少時用物合定放溫每吸一大口
微噴從頂至足勻遍勿噴頭面 病人
左右常令有胡荽氣即能辟太穢氣疹
瘡出快 又方

芫荽

酒糟蒸熱擦之自頭至足為齊

若出見而頭面愈多者佳

此因時用藥不可誤作傷寒妄施汗下
及伐天和又須看人虛實 如大便秘
結煩熱甚而發不出者以酒大黃微利
之 如吐利不止以參芍之類補之
經云母實實母虛虛損不足補有餘天
人性命也

損菴曰右方雖因時制宜亦有不可拘

泥者如冬月亦有不_上宜麻桂而宜石膏者正當以脉證為主耳若株守而不知通變必有失

發熱六七日以後明是疹子却不見出此皮膚堅厚腠理閉密或為風寒襲之曾有吐利乃伏也急用托裏發表之劑麻黃湯調_二檉葉散_二發之外用_二胡荽酒蘸_二麻刮之如一向未更衣者毒甚于裏伏

而不出也以_二七物升麻丸_二解之發之解之再不出者死證也

麻黃湯 廿四

麻黃 去根節 製過 升麻 牛蒡子 炒

蟬蛻 洗淨去足翅 甘草 各一錢

剉細加_二臘茶葉_二一錢水一盞煎七分去滓服

煩渴加_二石膏_二 細末 同煎

檉葉散 廿五

檉亦名垂絲柳青茂時採葉晾乾為

末每服一二錢茅根煎湯調下

七物升麻丸廿六

升麻 犀角 黃芩 朴硝

梔子人 大黃各二兩 淡豆豉二升 微炒

共為末煉蜜丸如黍米大凡覺四肢大

熱大便難即服取微利為止

疹子發熱吐利乃火邪內迫純是熱証

不可作寒論 上焦多吐

黃芩湯廿七

黃芩半錢 白芍藥六錢 甘草炙一錢 加

茅根 蘆根 枇杷葉 剉細加

大棗二枚 水一盞煎七分食前溫服下

魚多利宜黃芩湯送下

香連丸廿八

黃連一兩 茱萸製 木香五錢 石蓮子肉二錢 半

參科治法綱

痧利治法
卷一
建中堂

陳皮 五錢

為末 醋調神曲 糊丸如麻子大每 陳倉米

送二三十丸 中焦吐利俱多宜

黃芩湯多加蘆根煎調六一散服

六一例廿九

桂府滑石 水飛過淨六兩 大甘草 去皮為末一兩

和勻每服一錢薄荷泡湯調下內加製

辰砂 三錢

治狂言發搐驚悶 用

退火丹 三十

防風 薄荷 荊芥 天麻

煎湯候冷調下六一散 更加

牛黃 三錢 纏豆藤 三錢 又本方加鬱金

名牛黃六一散

治疹後瘡癩毒壅及天行瘟疫冷水調下多服取效 自利甚則裏急後重而

痧利治法
卷一
建中堂

疹科治法綱 卷一 三十一 建中堂

為滯下宜

加味黃芩湯 三十一

黃芩 黃連 錢各一 白芍藥 滑石 飛過各

甘草 七分

水煎服 調若滑石不煎本湯 血痢加

地榆 二錢

銅壁山人黃芩湯 三十二

黃芩 黃連 赤芍藥 生地黃

木通 枳殼 甘草 當歸稍

人參

水煎調 天水散 服初加 酒大黃 微利之

疹家吐利滯下宜于疹家求之不可作

吐利滯下而治

疹出多于耳後項上腰腿先見其頂尖

而不長其形小而均淨者吉

若色見紅者兼火化也症輕可治

疹科治法綱 卷一 三十一 建中堂

色淡白者心血不足也養榮湯養血化
癍湯主之

養血化癍湯 三十三

當歸身 紅花 生地黄 蟬蛻

人參各等分

右剉細水一盞生姜一片煎六分去滓

溫服無時

養榮湯 三十四

人參 當歸酒洗 赤芍藥桂水炒 甘草

紅花酒洗

水煎服

如色殷紅紫赤乾燥暗晦乃火盛毒熾

宜天水散解之 藥用滋陰涼血以除

其熱蓋養陰以退其陽也宜大青湯

玄參解毒湯選而用之若黑色者則毒

尤甚

赤保 大青湯 三十五

玄參

石膏

桔梗

梔子仁

大青

知母

木通

人中黃

升麻

水煎服

便秘者加酒大黃

繩準 大青湯 三十六

玄參

石膏

木通

地骨皮

大青

知母

甘草

荊芥穗 各等

分

淡竹葉 十二片

水煎服

玄參解毒湯 三十七

玄參

黃芩

桔梗

黑山梔

葛根

生地黄

荊芥穗 各等

甘草

水煎服

疹表後紅影見于肌膚成片切戒風寒
生冷瓜果如一犯則皮膚閉塞毒氣壅

滯遂變為渾身青紫而毒返內攻煩躁
 腹痛氣喘悶亂欲出不出危亡立至醫
 其可忽諸 如極渴欲水只宜少與葱
 白以滋其渴耳必須使皮竅中常微汗
 潤澤可也聶久吾曰服葱白自無發搐
 疹已出而反沒者乃風寒所逼而然也
 若不早治毒成內攻必致痒塌而死急
 用消毒飲合升麻葛根湯熱服

消毒飲 三十八 治瘡疹未出或已出未
 能勻遍 與前消毒散分兩小異

荊芥 牛蒡子 各二錢 甘草 一錢

姜二片 水煎服

升麻葛根湯 三十九

升麻 乾葛 白芷 各一錢 甘草 五分

姜葱 水煎服 又有以本方 一兩加

紫蘓 笋尖 各五分 山查 鼠粘子 各一錢

加冬麻黃 一錢

疹出之時咽喉腫痛者乃毒火上焦而然勿作喉痺治 妄用鍼刺喉痺內作癭腫故宜決去惡血疹瘡只是咽乾作痛宜

甘桔湯 四十

嬰狹感冒風熱火氣薰逼蘊毒上攻痰氣不順

啞嗽失音

人參去芦半兩 桔梗蜜浸炒 甘草半生半炙

劉水煎服 加玄參 連翹 牛蒡子

射干鼠粘子湯 四十一

射干 山豆根各一錢 紫草 牛蒡子

紫苑各一錢 升麻 蟬蛻各六分 桔梗

木通 石膏各八分 甘草五分 燈心九根

水煎服

甘露飲子 四十二 錢氏治心胃熱咽痛

未發又治熱氣上攻牙齦腫齒動搖

海截云為血劑

疹和治法
卷一
三十一
建中堂

天門冬 麥門冬各去心 山茵陳葉

熟地黃 生地黃 枇杷葉去毛

黃芩去心 石斛去苗 枳殼去穢炒

甘草剉炒各等分

每服二錢水煎食後溫服 牙齒則含

漱并服

外十全散四十三

黃連 黃芩 黃檗各一錢 苦參

孩兒茶 雄黃各五分 硼砂 玄明粉各三

乳香一分 片腦少許

為極細末每用五釐吹之

玉鑰匙三四十四

燄硝一兩五錢 硼砂五錢 白殭蠶二錢半

腦片一字

為末以竹管吹半錢入喉中立愈

保赤玉鑰匙方硼一錢 朴五分 蚕一條 腦

外科台法綱 卷一 三十一 建中堂

五釐

疹既出之後宜補陰以制陽何也蓋疹熱甚則陰分受其熬煎而血多虛耗故治以清火滋陰為主而不可少動其氣若燥悍之劑首尾當深忌也世知痘症之重而不知疹之誤藥殺人尤甚方書多忽而不備良可嘆也疹子渴喜飲水純是火邪肺焦胃乾心火內亢故也

初發熱渴者發散藥中多加石膏花粉或

葛根麥門冬散 四十五

乾葛 麥門冬 錢各一 茯苓 升麻

赤芍藥 人參 石膏 甘草 各五

淡竹葉 七片 水煎服

疹子出見渴者用

人參白虎湯見前方之十八加天花粉

渴甚者

白虎合黃連解毒湯 四十六

知母 天花粉 黃芩 黃連

山梔人 生地黃 麥門冬 各二錢

石膏 四錢 淡竹葉 十片

水二鍾煎一鍾更磨入犀角汁索湯水

則與之 覺胃熱渴甚宜以此方多與

之胃清乃止庶免牙疳之害直至疳成

而後清胃涼血解毒徃徃噬膚無及慈
親仁人宜早為之所無事姑息

疹子出沒常以六時為準假如子後出
者午時即收午後出者子時即收乃陽
生陰成陰生陽成造化自然之數也凡
此旋出旋收者輕若一出連綿三四日
不收者乃陽毒太盛宜大青湯 前之三
十六
解之逡巡不出者乃風寒外束皮膚閉

密也宜荊防敗毒散前之二十主之
疹子欲出則遍身發熱 或煩躁 或
頭眩 或身拍急 及既出則身涼諸
病悉解此一層疹子隨收矣
如疹子既出熱甚不減此毒壅遏宜大
青湯解其表 便澁者以黃連解毒合
白虎湯解其裏 大便不通者宜
四順清涼飲 四十七

赤芍藥 當歸 大黃 甘草各等
三歲小兒用二錢 水六分 薄荷二葉煎
八九沸去渣不拘時服 小便不通 加
燈心木通

疹子只要出得盡則毒邪解散正氣和
平如拂拂發熱煩悶不寧如蛇在灰如
蚓在塵之狀或嘔吐或注洩此毒邪壅
遏尚未出盡煩熱者黃連解毒湯前之
十六

嘔洩者

柴胡橘皮湯

柴胡

橘皮

人參

半夏

黃芩

白茯苓

各等分

竹茹

一團

生姜片

水一盞煎七分去查溫服

疹子欲出未出之時宜早發散以解其毒則無餘災若不預解使之盡出以致毒蓄于中或為壯熱日久枯痺或成驚

癩或為瀉痢或軟血喘促或作疳蠱而死此雖一時戾氣之染未有不繇于人事之未盡者

疹子收後身有微熱者此虛熱也不須施治待氣血和暢自然退去若熱太甚或日久不減宜

柴胡麥門冬散

四十九

柴胡

人參

玄參

各五分

麥門冬

八分

龍膽草 三分 甘草 二分

水煎服熱甚者間服

黃連解毒合白虎湯 前之四十六

如髮枯毛墜肉消骨立漸漸羸瘦者

柴胡四物湯主之 五十

柴胡 川芎 當歸 地骨皮

黃芩 知母 人參 麥門冬

白芍藥 生地黃 淡竹葉

水一盞煎七分溫服無時

疹子初起多瀉不妨惟愈後最忌重熱此不可不調治者蓋疹子發熱多至十一二日少亦不下五七日熱久元氣虛矣加之疹出飲食不進而復重熱陰陽耗竭不死何待故再熱者必大補血氣可也余見忽以為常而死者多矣疹後熱不除忽作搐者不可與急驚風

外科治法 卷一 建中堂

同論用

道赤散 五十一

生地黄 木通 甘草 一用 黃芩

各等分為末每服三錢又

人參 竹葉 麥門冬 同煎送下

安神丸 五十二

黃連 麥門冬 當歸身 白茯苓

甘草 各五錢 硃砂 一兩 龍腦 二分 五厘

右為極細末湯浸蒸餅和豬心血搗

勻丸如黍米大每服十九燈心湯下服

後小便清者可治短少難治

疹後牙齦黑爛肉腐血出臭息衝人者

曰走馬疳

馬鳴散主之 五十三

人中白 即溺底白渣刮取用新瓦盛之火

馬鳴退 即蠶退帶火燒 五倍子 生用一錢 另用一錢

外科治法 卷一 建中堂

疹未消法... 卷一... 三十三建中堂

同礬 枯礬 白礬 槌碎 錢 另取五倍子一錢入礬 于內用火煨枯

為極細末先以米泔濃汁浸洗以此傳

之

人中白散 五十四

人中白煨一錢 黃檗炒黑三錢 為末擦口內

若面頰浮腫環口青黑頰漏齒脫唇崩
鼻壞者死證也如唇口多瘡其聲啞啞
者曰狐惑

化蠱丸主之 五十五

黃連五錢 川椒去閉目者與子蒂炒出汗二錢

苦楝根白皮乾者二錢

右為末用烏梅七箇艾湯浸去核搗爛

和丸艾湯送下

更煩躁昏悶失聲者死證也

疹退之後微微咳嗽者此餘毒未盡也

主以

疹斗台法綱 卷一 三十三建中堂

瀉白消毒飲

五十六

與後字泰方不同然以後方為準

桑白皮 地骨皮 牛蒡子 荊芥穗

甘草

瀉白散 五十七 瀉肺脾熱目黃口不吮

乳喘嗽

桑白皮 一兩 地骨皮 一兩 甘草 半兩

為細末每服一二錢水一盞入粳米百

粒同煎食後服 易老加黃連

海藏云治肺熱傳骨蒸自汗用此以直

瀉之 梔子人 亦能瀉肺當以氣血分之

聶久吾曰須避風寒戒水濕若渴甚氣

否則終身咳嗽瘡無有愈日 喘連聲不住甚至飲食湯水俱噎出者

此熱毒乘肺而然也宜

門冬清肺湯 五十八

天門冬 麥門冬 各去心 欬冬花 貝母

桑白皮 馬兜鈴 地骨皮 知母

杏人去皮尖牛蒡子 桔梗 甘草各等

水一盞煎七分食後溫服

疹出之時曾作泄利未經清解至疹退之後變為休息痢不問赤白裏急後重日夜無度此餘毒在大腸也以黃芩湯廿七送下香連丸廿八虛者加人參滑者加椿根白皮俱于丸藥內加之勿入煎藥

疹子既收其毒不解邪火拂鬱渾身發熱晝夜不退髮枯膚痒漸成疔瘡以清熱除疔丸主之 五十九

黃連 當歸各二錢 青皮 龍膽草

陳皮 蘆薈各一錢半 史君子一錢二分 川芎

乾蟾頭燒各一錢

為末神曲糊為丸米湯下

若不早治以致睡則揚睛口鼻氣冷手

足厥逆微微瘳癰變為慢風不救者多
矣疹後渾身壯熱未至羸瘦但多搐掣
煩躁不寧此熱在心脾二經也以當歸
養血湯黃連安神丸間而服之
當歸養血湯 六十

當歸

川芎

木通

麥門冬

去心

生地黄

山梔人

淡竹葉

燈心

甘草

便秘少

加

大黃

黃連安神丸

六十一

黃連

當歸

龍膽草

各二錢

全蠍

七箇

石菖蒲

茯神

各一錢半

共為細末湯浸

蒸餅

杵

豬心血

丸

硃砂

為衣

燈心

湯下

疹子收完之後出入動止如常忽然心
腹絞痛而死者是元氣虛弱曾受疫癘
之氣外雖無病裏實虧損所以一發而

死也謂之中惡間有用人參湯研蘓合香丸而甦者

疹家禁忌

此痘家禁忌尤甚若誤食雞

魚則終身但遇天行之時又重出也

若鹽醋食之令嘔不止若五辛食之

令生驚熱梅桃蜂蜜香鮮之物食之

惹疳蟲上行以上通禁必待四十九

日之後方無禁也大熱未退不可與

食與傷寒同

關東醫官 卷一 建中堂

各科治法綱


卷一

建中堂

疹科治法綱
卷一
三十一
延中堂
刊

關東醫官
榎園吉田
祥校正

疹科治法綱卷一
終



天
山

