





明  
卷  
326  
止



疹科治法綱卷二 警古 節錄萃英方論

潔古老人癩論

曰癩疹之病其為證各異瘡發焮腫于外者屬三陽三焦相火也謂之癩小紅點行皮膚之中不出者屬少陽君火也謂之疹凡顯癩證若自吐瀉者慎勿亂治而多言謂邪氣上下皆出也太凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動而變此謂少

疹科治法綱

卷二

建中堂藏



陽通表宜和之也當先安裏解毒次微發之安裏解毒須安五藏防風湯是也解毒防風湯六十二

防風一兩地骨皮 鼠粘子 荊芥穗

黃芪氣有餘者不宜芍藥白者欬赤為勝枳殼各半兩

為粗末每服四五錢水煎

如大便不澀者須微發之藥錢氏方中甚多宜選用之

升麻葛根湯方見前消毒散方見前

胡荽酒方見前

四聖散六十三治瘡疹出不快及倒靨

紫草草木通剉甘草剉炒枳殼麩炒

為麤末每服一錢水一中盞煎至八分

溫服無時

補肝丸六十四四物湯內加防風等分

為細末煉蜜丸



右方熟地宜易以生地又宜用赤芍

鎮肝丸 六十五 治肝虛 即瀉青丸方見

前太<sub>大</sub>梔子<sub>黃</sub>

瀉腎丸 六十六 治脉洪而實

生地黃 八錢 乾山藥 牡丹皮 澤瀉

白茯苓 錢各四

為末煉蜜丸如梧子大空心滾水下三五丸

此治左手本部脉若右尺洪實以鳳髓

丹瀉之

瀉白散 方見前

阿膠散 六十七 補肺

阿膠 一兩半 馬兜苓 半兩 鼠粘子 炒香

甘草 錢各二分 糯米 杏人 皮尖

為末每服一二錢水一盞食後服

海藏云杏人本瀉肺非若人參天門冬



麥門冬之補也當以意消息

導赤散前見五泄丙

瀉心湯六十八泄丁

黃連去一兩鬚

為極細末每服一字至五分或一錢臨

卧溫水調

海藏云易老單瀉心湯加減法出于此

乃實邪也實則泄其子

益黃散六十九補脾

海藏云此劑瀉脾以燥濕

青皮 訶子肉 甘草各半 陳皮一兩

丁香二錢

每細末二錢水煎此劑太躁似乎未宜

瀉黃散七十瀉脾熱目黃口不能吮乳

藿香葉一錢 梔子二兩 石膏五錢

甘草三兩 防風四兩



判同蜜酒微炒香為細末每服一錢至

二錢水一盞煎清汁服海藏云此劑

瀉肺熱愚謂此劑瀉胃熱

白朮散七十一

藿香葉 白朮 木香 白茯苓

人參 甘草炒各兩 乾葛二兩

為末每服一錢至二錢水煎如欲飲

水者多煎與之

海藏云四君子湯加減法治濕勝氣脫

泄利太過治 蓋曰泄利太過氣脫固知為疹後藥也

蓋曰泄利太過氣脫固知為疹後藥也

寧無犯誤施

生犀湯七十二 黃龍湯犀角地黄湯加

減法

生犀碾取米 地骨皮 赤芍藥 柴胡

乾葛劉各 甘草五錢



為末每服一二錢水煎

海藏云此少陽陽明相合也

異功散 七十三 溫中和氣治吐泄思食

凡小兒虛冷病先與數服以正其氣

人參 茯苓 白朮 陳皮

甘草 各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑五片

棗二枚同煎

海藏云四君子補脾湯加減法

涼驚丸 七十四

草龍膽 防風 青黛 各三錢 龍腦 一錢

鈞藤 末二錢 黃連 五錢 牛黃 麝香

為細末麩糊丸粟米大每服一二十九

銀金湯下

黃耆散 七十五 治盜汗

牡蠣 黃耆 生地黄 各等分



建中堂

為末水煎黃聶久吾曰胃氣弱者少下地

連翹散七十六治一切熱兼治瘡疹有

神效

連翹 防風 梔子 甘草

為末水煎

海藏云治熱在外而不厥此少陽藥也

化毒湯七十七治小兒瘡疹已出未出

並可服之

紫草草升麻 甘草各等分

呔咀水三盞粳米五十粒同煎

海藏云此乃陽明之藥也

紫草木通湯七十八治小兒瘡疹

紫草 木通 人參 茯苓

粳米各等分 甘草減半

為末每服四錢水煎

海藏云此小便不利之劑也人參之温所以平紫

參斗台去四



寒草之

鼠粘子湯七十九治小兒瘡疹欲出未

能得透皮膚熱氣攻咽喉眼赤心煩

鼠粘子炒四兩荊芥穗二兩甘草一兩

防風半兩

為細末沸湯點服臨卧大利咽喉化痰  
涎止嗽老幼皆宜

海藏云太陽少陽藥也首論温平者此

也

活血散八十治瘡子或出不快

白芍藥一錢酒調如欲止痛只用温

熱水調下

海藏云張和之治四肢出不快加防風  
大效此正的太陰藥也

如聖飲子八十一治小兒毒攻咽喉腫痛

甘草生桔梗牛蒡子炒各兩麥門冬去心半兩



為末竹葉同煎細細服

犀角地黄湯八十二

犀角錢各一牡丹皮錢各一生地黃八分赤芍藥七分  
水煎

如大便過秘宜微利之當歸丸棗變百祥丸是也

當歸丸八十三  
以當歸之辛溫配二黃之寒則平矣以當歸之行血補血兼大黃之破血走血斯和矣

當歸半兩黃連五分大黃各二錢甘草一錢

右先將當歸熬膏子入藥末三味為丸漸加服之以利為度

棗變百祥丸八十四治癰疹大便秘結  
紅牙大戟去骨青州棗去核

水一椀同煎至水盡為度大戟不用

將棗焙乾可和作劑旋丸從少至多以利為度宜云不可犯甘草以甘桔湯時



初知癩疹若使之癩疹併出小兒難禁  
是以別生他證也首尾不可下者首曰  
上焦尾曰下焦若能吐利猶不可下  
也便宜安裏若不吐瀉者先安裏藥  
三五服如能食而大便秘結內實者  
宜踈利之若內虛而利者宜用裏藥  
末後一服調微發之藥服之木抵安  
裏之藥多發表之藥少秘則微踈之令

邪氣不壅併而能作番次使兒易禁也  
身溫煖者順身涼者逆二者宜多服防  
風湯和之安裏若大便實秘能飲食  
而內實宜當歸九微利之

海藏老人癩論

夫癩之爲病皆繇子在母腹中時浸漬  
食母血穢蘊而成毒皆太陰濕土壅滯  
君相二火之所作也因小兒真氣既盛



正氣又王邪無所容或因天冷或因傷  
表或因傷裏痲絲是而生焉治當何如  
外者外治內者內治中外皆和其痲自  
出 至于惡寒者發之 表大熱者奪  
之 渴者清之 大便秘結者下之  
小便不通者利之 驚者安之 泄者  
分之 何以執一為哉大抵傷寒同治  
最有高論隨經用藥不可缺也 假令

五日已裏諸病與痲疹不能別辨者不  
可疑作痲疹必須發之但各從其所傷  
應見治之皆不妨痲出若強發之其變  
不可勝數矣  
前人言首尾不可下者何也曰首不可  
下者為痲未顯于表下則邪氣不得伸  
越此脉證有表而無裏故禁首不可下  
也 尾不可下者為痲毒已顯于外內

卷二  
建中堂



無根蒂大便不實無一切裏證下之則  
 瘕氣逆陷故禁尾不可下也 有如所  
 言温煖蓋覆不令通風以其瘕未出或  
 身表涼而惡寒或天令寒而惡冷温煖  
 蓋覆不令通風也瘕若已出身熱天暄  
 何必用蓋覆而不使之通風乎

謂之通風但不可處之斗室垂簾密  
 帷耳凄清之氣亦宜避也即暄與熱  
 倍宜加意消息  
 不可任情卸露

後人執此二句首尾俱不敢下温煖不  
 令通風不知天令之所加人身之所感  
 致使誤人多矣大抵前人之言隨時應  
 變以其所可者而言之

讀前人之言者宜作此觀曰隨時曰  
 應變經權原自錯綜易曰參互以盡  
 變此醫之不可不知也

後人不知其變故執常而不移也 瘕  
 之用藥大率以脉為主浮中沉之胗平



舉按之候察其虛實定其中外則可以  
萬全矣

未顯癱證所用之藥

外傷升麻湯主之十七大便溼者枳朮  
丸主之十九內傷枳實丸主之剛兒若  
傷冷者溫之神應丸主之九十惡寒者  
發之宜防風蒼朮丸九十  
表大熱者奪之首此表者通言三陽也

夫陽盛則氣必上行言奪者治法不令  
上行也

渴者清之大渴者白虎湯十八小渴

者涼膈散九十大便秘結者下之桃仁

承氣湯九十四順飲子七十柴胡飲子

八十選用察其在氣在血

小便不通者利之導赤散五十八正散

七十之類當求上下二焦何經而用之



驚者安之涼驚丸四七十重則瀉青丸三  
泄者分之二寒則異功散三十七四君子  
湯六八十熱則澤瀉茯苓湯

已顯癱證所用之藥

出不快 化毒湯七十七

太陽出不快 荊芥甘草防風湯九十三

陽明出不快 升麻紫草湯九十九

少陽出不快 連翹防風湯九十二

四肢出不快 防風芍藥甘草湯九十四

出太多 犀角地黄湯八十二地骨皮鼠

粘子湯八十九

咽不利 桔梗甘草鼠粘子湯百四

煩者 桔梗甘草梔子湯百三

肺不利 紫草茸甘草枳殼湯百二

瘡疹輕重候

凡未出而發搐者是外感風寒之邪內



發心熱之所作也當用茶粉下解毒丸  
一百 犀角地黄湯主之八十一發便密  
如鍼頭形勢重者合輕其表而涼其內  
連翹升麻湯五十八若癩已發密重微喘  
飲水者有熱證用去風藥下之 若出  
不快清便自調知其表不在裏當微  
發散升麻葛根湯九三若青乾黑陷身  
不大熱大小便澁則是熱在內煎大黃

湯 下官風散七若身表大熱者表證  
未罷不可下 若癩疹已出見小熱小  
便不利當利小便八正散七八十若已發  
後有餘毒未散有身熱瘡腫之類當用  
茶粉下解毒丸一百  
瘡疹已出後有聲音者乃形病氣不病  
也 瘡疹未出先音聲不出者乃形不  
病而氣病也 瘡疹出而聲音不出者



建中堂

是形氣俱病也當清其肺氣

補方

連翹升麻湯 八十五

連翹 牛蒡子各一錢 升麻 葛根

桔梗 甘草各七分 白芍藥五分 木通八分

薄荷葉少許

剉細加淡竹葉水一盞半煎一盞溫服

四君子湯 八十六

人參 白朮 茯苓 甘草

水一盞煎七分水一盞煎八分

八正散七八十治大小便不通

滑石 瞿麥 大黃 木通

扁蓄 車前子 梔子各一錢 甘草五分

燈心一錢水一盞煎七分去渣食前服

柴胡飲子八十八表裏俱實此方主之

柴胡 防風 當歸 白芍藥

建中堂



人參 甘草 黃芩炒 大黃各等分

滑石倍用 生姜一片 水煎服

河間涼膈散 八十九 表裏俱熱純陽無

陰之證

大黃 朴硝 甘草各五分 連翹 一錢

梔子人 黃芩 薄荷各二分五厘

淡竹葉 五片 水一盞煎八分去渣入

蜜一匙和勻服

東垣涼膈散 九十 治裏熱 即前方太

大黃加桔梗 朴硝

枳朮丸 九十一

枳實去穢麩炒 黃白朮土炒

為極細末荷葉裹老倉米燒飯為丸梧

子大量兒大小與服

連翹防風湯 九十二 治時毒

連翹研碎 防風 黃連 陳皮



當歸 白芍藥 獨活 白蒺藜炒去刺

荊芥 白茯苓 黃芩 牛蒡子炒研

甘草 每服二錢水煎

荊芥防風甘草湯 九十三 太陽出不快

三味 等分水煎

防風芍藥甘草湯 九十四 四肢出不快

三味 等分水煎

桃仁承氣湯 九十五

桃仁二十粒 去皮尖 桂枝一錢 去皮 大黃五分 芒硝二錢

甘草一錢 半

右水煎四味去渣入芒硝再煎數沸服  
廣嗣云便秘固宜急通惟此劑太峻非  
真知其熱結膀胱而瘡不起發不宜輕  
用也

防風蒼朮湯 九十六

防風 甘草各二分 蒼朮 石膏各五分



建中堂

川芎 黃芩各一錢 薄荷七葉 生薑三片

水煎日二服

神應丸九十七

巴豆 杏仁 乾姜 百草霜各五錢

丁香 木香各三錢 黃蠟二兩

將巴豆杏仁同炒黑烟盡研如泥另用好醋煮黃蠟去渣淨取二兩丁香木香俱為末又將黃蠟入鈔內溶化春夏入

香油五錢秋冬八錢攪勻後下杏巴末

次下二香末并百草霜研勻搓作錠子

油紙裹用時旋丸梧子大每服三五

丸米飲下日三服

地骨皮鼠粘子湯九十八

地骨皮 柴胡 桑白皮 鼠粘子

枳殼 前胡 黃耆各七分半 白茯苓

五加皮 人參 桂心 白芍藥

建中堂



升麻紫草湯 九十九

甘草各五分 薑 水煎

升麻紫草湯 九十九

升麻 紫草 甘草灸 白朮

陳皮 白芍藥炒各五分

水煎少加酒

解毒丸 一百

板藍根四兩洗曬乾 貫衆 青黛 甘草生各一兩

為末蜜丸梧子大另用青黛為衣紫草

湯下

紫雪 一百一 瘡疹藏府熱口爛齒腫水漿入

黃金十兩 寒水石 磁石 石膏

滑石各二斤 至四石俱為細末用水一石煮

甘草灸八兩 生犀角 青木香 羚羊角

沉香各五兩 丁香 一兩 升麻 玄參各一斤

為粗末入前汁中再煮至一斗 硝石

朴硝各十斤 入前汁中微火煎用柳枝內

藥料治去稠 卷二 建中堂藏



後藥 半日方下 朱砂 一兩 麝香 一兩二錢五分  
各為細末

右煎成收貯每服一二錢水調下

紫草茸甘草枳殼湯 一百二

三味 等分每服一二錢水煎

桔梗甘草梔子湯 一百三

三味 等分水煎

桔梗甘草鼠粘子湯 一百四

三味 等分水煎服

關東醫官 榎園吉田 祥校正

疹科治法綱卷二 終

疹科治法綱

卷二

建中堂藏



疹科治法綱卷三 徵今 建中堂

疹科治法綱卷三 徵今

金沙王肯堂字泰論著

菰中朱之黯用汲訂錄

曰余每治麻疹但據見證以瀉白散加減大劑投之即至危困之證無不愈者其他時師用苦寒降火辛溫發散而陷于危亡者不可勝數瀉白消毒飲

疹科治法綱 卷三 建中堂成



疹科治法綱

桑白皮

取入土東行根以磁刮去黃皮取白者細緝成絲蜜拌新瓦上焙香

地骨皮

亦自採鮮者牛蒡子炒研

荆芥穗

各一分錢

桔梗

甘草

各一錢

浮萍

曬乾

為麤末每服三五錢水一盞煎六分濾清服

加味金沸草散

疹後咳嗽

旋覆花

麻黃

去節水煮浮萍乾

鼠粘子

炒

前胡

各七錢

赤芍藥

半夏

制

甘草

各五錢

荆芥穗

一兩

每服共三錢水煎加

生姜

二片

薄荷

錢三五

春溫夏暑秋清冬寒此四時之正氣也  
冬應寒而反溫陽氣暴泄火令早行人  
感之者來春必發瘡疥未出痘疹者必  
感而生但見天行一時傳染大小相似  
即宜先服三豆湯代天官化丸以預解

疹科治法綱

卷三

建中堂藏



之三  
三豆湯

赤小豆 黑豆 菘豆各一 細甘草兩三

右以三豆淘淨同甘草用長流水八升

煮豆熟為度去甘草將豆曬乾又入汁

再曬汁盡為度逐日取豆以水煮食之

雪水更佳

代天宣化丸

甘草土 甲巳年為君 黃芩金 乙庚年為君

黃檗水 丙辛年為君 山梔木 丁壬年為君

黃連火 戊癸年為君 連翹佐 心酒洗

山豆根佐 牛蒡子佐 酒淘炒

先視其年所屬者為君視之 臣視之 次四味為

臣比君藥 減半 餘藥佐之視之 又減半 共為極細

末于冬至日修合取雪水煮 升麻汁 打

麩糊為丸辰砂 為衣竹葉 煎湯下

參科給法綱 卷三 建中堂成



心法曰此方即醫通五瘟丹也以五  
運為主解毒神藥也勝三豆湯絲瓜  
多神砂散

又方佐視臣四分之三而加

防風佐太紫蘇葉 苦參佐人中黃

竹瀝調神曲糊為丸辰砂為衣

右方雖人中黃能解肺腑之熱而蘓防  
性升苦參性寒不及前方為平

加味地骨皮散 治疹出發熱不退飲

食不進亦治喘急不止

地骨皮鮮者麥門冬 桑白皮鮮者

銀柴胡各二錢赤芍藥 乾葛各一錢

生犀角 甘草各五分

水煎調大小無比散五七分

大無比散 治熱毒太甚驚狂譫語引飲

桂府滑石六兩辰砂三錢雄黃一錢

以上三味俱研無聲水飛如飛麩粉草一兩



右為末每三五歲者服一錢十歲以外服二錢

小無以散 治壯熱口渴小水澀大便

秘口氣熱煩躁不寧焦紫紅斑自發

熱至起壯有熱皆可用

桂府滑石六兩石膏俱飛過寒水石

粉甘草各五錢鬱金七錢蟬肚小者甘草湯煮

乾為末

右俱製淨末和勻每五歲者服二錢大

人再加冬月燈心湯下夏月井水調下

熱甚不解者井水磨犀角汁調下

仲淳先生痧疹論治徵今

曰痧疹者手太陰肺足陽明胃二經之

火熱發而為病者也陳文治曰天行時

肌肉故發于遍身小兒居多大人亦時有之殆

時氣瘟疫之類歟故曰痘疹不宜隨證



施治惟當治本本者手太陰足陽明二  
 經之邪熱也解其邪熱則諸症自退矣  
 其證類多咳嗽 嘔 眼中如淚 泄  
 瀉 多痰 熱 煩悶 渴 甚則躁  
 亂 咽痛 唇焦神昏 是其候也亦  
 多有嘔吐者勿治嘔吐但透痧毒則嘔  
 自止况嘔中便有發散之義  
 治法宜以清涼發散為主經曰痧要清

藥宜清熱透肌 辛寒 甘寒 苦寒  
 以升發之 惟忌酸收 最宜辛散  
 誤施溫補不旋踵

辛散如

荊芥穗 乾葛 鼠粘子 西河柳

石膏 冬用 頰以湯泡本節 為佐 只可

用一劑

清涼透肌如

參科治法綱 卷三 下 建中堂成



卷三

竹葉 玄參 青黛 薄荷

蟬蛻 枯蕁根

甘寒如

麥門冬 蔗漿 生甘草

苦寒如

黃芩 黃礬 貝母 黃連

連翹 知母

隨証輕重制劑大小中病則已毋太過

焉又病因論治篇曰若夫疹家便須速用前劑解散十不失一假令病重藥輕或治療後期或誤投溫熱則邪熱內攻煩躁悶亂不可救藥矣

忌破氣 溫補 酸斂 燥熱 下

辛溫 滯膩

破青皮 枳殼 枳實 厚朴 檳榔

溫人參 黃耆 蒼朮 白朮

醫科治法綱 卷三 建中堂



卷之三  
建中堂

王損庵曰雖虛勿用參朮

酸 五味子 烏梅 白芍藥 石榴皮

醋

熱燥 官桂 王損庵曰雖寒勿用

丁香

木香 半夏 南星 王損庵曰雖有痰而

嘔勿用星半 燥悍之劑升陽 聶久吾曰 蒜 大小

吳茱萸 胡椒 薑 又大料物

下 玄明粉 芒硝 日 大黃 巴豆

牽牛 保護胃氣此

辛 白芷 當歸 紫蘇 細辛 川芎

膩滯 猪 羊 牛 犬 雞 我鷺等及油

汁 麩 魚 蝦

愚按貴勢之家惜小兒如掌珠者每

見小兒貨多痰煩悶躁亂神昏輒以下廣

其中所藥貨既多不無剽疾辛悍之性

初發時必咳嗽宜清熱透毒不得止嗽

外科台法綱 卷三 建中堂



建中堂

清揚飲子 痘疹之主方

麥門冬三錢 西河柳五錢 玄參二錢

葛根 鼠粘子各一錢 知母 蜜炙 蟬蛻

甘草 荆芥穗 薄荷各一錢 竹葉三十片

甚者加

石膏五錢 冬米一撮 又甚者加

黃芩 黃蘗 黃連

即疹後咳嗽慎勿輕用 五味子等收斂之劑

只宜

苦梗飲

貝母 甘草 薄荷葉 玄參

苦梗 麥門冬 括萎根

以清餘熱消痰壅則自愈

疹發時多喘邪熱壅于肺故也慎勿用

定喘藥惟應大劑

竹葉石膏湯

外科台法綱 卷三 口



石膏 五錢至一兩 知母 一錢至三錢 竹葉 三十片至百片

麥門冬 三錢至五錢 粳米 加玄參 二錢

薄荷 二錢 西河柳 兩許

檀前葛根湯

乾葛 前胡 荊苈穗 貝母

西河柳 玄參 知母 麥門冬

甘草 水煎服 如冬夫寒甚痧毒

鬱于內不得透出喘渴悶亂煩躁不定

者加 出蓋煎服不吐

麻黃 一錢或七八分 去沫蜜酒拌炒

凡熱勢盛者即用

白虎湯 太人參加 西河柳 忌用升麻

服之必喘

如平時痧疹發不出喘嗽煩悶躁亂用

獨聖散 長孺曰神秘之方

西河柳葉 風乾為末 水調頓服立定



賀少君病疹，家人不知，尚以肉飯與之。仲淳見之，驚曰：此痧疹之極重者，何易視之！進以

蕪虎湯

西河柳 兩許 知母 五錢 貝母 玄參 各三錢

竹葉 七片 十麥門冬 兩許 石膏 一兩 五錢

右進二劑，而痧盡現，遍體皆赤。連進四劑，痧雖出盡，煩躁不止，勢尚不可保。再

進以大劑

三黃石膏加檉葉湯

石膏 麥門冬 各三兩 知母 一兩 黃芩

黃檉 黃連 錢各五 竹葉 片二百 西河柳 兩一

濃煎，飲之，煩躁定而瘡

多泄瀉，慎勿止瀉藥用

升連飲子

升麻 黃連 甘草 乾葛



外科消法類  
卷三  
建中堂

則瀉自止且疹家不懼泄瀉陽明之邪熱得解是亦表裏分消之義也

若疹後泄瀉及便膿血皆繇邪內陷故也  
大忌止瀉惟宜升散藥仍用

升麻芍藥湯

升麻 乾葛 甘草 黃連

白芍藥 白扁豆 滑石 澄極淨用 此藥便膿血則加

多服必自愈

若痧後元氣不復脾胃虛弱宜用

青蓮國老湯

白芍藥君 甘草君 蓮肉臣 山藥臣

青黛臣 白扁豆臣 麥門冬臣 龍眼肉臣

臣以佐君多服必漸強慎勿輕用

若疹後下積滯用

連石薯蕷丸

黃連酒炒 滑石各一兩 黃芩 乾葛

外科治法類  
卷三  
建中堂



外科... 卷三... 建中堂

白芍藥 酒炒各八錢 升麻 七分 甘草 四錢

右以山藥打糊為丸白湯吞三五錢

治痧後痢

糖調樗葉散

西河柳葉 為細末淨四錢 砂糖調服

治痧後瘰

清涼健脾散

鱉甲 新瓦上醋炙乾研細二錢 再山查肉 三錢

麥門冬 太心五錢 白茯苓 二錢 炙甘草 七分

橘紅 二錢半 竹葉 五十片 知母 一錢二分 乾葛 一錢半

貝母 三錢 柴胡 一錢 渴甚加

石膏 五錢 不渴并知母太之

養脾開胃飲

前方太 柴胡 貝母 竹葉 加

白芍藥 一錢半 米仁 五錢

附 痘後見疹主方

外科... 卷三... 建中堂



參柳湯

沙參

桔梗

貝母

各一錢

甘草

五分

西河柳

二錢 風乾

水煎服

疹後牙疳最危須內外兼治之良肉服

生犀地黃湯

連翹

乾葛

升麻

玄參

甘草

黃連

生地黃

荊芥穗

水煎即以藥汁磨

生犀角 二十匙同服緩則不可救矣

黃龍散 外治

牡黃牛糞尖

煨存性研極細

梅花片腦 一分研勻吹

龍明散 外治治痧後口瘡

牡黃牛糞尖

煨製如前

明礬

五分

水片

一分半

白礬砂

三錢

皮硝

一錢

共為細末，鴛翎管吹患處



若痧後生瘡不已餘熱未盡故也宜  
連翹生地飲

金銀花 連翹 甘草 玄參

黃連 生地黃 荊芥穗 木通

鼈虱胡麻 濃煎飲之

關東 醫官 撻園 吉田 祥 校正

疹科治法綱卷三 終

跋

自整藥之道載方冊已降百  
病之治法無不盡備焉特疹之  
一証人身之一大患也然治瘡之方未  
見全書之善者以為遺憾余嘗  
藏清朱用汲所輯疹科治法綱



其中雖未必無得矣提古證今  
包羅兼盡可謂全書矣或謂  
余云與秘於家而獨得藏書之  
奇孰刻以公之於海內長傳不  
朽余云祥也年少素固陋寡  
聞希親診此病豈為下手於此

等之書乎或云吾子過矣以此  
者拘於一己之私而不思裨益  
一世之大義也清從余言而速圖  
之余聞之言於我心有感焉乃  
醵命剞劂氏刻於家塾冀有  
少補於救人之一大患云



寬政庚申後四月益旬

吉田祥仲復并書



寬政十二庚申歲三月新鑄

京都

烏丸通丸太町上<sup>九</sup>早

丸屋源八郎

浪華

心齋橋<sup>南</sup>詰<sup>壹</sup>丁目

敦賀屋九兵衛

大傳馬町二丁目

大和田安兵衛

湯島一丁目

田中雄藏

東都

本石町二丁目

西村源六



