

門中武
327
卷

序

卷六序

夫婦人有經產也。舉世是為難危。

矣。故自古醫者有十三科。而大科為

其最。六別設婦人科。以列于其數。

雖均之。可任大科哉。其所以別之

者。以有夫經產故也。竊以雖常產



難澁日久則母子軀命迫於旦夕。當是之時有良醫則一治而兩全矣。豈大科止救一人比哉。况又至若王氏腋產樊氏額產之類。其無素者不能治也。是乃在十三科中。其任莫重焉。其功莫大焉。恭惟本

邦泰平之化盛行。幾乎二百年矣。武露布文。露沈百家衆技林。狀起。其中有中條氏在焉。以善治產難。鳴固非虛名也。今也其徒數十百人。分所海內。而救其難者。指不勝屈。一日書肆醉墨齋。袖一帙來。

謂予曰。吾嘗梓村山氏所撰中條
產書小冊。大行于世。今復欲壽梓
其後。扁增補。希公校正之。予於是
喜。其傳不折。校正之家藏書。間亦
傍加私論。以發揮之。蓋其為書不
必依古人方論。皆書一家經驗。以

鄉語。是以大方之家多不信也。雖
朕予屢試之。極効。則是書有大補
於濟世者。可知已矣。是配之十三
科中之書。又何耻之有。故今添以
序而還之云。

皇和寶曆改元年

旭山戶田齋誌



中條流產書跋

右中條流產前後書。余年來臨
病施治無不應。尤有濟民之功。
故鋟梓以作一步之助矣。

寛文戊申晩春中澣

村山林益撰

中條流産科全書目録

初一 本味茶方ノ事

同二 同加減法ノ事

同三 妊娠禁物ノ事

同四 産ノ項ヲ知ル事

同五 生産月数ノ事

同六 悪阻ノ事

一丁

同丁ウ

二丁

同丁

同丁ウ

三丁

同七

孕ムカ不^{サレ}孕カヲ知ル^ミ脈ノ事

同丁ウ

同八

男女ヲ知ル^ミ脈ノ事 付双^{フタ}子^コヲ知ル^ミ

同丁ウ

同九

血ヲ上^カニ病ム下^{シモ}ニ病ムト云事

同丁ウ

同十

背バラミノ事

同丁

同十一

胎内ノ子居所ヲ^カ管^カユル事

同丁

同十二

火ニアタル事

同丁ウ

同十三

水ヲアミル事

同丁ウ

同十四

産前^{サンゼン}脈ノ事

同丁

同十五

水腫ノ事

同丁

産前^{サンゼン}方^{ハツ}目^{モク}録^{ロク}

一

不食^{フシヨク}シテ煩^{ワザラ}フ事

同丁

二

食^{シヨク}違^{チガハ}ニテ煩^{ワザラ}フ事

同丁ウ

三

目ノ上^{メノウヘ}重^{オモク}ク時々大息^{オホイキ}ヲツキ煩^{ワザラ}フ事

同丁

四

中^{ナカ}程^{ホト}ヨリ帯^{オビ}ヲトク事

同丁

五 熱ヲ煩フ事 同丁ウ
 六 風ヲヒキ熱アル事 同丁ウ
 七 大熱氣ヲ煩フ事 八丁
 八 傷寒ヲ煩フ事 同丁
 九 三四ヶ月ニテ古血煩フ事 九丁
 十 子留リテ一月二月又ハ三四ヶ月ニテ流ル事 同丁ウ
 十一 虫出テ煩フ事 同丁ウ

十二 三四ヶ月ニテ母ノ喉ヨリ虫多ク出ル事 十丁
 十三 味噌汁ヲ嫌フ事 同丁ウ
 十四 咽渴ノ事 同丁ウ
 十五 腹痛ヲ煩フ事 同丁ウ
 十六 吐逆飢逆出ル事 同丁ウ
 十七 咳逆ノ事 十一丁
 十八 腹中ヲ煩フ事 同丁

十九

痢病ヲ煩フ事

同丁

廿

冷タル物ヲ食シ熱氣アル事

同丁ウ

廿一

霍乱ノ事

同丁ウ

廿二

眩暈ノ事

同丁ウ

廿三

頭痛ノ事

十二丁

廿四

胸氣ノ事

同丁

廿五

淋病ノ事

同丁

廿六

小便澁リ或ハ不通事

同丁

廿七

大便結スル事

同丁ウ

廿八

脱肛出テ不入事

同丁ウ

廿九

足冷ヘ痛ミ煩フ事

同丁ウ

三十

母ノ身大ニフクレ惣身ニ細ナル物出ル事

十三丁

卅一

母ヨレト云煩ヒノ事

同丁

卅二

舌不動痛ム事

同丁ウ

卅三 惣身スグミ煩フ事

同丁ウ

卅四 惣身冷ハ腹中熱シ煩フ事

十四丁

卅五 惣身骨痛ミ物ニ狂フ事

同丁

卅六 腫風ノ事

同丁ウ

卅七 腰腫レ廿日モ煩フ事

十五丁

卅八 腫氣サシ煩フ事

同丁

卅九 母ノ臍ヨリ腫物出ル事

同丁ウ

四十 同臍ヨリ膿イツル事

同丁ウ

四一 トワタリ腫レ煩フ事

同丁ウ

四二 七八ヶ月ニテ血下ル事

十六丁

四三 大血ト云テ滝ノ如ク血走ル事

同丁ウ

四四 血止リテ物ニ狂フ事

十七丁

四五 血不時ニ下ルヲ止テ熱出ル事

同丁

四六 目口鼻ヨリ血出ル事

同丁

四七

吐血ヌル事

同丁ウ

四八

産ニ向ヒ喉ヨリ血出テ又痰血ノ事

同丁ウ

四九

血乱テ謔語シ齒ヲカミ惡寒發熱ノ事

十八丁

五十

未満月子胎内ニ死テ目口ヨリ血出煩フ事

同丁

五一

胎内ニテ子死スル事

同丁ウ

五二

死胎ノ事

十九丁

五三

母病テ子胎内ニ死レ手足出ス事

同丁

五四

子ヲ下シ頓テ又留リタル事

同丁ウ

五五

子下リタル跡煩フ事

同丁ウ

五六

母反張ツキ煩フ事

比丁

五七

足ノ裏腫レ煩フ事

同丁

五八

氣勞レ眠ル事

同丁ウ

五九

心モナク五日モ十日モ眠ル事

同丁ウ

六十

氣勞レタル妊婦ノ事

比丁

六一 目ノ見ヘヌ事

同丁

六二 氣ヨワキ者ノ事

同丁

六三 髪ヌケル事

同丁ウ

六四 薄黒キ子バキ物ヲサイク吐ク事

同丁ウ

六五 寢ルト其マ、夢ヲ見ル事

同丁ウ

六六 子乳ロヲ離ス事

廿二丁

六七 子母ノ膽ヘ喰付ク事

同丁

六八 同胆ヘ逆上ル事

同丁

六九 子古血ニセカレ胸ヘ上リ不食スル事

同丁ウ

七十 惡血ニテ熱氣アリ不食ノ事

同丁ウ

七一 孕婦月水ヨ如常ミル事

廿三丁

七十二 母ノ乳滝ノ如ク出ル事

同丁

七三 子宮腫ル事

同丁ウ

七四 子宮出テ下ル事

廿四丁

七五 母無煩惣身ヨリ水ノ如ナル物出ル事 同丁

七六 子宮ヨリ白キモノ出ル事 同丁ウ

七七 母ノ手ノ指サキ痛ム事 同丁ウ

七八 胎内ノ子臍ノ緒ヲ首ニ巻ク事 九五丁

七九 嬢胎カ血塊カ不知事 同丁

八十 血塊ヲ解ク事 同丁

八一 血塊下リタル時ノ事 九六丁

八二 石子ト名物ヲ孕ム事 同丁ウ

八三 子宮ヨリ天目程ノ物出ル事 九七丁ウ

八四 先走ト云テ十日モ廿日モ白キ物出ル事 同丁ウ

八五 十日十五日前ヨリ血下ル事 九八丁

八六 同水コボルノ事 同丁

八七 同破水ノ事 同丁ウ

八八 度々氣ヲ取り失フ事 九九丁

八九 母ノ股ヨリ下ニ熱氣アリ煩フ事 同丁ウ

九十 解ヲ持コス事 同丁

九一 胎内ニテ子アガク事 三十丁

九二 胎内ニテ子啼モダユル事 同丁

九三 胎動ノ事 同丁

九四 母ノ喉ヘ子手ヲ出ス事 同丁ウ

九五 産近付キ重シ掛ルト云事 同丁

九六 帶解カゲンノ事 卅一丁

九七 産ニ臨ミ二三日四五日前ニ血下ル事 同丁

九八 後ノ物子ヨリ先ニ下ル事 同丁ウ

九九 子宮先へ出ル事 卅二丁

百 産門ヨリ挽茶ノヤウナル物出ル事 同丁

百一 産前イゲミ有テ産門カユガル事 同丁

百二 産ニ向イ身持ヤウノ事 同丁

百三 腹ツヨク痛ム事

同丁ウ

百四 常ノイゲミノ事

同丁ウ

百五 イゲミ有テ血度々下ル事

同丁ウ

百六 産ニノゾミ小便出ル事

同丁ウ

百七 難産ニイゲミ止メ度時ノ事

同丁ウ

百八 ハシリノ後産門ニヌル茶ノ事

同丁

百九 産ニノゾミイゲムコ不成事

同丁ウ

百十 産ニ臨母ノ胸へ子上リ生レ兼ル事

同丁

百十一 産ニ臨物ニクルイ煩フ事

同丁

百十二 産ニ臨子返リシカ子ル事

同丁ウ

百十三 子宮塞リ生レカ子ル事

同丁ウ

百十四 子宮不開子頭ヲ出シ生レカ子ル事

同丁

百十五 母ノ股へ子足ヲ入レ生レカ子ル事

同丁

百十六 産ニ臨小腹張リ子返リシカ子ル事

同丁ウ

百十七 難産ニモ産門不破茶ノ事 卅六丁

百十八 産ニ向イ腹下リ振フ事 同丁

百十九 産ニ向イ夢ノ如ク驚キ怖ルノ事 同丁

百廿 産ニ向イ大ニ振フ事 同丁ウ

百廿一 産前ニ目ノ上重ク息早ク汗スル事 卅七丁

百廿二 産ニ向イ腰不起事 同丁

百廿三 産ニ向イ吐血痰血ノ事 同丁ウ

百廿四 同咳血ノ事 同丁ウ

百廿五 産ニ向喉ヨリ虫沢山ニ出ル事 卅八丁

百廿六 産ニ向産門不開時吹茶ノ事 同丁

百廿七 早生茶ノ事 同丁

百廿八 催生茶方ノ事 附催生茶ヲ用 ヌル時刻ノ事 卅九丁

百廿九 産ニ臨呵欠シ頻リニ腹痛ム事 四十丁

百卅 産ニ臨子湯ト云物下ル事 同丁

百九一 産ヲ持コシ度時ノ事 四十二丁

百九二 双子ニテ子宮ニ向イ生レカ子ル事 同丁

百九三 逆子横子ノ事 四十二丁

百九四 子足ヲ出シ生レカ子ル事 同丁

百九五 同片足ヲ出ス事 同丁ウ

百九六 同内茶ノ事 同丁ウ

百九七 逆子腰ヨリ下出ル事 四十三丁

百九八 横子片手出ス事

百九十九 同両手出ス事

百四十 同吐茶ノ事

百四十一 同内茶ノ事

百四十二 子生レ兼ル事

百四十三 産前アシキ茶ヲ吞腹大クテリ子不生事

百四十四 子返リハシテ子生レザル事

百四五

難産ノ加減ト云事

百四六

破水皆下リアト乾キ子生レザル事

百四七

古血ニセカレ子生レカ子ル事

百四八

胞衣不下事

百四九

後ノ物不下日久シキ時ノ事 付腰温メヤウノ事

百五十

後ノ物不滞様ノ加減ノ事

百五一

後産子宮ニ入ル事 付母コトノ外放屁事

百五二

後産不下時ノ脉ノ事 付双子ニテハ腹ニノコル事

百五三

後産不下時ノ秘方ノ事

○産後方目錄

一

産後養生ノ事 付脉ノ事

五十一丁

二

産後血ヲ定ル事

五十二丁

三

同酢ヲカビスル事

同丁

四

跡腹痛ム事

同丁夕

二五十一丁

目錄二二

五 半産ノ後大ニ腹痛ム事

同丁ウ

六 本産半産モニ大ニムツカレキ時灸スル事

五十三丁

七 産後氣ツケノ事

五十四丁

八 子ヲウミ古血上リ血狂ヒスル事

同丁ウ

九 大イニ血走ル事

五十五丁

十 本産半産後凡物狂ハレキ事

五十六丁

十一 血乱レテ悪寒発熱スル事

同丁

十二 血止リ過テ熱氣サレ又氣虚フ事

同丁

十三 産後熱氣又煩フ事

同丁ウ

十四 産後目マイノ事

五十七丁

十五 目旋リ氣違フ事

同丁

十六 目旋リ人ヲ不見知事

同丁

十七 狂氣シテ汗ヲカク事

同丁ウ

十八 産後反張ノ事

同丁ウ

十九

産後振ツ事

五十八丁

十八

胸噪キキノ氣上キボル事

五十九丁

十七

眩暈メテシテ振フルイ付齒フキヲ喰ハシメ發熱ホツチツノ事

同丁

十六

頭痛煩ワツラノ事

同丁

十五

頭痛血ノ道ノ事

同丁ウ

十四

産後ニ子宮出ホル事

六十丁

十三

産門返モリり出イル事

六十二丁

十二

尻ノ出イル事

同丁ウ

十一

尻痛イタム事

同丁ウ

十

子宮ヒカザル事

同丁ウ

九

子宮ヨリ天目程テシモクホノ物出モル事

同丁ウ

八

胞衣子宮へ入ホル事 付母放ハ尻ノ事

六十三丁

七

陰戸痛イタム事

同丁

六

子ヲ生ウミ待合破マレ陰門肛門インモンコウモンヲニナル事

同丁ウ

三三 目見へザル事

六十四丁

三十四 耳ノ不聞事

同丁ウ

三五 夢ヲカサ子く見驚ク事

同丁ウ

三十六 寢汗ノ事

同丁ウ

三十七 子ヲ生之後ノ物ニテモナク腹痛之煩事

六十五丁

付 双子ニテ一人腹ニノコル事

三八 鼻血又ハ喉ヨリ血出ル事

同丁ウ

三十九 大便ニ血ヲ下ス事

六十六丁

四十 吐血ノ事

同丁

四十一 吐逆ノ事

同丁ウ

四十二 咽渴キ湯水大ニ吞タガル事

同丁ウ

四十三 下令タル故カ或ハ水ナド吞之古血堅リ虫ナドノ

六十七丁

四十四 古血不下事

同丁ウ

産科全書

目録

四五 古血フルチカタマリ身ミノ内ウチ天目程テンモクニ腫ハル事 同丁ウ

四六 大便結ダイベンスル事 同丁ウ

四七 小便淡セウベンル事 六十八丁

四八 小便頻数セウベンノ事 同丁ウ

四九 小便不覚通セウベンズル事 同丁ウ

五十 産後咳嗽サンゴノ事 同丁ウ

五一 早ハヤメニ物モノヲ云イヒ色イロ赤アカク汗アセ出イル事 六十九丁

五二 物モノ云イフナラ又煩ソツライノ事 六十九丁

五三 不食フシヨクノ事 同丁ウ

五四 噦ヒヤシスル事 同丁ウ

五五 泄泻痢病セツキリビヤウノ事 同丁ウ

五六 腹下ハラタル事 七十丁

五七 薄黑ウスクロク子バキ物モノヲ吐ハク事 同丁ウ

五八 腰コシ又テ手足不叶テアシバクハノ事 七十二丁

産科全書

目録

五九

久シク腰ヌケク煩フ事

同丁

六十

腹痛ノ事

同丁

六一

胸ヲ痛煩フ事

同丁ウ

六二

腰痛ノ事

七十三丁

六三

鼻痛ノ事

同丁

六四

口中痛ム事

同丁

六五

咽痛ム事

同丁ウ

六六

股足痛ム事

同丁ウ

六七

筋ヲ痛ム事

同丁ウ

六八

身骨ウツク事

同丁ウ

六九

産後中風ノ事

七十三丁

七十

風ホロセノ事

同丁

七一

風腫ノ事

同丁

七十二

風毒ノ事

同丁ウ

七三

腫氣ノ事

七十三丁

七四

腰ヨリ下腫ルノ事

同丁

七五

子ヲ下シテコナイ煩フ事

同丁ウ

七六

味噌氣嫌ノ事

同丁ウ

七七

産後呵欠シテ腮ノ離ル事

同丁ウ

七八

呵欠シテク涙多ク流ル事

七十五丁

七九

シヤシリ出ル事

同丁

八十

舌ヲ出シ湯水ヲモ不飲ウカクト煩フ事

同丁

八一

心脱ウカクトトノニ三年モ煩フ事

同丁ウ

八二

勞瘵ノ如ク煩フ事

七十六丁

八三

髪又ケ跡白クナル事

同丁

八四

十日十五日モ人心ナク眠ル事

同丁ウ

八五

胸ニ熱氣アツテ煩フ事

同丁ウ

八六

手足冷ル事

七十七丁

産科全書

目錄十九

八七

手足暖ナル事

同丁

八八

面赤ク手ニ熱アリ足冷ル事

同丁

八九

足冷ヘ面ホトフリ耳鳴ル事

同丁ウ

九十

産後コトノ外瘦ル事

同丁ウ

九一

横寐ナラヌ事

同丁ウ

九二

帯トキノ事

同丁ウ

九三

手ノ内腫ル事

七十八丁

九四

脐ノ下天目ホドニ腫レ痛ム事

同丁

九五

脐ヨリ膿イツル事

同丁

九六

子ヲ度々ウム者ハ古血アル事

同丁

九七

食違ノ事

七十九丁

九八

腹中塊アル事

同丁

九九

乳腫レ痛ム事

同丁

百

乳不足ニナル事

同丁ウ

三十一

目錄七

百一 乳イデザル事

同丁ウ

百二 腹ノフトル事

同丁ウ

百三 産シタル女早ク使フ事

八十丁

百四 産後母ノ痘瘡ノ事

同丁

百五 息クサキ事

同丁ウ

百六 産後腰氣ノ事

同丁ウ

百七 産後赤白帶下ノ事

八十二丁

百八 産後氣大過ナル人長ク煩ヒ或ハ勞瘵ヲヤミ俄ニ

氣ヲトリ違フ事

同丁

百九 同小氣ノ人物ヲ苦ニシテ血ノ道ヲヤミ氣違事

八十二丁

百十 産後瘡ノ事

同丁

百十一 赤白長血ノ事

八十三丁ウ

百十二 問ヒ茶ノ事

八十四丁

百十三 産門疵瘡ノ事

同丁

百十四

産後禁物ノ事

同丁

○ 中条流小児方目錄

子生レ落ルト其マ、養育ノ事

八十五丁

子出生其マ、吞スル茶ノ事

同丁ウ

子生レテ声ヲ上カル事

同丁ウ

生レ子ニ用ル茶ノ事

八十六丁

子ノ咽カワク事

同丁

子ヒタト腹ヲ下ス事

同丁

夜啼ノ事

同丁

キレ草ノ茶

同丁

五疳ニ用ル茶ノ事

同丁ウ

ハス子ノ茶ノ事

同丁ウ

ヲトミ子茶

同丁ウ

二生湯驚風ヲ治ス

同丁ウ

丁子圓虫積霍乱ヲ治ス

八十七丁

○板坂流小児方目錄

小児出生二七日ノ間大便不通ノ事

同丁

同一二月ノ間身熱シ腹下ル事

同丁ウ

五疳ノ菜

同丁ウ

清凉飲子

同丁ウ

加减丁香散

八十八丁

豆蔻散

同丁ウ

木香散

同丁ウ

白中散

八十九丁

万理圓

同丁

加减理中散

同丁ウ

加减粮臍湯

同丁ウ

度嶂散

九十丁

惺々湯

同丁

阿伽佗圓

同丁ウ

普濟散

九十二丁

三神圓

同丁ウ

豆蔻散

九十二丁

宿御湯

同丁

駐車圓

同丁

小兒下痢妙茶

同丁

赤痢腹痛ノ一方

同丁ウ

厚朴散

九十三丁

參苓散

同丁

丁木散

同丁

○ 中条派別録口傳某方目錄

枳殼散

九十四丁

止痛散

同丁ウ

理中散

同丁ウ

紅花散

同丁ウ

快後散

九十五丁

調經湯

同丁

早生秘菴

同丁

調榮湯

同丁ウ

澤蘭湯

同丁ウ

人參湯

同丁ウ

補氣湯

九十六丁

養血牡丹皮湯

同丁

延胡索湯

同丁

增損四物湯

同丁

增損柴胡湯

九十七丁

順血湯

同丁ウ

益母湯

同丁ウ

産後振り菜

九十八丁

白菜ノ方

同丁

同又方

同丁

白菜血道菜

同丁ウ

黒神散

同丁ウ

三味小切紙ノ方

九十九丁

二味二兩小紙ノ方

同丁

催生神應散

同丁ウ

加減四物湯

同丁ウ

産後補菜

百丁

白之本味方

同丁

蘓神湯

百一丁

天得湯

同丁ウ

解泄方

百二丁

血下薬

同丁

握り薬

同丁ウ

婦人秘薬 サシ薬

同丁ウ

同 サシ薬

同丁ウ

破血劑ノ事

百三丁

子ナキ者ニ孕スル方

同丁ウ

極意口上ノ一味方

同丁ウ

山ト云秘薬

百五丁

黒ト云秘薬

同丁

関ノ粉薬

同丁ウ

関ノ一味薬

同丁ウ

関ノ額塗薬

百六丁

塗茶秘方

同丁

香ノ粉茶

同丁ウ

黄ノ三色茶

同丁ウ

痢病ノ秘方

百七丁

同産後ニ用ル茶

同丁

痢病九茶

同丁ウ

風毒ノ九茶

同丁ウ

待相付茶

百八丁

反張ノ灸穴

同丁ウ

古血ノ灸穴

同丁ウ

腰氣ノ灸穴

百九丁

濃州乗付流産方目録

催世順氣散

同丁ウ

順生散

同丁ウ

横子手足出ス方

同丁ウ

隨醬散

同丁ウ

止痛散

百十丁

○板坂流女科目録

婦人脾血氣ノ事

同丁

婦人血分腫氣方

同丁

室女月候行トノ腫痛スルヲ治ル方

同丁ウ

正脾散

同丁ウ

加減四物湯

同丁ウ

月水滯腹痛スルヲ治ル方

百十丁

命仙湯

同丁

腸痔多年不愈ヲ治ル方

同丁ウ

泻血不止ヲ治方

同丁ウ

腰氣サシ茶 付加減法

同丁ウ

同一方

百十三丁

○瀨之尾流産科目錄

産前方 保氣散

百十三丁

産前風寒方

同丁

四物湯

同丁ウ

難産逆産ノ秘薬

同丁ウ

胞衣不下秘薬

同丁ウ

産前後血上リタル治方

百十四丁

同風氣方

同丁

血道并産後面腫方

同丁

血道并手負方

同丁

血道身ノ毛立面赤ヲ治ル方

同丁ウ

難産或死胎胞衣不下ニ用ル方

同丁ウ

産後方

同丁ウ

同黒茶

産後古血不下胞衣不下ニ用ル方

百十五

産後血シバリ

同丁

又方

同丁

アト腹ヲ治ル方

同丁ウ

神仙散

同丁ウ

當飯散

同丁ウ

黒神散

百十六

失笑散

同丁

産後反吐百葉不効ヲ治ル方

同丁ウ

呉茱萸湯

同丁ウ

血暈心氣絶スルヲ治ル方

百十七

三稜散

同丁

万病圓

同丁ウ

車前子散

滑胎散

牛膝散

產後中風方

產後偏身痛方

總目錄大尾

同丁ウ

百十八分

同丁

同丁

同丁ウ

中条流産科全書

攝陽

戸田齋

刪補

○本味

号正氣古血散一名順氣散
一名順血散

人參

沉香

川芎

芍薬

當歸

各等分

白朮

甘草

各三分

右七味水煎メ用ユ又為散温酒ニテ用ユアリ酒少ニ
加ヘ用ユ但シ緩クト養生スル時ハ酒少ニ用急用ニハ

産前産後方

上戸下戸共ニ酔程ニ用ヒヨ

加減法

參

脈沉細ニ除ク或ハ減ストキ下ニ度キチ下

度キ時芍上セ度キ上セタキ木腹中冷エル甘
ハ倍ス芍時ハ倍ス木ハ倍ス甘
倍口上何レノ加減ニモ是ヲ加ルソ

私ニ曰右茶味ノ中口上ト云フハ中条流極秘口傳ノ茶

ナリ舊板是ヲ不録其製法今具サニ奥ニ記ス

一唯加トハカリアルハ本味一味程ソ

一大目引トアルハ一味ノ内三分ニヒクソ

一倍トアルハ大ヒニツカフ事ソ

一茶ノ製法如常▲人參上品芦頭ヲ去ルソ

沉香ハ黒ク重実ノ物ヲ佳トス白ク輕虚ノ物不効

○禁物 油氣 川魚 雉鳥 抹茶 辛類 胡椒 生葱

類 菌類 冬瓜 胡瓜 梨子 鹿肉 兔肉

○産ノ頃ヲ知ル事経水來リ止ルヲ常ニ月初ニアル八月

初ニ産スルモノ也又月中ニ月水アルハ中旬ニ産ス下
旬ニ月水アルハ必月末ニ産スルモノ也但シ中旬ニ留
ルハ産安シ月初メニ留ルハ必難産成ルモノ也服茶
養生スベシ

○婦女孕ム事經水畢テ十日ノ内ニ孕ムナリ是レ過テ後
孕ムナキ物也此故ニ常ニ經水月初ニアル者ハ産ス
ルモ月初ナリ凡ソ始メテ孕者九十月月前後十一ヶ月

ニシテ産ス後々ハ九九ヶ月前後十ヶ月ニテ産ス是ヲ
以計ルニ不違

○惡阻ノ事經行止リテ兩三月精神如故酸ヲ好ミ食ヲ惡
ミ或ハ何ニテモ一物ヲタシミ痰又ハ清水ヲ吐キ体重
ク頭痛シ口渴シ嘔吐上氣腹痛下利耳鳴卧スヲ好ミ
其婦ニヨリ病狀一般ナラズ究メテ難云經行不調ノ病
カ妊身カ脈ヲ以テワカツベシ

○脉微滑ニ数ニシテ無間断瀉ナラズ伏ナラガル則胎脉ナリ又一法指頭ノ脉寸口ニ倍シ氣衝ノ脉寸口ニ倍ス是決シテ孕メル也

○男女ヲ知ル脉ノ事寸口滑実ヲ男トス尺中滑実女トス兩寸滑実男トス兩尺滑実女トス右尺尤寸滑実双男女トス

○上ニ血有ル者ハ口早ヤニ酒ニ酔フ人ノモノ言フ様ニアリ又下ニ血アルハ如何ニモ静ニ寐ル様ニ言也此理ヲ以テ万事心事心得アルツ

○腹サレ出シ孕ミタル者安産也背ヘツイテ孕ム者ハ必難多シク様ノ者ニハ惣ノ酒ヲ吞セヨ女ノ氣フトクナレバ産ハ安キモノ也又身ヲ大事ニ思ヒ身ヲツメ氣ヲ勞スルニヨリ難産スルコト有リ是等ハ酒ヲ進メヨ

○胎内ノ子爰カレコ居処ヲ替ルト云ハ必逆子横子ノ患

産前イナナ
アル者也其心得ヲ以テ色々替ル様子ヲ油断ナク見テ
茶ヲ与フベキコト

○腰冷ルトテ惣メ炭火ニアタルハアシ、血ノ上ルモノ
ナリ但シ焚火ハ不苦タキ ケルシカラ

○産前如何ホト暑ツガル凡水ヲ浴スルコト惡シアツトヲ
ビユレバ子必乳口ヲ離スモノ也乳口ヲハナシタル子
ハ必母ノ膾キモハ喰ツクモノ也 此茶方アリ

○産前二脉カチケタルハ夕トヘモノヲハツキト云トモ
氣弱シ只脉タシカナルカヨキナリ

○産前水腫ノ者産シテ血暈セサル者也胸ウデヨリ上腫アル
ヲ逆水トス産安クテモ母ハ多ク危シ腹以下腫ル、モ
産ハ安シトイハ凡母子共ニナヤムソ産前ヨリ服茶
シテ可慎也

產前 附 臨蓐 后産

一 不食^{ワツラ}シテ煩^{ワツラ}フコアリ本味ノ内人參川芎ヲ減^{ゼン}シ當飯
 白朮ヲ倍シテ用ユ又宿砂大ニ加ルゾ飯沉ハ常ヨリ倍シ
 テヨシニ十日三十日不食シテモ不苦大カタ右加減ノ茶
 一日ニ五三服可用惣シテ身草^{クダミン}卧氣カヒナキ人ニハ茶ヲ
 イカニモ和^{ヤハラ}カニシテ用ユルコ第一ナリ

齋按スルニ此症華人^{ハシジン}惡阻^ヲト名ク肥人ハ痰トシ瘦人ハ

熱トス痰ハ二陳湯ノ属ヲ主トシ熱ハ逍遙散ノ属ヲ加
減シテ用ユ又白朮黄芩縮砂等ハ古ヨリ安胎ノ主薬也
撰ヒ用一ベシ人参モ症ニヨリ忌ムベキニ非ズ

二 二三月ニテ食違ニテ煩フコアリ本味ノ内沉香當飯
ヲ倍シ用ユ子下リソウナル時ハ甘草ヲ倍シ用ユ脈沉細
ハヨシ細ニシテ熱氣アラハ子下ルコアルベシ本味ノ内
人参 大目 當飯 沉香 倍シ用ユヘシ

三 目ノ上重ク時々大イキヲツキ煩フハ大辛ナリ本味
用ヒ様子ヲ見脈浮大ニシテ息アラクハ陳皮香附子ヲ加
ヘヨ又ソレクニ加減シテ用ヒルゾ腹脹フクレツク息キ
死人ノニホヒスルハ尤大切ト知ルベシ

四 孕テ帯ヲシタルニ中程ヨリ帯ヲトク人ニハホソリ
薬ヲ用ヒテ帯ヲトカスベシ高貴ノ人ニハ日ヲ重子テ一
日ニ三度ツ、用ユベシ下賤ノ者ニハ一月ニ二三度ツ、

用ヒサセヨ但シ毎月ノコナリホソリ薬ハ本味ニ青皮中
加ヘヨ又一方三分一加ヘルズ帯ヲイヤガル時右ノ如ク
スルナリ

五 熱ヲ煩ワツラフ時ハ本味ヲ以テ養生スヘシ前後トモ熱ノ
煩ヒニ本味バカリ用ルコト專セン一ナリ餘症ヨレヤウアルニハワレク
ニ加減スベシ

六 風ヲヒキ熱ツキ氣アルニハ陳皮香附子ヲ加ヘ用ヒヨ

七 大熱氣ヲ煩フニハ本味ニ陳皮香附大ニ加ヘ用ユ又
汗ノ加減スベシ甚ハナクキニハ川芎ヲ倍ハイス

八 傷寒惡寒發熱ニハ本味ニ羌活防風ヲ加ヘ汗ナクハ
紫蘇葛根ヲ加ヘ頭痛ニハ白芷ヲ加フ寒熱往來ニハ柴胡

黃芩ヲ加ヘ用ユベシ

齋按スルニ姪婦傷寒ニ麻黃湯桂枝湯ヲ忌ムト云フコ
アリ墮胎ダタイセンコトヲ恐コソル、ヲ以ナリ雖然傷寒大邪イタニ至

リテハ如右ヌルキ薬ヲ以救ヒ難シ熱甚キハ症ニヨ
 リテ大小兼氣湯トイヘ氏施用セズンハアルベカラス胎
 墮スヲ恐ル、氏母治セズンバ子ヲ獲スベキノ道理
 ナシ勿論麻黄桂枝忌ムベキノ薬ニ非ス左ニ妊娠禁忌
 ノ藥品記ストイヘ氏狗々トシテ琴柱ニ膠スルヲナカ
 レ症ニ随ツテ用捨スベシ

○ 懷妊禁忌之藥品之事

- | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|----|----|----|
| 烏頭 | 附子 | 天南星 | 半夏 | 巴豆 | 大戟 | 芫花 |
| 藜芦 | 牛膝 | 皂莢 | 牽牛子 | | 茜根 | 干漆 |
| 瞿麥 | 三稜 | 麥牙 | 冬葵子 | | 常山 | 牛黃 |
| 麝香 | 諸石 | 諸茶 | | | | |

九 三四ヶ月ニテ古血煩フニハ色牡丹ニシテ加フルヅ
 古血下リテ悪シキヲナシ下シ度時ハ鼠尾ヲ用ヒテヨシ
 本味ニ沉香ヲ倍ス

十 一月二月ホト子留リテ流ル、ツアリ古血アツテ子
宮ツボヒユル故ナリ本味六七服ホド用ヒ後ニ本味ニ牡丹皮
二色ニシテ加ヘ用テ古血ヲ下シ養生スベシ牡丹二色ハ
生ト炒トナリ又曰三四ヶ月ニシテ毎々墮胎スル者ニハ
本味ニ生地黃艾葉阿膠ヲ加ヘ可用

十二 虫出テ煩フニハ本味ニ丁子ヲ加ヘヨ無効片ハ沉香
ヲ倍シ香附子ヲ大ニ加ヘ用ユ此煩ヒ必ス酒ヲ不好モノ

ナリ如何様ニシテモ酒ヲ進ムベシ

十二 三四月ニテ母ノ喉ヨリ虫イカ程モ出ルツアリ本味

ノ内當取炒沉香焙川芎芍薬一味大牡丹皮炒丁子香皮

ヲ加ヘ用ユベシ大事ノ煩ヒナリ氣勞ツカレ古血多クシテ下

焦冷タル故ナリ脉ハ時々打切レ有テ沉細ナルモノナリ

難産ノ基モトナリ又曰毎日虫出ルツアリ上氣人ニハ香附子

山梔子ヲ加ルツ

十三 味噌汁ヲ嫌フモ惡血ナリ又胸ノツカユルモ下焦ノ冷ナリ其心持第一ナリ本味ニ牡丹皮少香附子少加へ用ユヘシ前後同前ナリ

十四 咽乾クニ本味ニ牡丹皮少麥門冬中葛根中加へヨ

十五 腹痛煩フニハ本味ニテ様子ヲ見不治ハ本味ニ牡丹皮炒少シ加へ用ユベシ又日先甘草大々加へ用ユ

十六 吐逆出ルニハ本味ノ内當飯沉香倍丁子ヲ加へ用ユ

ハシ不苦イカニモ母ノ身ヲ温ムベシ

十七 咳逆ニハ関ノ粉茶ヲ奥ニ砂糖ヲ酒ニ化シテ用ユ但記ス

コノ粉茶バカリモヨシ本味ハ前ノ吐逆ノ加減ニテ用ユ

十八 腹中煩フニハ本味ニ黄ノ三色茶加へ用ヨ但シ虫ニ

ハ丁子ヲ加へヨ又腹痛アリ或ハ不食ニハ宿砂ヲ加へ用

ベシ

十九 痢病ニハ黄ノ三色茶糯米粉ニ砂糖少加へ薄茶一服

程ホトツ、白湯ニテモ食シノトリ湯ニテモ用ユ但シ本味ノ養
生ノ間イタク々ニ用ヒヨ三色菜ハ又日多ク傷産スルナリ油タシ断

ナク菜ヲ用ヒヨ又秘方奥ノ
菜方部可考

二十冷タル物ヲ食シ熱氣アルニハ本味ノ内入参少當飯

沉香倍陳皮香附子大ニ加ヘ用ヒヨ

北一クハクハラ霍乱ニハ本味ニ陳皮香附子ヲ加ヘ可用

北二クハクハラ眩暈ノ煩ハ痰氣又ハ惡血ヲケツ毛有レ本味ニ當飯大倍

川芎中倍 其外同前香附子中加ヘ用ユ加減ヨク心得

北三頭痛ニハ本味ニ香附子ヲ加ヘ用ヒヨ

北四ハナク胸氣ニハ本味ニ香附子大ニ加ヘヨ

北五淋病ヲ煩ワツラフニハ本味ニ沢泻中木通中加ヘ用ユ水腫水腫

ノ心アラバ猪苓中加フ不治ハ山茨菰中加ヘヨ

北六小便澀シリ或ハ不通ニ本味ニ牡丹皮二色ニノ加ヘ不

治ハ沢泻猪苓ヲ加ヘ用ユ一方山茨菰ヲ加フ

比七 大便結スルコトアリ本味ニ大黃ヲ加ヘヨ

比八 脱肛出テ不入コトアリ則本味用ベシ又黒蛤ヲ煮テ其

汁ニテソロクト洗フベシヒキ茶ニテ推シ入ル、也前後

同前黒キ蛤ナクハ黒キカタ付タル貝モヨシ又マテ合フ

ニ成テ脱肛出ルコトアリ其時ハ蛤ノ汁ニテ洗フテ惡シ

比九 足冷イタミ煩フハ下ニ冷タル血有テ上ニ上ルナリ

本味ノ内當飯沉香ヲ倍シ用ユベシ産ノ前カドニヨク養

生スベシカラ子ニナルモノナリ

三十 母ノ身大イニフクレ惣身ニ細カナル物フキ出ルニ

本味ニ牡丹皮炒大黃少加ヘ古血ヲ下スベシ

三十一 母ヨレト云フ煩ヒハ夜昼物ニ驚キ氣ヲ取失フコト也

本味ノ内當飯沉香 倍人參 大目甘艸 炒用ユベシ又日本味

右ノ加減ニシテ牡丹皮 炒遠志 中麥門冬 中加ヘ用ユ但シ

惡血ノ心ナクハ牡丹皮ヲ去ル又日本味ノ間々ニ関ノ粉

茶ヲ茶一服ホドツ、白湯ヲ以テ用ユベシセキノ粉茶

三十二母ノ舌不動痛ムツアリ古血故ナリ本味ニ沉香倍芍

茶川芎大目引 陳皮香附子ヲ加ヘ用ユ又汗アヲ出スベシ冷々

ル煩ワツラヒナリ

三十一惣身スクミ煩ワツラヒフアリ古血故ナリ本味ニ風ヲ去ル

加減カシテ用ユソレニテ不治ハ本味ニ牡丹皮ヨク加ヘヨ

下戸ナリ共酒ヲスゴスベシ帶ユルクセヨ

三十四惣身冷腹中熱ノ煩ワツラヒフアリ本味ニ香附子陳皮倍汗

ヲ出スベシ捨ステケバ産ニ向ヒ大ニ血下ル事アルク産ノ

一ケ月前二ケ月前ヨリ本味ノ内人参大目引 川芎芍茶倍用

ベキナリ

三十五惣身骨痛物ニ狂ホフアリ古血故ナリ又風ヲ引テ煩ワツラヒ

フアリ本味ノ内當取ホ炒沉香牡丹炒加ヘ用ヒテ母バカリ

養生スベシ又子痛ムホアル時ハ本味ノ内甘草ヲ倍用ユ

大争ノ煩也母バカリ養生スレバ子ノ痛ムコアルモノ也
又痛風ノ如ク惣身骨痛ミ足屈伸ナラズ又シク煩フコア
リ関ノ粉茶ヲヌル湯ニ化ノ引ベシ右本味ノ療治ニテ緩
々ト治スベシ惣ジテ前後腫ル者アリ常ト各別ナリ外科
ナドニカケベカラス

三十六腫風ニハ本味ノ内人參ヲ減シ陳皮小香附大加ヘ用
又陳皮不加モヨシ

三十七母ノ腰腫レ九日モ止日モ煩フニハ本味ノ内川芎芍

薬倍牡丹皮炒加ヘヨ熱氣アルニハ香附子陳皮ヲ用ベシ

腫タル腰ニハ関ノ一味ヲ奥ニ記ス水ニテ塗ルベシ

三十八腫氣サシテ煩フ事アリ前後古血故ナリ本味ニ牡丹

皮生炒ニ色ヲ加ヘ用ユ古血下ルコアリ本味ノ川芎芍薬

倍シ用ユベシ但シ腫足ヨリサスハ不苦上ヨリサスハ大

事ナリ則前文ニ見タリ可考

症前後集方

十五

産前産後

三十九 母ノ臍ヨリ腫物出ル莫アリ其時ハ伏龍肝ヲ粘ニ押

マセ腫タル処ニヌリテ紙ヲフタニスルナリ内蒸ニハ本

味ニ牡丹皮ヲ加ヘテ古血ヲ下ヌベシ

四十 母ノ臍ヨリ膿イヅルアリ直ニ本味ヲ用ルヅ其間

ニ紅花散ヲ奥ニ少ツ、可用前後共同シ

四一 會陰ノ腫レ煩フニハ本味ヲ黒焼ニシテ胡麻ノ油ニ

四二 七月八月ニテ血下ルヲアルハ産ニノヅミ生レカ子

ル物ナリ本味ノ内人參川芎芍薬倍當皈沉香大目引用ベシ

必ス止ル也又云血下ルヲ少シツ、ハ不苦多ク下ル時右

ノ本味ニテ不止ハ騏驎竭ヲ焼テ本味ニ壹匁加ヘテ必ズ

止ル也口傳日産前キリン血ヲ用ル時ハ必ス焼ベシ其後

ハ腹ノ子ニアタル者也又産後ニキリンケツ用ルヲ大事

ナリ大形本味ニテ留テヨレ去血多下ル時ハ先本味ニ

産前産後

一六

テ血ヲ止メテ其上キリン^{ケツ}竭ヲ可用ケ様ニ世子^{ノチ}バ後^{ノチ}煨^{ノチ}フ
物ナリ何煩^{トク}モ本味養生專^{セン}一ナリ當^ニ取^ル川芎芍藥甘草^ノ炒^ル用^ス
ルガヨシ十日廿日血下ル時モ右ノ如ク心得ベシ

四三 大血ト云フテタキノ水ノ如ク血走ル^トアリ是ハ子
留リテ五月六月七八月ニテモ走ル物也本味ノ内沉香當
取^小芍藥川芎^大人參炒用^{ベシ}無^レ効ハキリン^{ケツ}燒^ル●コレ
程ニ紙ニ包^ミ本味ノ内へ入^レ用^ユベシ

四四 血止リテ物ニ狂^フ更^{アリ}本味バカリ用ヒ汗^ヲカセ

酒ニ醉^セ養生スベシ何ト狂^フ比^シ苦^シカラズ

四五 血不時ニ下^ル止^メテ後熱氣^{子ツキ}出ル^トアリ不^レ苦本味ニ

陳皮香附子大ニ加ヘ用ユベシ

四六 目口鼻ヨリ血出ル^トアリ帶^ヲユル^クレテ本味ノ内

人參炒沉香當^取倍用ユ其後帶^ヲトキ右ノ加減ニ^テイカ

程モ用ユベシ^レニテモ不^レ止^スハ牡丹皮^炒大黃^炒加ヘ用

五三 前^ノ後^ノ方

十七

ベシ

四七吐血スルコトアリ本味ニ丁子少加ヘテ用ユカキ茶ヲ
手ノ内ニヌリテカ、セヨ又子ブラスモヨシ但シカキ茶
ハ理中散奥ニヲ用ユ茶モ湯水モ吐及スニ理中散ヨシ白
湯ニテ少シツ、可用ナリ

四八産前向ヒ喉ノドヨリ血出イデニ夕痰タシキ血ノ時ハ本味ノ散茶ヲ
チカヤノ煎湯ニテ用ユベシ

齋按スルニ古来茅ヲチカヤトヨムニ依テ誤レリ茅ハ

ツバナ也血ヲ止ルノ効アリ故ニ茅根ノ煎湯可ナリ

四九血乱ミダレテ譫語セシゴシ齒ハヲカミ又惡寒發熱スルコトアリ本

味ニ芍薬小白朮小加ヘ用ユ其後香附子ヲ中加ヘ用ユベシ

五十嬢姪未満月或ハ四五月ニ腹中ニ子死シテ目口ヨリ

血出テ煩ワツラフコトアリ子死タル故ニ脉キル、ナリ案スルニ

古血ノシハサ也古血下シヲ用ヒテ其後早メノ加減シテ

産前後茶方

十八

用ユレハ死胎則下ルナリ仕覺アル故書記ス

五二胎内ニテ子死スル莫アリ其時ハ脉沉細ナル物ナリ

又左右脉切ル、フアリ又片ヨリテ死夕方バカリ切ル、

莫モアリ又母ノイキクサキ物ナリ本味ニ牡丹皮生良姜

ヲ加ヘテ用ユベシ子クサリテ下ル物ナリ又日本味ニ良

姜生炒ニ色ニシテ大延胡索中合テ酒ニテ三貼頻ニ用ヒ

ハ子ハフシクヨリ切レテ下ルグ又日死胎ニ雲母ヲ加ノ

又産室ニタキ蒸ヲ焚クベシ安産ニ云吉ナリ

五二息クサク舌黄ニノ脉沉細ナルハ死胎ナリ右ノ加減

可用子ハ一日ノ内ニ下ルモノク下リテ後ハ本味ヲ用

齋按スルニ華人ノ外候ハ息クサク舌青シト誌ス

五三母病テ子胎内ニ死タル如キフアリ本味ニ牡丹皮ヲ

加フ又手足ヲ出スフアリ其子イマタ生タルニハ関ノ一味

奥ニヲ水ニ化メ子ノ出シタル手足ニヌルベシ母ニモ吞
記ススベシ其子死タルニハ前ノ加減ヨシ又曰死胎ニテ手足
出シタル時ハ出シタル程キリトリ母ニカクシ袋ニ入レ
桑ノ木ヲ手一束ニ切テ剪ジ用ユベシ

五四子ヲ下シ其跡ニヤガテ留リタルハ産ノ時生レカヌ
ル物ナリ下シタル時ヨク古血ヲ下セバ不苦

五五子ヲリタル跡煩フハウミタル跡ヨリ大事ナリ本味
ノ内沉香倍牡丹皮生加へ用ユベシ腰痛ニハ延胡索少加
へ用ユベシ

五六母ヲリケツキ煩フニハ本味ニ牡丹皮炒加へ用ヘシ
不効ハ口傳ノ灸アリ母ノ臍ノ下一寸ヲ十五壯ホドヤク
ベシ後ヘツラバ前ノ寸ヲトリ龜ノ尾ニアテ上一寸ヲ右
ノ如クヤクベシ又灸所奥ニ記ス

五七足ノウラ腫レ煩フニハヌリ茶ニ本味ニ牡丹皮生加

産前産後方

七

粉ニノ水ニテトキヌル扱又本味ノ内芍薬川芎倍用ベシ

五八氣勞レ眠ルニハ本味ノ内人參川芎芍薬各引當飯沉

香倍酒ニテ少レ醉エフホド用ユベシ

五九妊婦心モナク五日モ十日モ眠ル子ム一日モワスル程ホト

寐ルフアリ氣勞ツカレ又惡血ノ故ナリ本味ノ人參ヲヨク炒

川芎芍薬ヲ減シ當飯沉香ヲ倍イシ用ル也氣勞レタル病人

ハ後ニ胸痛ムモノ也酒ヲ過スサスベカラス能程ニ与キホトフベシ

本味ニ遠志ヲ大ニ加ヘ用ユ右ノ加減前後同前ナリ

六十氣勞レタル者ハウカクトスル也ツノ時ニハ本味ニ

白茯苓ヲ加ヘ用ユ又曰心地クタビレ物イミシレ或ハ氣ヲ

トリ失フニハ遠志茯苓ヲ加フ

六一産前目ノ見ヘヌ者アリ本味ニ人參ヲ倍シ用ヒヨ

六二氣ヨクキ者ニハ前後トモ人參ヲ用ルフヲ忌ムナリ

又氣大過タイクハノ人ニモ本ヨリ忌ム是非用ヒテ不叶カテハ時ハ焙アツリテ

用ヒヨ大形ナラハ無用ニスベシ

六三 髮毛拔ル^テアリ本味ニ香附子ヲ加フベシ又日本味

ニ當飯五倍ニ加ヘ川芎ヲ減^シ用ユ

六四 ウス黒キ子バキ物ヲサイク吐ク^ハアリ本味ニ二色

ノ牡丹皮^{大々}加ヘ一二貼用ヒ其後右ノ牡丹皮ヲ去リ白

木^{中或ハ少}甘艸^少了子^少加ヘ可用

六五 寐ルト其^{ユメ}夢ヲ見ル^テ度々ニ及^ラブト云フ^テアリ

本味ニ遠志ヲ加ヘ用ヒヨ

六六 子乳^{チツチ}口ヲ離^ハレ煩^フニハ本味ニテ様子ヲ見不^レ治ハ本

味ノ内白朮甘草^倍粉茶ニメ砂糖ヲ酒ニ化^シ用ユ

六七 子乳口ヲ離^ハス時ハ必ス母ノキモヘ^シ食付^ツモノ也白朮

ノ末ヲ蜜ニナリ^ト無キ時ハ砂糖ヲ酒ニトキ用ヒヨ白朮

ハ惣ノキモニアタル物ヲ推^ラシ落^ラスモノナリ

六八 子キモヘ^{サカ}逆上^ルリ茶ヲモ何ヲモ不下事有^ルニハ白朮ヲ

末ノ一味酒ニテ用ユ白朮ノ沙汰スル已ニ前ニ謂ツ

六九子古血ニセカレテ胸ハモトへ上リ余不食スルニハ本味ノ

内人参色ツ焙川芎芍薬ヲ除キ當飯沉香大甘艸白朮如常ツ

陳皮香附子ヲ加ヘテ用ルツ

七十ヲ惡血ニテ熱氣アリ不食スルアリ本味ノ内飯尾大

ヲ用ヒ牡丹皮大白朮中合一貼用ヒソノ後本味ニ香附子

宿砂各小加ヘ用ユベシ

七十二孕胎ニテ月水如常見ルアリ必ス古血過タル女此

煩ヲスル也本味ニ生炒ニ色ノ牡丹皮大加ヘ人参ヲ減シ

古血下シテ大事ナシ必ス脉沉細也右二三貼用ヒテ不治

ハ血竭キ丸シ上ヲ紙ニテ張ハ白湯ニテ二三度モ用ユヘシ

不治ハムツカシキツ

七二母ノ乳チ瀉タノ如ク出ルアリ子死タルカ古血ニセカ

レタルカノニツナリ本味ノ内川芎芍薬大目引當飯沉香大

産科後集方

七三

甘草 倍 牡丹皮 炒 加へ用ユ 帶ヲイカニモ 緩クシテ 足ノ裏

ニ延胡索 牡丹皮 生ノリニ押ニセハリツケ養生スベシ又

曰氣勞レ腹中ノ子惡血ニセメラレテ乳口ヲ離シテ此煩

ヒラスルヲアリ本味ニ遠志 大々加へ甘草 小人参 用ル

子處タル見
ヤウ前ニ記マ

七三 子宮腫ルヲアリ本味計合シテ黒燒ニメ油ニテ付べ

シ内蒸ニハ古血下シ佳ナリ

七四 子宮出テサガルヲアリ三色ノ牡丹皮ヲ一ニ三ト合

コレ程ニ丸シ産門ニサスベシ本味ニモ加へ用ユ又産

門カハク時モ是ヲ用ヒヨ

七五 母無煩惣身ヨリ水ノ如クナル物出ルニハ本味ノ内

人参 沉香 倍 茅根ヲ加へ用ユベシ又曰此煩ハ其氣勞レ又

ハ古血下リカ子ル也本味ノ内人参 倍 當飯沉香 大ニシテ

ホウヅキノ根ヲ加へテイカ程モ用ヒヨ産前ニ廿日此日

モ古血下シテ用ヒテ可下イカヤウニ煩フ疴不苦

七六 コツホ子宮ヨリ白キ物イヅルニ本味ノ内當飯沉香 倍牡丹

皮ニ色ニノ加ヘ用ユベシ

七七 母ノ手ノ指サキ痛ミ煩フイアリ胎内ノ子脐ノ緒ヲ

首ニカケ煩フニ依テナリ本味ノ内白朮 倍用ヘシ大事ノ

煩也脉ハ沉細イカニモ茶ヲヤワラカニ使フベシ又曰指

サキ痛ニハ本味ニテ冰砂糖ヲトキ用ユ又砂糖ヲ本味ニ

等分ニシテ常ノ如ク煎シ用ユベシ

七八 胎内ノ子脐ノ緒ヲ首ニ巻テアル時ハ母必スカラエ

ツキスル者ナリ又十指ノ先キ痛ムモノナリカラエツキ

アル時ハ川芎ヲ除キ白朮ヲ倍シ用ルヅ

七九 月経止リテヨリ動クコナク次第ニ腹大ニ成テ子疴

血塊疴不知テアリ七八ヶ月ノ頃高キ処ノ物ヲ取テ見ル

ニ腹中痛ミ指サキ痛ム者ハ子ト可知又高キ処下ル時

ケツマツキテ手足ナヤミ有ルモ子也其時ハ三色ノ牡丹皮ヲ丸茶ニノ干姜ノ煎湯ヲ薄クシテ用ルニ胎内ノ子動^{クイナ}狂^{キヤウ}スル者也其時ハ本味ヲ直ニ可用右ノ茶ニテ動狂ナキハ血塊ナリ

八十血塊ヲ解クノ飯尾大牡丹皮大川芎中芍药小人参小白木少甘州少干姜延胡索加へ用ユ此方ニテ不解時ハ良姜生炒三色ノ牡丹皮大紅花中干姜中如此合ニ粉茶ニノ

薄茶一服ホドツ、本味ノ煎湯ニテ用ユ又丸茶ニノモ可用但シ散茶ノ時ハ干姜ヲ去ルベシ右ノ療治煎湯尤佳ナリ惣ジテユルクト養生スル時ハ酒ノ用ヒヤウ口傳アリ又曰牡丹皮二色ニノ本味ニ二分一加へ用ユ不治ハ又生ニテ用ユ此方口傳多シ

八一血塊下リタル時ハ本味ヲ黒燒ニノ用ユ但シ此茶ハカリニテ中々古血不可下右本味ニ大黃莪木紅花香附子

ヲ加ヘテ用ルツ咽渴ハ葛根ヲ加ヘ發熱アラハ柴胡ヲ加
フベシ唯脾胃ヲ補フコトヲ要トス

八二 石子ト云テ腹ニ子ホドノ物アリテ生コモノナラズ十
日廿日ニテモ生レケナク煩フコトアリ其見ヤウハ先脈ヲ
診ニ沉細ナリ其上胎内ニテ不動又アメリフトルコトモナ
ク母ハ子胎内ニアルヨリモ苦シムモノ也其時ハ本味計
六七服用ヒ脈ヲ診ニ右ノ芤ニテモ沉細ニシテ替ルコトナ

クハ本味ニ牡丹皮 大良香ヲ加ヘ用ユベシ腹ヲサクリ見
ルニイカニモ堅ク腹中冷ルモノ也又曰胎内ニテ手程ノ
塊アリ痛ミ手足腫氣微シアリ息大ニメ煩フニハ本味ニ
芍薬ヲ倍シ飯尾 大加ヘ用ユ又本味ニ三色ノ牡丹皮文黃
等分ニメタケクラベニ合シ甘酒ニテ用ユ常ノ酒モ佳ナリ
古血解ケ下テ後右本味ノ内飯尾ヲ去リ芍薬ヲ減シ用ユ
ベシ 前ノ血塊ノ
条可考

産前後集方

七七

八三 子宮コツボヨリ天目ホドノ物出ルイッアリ本味ノ内川芎芍

薬倍用ヒヨ出ル物ニハアイノ実ヲ水ニテトキヌルベシ

不治ハ牡丹皮生香附子加へ用ユベシ大事也

八四 サキ走リト云テ廿日ホモ子宮コツボヨリ白キ物出ルフ

アリ産ニ臨ミ生レカスル物也皆古血故ナリ右ノ薬ヲ用

ルニハフノリヲ水ニ立テ用ユベシ大事也又曰先本味ヲ

用ヒ見ルベシ子宮イヅルアラハ本味ノ内川芎芍薬大

帯ヲトカセ養生スベシ出ル物ニハ藍ノ実ヲ水ニ立テ塗

イカニモ温メ汗スベシ薬ヲ多ク用ユベシ古血ニ風ヲ引

タル故ナリコ湯ト云フ奥ニアリ子宮出ルフ共ニ考合

八五 十日十五日前ヨリ血下ルアリ不苦本味ニキリン

ケツヲ加へ齒ニアタラサル様ニ白湯ニテ用ユ血下リノ

可考合
八六 十日十五日前ヨリ渋リ水コホルフアリ不苦本味ニ

栢子仁ヲ加ヘフノリニテ可用

ハ七十日十五日前ヨリ破水ハスイ下ル者ハカラ子ニナリテ産

ノ時シブリ必ズ生レカ子ルモノ也奥ニ記ス難産ナシノフノ

リ蒸用ユベシ此内ニ丁子ヲ加ヘ可用サナケレハ虫ムシサシ

出ルモノ也口傳曰本味ヲ濁酒ノ水ノ不入ヲシボリテ如

何ニモカンアツクシテ用ユ第一ノ煩ナリ右ノ如ク血下フク

モアリ右ノ類カサニ三ツ程ホド下ル時ハ海羅フノリヲ茶一服ホド

用テヨシ但シフノリハ少シ塩ケアリテ多ク用レハ咽湯ノド

スモノ也細ニオロシ用ルゾ又一方本味ニ牡丹皮少紅花

少加ヘ其後右ノ加ゲンニノ又大黄等分ニ合シフノリヲ

酒ニ化クハメ用ベシ可秘々々

八八母外ノ夏タビナク度々タビ気ヲトリ失フオハ子母ノ喉ノドヘ手

ヲツキ入ルト知ルヘシ此時煎湯セシトウノ中ハ藍アイノ実末シテ

入ルベシ

八九 母ノ股ヨリ下ニ熱氣アリテ煩フハ古血故ナリ本味ノ内川芎ヲ倍用ルヅ其後當飯沉香倍牡丹皮炒加へ用べシ

九十 母月ヲ持コシ十五ヶ月十七ヶ月ナドニテモ不生ナリ其時ハ本味ニ早生ノ加減ノ用ユベレ後一記スサセル

一ナクハ療治ニ不及本味ヲ口くト用ヒヨ但シホフリノ加減スベシ産近ツカバ類ニ早メノ加減三分一加へ用ユヘシ又ホフリノ加減ハ青皮ヲ加フ但シ一ヶ月越ハ三分

一味加ニヶ月越ハ三分二加へ三ヶ月越ハ等分ニ加フベシ

九一 胎内ニ子アガクハ古血ニセカレテモダユルナリ本味牡丹皮炒三分一加へ用ユ

九二 胎内ニテ子啼モダユル莫アリ本味ノ内沉香甘艸倍用ユベシ

九三 胎動シ子啼クルフテ腹痛ニ身アツカイスルナリ不苦本味ヲ直ニ用ヒ其後三色ノ牡丹皮一二三ト〇ユレ

ホドニ丸シ本味ノ煎湯ヲ以テ用ユ又古血ニセカレテモ
ダユルヲアリ安胎散回春方ヲ用ユ母ノ身ヲ暖メ右ノ茶イ
カ程モ用ベシ又日胎動ニ青皮ヲ加フ

九四 母ノ喉ヘ子手ヲ出スニハ本味ニ藍ノ葉ヲ加ヘ温メ

酒ニテ用ユベシ

九五 産近付チカヅキキ重シヲモ掛ルト云フアリ食餅味曾汁何ニテモ
腹ハラ一パイ冷ハセ帯ヲヨキ加ゲンニメ子返リスルヲ見合セ

帯トクベシケ様ニセ子バ子自由シテ上ヘアガリ子返リ
シカ子ムツカシキナリトカク食ヲ過スシヨクト是ヲ重シカク
ルト云ナリ

九六 帯解カゲンニハ本味ノ内沉香大ニ用ユベシ

九七 産ニ臨グミニ三日或ハ四五日前ニ先血下ルヲフアリ先

本味バカリ用ベシ但タシ子生レカ子ハ本味ノ内當取沉香

大川芎芍薬大目用ルヅ

九八 後ノ物子ヨリ先ニ下ル夏アリ不苦又後ノ物二三日
前ニ下ル共本味バカリ用ユ若シ子生レカ子ハ本味ニ川
芎若菜減シ沉香少シマシ用ユ又後ノ物ニツレ大血走ル
フアリイカニモ本味ヲ和ラカニメ用ユ若シ血多ク下ラバ
キリン竭焼●紙ニ包ミ本味ノ内ヘ入レ用ユベシ血少ク
下ラバ本味バカリニテ和カニ養生スベシ又曰胞衣先ヘ
下ルニ田螺ノ黒焼三分本味ニ倍シ用ユベシ

九九 子宮先ヘ出ルニ棟ノ嫩芽ノカゲ干ヲ末ノニ日本味
ニ加ヘ酒ニテ用ユベシ

百 産前ニ産門ヨリ挽茶ノヤウナル物出ル時ハ子宮先
ヘ出ルト知ルベシ

百一 産前イケミ有テ度々産門ヲカユガルトキハ胞衣サ
キヘ出ルト知ルベシ

百二 産ニ向ヒ身持様ノ一側ヘヨリカ、ル事ナカレ胸腹

産前及後方

百二

イタムトテ仰クナカレ子返リセントテ痛ムモノナリ

百三 腹ツヨク痛ムコ不苦コレニテ返ルト知ルベシ必ズ

イケミナクシテ生ルナリ

百四 常ノイケミニテ返ル時ハセギリ胴ヨリ出ルナリ少

ヲヤミマハルト知ルベシ

百五 同イケミ有テ血度々下ル莫アリ子死スルト知ルベシ

百六 産ニ臨ミ小便出ルハ横産カ又ハ死胎ナリト心得ベシ

シ又水ヲ下スヲ止ガルモ死胎ゾ

百七 難産ニイケミ止タキ時ノ療治ハ水八升ヲ以テアツ

ク沸シ鍬ヲヨク焼キ右ノ湯ノ中へ入レグサくトニエタ

ツ時鍬ヲ取アゲ其湯ニテ足ノ曲リノ下ヲ洗ハセテヨシ

内茶ハ欵冬根五分常ノ如ク煎シソレニテ本味五貼用

ベシ

百八 ハシリノ後カイノ口ニヌル葉藍火ヨ水ニ立テヌル

産後葉方

三十三

ベシアイタ藍玉トアリ関ノ一味茶トモ云

百九産ニ臨イケムト不成ニハ其身ニ不カハラ抱本味ヲ用ユベ

シ又掛カケ茶ヲ少シ用ヒ横ヨコニ寝ササセ身ヲ温アタメ汗アセヲカ、セイ

ケミ立タタルヲ見合セ本味エ川芎クワンソウ大黃ダイオウ三分一入レソレニテ

子不ウツ動ハ早生ハヤメヲ可用掛カケ茶トハ海フノ蘿リ生粉ニシテ本味等分

加フ

百十産ニ臨ミ母ノ胸ウツヘ子コ上ノリ生レカヌルコトアリ其時ハ

母ノ胸ウツヲサスリ子ヲ下ヘサケテ本味ヲニニ服用ス

母ヲイカニモ温アタメテ本味ノ内ヘ早生ハヤメ茶ヲ加ク用ユベシ

トケバコカヘ子返ハスレレ氏生カヌル物ナリ帯オビヲトカバ食クナリ

氏用ヒサセテ帯オビヲトクベシヲモシヲカクルトハ此レ也

是第一ノ口傳ナリ

百十一産ニ臨ミ物ニ狂クヒ煩ワヅラフコトアリ先本味ノ内人參ニンジン用

五頂イタニ藍アイノ実ミ子宮コウボニモ塗スルベシ大事ナリ

子宮前症

三十四

百十二 産ニ臨コカヘリニ返コカヘリシカ子バ本味ニ牡丹皮大黃心加へ用
ヒ無効ハフノリヲ本味ニ入レ母ノ帯ヲ強ツヨククサセ内ノ子
身ヲツメサスベシ子返コカヘリシタキ時ハ子宮コツホヨリ白キ物出ル
母ノ腰痛コイムナラハ帯ヲトキ生ウキスベシ生レカ子ハ大黃大
ニ加へ用ヒヨ

百十三 子宮フサガリテ生ウキレカヌルニハ本味ニ牡丹皮生加
用ニ古血下ルベシ不苦又日本味ニ牡丹皮イリ香色ニ炒イリ加へ

末ノ紙ニ包ツミ丸ノ上ヲツバキニテスラシテ子宮コツホヘサス
ベシ

百十四 子宮不開ヒラカ子頭カシラヲ出シ生ウキレカヌルニハ本味ニ大黃少シ
加ヘタテカケテ用ユベシ扱ツツホ又子宮ニハ牡丹皮生ト炒ト
延胡索ト三色等分末メ粘ネリニラシ合セサスベシ又女ノ足
ノ裏ウラニツクベシ

百十五 母ノ股モヘ子足アシヲ入レ生レカヌルニハコレヲ立子トイフアイノミ藍実アヲヲ又

産前症

三十五

リ本味ノ内人參焙川芎白朮二味當歸沉香大目用ユベシ

大夏ノ煩ワツラヒナリ産キハニ股モイタミ子返コカヘリシカ子ハ右ノ煩

ト介別シテ帶ヲビヲツヨクシメテ子ニ身ヲツメサセ其後シ

キリアラハ早生ハヤシノ加減シ可用

百六産ニ臨シ小腹痛張リテ子返コカヘリシカヌルハ古血モ能キ血

モ皆下へ下テ血ニセカレタル故ナリ其時ハ本味ノ川芎

芍薬倍香附子少加へ二三服用ヒ後ニ本味ノ内當歸沉香

大牡丹皮生加へ用テ古血ヲ可下無効ハ牡丹皮生粘ニ押

一ゼテ子宮へサスベシ口傳

百十七産ニ向カヒ産門ニ藍アイノ実トキ塗ヌルベシイカヤウノ難産

ニテモ不破スレシテ生ル、也

百十八産ニ向カヒ腹下リフルフニ鳥カラスノ卵タマゴヲ黒焼ニメ二日本

味ニ加へ酒ニテ用ユベシ

百十九産ニ向カヒ夢ユメノ如ク驚オドロクキヲソル、如クナルニハ本味

ニ遠志ヲ加ヘ白湯ニテ用ユベシ

齋按スルニ此症極虚ノシルシ也遠志ノ加ニテ及ブベ

キニアラズ大劑ノ獨參湯ヲ可用

百北産ニ向ヒ大ニ振フコアリ本味ニ栝子仁桔梗ヲ加ヘ

ヨキ酒ニテ用ユベシ又曰本味ニ人參ヲ倍ス

齋按スルニ此症此方ヲ用ヒテ若不治ハ療治ヲクレテ

危シ只初ヨリ獨參湯ヲ用ルニシクハナシ

百北一産前ニ目ノ上重クイキ早ク汗シミくと出フルヒ有

大事ナリ本味ニ遠志桔梗挑仁右三味加ヘ用ルヲ

齋按スルニヤカテケ様ナル症ニ至テ此方ノ如キユル

キ棊ニテハ決シテ救ヒガタシ大劑ノ獨參湯ヲタテカ

ケク用ユベシ

百北二産ニ向ヒ腰起サル時ハ鷓鴣ノ黒焼ヲ本味ニ加ヘ白

湯ニテ用ユベシ

産前

三十七

百九三 産ニ向ヒ喉ヨリ血出又痰血ノ時ハ本味ヲチカヤノ煎湯ニテ可用チカヤハ茅根ノ煎湯ヲ用ユルヲ前ニアリ

百九四 産ニ向ヒ咳血アル片ハ本味ニ鹿角ヲ加ヘ白湯ニテ用ユベシ

齋按スルニ咳血等産前ニ發セバ治療ヲ加フベシ已ニ産ニ向ヒ發スル者ハ是ニカ、ハラズ先安ク産セシトモヲ奪一ニ意得ベシ産後イカヤウニモナルコトナリ

百九五 産ニ向ヒ喉ヨリ血出ル時ハ本味ニ丁子杏仁ヲ加ヘ白湯ニテ用ユベシ

百九六 産ニ向ヒ産門交骨不閉トキノ吹茶ノ夏甘松石灰蕎麥ノ花ククロヤキ右等分ソバヲラノアクニテトキ管ニテカウモンニ可吹入

百九七 早生茶ニハ香白芷一目 百艸霜五分 右海草湯ニテタテ、天目八分 程用ユ無効ハ牡丹皮生炒二色粘ニ押マセ

手ノ内足ノ裏ニ付ベシツレニテモ驗シナクハ●是ホト
ニ丸ジ子宮ヘサスベシ又日本味ノ内芍薬去リ紅花大加
ヘ同秘薬ヲ加ヘテヨシ秘薬トハ熊ノ胆ヲ鮫ニテ摺粉ニ
シテ加ル難産逆産死胎何レモ生レカヌルニ秘薬大紅花
大ニ加フルゾ又曰本味ニ桂心香附子換柳括呂根 各一各
大黃五分 加ヘ用ユ又鹿茸ヲ黒燒ニメ白湯ニテ用ユ又方
本味ニ川芎ヲ倍シ大黃等分ニメフノリニ化メ用ユベレ

大黃 延胡索 鼠糞

右三色等分本味ニ等分ニ加ヘ用ユベシ

齋按スルニ此催生薬ヲ用ント思ハ、先産婦ノ息ツカ
ヒ顔色ニ心ヲ付脉ヲ診察ノ用ユベシ若元来ヨハメナ
ル婦人カ或ハ又ツヨメナル婦人ナリハ三五日モ腹痛
食モスクナク其間トリアゲ婆々度々取立氣體ツカレ

百廿八催生薬方 常ノ催生方ヲ用ヒテモ生レ
カヌル者ニコノ薬ヲ用ユヘシ

產前發熱方

テイヨク生レ兼ル者ニハ決シテ不可用其時ハ必ス独
參湯ヲ用サレバ生カヌル者ナリ如此疲レタル産婦ハ
タトヒ此催生茶ニテ一旦効ヲ取ル所立ドコロニ歟ス
ルナリ能ク意得ベレ何程ツヨク腹イタハ所時到ラサ
レバ産ハナキト知ルベシ頓テ可生ヲ知ルハ脈ニテ
可知ツノ脈ハ三部所浮数ニカアラリ或ハ婦人ノ常脈
ニヨリ左ナキモアレ何分カハアルナリ又左右ノ中

指ノ末ノ横紋ノ所ヲ輕ク押テ見ルニ必ス動脈アリ是
モ手ノ脈浮サル者ハ輕ク按テハ不知其時ハ漸々ニ重
ク按テミルベシ凡浮タル脈ヲ始ヨリ重ク按ハ又不知
モノ也此脈出レハ早速生ルト知ベシソクテモ四
時メニハ必生ル也若此脈出テ一日モ不生ハ其症ニ
隨ヒ独參湯或ハ催生茶ヲ可用其出サル内ハソヨク腹
痛ス所此方ヨリサソヒ生サセントスル莫辭酌スベシ

此脈ノ夏ハ方書ニモヘテ予数多ノ産婦ヲ試ルニ必ス
シルシアリ

百九 産ニ臨ミ呵欠レキ去押立テモ不生頻リニ腹痛煩フ

氏脈大ニメ手ノ内冷ヘ足ノウラ温カナラハ不苦ツ本

味ヲ用ヒ帯ヲトキタラハ又サセ扱頻リニ生ミタハ早

生葉ヲ用ユベシ

百三 産ニ臨ミコ湯トモフ物下ルヲアリ其下リタルホド

フノリヲ用ヒ早生ヲ与フベシ又日本味ノ粉葉フノリ一
倍入レテシルクトキ用ユベシ

百二 産ヲタモタスル一持コレタキ時ニハ本味ニ沉香當

飯ヲ倍シ用ユベシ

百二 双子ニテ子宮ニ向ヒ生レカヌルニハ本味ニ牡丹皮

生加ヘ用ヒ扱子ヲニツニ分ケテ母ノ腹ヲサスリ右ニア

ル子ヲハ胸本ヘサスリ上ケ帯ヲサセ早生ヲ用ユベシ一

人生レタラバ其後又本味ヲ用ヒ母ノ氣色ヲシテ何ナリ
氏望ノ食ヲ食ハセ又帶ヲトキ又早生ヲ用ユベシ又曰血
レバリヲ用ルニ依テ子抱合テ生レザルコトアリ其トキハ
古血下シテ用ヒテ右ノ如ク生スナリ何時モ此心得尤也
但シ前ニ本味ヲ用ヒテ母ノ元氣ヲウクラフベシ若子死
タルハ夫々ニ加減アリ右本味ハ當服ヲ倍シ可用
カシガ
フベシ

百葉三 逆子攪子ノ夏手足出ルコトアリ其時ハ関ノ一味ヲス
ル湯ニテ化ノ塗リ難産ノ加減後ニ記スセキ一味葉ヲシ
テ用ユ又手足ノ不入ニハ血竭ヲ用ユ又葶麻子ヲスリ甘
艸少加ヘ七推又百會ニ可貼口傳ニシテ可付手足ヲ出シ五
日十日モ不苦本味ノ内川芎芍薬ヲ減服沉ヲ倍早メ加減
シテ用レハ子ハ死シテ生ル事アリ
百葉四 子足ヲ出シ生レ兼ルニハ藍、実ヲ水ニタテ出シタ

ル所ニスリ母ノ帯ヲトキ本味ノ内芍薬川芎倍用ユベシ

百鬼五同片足カクヲ出ス時ハ母ヲ横ヨコニ寐子サセイゲミヲ止メテ

子ノ足ノウラニ握ニキリ薬ヲ付ニギリ部部松葉ニテシカク

サセハ足ヲ引ナリ尻高ニメ一時ハカリモヲキ腰湯ヲサ

セ催ハヤ生マヲ用ヒ如常生スベシ若子死タル時ハ少サリ薬ヲ

以テ療治ズ薬方死胎ノ条ニ出

百鬼六同内薬ノ一本味ニ桂心爵金雲母右三味ヲ加ヘ酒ニ

テ用此内薬ト云ハ死胎ノトキノカゲンナリ

百鬼七逆子腰ヨリ下出ル時ハ向ニ繩ナハヲ付前ハ踏フムハラセ中

腰ヲ折フリツケ前ニトリアゲバノ功者ナルヲ居ワヘ療治スベ

シツレニテモ不生サル時ハ二三度モハワセテテヨシ其時ハ

子ヲ緒ヲニ包ツミ母ノ両手ヲ向カフヨリ取トルテ頭カヲ上ゲサセハツ這

スルナリサレ氏不生トキハ腐薬ヲ用テ療治ス右ノ如ク

スベシ

百八 横産序 手出ス時ハ仰ケニ寝サセテ右ノ如ク可療治
又子死シタルト知ル時ハ腐葉ヲ以テ療治スベシトカク
温ニノヨシ又手ヲ平ニ出ス時ハムツカシ、其時ハ母ノ
元氣ヲトリ立緩々ト心ヲ持セ帶ヲカケイケニ止メイ
ク度モ上ヘサスリ上ルヤウニシテ手ヲ引トキハ横切ニ
帶ヲカタクシテ尻高ニ寐サセ一日一夜バカリ間ヲキ
又取立テ常ノ産ノ如クニシテ生スベシ

百九 同両手ヲ出ス時ハ母ヲ仰ケニ寐サセ左ノ足ヲ上ヘ
上知何ニテモツカユヲ置付ケ葉右ノ如クシテ出タルキ
ヲ縮ニ包ミユルヤカニシテ一時モヲキ母ヲ起シ仰ノキ
スグル程ニシテ熱湯ニテ横切ヨリ下ヲ洗ヒ腹ヲビヲカ
ケ生スルナリ若不生時ハ又仰ケニシテ縮ヲトキ胸ヘサ
スリ上ルヤウニシテ吐葉ヲ用レハ胸ヘセリ上ルナリ其
時横切ニ帶ヲ堅クシテ又水落ニモ帶ヲ堅クシテ催生葉

産前産後

四十四

ヲ用ヒ汗ノ出ル程シキリアル時取立下ノ帯ヲトキ常ノ如ク生スルナリ

百四 同右吐藜ノ方川芎酢ニテ用ヒ又伏竜肝ヲ吞汁ノリヲヨク煮テ酒ヲ少シ加ヘテ天目ニ一ツ用ユベシ

百四二 同内葉ノ夏木味ニカツレイ草口傳後箱根州桃仁右三色加ヘ用ユベシ

齋按スルニ横産逆生固有ノ理ナシ是ニナ医者トリア

ゲバノ下手ヨリ起ルト知ルベシナセナレバ医者ト
リ上ババモ産婦ノ腹サヘ痛メバミナ早生葉ヲ用ユル
モノト意得シキリニ用之或ハ未子返リモセザルニ急
ニ取立イキツマセ時モ到ラヌニ無理ニ生スル故ニ多
ハ横生逆生トナルナリ元來催生葉ハ難産ノ為ニシテ
平産ニ用ユル物ニハ非ズ五七日モ痛生レカヌルモノ
ニハ巴ヲ用ユズシテ用ユルモノト意得ベシ

百四三 子生レカヌルモ血上リテ下ニ血ナキ故ナリ本味ニ
當取沉香ヲ倍シ川芎芍薬ヲ減シ用ユ此時ハ脉沉細ナリ
百四三 産ギハニ悪キ薬ヲ服スルニヨリテ破水モハシラズ
腹コトノ外大キク成テ子不生フアリ古血下シノ内ニ早
メ薬ヲ少シ加ヘテ用ヒ生レキ付ク其時帯ヲ胸本へ上ケ
サセ次第ノ推シ下テ生ギハニ帯ヲトキ則生スル也
右ノ薬ノ内ニホツリ薬ヲ加フベシ本味ハカリ用ヒ其後

如此スルゾ

百四四 子返リシテ生レズハ弓ノ弦ヲハツシテ母ノシラザ
ルヤウニ腰帯ニサセテ産シテ後トクベシ

百四五 雑産ノ加減ト云ハ本味ニ延胡索ヲ加ヘ用ユルゾ但
所ニヨリ大中ニ口傳アリ又右ノ加減ノ内ニ炒牡丹皮ヲ
加ヘ馬鞭艸ノ葉カゲ于ニシテ一各五分煎湯ニシテ右ノ
散薬ヲ用ユルゾ甚妙ナリ

産前産後方

百十六

百四六 破水^{ハス}皆下^スリアトカワキ不生^{ナシ}難産^{ナシ}セハ香白芷^{カク}一各百

艸霜^ス五分 各末^スノフノリヲ白湯ニ化^カノ用ユルゾ此ヲ催生^{サイセイ}

散^{サン}ト号^{カウ}ス此時氣血衰^{オトロ}ヘ或ハ氣力^{キリカ}少^スク不食^ケシ症ニ向腹^{オウヘ}ノ

加^カラ少^スク子生^{ウマ}レカ子ハ黒神散ヲ用ベシイカ様ノ難産ニ

テモ三貼ニ不^ハ越^ハ生^クル、ツ早^{ハヤ}メニモヨシタメシノ方也

黒神散方 當^ト版^ハ 地黄^ニ 桂心^各 赤芍^中 人參^小 蒲黃^中

干姜^中 黑豆^分 甘草^少 右如常煎服腹一盃ニナル程^{ホト}タテ

カケテ用ユベシ

百四七 古血ニセカレテ子生^{ウマ}レカ子ハ生牡丹皮^ニ 大黃^ニ 本味^ニ

三分一^ニ加^ヘ用ユベシ又肉桂^ニ 紅花^各 大^ニ 飯尾^中 栴^子 柳^子 小^右

煎服ス是ヲ催生湯^{サイセイトウ}ト名ツク

百四八 胞衣^デ不下^ストキ難産^{ナシ}ノ加減^ニシテフノリヲ化^カシテ用但

シ天目^ニ 一盃^ホトソ

百四九 後物^ノ不下^スト内熱^{ナイ}シテツカユルナリ不下^ストテ股^モニ結^コ

付ルツケトア惡シ若モシ結ナ付ツケテ堅カタミリタル時ハ湯ニ入ヤハラカニ
内へ入ルナリ其當坐タツサナラバ其俛内へ可入扱本味ニ延胡
索大大黃三分加へ下スへシ大黃ニサマサレテ必ス下ル
ナリ後ノ物ヲ必ス結付ルカ勿レ又本味ニ牡丹皮生延胡
索ヲ加へテ下スモ佳カナリ必ス下ルナリ又久シク不下下
アリ右ノ方ニテ可下但シ十日及不下トキハ本味ニ良姜
牡丹皮ヲ加へテ切テ落スベシ但シ三五日ノ間ハ本味バ

カリニテヨシ又米ノ粉鍋ニ入塩少水少加へ手拭ニ包ミ
腰ノ廻リヲ可温アタム

百五十 後ノ物不滞ヤウノ加減ハ催生ハヤメノ薬ニ延胡索牡丹皮
ヲ加へテ用ユレハヲノヅカラ胞衣エナハ下ル也

百五二 後産アト子宮コツボニ入ルツアリ其時ハ必ズ母コトノ外ヘ放ヒ疵
スルモノナリ難産ノ加減ニ青皮少加へテ用ユベシ又足
ノ裏ウラニ付茶アリ同シクハ不付ガヨシ口傳ナリ又延胡索

生牡丹皮 香色ニ炒 五名本味ニ加ヘ必ズ下ルヅ 難産ノカゲン并ニ付葉葉方

部ニアリ

百五三 後産腹中ニアル時ハ脉沉細ナル者ナリ又下リテ後

ハ脉浮大ナル者ナリ五六日前ニ子生レ又一人腹ニ子ノ

残ルヲアリ其時ハ脉ウチ切レテ夕へ又ウツ時ハ如何ニ

ニモ大ニ少シフル心アリ夕トヒ後ノ物ト見付ケタリト

毛難産ノ加減シテ用ユベシ必ズ子残リ居ルヲ有モノ也

百五三后産不下ニ用ル葉方

榆白皮 香附子 芍薬 桂心 牛膝 右本味ニ加ヘヨ

又方 桂心 生地黄 各 当収 芍薬 黑豆 各中 香附子 小

甘草 少 又

牛膝湯 紅花 桔梗 各 瞿麥 各 牛膝 桂心 牡丹皮 各中

右七味 又

秘方 牛房子 イワシノ焼頭 甘草 右三味等分粉ニシ

産前後

明者^少加へテ酒ニテ用ユ妙ナリ

又胞衣不下時ノ薬本味ニ延胡索一分 鼠糞^{五厘} 大黄^{二分}

右三味ヲ加へ可用

齋按スルニ胞衣久シク下リガレハ古血胞中ニ入フク

レテイヨク不下却テ上心ヲ衝キ危キニ至ル其時如此

緩キ薬ニテハ救ヒカガタシ花菱石一味細末シテ四五

分牛膝葉ノシホリ汁ニテ用ベン葉ナキ時ハ根ヲ搗キ

生汁ヲ取用ユ花菱石ハ薬舗ニモ沢山ニナキ者ユハ急

ニハ求ガタシ産科医者ハ常ニ吟味シテ調置ベシ其石

理微粗微黄色ニテ點々ト白花形アリ觀美ナルモノ也

正真稀シ吟味シテ買ベシ此方ハ元本艸綱目ニ出テ予

カ家ノ經驗ナリ但シ其用ヒヤウ本艸ト異ナリ又本艸

ノ説ノ如ク制ヲ用ヒズ其マ、打碎細研シ用ユ

産前後

五

産後

攝陽 戸田齋 刪補

一 産後ハ脉浮滑ニシテヨシ又ハ沉細モヨシ大キクヒ
 ツハリシフリ早キハ悪シ夫レ婦人産シ畢テ即チ振茶ヲ
 奥ノ茶方用ヒテ物ニヨリカ、ラセ足ヲ少シ屈メ少シツ
 ノ中ニアリ 睡ラセ多ク子ムラセズ酢ヲハナニヌリ振茶ニ童便少シ

ツ、加^{ソウ}ヘテ用ユル也扱又手ヲ以テ胸^{ムネ}ヲソロクトサスリ
サスリ古^{フルチ}血不^{ガルトニラ}滞ヤウニ如此スルヲ三日ナリ目^メイ血上
ルヲナシ類^キリニ白粥^{シラカ}ヲ少^カシツ、用ユベシ三日^ス過^キテ後
ニ味噌汁ノ類少^シシツ、用ユベシ魚鳥ノ類ハ一ヶ月ノ後
ニ食スベシ多^ク言スベカラス喜^キ怒^ド憂^ウ悲^ヒ恐^ウ驚^キヲ慎^ツムベシ
若^モ又氣血^{キキョウ}ヨハキ人百日ノ内慢^{シタリ}ニ不養生ノ手足腰腿如^{カク}
痛^ム病^ヲ褥^ヲ勞^ト云^フ最^モ難^カ治^シ症^也也産後諸病ハ凡^ソテ大ニ

氣血ヲ補フベシ

後ノ物不^{サル}下^リ前部ノ末^スニ記ス^{本書ノ}

二 産後血ヲシヅムル茶ハ本味バカリ用ルガヨシ其時
ハ帶^ヲヲモ緩^クトサセ帶ノ内ニ手ノ甲^{カウ}ノ自由^{シユウ}ニ入ル程^{ホド}ニ
シテ養生スベシ

三 産後ニ炭火ニヨキ酢^スヲカケテ母ニ嗅^{カニ}ヒヨ血暈^{ケウ}ニ

ヨシ

四 アトハラ痛ムニハ本味ニ延胡索三分牡丹皮二色ニ

加ヘ用エベシニナ古血ユヘナリ不不治ハ敏尾大牡丹皮中

良姜中芍薬小丁子小右如此用エベシ但シ軽キ者ハ本味

ニ牡丹皮ヲ加ヘテ可治又曰莪朮ヲ加フ

五 半産ノ後本産ノ時ノ如ク大ニ腹ヲ痛ムフアリ本味

ニ沉香倍牡丹皮生良姜ヲ加ヘ用ヒヨ又大ヒニ腰腰ヲ痛ム

古アリ本味ニ延胡索ヲ少シ加ヘ用ヒヨ又曰ニニ三ヶ解ニ

テクダシタル跡ハ大産ヨリ重シ本味ヲ直ニ用ユ其々、
香ノ粉薬奥ノ方ノヲ少シツ、度々用エベシ

齋按ズルニ半産本産ノ後ノ腹痛下大ニ痛ムモノハ

右ノ薬ヲ用テ可ナリ或ハ脐上ヨリ上痛ム者ハ多クハ寒

暑ニアタリ食滞ルニ因テナリ其時ハ右ノ薬ハ不宜

平胃散ノ類ヲ加減シテ可用又脐下ノ痛ミモ少ノハ

思慮ヲ不加シテ可ナリ痰血ノ下ル度トニ少シツハ

痛ムモノ也而ルニ猥リニ此方ニヨリ破血ノ薬ヲ用ヒ
テ急ニ古血ヲ下スハ悪シ瘀血コトぐク下レハ痛モ自
然ニ止ト知ルベシ

六 本産半産トモニ大ニムツカシキ時湧泉足ノウニ灸
スベシ息絶タルモ温リ有之ハ成程大ニシテ灸スベシ心
持ヨク氣付タリ凡脉出スハ曲池左右ノヒヂニ灸ニ壯ツ
スベシ

齋按スルニ産後シバク昏暈シ己ニ死セントスル者一
概ニ極虚ノミニ非ズ或ハトリ上ケハ、無功ニテ帯ア
マリ緩スギテ目ヲマハスモアリ然レモ是ハ希ニアル
コナリ凡ツ帯ハ緩スギルモ悪ク又シメ過タルモ悪シ
是ハトリ上ケバ、ノ所為ナレ凡医モ亦可心得コナリ
但シ始ヨリ帯セザル婦人ハ此例ニアラズ

七 産後ノ氣付ケニ牛黄田蘘香田用ユベカラズ死スル

ナリ本味ノ内人參ヲ倍シ用ユルヅ但シ強ク血上ル時ハ
人參川芎一各ツ、増ス餘リ上ラバ人參ヲ減シ本味ツノ
一、用ユヘシ

八子ヲ生ウ古血上リ血狂スルニハ本味ノ内當歸沉香
倍シ陳皮香附子加ヘ用ヒ酒ヲ過スサセ帶ヲ緩ユル々トシテ枕
ヲ能キコロニサセ養生スベシ何ト狂ク凡不苦クシカ又曰ウハ血
上リテ俄ニ物ニ狂フニハ四物湯ニ香陳皮荆芥ヲ加フ

又曰血上リ狂ニ犀角荆芥川芎人參沢蘭本味ニ加ヘ上戸
ハ粉コニメ酒ニテ用ユ又曰血上リ狂フニ本味ニ犀角荆芥
百草沢蘭ヲ加ヘ用ユ人參川芎加減アルヅ

九 大ニ血ハレルニハ本味ノ内川芎芍藥倍ニ三服用ユ
ベシ若無効ハ牡丹皮妙加ヘ惡血ヲ下スベシツレニテモ
不止ハ騏驎キリシ竭焼 ●紙ニ包ミ本味ノ内へ入レ用ユヘシ十
日廿日古血下ル凡不苦但シ廿日三十日モ下ル時キリシ

ケツヲ加フ又チヨウシノ^ツヨリ水ヲツク如ク多ク下ル
 時ハキリンケツ生ニテ本味ニ三分一^加テ用ル^ツ此三
 分一ハ本味ノ三分一ノ又三分一ナリ血キツク止ル時
 ハ^{ツラ}煩フ^{キリニケツ}アリ血竭ヲ用ル^ツ大事ナリ又曰本産半産後^氏
 ニ大ニ血下リスルトキハ本味ニ白茶^{茶方ノ部ニ有}ヲ加ヘキリ
 シケツヲ紙ニ包丸シ右ニ色白湯ニテ用ユ但シニ包三包
 ニハ^{スキ}不過又曰大血下リ面青ク身フルイ氣^ケツクニ荊芥當

散^各大地黄^大黑豆^中人参^少甘草^少煎^レ用ユヘシ

十 本産半産後^氏物^狂ハシキ時本味ニ黑神散ヲ加ヘ^黒

散^ハ茶^方ノ部ニ出^酒ニテ用ユ産前コノ症アルモ同シ^ナリ

十一 血乱^レテ惡寒發熱スルニハ本味ノ内當^散芍薬ヲ倍

シ人参減シ炒用ユ又関ノ額^{ヒタイ}塗茶ヲヒタイノ上ニヌルベシ

又関ノ一味茶ヲ用ユルモ可ナリ口傳ニスベシ血乱^レテ

物ニ^狂フニハ香ノ粉茶ハカリヲ酒ニテ可用サテ関ノ額

塗蒸ヲヌレ塗リ様ハヒタイノ真中ニ錢ノ輪ホドニウ
スノリニテ付ルナリ

十二 血止リ過テ熱氣サシ又氣ノ違タガアリ不苦本味ノ甘

艸倍 陳皮香附子 大加へ用ユヘシ

十三 産後熱氣ヲ煩ワヅラフニハ本味ノ芍薬 大甘艸 倍香附子ヲ

加へ用ユ又大熱或ハ疫病瘡ヲ煩ワヅラフ有レ陳皮香附子ヲ

本味ニ一各加へテ用ユヘシ口傳ニ夏ハ風引リヲハキ

物ヲ陳皮香附子加へ用ユベシ又ハ温氣ノ強クレハ右

ノニ色ヲ不ハナ放ナ加フルガヨキナリ

十四 産後目メイニハ本味ニ伏龍肝 三分明荅 一分加へ水

ニテ用ユベシ

十五 目旋リ氣違タガフ夏アリ本味ニ當歸沉香 各倍干姜 大加

用ヒヨ

十六 目旋カリ人ヲ不見知ラアリ関ノ一味薬ヲヌル湯ニ化

シテ額ニ塗ル又少ツ、本味ノ間ニ用ユ其後本味當飯甘
草ヲ倍シ用ユ又方當飯沉香ヲ倍シ用ヒ間々ニ香ノ粉茶
ヲ少ツ、白湯ニテ用ユヘシ

十七 脉大ニテ汗アリ手ノ内暖ナルハ何程狂氣スル凡不
苦ツノ時ハ本味ニ香附子大加ヘ可用

十八 産後ツリケ付アリ古血有テツル者アリ本味ニ牡
丹皮青皮ヲ加ヘ用ユ又曰反張ニハ本味ニテ姜中加ヘ牡

丹皮小加ヘ用ユベシ但ノツケニツリ茶ニテ治セズハ灸

所アリ某方ノ奥ニ有又曰牡丹皮炒リ過シテ本味ニ六倍加

ヘ用イヨ又曰反張ニ荆芥ヲ用ユ是秘事ナリ氣カスクナ

ク不言齒ヲ食ツモイハノ或ハ反張ニ荆芥湯ヲ用ユ

齋按スルニ此症方書ニ産後ノ瘧ト云又反張風ト云テ

大事ノ病ナリ強チアチカニ古血ノミニ飯スベカラス古方大

豆子湯或ハ參附湯ナドヲ用ユ可考

荊芥ハ産後ノ要薬 并 金瘡破傷風角弓反張口噤手足瘳
血暈衝心不知人事者ニ齒ヲ押シ開キ荊芥炒末シテ酒
ニテ服ス或ハ童便ヲ以テ灌グ其効如神古人皆稱之或
曰愈風散曰如聖散曰再生散曰舉鄉古拜散荊ハ拳鄉切
芥ハ古拜切
等数号アリ

十九 産後ニフルウ事アリ少モ不苦本味ヲ温メ酒ニテ可
用口傳曰物狂ハシク振フニハ酒ヲ可過本味川芎人參一

各倍シ用ユベシ

二十 胸噪シテ氣上リ胸焦ニハ本味ニ遠志大 麥門冬小 加

用ユベシ

二十一 眩暈シテ振イツキ齒ヲ喰シメ發熱スルニハ極意口
上ノ一味バカリヲ可用ナリ

二十二 頭痛煩フ夏アリ本味ニ川芎芍薬ヲマシテ三服ホド
用ヒ三洗芎ヲ
倍スルアリ 其後當飯沉香ヲ増シテ牡丹皮ヲ炒加ヘ古

産前産後

五十九

血ヲ下スナリ何様ニ痛ム凡右ノ加減ガヨキゾ又曰前後
凡本味ニ香附子ヲ加フ又曰冷テ頭痛セハ柴胡黄芩麥門
冬ヲ加フ又熱出バ干姜ヲ加フベシ

二十三 頭痛血ノ道氣ニハ蜀漆ノワカメ 旃檀ノワカメ茶ノ
ワカメ右三色末ニシテ本味一劑ニ拾ニ各加ヘ美酒ニテ
用ユ一劑トハ百六十目ナリ

齋按スルニ目マフハ眩暈ナリ血道ハ血暈ナリ旃檀ハ

棟ナリ

二十四 産後ニ子宮イヅル夏アリ其時ハ独活ノ皮ヲ和カニ
シテ吹キヒシギ蒸テ温ノ絹ニ包ミ子宮ニアテ母ノ尻ニ
物ヲカヒ上テ仰ケニ寐セテ足ニテフロクト踏入ルナリ
但シ帯ヲ解クベシ独活ノ皮冷タラハ又温メ右ノ如クス
ベシ内茶ヲ用ヒテ氣ヲ取失ハヌヤウニスベシ大事ナリ
内茶ニハ本味ノ内人參焙リ川芎芍薬 倍 當皈沉香 大目 延

胡索 大陳皮香附子加へ用ユベシ又曰口上ノ一味卵ノ白
 ミニ和^{クワ}シテツケ独活^{ウド}ノ根ノ皮タ、キヒシキヨノ者ノ足
 ニテ息合^{イキアヒ}ヲ見テ踏^{フミ}込ムベシ冷^{ヒヤ}タルハアシ、又干菜^{ホシナ}モヨ
 シ又曰ウドノ皮ヲ煎シ腰湯サセテ藍^{アイ}ノ実ヲ塗^ヌリ押入^{オシ}ル
 モヨシ腰ニモヌルズ又十四ノ推^スニハリ蒸^スアリ同クハ不^ズ
 張^カカヨシロ傳^ワアリ
 齋^カ按スルニ此一症^{カラ}華土ノ方^ホ書ニ陰^イ脱^トト云者ニシテサ

一、テ重キコニハアラス療治ノシカタ悪^アキニ因^ヨテ大事
 ニ至ラシム也凡産後頭少シ下ルタモ大^キ忌^ム然ルニ
 仰^{オホ}ケニ卧^フセフノ上後高^シニシテ頭ヲ下サスレバ^イ味^ミ收^メノ
 血^ク氣^キ散^{サン}換^{カン}逆^{ギャク}上^{ジョウ}シテ必^{ヒツ}危^キニ至ルナリ其独活^{ウド}ノ皮^カヲ温^ユ
 外ヨリ押入ル夏モ悪キニハアラ子^シ氏^シ元来産ノ時氣力
 ヲモミ大ニ疲^{ツカ}レテ陰脱スルガ故ニ服蒸サセテ元氣ヲ
 補^ホハザレバ外ヨリイカヤウニシテモ入ルコナシサア

レハ外ヨリウドノ皮ヲ以テ温メ入ル氏仰ケニ寐サセ
ズ物ニヨリカ、ラセ居温入レ服茶ヲ専用ニスヘシ此
症ノ服茶古方當飯黃芪散 當飯散 十全大補湯 加
味道遙散 飯脾湯ノ類ヲ其見症ニ随フテ用ルヲアレ
氏予ガ家法大抵補中益氣湯ヲ通用シテ其量一服二三
錢ヨリ五六錢ニ至リ人參本方ニ准シ今用ル所ノ量ニ
随ヒ用ヒテ可ナリ又古方ニモ外ヨリ温ルノ方種々有

或頂心ニ菟麻子ヲ押レツフニ塗リ上ヘ引上ルヲモテ
リ考ヘ用ユヘシ

二十五産後ニ玉門返出タルニ内茶コレ大事也下焦ニ血多
キ故開キ出ル也血ヲ上ヘノボセ頻行スル心持ノ加減ヨ
レ本味ノ芍薬川芎ヲ倍シ當飯沉香ヲ減シ人參白朮用
シテ可用何時モ氣血ヲ上ルニハ芍药ニ味ヲ倍シ當飯ニ
味ヲ三分一減スヘシ口傳ナリ

二十六 同尻ノ出タルモ右同前ニ養生スベシ

二十七 同尻痛ムコアリ牡丹皮二色ニシテ加ヘテヨシ

二十八 子宮ヒカズハ牡丹皮生末シテ大豆等分ニ粘ニテ丸

シ子宮ニサスベシ

二十九 子宮ヨリ天目ホドノ物出ルコアリ本味ニ川芎芍薬

ヲ倍シ用ユ出タル物ニハ藍ノ実ヲ水ニ化シ塗ルベシ若

不入ハ生牡丹香附子ヲ本味ニ加ヘ用ヘシ大事ナリ母ノ

帯ヲ解カセ養生スベシ如何ニモ温ノ汗ヲカ、世蒸多ク

用ヒヨ古血ニ風ヲ引タル故ナリ

三十 後ノ物ナリ子宮ヘ入ル事アリ其見ヤウハ女シキリ

ニ屁ヲヒルナリ延胡索牡丹皮等分本味ニ加ヘ用ヒヨ産

前ノ末ニ詳ニ記ス可考

三十一 産後陰戸痛ム夏アリ陳皮香附ヲ本味ニ加ヘ用ユ又

湯ニ塩ト石灰ト少シヅ、入テサイク洗フベシ

三十三子ヲ生ミ待相ヤブレテ陰門ト胎門ト一ツニ成ル
アリ本味ヲ黒燒ニシテ胡麻ノ油ニテ付ベシ大小便モ血
モ流レ出テ茶付ルナラザルニハ靈天蓋ヲ末ニシテ少
加ヘテ付ベシ内菓ニハ本味ニ甘草ヲ倍シ用又白湯ニ燒
塩少石灰少入腰湯サセ水氣ヲヌグヒ菓ヲ付テヨシ但シ
是ハ病人ノ氣力ニヨルヘシ又本味ニ牡丹皮大干姜黒炒
ニシテ卵ノ白ニテ付ル其上ヲ獨活ノ皮ヲタキヒシ

ギ蒸シテ敷付サスルア暖ナルハ惡キ也又血多リ下リテ赤
モ不付事アルニハ血竭ヲ用ヒテ血ヲ可止ナリ

三十三産後ニ目見ヘザル時ハ明礬ヤキ返シ路ノトウ黒燒
右末ニテ熱湯ニタテ眼ニ吹ヘシ産前モシ此煩ワルモ
同シ又曰本味ニ人參ヲ倍シ可用

齋按スルニ産前ニ此病アル者吹茶ニテ猶治スベシ産
後ニ至ラハ多クハ極虚ニ属セン大劑ノ独參湯ヲ急ニ

用ユベシ

三十四 産後耳ノ聞ヘス夏アリ是モ産ノキハニ古血不下故

ナリ本味ノ内川芎五各牡丹皮炒三加ヘイカ程モ可用也

三十五 産後ニ夢ヲ重子ユメク見テ驚クオドロクアリ本味ニ遠志麥門

冬三分一加ルナリ

三十六 寐汗アソニハ伏龍肝ヲ末ニシテ糊ニ押セ臍ノニハリ

三四寸四方ニハリ置テヨシ

齋按スルニ盜汗アソ甚キニ至テハ止此ハリ茶ノミニテ治

スベキニ非ス必ス服茶セシムベシ古方對症ノ方麻黄

根人参湯參附湯當歸補血湯等アリ撰ヒ用ユベシ又當

歸六黄湯アレ氏決シテ産後ニ宜シカラズ

三十七 子ヲ産テ後ノ物ニテモナク腹痛煩ウラフコアリ古血ナ

ラバ脉沉細ナルベシ又双子フタゴナラバ弦ケンニシテ時々打切レ

アルベシ先本味ヲ用ヒ様子ヲ見古血ナラハ本味ニ催生

茶又牡丹皮ヲ加ヘ用ユベシ若シ子死シタラハ本味ニ牡丹皮良香加ヘ用ユベシ死胎ノ一産前ニ記

三十八鼻血又ハ喉ヨリ血出ルハ上ニ血アリト心得當飯沉香ヲ増シ芍薬川芎ヲ加ヘテイカ程モ可用又腹帯強クシ

ニリ鼻血出ルヲアリヨキ程ニスベシ又曰香附子大ニ加用ユベシ又曰日本味ノ内人參當飯各五倍シテ用ヒヨ不止

ハ右ノ方ニ血竭五分加ヘ用ユベシ必ズ止ル也又大小便

ヨリ血下ルモ右ノ加減同前ナリ其時ハ産婦ノ手足屈伸自由ニサスベシ身ヲ詰レハ必ズ腫氣サス者ナリ

齋按ズルニ此症氣血耗損虚火ノ上リモアルベシ其時ハ人參ヲ多ク用ヒザレバ不止容躰ニヨリ肉桂附

子干姜等モ用ヒザレバ止リガタシ

三十九大便ニ血ヲ下スヲアリ本味バカリニテ可療治

四十吐血スルニハ本味ニ干姜大ヲ加ヘ可用又後ニハ是

ニモ手ノ内塗リ葉ヲ用ユルヅ 葉方ノ部 又惡血ニテ腹ニ

熱氣アルニハ本味ニ牡丹皮小加ヘヨ又関ノ一味葉可用

四一吐逆トキヤアルニハ丁子ヲ加ヘヨ虫ニモ同シ夏ナリ虫モ

古血故ナリ丁子生牡丹ヲ加ヘ用ユ古血アレハ吐逆ハキ心ア

リ度々及スニハ本味ニ炒牡丹皮大加ヘ古血ノ加減肝要

ナリ

四二産後ニ喉ノドカワキ湯水ヲ大ニ吞ミタガルコアリ本味ニ

陳皮香附子牡丹皮炒ニ色ヲ加ヘテ可用水吞ミタカル不

苦古血下スベシ又日麦門ヲ加フ

四三下冷ヒタル故ニカ或ハ水ナド吞ミ古血カタマリ虫ナ

ドノ様ニ煩ワザラフニハ本味ノ内當飯沉香倍牡丹皮生加用ヒ

テ古血ヲ可下ス必ズ痛ミ止ムモノ也又曰水ヲ吞ミタリト云

時ハ牡丹皮炒本味ニ三分一加ヘ用ユヘシ此葉用ヒテ半

時アリテ後水ヲ飲ミテモ不苦渴カワキハ古血ノワサシ

四四 産後ニ古血不下ハ本味ニ生牡丹皮ヲ加ヘ猶不下ハ炒テ加フ夫ニテ下ハ二色ニシテ用ユベシ

四五 古血カタマリ身ノ内天目ホドニ腫ルコトアリ本味ヲ黒焼ニシテ牡丹皮生ト黒焼トヲ等分ニシテ糊ニテ押合付ルナリ左カ右カ一方ハルモノ也

四六 大便結スル事アリ本味ノ當飯白朮ヲ倍シ麥門冬大黃ヲ加フ牡丹皮ヲ加ルモ佳ナリ古血故ニ大便結スルニハ

牡丹皮炒用ユツヨクアブレバ大便通下ス少炒レハ小便下ルナリ又曰古血ニテ大便不通ニハ難産ノ加減ヲ用ル

コアリ

四七 小便渋ルハ炒牡丹皮大黃少加ヘヨ又本味ニ良姜ヲ加ルモ可ナリ又曰小便不通ニ本味ニ沢泻車前子木通ヲ加ヘ用ユ又曰子宮塞リテ小便不通コトアリ湯ニ石灰藍ノ実ヲ入レ洗フナリ内菘ニハ古血加減肝要ナリ

四八小便間ナク頻ニ下リ不止アリ本味ニ人參炒川芎
芍薬倍シ當飯沉香減シ用ヒヨ又曰牡丹皮炒茯苓ノ根ニ色
ヲ加ヘ用ユベシ

齋按スルニ此イバラハ即チ本艸ノ薔薇根ナリ

四九小便不覚通ズルトキハ本味ニテシユ口傳ニ曰酸醬艸根ナリ

ヲ加ヘ白湯ニテ可用又湯ニテ足腰ヲ洗ヒ温メヨ

五十産後咳嗽イヅルニハ本味ヲミナ火トリテ人參ヲ減

シ白朮ヲ増シ香附子加ヘ用ヒヨ

五一早メニ物ヲ云ヒ色赤ク汗出ルニハ本味ノ内川芎芍

薬倍二三服用ヒテ以後沉香當飯倍用ユ

五二産後物云フナラ又煩ヒアリ先本味ヲ用ヒ其後古血

ノ加減容体ニヨル也

齋按スルニ古人亦古血ニ飯シテ主方八珍散四物四君合方ノ八

珍ニ又ハ孤鳳散等アリ

五三 食ス、マ又芟アリ本味ニ縮砂ヲ加ヘ用ヒヨ又曰ツ
ヨク不食スルニハ本味ニ大黃三分一加ヘ用ヒヨ

五四 噦スル^{エツキ}芟アリ陳皮香附子ヲ加ヘ白朮ヲ少シ増シテ
用ユ又甘艸ヲ増シ牡丹皮^カ加ルモ佳ナリ

五五 産後泄瀉痢病^中氏本味ノ間ニ^{ワダク}黄ノ三色葉加減シテ用
本味ニハ肉豆蔻^中加フ又三色葉本味ニ一々加ヘ用ユ又
泄瀉水ノ如ク下ル^カアリ右ノ加減可用又本味ニ木香香

附子ヲ加ヘ用ユルヲ又痢病久シキ時ハ糲炒茶アリ^中
記^{アイタノ}是ヲ本味ノ間々ニ二三度用ヒヨ大形^{カタ}可治又頻^{キリ}ニ腹痛

世ハ牡丹皮ヲ加ヘ味噌湯ニテ用ユ是ヲ大補丸ト号ス
五六 又方當飯ヲ増シ三色葉ヲ用ユベシ夏ハ生ヲ増シ冬

ニハ黒燒ヲマシ又サハラノ時ハ炒ヲ増シ赤シブリノ時
ハ生ヲマシ古血ノ加減^{カンヨウ}肝要ナリ又曰芍藥^カ炒白朮倍陳皮

ヲ加ヘ用ユ

齋按スルニ此治方甚悪シ凡^レ泻利ノ症ニ當^レ飯ナドノ溼
アル^{イム}茶ハ忌^{イム}ナリ又三色茶ハ黄栢生ト炒^{イリ}ト黒焼ト等
分ノ方ナレバ産後ニ宜^キ方ニ非^{アラ}ズ水泻ハ常ノ泄泻ノ
主方赤シブリハ痢病ノ主方ヲ考ヘ療治スベシ

五七 薄^{ウキ}黒ク子バキ物ヲ吐^ハク夏アリ本味當^レ飯ノ身ヲ去リ
尾ヲ犬ニ用牡丹皮^大延胡索^大三貼用ヒテ其後ニハ本味
ニ宿砂^大加ヘ人參ヲ減^シ用ユ但シ參代ニ齊寧^{セイネイ}ヲ用ユルゾ

又手ノ内ニ塗^リ茶可ナリ 茶方ノ中
又リ茶出

五八 腰ヌケ手足不^ル叶ニハ前後^レ本味ニテ療治スベシ

五九 久シク腰^ヌ拔^ツケ煩^{ワツラ}フニハ本味バカリ可用^ユ上焦^{キョウ}ニ血ア

ルニハ本味ノ内當^レ飯沉香^倍下焦ニ血アルニハ本味ノ内
川芎芍薬ヲ倍^イシ用ユ又日本味ニ牡丹皮^少加フ但シ惡血
ノ心ナクハ牡丹皮ヲ不加^ハ又付^レ茶アリ口傳ナリ

六十 腹痛ニハ黒大豆皮ヲ去リ炒^シ一目葱根一目右ニ味ヲ

煎じ用ユベシ

六一胸ヲ痛之煩ワヅラフク夏アリ本味ニ人參少ヒカヘ當取沉香ヲ増シテ用ヒヨ又ハ芍薬ヲ増シテ本味バカリニテ療治スヘシ又曰人參炒リ可用又曰胸痛悶絶モシセツシ又ハ咳シ痰膿血ヲ吐スルトアリ或ハクサキハ大方肺癆ハイヨウナリ大事ノ病ナリ本味ニ天門冬ヲ加ヘ用ヒヨ又曰胸ニ痰ツカヘ或ハ氣順キスミ行カウセズ胸ヲ痛ムハ本味ニ人參ヲ去リ陳皮枳壳ヲ加フベシ

六二腰痛ム夏アリ香附子カウ炒加ヘ甘州白朮ヲ増ス又様子ニヨリ延胡索ヲモ加フ又曰牛膝ヲ加フ

六三鼻ヲ痛ムトアリ古血カタメル故ナリ先ヅ芍薬川芎ヲマシ五六貼用ヒ其上ニテ當取沉香ヲマシ芍薬川芎ヲヒ

カヘ用ヒヨ

六四口中ヲ痛ムトアリ不苦産ノ時難ニ思ヒ強ク齒キリスルニ依ヨツテ痛ムナリ當取沉香ヲ増シ用ユ

六五 咽痛ムニハ本味ニ陳皮香附子ヲ加ヘ當飯沉香ヲ倍
シ川芎芍薬ヲ減ジ用ヒヨ大事ナリ

六六 股足痛ムフアリ當飯沉香ヲ増シ用ユ血上ヘ上ル故
ナリ必ス手ニ熱氣アルベシ

六七 筋ヲ痛ムニハ本味當飯ヲ倍シ用ユ

六八 身骨ウヅクハ湿氣ナリ本味ニ甘草ヲ倍シ陳皮香附
子三分一加ヘ用ヒヨ

六九 産後中風ニ本味ニ羌活獨活防風ヲ加ヘヨ惣シテ産
後冷ルフナカレ

七十 風ホロセノ様ナル者出ルカ或ハ小瘡イヅル夏アリ
皆古血故ナリ其心得ニテ療治スベシ

齊按スルニ是又一概ニ瘀血ニ不可飯風症モ有ベシ

七一 風腫ニハ本味ニ人參ヲ減シ香附子ヲ加ヘ用ユ又痛
風ニハ本味ニ白朮ヲ倍用何レモ止痛散ニ可引又惡血ニ

テ右ノ如ク痛ムコアルニハ本味ノ當飯沉香ヲ倍シ用ユ
ヘシ止痛散奥茶
方ノ部出

七二風毒ニハ本味ニ紅花大加ヘ用ユ又蒼朮ノ丸茶蒼朮丸奥

部茶方ノ出 ヲ間々白湯ニテ可用又引茶ニ同シク止痛散ヲ

用ユ又曰風腫風毒氏本味ニ紅花中香附子小加ヘ叔又止

痛散ヲ水ニ化シテ引ベシ不治ハ加ヘタル香附子ヲ去リ

牡丹皮大加ヘ用ユ若シ無効トキハ可斟斟酉

七三産後腫氣ノコ足ヨリサスハ不苦不苦上ヨリサスハ大事

ナリ但シ上ヨリサスニハ本味ノ川芎五倍シテ用ユ下ヨ

リサスニハ當飯五倍シテ用ユルヅ口傳ニ曰腫氣引タル

跡ノ堅カクキハ惡シ常ノ如ク和ヤラカナルガヨシ又曰本味ニ莪

朮香附子紅花ヲ加ヘ用ユベシ

七四同腰ヨリ下腫ルコアリ是モ本味ニ當飯沉香ヲ倍シ

可用又腰ヨリ上腫ルニハ芍薬川芎ヲ倍シ用ユベシ

七五子ヲ下シソコナイ煩ワザフ本味バカリヲ用ヒテヨシ効
ナクハ本味ニ犀角サイカクキリシケツヲ加ヘ可用又艾葉アイヨウヲ煎シ
其汁ヲ用ルモヨシ

七六産後ニ味噌ケキ嫌キヤフアリ悪血ナク本味ニ牡丹皮紅
花各小ヲ加ヘ又其間々ニ黄ワウノ三色茶白湯ニテ少シツ、
用ユベシ

七七産後ニ呵欠アクビシテ臆オビノ離ハルアリ止痛散シツクサニ川芎クワンソウ少加

茯苓ノ煎汁ニテ塗ル扱又本味沉香甘草ヲ倍シ用ユベシ

七八同呵欠アクビシケク淚ナミ多ク流レ煩ワザニハ本味ノ沉香倍其

間々ニ関セノ一味茶少シツ、可用

七九シヤクリ出ルハ惣ヒシテ冷タル故ナリ本味ノ内當飯
ヲ倍シ酒ヲ過スベシ熱症ネツハツレクニ加減スベシ前ノ噦

可考

八十舌ヲ出シ湯水ヲモ不飲クウカクトシテ煩ワザフアリ氣

ノ勞^{ツカ}レ又惡血故ナリ難産ノ加減後ニ記スレテ可用其後本味ノ内服身ヲ去リ尾大川芍牡丹皮良姜各六芍藥小其外同前右ノ加減三貼用ヒテ後二本味ノ白朮小遠志茯苓中加二三貼可用其後養生ノ茶本味ニ山茨中加ヘ用ユベシ又青皮少加ヘヨ

八一 心臍^ホウカクトシテ口ヲアケテ言フ夏ナク二年三年モ煩フ夏アリ本味ニ牡丹皮少加ヘテ用ヒ其間々ニ関ノ

一味葉ヲ湯ニテモ又ハ本味ノ煎湯ニテモ可用又其後口上ノ一味バカリヲ用ユベシ但シ唯授一人ノ秘傳葉トハコノ事ナリ

八二 産後勞瘵ノ如ク煩フニハ本味ヲ三貼用ヒ血アルハ面ニ田虫ノ如ク吹出ルナリ古血ヲ可下ス

八三 産後ニ髮又ケテ跡白クナルコトアリ本味ノ内ニ紅花香附子各六加ヘテ二三貼用ヒフノ後ハ本味ノ川芎當歸

ヲ倍シ可用惡血ノ心アルニハ牡丹皮中ニ加ヘヨ又曰カ
 之^ズ拔ルニ大事ノ夏アリ本味當飯五倍シテ川芎ヲ減ス
 八四何トナク十日十五日モ人心ナク眠ル夏アルハ氣ノ
 勞^カレ又惡血故ナリ但シ氣遠ク身暖ナル者ハ少モ不苦前
 ニアル養生ニテヨシ勞^{ツカ}レタル病人ナラハ人參ヲ小二
 或ハセイ子イニ代^カヘテ佳^カナリ成程緩^クト療治スベシ
 八五産後胸^ニ熱氣アツテツカハ煩^フニハ本味ノ人參川

芎ヲ減シ當飯沉香ヲ倍セヨ不^レ治ハ胸^ノサワギノ処可考
 八六同手足冷^キヘテ火ニアブレ^レ冷^ルハ古血煩^フナリ
 本味ニ古血下ス心持シテ用ユベシ
 八七手足暖ナル^ト有ニハ下^カ焦^ヲ湯ニテアタ^ハメヨ
 八八面赤^ク手ニ熱^チアリ足冷^ルハ上^ニ実スル也早^ク上^ラ
 下スベシ本味ニ川芎牡丹皮ヲ加ヘヨ又血ヲ下ス療治ヨ
 シ

八九足冷へ面ホトフリ耳鳴ルハ本味ニ地黄桂心山梔子
ヲ加へ用ユベシ

九十産後コトノ外瘦ル^{ヤセ}夏アリ古血故ナリ本味ニ牡丹皮
炒加へヨ生ハ悪シ又曰食減^ダ或ハ腹痛本味ニ知母黄柏
少加へ又當^{トキ}ヲ倍シ地黄地骨皮ヲ加フ

九一横^{ヨコ}寝ナラヌハ古血ノ譌也本味ニ牡丹皮ヲ加へ可用
九二帶トキニ本味ニ當^{トキ}既沉香大々加へ用ヒヨ

九三手ノ内ニ腫物^{ウツモノ}ノ出ルヤウニ腫ルハ夏アリ子宮^{コウ}ノ塗
薬ヲ白粥^{シラカユ}ノ汁ニテ付ベシ必ス引クナリ内薬本味直^{タチ}ニ用
ニベシ但シ付薬ニ関^ケノ一味モヨシ同粉薬モ用ヒルゾ又
本味黒焼モヨシ産前後凡同前ナリ

九四臍^{ホグ}ノ下天日程ニ腫レ痛ニハ本味ニ我朮ヲ加へ用ヒ
ヨ又曰臍下大ニ腫物イツル夏アリ牡蛎^{ボレイ}ノ粉ヲ糊^コニテ
合テ廻^マリニ付其上ニ綿ヲフタニシテ廻^マリヨリシメ寄^{ヨス}ル

トキ腫ノ頭ニ灸カ銚ヲシテ後ニ吸膏葉ヲ付ベシ内葉
本味ニ白芷ヲ加ヘ用ユ膿出ガタク長引クハ四物湯ニ連
堯白芷ヲ加ヘ用ヒ其後又木香乳香藿香丁香甘艸ヲ加ヘ
用ユ是則五香也

九五臍ヨリ膿イヅルヲ産前ノ部ニ記ス同前ナリ

九六子慶冬生ム者ハ古血アル也炒牡丹皮ヲ用ユ當坐ノ
血ニハ生牡丹皮ヲ用ユ新古交レハ二色ノ牡丹皮ヲ可用

九七食違アラバ何ナリ凡食シタル物ヲ黒焼ニメ加ヘヨ

九八腹中塊カクリアルニ紅花桃仁芍薬莪朮スレツ方木ヲ本味ニ加

用ユベシ

九九乳腫レ痛ムヲアリ本味ニ白朮ヲ倍シ牡丹皮中加ヘ

用ユ扱又関セキノ引葉湯ニ化シテヌル外科ノ付葉ナドハ惡
シキ也又カラムシノ根子洗ヒコツゲ味少加ヘツキマセ
付クヘシ

百一 乳不足ニナル夏アルニハ本味白朮ヲ倍シニ色ノ牡
 丹皮ヲ等分ニ合シ小ニ加ヘ甘酒ニテ可付又砂糖酒ニ化
 シテ用ルモ佳ナリ又曰本味括婁仁ヲ加ヘ濁酒ニテ可用
 百二 腹ノフトル夏アリ古血下ラスレテナスワザナリ古
 血下スベシ但シ古血下ス凡血ハ不下シテ大小便ニス、
 色ノ物下ル也又古血ニテ腰ノ上廻リ痛ミ五六度ツ、氣

ヲ取失フ夏アリ先本味ヲ五六貼用ヒテ扱牡丹皮炒ニ色
 ニシテ本味ニ加ヘ用ユレバ古血皆下リ則治ス又本味バ
 カリモヨシ氣勞レタ人ニハコレヲ用ユルヅ
 百三 産シタル女早ク使ヒ度トキハ本味ニ血竭ヲ焼返シ
 テ三分一加ヘ酒ニテ二貼ホド用ユベシ其一、起テモ血
 上ル夏ナレ去ナガラ大事也
 百四 産後母ノ痘瘡ニハトカクサマシテヨシ本味ニ沉香

ヲ倍シ陳皮ヲ加フベシ

百五 息イキクサキハ皆腰氣也

百六 産後腰氣ノ夏コシケヨクイリタリタル牡丹皮生ノ延胡索ヲ本

味ニ加ヘ可用必ス腰氣下ルナリ灸所アリ後ニ又曰腰氣

ノ夏産後養生ノ間ハ右ノ如クナリ常ハ經水ノ内ニ惡血

又月水ヲモ下サセテヨシ但シ腰多ク痛ムトキハ七八日

モ古血下シテ腰氣劑ヲ用ユベシ中程ニ痛ム時ハ四五日

モ可用又少シ痛ム時ハ二三日モ用ユ必ス經行ノ内血ヲ

可下シ滞トコレハ其後ハ本味ニ牡丹皮炒テタケクラベニ合可

用生ハ惡シ惣シテ婦人月水妄行ハ其身冷ヒヘタル故ナリ

ソノ心持ニテ加減セヨ又サシ茶 茶方部出

百七 産後白帶赤帶ニテモ下ルヲ留トムル心持ノ事病人弱ク

脉沉細ナル時ハ本味一兩日モ可用氣ヲ調ヘテ扱古血ヲ

下シ其後止メテヨシ此茶ニハ本味ニ牡丹皮生炒ニ色ニ

本味タケクラベニ合せ可用是古血下シナリ其後止メ茶
ニハ本味ニ血竭キリン三分一ノ三分一加へ止メルナリ止ル程
五日モ六日モ用ル也若不止モシバ血竭ヲ倍スベシ口傳ニ曰
血ヲ止ルハ先血ヲ下シテ後止ムベシ如此世子バ血止メ
テモ煩ワツラフ也又曰白滞赤帯トクトクレ鳩トク黒燒ニシテ茶一服
程ツ、白湯ニテ用ユベシ

百八 産後氣大過タイクハナル人長ク煩ヒ或ハ勞瘵ラウサイヲ病ニ俄ニ氣

ヲ取違チカフ者ニハ本味ノ氣茶去リ陳皮香附子當飯熟地黄

各大芍薬中川芎中白朮少甘中少ヲ用ユ熱甚ク狂フニハ

荆芥大々ニ加へ時々汗アセヲトルベシ

百九 同小氣ノ人物チカヲ苦クニシテ血ノ道何ホド氣違チカフト

當飯地黄各大芍薬中川芎各中沉香少人參各少若モシ脾胃弱ヨハキ

人不食セハ陳皮白朮少加へテ可用病人ノ氣ニ應シテ丸

散煎何レニテモ與アタフベシ

百十 産後瘡ノ支悪血食傷ヨリ出ルモノ也或ハ筋骨シ、
之周身癱^ス之動揺ナリ^{トウヨ}難^{ガタ}キヲ等アリ其時ハ本味ニ三色
牡丹皮ヲ加へ五六日用ヒテ其後本味ニ大黃等分合一日
五六度バカリ七日用ユ夫レニテ^シ効ナクハ又本味バカリ
一兩日用ヒ其後右本味ニ大黃等分ニ加へタル中ニ二色
ノ牡丹皮多ク加へテ二三日用ヒ其後紅花散^{葉方ノ}部ニ出ニ大
黃^大加へテ一日用ヒ可下^ス又実症^{ビツシキ}氣血盛^{サカ}ナル人ニハ大

黃^大ニ加へテ二三日可用コノ療治ニテ大形ヨクハ右ノ
三貼ニ貼ニシテ皂角刺一目割^{アケガタ}之如常煎シテ其湯ニテ右
散茶^{アケガタ}曉方ニ可用必ス小便ニ血下ル者ナリ又惣シテ紅花
散用ル内ニハ小便黄色ナル物ナリ右ノ療治後本味ニ白
朮少シ増シ可用養生ノタメ也或ハ身フクル、支アリ
関^{セキ}ノ粉茶ヲヌル湯ニ化シテ可引但シ内茶バカリニテモ
治スルゾ

百十二 永血赤白共本味三色牡丹皮中加へ緩々ト用ヒ其後

ハ血竭キリシヤ程ニ丸ジテ本味ノ間ニ白湯ニテ用ユルナリ

又年久シキニハ本味ニ三色ノ牡丹皮中延胡索中加へ可

用又其後血竭キリシヤ可用又良姜少加へ用ユベシ夫ニテ不治ハ

本味ノ内口上ノ一味バカリヲ可用

百十三 産前後凡問茶ノ夏ムサクト煩ワツラフ者ニ先本味与へテ

見ミルヘル血枯カレタル者其身温アタタマリ能スレト云者ニハ本味テ

療治スベシ本味ヲ用ヒテ頭周カ身カユクフクルト云ハ

古血アリト心得テ本味ニ牡丹皮加へテ可ナリ口傳ニ曰

血枯カタル者ハ脉消キユル如ク沉チナリ血アル者ハ脉一動数ア

ツテ浮大也

百十三 産門ニ疵瘡ニハ上々ノ酒椰子ノ油右ニ味煎シテ陰

門ヲ洗フ又大栗薄ク片ギ日ニ干シ粉ニシテ捻ヒル

百十四 産後禁物之事

海草類 葶ノ類 木実類 胡椒 四足類 蕎麥

鯢 鳥 但シ雞卵ハ不苦

右ハ養生ノ間禁之ヲ

河魚 鍋炭 油氣 梨子 檄茶 但シ古茶ハ不苦

中條流産科全書終

中条流小兒方

○子生ル、ト其終乳ヲ吞スル其惡シ其故ハ早ク乳ヲ吞スレハ其子或ハ夜啼シ瘡草ナド出ルモノ也是生ル、時惡血ヲ吞ム故ナリ生レ出ルト其終指ニ縮ヲ卷テ口ノ中ニアル古血ヲヌグイトリ咽マデ指ヲ入レ子湯吞ミタルヲ吐セ其後用ル葶白朮甘草香附子 各等分 右調合シテ縮ニ包ミ振出シ口ヘイカ程モ塗ル也黑色ナル大便ヲ不下

先キニ乳ヲ吞スベカラズ口傳此茶夜啼ニ用ヒテ佳瘡ニ
モ用ルヅ

○子生レテ其終吞スル茶 大黃 甘草 山茨菰小根白

キザミ右熱湯ニ振出し用ユルヅ此ハ惡血ヲ吐スル為也

○子生レテ声ヲ不上ニハ 藍葉 白朮 各等分 振出し口

ノ内へ塗ルベシ右ノニ味ヌル湯ニテ振出スベシ又曰ク

藍ノ玉 甘草 各等分 ヲ用ユ

○生レ子ニ用ル茶 甘艸 白朮 生牡丹皮 各等分

右絹ニ包ミ振出し用ユ

○子ヒタト腹ヲ下スニハ本味ニ三色茶加へ母ニ用ベシ

○子夜啼ニハ 當飯 石膏 川芎 甘草 各等分

右為末母ノ乳ニ付テ與へ母ニハ本味ヲ可用

○キレ草ノ茶 ドコニモ出ル者ハ イモリ黒燒

胡麻ノ油ニテ煉リツクル

五疳疔ニ用ル茶 イモリ 黒焼 末シテ丸シ湯ニテ用ユ

ハスノ菜 百合根 桐木ノアハハタ

右ニ味押合せハスノ上ニ付ル

ヲトミ子菜 白朮 黄芩 黄連 青皮 漆 肉桂

茯苓 各等分 咽ノドツヨク渴クニハ 枳壳 芍薬 瓜蒌仁

麥門ヲ加ヘヨ吐逆トキヤクアラハ丁子ヲ加ヘヨ

二生湯 驚風ヲ治ス 黄連 百合 白朮 各二分

遠志 一分 沉香 二分 肉桂 一分 茯神 一分 姜蚕 炒少 漆 燒

○丁子圓 虫積霍乱クハクシヲ治ス 丁子 肉桂 各五 干姜 三々

宿砂 五々 甘草 一々 陳皮 三々 香附子 三々

右末シテ蜜ミツニテ煉子リ用ユ

中条流小兒方終

板坂流小兒方 小兒生レテ二七日ノ間胎熱タイ子ツニテ大便不通ニハ

牡丹皮 黑炒生 厚朴 白木 甘草

○同一二日ノ間腹中鳴リ一身熱シテ不安ニ

芍薬炒 白木炒 厚朴 甘草 一方ニ桔梗ヲ加フ

後重ニ木香ヲ加フ或紅花ヲ加フ

○小兒五疳ヲ治ス 益母ノ絞汁服之ヲ

○清涼飲子 小兒血脉壅塞シ腑臟熱ヲ生シ頬赤ク渴多ク

五心煩躁シ睡卧不安四肢驚掣乳哺ヲ及シ不時寒温失

度血氣不理腸胃不調或湿滯欲成伏熱或壯熱不歇欲成驚

癇ヲ治ス又風熱結核頭面瘡癩目赤ク咽痛瘡疥ノ餘毒

一切壅滯并服之 當皈 甘草 芍薬 赤 大黃 各等分

右如常煎ス

○加減丁香散 小兒痢病服之有効 白木 二兩 厚朴

陳皮 茯苓 芍薬 宿砂 各二分 干姜 三分 丁子 甘草 各

二 右細末每服 一各 塩湯温湯ニテ用ユ

○豆蔻散 丹家秘製 通用赤白痢甚効アリ

人参 三分 宿砂 一兩 干姜 一兩 甘草 二分 白芥子皮 二兩

右五味末ノ毎服三々二々一々温湯或米飲佳也

秘ニ曰肉豆蔻ヲ加フ又赤痢ニ白芍薬ヲ加熱アルニ干姜ヲ除キ芍薬茯苓ヲ加フ

○木香散 痢病秘製 宿砂 干姜 各二分 人参 二分 甘草 一分

罌粟 一兩 肉豆蔻 二分 丁子 一分 木香 一分 厚朴 一分

右末ノ米飲ニテ下ス

○白中散 赤痢變白ヲ治ス 厚朴 罌粟 百合 各一兩

甘草 五分 白朮 一兩 茯苓 陳皮 肉豆蔻 各半 右末ノ米飯

湯下或豆蔻ヲ去テ芍薬ヲ加ヘ百合ヲ去テ干姜ヲ加フ

○万理圓 虫腹胃痛及痢病ヲ治ス 楊梅皮 百合

葛根 各等分 右末ノ丸ス梧桐子ノ大サ温湯ニテ十五丸服

一方 白朮 厚朴 香附子 苦参ヲ加ヘテ黄金丹ト名

○加減理中散 虚冷ヲ扶ケ痰飲ヲ消ス大人小兒産後用之
白朮 五兩 人参 干姜 芍薬 各二兩 桔梗 三兩

胡椒 一兩 甘草 二分 右末ノ每服二合又胡椒ヲ去リ川椒ヲ加フ

△以上六方老若男女通用也

○加減粮臟湯 泄泻腹痛瀉泄腸胃虚冷大人小兒男女通用

用 木香 桂心 訶子 芍薬 宿砂 當飯 川芎

人参 肉豆蔻 各三分 丁子 一分 御米殼 三分 甘草 二分

右煎服一方 白朮 厚朴 茯苓 干姜ヲ加フ

○度嶂散 小兒風寒挾虫或ハ元日屠蕪酒ト服ス時疫ニ

甚効アリ大人小兒通用 麻黄 山椒 各三分 細辛 防风

桔梗 干姜 白朮 桂心 各二兩 右細末ス

○惺々湯 小兒風熱瘡疹傷寒時氣ヲ發表ス多眠咳嗽喘

鼻塞ス、漸々ルヲ治ス

人參 白朮 茯苓 桔梗 細辛 藜根各一分 甘草二朱

右姜三片水煎

○阿伽佗圓 アカタ 茜根セネ 去心 山椒 湯洗 百合 鬱金 鹿皮ヲ去

紫且シタン 各一兩 右細末ノ丸ス又七種ノ加茶ト云ハ 人參

地骨皮 各三分 又九種ノ加茶 木香 丁香各三分 又甘草

一分 右細末蜜丸△痢病者ニ蓬棗ト生姜煎去滓用九種ヲ 大佳也

○普濟散 一切痢病ヲ治ス 厚朴一兩 甘草三分 御朱散

五兩裏ノ筋ヲ不去一夜酢ニ浸シ 干姜一兩 石榴皮一兩 以上

末シテ子バキ飯湯ニテスルダメ用之ヲ

口傳加減方○冷痢ニ干姜ヲ倍ス○傷寒熱痢ニ干姜ヲ去

烏梅ヲ加フ○虫疳痢ニ黃連ヲ加フ○赤痢ニ艾煎ニテ用

○痔血ニモ同シ○白痢本方用之肉豆蔻ヲ加ヘテ疼ニ可

可秘○吐逆ニ白梅花藿香ヲ加フ○勞損シヨク 虛損キヨ 內損ノ痢ニ

阿膠人參ヲ加フ。噦噎ニハ棟實ヲ加フ。或ハ楸又丁子ヲ加フ。酒損痢丁子ヲ加フ。咽乾燥ニ括萎根烏梅少薑根ヲ加フ。目眩ニ人參茴香ヲ加フ。寒痢ニ桂心ヲ加フ。不食痢宿砂白豆蔻ヲ加フ。胸塞ニ枳實ヲ加フ。以上口傳ナリ。

○三神圓 虛冷シボリ腹夜頻ナルニ草烏頭生炒黑右等分麩糊丸每服二十九丸米飲下マ

○豆蔻散 肉豆蔻 二兩 厚朴 御米殼 各二分 干姜 甘草 各二分

右末ノ飯ノトリ湯ニテ下ス

○宿御湯 諸痢殊ニ虫漆發スルヲ治ス 厚朴 茯苓

宿砂 干姜 各二兩 御米殼 三兩 右末ノ米湯ニテ下ス

○駐車圓 諸血痢ヲ治ス 阿膠 黃連 各三兩 當飯 二兩

干姜 一兩 右末ノ阿膠ヲ酢ニテ煉〇程ニ丸シ二十粒可用

○小兒下痢妙藥 大人ニモ佳也 艾ノシベ 蟬退 御米殼

甘草 各等分 右末ノ糊丸口傳ニ曰御米穀ハ鹿皮ノ内ノア
ニ肉ヲ片ギ取リ用ニ是秘事ナリ

○赤痢腹痛有熱ヲ治ス 百合炒 御米穀 黄芩 黄连 各

二分 甘草 三朱 右水煎或ワセ小豆 百合 甘草 右三味

末ノ久シキ梅干ノ肉ニ丸ス朱砂ヲ衣ニマ又葛根ノ粉ニ

佳ナリ但シ三日ヨリ内ハ不可用又曰御米穀煎湯ニテ調

下ス

○厚朴散 前症ヲ治ス 御米穀 厚朴 各五兩 葛根

人参 百合 甘草 各一兩 右末ノ米飲下

○参苓散 前症ヲ治ス 陳皮 御米穀 各二兩 肉豆蔻 二分

木香 一分 茯苓 二分 人参 扁豆 各三分 右末ス

○丁木散 小兒虚滑泻痢不止ヲ治ス 厚朴 訶子 各五分

史君子 一各 丁香 一各 白朮 青皮 茯苓 各三各 甘草 一各

右末ノ米湯調下ス 右各痢方大人 小兒通用劑也 板坂流小兒方終

中條流産科全書下卷

攝陽 戸田齋 刪補

別録口傳之茶方

○枳殼散 枳壳黒焼 十各 炙甘草一各 右末シテ薄茶ウス一服ツ、

一日ニ二三度白湯サユニテ用ユ此レハ産前養生茶ナリ孕ハミテ

五六月ノ比ヨリ此茶用ユレハ難産ナシノ患ウレヘナシ併シカシ人ニ

依ヨテ少ツ、可用不足スル故ナリ

○止痛散 山椒来 白小豆 各等分 肉桂 少 右末シテ

生姜ノ煎汁ニテ可付但シ臑ノ離レタルニハ右ノ内へ川芎 少 加ヘテ茯苓ノ煎汁ニテヌルベシ

○理中散 手心ニ塗ルト前ニ記ス茶方也 紅花 小

縮砂 大 右末シテ合セ薄糊ニテ塗ルゾ子ブリテモヨシ

○紅花散 紅花 大 香附子 中 茯苓 中 牡丹皮 小

右末シテ薄茶一服程ヅ、白湯ニテ用ユ

快後散 符中葉トモ車トシキ臣云 一切産後ニヨシ 人參 當皈

川芎 宿砂 車前子 沢泻 沉香 黄芩 括萎仁 各一

紅花 二 大黃 香附子 各 陳皮 柴胡 各三 甘草 少

○調經湯 一名生氣散 産後ノ用茶也 人參 陳皮 熟地

黄 當皈 肉桂 干姜 黄芩 芍薬 右水煎

○早生秘茶 熊爪ヲ斂ニテ摺リ粉ニシテ本味ニ加ヘ用ユ

死胎逆産何レモ生レカ子ルニ此秘茶紅花大ニ加ヘ用ユ

○調榮湯 産後ノ諸病ニ加減シテ用ユベキナリ

人參 木香各一各 當皈 香附子 陳皮 紫檀 川芎 熟

地黄 縮砂 牡丹皮 茯苓各五分 甘草一各 右水煎

○澤蘭湯 産後一古血下ル夏少シ血上リ血暈スルヲ治ス

沢蘭二各 當皈 川芎 紅花 荆芥一各 牡丹皮五分

右水煎服ス
○人參湯 産後ニ古血下ル多クシテ血暈スルヲ治ス

當皈 熟地黄各一各 川芎 芍薬 陳皮 人參各五分

甘草 右水煎シ可服ス

○補氣湯 産後氣虚シテ心ヲ勞シテ目マイスルヲ治ス

人參 當皈 川芎各一各 陳皮五分 甘草少 右水煎服

○養血牡丹皮湯 産後古血不下胸腹クルカ如ク痛ミ發

熱スルヲ治ス 皈尾 芍薬各二各 牡丹皮 延胡索

桂心各一各 甘草少 右水煎服ス 古血不下腹痛強クハ挑仁

沒藥 乳香 各二分 紅花 香附子 各五分 加へ可用

○延胡索湯 產後ニ血堅リテ腹ニアリ少シモ不下腹甚

夕痛ムヲ治ス 延胡索 當皈 各一分 琥珀 蒲黃 各八分

桂心 二分 芍藥 五分 紅花 二分 右粉ニシテ酒ニテ用ユ

○增損四物湯 產後^{タチ}寒^{タチ}熱^{キヤク}ノ如ク小腹痛ムヲ治ス

當皈 川芎 人參 干姜 芍藥 酒各等分 甘草 少 右水煎ジテ

服ス 古血有テ腹強ク痛ムニ牡丹皮 紅花 柴胡 各等

加フ 風引タラハ加味柴胡湯ヲ用ユベシ 當皈 川芎

熟地黄 柴胡 白朮 荆芥 菴活 各二分 人參 白芷

防風 肉桂 各一分 甘草 少 右生姜入水煎シテ可服 熱不

去 牡丹皮 黃芩 梔子 麥門冬ヲ加フ

○增損柴胡湯 產後ニ早クヲキ心ヲ勞シ頭痛發熱シ汗

出テ背ヲシク痛惡寒發熱シ食不進シテ咳嗽スルヲ治ス

柴胡 四分 人參 半夏 陳皮 川芎 白芍藥 各三分 甘草 少

姜枣水煎

○頰血湯

産後古血不盡ツキ遍身手足腫ハル、ヲ治ス 紅花

馬鞭草

白茯苓

瞿麥

羌活

香附子

各三各

肉桂

琥

珀 陳皮各一各

右水煎服

○益母湯

産後血崩ホツスルヲ甚シテ不止ヲ治ス 當歸

川芎

人參

白芷

升麻

續斷ソクダシ

各一各

熟地黄

白芍薬

益母草各二各

甘草少

右姜煎服

○振茶

産後血道血暈ヲ治ス 人參 川骨各二各 肉桂

桂心各一分

茯苓

丁香各一分

甘草少

右絹二包ニ振出シ用ユ

○白茶ノ方

采ノ寒晒ノ粉ニ合 葛粉五勺 滑石一兩

右細末シテ酢ニ浸シ取上ケ乾カスベシ

○同又方

餅采一合

山芋

一夜酒浸ス 一各六分

粳采一合 トウボシ

一夜酒ニ浸シ 右末シテ寒ノ水ニ七日浸シ取上ケ又酢ニ七日

浸シ粉ニシテ用ルナリ

○白茶血道茶ノ方 香附子炒大 人参小 胸痛ニ少炒寒晒大々

甘草少 右細末病人ノ症ニヨリ口傳多シ

○黒神散 古せアサ 益母草 アラ 各一兩 カラ 半兩 十八

角豆 半兩 箱根草 一兩 テンシユ一兩 白菜 一兩 甘草 少 右九味

調合シテ酒ニテモ白湯ニテモ用ユ但シテテンシユハ酸漿

艸根也

愚曰黒神散方書ニ出ツ此方ハ中条ノ家方也故ニ和名

秘名口傳ニスル物アリ

○三味小切紙ノ方 真名クロヤキ則 雞ノ羽黒ヤキ但 赤牛

ノ糞 右三色黒焼ニシテ用ユ

○二味二兩小切紙ノ方 紫河車黒ヤキ コツプ銅銹ナリ

銅三十目ヨクミガキ酢三二日二夜ヒタシトリアゲ 右シカシヤ黒焼

咳干ニシテ上へ出タルアカヲコツプゲ用ユルナリ 難産生レカヌ

二兩ノ内ヘコツプノ花ヲ二分入レテヨシ 難産生レカヌ

ルニ本味ニ二味二兩三味二兩ヲ合セ二七サシ入ルベシ半産

モ同シ惣シテ産前何ノ病ニヨラズ生レカヌルニ用ヒテ

妙ナリ

○催生神應散 サイセイ 難産横産逆産ヲ治ス度々効ヲ得タル方

ナリ可秘ス々々 車前子一各 葵子キ 白芷各三 枳壳二各

牛膝二各 芍薬 鼠尾 川芎各一各 紅花 大腹皮各八分

或ハ桂ヲ加ヘ水煎

○加減四物湯 血定ル薬也 當皈 川芎 地黄 芍薬

紅花 牡丹皮 細辛 牛膝 枳壳 沢蘭 人參

○産後補薬 黒雞一羽 水三升入レサハクト煮立テト

ニ立タル沫ヲ扱シニテスクヒ捨テ其後 肉桂 丁子 宿

砂 紅花 胡椒各二各 胡燕洞蘆一兩 入レ右ノ水ヲ二升

煎シテ吞ム度ニ塩少シ加ヘ朝夕少シ宛用ユベシ

○白之本味ノ方 人參 沉香 茯苓 紫且 陳皮

木香 大黃 川芎 熟地黄 芍薬 白芷 當皈各等分

右十二味細末ス又水煎服又 藿香 宿砂 甘草ヲ加ヘ
 合十五味也 四季加減アリ産前後凡ニ春ハ飯ヲ倍夏ハ
 芍ヲ倍ス秋ハ芎ヲ倍ス冬ハ芎ヲ倍ス ▲長血白血ニ用ル
 時ハ先初メ二十貼程ハ紫且ヲ去リ牛漆ヲ加フ此カゲン
 ハ下ル也止メ度時ハ紫且蒲黄ヲ加フルヅ ▲常ノ加減法
 ▲熱氣アルニハ柴胡枳壳ヲ加ヘヨ ▲大熱ニハ前胡柴胡
 知母ヲ加フ ▲血下ニ蒲黄紫且ヲ加フ ▲腫氣ニ大黃芍薬

ヲ加 ▲筋引ツルニ黄芩ヲ加 ▲頭痛ニ細辛ヲ加フ又川芎
 白芷ヲ加 ▲不食ニ宿砂大厚朴白朮ヲ加 ▲面色赤キニ車前
 子ヲ加 ▲下痢ニ大黃ヲ去リ當飯ヲ加フ ▲氣ヲ煩ワツラフニハ
 人參一倍入レ用ユ ▲冷痛ニ白朮干姜ヲ加 ▲小便血下ニ
 鬱金烏梅ヲ加フ右ハ白ノ本味加減法也

○蘓人湯又散ニモ 當飯二兩 枳榔子三兩 川芎一兩 莪朮一兩
 右五味口傳ニ上ト云 丁子三兩 黄芩三兩 白朮一兩 甘草一兩
 次ノ四味ヲ下ト云

塊強^{クイ}キニハ上バカリ等分ニ用ヒ常ニハ上下用ユ▲産後
 早^{ハヤ}ク蕪人湯ヲ上バカリ用ユレバ血不上常ノ時デモ用テ
 不^シ苦▲氣上リタルニハ下バカリ煎ジ用ユ▲大血ハシリ
 或ハ長血ニハ上下用ニ合煎服ス急ニ止^トメ度^{タキ}ハ大包^{ツバミ}ニメ
 用ユ連々ニハ小包ニシテ用ユルゾ▲下血^{キウシヨ}灸所ナドヨリ
 血ノハシルニヨシ▲急病ノ時ハ煎茶ニシテ用ユ可秘^ス々々
 ○天得湯 癩瘡^{ライサウ}ヲ治ス 黄芪 川芎 地黄 丁子

烏^ウ蛇^サ 白木 藿香 沉香 甘草 牽牛子 山梔子
 柴胡 白芷 赤芍薬 香附子 诃榔子^{各ニ} 升麻^{各四}
 人參^{一匁} 甲^{二十目} 大風子^{百十} 以上
 ○解泄方^{ゲセツ} 大黄^{二分} 胡椒^{三粒} 皂刺^{二分} 巴豆^{一粒}
 丁子^{三枚} 以上末シテ丸トス
 ○血下薬 大黄^{三匁} 蕎麥粉^{二匁五分} 右二味酒ニテ用ユ
 但^シ霄^コト夜半^{ヤハン}ト曉^{アカキ}ト三度^ドニ用ユルゾ

産前産後

百三

○握茶ノ方 當飯五分 紅花三分 丁子二分 藍玉二分

良香二分 牡丹皮二分 右調合

是程ニシテキヌ絹ニ包ミ

手ノ内ニ入ラキ置テヨシ

血塊タケ古血ナドハ本味用テ後可サス指モシ下リカ子バニツモ

三ツモ入カハ替テヨシ下ル物ハ白キ物モ赤キ物モアル也

○同サシ茶ノ方 古血下レ用又子クサリ茶トモ云 嬢胎ノ女ニ用ユルト勿レ

拱擲子五分 粉ニシテ薄苛ノ煎ジ汁少 丸ジテ水銀少

右ノ丸茶ノサキニサシ大サキ

○是程ニシテ産門ニ押ラレ入レテ一時バカリ置ラシナリ嬢シ

胎ノ時サス指ベカラズトサシニテ子ハ腐クサリズンくニ

成リ下ルグ

○破血劑ハチツノ方 香附子炒 川芎一各 巴豆一各 毒ヲトリクロヤキ

右三味末シテ酒ニテ用ユ但シ本味ハ不用ヒ

妊ムト血塊ヲヨク見分テ可用妄リニ用ヒテ人ヲ誤アヤミル
ベカラス物スベ惣テ度々下せば茶事キカズ必以可慎コレヲ服
スルトキハ先本味ヲ以テ下地ゲンキ元氣ヲヨクヤウ類生シテ而後
右ノ茶ヲ可用ユ

○子ナキ者ニ子ヲ孕ハラマスル事ハ本味バカリ常ニ用ベシ

○極意口上之一味方

黑豆大 干姜中 蕪ブレ 蕪イ 中 右コレヲ 拵ヤウノ事黑豆生炒等分ニ合

シ童便ニ好酒五倍合シ三日浸シ取上ケ日ニ乾ス又如右
浸シ干スフ三度干ツケテ為細末。干姜コレラハ様ハ寒
中ニ七日水ニ浸シ水ヲ日々ニ替カヘ干シ上ゲ皮ヲ去リ刻
ミ炒末ス。蕪ブレ 蕪イ ト玄ハ雞ノヒヨコノ夏也コレラハ様ハ
湯ヲヨク煮立テ其湯ノ中へ蕪ブレ 蕪イ ヲ入レ暫レク置キ取上ケ
皮カニ毛ヲ去リ陰干ニシテ其後度々干シ虫糞ノ如クニ
成ルヲ用ユルグ 右三品黑豆ヲ漬タル汁ニテ粉ヲ子リ

テ大キニ丸ジ置キコソゲテ用ユルゾ可秘タタ

但シ何レノ加減ニモ中ニ加ヘザレハ不効セムコト也

口上之一味バカリ用ル諸症ノ事。産後フルヒ齒噤ハククヒツメテ

目旋ルトキ。産後子宮出テ久シキニ卵タマゴノ白ミニテ解トキ

塗ルベシ。産後心神ウカクトレテ二年モ三年モ不語コトヲ

ニ。年久シキ赤白帶下ニ諸茶無効ニ用ルベシ。燕ツバメノ油トルヲ右煮ル時其汁ヲ器ウツバニ入置テツ底ニ沉シヅ

ム也ソノ上澄ウハスミヲ捨テ底ノ堅クミンカクテイカノ如クナル

ヲ能ク水氣スイキヲ去リテ置ナリ

○山ト云ハ兔ウサギノ孕子ハラムコヲ黒焼ニスル也

此ハ産後癩瘡ライソウノ時初中後何ノ某ニモ少ツ、加ルゾ又産

前後氏用ル処アリ口傳

○黒ト云ハ男ノ乱髪ヲ黒焼ニス

此ハ難治ノ癩瘡ライソウニ用ユルゾ大方ノ癩ライニハ不用但シ山ト

引合テ不放用ル也山ノ三ノ三ヶ一用ヒルゾ又産ニ用ユ
ル夏アリ口傳

関ノ粉菜方

藍葉大 六月土用ニ採トテ陰干カゲホシニシテ為末

○莖アサカホノ小キ但シ花ノ不咲ルオカ前ニ採リ根ヲ去リ為末○紅花

ノ中ノ實ヲ其終末ス右三味合世付ル塗ル用ルトイフハ
是レナリ

関ノ一味菜ノ方

藍実

新シキヲ佳トス
葉モ同シ

右一味粉ニシテ

用ユルゾ塗りモスルナリ

関ノ額塗菜ノ方

藍葉大 小豆小 黑豆少 右三味合世テ

能ク末シ雞冠ライオンノ生血ニテ糊ヲ延テ張ルソ又糊ハカリニ

テモ付ル是ハ塗ルバカリ也

塗菜秘方

藍実大 甘草少 右二味合テ末シヌル也

此ハ胞衣不下ニ張ル又難産ノ時ニモ又子手足ヲ出シテ
不入ニモ三ノ推百會ズイナドニ塗りテヨシ是中条秘事口傳

ナリ惣シテ中糸流ニハ胞衣不下難産手足出ス等ニ草麻
子ヲ三推百會ニヌリテ紙ニテ張ルト云フハ大事也惡シ
不用ゾ

○香ノ粉某方 香附子春秋二季ニ採テ白水ニ浸シトリ
上ケ又臼ニテ舂キ碎キ石臼ニテ粉ニシテ丹ヲ以テ色ヲ
付ケ薄茶一服程ツ、白湯ニ用

○黄ノ三色某ノ方 黄栢キガミ一夜酒浸シ生ニ炒ニ黒

一ト合せ粉ニシテ生姜糊ニテ〇程ニ丸シ一度ニ七粒ツ、
白湯ニテ用ユ又散某モヨシ一度ニ一日ツ、用ユルソ産
前後痢病又虫ニモ用ヒテ吉

○痢病ノ秘方 餅糸ノ粉炒ト黒ト二色ニシテ砂糖少

右ウス茶一服程ツ、一日ニ三度白湯ニテモ食ノトリ湯
ニテモ可用丸シテモヨシ産前後凡本味ノ間々ニ用ユ

○同産後ニ用ユル某 寒中カ土用カニ糞ノ花バカリヲ

フルイ生姜ノ汁ニ浸シ日ニ干ツケテ生ト炒ト黒ト三品
一二三ト合テ薄茶一服程ツ、一日二三度食ノトリ湯ニ
テ用ユ此モ本味ノ間々ニ用ルゾ

○痢病丸茶 牡丹皮三色一二三ト合シ 山茨菰 等分合

シテ大豆ノ大サニ丸ジニ粒ツ、一日二三度白湯ニテ用

○風毒ノ丸茶 蒼朮^{ニ兩一歩} 黄栢^{四兩一夜酒ニ浸シ日}

右ニ味大豆ノ大サニ丸シ、度ニ三粒ツ、生姜湯天目ニ

半分ニテ用ヒヨ

○待合付茶ノ秘方 産前後ノ部ニ記ス所ノ療治ニテ不

治ハ此茶ヲ可用^{キヤウコシ} 羌根皮 甘松 各等分 右ニ味刻ミ本味

トタケクラベニ合シ又大麦ヲ右茶ノ等分ノ分量ニシテ

食ニタキ少シシルキ程ニシテ^{アタロ}暖ナル中ニ此茶ヲカキ

セ、子合ヲヨクムシ扱^{フレイ}蕪^イノ油ヲ塗リテ又其上ニ本味

ノ黒焼ヲ二重ニ可付ツケ汁ニハ蕪^イノ油ニテモ又卵^{タマゴ}ノ

白ミニテモヨシ蓋ニハ何時モウドノ皮ヲ付ル也

○反張ノ灸　口ノ寸ヲ取テ大推ヨリ下ヘアテ届ク所ニ

大キニシテ一灸ス但シ産前後反張スルニヨシ又本ヲハ

ソニ當テト、ク処ヘ居ルモヨシ

○古血ノ灸所ハ起々セテ竹ヲ足ノ指ニハサマセ臍ヘク

ラベテソノ真中ニテ切りウシロヘ當テ届ク所ノ背筋ノ

正中ニ点ヲ付　○是程ニシテ灸救ハ其人ノ氣根次第ス

ベシ扱右ノ竹ノ本ヲ一寸切テ臍ノ正中通りニ當テ左右

凡一寸ヒラキ両点シ灸　○是程ニシテ救ハ五十壯ツ、ス

ベシ但シ人ニヨルベシ

○腰氣ノ灸　赤白凡ニ吉シ戸渡リノ正中　○是程ニシ

テ二三壯スベシ又小便ノ穴ト子宮ノ穴トノ間サ子ノ下

ニ指ノハラ程フクレタル所アリ是灸所ナリ

中条流某方終

濃州乘付流産方

○催生順氣散 枳殼三分 牽牛子一分 甘草少

○順生散 逆子足ヲ出スニ用ユ

○昊天蓋小 枳壳中 熊膽小

○横子手足ヲ出スニ用ル方 枳壳中 香附子大 甘草

茶各小

○隨醬散 胞衣下 人参小 枳壳大 莪朮小

○止痛散 アト腹 痛ヲ治ス 人参小 枳壳大 莪朮小 以上

板坂流女科

○婦人脾血氣トハ脾寒ヒヤ血弱シテ腹痛コレ也

陳皮 青皮 莪朮 丁香皮 干姜 茴香 甘草各二分

木香 縮砂各一分 山梔各二分 桂心一分 生姜一方 香附子アリ

○婦人血分腫氣 當歸圓 芍藥 當歸 人参 桂心

瞿麥各一兩 葶藶半兩 右末ニ蜜九粒米湯下ス

室女月候行メクラントシテ先腹痛スルハ是血痛也諸症ヲ不問四物湯ニ莪朮三稜ヲ加ハ用ユ若シ大小便結セハ蘓子降氣湯ヲ以テ大便通ス五苓散小便ヲ利ス

○正脾散 莪朮 香附子 茴香 陳皮 甘草 各等分

○加減四物湯 四物湯ニ杜仲 桂心 茯苓 甘草

牛膝 人參 防風 獨活各三分 桑螵蛸二分 細辛二分

秦芈一分 天陰雨ニ生 薑ヲ加フ

○月水滯腹痛スルニ四物湯ニ當皈赤芍藥ヲ倍シ桂ヲ加フ

○妊婦腹痛或ハ胎動下血ニ阿膠炒 熟艾ヲ四物湯ニ加用

○命仙湯 腰氣ヲ治ス 人參二分 丁子 茯苓 肉桂

當皈 川芎 芍藥各一分 甘草少 右水煎加減法▲腹コワラ

ハ莪朮ヲ加フ▲腎氣弱弱キ人ニハ人參ヲ倍ス▲虫氣虫ニ丁

子ヲ加フ▲冬モ同上▲冷タル人ニモ同シ▲氣重重キ人ニ

ハ當皈ヲ減ス▲風症ニモ同▲頭痛目重キニ白芷ヲ加フ

▲熱ニ芍薬ヲ加フ

腸痔多年不愈^{イヘ}下血不止ヲ治スル方 木賊 枳壳^{各二}

干姜^{一兩} 大黄^{一分} 右四味一処ニ炒黑色ニシテ末ニ米湯


ヲ以食前ニ服ス妙ナリ

○瀉血不止ヲ治ス 木賊水煎空心服

腰氣サシ薬 明礬^{二分} 紫貝 蘓方^{スラハ} 梅干 黑燒各一分

右細末シ緞ニ包ミ五六寸バカリ糸ノ緒ヲ付ケ

大キサ



是程ニシテ房内^{バウチ}ヘサスベシ

七日ノ間ニ三度^ド薬ヲ替^カヘヨ

加減法如左

○腹コワラバ腰湯サスベシ ▲腰張り腹ハルハカヲ竹ノ

根ヲ煎ジ塩ヲ入レ腰湯サスベシ ▲氣力弱^{ヨク}キ人ニハ明礬等

分ニスベシ 砒^{カキ}力強キ故ナリ ▲腹張り痛ムハモムベシ ▲

物下ル時ハ枳壳^{カキ}核霜^{カキ}一分加ヘヨ ▲薬サシテ後腹ハルハ必

驗ヲ得ルノ證ナリ▲ウドンノ様ナル物下ル柿渋ノクサ
リタル様ナル物下ル又薄赤キ物下ル又フノリヲ解タル
様ナル物下ル又不下_ラトモアリ不苦_{カラ}内茶ニハ右ニ記ス
命仙湯ヲ可用

○同一方 明岩焼 紫根_{水ニ浸} 輕粉_少

右細末シテ コレ程ニ緇ニ包ミ_{ハウチ}房内ニサスベシ

内茶同前命仙湯ヲ用_ユ 板坂派女科終

瀨之尾流産前後方

○産前方 安胎_ヲ寛氣_ヲ進食_ヲ瘦胎_ヲ易産_ヲ或ハ胎動胎漏_ヲ

下血ニハ佛手散或ハ枳殼散ニ此茶ヲ兼用ユベシ

保氣散 香附子_{四兩} 山棗_{二兩} 縮砂_{一兩} 木香_{四錢} 益智

紫蘓 甘草_{各半兩或} 右水煎又細末シテモ用ユ

○産前風寒ヲ治ス又進食_ヲ平胃散_ヲ宜服之_ヲ 蒼朮_{五兩}

厚朴_{三兩} 陳皮_{三兩} 甘草_{三分} 六味ノ加減茯苓良姜_{各二兩} 一方除

良姜加人參産前ニハ 八味ノ加減縮砂香附子丁子 各二兩
厚朴良姜ヲ去ル

加へ細末ス或ハ煎服ス脉散ズル時ハ塩湯ニ調下ス

○産前一切煩ワライニハ四物湯ニ枳壳ヲ加へ用ユ産月常ニ用ユ

○難産逆産ニハ兔頭黒焼一各温湯ニテ服ス但シ胎内ノ子欲

生時可用若シ早ク服スル時ハ足ヨリ生ル也一服ニテ不

生ハ重テ又服ス或胎生レカ子ルニ甚効ヲ得タリ

○胞衣不下ニ 抽実 抽 黒焼或陰干温湯ニテ服スフリラ

加へテ早
由ニ用ユ

○産前後血上リタルニハ伏龍肝 水菖温湯ニテ用ユ

○同風氣ニハ四物湯九文散 各半調合服ス

○同血道并産後面腫血上リヲコリサメ有ニ益母散ニ荆

芥二兩川芎一兩沢蘭三分右水煎又散茶ニテモ用ユ

○同血道并手肩ニハ益母艸二兩イノシリ草三兩フルセ

アサ 三兩童便 右細末
製黒ヤキ

○同血道身ノ毛立チ面赤キニ宜_レ人参當_レ散_ニ 麦門冬

人参 肉桂 當_レ散 生地黃 芍_レ藥 各等分 右如常煎服ス

○難産或_ハ死胎或_ハ胞衣不下_ラニハ當_レ散 赤芍 川芎 各一兩

牛膝 二兩 延胡索 一兩 右煎服

○産後四物湯ニ地黃ヲ去リ莪朮 二分 加_レ用_ニ腹痛ノ時

ハ三分加_フ寒ニハ干姜ヲ加_ヘ血不下_ラニ桃仁ヲ加_ヘヨ_ノ惣

産後ニハ某灸ルハ惡シ 痰血留ル何某モ同シ

○産後黒茶 アト腹血ノ道諸事ニ用_ニ 女髮 黒ヤキ 一兩

フルセアサ 黒ヤキ 一兩半 女鹿ノ頭 黒ヤキ 二兩 右酒或ハ湯ニテ用_ニ

○産後古血不下_ラ胞衣不下_ラニ四物湯延胡索柚ノ黒焼加_レ用

○産後血シバリ又ハ手肩ニ此藥用ル片ハ帯ヲ解キ枕ヲ

高クシテ休_マセテヨシ 人参 沉香 各等分 金_ハ玉 陰干ニテ 數テ摺

少葱 ニ寸 味噌 少丸ル 右煎_ニ用_ニ

○同血シバリ 人参 川芎 黃連 各等分 甘草 少

右水煎散ニシテ用ル時ハ塩湯ニテ服ス帶ヲ緩メヨ

○産後アト腹ニハ當皈 良姜 芍薬 肉桂 香附子各二分

甘草少又黒神散ヲ用ルモ佳ナリ

○神仙散 産後常ニ用テ佳也 當皈一兩 川芎三分 人參

一兩二分 干姜二分 紅花二分 右細末シテ用ユ又蜜丸ニスル時

ハ延命丹ト名ク

○當皈散 婦人百病ヲ治ス兼テ産後腹痛ヲ治ス

當皈半兩 芍薬三分 熟地黄三分 蒲黄半兩 桂枝一兩半 甘草一分

○黒神散 産後胸先ハサキヘコミ込揚ケフクレ口渴カハキ目眩メニイ譫言メワコト眼

色黒ク臍腹脹リカタク鼻血惡露不盡ツキユナ胞衣不下ル腹痛口噤ツツミ

諸疾ヲ治ス 熟地黄 當皈 桂心 芍薬 干姜 蒲黄

炒甘草各四兩 黑豆炒去皮 右細末每服二目酒半盞童便半盞

煎服▲胞衣不下アト腹痛ニ延胡索ヲ加ヘヨ▲熱強ツヨクハ

柴胡大ヲ加フ

○失笑散 產後心腹痛欲死百棊不効ニ用ヒテ愈ユ又痴

氣急引筋欲死ヲ治ス 蒲黃凡失血ノ者ニハ生ヲ用 五靈脂酒水モソ土砂ヲ去。炒。麻油

三五滴入レバ細ニナリ安シ 右等分細末シテ用ユ又醋ニ

入熬成膏 又水一盃入レ七分ニ煎シ食前熱服ス

○產後及吐百棊不効ヲ治ス 橘皮 生姜 桔梗

右細末水煎九種阿伽佗圓兼服ス

○吳茱萸湯 產後腹痛ヲ治ス 桔梗 防風 干姜

甘草炒 當皈炒 細辛各半 吳茱萸一兩 乾地黄三分 石水煎

又末シ用ユ

○產後血暈心氣絶スルヲ治ス 益母絞汁一

又黑炒童便製ニシテ用ユ

○三稜散 產後惡血不散結聚成塊セケツレ或ハ時ニ寒熱シ不思

飲食ヲ治ス 荊芥 熟地黄 穿山甲各一 挂心 當皈

川芎 牡丹皮 赤芍藥 劉寄奴各半 大黃 桃仁 牛膝

各三 右粗末每服三々紫蘓 一各 生姜 三片 水煎七分服之

○万病圓 婦人月候不来繞臍痛及産後血氣不調腹中生

癥結不散又寒疝痛ヲ治ス 乾漆 焙煙青白クナルニテ 牛膝

酒浸一宿 右細末シ生地黄汁一升 入燻火熬梧桐子大二九

シ空心米飲又温酒ヲ以テ下ス日ニ二九病去ラハ某ヲ止

メヨ妄ニ勿加丸

○車前子散 難産ニ用ユ 車前子 炒半 滑石 半両 榆白皮

一両 當皈 半両 瞿麥 炒 一両 右末ノ二々酒服

○滑胎散 難産ニ用ユ 榆白皮 牛膝 麻仁 各一両

瞿麥 木通 各三 右末ノ酒服

○牛膝散 胞衣不下ニ用ユ 牛膝 酒浸 葵子 各三 榆白皮

瞿麥 各二 生地黃 一両 右末ノ酒服

○産後中風并ニ氣ノ滯リ或ハ多年小便血下リハ味煩氣

散ニヨロシ 人參 白朮 茯苓 青皮 白芷 陳皮

烏茶 當飯各等 生姜三片 右水煎 一方有甘中一各

○產後偏身針ニテ如刺痛ムハ血風也又寒熱往来昼靜ニ
夜劇シク妄言譫語シ鬼神ノ狀ヲナスハ熱血室ニ入ル也
四物湯柴胡ヲ加ヘ用ユ不退ハ小柴胡湯ニ生地黃三兩ヲ
加フ又後發熱渾身拘急セバ四物湯 參飯湯前ニ 逍遙散
或ハ牡丹皮 山梔子炒 加ヘ用ユ
瀨尾流產方終

予嘗撰中条家產書小冊令書肆某氏梓
焉其書大行于世而猶憾其多遺漏再探
續中撰切日用者数十条與之欲以小補
於產科者流云爾

村山林益撰

附錄

夢生之說 物理小識以此為悶寂生

彭用光體仁彙編曰婦已產生下孩兒但
不能發聲謂之夢生庸俗不知此理遂棄
而不救極為可憫今凡有此切不可斷臍
帶將胞衣火燒灸令火氣入孩兒之腹內
兒身已煖卻取猫一隻青衣包裹其頭足
令一乖覺婦人奔住用猫頭在兒耳邊卻
以手捉住猫頭婦人以口齒著力咬破猫

耳猫遂大叫一声孩兒即醒開口發聲能
省眼開遂得長生矣又物理小識曰兒生
墮不啼擊木瓢迫猫令叫即啼中通曰俗
稱不啼兒為悶寂生旁人呼其父應兒即
啼

斯二說雖難信以諸方書所無而識者
幾希故姑附錄于此且為和解以示童

蒙吁世之妄醫見孩兒生下身冷眼合
不發聲不動四肢皆以為死胎遂棄而
置之度外可不嘆乎若夫兒身稍冷亦
未至於骨節強直者即用此法或甦矣
有其任者不可不知也

夢生之說和解

體仁彙編ニ曰ク凡子生下テ初声ヲ揚ザルヲ夢生
ト云フ素人醫者コレヲ活ス直ヲ不知死胎トナシ
テ棄ル者多シ若シホウセイノ子アラバ必先臍ノ帶
ヲキラズ直ニ胞衣ヲ火ニテ得ト炙リ其温リ子ノ
腹ノ内へ入バ身モツコテ温カニ成ナリ扱又猫一隻
トラヘ藍染ノ絹ニテ頭モ足モイクエモ能ク包ミ身
ヲ働キ人ヲカヌヤウニシテ氣ジヤウナル女ニ両手ニ

持せ猫ノ頭ヲ子ノ耳ニトクト押アテ齒ニテ猫ノ
 耳ヲカ一^{カラ}バイ咬切^{カミキル}ハカリニ咬スレバ猫ハ痛ニ忍^{コシ}カ子大
 声アゲテ叫^{サケブ}トヒトシク子ハ其マ、氣付テ口ヲ開^{ヒラ}キ
 声ヲアゲ目ヲ開キ長ク別条ナシ此下物理小識、和解畧マ
 右和解^{ワカイ}讀者^{ヨムモノ}ヨク合^{カッテ}点^テシテ其ノ事ノ成ヤスキヲ本トス
 故ニ其意^{ソノイ}ハ本文ト違^{タガ}ハズトイヘル其詞^{コトバ}ニ於テハ増減^{ゾウケン}
 スルモノ多シ

安永七年戊戌十一月發行

