



門中武
329
卷



類聚方自序

益之學也方為牙。於黃氏

顛矣。靡泮而聞已。周室之

盛。心療萬民之病。則有益

職之設。其既有益職之設。



類聚方

卷

一

二

三

其法定可不精為。惜夫官
失其職。藉滅其傳。述方之
士。奚所得其門而入之。而
觀藥齊之富。法術之妙。采
後有曰扁鵲者。謂秦越人

清虛亭

也。名著天下。余初讀其傳。
少覺疾益之法。竊以為己
師。然而扁鵲之沒也。藉二
不傳。去雖有祈嚮者。其奈
之何。當漢之時。張氏之為

類聚方

二

二

二

二

方也。雖後稍後商。而其
藥齊之富。法術之存。蓋莫
古焉。而蓋之學也。方焉。
吾亦何未。疾蓋之法。其百
以復耶。曰。何不可也。吾常

恨其世之與時。後藉非其
焉。將繫之法。家以復之。於
古。仲蓋氏。吾如爾何。自漢
已降。以人。以藉。孰可以憲
章者。吾其捨此。亦何依。遂

心。扁鵲為法。法。張氏之籍。
 欠之。而後知。扁鵲之與。此
 氏。並法一也。乃今而後。味
 之。淄澠。可以辨。見之。毫釐。
 可以晰。而後。若置其身於

于載之上。親受其指揮也。
 蓋夫張氏之籍。之難讀也。
 方之與。謹之。教在諸篇。使
 夫學者。惑焉。今也。列而類
 之。附心。已所見。其有疑者。

矩之心方焉。名曰類聚方。
庶穿使夫學者。雖非易牙。
淄澠可以味矣。雖非離婁。
準鑿可以見矣。遂命剖劂
之師。遺之篤信好古之士。

云甫。

案曆壬午夏六月

何岐吉益為則撰



頤泉方

此處為書中內容，因字跡模糊，難以辨認。

類聚方序
欽繇嘗患血疰。五六年矣。骨將
枯矣。東洞翁肉馬。爾後相得而
歡。薦欽繇於醫事。混然途之人
也。乃比之耳目其術奏效。間聞
為其徒。辨惑之畧。曰。唐宋來。方

類聚方序 蒲盧亭

技家無慮數十。丹溪東垣輩稱其時其論著鑿空張虛如其持之有故其言之成理而無益於術。投饑餓以土羹乎。救決河用枯蘄乎。而近世醫或一毒同症而投其劑。朝更夕改其莽之設。

令乎。或一毒異症仍貫乎。其施其守株刻舩乎。而或其中非爾力也。病者天幸已非然。則諺云。驅飯上蠅耳。豈視越人所論。仲景所傳。以為周之冕不可冠。殷之輅不可乘乎。奚不能自開一

眼以蹈冥故途甚矣世醫之墨
也乃使秦張二子謂千歲無
知己此胡異乎見表石為鬼兒
藏燕石為大寶雖素非芒輒侵
措者面墻使然乎即有一說悼
驚人耳換面陳言而丹溪東垣

輩之尸之祝及或見讀古方書
者又億然猥以徒敝精神奚
乃為此方枘圓鑿安所施之且
利之昧心也使志不立彼何論
於救濟張氏所謂寧不利於病
不拂富家心其簧巧求售如假

類聚方
卷之
三
論
三

類聚本
六十一
三
蒲蘆亭
飾妖娣倚閭求歡者不自知其
陋又不耻其耻焉則又何進焉
噫即使為則沙汰其砂礫簸揚
其批糠乃不能以一旦遽洗滌
世醫舊染夏蟲疑冰不亦類乎
亦唯候後世之公言耳蓋詭隨

僂子聞此語豈不謂避竈猶煬
沾背出汗乎詩云我思古人
俾無訖兮東洞翁之謂也蓋東
洞翁壯年前憤厲激發立志其
復古焦心覃思更唐宋失機縱
敵之弱謀張秦張應褒摧堅之

紀律乃遂揭旗幟其道振金鼓
其黨亦惟繼絕存亡矣斯亦謂
典秦張二氏千歲而比肩也不
亦宜乎往年醫斷出則若夫金
科玉條乎腐論迂說者瞠然疑
之愕然駭之勾以彈之訑以拒

之或自覺昨非以思改轍而以
日莫途遠倒行逆施或闔然自
揜寄托遺簪弊履乃巧其道籜
鬻其苦窳者或托神奇其道假
儒飾其業乃謂攻異端斯害已
者亦有之如思折伯牙之指願

摧王良之手者亦有之。余聞之
人言。稍黠者。陽排斥東洞。譙訶
其說。陰謄抄其著稿。用以為帳
秘。而緣飾其術。往往取其効者
亦有之。亦惟繫縛於名。漠溘於
利也。雖然。醫斷已出。牖後進。杖

心旨。乃漆指于古。或千里負笈
委然就學。或聞風而弗然興者。
不為不多矣。古人云。涉淺水者
見蝦。其頗深者。察魚鼈。其尤者
觀蛟龍。焉知世不有深入於刀
圭之道者乎。則知東洞者。何候

後世乎。其著藉追踵出則又焉
知不有初聘睨者。心竊若小巫
於翁而神氣竭耶。間者刊其類
聚方。是亦不啻設左右廣而導
之前茅也。一日謂余曰。世謀其
著之顯。而請其序也。或以貴。或

以名。假其燿輝。余也不然。幸以
子之識為則也。題一言。夫名之
剖發於海內。此藉自白矣。且欽
繇不知醫事者也。何為重於此
舉。但書諄誨其徒之緒餘。以為
序。是已已。而豈足盡東洞翁采

豈足盡東洞翁乎。
室曆癸未之春

美濃

武欽繇撰



凡例

始我先生之編類聚方也。軌在左右，躬受其
凡例，此書之就成也。軌之所錄，其凡之例亦
已備矣。乃不敢私之，敢措諸卷首，以布諸同
志之士。乃我先生之編類聚方也。凡例如左。
一昔者張氏之書，其散軼也久矣。晉大鑿命王
氏叔和集爲之次。至今學者受其賜矣。雖然，
叔和其識之未優也。加以私言，珷夫燕石俄

然收之而后之讀之亦不知擇焉見以爲一
圭一璧此盡希世之寶也嗚呼可悲夫乃今
悉取其空言虛語也臆說理義也痛極刪削
然後譬之崑崙玄圃無非圭璧者此所以爲
仲景雪冤而爲學者發贖也

一 仲景之書蓋一而已岐爲二三別病頒方抑
亦後人之撰葺夫鑿之處方也隨證以移惟
其於同也萬病一友惟其於變也一毒萬方

故鷄壅豕零時爲帝也莖及桔梗互爲宰也
奇乎正乎縱橫取舍鑿師之術也此書本不
別病也不頒方也亦其志之所存慮
一 蓋方之所貴也不在古今期于治疾論之所
貴也不在新故期于有事故方能治疾也不
問古今論若繫于事也不在新故惟是所以
汲汲于治疾也

一 諸方以類就位又以類之變猶八卦之旋爲

六十有四處其慎斯術也以往其方之用與藥之能可得而言矣

一原文有舉脉之例而措病之證焉有稱病之名而略形之狀焉凡今學者宜以此推彼矣

一諸方或無其証也証或無其方也則據傍例攬摭之加諸焉則之按焉者以異於其舊蓋皆不苟用私說也於藥徵虜見之

一仲景之書方之與証其所載也散在諸篇如

觀其證之全也因非急索焉而所能得矣今之於蒼卒也無有子遺矣

一諸方而在於諸論之中無一不載焉其空言虛語臆說理義既已非夫疾鑿之事則域焉而異之所以燭乎昧行之徒也亦惡其辭而域焉終沒其證也是故有域焉而刪焉者有域焉而指擿焉者凡其學者其能詳之矣

一凡其不試者十有八方也附之于後以俟後

桂枝附子湯^九 桂枝附子去桂加朮湯^九
 桂枝去芍藥加苓朮湯^十
 桂薑棗艸黃辛附湯^十
 桂枝去芍藥加皂莢湯^{十一}
 桂枝加龍骨牡蠣湯^{十一}
 桂枝芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯^{十一}
 桂枝加芍藥去黃芩人參湯^{十二}
 桂枝二麻黃一湯^{十三}

桂枝二越婢一湯^{十四} 桂枝麻黃各半湯^{十三}
 小建中湯^{十四}
 黃耆建中湯^{十四} 黃耆桂枝五物湯^{十五}
 黃耆桂枝苦酒湯^{十五} 桂枝甘艸湯^{十六}
 半夏散^{十六} 桂枝甘艸附子湯^{十六}
 桂枝甘艸龍骨牡蠣湯^{十七}
 桂枝人參湯^{十七} 人參湯^{十八}
 茯苓甘艸湯^{十九} 茯苓杏仁甘艸湯^{十九}

類聚方 目錄 二 卷之三 歲

茯苓戎鹽湯_{二十}

葵子茯苓散_{二十}

苓薑朮甘湯_{二十一}

苓桂朮甘湯_{二十一}

苓桂甘棗湯_{二十二}

苓桂五味甘艸湯_{二十二}

苓甘五味薑辛湯_{二十三}

苓甘薑味辛夏湯_{二十三}

苓甘薑味辛夏仁湯_{二十三}

苓甘薑味辛夏仁黃湯_{二十四}

茯苓澤瀉湯_{二十五}

澤瀉湯_{二十五}

五苓散_{二十三}

茵陳五苓散_{二十七}

猪苓湯_{二十七}

猪苓散_{二十七}

牡蠣澤瀉散_{二十八}

八味丸_{二十八}

栝蒌瞿麥丸_{二十九}

麻黃湯_{二十九}

麻黃加朮湯_{三十一}

麻黃甘艸湯_{三十一}

麻黃附子甘艸湯_{三十一}

麻黃附子細辛湯_{三十二}

麻黃杏仁甘艸石膏湯_{三十三}

麻黃杏仁薏苡甘艸湯_{三十三}

牡蠣湯_{三十三}

麻黃淳酒湯_{三十四}

類聚方

目錄

三

卷之三

半夏麻黃丸 二十四

小青龍湯 二十五

大青龍湯 二十六

文蛤湯 二十七

越婢湯 二十七

越婢加朮湯 二十八

越婢加半夏湯 二十八

葛根湯 二十八

葛根加半夏湯 二十九

葛根黃連黃芩湯 二十九

小芫胡湯 四十一

柴胡加芒消湯 四十五

芫胡去半夏加枳實湯 四十五

柴胡薑桂湯 四十六

芫胡加桂枝湯 四十六

芫胡龍骨牡蠣湯 四十七

大柴胡湯 四十七

白虎湯 四十八

白虎加人參湯 四十九

白虎加桂湯 五十

小承氣湯 五十

厚朴三物湯 五十三

厚朴七物湯 五十三

大承氣湯 五十三

大黃黃連瀉心湯 五十八

瀉心湯 五十八

附子瀉心湯 五十九

大黃附子湯 五十九

大黃甘遂湯 五十九

抵當湯 六十一

抵當丸 六十一

頭

目

類聚方
卷之五
四
二
蒲葶亭藥

橘皮大黃朴硝湯 六五

大黃硝石湯 六五

大黃牡丹皮湯 六二

大黃甘艸湯 六二

調胃承氣湯 六三

桃核承氣湯 六十七

下瘀血湯 六五

土瓜根散 六十五

甘艸湯 六五

桔梗湯 六六

排膿湯 六六

芍藥甘艸湯 六六

甘遂半夏湯 六十七

芍藥甘艸附子湯 六十七

甘麥大棗湯 六八

甘艸粉蜜湯 六八

生薑甘艸湯 六八

甘艸干薑湯 六十九

四逆湯 七一

通脈四逆湯 七十一

四逆加人蔘湯 七十二

茯苓四逆湯 七十三

通脈四逆加豬膽汁湯 七十三

干薑附子湯 七十三

附子粳米湯 七十三

薏苡附子散 七十四

薏苡附子敗漿散 七十四

白通湯 七十四

白通加豬胆汁湯 七十四

大烏頭煎 七十五

烏頭湯 七十五

類聚方

類聚方 卷之八 目錄 五 蒲葶亭藏

赤丸 七十六

真武湯 七十六

附子湯 七十七

天雄散 七十八

梔子豉湯 七十八

梔子甘艸豉湯 七十八

梔子生薑豉湯 七十九

枳實梔子豉湯 八十

梔子大黃豉湯 八十

茵陳蒿湯 八十

梔子蘘皮湯 八十一

梔子厚朴湯 八十一

梔子干薑湯 八十二

大陷胸湯 八十二

大陷胸丸 八十三

小陷胸湯 八十四

括蕒雄白白酒湯 八十四

括蕒雄白半夏湯 八十五

瓜蒂散 八十五

文蛤散 八十五

大半夏湯 八十六

小半夏湯 八十七

生薑半夏湯 八十七

小半夏加茯苓湯 八十七

半夏苦酒湯 八十八

半夏厚朴湯 八十八

半夏乾薑散 八十八

干薑人蔘半夏丸 八十九

半夏瀉心湯 八十九

甘艸瀉心湯 八十九

生薑瀉心湯 九十

吳茱萸湯 九十

本草綱目 卷之八 目錄 五 蒲葶亭藏

厚朴生薑半夏甘州人蔘湯 九十八

黃連湯 九十一
干薑黃連黃芩人蔘湯 九十二

大建中湯 九十二
黃連阿膠湯 九十三

黃芩湯 九十三
黃芩加半夏生薑湯 九十四

六物黃芩湯 九十四
三物黃芩湯 九十四

白頭翁湯 九十五
白頭翁加甘州阿膠湯 九十五

木防己湯 九十五

木防己去石膏加茯苓芍藥湯 九十六

防己茯苓湯 九十六
防己黃耆湯 九十七

枳實芍藥散 九十八
枳朮湯 九十八

排膿散 九十八
桂枝枳實生薑湯 九十八

枳實薤白桂枝湯 九十八
橘皮枳實生薑湯 九十九

茯苓飲 九十九
橘皮竹茹湯 一百

橘皮湯 一百
桂枝茯苓丸 一百

芎歸膠艾湯 百一
旋覆花代赭石湯 百一

赤石脂禹餘糧湯 百二
桃花湯 百一

頁 目錄 二 七

類聚方
卷之九
百三
百四
百五
百六
百七
百八
百九
百十
百十一
百十二
百十三
百十四
百十五
百十六
百十七
百十八
百十九
百二十
百二十一
百二十二
百二十三
百二十四
百二十五
百二十六
百二十七
百二十八
百二十九
百三十
百三十一
百三十二
百三十三
百三十四
百三十五
百三十六
百三十七
百三十八
百三十九
百四十
百四十一
百四十二
百四十三
百四十四
百四十五
百四十六
百四十七
百四十八
百四十九
百五十

大猪膽汁方 百三

蜜煎導方 百三

酸棗仁湯 百四

葶藶大棗湯 百四

麻仁丸 百四

已椒藶黃丸 百五

蜀漆散 百五

十棗湯 百五

桔梗白散 百六

走馬湯 百七

備急圓 百七

礬石湯 百八

消礬散 百八

礬石丸 百八

蛇狀子散 百九

不試功方

雄黃薰 百十

頭風摩散 百十

皂莢丸 百十

葶藶湯 百十一

當歸生薑羊肉湯 百十一

蒲灰散 百十一

滑石白魚散 百十二

猪膏髮煎 百十二

栝葉湯 百十二

黃土湯 百十三

雞屎白散 百十二

蜘蛛散 百十三

狼牙湯 百十三

小兒疳蝕方 百十四

類聚方
目錄
百九
百十
百十一

竹葉石膏湯 百九

麥門冬湯 百十

當歸芍藥散 百九

歸母苦參丸 百十

蘇黃煎
不結散
煎丸
煎丸
煎丸

類聚方

日本
藝陽
石陽
中邨貞治子亨按

桂枝湯
桂枝 三兩
芍藥 三兩
甘艸 二兩

生薑 三兩
大棗 十二枚

右伍味咬咀以水柒升微火煮取三升去滓
適寒溫服一升服已須臾歎熱稀粥一升餘
以助藥力溫覆令一時許遍身漿漿微似有

類聚方
百九
百十
百十一

汗者益佳不可令如水流滴病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出齋齋惡寒漸漸惡風翁翁發熱鼻

鳴乾嘔者○太陽病頭痛發熱汗出惡風者○太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之○太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府卻與桂枝湯則愈○太陽病三日已發汗若吐若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆隨證治之○桂枝本為解肌若其人脈浮緊發熱汗不出者不

可與也常須識此勿令誤也○若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也○太陽病外證未解脈浮弱者當以汗解○太陽病外證未解者不可下也下之爲逆欲解外者○太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈○病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣

不共榮氣和諧故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈○病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈○傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄○傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當

救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏
宜四逆湯救表宜桂枝湯○太陽病發熱汗
出者此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風者
○傷寒太下後復發汗心下痞惡寒者表未
解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解
表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯○陽
明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發
汗○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所

發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者
宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯○
太陰病脈浮者可發汗○下利腹脹滿身體
疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻
表桂枝湯○吐利止而身痛不休者當消息
和解其外宜桂枝湯少和之○下利後身疼
痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗○
婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒

熱名娠桂枝湯主之於法六十日當有此
證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之
○產後中風續之數十日不解頭微痛惡寒
時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽且證續
在耳○服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝
湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜
桂枝二麻黃一湯水浸桂枝湯方內加桂二兩
桂枝加桂湯於桂枝湯方內加桂二兩

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔
豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與

桂枝加桂湯

桂枝加芍藥湯

兩芍藥

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太

陰也

為則按腹滿時痛者即拘急而痛也是以

芍藥為主爾

桂枝芍藥湯

於桂枝湯方內芍藥

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝芍藥湯
主之若微惡寒者芍藥方中加附子湯主
之

為則按不拘急故芍藥也

桂枝加葛根湯

於桂枝湯方內加葛根四

兩

太陽病項背強几几反汗出惡風者

桂枝湯方內加括蘆根二

兩

天陽病其證備身體強几几然脈反沈遲此

為瘧

出為則按桂枝湯之症而渴者主之

桂枝加黃耆湯

於桂枝湯方內加黃耆二

兩

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食
已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也若汗
出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止
者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必
身瞶即胸中癰又從腰以上必汗出下無汗
腰體弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身
疼重煩燥小使不利此為黃汗○諸病貴家
但利其小便假令脉浮當以汗解之

類聚方
六
蒲蘆亭

合為則按黃耆主治波膚水氣可考藥徵合

桂枝加芍藥大黃湯煎於桂枝加芍藥方內

加黃一兩

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太

陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加

大黃湯主之

林為則按桂枝加大黃湯因桂枝加芍藥湯

林加大黃者也故方名從之

類聚方
二
青蘆亭

桂枝加厚朴杏子湯

於桂枝湯方內加厚

朴二兩杏子五十個

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳○太陽病下

之微喘者表未解故也

為則按當有胸滿證

烏頭桂枝湯

烏頭五枚

桂枝一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五

合解之得氣升後初服二合不知即服三合

又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者

為中病蘇頌寒毒入於藥中

寒痲腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺

諸藥不能治抵當用此方

桂枝為則按是烏頭煎而合桂枝湯方也當列

於烏頭煎方下今列之桂枝加附子湯者示

其異也又按煎法可依大烏頭煎之法

桂枝加附子湯

於桂枝湯方內加附子一

枚

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小使難四
支微急難以屈伸者

桂枝去芍藥加附子湯 於桂枝去芍藥湯

方內加附子一枚

太陽病下之後脈促胸滿者桂枝去芍藥湯
主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主
之

桂枝附子湯 桂枝兩 附子三枚 小豆麻米

生薑三兩 甘草二兩 芍藥四兩 附子三枚 小豆麻米

右五味以水六升煮取三升去滓分溫三服

傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不能自轉

卦 側不嘔不渴脈浮虛而濡者桂枝附子湯主

之若其人大便鞭小便利者去桂枝加朮

湯主之

為則按當有上衝證此方與桂枝去芍藥

加附子湯同而治與方名異彼方下曰微惡寒此方下曰身體疼煩惡寒輕疼煩重獨在附子之多少也已

桂枝附子去桂加朮湯

於桂枝附子湯方

內去桂加朮四兩

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如舂狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得

除故月

傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴麻浮虛而瀦者桂枝附子湯主之若大便鞭小便利者

為則按桂枝附子湯證而無衝逆者也

桂枝去桂加苓朮湯

於桂枝湯方內去桂

加苓朮各參兩

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無

蒲蘆亭藥

汗心下滿微痛小便不利者
為則按當有心下悸之證

桂薑棗艸黃辛附湯 桂枝三兩

生薑三兩 甘艸二兩 大棗十二枚 麻黃

細辛各二兩 附子一枚

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮
取二升分溫三服當汗出如虫行皮中即愈
氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

為則按證不備也此方合桂枝去芍藥湯

與麻黃附子細辛湯也證當於二方之下

求也藥微有辨

桂枝去芍藥加皂莢湯於桂枝湯方內去

芍藥加皂莢二枚

肺痿吐涎沫者

桂枝加龍骨牡蠣湯於桂枝湯方內加龍

骨牡蠣各三兩

類聚方

夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落脉極
虛芤遲爲清穀亡血失精脉得諸芤動微緊
男子失精女子夢交

爲則按當有胸腹動證

桂枝芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

桂枝三兩 甘草二兩 生薑三兩 牡蠣五兩

大棗十二枚 蜀漆三兩 龍骨四兩

右爲末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內

諸藥煮取三升去滓溫服一升

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥

不安者○火邪者

內爲則按當有胸腹動而衝逆之證

桂枝加芍藥生薑人參湯

加芍藥生薑各二兩 人參三兩

發汗後身疼痛脉沈遲者

爲則按當有心下痞鞕或拘急或嘔證

桂枝二麻黃一湯

桂枝一兩七銖

芍藥一兩六銖

麻黃六銖

生薑一兩六銖

杏仁十六個

甘草二兩

大棗伍枚

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解

桂枝二越婢一湯

甘州各十銖

生薑一兩三銖

大棗四枚

麻黃八銖

石膏二兩四銖

右柒味以五升水煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

大陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗

桂枝麻黃各半湯

芍藥一兩六銖
生薑一兩六銖
甘草二兩
麻黃一兩

大棗

四枚

杏仁

二十個

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升捌合去滓溫服陸合

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得少汗出身必痒

小建中湯

桂枝

三兩

甘草

三兩

大棗

十二枚

芍藥

六兩

生薑

三兩

膠飴

一斤

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脈澀陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯主之○傷寒二三且心中悸而煩者○虛勞裏急悸衄腹

中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥
○男子黃小僂自利○婦人腹中痛

為則按當有腹中拘急之證其方類芍藥
甘州湯也

黃耆建中湯 於小建中湯方內加黃耆一
兩半

虛勞裏急諸不足
為則按當有盜汗黃汗之證又曰桂枝加

芍藥湯當入于此而以有桂枝之名列于
彼也

黃耆桂枝五物湯

黃耆 三兩

芍藥 三兩

桂枝 三兩

生薑 六兩

大棗 十二枚

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三

服

面痺病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚
盛重困疲勞汗出臥不時動搖加被微風遂

得之但以脉自微瀦在寸口關上小緊空鉞引陽氣令脉和緊去則愈血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀

為則按桂枝加黃耆湯證而嘔無急迫者

黃耆桂枝苦酒湯

黃耆五兩

芍藥三兩

桂枝三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩

不止者以苦酒阻故也

黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如藥汁脉自沈何從得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之

桂枝甘艸湯

桂枝四兩

甘艸二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服○發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者為則按當有急迫證

半夏散

半夏

桂枝

甘艸

各等分

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸七日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸七夏煎三沸下火令少冷少少嚥之

列陰病咽中痛

桂枝甘艸附子湯

甘艸二兩

附子一枚

朮二兩 桂枝四兩

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升

日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者

服五合恐一升多者服六七合○風濕相搏

骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出

短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

天為則按當有衝逆之證

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯

桂枝一兩

甘艸二兩

龍骨二兩

牡蠣二兩

類聚方

十一

春

右爲末以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

灭逆下之因燒鍼煩躁者

桂枝人參湯

桂枝^{四兩} 甘草^{四兩}

朮^{三兩} 人參^{三兩} 乾薑^{三兩}

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升日再夜一服○太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止

心下痞鞭表裏不解者

人參湯理中丸也

乾薑^{各三兩}

右四味搗篩爲末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合和丸研碎溫服之日三服夜與服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服一升日三服加減法若臍上築者腎氣動也去

尤加桂四兩吐多者去尤加生薑三兩下多者還用朮悸者加茯苓二兩渴欲得水者加朮足前成四兩半腹中痛者加人參足前成四兩半寒者加乾薑足前成四兩半腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被○霍亂頭痛發熱入身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之○大病差後喜唾久不

了了者胃上有寒當以丸藥溫之○胸痹心中痞留氣結在脘胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

茯苓甘州湯主之 茯苓二兩 桂枝二兩 生薑三兩

甘州二兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者○傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘州

湯卻治其厥不爾水漬入胃必作利也

為則按當有衝逆嘔吐證

茯苓杏仁甘艸湯

茯苓三兩

杏仁五十個

甘艸一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三

服不差受服

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘艸湯主之

橘枳姜湯亦主之

茯苓戎鹽湯

茯苓半斤

戎鹽二兩

戎鹽

彈丸大一枚

右三味先將茯苓煎成入鹽再煎分溫三

服

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎

鹽并主之

為則按當有心下悸證又按此方煎法不

密依他例當以水六升煮取三升去滓內

茯苓戎鹽一二沸分溫三服

茯苓

戎鹽

二清靈亭賦

葵子茯苓散

葵子

一斤

茯苓

三兩

右二味杵為散飲服方寸七日三服小便利則愈

妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩

為則按當有心下悸證又按葵子一斤本

艸綱目作三兩今從之

苓薑朮甘湯

甘艸

朮

各二兩

乾薑

茯苓

各四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中

即溫

腎者之病其人身體重腰中冷如坐水中形

如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下

焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷

痛腰重如帶五千錢

為則按當有心下悸證

苓桂朮甘湯

扶苓兩四

桂枝兩三

朮兩二

甘艸兩二

右四味以水六升煮取三升去滓分溫參服傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沈緊發汗則動經身為振振搖者○心下有痰飲胸脇支滿日眩○夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之

苓桂甘棗湯

扶苓兩半

甘艸兩三

大棗十五枚

桂枝兩四

甘艸兩四

右四味以水一斗先煮扶苓減二升內諸藥取三升去滓溫服一升日三服發汗後其人臍下悸者欲作奔豚

為則按當有腹拘急證

扶桂五味甘艸湯

扶苓兩四

桂枝兩四

甘艸兩三

五味子半升

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服
欬逆倚息不得臥小青龍湯主之青龍湯下
已多唾口燥寸脉沈尺脉微手足厥逆氣從
小腹上衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因
復下流陰股小使難時復冒者與苓桂五味
甘州湯治其氣衝

苓甘五味薑辛湯

茯苓

四兩

甘州

乾薑

細辛各三兩

五味

升半

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升
日三服

衝氣即低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘

州湯去桂加乾薑細辛以治其欬滿

苓甘薑味辛夏湯

茯苓

四兩

甘州

細辛

乾薑

各二兩

五味

升半

半夏

各半升

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升
日三服

欬滿卽止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水

苓甘薑味辛夏仁湯
茯苓^{四兩} 甘草^{三兩}
五味^{半升} 乾薑^{三兩} 細辛^{三兩} 半夏^{半升}
杏仁^{半升}
右七味以水六斗煮取三升去滓溫服半升

日三服

水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故不內之若逆而內之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

苓甘薑味辛夏仁黃湯
茯苓^{四兩} 甘草^{三兩}
五味^{半升} 乾薑^{三兩} 細辛^{三兩} 半夏^{半升}
杏仁^{半升} 大黃^{三兩}

右八味以水一斗煮取三升去滓溫服半升
日三服

若面熱如醉此為胃熱上衝熏其面加大黃
以利之

為則按以上五方當有驚悸肉瞤筋惕等

內證

茯苓澤瀉湯 其人茯苓半斤澤瀉四兩甘艸二兩

桂枝二兩朮三兩生薑四兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取

二升半溫服八合日三服

胃反吐而渴欲飲水者

為則按當有心下悸或小便利證

澤瀉湯 澤瀉五兩朮二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服○心

下有支飲其人苦胃眩

五苓散 猪苓十八銖澤瀉一兩六銖半

類聚方

二五 猪苓散

茯苓

十八銖

桂枝

半兩

朮

十八銖

右五味為末以白飲和服方寸七日三服多飲煖水汗出愈

天陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者○發汗已脈浮數煩渴者○中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆○病

在陽應以汗解之反以冷水灌之若灌之其熱被劫不得去瀰夏益煩胸上粟起意欲飲水反不渴者服文收散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服○太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞕不更衣十日無

所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者○霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之○傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘艸湯主之○男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之脉浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗○假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癩眩此水也○本以下之故

心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者

茵陳五苓散分 茵陳蒿末分 五苓散分

右二物和先食飲方寸七日三服

黃疸病

為則按當有小便不利或渴證

猪苓湯 猪苓 茯苓 阿膠 滑石

澤瀉各一兩

類聚方

卷之二 諸虛百損

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱消溫服七合日三服○若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者○陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也○小陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者○
小為則按常有便膿血證

猪苓散

猪苓 茯苓 朮 各等分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服
嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者

牡蠣澤瀉散

牡蠣 澤瀉 栝蒌根

蜀漆 葶藶 商陸根 海藻 各等分

右七味異擣下篩為散夏入臼中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三服
天病差後從腰已下有水氣者

爲則按當有胸腹有動或渴證

八味丸

乾地黄

山茱萸

薯蕷

澤瀉

茯苓

牡丹皮

桂枝

附子

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸

日再服

脚氣上入小腹不仁○虛勞腰痛少腹拘急小便不利者○夫短氣有微飲當從小便去

之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之○男子

消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸

主之脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便

發汗五苓散主之○婦人病飲食如故煩熱

不得臥而反倚息者何也曰此名轉胞不得

溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈

爲則按外臺祕要作桂枝二兩附子二兩

今從之

類聚方

卷之二十一

括蕞瞿麥丸

括蕞根兩二

茯苓

薯蕷各三兩

附子一枚

瞿麥一兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知小便利者有水氣其人若渴

為則按當有心下悸證

麻黃湯

麻黃三兩

杏仁七十個

桂枝二兩

甘草一兩

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫為諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息小汗身解太
陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者○太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下○太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者○太陽病脈浮緊無汗發熱身疼

痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也○脈浮者病在表可發汗○脈浮而數者可發汗○傷寒脈浮緊不發汗因致衄者○陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛又按之氣不通鼻乾不得汗者臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過

十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治○陽明病脈遲無汗而喘者發汗則愈

麻黃加朮湯 於麻黃湯方內加朮四兩

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之

麻黃甘州湯 甘州二兩 麻黃四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘州

煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再服慎
風寒

真水越婢加朮湯主之甘艸麻黃湯亦主之
為則按水病而腫脹或喘或自汗出或無
汗者主之

麻黃附子甘艸湯

麻黃二兩

甘艸二兩

附子一枚

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去沫

內諸藥煮取三升太淳溫服一升日三服
少陰病得之二三日麻黃附子甘艸湯微發
汗以二三日無裏證故微發汗也○水之為
病其脉沈小屬少陰浮者為風無水虛脹者
為氣水發其汗即已脉沈者宜麻黃附子甘
艸湯浮者宜杏子湯
為則按當有惡寒證

麻黃附子細辛湯

麻黃二兩

細辛二兩

附子 一枚

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病始得之反發熱脈沈者

為則按不可無惡寒之證

麻黃杏仁甘艸石膏湯 麻黃 兩四

杏仁 五枚 甘艸 二兩 石膏 半斤 麻黃 兩四

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升發汗後

不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者 金匱發汗

後作下後

為則按當有煩渴證再服汗出喘愈今辨

麻黃杏仁薏苡甘艸湯 麻黃 兩半 杏仁 一兩 甘艸 一兩

薏苡仁 兩半 杏仁 一兩

右剉麻豆大每服四錢七水盞半煮八分去

滓溫服有微汗避風

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此
病傷於汗出當風或久取冷所致也

為則按常有喘滿證外臺古今錄驗作葦

苳半斤麻黃兩四甘艸杏仁兩各二右四味以水

五升煮取二升分溫再服汗出即愈今從

之

牡蠣湯夏牡蠣兩四麻黃兩四甘艸兩二

內蜀漆兩二

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去沫得

六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿

更服

治牡蠣法大熱實轉大小豆大冷即三五日

半更為則按麻黃甘艸湯證而胸腹有動者主

之

麻黃淳酒湯 麻黃兩三

右一味以美清酒五升煮取二升半頓服盡

類聚方 卷之...

冬月用酒春月用水煮之

治黃疸

為則按當有喘證

半夏麻黃丸 麻黃 半夏 麻黃各等分

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三丸日

三服

心下悸者

為則按當有喘或嘔證

小青龍湯

麻黃

兩

芍藥

兩

五味子

半升

乾薑

兩

甘草

兩

桂枝

兩

半夏

半升

細辛

兩

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升加減法若

微利者去麻黃加薤白如雞子若渴者去半

夏加括樓根三兩若噎者去麻黃加附子一

枚若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩

若喘者去麻黃加杏仁半升

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或

渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者○

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯

已渴者此寒去欲解也○病溢飲者當發其

汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之○欬逆

倚息不得臥小青龍湯主之青龍湯已多

小咳喘燥寸脉沉尺脉微手足厥逆氣從小腹

上衝胸咽手足痲其而翁然如醉狀因復下

流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味

甘州湯治其氣衝○婦人吐涎沫醫反下之

心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之

涎沫止乃治痞瀉心湯主之

大青龍湯 麻黃六兩 桂枝二兩 甘州二兩

杏仁四十個 生薑三兩 大棗十二枚

石膏雞子大

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗
汗出多者溫粉粉之一服汗者停後服汗多
亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

大陽中風脈緊發熱惡寒身疼痛不汗出而
煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風
者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也
○傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少

陰證者大青龍湯發之後條辨續論皆云當

之○病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小

青龍湯亦主之

為則按當有渴證蓋厥逆以下真武湯之

證也可考

文蛤湯 文蛤五兩 麻黃 甘州

生薑各三兩 石膏五兩 杏仁五十個

大棗十二枚

右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出即愈

吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主之兼主微風脈緊頭痛

為則按當有喘證

越婢湯

麻黃

六兩

石膏

半斤

生薑

三兩

大棗

十五枚

甘草

二兩

右五味以水六升先煮麻黃去沫內諸藥

煮取三升分溫三服

風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無

大熱

越婢湯

為則按大青龍湯證而無咳嗽衝逆有腳

攣痛之證者主之不渴當作渴自汗出之

下當有或無汗字

越婢

加朮湯

於越婢湯方內

加朮四兩

裏水者一身面目黃腫其脈沈小便利故

類聚方

卷六

卷六

越婢湯

令病水假如小便自利此因津液故令渴也
○裏水越婢加朮湯主之甘艸麻黃湯亦主
之○治內極熱則身體津脫腠理開汗大泄
厲風氣下焦腳弱

越婢加半夏湯於越婢湯方內加半夏半

升

欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮
大者

為則按常有煩渴嘔逆證

葛根湯

葛根

兩四

麻黃

兩三

桂枝

兩二

芍藥

兩二

甘艸

兩二

生薑

兩三

大棗

枚十二

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二
升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆
取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁
忌

太陽病項背強几几無汗惡風○太陽與陽

明合病者必自下利○太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘕

為則按合病併病說非疾病醫事也

葛根加半夏湯 於葛根湯方內加半夏半

升

太陽與陽明合病不下利但嘔者

葛根黃連黃芩湯

葛根 半斤

甘艸 二兩

黃芩 二兩

黃連 三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者

表未解也喘而汗出者

為則按當有項背強急心悸證

小柴胡湯

柴胡 半斤

黃芩 三兩

人參 三兩

甘艸 三兩

半夏 半斤

生薑 三兩

大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎

取三升溫服一升日三服後加減法若胸中煩而不嘔去半夏人參加栝蒌實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半栝蒌根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者○太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者麻黃湯主之○血弱氣盡滕理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默

不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故
使嘔也○服柴胡湯已渴者屬陽明也以法
治之○得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足
溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及
身黃頸項強小使難者與柴胡湯後必下重
本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者
噦○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿
手足溫而渴者○傷寒陽脉澀陰脉弦法當

腹中急痛者先與小建中湯不差者○傷寒
中風有柴胡證但見一證便是不必悉具○
凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復
與柴胡湯必蒸蒸而振卻發熱汗出而解也
太陽病過經十餘日反二三下之後四五日
柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下
急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡下之則
愈○傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所

發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之○婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘡狀發作有時○傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者此爲陽微結必有表復有裏

也脈沈亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脈雖沈緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也○可與小柴胡湯設不了了者得屎而解○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下

滿而鞭痛者此爲結胸也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者此爲痞。柴胡不中與之。宜半夏瀉心湯。○陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯。上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解也。○陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛又按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身

及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯。脈但浮無餘證者與麻黃湯。若不尿腹滿加噦者不治。○本太陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊者。○若已吐下發汗溫鍼譌語柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之。○嘔而發熱者。○傷寒差已後更發熱者小

柴胡湯主之脈浮者以汗解之脈沈實者以
下解之○諸黃腹痛而嘔者○新產婦人有
三病一者病瘧二者病鬱冒三者大便難何
謂也曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘧
亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大
便難產婦鬱冒其脈微弱不能食大便反堅
但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒
家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故

頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣
獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食
○婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭
痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者三物黃芩
湯主之

柴胡加芒消湯 於小柴胡湯方內加芒消
六兩

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮

熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今
反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者
實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒
消主之

為則按小柴胡湯證而有堅塊者主之

柴胡太半夏加括蕪湯 於小柴胡湯方內

去半夏加括蕪根四兩

治瘧病發渴者亦治勞瘧

為則按當有胸脇苦滿證

柴胡加桂枝湯

桂枝

黃芩

人參

各一兩

甘草

半兩

芍藥

一兩

大棗

六枚

生薑

半兩

柴胡

四兩

右九味以水柒升煮取三升太澤溫服一升

日三服

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心
下支結外證未去者○發汗多亡陽讖語者

不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液
後自愈○心腹卒中痛者

柴胡薑桂湯

柴胡半斤

桂枝三兩

乾薑三兩

括婁根四兩

黃芩三兩

牡蠣三兩

甘艸二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎
取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗

柴胡

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結

小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心
煩者此為未解也○瘧寒多微有熱或但寒
不熱者

為則按頭汗出者是衝逆也又曰當有胸
脇有動證

柴胡加龍骨牡蠣湯

半夏二合

大棗六枚

柴胡四兩

生薑

人參

龍骨

鉛丹

桂枝

茯苓各一兩半

大黃二兩

牡蠣半兩

類聚方

類聚方

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如
碁子受煮一二沸太澤溫服一升○傷寒八
九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一身盡
重不可轉側者

為則按當有胸腹有動證玉函經無切如
碁子四字一二沸作取二升今從之

太柴胡湯柴胡半斤黃芩兩芍藥兩

半夏升川生薑兩枳實四枚大棗枚

右七味以水一斗二升煮取六升太澤再煎
溫服一升日三服一方用大黃二兩若不加
大黃恐不為大柴胡湯也黃正函醫百論
大陽病過經十餘日反二三下之後四五日
柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下
急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之
則愈○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱
者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結

在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之○
傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利
者○按之心下滿痛者此為實也當下之○
傷寒後脈沈沈者內實也下解之

為則按小柴胡湯證而胸腹拘攣可下者
主之又按本方當有大黃玉函經再煎下
有取三升三字又曰一方已下注文也

白虎湯

知母兩

石膏斤

甘草兩

粳米

粳米

六

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒○三陽合病
腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讞語遺
尿發汗則讞語下之則額上生汗手足逆冷
若自汗出者○傷寒脈滑而厥者裏有熱也
為則按以上三條非白虎湯證乃於白虎

加人參湯條下辨之又曰煎法可從白虎

加桂枝湯

白虎加人參湯

於白虎湯方內加人參三

兩

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者
○傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在
裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩
欲飲水數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩

背微惡寒者○傷寒脈浮發熱無汗其表不

解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者○

若渴欲飲水口乾舌燥者為則按已上四章

主之外臺亦同而方後○太陽中熱者喝是

也汗出惡寒身熱而渴

為則按此方白虎湯證而心下痞鞅者主

之

白虎加桂枝湯

於白虎湯方內加桂枝三

兩 右以水一斗五升煮取八升太滓溫服
溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時
嘔

為則按當有煩渴衝逆證

小承氣湯 大黃^{四兩} 厚朴^{二兩} 枳實^{三枚}
已上三味以水四升煮取一升二合太滓分
溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更
衣者勿服之

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短
氣腹滿而喘有潮熱者此大便已鞅也大便氣
手足濇然而汗出者此大便已鞅也大便氣
湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其
熱不潮未可與承氣湯若大滿不通者可與
小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○傷寒不
大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便
清者知不在裏仍在表也常須發汗若頭痛

類聚方 卷之... 清瘧... 傷寒... 承氣湯

者必衄宜桂枝湯○陽明病潮熱大便微鞮者可與大承氣湯不鞮者不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞮後必澀不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞮而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也○陽明病

其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞮鞮則譫語小承氣湯主之若脈澀語止更莫復服○陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之○日不大便脈反微澀者裏虛也爲難治不可更與承氣湯也○太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞮者與小承氣湯和之愈○

得病二三日脉弱無天陽柴胡證煩躁心下
鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微
和之令小安至六日與承氣湯一升若不大
便六七日小便利者雖不能食但初頭鞭後
必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭
乃可攻之宜大承氣湯○下利讞語者有燥
屎也○大便不通噦數讞語者

厚朴三物湯 厚朴八兩 大黃四兩 枳實五枚

右三味以水一斗先煮厚朴取五升內
大黃煮取三升溫服一升以利為度

太痛而閉者 大黃

為則按小承氣湯證而腹滿甚

厚朴七物湯 厚朴半斤 甘草二兩 大黃三兩

大棗十枚 枳實五枚 桂枝二兩 生薑五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三
服嘔者加半夏五合下利太黃寒多者加

厚朴三物湯 厚朴八兩 大黃四兩 枳實五枚

生薑至半斤

病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故

為則按此方合厚朴三物湯桂枝去芍藥

湯而加生薑二兩也由是觀之當有二方

之證而七逆嘔證

太承氣湯

大黃兩

厚朴半斤

大枳實

枚五

芒消

三合

右四味以水一斗先煮三物取五升去滓內

大黃煮取二升去滓內芒消更上火微

沸分溫再服得下餘勿服

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短

氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可象裏也

手足濇然而汗出者此大便已鞭也

大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也

其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可

與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

頤

陽明

病潮熱大便微鞣者可與大承氣湯不鞣者
不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之
法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有
燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞣
後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲
飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞣
而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不
可攻也○傷寒若吐若下後不解不大便五

六日七至十餘日日嘔所發潮熱不惡寒獨
語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀
惕而不安微喘直視脉弦者生瀰者死微者
但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止
後服○陽明病譫語有潮熱反不能食者胃
中必有燥屎五六枚也若能食者但鞣爾○
汗出譫語者以有燥屎在胃中此爲風也須
下之過經乃可下之下之若早語言必亂以

表虛裏實故也下之則愈○三陽併病太陽
證罷但發潮熱手足繫繫汗出大便難而譫
語者下之則愈○陽明病下之心中懊懣而
煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞞後必
澹不可攻之若有燥屎者○病人煩熱汗出
則解又如瘧狀日哺所發熱者屬陽明也脉
實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承
氣湯發汗宜桂枝湯○大下後六七日不大

便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者
本有宿食故也○病人小便不利大便難
乍易時有微熱喘胃不能臥者有燥屎也
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩燥心下
鞞至四五日雖能食以小承氣湯少少與微
和之令小安至六日與承氣湯一升若不大
便六七日小便少者雖不能食但初頭鞞後
必澹未定成鞞攻之必澹須小便利屎定鞞

乃可攻之○傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實急下之○陽明發熱汗多者急下之○發汗不解腹滿痛者急下之○腹滿不減減不足言當下之○陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之○少陰病得之紅白痢口燥咽乾者急下之○少陰病自利清水色

純青心下必痛口乾燥者急下之○少陰病六七日腹脹不大便者急下之○下利三部脈皆平按之心下鞭者急下之○下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之○人病有宿食何以別之曰寸脈浮而大按之反澀尺中亦微而澀故知有宿食當下之○下利不欲食者以有宿食故也當下之○下利差後至其年月日復發者以病不盡故也當下

之○下利脉反滑當有所公下之乃愈○病
腹中滿痛者此為實也當下之○脉雙弦而
遲者必心下鞕脉大而緊者陽中有陰也可
以下之○瘧為病胸滿口噤臥不著席脚攣
急必斷齒○病解能食七八日更發熱此為
胃實○產後七八日無太陽證少腹堅痛此
惡露不盡不大便煩燥發熱切脉微實再倍
發熱口噤煩燥者不食食則譫語至夜即

愈宜大承氣湯主之熱在裏結在腸也

大黃黃連瀉心湯

大黃 兩 黃連 兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分
溫再服
心下痞按之濡其脈關止浮者○傷寒大下
後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻
痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝
湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

為則按當有心悸證

瀉心湯

大黃_{二兩}

黃連

黃芩

各一兩

右三味以水三升煮取一升頓服之

心氣不足吐血衄血○本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便利者五苓散主之○婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

為則按煎法當從大黃黃連瀉心湯附子

瀉心湯之法也又曰不足千金竹不定今

大黃從之

大黃_{二兩}

黃連

黃芩

附子瀉心湯

於瀉心湯方內加附子一枚

右四味切參味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服
心下痞而復惡寒汗出者

大黃附子湯

大黃_{三兩}

附子_{三枚}

細辛_{二兩}

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人者取二升半分溫三服服後如人行四五里進一服

脇下偏痛發熱其脉緊弦此寒也以溫藥下

大黃甘遂湯

大黃兩

甘遂二兩

阿膠二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下婦人少腹滿如敦狀小使微難而不渴生後

此為水與血俱結在血室也

抵當湯

水蛭

個三十

蟅蟲

個三十

桃仁

二十

大黃

三兩

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服

一升不下再服

天陽病六七日表證仍在脉微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經

類聚方
卷之六
癍熱在裏故也○太陽病身黃脉沈結少腹
鞭小便利者為無血也小便利其人如
狂者血證諦也○陽明證其人喜忘者必有
畜血所以然者本有久癍血故令喜忘屎雖
鞭大便反易其色必黑○病人無表裏證發
熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉
數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便
者有癍血○婦人經水不利下

抵當丸

水蛭

二十個

蟲蟲

二十個

桃仁

二十個

大黃

三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七
合服之晬時當下血若不下者更服
傷寒有熱少腹滿應小便利今反利者為
有血也當下之不可餘藥

橘皮大黃朴消湯

橘皮

大黃

朴消

類聚方

卷之六

右三味以水一大升煮至小升頓服即消
膾食之在心胸間不化吐復不出速下除之

久成癥病

大黃消石湯

大黃 黃蘗

消石 各四兩

梔子 十五枚

右四味以水六升煮取三升去滓內消石更
煮取一升頓服

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和

裏實當下之

大黃牡丹皮湯

大黃 四兩

牡丹 一兩

桃仁 五十個

瓜子 半升

芒消 三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再
煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血

腸癰者小腹腫痞按之即痛如淋小便自調
時時發熱自汗出復惡寒其脈遲緊者膿未
成可下之當有血脈洪數者膿已成不可下

也

爲則按千金方作牡丹皮三兩瓜子一升
芒消二兩瓜子一升今當十兩

大黃甘州湯

大黃四兩

甘州一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服○食
已卽吐者

大黃爲則按當有急迫證

調胃承氣湯

大黃四兩

甘州二兩

芒消半兩

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒

消更上火微煮令沸少少溫服

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒胸膈

急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥

咽中乾煩躁吐逆者作甘州乾薑湯與之以

復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘州湯與

之其脚卽伸若胃氣不和讞語者少與調胃

承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

○發汗後惡寒者虛故也不惡寒便熱者實也當和胃氣○太陽病未解陰陽脈俱停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解但陰脈微者下之而解若欲下之○傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此爲內實也○太陽病

過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溇腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸中痛微溇者此非柴胡證以嘔故知極吐下也○陽明病不吐不下心煩者○太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也○傷寒吐後腹脹滿者○大便不通胃氣不和者爲則按但急迫而大便不通者主之

桃核承氣湯

桃仁五十個

桂枝二兩

大黃四兩

芒消二兩

甘艸二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消
更上火微沸下火先食溫服五合日三服當

微利

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下
者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解
已但少腹急結者乃可攻之

下瘀血湯

大黃二兩

桃仁三十個

蟅蟲

二十枚

右三味末之煉蜜和為四丸以酒一升煎一
丸取八合頓服之新血下如豚肝○產婦腹
痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹
中有乾血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經
水不利

土瓜根散

土瓜根

芍藥

桂枝

類聚

卷五

麤蟲各三

右四味杵為散酒服方寸七日三服

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者○

陰癩腫

甘艸湯

甘艸兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七

合日二服

少陰病二三且咽痛者可與甘艸湯不差者

與桔梗湯

為則按甘艸主急迫者也

桔梗湯

桔梗兩

甘艸兩

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服

少陰病二三且咽痛者可與甘艸湯不差者

與桔梗湯○欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴

時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

若膿為則按粘痰如膿者主之

類聚方

六

六

補益亭藏

排膿湯

甘艸二兩

桔梗三兩

生薑一兩

大棗十枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

為則按有粘痰或膿血而急迫者主之

芍藥甘艸湯

芍藥四兩

甘艸兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服之

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘艸乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘艸湯與之其脚即伸若胃氣不和讞語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

甘遂半夏湯

甘遂三枚

半夏十二枚

芍藥五枚

甘艸一枚

指大一

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也

為則按芍藥甘州湯加減之方也故當有變急證

芍藥甘州附子湯

芍藥三兩

甘州三兩

附子一枚

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分

溫服

發汗病不解反惡寒者虛故也

為則按芍藥甘州湯證而惡寒者主之

甘麥大棗湯

甘州三兩 小麥一升

大棗十枚

右三味以水六升煮取三升分溫三服○婦

人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸

為則按急迫而狂驚者主之

甘艸粉蜜湯

甘艸兩二

粉兩一

蜜兩四

右三味以水三升先煮甘艸取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差即止
[蛇蟲之為病]令人吐涎心痛發作有時毒藥不止

生薑甘艸湯

生薑兩五

人參兩三

甘艸兩四 大棗兩十五

右四味以水七升煮取三升分溫三服○肺

痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

為則按當有心下痞緩強急證

甘艸乾薑湯

甘艸兩四

乾薑兩二

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

[肺痿吐涎沫而不咳者]其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此為

肺中冷必眩多涎唾甘艸乾薑湯以溫之若
服湯已渴者屬消渴○傷寒脉浮自汗出小
便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻
其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者
作甘艸乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫
者更作芍藥甘艸湯與之其脚即伸若胃氣
不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復
加燒鍼者四逆湯主之

為則按當有急迫語

四逆湯

甘艸二兩 乾薑一兩 附子一枚

右三味以水三升煮取一升二合去滓
分溫再服強人可大附子一枚乾薑二兩
傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣
急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥
咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾薑湯與之以
復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘艸湯與

之其脚卽伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之
○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛當救其裏○脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者○自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服

四逆輩○少陰病脈沈者急溫之○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之○大汗出熱不忤內拘急四肢厥又下利厥逆而惡寒者○大汗若大下利而厥冷者○下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯○嘔而脈

弱小便復利身有微熱見厥者難治○吐利
汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者○既
吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒
外熱脈微欲絕者

為則按此甘艸君藥也

通脈四逆湯

甘艸二兩

附子一枚

乾薑三兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫
再服其脈即出者愈後如減法面色赤者加

蔥九莖腹中痛者去蔥加芍藥二兩嘔者加
生薑二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止
脈不出者去桔梗加人參二兩

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微
欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾
嘔或咽痛或利止脈不出者○下利清穀裏
寒外熱汗出而厥者

為則按當作附子大者一枚以乾薑知其

然甘州新校正作三兩是也

四逆加人參湯而於四逆湯方內加人參一

兩

惡寒脈微而復利利止亡血也

為則按當有心下輕病也辨之藥徵人參

條下

茯苓四逆湯

茯苓

六兩

人參

一兩

甘草

乾薑

兩

附子

一兩

右五味以水五升煮取三升太滓溫服七合

日三服

發汗若下之病仍不解煩躁者

為則按當有心下悸惡寒證

通脈四逆加豬膽汁湯

於四逆湯方內加

豬膽汁半合如無豬膽以羊膽代之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲

絕者

乾薑附子湯

乾薑 兩

附子 枚

右二味以水三升煮取一升去滓頓服○下
之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不
嘔不渴無表證脉沈微身無大熱者

附子粳米湯

附子 枚

粳米 半升

甘艸 兩

大棗 十枚

附子 一枚

粳米 半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服
升日三服

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

薏苡附子散

薏苡仁 兩

附子 兩

大附子 一枚

右二味杵為散服方寸匕日三服

胸澀緩急者

為則按當有惡寒或浮腫證

薏苡附子敗漿散

薏苡仁 分

附子 分

敗漿 分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半

類聚方

七十四 諸虛百損

頓服小使當下

腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此為腸內有癰膿

白通湯

蔥白四莖

乾薑兩

附子一枚

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

少陰病下利

為則按當有氣逆證

白通加豬膽汁湯

蔥白四莖

乾薑兩

附子一枚

人尿五合

豬膽汁合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁

人尿和令相得分溫再服若無膽亦可

用陰病下利脈微者與白通湯利不止欲逆

無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯上之服湯

脈暴出者死微續者生

大烏頭煎

烏頭大者五枚

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令

水氣盡取二升強人服七合弱人五合不差
明日更服不可一日再服

腹痛脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則
不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝遶臍痛若
發則自汗出手足厥冷其脉沈弦者

烏頭湯

麻黃

以藥

黃耆各三

兩

川烏

五枚

以蜜二升

煎取

升即出烏頭

升

右五味咬咀四味以水三升煮取一升太滓

內蜜煎中更煎之服七合不知盡服之

病歷節不可屈伸疼痛○脚氣疼痛不可屈

伸○寒疝腹中絞痛風人攻五臟拘急不

得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆

為則按當有白汗盜汗浮腫證

赤丸

茯苓

四兩

半夏

四兩

方用桂

烏頭

二兩

細辛

兩

右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大

先食酒飲下三丸日再夜一服不知稍增之
以知為度

寒氣厥逆

為則按當有心下悸及嘔而腹痛證

真武湯

茯苓

三兩

芍藥

三兩

生薑

三兩

附子

一枚

附子

一枚

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合
日三服後加減法若欲者加五味半升細辛

乾薑各一兩若小便利者去茯苓若下利者
去芍藥加乾薑二兩若嘔者去附子加生薑
足前成半斤
少陰病二三日不已至四五日腹痛小便利
利四肢沈重疼痛自下利者此為有水氣其
人或欬或小便利或下利或嘔者○太陽病
發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身
瞤動振振欲擗地者

附子湯

附子二枚

茯苓三兩

人參二兩

朮四兩

芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升

日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之○少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沈者

為則按當有小便利心下悸或痞鞅證

藥徵辨之

天雄散

天雄三兩當

朮八兩

桂枝六兩

龍骨三兩

右四味杵為散酒服半錢七日三服不知稍增之

為則按失精家而小便不利臍下有動或惡寒或衝逆者主之藥徵辨之

梔子豉湯

梔子十四枚

香豉四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉
煮取一升半去滓分爲二服溫進一服得吐
者止後服

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛
倒心中懊懣○發汗若下之而煩熱胸中窒
者○傷寒五六日下之後身熱不去心中
天結痛者未欲解也○陽明病脈浮而緊咽燥
口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身

重若發汗則燥心憤憤反藏語若加燒鍼必
怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣
動膈心中懊懣舌上胎者○陽明病下之其
外有熱手足溫不結胸心中懊懣饑不能食
但頭汗出者○下利後更煩按之心下濡者
爲虛煩也

爲則按集註曰舊本有一服得吐止後服
七字此因瓜蒂散中有香豉而誤傳於此

今為刪正余亦從之以下倣之

梔子甘艸豉湯 梔子豉湯方內加入甘艸

二兩

梔子豉湯證而若少氣者

梔子生薑豉湯 梔子豉湯方內加生薑伍

兩 梔子豉湯證而若嘔者

為則曰已上二方證以若字者冠梔子豉

湯證之辭今裂而列之故敢加梔子豉湯

證而六字以通其意也

枳實梔子豉湯

枳實

三枚

梔子

十四枚

豉

一升

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實

梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分

再服覆令微似汗

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿

食者加大黃如博碁子大五六枚

為則按當有心中懊懣胸滿證

梔子大黃豉湯

梔子

十二枚

大黃

兩

枳實

五枚

豉

一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服○酒

黃疸心懊懣或熱痛

茵陳蒿湯

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚

大黃

二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味

煮取三升去滓分溫三服小使當利尿如皂

角汁狀色正赤一宿腹減黃從小使去也

穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安

久久發黃為穀疸○陽明病發熱汗出此為

熱越不能發黃也但頭汗出身無汗刺頸而

還小使不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身

必發黃○傷寒七八日身黃如橘子色小使

不利腹微滿者

梔子蘘皮湯

梔子一十 五個

甘艸一兩

黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

傷寒身黃發熱者

梔子厚朴湯

梔子十四枚

厚朴四兩

枳實四枚

已上三味以水三升半煮取一升半去滓分

三服溫進一服得吐者止後服

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者

梔子乾薑湯

梔子十四枚

乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者

大陷胸湯

大黃六兩

芒消一斤

甘遂錢一

類聚方

清蘄亭藥

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內
芫消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利
止後服

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動
則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反
惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內
拒痛胃中空虛客氣動膈短氣燥煩心中懊
憒陽氣內陷心下因鞞則爲結胸大陷胸湯

主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而
大還小使不利身必發黃也○傷寒六七日結
胸熱實脈沈而緊心下痛按之石鞞者○傷
寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴
胡湯但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也
但頭微汗出者○太陽病重發汗而復下之
不大優五六日舌上燥而渴日晡所小有潮
熱從心下至少腹鞞滿而痛不可近者○傷

寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯

大陷胸丸 水漿大黃半升 葶藶半升

芒消半斤 杏仁半升

右四味搗篩二味內杏仁芒消合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法

結胸者項亦強如柔痙狀下之則和

小陷胸湯 黃連兩 半夏升

栝蒌實 大者一個

右三味以水六升先煮栝蒌取三升去滓內

諸藥煮取二升去滓分溫三服

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者○
病在陽應以汗解之反以冷水瀝之若灌之
其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲
飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓
散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白
散亦可服

栝蘆薤白白酒湯

栝蘆實一枚

薤白

半升

白酒

七升

右三味同煮取二升分溫再服
胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉沈
而遲關上小緊數

栝蘆薤白半夏湯

栝蘆實一枚

薤白

三兩

半夏

半升

白酒

一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服○胸
痺不得臥心痛徹背者

爲則按當有嘔或胸腹鳴證

瓜蒂散

瓜蒂

一分

赤小豆

一分

右二味各別搗篩爲散已合治之取一錢七以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸人血虛家不可與瓜蒂散病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞鞅氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也

當吐之○病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之○病食在上脘當吐之

爲則按當有欲吐證

文蛤散

文蛤

五兩

右一味爲散以沸湯和一錢七服湯用五合病在陽應以汗解之反以冷水漬之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲

飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可服○渴欲飲水不止者

大半夏湯

大半夏二升

人參三兩

白蜜一斤

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮取二升半溫服一升餘分再服

胃反嘔吐者

為則按外臺云治嘔心下痞懣者今從之

小半夏湯

小半夏一升

生薑半斤

○去諸藥

右二味以水七升煮取一升半分溫再服嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也○黃疸病小復色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者○諸嘔吐穀不得下者

生薑半夏湯

半夏升

生薑汁升

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁

煮取一升半小冷分四服日三夜一嘔止停後服

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無奈

小半夏加茯苓湯 小半夏 生薑 升

茯苓 兩

右三味水七升煮取升五合分溫再服

卒嘔吐心下痞滿間有水眩悸者○先渴後

嘔為水停心下此屬飲家

半夏苦酒湯

半夏 十四枚

雞子 一枚

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差夏

作三劑

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者

半夏厚朴湯

半夏 升

厚朴 兩

茯苓 兩

生薑 兩

乾蘼葉 兩

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一服

婦人咽中如有炙臠

為則按當有悸證又按千金作胸滿心下堅咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不

下

半夏乾薑散

半夏 乾薑 各等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取

七合頓服之

乾嘔吐逆吐涎沫

乾薑人參半夏丸

乾薑 人參 各一兩

半夏 各一兩

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲

服十丸日三服

妊娠嘔吐不止

為則按當有心下痞鞭證

半夏瀉心湯半夏升黃芩 乾薑

人參各三兩黃連一兩大棗十二枚甘艸三兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三

升溫服一升日三服

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以

他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖

已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而

解若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸

湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與

之○嘔而腸鳴心下痞者柴胡內減甘草二

為則按心下痞當作心下痞鞭

甘艸瀉心湯半夏瀉心湯方內加甘艸一

兩

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀

不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不

得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益

甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞮也○狐惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不得閉臥起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕甘於上部則聲喑為則按常有急迫證
生薑瀉心湯 半夏瀉心湯方內減乾薑二兩加生薑四兩

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞮乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

吳茱萸湯 吳茱萸一分 人參三兩

生薑六兩 大棗十二枚

右四味以水七升煮取三升去滓溫服七合日三服○食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也○少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者○乾嘔吐涎沫頭痛

者○嘔而胸滿者

厚朴生薑半夏甘艸人參湯

厚朴斤半

生薑

斤半 半夏

斤半 人參

兩一 甘艸

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

日三服

發汗後腹脹滿者

人參

為則按當有吐逆證

黃連湯黃連 甘艸各三 桂枝各三

人參

兩半 夏

升半 棗

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升

大甘

服夜二服

傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐

者

為則按當有心中悸心煩上逆證

乾薑黃連黃芩人參湯

乾薑

黃連

黃芩

人參

類聚方

類聚方

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服
傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下
若食入口即吐心下痞滿
為則按此方主心中煩悸及心下痞鞭而
吐下者也
大建中湯 蜀椒二合 乾薑四兩 人參二兩
右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴六
升微火煎取半升半分溫再服如一炊頃可

飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之
心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮
起出見有頭足上下痛而不可觸近
黃連阿膠湯 黃連四兩 黃芩一兩
芍藥二兩 雞子黃二枚 阿膠三兩
右五味以水五升先煮三物取二升去滓內
膠烱盡少冷內雞子黃攪令相得溫服七合
日三服

類聚方
卷之三
黃連阿膠湯

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥

黃芩湯

黃芩三兩

甘草二兩

芍藥二兩

大棗十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

日再夜一服若嘔者加半夏半升生薑三兩

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔

者黃芩加半夏生薑湯主之

為則按當有心下痞腹強急證

黃芩加半夏生薑湯

於黃芩湯方內加半

夏半升生薑三兩

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔

者○乾嘔而利者

六物黃芩湯

黃芩

人參

各三兩

乾薑三兩

桂枝一兩

大棗十二枚

半夏半升

右六味以水七升煮取三升分溫三服○乾

嘔下利

為則按當有心下痞鞅證

三物 黃芩湯

黃芩

兩

苦參

兩

乾地黃

兩

右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐

下虫

婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者

為則按當有心胸苦煩證

白頭翁湯

白頭翁

兩

黃連

黃柏

秦皮

各三兩

右四味以水七升煮取二升太滓溫服一升

不愈更服一升○一本白頭翁作三兩

熱利下重者○下利欲飲水者以有熱故也

為則按當有心悸證

白頭翁加甘艸阿膠湯

白頭翁湯方內加

甘艸阿膠各二兩

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡分溫三服

產後下利虛極

為則按雖曰產後非唯言產後也當以血證為準又當有急迫證

木防已湯

木防已

石膏

雞子大

桂枝

二兩

人參

四兩

石四味以水六升煮取二升分溫再服

○臍間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沈緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜木防已湯去石膏加茯苓芒消湯主之

為則按當有煩渴證

木防已去石膏加茯苓芒消湯

木防已湯

方內去石膏加茯苓四兩芒消三合

右五味以水六升煮取二升去滓內芒消再微煎分溫再服微利則愈

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉

沈緊得之數十日醫吐下之不愈水防己湯

主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者

水內為則按當有心下悸證

防己茯苓湯防己三兩黃耆三兩

桂枝兩茯苓兩甘草兩防己三兩黃耆三兩

右五味以水六升煮取二升分溫三服○皮

水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聳身動

者

防己黃耆湯防己四兩黃耆五兩

甘草兩生薑三兩大棗十二枚赤三兩

右六味以水六升煮取二升分溫三服

○風濕脉浮身重汗出惡風者風濕一作風水○治

風水脉浮為在表其人或頭汗出表無他病

病者但下重從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸

為則按分量煎法非古今從外臺

枳實芍藥散

枳實 芍藥 各等分

右二味杵為散服方寸七日三服并主癰膿以來麥粥下之

產後腹痛煩滿不得卧○產後腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血

著臍下空下瘀血湯主之亦主經水不利

枳朮湯

枳實 七枚 朮 二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中更即當散也

心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

為則按當有小便不利證

排膿散

枳實 十六枚 芍藥 六分 桔梗 二分

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞

黃相等揀和令相得飲和服之日一服

為則按有瘡癰而胸腹拘滿者主之

桂枝枳實生薑湯 桂枝 生薑各三兩

枳實五枚

右三味以水六升煮取三升分溫三服

○心中痞諸逆心懸痛

為則按當有嘔證又曰痞下脫滿字耶

枳實薤白桂枝湯 枳實四枚 厚朴四兩

薤白升中 桂枝兩一 栝蒌實一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去

滓內諸藥煮數沸分溫三服

胸痹心中痞留氣結在胸脅滿脇下逆搶心

枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

橘皮枳實生薑湯 橘皮斤一 枳實兩三

生薑半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

○胸癭胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘艸湯主之橘枳薑湯亦主之

為則按當有嘔證

茯苓飲 茯苓 人參 朮 各三兩

枳實 二兩 橘皮 二兩 生薑 四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服知

人行八九里進之

治心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間

虛氣滿不能食消痰氣令能食

為則按當有心下痞鞭證

橘皮竹茹湯 橘皮 二斤一本 竹茹 二斤

大棗 三十枚 生薑 一斤半 甘艸 五兩 人參 一斤

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三

服

噦逆者

橘皮湯 橘皮 四兩 生薑 一斤半

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽
即愈

乾嘔噦若手足厥者

桂枝茯苓丸 桂枝 茯苓 牡丹

桃仁 芍藥 各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前

服一丸不知加至三丸

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不

止胎動在臍上者為癥痼害妊娠六月動者
前三月經水利時胎下血者後斷三月不血
也所以血不止者其癥不去故也當下其癥
為則按當有衝逆心下悸證又曰是不唯
治婦人之病方也

芎歸膠艾湯 芎藭 阿膠 各二兩 甘草 二兩

艾葉 當歸 各三兩 芍藥 四兩 乾地黄 六兩

右七味以水五升清酒五升合煮取三升太

淨內膠令消盡溫服一升日三服不差更作
 婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕
 者有姙娠下血者假令姙娠腹中痛為胞疽
 為則曰凡治吐血下血諸血證者不別男

子婦人矣

旋覆花代赭石湯

旋覆花_{三兩} 代赭石_{三兩}

人參_{二兩}

生薑_{五兩}

半夏_{半升}

代赭石_{一兩}

大棗_{十枚}

甘草_{三兩}

水一斗煮取六升去滓再煎取

三升溫服一升日三服

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不
 除者

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂_{一斤}

禹餘糧_{一斤}

已上二味以水六升煮取二升分三服

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯

已復以他藥下之利不止醫以理中與之利

益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹
餘糧湯主之復利不止者當利其小便
為則按此章非疾病醫義故不取雖然赤
石脂禹餘糧湯證可從于此也又云當利
其小便

桃花湯

赤石脂

一斤

乾薑

兩

粳米

升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫七合內
赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

少陰病不利便膿血者○少陰病二三日

至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者

○下利便膿血者

大猪膽汁

大猪膽

一枚

瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大
便出

陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津
液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜

煎導而通之若上瓜根及與大猪膽汁皆可
為導

蜜煎導

蜜七合

味甘內銅器中微火煎之稍凝似飴狀擾之
大勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如
指長二寸許常熱時急作冷則擾以內穀道
中以手急抱欲大便時乃去之
主治見大猪膽汁下

酸棗仁湯

酸棗仁升

甘草兩

知母兩

茯苓兩

芎藭兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥
煮取三升分溫三服

虛勞虛煩不得眠

為則曰虛勞當作煩躁

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶

搗丸如
彈丸大

大棗

十一枚

類聚

類聚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮
取一升頓服

肺癰喘不得卧○肺癰胸滿脹一身面目浮
腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘
鳴迫塞○受飲不得息

麻子一斤 厚朴一斤 杏仁一斤 枳實一斤

大黃一斤 厚朴一斤 杏仁一斤

酒右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十丸日

三以知為度入如平地麻子之平以麻子

跌陽脉浮而濡浮則胃氣強濡則小便數浮

濡則搏大便則堅其脚為約

已椒蘘黃丸防己椒目葶藶

大黃

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一丸

日三服稍增口中津液渴者加酒清半兩

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣

蜀漆散

蜀漆

雲母

龍骨

各等分

右三味杵為散未發前以漿水服半錢○瘧

多寒者名曰牡瘧

為則按當有臍下動證

十棗湯

芫花

甘遂

大戟

各等分

右三味等分各別搗為散以水一升半先

煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人

服錢七贏人服半錢溫服之平旦服若下

少病不除者明日更服加半錢得快下利後

糜粥自養

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人

繫繫汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇

下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未

和也○病懸飲者○效家其脈弦為有水○

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百

日一歲

桔梗白散

桔梗

貝母

各三分

巴豆

一分

右三味為散強人飲服半錢七羸者減之痰在膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一盃則定川水瀉之欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿寒如米粥者為肺癰○病在陽應以汗解之反以冷水瀼之若灌之其熱被劫不得去滿更益煩肉上粟起意欲飲水反

小渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可

為則按有結毒而濁唾吐膿者主之

走馬湯

巴豆

一枚

杏仁

一枚

右二味以綿纏搗令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下老少量之通治飛尸鬼擊病中惡心痛腹脹大便不通

備急圓

人黃兩

乾薑兩

巴豆兩

右藥各須精新先搗人黃乾薑為末研巴豆
內中合治一十折用為散蜜和丸亦佳密器
中貯之莫令歇氣

主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿
卒痛如錐刺氣急口禁停尸卒死者以暖水
若酒服大如許三四丸或不下捧頭起灌令
下咽須臾當差如未差更與一丸當腹中鳴

即吐下便差若口禁亦須折齒灌之

礬石湯

礬石二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸腳浪
治腳氣冲心

消礬散

消石 礬石 等分

右二味為末以大麥粥汁和服方寸七日三
服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候
也

黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之
膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作
黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞
之病非水也腹滿者難治

礬石丸

礬石

三分

杏仁

一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者
再內之

婦人經水閉不利臍堅癖不止中有乾血下

白物

蛇床子散

蛇床子仁

右一味末之以白粉少許和令相得如棗大
綿裹內之自然溫
溫陰中坐藥

類聚方終

不試方十八方

竹葉石膏湯

竹葉

把二

石膏

劬一

半夏

升半

人參

兩三

甘艸

兩二

粳米

升半

麥門冬

升一

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服○傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

爲則按當有枯燥證又按條辨作竹葉三

兩今從之

麥門冬湯

麥門冬

升七

半夏

升一

人參

兩三

甘艸

兩二

粳米

合三

大棗

枚十

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升

日三夜一服

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者

爲則按當有心下痞證

雄黃熏

雄黃

右一味為末筒瓦二枚合之燒向肛熏之○
蝕於肛者

頭風摩散

大附子一枚

鹽等分

右二味為散流了以方寸七已摩疾上令藥
力行

皂莢丸

皂莢八兩

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三
丸日三夜一服○欬逆上氣時時唾濁但坐

不得眠

葶藶湯

葶藶二升

慧苡仁半升

桃仁五十枚

瓜瓣半升

右四味以水一斗先煮葶藶得五升去滓內
諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿○欬
有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰

當歸生薑羊肉湯

當歸三兩

生薑五兩

羊肉一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生薑成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩朮一兩加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之○寒疝腹中痛及脇痛裏急者○產後腹中疔痛當歸生薑羊肉湯主之並治腹中寒疝虛勞不足

蒲灰散

蒲灰

七分

滑石

二分

右二味杵爲散飲服方寸七日三服

小使不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓合戍鹽湯并主之○厥而皮水者

滑石白魚散

滑石

二分

亂髮

二分

白魚

二分

右三味杵爲散飲服方寸七日三服

小使不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓合戍鹽湯并主之

猪膏髮煎

猪膏

半斤

亂髮

如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出○主諸黃

栢葉湯

栢葉

乾薑

各三兩

艾

三把

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服○吐血不止者

黃土湯

甘州

乾地黄

朮

附子

各三兩

右七味以水八升煮取三升分溫二服○下

阿膠

黃芩

各三兩

竈中黄土

半斤

血先便後血此遠血也○主吐血衄血

雞屎白散

雞屎白

右一味為散取方寸匕以水六合和溫服○轉筋之為病其人臂腳直脈上下行微弦轉筋入腹者

蜘蛛散

蜘蛛

十四枚

桂枝

半兩

右二味為散取八分一匕飲和服日再服蜜丸亦可○陰狐疝氣者偏有小大時時上下

當歸芍藥散

當歸三兩

芍藥一斤

茯苓四兩

朮四兩

澤瀉一斤半

芫花半斤

一作三兩

右六味杵為散取方寸七酒和日三服○婦人懷妊腹中疴痛

歸母苦參丸

當歸

貝母

苦參

各四兩

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服二丸加至十丸○妊娠小使難飲食如故

狼牙湯

狼牙三兩

○

○

○

右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯瀝陰中日四遍○少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之

小兒疳蝕齒

雄黃

葶藶

右二味末之取臘日猪脂鎔以槐枝綿裹頭四五枚點藥烙之

類聚方跋
 卷之六之各曰
 麟
 載其
 道以
 傳之
 千載
 故其
 欲
 求之
 也。不
 由其
 路。譬
 如場
 師
 失養
 梧。橫
 於枳
 棘。苟
 其失
 養
 之也。
 且人
 賤之。
 况又
 迷固
 之。

類聚方跋
 卷之六之各曰
 麟
 載其
 道以
 傳之
 千載
 故其
 欲
 求之
 也。不
 由其
 路。譬
 如場
 師
 失養
 梧。橫
 於枳
 棘。苟
 其失
 養
 之也。
 且人
 賤之。
 况又
 迷固
 之。

類聚方跋
 卷之六之各曰
 麟
 載其
 道以
 傳之
 千載
 故其
 欲
 求之
 也。不
 由其
 路。譬
 如場
 師
 失養
 梧。橫
 於枳
 棘。苟
 其失
 養
 之也。
 且人
 賤之。
 况又
 迷固
 之。

人。不亦悲乎。我東洞先生
取道於越人。求方於長沙。以
唱古醫之術。然其書之篇章。
證或先方而發焉。方或後證
而起焉。不易來觀。於是
先生乃因對之。次之名曰類

聚方。嗟乎善乎此書。乃使志
古醫之術者。得由其路也。不
迷罔焉。夫道如大路然。孟軻
氏之云。今乎宜也。詩曰。不愆
不忘。率由舊章。抑此之謂與。
寶曆壬午春二月

類聚方 卷之 二 弟 二 清虛山 常卿 謹跋

門人 清東都山常卿謹跋



淡古... 清虛山常卿... 謹跋

題類聚方後

古也者逸矣無有方書存焉其
存焉者僅金匱玉函傷寒論已
此猶天之未喪斯文也是以歷
代為方者必尊奉張仲景氏矣
維然尋案多滯不得其溫與柔

類聚方 卷之 二 弟 三 清虛山 常卿 謹跋

則茹之、剛、則吐之、終令斯文至
拂也、且生書、歷世之久、闕文
錯簡、不可勝計、加之、以傳者、增
損之、變、不、亦、悲、乎、獨、吾
東洞先生、張瞻、瞋、目、朝、考、夕、試、
剛、亦、不、吐、柔、亦、不、茹、嬰、類、而、長

之、依、例、而、刪、之、以、著、類、聚、之、舉
以、視、門、人、令、人、得、與、斯、文、可
謂、幸、甚、矣、蓋、類、聚、以、以、書、方、意
也、才、意、重、只、藥、能、從、藥、能、從、則
疾、疾、無、以、潛、惡、也、賢、臣、子、不、嘗
則、已、嘗、以、甚、于、以、利、于、疾、也、百

世一日而後皆之從事于仲景
 氏日益深矣則斯文郁乎今
 者豈有與仲景氏之世矣乎哉
 余不勝其爵躍遂題類聚方後
 門人 阿波新崎國林謹題



明和元^甲申年七月

平安書肆

田中市兵衛
 山本長兵衛
 林 權兵衛
 林 宗兵衛

