





十卷

乾道厚  
半地  
荷枯  
杞人  
吳

武

999

卷

東洞先生著

方機

江戸書林

玉巖堂梓

方機序

若傷寒十百  
外愈熱未除  
脈息未緩  
便不快  
或渴或不  
能安不思飲食  
人參 芩 朮  
芍藥 甘草  
知母 生薑  
麥門 甘草

方機序

刀圭之術。自古岐黃下及歷代名師。哲匠。往往繼興。方書論說紛紛乎。不知幾數也。後漢張仲景獨尤出群。然其書傳者。僅傷寒論金匱而已。晉王叔和撰次之。增演其書。加以私說。於是篇中玉石混同。而失真面目。至千歲之後。無知仲景心事者矣。吾邦東洞翁憂其迂論臆說。害本文。憤厲激發。而作書著論。以簸以揚。批糠悉去。張氏之書得復其舊。豈不

方機



紫河車百湯  
 治傷風勞熱  
 惡寒頭痛  
 汗而咳喘  
 無自利無  
 治一切痰症  
 紫河車  
 子夏  
 黃芩  
 白朮  
 厚朴  
 枳實  
 甘草  
 芍藥

精哉。宜矣哉。世之尊信翁也。屬者。書肆北林堂齋方  
 機來曰。此書也。東洞翁口授。而門人之所傳記。以為  
 帳秘也。余得之於乾守業者。欲刊以公於世。願勞先  
 生而得校訂。余不敢辭。事務之餘。檢校數次。遂於方  
 名之下。加其方。以應其需云爾。  
 文化八年未歲二月

殿經文緯撰  
  


六二順三湯  
 若傷寒實  
 大便澀口  
 燥渴乾吐  
 喘急痰涎  
 之妄揚舌  
 難言陽脈  
 熱自汗胸  
 滿脘腹痞  
 積胡蘆  
 枳實厚朴  
 芒硝甘草  
 大黃

凡例  
 一東洞翁所著方極大行於世。然其文要簡。不便於  
 初學。此編雖似蛇足。然亦輯翁之所口授。而坦易  
 鄭重。故欲為彌後進之一助也。  
 一分量古今不一。且漢秤與本邦異。故今就翁所  
 考訂。而別註於各方下。如桂枝湯。桂枝芍藥生薑  
 各三兩。大棗十二枚。今各七分五厘。甘草二兩。今  
 五分。是也。存其舊者。以便覽者。煮法亦然。

方幾



茯苓 澤 甘 瓜 葛 瓜  

 茯苓 澤 甘 瓜 葛 瓜  
 治宜加減元  
 是方用  
 香 厚 當  
 水 茯苓  
 地 甘 陳  
 川

一各方後舉其所主治之病症而傍加兼用劑也如其藥方審于嚮所刊行古方丸散方故今不贅  
 一凡欲就長沙方而施七術者尤不可擇藥性不精嚴近世為醫者徒貪其價廉而不要擇藥唯利之趨往往欺人者多矣何其不仁之太甚也夫醫之治疾也猶勇士之使兵鎗刀鈍器雖當仇讎將安為用也故苟去其利而擇藥性能從古人之規矩則何病不治思諸思諸

方機目錄

- 桂枝湯一 桂枝加厚芍藥生薑人蔘湯二
- 桂枝加桂湯二 桂枝加芍藥湯三
- 桂枝加芍藥大黃湯三 桂枝加葛根湯三
- 栝蒌桂枝湯三 桂枝加黃耆湯三
- 桂枝加附子湯三 桂枝去芍藥湯四
- 桂枝加厚朴杏子湯四 桂枝去芍藥加皂莢湯四
- 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯四

方機



莫艾前最  
上焦熱  
內服出鳴  
受劑外  
通商麥  
地衣桑  
前為甘

桂枝去桂加朮芍湯<sub>五</sub> 桂枝加龍骨牡蠣湯<sub>五</sub>  
桂枝加桔梗湯<sub>五</sub> 桂枝加朮附湯<sub>五</sub>  
桂枝加芍藥湯<sub>五</sub> 桂枝附子湯<sub>六</sub>  
桂枝附子去桂加朮湯<sub>六</sub> 桂枝加芍藥湯<sub>六</sub>  
桂姜棗草黃辛附湯<sub>六</sub> 小建中湯<sub>七</sub>  
茯苓建中湯<sub>八</sub> 黃耆建中湯<sub>八</sub>  
桂枝甘草附子湯<sub>八</sub> 桂枝人參湯<sub>八</sub>  
人參湯<sub>九</sub> 茯苓杏仁甘草湯<sub>九</sub>

胃苓湯  
治脾胃不和  
腹痛泄瀉  
火數不陰  
湯不分  
蒼厚陳  
猪澤茯  
有甘桂  
水瀉  
加滑石  
石燕

苓桂朮甘湯<sub>十</sub> 苓姜朮甘湯<sub>十</sub>  
苓桂五味甘草湯<sub>十</sub> 苓甘五味姜辛湯<sub>十一</sub>  
苓甘姜味辛夏湯<sub>十一</sub> 苓甘姜味辛夏仁湯<sub>十一</sub>  
苓甘姜味辛夏仁黃湯<sub>十一</sub>  
苓桂甘棗湯<sub>十二</sub> 茯苓澤瀉湯<sub>十二</sub>  
澤瀉湯<sub>十二</sub> 五苓散<sub>十三</sub>  
茵陳五苓散<sub>十四</sub> 猪苓湯<sub>十四</sub>  
牡蠣澤瀉散<sub>十四</sub> 八味丸<sub>十四</sub>



竹葉石膏湯  
治枯燥氣逆  
或欲吐者  
竹葉四石  
石膏二石  
半夏八分  
甘草二升  
麥門冬  
傷寒解後  
虛羸少氣  
氣逆欲吐  
者

麻黃湯<sup>十</sup>

麻黃加朮湯<sup>十</sup>

麻黃加朮附湯<sup>十</sup>

麻黃附子甘草湯<sup>十</sup>

麻黃附子細辛湯<sup>十</sup>

麻黃杏仁甘草石膏湯<sup>十</sup>

麻黃杏仁薏苡甘草湯<sup>十</sup>

牡蠣湯<sup>十</sup>

小青龍湯<sup>十</sup>

大青龍湯<sup>十</sup>

越婢湯<sup>十</sup>

越婢加朮湯<sup>十</sup>

越婢加朮附湯<sup>十</sup>

越婢加半夏湯<sup>十</sup>

葛根湯<sup>十</sup>

麥門冬湯

葛根加半夏湯<sup>十</sup>

葛根加桔梗湯<sup>十</sup>

麥門冬

葛根加大黃湯<sup>十</sup>

葛根加朮附湯<sup>十</sup>

人參

葛根加梓葉湯<sup>十</sup>

葛根黃芩黃連湯<sup>十</sup>

米

小柴胡湯<sup>十</sup>

柴胡加芒消湯<sup>十</sup>

大逆上氣

柴胡去半夏加栝蒌湯<sup>十</sup>

咽嗑不利

柴胡加桂枝湯<sup>十</sup>

柴胡桂枝湯<sup>十</sup>

止逆下氣

柴胡加龍骨牡蠣湯<sup>十</sup>

柴胡姜桂湯<sup>十</sup>

大柴胡湯<sup>十</sup>

白虎湯<sup>十</sup>

方

三



田白湯  
治脾胃  
和腹痛泄  
瀉水穀不  
化陰陽不  
命  
木厚陳  
猪澤袪  
苟甘桂  
水煎

白虎加人參湯 二十

小承氣湯 二十

厚朴七物湯 二十

瀉心湯 二十

大黃附子湯 三十

抵當湯 三十

大黃消石湯 三十

大黃甘草湯 三十

白虎加桂枝湯 二十

厚朴三物湯 二十

大承氣湯 二十

附子瀉心湯 三十

大黃甘遂湯 三十

橘皮大黃朴消湯 三十

大黃牡丹皮湯 二十

調胃承氣湯 三十

胃風湯

水穀不化  
泄瀉

當歸芍

桂參水袪

水煎

桃核承氣湯 三十

桔梗湯 三十

甘遂半夏湯 三十

甘麥大棗湯 三十

甘草乾姜湯 三十

通脈四逆湯 三十

茯苓四逆湯 三十

附子粳米湯 四十

甘草湯 三十

芍藥甘草湯 三十

芍藥甘草附子湯 三十

生姜甘草湯 三十

四逆湯 三十

四逆加人參湯 三十

乾姜附子湯 三十

薏苡附子敗醬散 四十



牡蠣湯  
腹中動  
以者  
牡蠣厚  
桂姜  
干茯苓

大烏頭煎<sub>十四</sub>

烏頭湯<sub>一十四</sub>

赤丸<sub>二四十</sub>

真武湯<sub>二四十</sub>

附子湯<sub>三四十</sub>

天雄散<sub>三四十</sub>

梔子豉湯<sub>三四十</sub>

梔子甘草豉湯<sub>三四十</sub>

梔子生薑豉湯<sub>四四十</sub>

枳實梔子豉湯<sub>四四十</sub>

梔子大黃豉湯<sub>九四十</sub>

茵陳蒿湯<sub>五四十</sub>

梔子藥皮湯<sub>五四十</sub>

梔子原朴湯<sub>五四十</sub>

梔子乾姜湯<sub>六四十</sub>

大陷胸湯<sub>六四十</sub>

涼膈散

小陷胸湯<sub>七四十</sub>

括蕪薤白白酒湯<sub>七四十</sub>

三焦瀉散

瓜蒂散<sub>八四十</sub>

大半夏湯<sub>九四十</sub>

舌生瘡小

小半夏湯<sub>九四十</sub>

小半夏加茯苓湯<sub>九四十</sub>

便赤大便

半夏苦酒湯<sub>九四十</sub>

半夏厚朴湯<sub>十五十</sub>

結一切者

半夏乾姜散<sub>十五十</sub>

乾姜人參半夏丸<sub>一五十</sub>

餘之火

半夏瀉心湯<sub>一五十</sub>

甘草瀉心湯<sub>二五十</sub>

薄甘翅

生薑瀉心湯<sub>二五十</sub>

吳茱萸湯<sub>二五十</sub>

芒枳椇

厚朴生薑半夏甘草人參湯<sub>三五十</sub>

苓大

方幾

五



者美湯  
赤白痢  
題子園  
裏急  
腹看治  
苟當  
連  
大  
牛  
甘  
桂

黃連湯

三五十

乾姜黃連黃芩人參湯

四五十

大建中湯

四五十

黃連阿膠湯

五五十

黃芩湯

五五十

黃芩加半夏生姜湯

五五十

六物黃芩湯

六五十

三物黃芩湯

六五十

白頭翁湯

六五十

白頭翁加甘草阿膠湯

七五十

木防已湯

七五十

木防已去石膏加茯苓芒消湯

八五十

防已茯苓湯

八五十

防已黃耆湯

八五十

渴者  
肝有熱  
直視  
偏視  
暴赤  
當  
黃  
防

枳實芍藥散

九五十

枳木湯

九五十

排膿散

九五十

桂枝枳實生姜湯

十六十

枳實薤白桂枝湯

橘皮枳實生姜湯

一六十

茯苓飲

一六十

橘皮竹茹湯

二六十

橘皮湯

二六十

桂枝茯苓丸

二六十

芍歸膠艾湯

三六十

薤覆代赭石湯

三六十

赤石脂禹餘糧湯

四六十

桃花湯

四六十

酸棗仁湯

五六十

葶藶大棗湯

五六十



茅胡柳葉

十棗湯 六十

桔梗白散 六十

走馬湯 六十

備急圓 六十

礬石湯 六十

消礬散 六十

蛇床子散 六十

黃土湯 六十

桂枝芍藥知母湯 六十

滑木炭  
鉤草葉  
甘

目錄終

家紫欬

方機

陳枳枳

吉益先生口授

乾省守業筆記

甘水羊

殿經文緯校訂

紫葛胡

桂枝湯

桂枝芍藥生薑各三兩大棗十二枚 今用各七分

甘草二兩 今用五分

右五味以水七升微火煮取三升去滓適寒

升麻散

方機

連黃連

山



陰道通散  
肺經血少  
者脾胃虛  
肝心肝火  
動心亡  
當省不  
禁食甘  
社死姜

清肺湯  
枯木陳  
桑母膏  
杏梔麥  
五苓甘  
正散  
黃蘗通  
滑苳梔  
車甘

溫服一升今以水一合服已須更飲熱稀粥一  
升餘以助藥力溫覆令一時許遍身發熱微似有  
汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗  
出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又  
不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者  
一日一夜服周時觀之服一劑盡病在者更  
作服若汗不出者乃服至二三劑  
頭痛發熱汗出惡風者正證也頭痛一證亦當投

此方矣若因咳嗽嘔逆而頭痛者則非此湯之所  
治也桂枝湯不宜與此湯同服惡寒鼻鳴乾嘔者外邪之候也此方主之脉浮弱  
或浮數而惡寒者雖不具證亦用此方浮數浮弱  
蓋桂枝湯之脉狀也脈浮弱汗吐下後更湊一證又發熱汗出而身疼痛者此  
方猶為可用若脉浮緊而疼痛者則非此湯之所  
治也治也

方幾



桂枝加芍藥  
生姜人參湯

發汗後疼痛甚脉沉遲或痺或四肢拘攣心下痞  
塞者桂枝加芍藥生姜人參湯主之於本方內加  
芍藥生薑各一兩今用桂枝大棗人參  
各六分芍藥生薑各  
八分甘草四分以上兼用大簇或  
應鐘上衝甚者桂枝  
加桂湯主之於桂枝湯方內加桂二兩桂枝一錢  
芍藥大棗  
生薑各六分甘草四分  
右五味煮如桂枝湯兼用應鐘若有拘急鞭滿之證  
者則桂枝湯不宜與焉凡上衝者非上逆之謂氣  
從少腹上衝于胸是也

桂枝加桂湯

桂枝加芍藥湯

煩脉浮數無鞭滿狀者小於散四錢以  
腹滿寒下脉浮或惡寒或腹時痛者桂枝加芍藥  
湯主之於本方內加芍藥三兩桂枝大棗生薑各  
六分芍藥一錢二  
分甘草四分右  
五味煮如本方  
寒下已止而大實痛者桂枝加芍藥大黃湯主之  
於前方內加大黃一兩今於前方內  
加大黃二分兼用應鐘  
項背強汗出惡風者桂枝加葛根湯主之於本方  
內加葛根四兩桂枝芍藥大棗生薑各六分甘草  
四分葛根八分右  
五味煮如本方

桂枝加芍藥  
大黃湯

桂枝加葛根  
湯

方幾



桂枝加厚朴杏子湯

身體強脈沉遲者發熱汗出四肢拘急者或桂枝湯證而渴者括蕞桂枝湯主之於本方內加括蕞

根二兩桂枝芍藥大棗生薑各六分括蕞根甘草各四分右六味煮如本方

黃汗四肢弛痛或身疼重煩燥小便不利者煩燥不利者立方証也身體疼重爲主証也或盜汗出者發熱惡風而發

黃色者桂枝加黃耆湯主之於本方內加黃耆二兩桂枝芍藥大棗生薑各六分甘草黃耆各四分右六味煮如本方

桂枝加附子湯

發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以

桂枝加厚朴杏子湯

屈伸者桂枝加附子湯主之於本方內加附子一枚桂枝芍藥大棗生薑各六分甘草四分附子三分右六味煮如本方

桂枝去芍藥湯

胸滿無拘急之證者桂枝去芍藥湯主之於本方

內去芍藥桂枝大棗生薑各九分甘草六分以上四味煮法如本方若有喘而

胸滿或痛或脇下痞鞞等證者非此湯之所知也

桂枝加厚朴杏子湯

喘家桂枝加厚朴杏子湯主之於本方內加厚朴

二兩杏子五十個桂枝芍藥大棗生薑各六分甘草厚朴杏仁各四分右七味煮

如本方若喘而身疼痛者非此湯之所至也



桂枝去芍藥  
加皂莢湯

胸中熱而吐涎沫或咳者兼用南呂桂枝去芍藥加皂  
莢湯主之於本方內去芍藥加皂莢二枚桂枝生  
各七分五厘甘草皂莢各五分右五味煮法如本方若咳而腹中拘攣或咳  
逆倚息者非此湯之所治也

桂枝去芍藥  
加蜀漆龍骨  
牡蠣湯

驚狂兼用紫圓起臥不安者或火逆躁兼用紫圓胸腹動劇  
者及瘧疾而有上衝者兼用紫圓桂枝去芍藥加蜀漆  
龍骨牡蠣湯主之桂枝生姜蜀漆各三兩大棗十  
二枚今各四牡蠣五兩九分龍骨四兩六分甘草二

桂枝去桂  
加苓朮湯

兩分三右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內  
諸藥煮取三升去滓溫服一升今以水二合若  
有胸脇苦滿之症則別有主治矣

桂枝加龍骨  
牡蠣湯

頭項強痛發熱無汗心下滿微痛兼用南呂小便不利  
者桂枝去桂加朮苓湯主之於桂枝湯方內去桂  
加苓朮各三兩芍藥大棗生姜各六分廿  
失精胸腹有動者兼用應鐘桂枝加龍骨牡蠣湯主之  
於本方內加龍骨牡蠣各三兩桂枝芍藥大棗生



湯桂枝加桔梗

分五厘甘草三分  
右七味煮如本方

外感之證咽痛者或咽喉中生瘡或腫痛兼用應

攻之以梅肉者桂枝加桔梗湯主之於本方內加桔梗

濕家骨節疼痛兼用應者或半身不遂口眼喎斜

紫圓南呂或者或頭疼重鐘應者或身體麻痺者或頭痛

劇者應鐘時々以七室桂枝加木附湯主之桂枝

大棗生姜木各六分附子甘  
草各四分右七味煮如本方

濕家眼目不明者應鐘或紫或耳聾或肉脞筋惕

湯桂枝加木附

湯桂枝加苓朮

者桂枝加苓朮附湯主之於前方內加茯苓六分  
經按以上二方皆從桂

桂枝附子湯

桂枝四兩今八分附子三枚今九分甘草二兩今四分生姜三

兩大棗十二枚各六分

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服今以

身體疼煩不能自轉側者應鐘或若其人大便秘

方幾



桂枝附子去  
桂加木湯

應鐘小便自利無衝逆者桂枝附子去桂加木湯主  
之於桂枝附子湯方內去桂加木四兩附子九分  
木八分甘  
草四分大棗生姜各六分右  
五味煮法如桂枝附子湯  
取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服  
三服都盡其人如冒狀勿怪卽是木附走皮中逐  
水氣未得除故耳

桂姜棗草黃辛附湯

桂枝生姜各三兩大棗十二枚各六分甘草麻黃細

辛各二兩各四分附子一枚三分

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二  
升分溫三服當汗出如虫行皮中卽愈以水一合  
四勺煮取

惡寒或身體不仁或手足逆冷而心下堅者紫圓  
南呂

及有痰飲之變者

四肢惰痛惡寒甚者

世俗所謂勞咳脊骨  
之灸骨蒸惡熱惡寒心中鬱鬱或



心下痞堅者南呂無痞堅者解毒散俱以紫圓時令攻之

小建中湯

桂枝甘草生姜各三兩大棗十二枚各四分五厘芍藥

六兩分九膠飴一升錢三

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微

火消解溫服一升日三服以水一合五勺煮取六

腹中急痛應鐘或拘攣者此其正証也若有外閉之

証則非此湯之所主治也

衄解毒失精下血應鐘之人腹中攣急或痛手足煩熱

者

產婦手足煩熱咽乾口燥腹中拘攣者應鐘若有塊

者夷則

心悸或肉腠筋惕或頭眩者應鐘心悸甚者解毒茯苓

建中湯主之於本方內加茯苓四分五厘煮法如本方

盜汗或汗出多或身重或不仁者黃耆建中湯主

之兼用於小建中湯方內加黃耆一兩半今二分三厘

茯苓建中湯

黃耆建中湯

方幾



桂枝甘草附子湯

甘草朮各二兩分六附子二枚分九桂枝四兩分二

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三

服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐

一升多者服六七合以水一合二勺

骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇者紫圓或七室

桂枝人蔘湯

桂枝甘草各四兩分八朮人蔘乾姜各三兩分六

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取

二升溫服一升日再夜一服以水一合八勺

表裏有熱下利心下痞鞅大者痢病發熱惡寒心

下痞鞅圓紫者

人參湯

人參甘草朮乾姜各三兩各七分

右四味搗篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合

和一丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益



至三四九然不及湯湯法以四物依兩數切用水  
八升煮取三升去滓溫服一升日三服以水一合  
六勺煮取

服

心下痞鞭大者心下痞喜噦不了者南

暑病所謂霍亂嘔吐下利心下痞鞭者紫

茯苓杏仁甘草湯

茯苓三兩一分錢杏仁五十個一分錢甘草一兩五分

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不

差者更服以水一合二勺煮取六勺

短氣息迫或喘急紫者酒客最多此病以此湯大有効

苓桂朮甘湯

茯苓四兩一分錢桂枝三兩九分朮甘草各二兩各六分

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服以水  
二勺煮

取六勺

心下逆滿起則頭眩應鐘或紫者

眼痛生赤脉不能開者應鐘或紫

方錢



耳聾衝逆甚頭眩者應鐘及七室

苓姜朮甘湯

甘草朮各二兩五分乾姜茯苓各四兩錢一

右四味以水五升煮取三升分溫三服以水一合二勺煮取

六勺

身體重腰冷小便自利者應鐘

苓桂五味甘草湯

茯苓桂枝各四兩八分甘草三兩六分五味子半升錢一

二分

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服以水一合

六勺煮取六勺

咳後衝逆劇手足厥冷或心下悸或頭眩或肉瞤

筋惕者以上諸症皆兼用南呂丸若衝逆已愈但咳滿者苓甘

五味姜辛湯主之於前方內去桂加茯苓四兩六分

乾姜細辛各三兩四分五厘

苓甘姜味辛夏湯

夏甘五味姜辛湯



茯苓四兩分九甘草細辛乾姜各三兩分各三五味子

半夏各半升分各九

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

服以水一合六勺煮取六勺

前方証而嘔者

苓甘姜味辛夏仁湯 於前方內加杏仁半升分九

前方証而微浮腫呂南者

苓甘姜味辛夏仁黃湯於前方內加大黃三兩分三

前方証而大便不通者

苓桂甘棗湯

茯苓半斤一分錢甘草三兩四分五厘大棗十五枚五分五厘

桂枝四兩分六

右四味以水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取

三升去滓溫服一升日三服以水二合煮取六勺

臍下悸者

奔豚迫于心胸短氣息迫紫圓者

方機

生



茯苓澤瀉湯

茯苓半斤一分錢澤瀉生薑各四兩各六分甘草桂枝

各二兩各三分木三兩四分

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉更煮取二升

半溫服八合日三服以水二合五勺先煮五味取

吐而渴欲飲水者此正症也圓紫渴有水而而小便

不利心下悸或腹脹滿水滿者者經實紫圓仲

澤瀉湯

澤瀉五兩二分錢木二兩一分錢

右二味以水二升煮取一升分溫再服以水一合

六勺

心下有水氣苦胃眩小便不利者

五苓散

澤瀉一兩六銖半八分猪苓茯苓木各十八銖各六分

桂枝半兩四分

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲煖



水汗出愈或以水一合五勺煮取六勺服亦可也

大汗出而煩燥小便不利身熱消渴者正症也發

汗而脉浮數煩渴者亦可用焉

發熱而煩渴欲飲水水入口則吐者紫圓發熱小便

數與發汗者或渴欲飲水者

頭痛發熱汗出惡寒身疼痛而欲飲水者紫圓

發熱嘔吐下利渴而欲飲水者紫圓

心下悸吐涎沫頭眩者紫圓

心下痞煩渴口燥小便不利黃鐘丸者若發黃色者

茵陳五苓散主之兼用兼氣丸茵陳蒿末分五五苓散分五

右二物和先食飲方寸匕日三服

猪苓湯

猪苓茯苓阿膠滑石澤瀉各一兩分六

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿

膠烱消温服七合日三服以水一合二勺煮取六勺內膠令消

脉浮發熱渴欲飲水者此其正症也

方幾

占

四續今啟



下利咳嘔渴而心煩不得眠者

小便淋瀝或便膿血便者小者滑石礬甘散或應鐘

牡蠣澤瀉散

牡蠣澤瀉括萆根蜀漆葶藶商陸根海藻各等分

右七味異搗下篩為散更入臼中治之白飲和服

一方寸匕小便利止後服日三服

胸腹有動而渴腰以下水腫者實

八味丸

乾地黄兩八山茱萸兩薯蕷兩各四澤瀉兩茯苓兩牡丹皮兩各三

桂枝附子兩各二

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日再

服

脚氣疼痛少腹不仁難足冷或痛少腹拘急小便

不利者應鐘

消渴而小便反多者

煩熱不得卧倚息小便不利飲食如故者



夜尿或遺尿者應鐘及臍下氣海之邊日灸七壯

麻黃湯

麻黃三兩杏仁七十個各九分桂枝二兩六分甘草一

兩三分

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息以水二合煮取六勺頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者

是其正證也

喘而胸滿者服發汗劑而不汗却斂者

濕家身煩疼者麻黃加朮湯兼用七室主之於本方內

加朮四兩麻黃杏仁各七分半桂枝五分甘草二分半朮一分半錢右五味煮法如本方

小瘡內攻喘鳴息迫小便不利一身滿腫者麻黃

加朮附湯主之兼用桃花散或紫圓

麻黃附子甘草湯

麻黃甘草各二兩錢一附子一枚七分五厘

麻黃加朮附子湯

麻黃加朮湯



右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服以水一合四脈微細但欲寐惡寒黃連解毒散者水腫脈沉微鬱滯者桃花散或糞宿時々以紫圓攻之而可也

麻黃附子細辛湯

麻黃細辛各二兩錢一附子一枚五厘

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服以水一合四

手足冷發熱脈沉者或脈微細而惡寒甚者

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩分八杏仁五十個甘草二兩各四石膏半

斤一錢六分

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升以水一合四

汗出而喘熱伏者

喘息而渴者兼用南呂或姑洗

方

七



麻黃杏仁薏苡甘草湯

方從外臺古今錄驗

麻黃四兩分八甘草二兩杏仁五十個各四分薏苡仁

半斤一分錢六分

右四味以水五升煮取二升分溫再服以水一合五勺煮取

勺六

一身悉痛應鐘發熱劇或浮腫桃花者

發熱皮膚枯燥喘滿桃花者

牡蠣湯

牡蠣麻黃各四兩錢一甘草二兩五分蜀漆三兩七分五厘

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升

內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服以水二合

四勺先煮麻黃蜀漆得一合八勺內二味煮取六勺

瘧疾惡寒甚胸腹動劇紫圓者

小青龍湯

麻黃芍藥乾姜甘草桂枝細辛各三兩各三分五味

子半夏各半升各六分

方幾

木



右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升以水二合

乾嘔發熱而咳或咳且微喘者以上兼喘息者南

大青龍湯

麻黃六兩分八桂枝甘草各二兩杏仁四十個各三分

生姜三兩大棗十二枚各四分石膏雞子大一分

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗以水一合

汗出多者溫粉粉之一服汗者停後服汗多八分

陽遂虛惡風煩躁不得眠也

發熱惡寒身疼痛不汗出煩躁者

脈浮緩發熱身重乍有輕時者

頭痛劇四肢惰痛發熱而汗不出者

越婢湯

麻黃六兩分九石膏半斤一分生姜三兩四分大棗

方幾

七



越婢加木湯

十五枚分六甘草二兩分三  
右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取  
三升分溫三服以水一合二  
一身悉腫脉浮自汗出惡風者  
若前症而小便不利者或一身面目黃腫小便自  
利其脉沉而渴者或小便不利不渴者越婢加木  
湯仲品或難實迫于胸主之於本方內加木四兩  
麻黃六分石膏八分大棗木各四分甘草  
二分生姜三分右六味煮法如越婢湯

越婢加木附

湯越婢加半夏

脚氣一身腫滿小便不利或惡寒或兩脚不仁者  
越婢加木附湯主之兼用於前方內加附子分四  
咳而上氣喘或嘔者越婢加半夏湯南主之於本  
方內加半夏半升麻黃半夏各六分石膏八分生  
六味煮  
如木方

葛根湯

葛根四兩分六麻黃生薑各三兩大棗十二枚分各四  
厘桂枝芍藥甘草各二兩分各三

方幾

三



葛根加半夏湯

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌以水二合煮取六分項背強而無汗惡寒者應二陽大陽陽明合病下利者

不下利但嘔者葛根加半夏湯主之於本方內加

半夏半升葛根半夏各六分桂枝芍藥甘草各三分麻黃大棗生薑各四分五厘右八味

煮如本方

瘧病無汗小便反少氣上衝于胸口噤不能語言

者本方主之紫圓

瘡瘡自初熱至黧見投本方兼用紫圓下之度自起脹至貫

膿葛根加桔梗湯主之於本方內加桔梗五分自落痂

以後葛根加大黃湯主之於本方內加大黃五分若惡

寒劇起脹甚而一身腫脹或疼痛者葛根加木附

湯紫圓主之於本方內加木附子各四分若腫脹甚者桃花散

寒戰咬牙而下利者俱加木附湯兼用紫圓

葛根加桔梗湯  
葛根加大黃湯  
葛根加木附湯



葛根加梓葉湯

頭瘡加大黃湯主之

小瘡葛根加梓葉湯

桃花散以葷麻子搗之  
毒劇者以梅肉攻之主之

於本方內加梓葉五分

諸頑腫惡腫加木附湯主之

瘰癧七室梅肉日便毒瘍疔之類以梅肉攻之五分夕

五分酒

疔瘡七寶或梅肉之類撰用

凡諸有膿則加桔梗若疼劇則加木附

世俗所謂小兒赤遊風丹毒類皆加木附湯主之

兼用紫圓攻之

葛根黃芩黃連湯

葛根半斤一分甘草黃芩各二兩各四分黃連三兩

分六

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取

二升去滓分溫再服以水二合六勺煮取六勺

下利喘而汗出者

方幾

三



項背強汗出下利者以上兼用應鐘

小莖胡湯

柴胡半斤分八黃芩人參甘草生姜各三兩大棗十二枚分各三半夏半升分六

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服以水二合四勺煮取二合去滓再煎取六勺

往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者

胸滿脇痛者

身熱惡風頸項強胸下滿或渴或微嘔者

胸下逆滿鬱鬱不欲飲食或嘔者應鐘

發潮熱胸脇滿而嘔者消塊

寒熱發作有時胸脇苦滿有經水之變者應鐘

產婦四肢苦煩熱頭痛胸脇滿者解毒散

產婦鬱冒寒熱往來嘔而不能食大便堅或盜汗

出者消塊或應鐘

發熱大便溏小便自可胸滿者消塊



此胡加芒消湯

發黃色腹痛而嘔或胸脇滿而渴者應鐘  
胸下鞭滿不大便而嘔者消塊

若潮熱不去大便不通者此胡加芒消湯主之於

小此胡湯方內加芒硝六兩柴胡八分半夏芒消各六分人參黃芩各一分

草生姜大棗各三分右八味以水二合四勺煮取一合二勺去滓再煎取六勺內芒消更上火微沸

消令

癰病往來寒熱胸脇苦滿或渴不嘔者此胡去半

夏加括蕪湯主之兼用於紫圓於小此胡湯方內去半夏

此胡去半夏加括蕪湯

柴胡加桂枝湯

加括蕪根四兩柴胡八分人參黃芩生薑大棗甘草各三分括蕪根四分右七味煮

法如小此胡湯

若上逆者柴胡加桂枝湯主之於本方內加桂枝五分

發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結者兼用應鐘或

腹中急痛上衝心者應鐘桂枝湯合方主之柴胡桂

枝湯方桂枝芍藥黃芩人參生薑大棗各三分甘草二分半夏六分柴胡八分右九味煮法

如小此胡湯

若本方証而嘔逆劇者倍半夏湯熟而加生薑汁

方幾

香



此胡加龍骨  
牡蠣湯

一錢

本方症而胸腹有動者失精者俱應胸滿煩驚者

解毒散或紫圓莖胡加龍骨牡蠣湯主之半夏二合分大

棗六枚生薑人參龍骨鈎丹桂枝茯苓牡蠣各一

兩半各二厘柴胡四兩六分大黃二兩三分

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如棗子

更煮一二沸去滓以水一合服一升以水一合五

柴胡姜桂湯

柴胡半斤八分桂枝乾姜黃芩牡蠣各三兩三分括萎

根四兩四分甘草二兩二分干厚衣

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈今

如小柴胡湯

胸脇滿微結渴而不嘔頭汗出往來寒熱心煩者

兼用應鐘

胸脇滿上逆胸腹有動者

方幾

三五



瘧疾惡寒甚胸脇滿胸腹有動而渴者

紫圓或應鐘

大柴胡湯

柴胡半斤八分黃芩芍藥各三兩大棗十二枚各三分

半夏半升六分生姜五兩枳實四枚各五分大黃二兩

二分

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服

一升日三服煮如小此胡湯

嘔吐不止心下急鬱鬱微煩者

心下痞鞭而痛嘔吐下利者

心下滿痛大便不通者

胸脇苦滿腹拘攣大便不通者

白虎湯

知母六兩六分石膏一斤六錢甘草二兩二分粳米六

合一分錢

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日

三服以水一合二勺煮取六合

方幾

三六



白虎加人參湯

手足厥冷或惡寒而自汗出譫語者  
手足厥冷曾腹熱劇者  
大煩渴舌上乾燥欲飲水數升者  
無大熱心煩背微惡寒者  
暑病汗出惡寒身熱而渴者  
胸腹熱劇或渴如狂者本方內加黃連六分  
本方証而心下痞鞭者白虎加人參湯主之於本  
方內加人參三兩三分

白虎加桂枝湯

瘧疾身熱骨節痠煩渴欲飲水者白虎加桂枝湯  
主之於本方內加桂枝三兩三分右以水一斗五升  
煮取八升去滓溫服以紫圓時以上皆

小承氣湯

大黃四兩一分厚朴二兩六分枳實三枚九分  
已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二  
服以水二合初服湯當更衣不爾者盡飲之若更  
衣者勿服之

方幾

三



腹滿大便不通者

汗多大便鞭譫語者

發潮熱大便初頭鞭後必溏者

微煩小便數大便鞭者

下利譫語者

大便不通噦而譫語者

厚朴三物湯

厚朴八兩二錢 大黃四兩二錢 枳實五枚一錢五分

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃

煮取三升溫服一升以利為度煮如小承氣湯

腹滿心下痛而大便不通者屢所經

心下滿痛吐出水者

厚朴七物湯

厚朴半斤八分 甘草大黃各二兩各三分 大棗十枚二分

枳實五枚 生姜五兩各五分 桂枝二兩二分

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服水以



一合五分  
煮取六分

腹滿發熱脉浮數飲食如故者

腹滿發熱脉浮數而嘔大便不通者

痢疾手足惜痛或發熱脉浮數或嘔者

大承氣湯

大黃四兩分六厚朴半斤二錢枳實五枚七分芒消一分

三合分九

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃

煮取二升去滓內芒消更上微火一兩沸分温再

服得下餘勿服以水三合者厚朴枳實減半去滓

發潮熱大便鞭者

腹滿難解者

腹滿脹而喘兩便不通一身面目水腫者

潮熱譫語大便鞭或有燥屎者

腹滿痛大便不通者

大便不通煩而腹滿者



目中不了了<sub>レ</sub>睛不和<sub>レ</sub>大便鞭者  
 自利清水心下痛口乾燥者  
 胸滿口噤臥不着席脚攣急咬牙者  
 腹中有堅塊大便不通者  
 痘瘡腹大滿兩便不通或譫語口乾咽燥者  
 痢疾譫語或腹滿痛而不能食者  
 食滯腹急痛大便不通或嘔利者  
 瀉心湯

大黃二兩錢黃芩黃連各一兩各五分

右三味以水三升煮取一升頓服之今以沸湯八

沸須更絞去滓頓服

心下痞按之濡者正症也

心氣不足吐血衄血者

心煩心下痞者

若惡寒者附子瀉心湯主之於瀉心湯方內加附

子一枚右四味切三味以麻沸湯二升漬之須更

附子瀉心湯

方幾

三



絞去滓內附子汁分溫再服大黃一錢黃芩黃連各五分附子七分五厘右四味以水九勺先煮附子取六勺去滓內諸藥煮一二沸須更絞去滓服

大黃附子湯

大黃三兩分九附子三枚分一錢三厘細辛二兩分六

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取一升半分溫三服服後如人行四五里進一服

以水一合五勺煮取六勺胸下偏痛發熱者黃蘗合一兩分五

惡寒甚腹痛大便不通者

大黃甘遂湯

大黃四兩分四甘遂阿膠各二兩分各七

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當下以水一合八勺煮取六勺

小腹滿如敦狀小便微難者

小腹絞痛堅滿手不可近者

抵當湯



水蛭 蠶蟲 各三十個各十個 桃仁 二十個分二 大黃 三兩二錢

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服為末以水合煮取六分

小腹痛滿小便自利發狂者其血當下

喜忘大便鞕反易通色黑者

大脉浮數而善饑大便不通者

經水不利者六野不血者

橘皮大黃朴消湯

橘皮一兩分六 大黃朴消各二兩二錢

右三味以水一大升煮至小升頓服即消以水合八分

煮取六分

宿食在心胸之間不化者

大黃消石湯

大黃黃蘗消石各四兩分八 梔子十五枚分四

右四味以水六升煮取三升去滓內消石更煮取



一升頓服以水一合二升煮三味取六分去滓內硝令消

發黃色腹滿小便不利者

身熱心煩大便不通者

大黃牡丹皮湯方從千金

大黃四兩六分牡丹皮三兩四分桃仁五十個芒消

二兩各三分瓜子一升一分

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再煎沸

頓服有膿當下如無膿當下血以水三合六分煮取六分去滓

內芒消

腹癰按之即痛時時發熱自汗出復惡寒者

腹中有堅塊經水不順者

腹脹滿如鼓生青筋或腫小便不利者

小腹有堅塊小便淋瀝者

大黃甘草湯

大黃四兩錢二甘草一兩五分

右二味以水三升煮取一升分溫再服以水一合八分煮取

方幾

三



六  
勺

大便不通急迫者

食已即吐大便不通者

調胃承氣湯

大黃四兩錢一甘草二兩分五芒消半觔錢二

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒消更

上火微煮令沸少少溫服以水一合八勺煮取六勺去滓內芒消令消也

因汗吐下謔語者

發汗後熱而大便不通者

服下劑下利不止心煩或謔語者

吐下之後心下溫溫欲吐大便溏腹微滿鬱鬱微

煩者

吐後腹脹滿者

桃核承氣湯

桃仁五十個桂枝芒消甘草各二兩各五大黃四

兩錢一

方

錢



右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消更上火微沸下火先食温服五合日三服當微利以水

五勺煮取六勺去滓內芒消微沸令消

小腹急結如狂者

胞衣不下氣急息迫者

產後小腹痛惡露不盡或不大便而煩燥或譫

語者

痢病小腹痛急痛者

甘草湯

甘草二兩錢二

右一味以水三升煮取一升半去滓温服七合日

二服以水一合二勺以水一合二勺

急迫而咽痛者

桔梗湯

桔梗一兩錢一甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服以水一合



八勺煮  
取六勺

咽痛者 應鐘

咽中腫不能飲食者

肺癰 應鐘 癰疽 伯州或梅肉 諸腫有膿者 伯州梅肉

芍藥甘草湯

芍藥甘草各四兩 各一錢四分

右二味以水三升煮取一升半去滓分温再

服之 以水一合二勺煮取六勺

脚攣急者 應鐘紫圓

甘遂半夏湯

甘遂三枚 二分 半夏十二枚 一分 芍藥五枚 甘草指

大一枚 各八分

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半斤和藥

汁煎取一合頓服之 以水一合六勺煮取四勺去滓以蜜四勺和藥汁煎取六勺

下利心下續堅滿者

方幾

三



下利拘攣而痛不可近者

芍藥甘草附子湯

芍藥甘草各三兩一分錢附子一枚一分六

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

以水二合

汗後惡寒者半夏十二枚

脚攣急疼痛者應鍾紫圓

甘麥大棗湯

甘草三兩四分小麥一升二分大棗十枚四分

右三味以水六升煮取三升分溫三服以水一合

六勺

心中煩燥悲傷欲哭腹中濡者紫圓或解毒散兼用

生姜甘草湯

生姜五兩錢人參三兩六分甘草四兩大棗十五枚

各八分

右四味以水七升煮取三升分溫三服以水一合

方機

三



六

咳唾涎沫不止咽燥而渴者南呂

嘔吐不止心下痞鞭而急迫者紫圓

甘草乾姜湯

甘草四兩錢一乾姜二兩分五

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服

以水一合二勺煮取六勺

吐涎沫不咳遺尿小便數者南呂

足厥咽中燥煩躁嘔逆者

吐下後厥逆煩躁不可如何者

四逆湯

甘草二兩錢一分乾姜一兩半附子一枚各九分

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分温

再服強人可大附子一枚乾姜三兩以水一合五勺煮取三勺

手足厥冷者

下利清穀者

方

錢



通脈四逆湯

腹拘急四肢厥冷下利惡寒者

大汗出熱不去拘急四肢厥冷者

下利腹脹滿身體疼痛者

吐利汗出發熱惡寒四肢厥冷脈微欲絕或腹痛

或乾嘔或咽痛者通脈四逆湯主之 甘草二兩

錢附子一枚一分五厘乾姜三兩一分六錢右三味以水三

升煮取一升二合去滓分溫再服其脈即出者愈

今為如本方

四逆加入參湯

下利惡寒脈微手足厥冷或心下痞鞭者四逆加

人參湯主之於本方加入參一兩甘草錢乾

分五厘人參五分

茯苓四逆湯

茯苓六兩一分五厘人參一兩一分二厘甘草二兩一分五厘

乾姜一兩半附子一枚各三分八厘

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三

服以水一合

方幾

三九



手足厥冷煩躁者

肉腠筋惕手足厥冷者

心下悸惡寒腹拘急下利者

乾姜附子湯

乾姜一兩二分附子一枚一分

右二味以水三升煮取一升分滓頓服以水一合

六

煩躁不得眠脉沉微者

附子粳米湯

附子一枚三分半夏一分甘草一兩二分大棗十

枚五分粳米半升錢二

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日

三服以水一合六

腹中雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐者消塊

惡寒或手足厥冷腹滿痛嘔吐者消塊

薏苡附子敗醬散

方幾

四



薏苡仁十分附子二分敗醬五分

右三味搗為末取方寸匕以水二升煎減半頓服

小便當下以水一合二

腸癰其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀脉數者

瘡家身甲錯者

所謂鷲掌風者以上

大烏頭煎

烏頭大者五枚三錢

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣

盡取二升強人服七合弱人五合不差明日更服

不可一日再服以水九勺煮取三勺去

腹痛自汗出手足厥冷脉沉絃者麤實或紫圓

烏頭湯

麻黃芍藥黃耆甘草各三兩六分川烏五枚呿咀以

蜜二升八勺煎取一升四勺即出烏頭

右五味呿咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜

方幾

三



煎中更煎之服七合不知盡服之以水二合七勺  
去滓內蜜煎中更煎取六勺

歷節疼痛不可屈伸者

脚攣急疼痛不可屈伸者

脚腫疼痛者以上兼用麩實時時以紫圓攻之仲呂亦可也

腰以下腫疼痛者麩實或仲呂或挑花散

腹中絞痛拘急不得轉側身重手足厥冷陰縮者

小腹攣急陰囊偏大者麩實或仲呂

自汗盜汗出浮腫者桃花散

赤丸

茯苓四兩半夏四兩一方用桂烏頭二兩細辛一

兩

右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大先食

酒飲下二九日再夜一服不知稍增之以知為度

厥逆惡寒心下悸者

真武湯



茯苓芍藥生姜各三兩各七分 朮二兩五分 附子一枚四分

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三

服以水一合六  
勺煮取六勺

腹痛消塊小便不利四肢沈重疼痛下利或咳或嘔

者苓四兩半心下悸頭眩應鐘身動振振欲擗地者

舌上乾燥黑胎生口中有津液身熱頭眩手足振

振或下利者紫圓

附子湯

附子二枚茯苓芍藥各三兩分六 人參二兩分四 朮四

兩分八

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

服以水一合六  
勺煮取六勺

脉微細其背惡寒者

身體痛手足冷骨節痛脉沈者應鐘



身體痛小便不利心下悸或痞者

天雄散

天雄三兩當作三枚 朮八兩 桂枝六兩 龍骨三兩

右四味杵為散酒服半錢匕日三服不知稍增之  
失精臍下有動而惡寒或衝逆或小便不利者應

梔子豉湯

梔子十四枚分 香豉四合錢

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取

一升半去滓分為二服溫進一服得吐者止後服

以水一合六勺先煮梔子取一合去滓內豉煮取六勺

心中懊懣者

煩熱胸中窒者

身熱不去心中結痛者

下後煩心下濡者此煩與桂枝湯發汗後之煩不可混

若急迫者梔子甘草豉湯主之於梔子豉湯方內

加甘草二兩分

梔子甘草豉湯



湯 梔子生姜豉

若嘔者梔子生姜豉湯主之於梔子豉湯方內加  
生姜五兩錢二

湯 枳實梔子豉

若胸滿煩熱者枳實梔子豉湯主之 枳實三枚

六分梔子十四枚四分豉一升八分錢

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子

煮取一升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆取

微似汗以水一合六勺先煮二味

若大便不通胸脇滿痛者黃疸心中懊懣或熱痛

湯 梔子大黃豉

者梔子大黃豉湯主之 梔子十二枚二分大黃

一兩一分枳實五枚七分豉一升八分右四味以

水六升煮取二升分溫三服以水一合八勺

茵陳蒿湯

茵陳蒿六兩一分錢 梔子十四枚 大黃二兩各六分

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取

三升去滓分溫三服以水一合六勺先煮茵陳取一合

小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從

方 幾

四



小便去也

發黃色小便不利渴而欲飲水大便不通者

發黃色小便不利腹微滿者

寒熱不食頭眩心胸不安者

梔子蘘皮湯

梔子二十五個一分甘草一兩一分黃蘘二兩一分

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服以水

一合六分

身黃發熱者

身黃心煩者解毒散

梔子厚朴湯

梔子十四枚一分厚朴四兩枳實四枚各一分

已上三味以水三升半煮取一升半去滓分三服

溫進一服得吐者止後服以水一合四分

心煩腹滿起卧不安者

梔子乾姜湯

方機

果



枳子十四枚乾姜二兩各一錢五分

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服温

進一服得吐者止後服以水一合四

身熱不去微煩者兼用解毒散

### 大陷胸湯

大黃六兩九分芒消一升三錢甘遂一錢一分

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消

煮一兩沸內甘遂末温服一升得快利止後服

一合八勺先煮大黃取六勺去滓內芒消令消內甘遂末服之

結胸心下痛按之石鞭者

短氣煩燥心下鞭者

舌上燥而渴發潮熱不大便自心下至小腹鞭滿

而痛不可近者

讖語煩燥心下痛手不可近者

### 小陷胸湯

黃連一兩四分半夏半升二錢四分栝蒌實大者一個八分

方幾

四七



右三味以水六升先煮括蕒取二升去滓內諸藥  
煮取一升去滓分溫三服以水一合八勺先煮括蕒取九勺內二味煮取

六  
結胸有痰飲之變者兼用南呂姑洗或紫圓

龜背腹中無積聚者兼用紫圓

病聚于胸中而嘔或吃者紫圓

胸膈膨脹而發痼者紫圓

括蕒薤白白酒湯

括蕒實一枚分六錢薤白半升分二錢白酒七升分二合

右三味同煮取二升分溫再服取六勺服

喘息咳唾胸背痛者姑洗或白散或紫圓

若心痛徹背不得臥者及胸噎心痛者括蕒薤白

半夏湯主之俱兼用姑洗紫圓括蕒實一枚分六錢薤白三兩

分九錢半夏半升分八錢白酒一斗分三合右四味同煮取四

升溫服一升日三服煮取六勺

瓜蒂散

括蕒薤白半  
夏湯



瓜蒂赤小豆各一分分五

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香

豉一合二錢四分用熱湯七合七煮作稀糜去滓取汁

和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡

血虛家不可與瓜蒂散

胸中痞塞上衝咽喉不得息者

手足厥冷心中煩滿饑不能食者

心中溫溫欲吐又不能吐手足厥冷者

大半夏湯

半夏二升四分二錢人參三兩三分白蜜一升五分二錢

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮

取二升半溫服一升餘分再服以水三合四分

嘔吐而心下痞鞭者大簇或紫圓

嘔而心下痛者南

小半夏湯

半夏一升四分二錢生姜半斤一分六分



小半夏加茯苓湯

右二味以水七升煮取一升半分温再服以水八分

煮取六分

嘔吐而不渴者嘔劇者倍加生姜汁

若心下痞眩悸者小半夏加茯苓湯主之兼用俱

半夏一升八分錢生姜半斤二分錢茯苓三兩四分五厘

右三味以水七升煮取一升五分温再服以水八分

八分煮取六分

半夏苦酒湯

半夏十四枚分雞子一枚去黃

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安

火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

咽中生瘡不能語言者

咽中腫水穀不下者

半夏厚朴湯

半夏一升二分錢厚朴三兩三分茯苓四兩四分生姜五

兩九分乾蘓葉二兩二分

方機

五



右五味以水七升煮取四升分温四服日三夜一

服以水一合五勺煮取六勺

咽中如有炙臠者兼用南呂按千金作胸滿心下堅咽中帖々如有炙肉吐之不

出吞之不下

若感冒桂枝之証而有痰飲者桂枝湯合方主之

屢所經驗也

### 半夏乾姜散

半夏乾姜各等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半二合煎取

七合分頓服之

乾嘔不止者

吐涎沫者兼用南呂

### 乾姜人蔘半夏丸

乾姜人蔘各一兩七分半夏二兩一分

右三味末之以生姜汁糊為丸如梧子大飲服十

丸日三服或三味水煎合生姜汁服



妊娠嘔吐不止者

心下痞鞭而乾嘔不止者

半夏瀉心湯

半夏半升分九黃芩乾姜人蔘甘草各三兩大棗十

二枚各四分黃連一兩一分

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升温

服一升日三服以水二合者取六分

心下痞鞭腹中雷鳴者大

嘔而腸鳴心下痞鞭者人

心中煩悸或怒或悲傷者紫

若下利不止乾嘔心煩者甘草瀉心湯主之紫

欲眠目不得閉起臥不安不欲飲食惡聞食臭者

甘草瀉心湯主之於半夏瀉心湯方內加甘草一

兩一分

若乾噫食臭腹中雷鳴下利或嘔吐者生姜瀉心

湯主之半夏瀉心湯方內減乾姜二兩加生姜四

生姜瀉心湯

甘草瀉心湯



兩半夏九分甘草一分人蔘一分大棗一分黃芩四分五厘一分黃連一分乾姜一分五厘一分生薑六分右八味煮如半復湯心

吳茱萸湯

吳茱萸一升人蔘三兩大棗十二枚各四分

生薑六兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三

服以水二合煮取六分

食穀欲嘔者逆方意以氣証

吐利也吐手足厥冷煩燥者

乾嘔吐涎沫頭痛者南六代志乾頭一代日三

嘔而胸滿者紫

脚氣上攻而嘔者紫若水腫而嘔者非此湯之所

知也

厚朴生姜半夏甘草人蔘湯

厚朴一斤生薑各半斤二分錢半夏半斤一分九人蔘一兩一分

五厘甘草二兩三分



右五味以水一斗煮取三升去滓温服一升日三服以水二合煮取六分

腹脹滿嘔逆者兼用消塊

黃連湯

黃連甘草乾姜桂枝各三兩大棗十二枚各四分五厘

人參二兩分三半夏半升分九

右七味以水一斗煮取六升去滓温服一升日三服夜二服以水一合煮取六分

胸中有熱腹中痛欲嘔吐者以水一合煮取六分

心煩嘔逆者以上兼用紫圓

乾姜黃連黃芩人參湯

乾姜黃連黃芩人參各三兩六分五厘

右四味以水六升煮取二升去滓分温再服以水一合

八分煮取六分

下利心煩食入口即吐者兼用紫圓

下利心下痞鞭乾嘔者兼用紫圓



大建中湯

蜀椒二合分六乾姜四兩一分人參二兩分六

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微

火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升

後更服當一日食糜溫覆之以水一合去滓內膠飴煮

取六

心胸間痛嘔不能食者

腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸

近者兼用

黃連阿膠湯

黃連四兩一分黃芩一兩分三芍藥二兩分六雞子黃

二枚分一阿膠三兩分九

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱

盡少冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服水

一合半煮三物取六分去滓內膠烱

心中煩而不能臥者



胸中有熱心下痞煩而不能眠者

黃芩湯

黃芩三兩大棗十二枚各九分甘草芍藥各二兩各六分

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再

夜一服以水二合

心下痞自下利者本方內加半

口苦咽燥目眩自下利者

若嘔者黃芩加半夏生姜湯主之於本方內加半

黃芩加半夏  
生姜湯

夏半升生姜三兩黃芩大棗生姜各四分九厘

味煮如三本方

六物黃芩湯

黃芩人參乾姜各三兩大棗十二枚各四分五厘桂枝

一兩一分五厘半夏半升九分

右六味以水七升煮取三升分溫二服以水一合

四勺

乾嘔下利心下痞鞭者

方幾

五



痢疾心下痞鞭而嘔不能食者兼用紫圓

三物黃芩湯

黃芩一兩四分苦參二兩八分乾地黄四兩一分

右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐下虫

以水一合六勺煮取六勺

四肢煩熱者兼用黃連解毒散

白頭翁湯

白頭翁黃連黃蘗秦皮各三兩各七分五厘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈

更服一升以水二合六勺煮取六勺

熱利下重者

下利欲飲水者

胸中熱而心煩下利者以上兼用紫圓

若心煩不得眠或煩燥者白頭翁加甘草阿膠湯

主之於本方內加甘草阿膠各二兩右六味以水

七升煮取二升半內膠令消盡分溫三服白頭翁黃連黃

白頭翁加甘草阿膠湯



藥素皮各六分甘草阿膠各四分右六味以水一合七勺煮取六勺去滓內膠令消盡

木防己湯

木防己三兩分六石膏雞子大六一錢桂枝二兩分四人

參四兩分八

右四味以水六升煮取二升分温再服以水一合八勺煮取

分六

喘滿心下痞堅者

腫滿心下鞭滿者

短氣或逆滿而痛或渴者

以上兼用殺賓南呂劇者以茶圓攻之

若喘滿止或不渴心下悸而痞堅難解者木防己

去石膏加茯苓芒消湯主之於木防己湯方內去

石膏加茯苓四兩芒消三合右五味以水六升煮

取二升去滓內芒消再微煎分温再服微利則愈

防己六分桂枝四分人參茯苓各八分芒消一錢二分右五味以水一合八勺煮取六勺內芒消令

消盡

防己茯苓湯

防己

茯苓

木防己去石  
膏加茯苓芒  
消湯



防己黃耆桂枝各三兩各六分茯苓六兩一分甘草

二兩四分

右五味以水六升煮取二升以水一合分溫三服八勺煮取

六勺

四肢腫水氣在皮膚中肉腠筋惕者桃花散

防己黃耆湯方從外臺

防己四兩六分黃耆五兩七分木生姜各三兩大棗

十四枚各四分五厘甘草二兩三分

右六味以水六升煮取二升分溫三服八勺以水一合煮取

六勺水病脉浮身重汗出惡風者

水病脉浮身重汗出惡風者

水病小便難腰以下腫或及陰難屈伸者仲呂

枳實芍藥散

枳實芍藥各等分二兩

右二味杵為散服方寸匕日三服并主癰膿以麥

粥下之



腹痛煩滿者則

枳木湯

枳實七枚一分 木二兩六分

右二味以水五升煮取三升分温三服腹中更即

當散煮以水一合

心下痞堅小便不利者

或心下滿痛小便不利者

排膿散

枳實十六枚一分 芍藥六分 桔梗二分

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞黃相

等揉和令相得飲和服之日一服

瘡癰痛而欲膿潰者

桂枝枳實生薑湯

桂枝生薑各三兩九分 枳實五枚一分

右三味以水六升煮取三升分温三服以水一合

勺六

方機

不



心中痞逆滿心痛者

逆滿吐出水不受水藥者消塊或南呂

枳實薤白桂枝湯

枳實四枚厚朴四兩各八分薤白半升六一錢桂枝一

兩二分括蕒實一枚四分

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內

諸藥煮數沸分溫三服以水一合六分先煮枳實厚朴取八分去滓內諸藥

煮取六分

心中痞胸脇滿脇下逆搶心者

胸滿心痛或背痛者南呂或控涎丹

嘔噎胸痛者控涎或紫圓

橘皮枳實生姜湯

橘皮一斤二錢枳實三兩四分生姜半斤二錢

右三味以水五升煮取二升分溫再服以水一合五分煮取

六分

胸中痞塞逆滿短氣者

方機

卷



吃逆不止者

茯苓飲

茯苓人參朮各三兩分六枳實二兩分四橘皮二兩半

分五生姜四兩分八

右六味以水六升煮取一升八合分溫三服如人

行八九里進之以水二合

胸中有痰飲滿而不能食者南呂

吐出水心下痞鞭小便不利者紫圓

脚氣小便不利心下悸逆滿嘔者紫實或紫圓

橘皮竹茹湯

橘皮二斤分三錢竹茹二升大棗三十枚生姜半斤

各九分甘草五兩分五人參一兩分一

右六味以水一斗煮取二升溫服一升日三服以水

二合煮取六勺

胸中痺而吃逆者

橘皮湯



橘皮四兩錢二 生姜半斤錢四

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

以水一合四勺煮取六勺

乾嘔噦若手足厥者

桂枝茯苓丸

桂枝茯苓牡丹桃仁芍藥各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一

丸不知加至三九

漏下不止胎動在臍上者

婦人衛逆頭眩或心下悸或肉膈筋惕者則

經水不利面部或手足腫者湯或散而服之則或抵當丸兼用

病有血症之變手足煩熱小便不利者則

芎歸膠艾湯

芎藭阿膠甘草各二兩三分艾葉當歸各二兩四分五厘

芍藥四兩分六乾地黄六兩分九

右七味以水五升清酒五升合煮取三升去滓內



膠令消盡溫服一升日三服不差更作清酒以水一合

漏下者

產後下血不絕者

下血吐血不止者解毒散

旋覆花代赭石湯

旋覆花甘草各三兩大棗十二枚各四分人參二兩三分生姜五兩七分半夏半升九分代赭石一兩一分

厘五

右件七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服以水二合煮取一合心下痞鞭噫氣不除者

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂禹餘糧各一斤一錢六分

已上二味以水六升煮取二升去滓二服以水八分

方幾

六五



下利小便不利者

小腹痛小便不利若下利者

桃花湯

赤石脂一斤六分乾姜一兩一分粳米一升錢

右三味以水七升煮米令熟去滓温七合內赤石

脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服以水二合

內赤石脂末方寸匕

下利便膿血者

腹痛小便不利下利不止者

酸棗仁湯

酸棗仁二升二錢四分甘草一兩一分知母茯苓薤各

二兩二分

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取

三升分温三服以水一合六勺煮酸棗仁取一

煩而不得眠者

煩悸而眠不寤者



葶藶大棗湯

葶藶搗丸如彈丸大五分大棗十二枚三分

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取

升頓服以水一合八勺先煮棗取一合

喘而不得臥者

一身面目浮腫咳逆上氣喘鳴息迫者白散兼用

十棗湯

芫花甘遂大戟各等

右上一三味等分各別搗為散以水一升半先煮大

棗肥者十枚取八合去滓內藥末強入服一錢匕

羸人服半錢温服之平且服若下少病不除者明

日更服加半錢得快下利後糜粥自養以水一合

大棗五錢取六勺內藥末一錢頓服之

頭痛心下痞鞭引脇下痛乾嘔汗出者

欬煩胸中痛者

胸背製痛不得息者



桔梗白散

桔梗貝母各三分巴豆一分

右三味為散強人飲服半錢七羸者減之病在膈上者吐膿而膈下者瀉出若下多不止飲冷水一杯則定

有結毒而濁唾吐膿者

毒在胸咽而不得息者

走馬湯

巴豆杏仁各二枚

右二味以綿纏追令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下老少暈之通治飛尸鬼擊病以熱湯六分餘如上法

中惡心痛腹脹大便不通者

喘鳴息迫者小兒馬脾風之類是也

所謂中風吼喘息迫者

備急圓

大黃巴豆乾姜各一兩



右藥各須精新先搗大黃乾姜爲末研巴豆肉中  
合治一千杵用爲散蜜和丸亦佳密器中貯之莫

令歇氣

食滯腹痛者

心痛諸卒痛者

霍亂吐下心痛者

礬石湯

礬石二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

脚氣痿弱不仁及上入搶心者

消礬散

消石礬石各等分

右二味爲末以大麥粥汁和服方寸匕日三服病  
隨大小便去小便正黃大便正黑是候也

日晡發熱惡寒小腹滿身悉黃額上黑足下熱或  
腹脹而如水狀大便黑時溇者



霍亂吐瀉  
厚朴  
腹瀉  
正

蛇床子散

蛇床子仁

右一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裹內之自然溫

陰中痒者以此湯洗之眼目痒者亦然

黃土湯

甘草乾地黄木附子阿膠黃芩各四分竈中黃土一分

二錢

內托散

參茸當  
厚朴  
香桂

右七味以水八升煮取三升溫服以水一合五

下血四肢不仁或冷而痛者

下血手足煩熱心煩不得眠者

吐血衄血亦有前症則此湯主之

桂枝芍藥知母湯

桂枝知母防風各四分芍藥三分甘草麻黃各二分

生姜蒼木各五分附子一分

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服以水



洗淨散  
風熱上攻  
赤腫痛  
痰多

山當川  
薄卷防  
黃甘

蔓荊散  
升通尚  
桑葉地  
柴荷花  
蔓荊散

一合五勺  
煮取六勺  
歷節疼痛彎急頭眩温温欲吐者

方機終

歷代名醫一覽  
痘疹不求人方論  
幼々集成

折本  
一冊  
十冊

天保七年五月

横山町三丁目

和泉屋金右衛門



