



明
937
卷
9

衆方規矩刪補卷之中

香砂六君子 曰

治脾虛不思飲食食後致飽

悶

茯苓 守陳多

朴 砂 參 木 益

甘 各五

右入姜棗煎服 傳方六君子 胃

口有寒嘔吐不止去木益加喬

藿名藿香安胃湯 脾瀉者食

後到飽瀉去即寬脉細去守多

木益加芍蒼預入姜梅煎服



回春泄瀉門香砂六君子○腹

湯之加減也學者考之○

痛去參預加木茴○渴加永梅

○小水赤短加通車○嘔噦惡

心加藿守○夏月加連○

冬月加永去芍

按此方治因脾胃虛寒而致

損傷者矣不舉治例切所以

得奇効也去守益加木蒼則

前所謂香砂養胃湯

公友松子曰脾胃者人之坤元也

飲食者人之司命也學醫者其可

不先究乎故東垣氏以飲食脾胃

為言而藿子才以節調飲食為說

畧舉其証治曰調理脾胃者醫中

王道也飲食停積作痛者宜消導

也飲食自倍脾胃乃傷宜內消也

飲食不思痞悶者脾寒也宜養胃

也飲食不化到飽者脾虛也宜此

香砂六君子湯

△程仁甫曰常治小兒吐逆之疾

得捷効者甚多須辨寒熱若夏月

熱症必用六君子湯加姜連以用

藿香白豆蔻之類徐徐服之不可

火急頓服即不納如寒月用六君

子加乾姜砂仁藿香白豆蔻之類

或有傷食吐瀉者初劑加麥芽山

查一二劑決可取効如不効者必

發慢驚死屢試皆爾

△按此兼治怠惰嗜臥四肢不收

或大便泄瀉者濕勝故也從平胃

散治不効者用之又食入則困倦

精神昏冒而欲睡者用之若飲食太過轉運不調再加消食之劑神麴麥芽山查枳實輩已上論六君子湯

附方

寬中進食丸滋形氣喜飲食

本方去香附白芫薹厚朴

益智加草芫薹麥芽神麴

乾薑猪苓澤瀉青皮枳實

加味六君子湯調理脾胃

即白朮茯苓麥芽半夏

陳皮縮砂人參甘艸

東垣葛花解醒湯治飲酒太過嘔

吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手

足戰搖飲食減少小便不利

去香附半夏厚朴益智甘艸

加葛花青皮猪苓神麴澤瀉

乾生薑

生胃丹生胃消痰沫開胃膈進飲

食

去香附厚朴益智甘艸

加麥蘗青皮革澄茄石蓮肉

粟米天南星

道寧神陽丹治真元虛損心腎不

安精神耗散脾土濕敗不能化

食所食五味之物不成精液乃

成痰涎聚於中脘不能傳導以

致大腸燥澀小便反多而赤或

時嘔吐酸水久成翻胃結腸之

證

去香附益智加蒼朮蓮肉

南星穀芽麥芽二稜丁香

莪朮革澄茄沉香粟米

加味六君子湯治久病胃虛嘔吐

去香附白朮薹厚朴木香

益智 加芍藥 山藥 藿香
當歸 烏梅 蓮肉 炒米

四物湯 二

①治血虛發熱或寒熱往來或
日晡發熱頭目不清或煩燥不
寐胃膈脹或脇痛一切補血之
本藥也已上數症只以血虛二字為本而用此方可也
但血症多端學
者當自體悉

斤 芍 芍 芍

右煎服王海藏曰此方君臣佐使當隨時令及因症候

增損以故不著分兩○加加苓柴壯治肝

脾腎血虛發熱逍遙散合方之例歟○午

後發熱屬血分加參伽壯血分

尤乃陽生陰長之理乎然則投于氣血併虛之者最可○

如熱從左邊起者肝火也○實

則加游丹直用○虛則加參伽

芪補金以○熱從臍下起者陰

火也加參伽栢雷會門桂○夜

發熱加雷栢連丹壯柴與前午

屬血分加參栢壯丹相為表裡○晝夜俱發熱

合小柴胡湯加連丹○血虛無

汗潮熱合葛根合參蘇飲即茯苓補心湯也詳

下
加姜棗或女子血虛有汗潮

熱者亦宜之○瘦人中風屬陰

虛火熱加膠芩栢○左半身不

遂手足癱瘓加桃紅瀝姜汁○

多思慮以致血虛五更時嘈雜

加蒺藜連貝○血虛陰火冲上

頭痛加酒潯冷蔓連丹○臍下

虛冷腹痛者本方加索練各

名之四物苦練湯○因挫閃

跌撲致死血流本經而腰痛加

嬰紅方○因房勞而腰痛加雷

栢會仲○鼻衄加側○弱血合

五苓散○下血因寒久不愈加

升永棕灰○血痢加膠朴艾○

大便秘結加嬰虎○小便秘澀

加澤通○血氣痛五心熱加矮

官○五心煩熱加芩柴錄百合

○口乾煩渴加門葛梅○咳嗽

加桑杏麻○頭眩加羌細○不

思飲食加砂多蓮○面色痿黃

加陳苧姜○心氣不足恍惚加

遠酸辰○虛煩不睡加膏參淡

竹葉○金瘡出血過多加參芪

○經水將來作痛者血實氣滯

也或心腹連腰作痛加連芩麥

紅索牡茂童神設名清○過期熱四物湯

不來作痛者血虛有寒加桃紅

茹桂茂通方甘名通經○先期四物湯

來者血虛有熱加芩苳連膠栢

雷甘艾名清經○過期而來紫

黑成塊者氣鬱血滯加桃紅牡

童苳索甘名通快○經水去多

久不止發腫滿者脾經血虛加

朮苓砂腹木陳朴軾猪通苳索

膝甘名調○經水月久不行發

腫者瘀血滲入脾經加桃紅牡

永桂枳木苳膝索去辛名健脾

○先期而至血紫有塊腰腹痛

手足冷痺口乾頭眩加芩苳苳

苗索續仲印甘名消瘀○錯經

妄行於口鼻者火載血上氣之

亂也加芩丹犀膠苓門陳名涼

湯○經水行後作痛者氣血虛

合四君子加永此即八珍湯

法實是○過期而來色淡者痰

多加陳守苓甘姜即活血○適

來適斷或有往來寒熱先服小

柴而後以此湯和之即熱入血

柴胡
條主
○肥白人經水過期者痰

多用
陳加星蒼滑芍斤蒴除名

濕四
○經水過多久不止者成

血崩加斤伽膠苓丹印荊蒴甘

名阿膠
○骨蒸勞熱加錄雷紫

苓名清火
○妊娠胎動不安下

血不止加艾膠苓奇効
○風

虛眩暈加芫莖即治風
○發熱

心煩不得眠加連丹即治火
○

虛寒脉微自汗氣短自利加永

多加苓此方無地黃即仲
○

經水澁少加葵紅○赤白帶下

加蒴芷○血臟虛冷崩中去血

過多加膠艾此仲景神方芎歸

○婦人血積血瘕加稜菰桂乾

漆○胎漏下血腹痛加膠苓伽

砂蒴艾小梗○子腫者面目虛

浮加苓澤伽苓丹門朴甘○產

後發熱加柴苓錄若非血熱則

者須用大
○虛渴加參梅葛瑞

○小兒生下遍體皆黃加括兒

母俱
○小兒齒久不生加預沉

甘為末擦齒根調下鹽湯○小

兒血熱生瘡遍身腫痒加芩苓

○小兒尾骨節痛者陰虛加酒

酒或桂少或西蜜為引如痛不

止加乳沒兼服六味地○加柴

去芍名增損四物湯治產後陰

虛發熱或日間明了暮發寒熱

○去芍加參永甘人姜亦名增

損四物湯治產後陰陽不和如

有惡露未盡停滯胞絡亦能冷

入寒熱但小腹急痛為異產後陰陽

不和加芍參永甘去芍加

芩苓細正蒼甘膏名加減四

物湯治產後血虛氣弱痰癖寒

厥背冷頭痛○如有汗者氣弱

頭痛加芍桂姜○痰癖頭痛加

守苓姜○熱厥頭痛加正膏雷

○寒厥頭痛加天雄附姜○加

陳苓丹令定各等分參甘各減入

姜棗是亦名加減四物湯治瘦

人頭眩者屬血虛痰火也○四

物加苧參砂入姜棗名調氣養

血湯專治婦人室女血氣不和

胎前產後諸病○氣痛加吳此

治要訣之○痰盛加一陳湯此

切得奇効蓋婦女以血為王殊不知因氣不調然後血脉不順故生諸病

按補益血虛之王藥

只此血虛一言

盡四物之用也凡用上條加減當以血虛症為額也

予連年血虛發熱挫閃跌撲

月水調理鼻衄下血等照加

減取奇効且四物苦練增損

四物調氣養血等湯切得數

効猶有加減之法也

△陳氏經驗方曰凡婦人百病以四物湯加茱萸無不愈者難產及胎衣不下子死腹中入酒同煎此

藥不知起於何氏或云自魏華陀陀之術精微方類單省傳秘陀針灸不過數處千金方曰自三代以來醫方藥論未有如是詳備產寶方有四物散自後醫者易散為湯蓋用者若馭良馬當隨意無不得至焉於四物中增損品味虛實寒燠皆得其要者然亦非止婦人之疾可用而已

△吳山甫曰當歸入心肺芍藥入肝熟地入腎乃川芎者徹上徹下而行血中之氣者也此四物湯所以為婦人之要藥而調血者必以之為主或問四物亦有不宜者乎余曰有之氣息機微者不宜川芎恐其辛香益散真氣也太便溏泄不宜當歸恐其滯滑益增下注也脉遲腹痛不宜芍藥恐其酸寒益

增中冷也胸膈不塞不宜地黃恐其粘膩益增泥滯也明者解之味者誤矣

△徐春甫曰四物湯養生方用熟地和劑亦然本草云男子宜熟女子宜生以其行血合用生地

△劉宗厚曰川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能和血治虛腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨症損益攝其一二味之所宜為主治可也若氣虛血弱又當如長沙血虛以人參補之陽旺則生陰

血也若四物者獨能主血分受傷為氣不虛也輔佐之屬○若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮者血滯所宜○蒲黃阿膠地榆白朮霜棕櫚灰者血崩所宜○乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜○菝葜瑣陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜○乳酪血液之物血燥所宜○乾薑肉桂血寒所宜○生地黃苦參血熱所宜此特取其正治太畧耳人能觸類而長可以應無窮之變矣

△按楊仁齋曰人之一身不離乎氣血凡病經多日療治不痊須當為之體認人之有病皆知調氣而血之一字念不到焉至於調氣不愈加以消痰逐水無所不至其病自如是皆血之為患矣然而血症

不以血藥調理遷延日久致使病人神志昏昏驚狂冒悶煩渴嘔吐語短肉痛鼻衄唾紅眼赤面赤骨熱膚熱腸垢尿多胸滿頑痰譫語多汗甚至四肢厥冷慄不知人蓋不知血之爲患伏於眞冥之中而不可測識矣據脈驗之挾血者脈來乍澀乍數或沉細而隱伏若夫血與熱交攻則左手寸關按之洪盛乃心主血肝藏血固當如是矣學醫者其於四物湯亦可留心焉△戴元禮曰四物湯婦人要藥於內加果茱萸一應氣血病無不治又曰當經事腹痛者皆血之不調故也欲調血先調氣四物湯加吳茱萸香附又曰婦人之藥大率皆甜不利於脾胃歸猶滯况地黃乎脾胃實者固未見功素痰飲及喜

甜人諸血藥中半夏陳皮自不可少

△徐氏醫統曰昔張聲道用四物湯治婦人百病加吳茱萸煎服若陽臟之人以加茱萸若陰臟人多加茱萸四物若得茱萸則芍藥地黃之寒滯不能害脾胃也

△王好古曰熟地補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥也川芎治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥也芍藥和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也當歸和血如血刺痛痛如刀刺非此不能除乃通腎經之藥也

△龔子才曰四物治血分之聖藥也用當歸引血歸肝經川芎引血歸肺經芍藥引血歸脾經地黃引

血歸腎經唯心生血肝納血脾統血肺行血腎藏血男子則化為精女子則化為月水血乃有形之物屬乎陰故名四物湯

△友松子曰四物湯原於仲景芎歸膠艾湯中選出四品以為補陰之劑陽無形陰有形故銘曰物凡女人調經產理男子血症從此方調補若七情過用以心脾氣虛而血不生肝腎氣虛而不能納血以致陰血虛耗者又當求本施藥不可專恃四物吳山甫曰當歸芍藥地黃能養五臟之陰川芎能調榮中之氣五臟和而血自生耳若曰四物便能生血則未必血不足以此方調之則可若上下失血太多氣息幾微之際則四物禁勿與之所以然者四物皆陰陰者天地閉

塞之令非所以生萬物者也故曰禁勿與之予謂此言淺得用四物之法矣用之者不可不熟讀△天民曰先哲制四物湯方以川芎當歸之溫佐以芍藥地黃之寒以是寒溫適中為婦人諸疾之妙劑也若或用於產後必取白芍藥以酒重侵製炒去其酸寒之毒但存生而活血之能可也

附方 愚按古方四物湯變法極多今以冊短事長茲擇諸家緊要者備覽焉

芎歸膠艾湯 金匱曰婦人有漏下

者半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻芎歸膠艾湯主之

艾葉 兩 阿膠 兩 川芎 兩 甘欄 兩

當歸 兩 芍藥 兩 乾地黃 兩

右七味水五升酒二升合煮取

三升去滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作○愚按仲景芎歸膠艾湯乃四物湯之原方也中間四物後人簡擇而用之以爲調血之總司女科之聖劑陳氏謂起自魏華陀未知有何所據

當歸芍藥散治婦人懷胎腹中疴痛金匱之方也

四物湯去地黃加朮苓澤瀉

當歸散妊娠常服即易產胎無苦疾產後百病悉主

四物湯去地黃加白朮黃芩

○愚按安胎束胎達生調血諸湯悉以此方爲本耳

溫經湯治婦人帶下曾經半產瘀

血在小腹不去其證下利不止暮即發熱小腹裡急腹滿手掌煩熱唇口乾燥
去地黃加阿膠人參甘朮
吳黃桂枝丹皮生姜半夏
麥門

潔古加減法倍川芎一日春月二

日脉弦二日頭痛○倍芍藥一

日夏月一日脉洪三日泄○倍

地黃一日秋月一日脉濇二日

血虛○倍當歸一日冬月二日

脉沉三日寒而不食○此常服

順四時之氣而有對症不愈者

爲失其輔也宜如後法

春防風四物湯

加防風倍川芎

夏黃芩四物湯

加黃芩倍芍藥

秋 天門冬四物湯

加天門 倍地黃

冬 桂枝四物湯

加桂枝 倍當歸

此四時常服隨症用之也

腹痛六合湯治血虛腹痛微汗而

惡風

加莢朮 肉桂

風六合湯治風眩

加蔡朮 羌活

熱六合湯治發熱而煩不能睡臥

加黃連 梔子

濕六合湯治中濕身沉重無力身

冷微汗

加白朮 茯苓

氣六合湯治氣弱起則無力在然

而倒

加厚朴 陳皮

寒六合湯治虛寒脉微自汗氣難

布息小便清白

加乾姜 附子

○證治準繩曰四物湯與桂枝

麻黃白虎柴胡理中四逆茱萸

承氣涼膈等方皆可作各半湯

此易老用藥大畧也

增損四物湯治產後陰陽不和乍

寒乍熱如有惡露未盡停滯胞

絡亦有令人寒熱但小腹急痛

爲異當加官桂莢朮玄胡丹皮

桃仁紅花靈脂沒藥去瘀生新

之品

去地黃 加入參乾姜甘州

四神湯治血虛寒心腹疔痛

即去地黃 加乾姜

爲末酒調名四神散

當歸飲養血清熱安胎

去地黃 加黃芪白朮

桂香散治產後腹痛

去地黃 芍藥 加肉桂

酒小便煎

君臣散治月水不調心腹疴痛又

治血虛頭痛又治產後并一切

去血過多煩暈

去芍藥 地黃

一名萬口君臣散 一名芍

歸湯一名佛手散 一名

琥珀散 一名驗胎散

地黃當歸湯治胎痛又治太便秘

久虛亡血

去川芎 芍藥

一名益母丹 一名內補丸

蜜丸

羌活龍膽湯治目赤暴發雲翳疼

痛

加羌活防風龍膽防已

六神湯治氣血不足肌體煩熱四

肢倦怠不進飲食

加骨皮黃芪

玄胡六合湯治小腹痛及膺中虛

冷腹痛腰脊間痛

加玄胡川棟

香桂六合湯治赤白帶下

加香附肉桂

黃芩六合湯治經水過多

加黃芩白朮

當歸養血圓治產後惡血不散發

渴疼痛及惡露不快膈腹堅脹

兼室女經候不勻赤白帶下心

腹腰脚疼痛

去川芎地黃 加牡丹皮桂心

延胡索

奇効四物湯治肝經虛熱血沸騰

而崩久不止

加阿膠艾葉黃芩

衆方見巨制補卷中

起枕散治產後心腹痛惡血不行
或兒枕作痛甚危
加白芷官桂蒲黃牡丹皮
玄胡索五靈脂沒藥
水煎入童便空心服

四物調經湯 三

①治婦女或十五六歲經脉不
行日夜生寒熱手足麻痺飲食
少進頭痛惡心嘔吐腹中結塊
冲動痛者此誤食生冷傷感而
致也
按此藥聖林之制也壽世
保元有調經之法自女子
十四歲至五十一二各有隨年

用藥之例學者宜參看之可也
雖非仲景假說問答明論理致
之設亦可以備臨症處劑之需
候炒一炙 沂炒 芎炒 芍炒

芩各八分 枳各八分 洋各八分 陳各八分 莪各八分

稜各八分 伽各八分 芷各八分 茴各八分 索各八分

青各八分 砂各八分 紅各八分 甘各八分

右入姜葱水煎服○遍身痛加

羌活用此行經絡而利氣則痛

當歸隨利氣而散若因血痛又

乾漆因瘀 ○瘧加果恒 ○泄瀉

去積加行經閉泄瀉多屬瘀血

着眼焉不可全
藉收澁之物

按此方全合證治二五八也

其外調經水則與調氣養血

湯見前四而得數功觀此按

物條下字俱是卜度治病妄將聖明之法而作愚昧之物乃軒岐之罪人也

△友松子曰李南豐曰婦女血滯經閉宜破者原因飲食熱毒或暴怒凝瘀積痰直須太黃乾漆之類推陳致新俾舊血消而新血生也若氣旺血枯起於勞役憂思却宜溫和滋補或兼有痰火濕熱尤宜清之涼之余於壯實婦女居經用此方去白朮加蟲虫乾漆以破血或加肉桂以行血或加枳櫛以推之或加牛膝以引之或加半夏南

星以消痰或加丹皮梔子以清熱或加大黃桃仁以蕩瘀得効良多其於虛弱婦女者宜按法施治非四物調經及調氣養血湯之所能調也○按張景岳曰經閉有血枯有血隔然而枯之與隔則相反有如水族夫枯者枯竭之謂血虛之極也隔者阻隔之謂血本不虛而或氣或寒或積有所逆也隔者病發於暫其症則或痛或實通之則血行而愈可攻者也枯者其來也漸漸任內竭其證無形必不可通者也常見今人之治此者聽其言則明日血枯經閉也察其治則每用四物加桃仁紅花甚至硝朴枳我之類無所不至夫血既枯矣只當補養陰氣使其血充則弗招自至矣俟通也若勉強逼之則枯者

愈枯矣不危何待若夫人者非惟不知病情卽字義曰枯猶然未解其與目不識丁者何異末其無言不可得安望其有濟於人哉愚按血枯之症其人年壯者或用古方艾煎丸四物加食茱萸石菖蒲太人參熟艾治筋傷淋瀝小腹脹痛滋血湯去熟地黃加馬鞭草荆芥稍穗桂心枳實牡丹皮治婦人之血風血熱血虛經候澁滯經脉不得通四肢麻木肌體渾身疼痛倦怠而將成勞瘵若年過三旬若虛乏人尤宜純補

附方

順氣四物湯冬時覺心中氣不下降痞塞不通或有積塊去地黃延胡索紅花加烏藥白朮白芷茴香枳榔

青木香遠志辰砂麥門一方加肉桂干姜

化積四物湯治因飲酒中毒或時胸中痞悶腹中膨脹者有妨飲食

去黃芩地黃白朮白芷茴香

延胡索紅花

加枳實枳榔蓮肉烏梅

青木香白豆蔻

小溫經湯治室女十四歲經脉初動經水至失調理心腹脹滿惡寒發熱頭身遍疼

去陳皮莪朮三稜延胡索

青皮紅花

加桂枝羌活柴胡

加味四物湯治室女十五六歲經脉不通日夜寒熱手足麻痺飲

食少進頭疼惡心嘔吐腹中忽
然結一塊痛者此症誤食生冷
所傷可服

去紅花 加柴胡肉桂

歸朮破瘕湯治婦人經水不通腹

中積塊疼痛

去白芷香附三稜赤芍青皮

莪朮紅花

加白芍烏藥官桂蘇木

水煎入酒一鍾空心服

八物湯

四 一名八珍湯

①治肝脾傷損血氣虛弱惡寒
發熱或煩燥作渴或寒熱昏憤

或胸膈不利大便不實或飲食

少思小腹脹痛或口舌生瘡或

齒齦腫潰或便血吐血盜汗自

汗等

參 仰 令 芍 芎 芩 苓

歸 各一 甘 五
分

右入姜棗煎服○氣弱脇痛脉

細緊或弦多從勞役怒氣得之

加蜜童或加官○孕婦由中氣

怯弱不能舉胎胎壓其胞胞繫

了戾而小便不通謂之轉胞合

一陳煎湯探吐之所以升提其

氣上竅通而下竅自利按丹溪

妾轉胞製此而與之連吐數朝用八貼而安原無茯苓只用九味各參朮飲各醫方考二陳四物四君合用各三合湯論與前同

也○產後子腸不收加升芸

以酒炒芪為君子腸下脫以斯八珍補之以黃

芪升麻防風提之乃良法也收功又要固之斂之之物五味阿膠之

類○小兒解顱者用八珍若

有熱加連煎服更以帛緊束及

以白斂末付之小兒解顱用八珍當矣然而此

症多屬腎虛再與六味丸加鹿茸更骨之類充之其効更著

按四君四物合之方故非

氣血兩虛者勿用之非氣血兩虛者

勿用之九字通矣然於八珍妙方下字及是因恐後學不

著精彩故刪九字易以○心

中惕惕然而跳動謂之怔忡

加酸連門煎湯調辰末服得

奇効○產婦大便七日不通

加桔桃而得卒効○一婦滑

泄帶血解怠不食去華加木

而二十餘貼得安全

公友松子曰八珍湯治氣血兩虛

症候散見諸書而行醫者不待贅

而必知之耳設若血虛症服四物

湯而血不盈者乃脾氣之不化生也尤當以此方補之若氣虛症服四君子而氣不周者乃孤陽不生

之謂也亦當以此方濟之經曰氣血正平長有_{天年}其斯之謂乎至若百脉煩痛腰脚疼軟胸滿氣短心煩不安耳鳴目眩咳嗽煩熱夜作盜汗遺精白濁飧泄食少無味不為肌膚或睡中驚悸午後發熱倦怠無力等症皆當此方增損又曰李南豐曰治氣血俱虛男婦百症小兒痘疹通用有痰合二陳湯名入物二陳湯凡人參養榮湯十全大補湯益氣養榮湯皆從此方而變化之也予以此方治金瘡失血瘡瘍潰後及產後諸症出入增損無不如神之驗又按東垣曰脉弦氣弱皮毛枯槁髮脫落黃芪建中湯王心髮脫臍下痛四君子湯加熟地予初年因一婦人病後髮脫求療而劑八珍出入增減至三月許髮長如故

附方

加味八物湯治虛勞咳嗽四肢困倦氣血兩虛者

加黃柏知母貝母麥門冬

五味子瓜蒌仁陳皮

行濕補氣養血湯治氣血虛弱單

鼓腹脹浮腫

去地黃加蘇梗陳皮厚朴

大腹皮木通萊菔子木香

海金沙

加減補心湯治諸虛健忘等證

去川芎加陳皮遠志石菖

蒲麥門冬酸棗仁黃柏

知母

人參養榮丸治男子婦人諸虛不足羸瘦少力此藥大能生血氣補益榮衛多有功效

去芍藥川芎加陳皮砂仁
香附胡黃連

人參柴胡湯治邪熱客於經絡肌
熱煩燥盜汗
去地黃川芎加柴胡乾葛

柴胡散補虛勞清虛熱
去地黃加柴胡桔梗青皮
麥門冬升麻桑白皮

黃芪劫勞散治心腎俱虛勞嗽時
復二兩穀無痰遇夜發熱熱過
即冷時有盜汗四肢倦怠體劣
黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣
不寧睡多異夢此藥能治嗽唾
中有血絲名曰肺痿
去白朮川芎加五味子黃芪
桂阿膠

劫勞散治勞嗽發熱盜汗體瘦唾
中有紅或成肺痿
去白朮川芎加肉桂黃芪
五味子半夏阿膠

家藏方寧肺湯治榮衛俱虛發熱
自汗肺氣喘急咳嗽痰唾
加麥門冬五味子桑白皮
阿膠

和劑大防風湯詳見中之
去茯苓加黃芪附子杜仲
牛膝防風羌活

大建中湯治腎虛腰痛
加黃芪肉桂半夏附子門冬
肉苁蓉

大補黃芪湯治自汗不止服諸藥
固表而汗不收止可理心血蓋
汗乃心之液心無所養不能攝
血故溢而為汗宜此藥若不止
更加酸棗仁王之一有微熱更加

石解

去芍藥 加黃芪肉桂防風
山茱肉茯苓

三痺湯治血氣虛弱滯滯手足拘
攣風痺等病

去白朮 加黃芪肉桂防風
秦艽細辛獨活杜仲牛膝
續斷

人參養榮湯治氣血虛變見諸症
發熱惡寒肌肉消瘦面黃短氣
食少作瀉等症

去川芎 加黃芪肉桂遠志
陳皮五味子

固真飲子益五臟之真精補三焦
之元氣生津液而榮衛充利機
關而飲食自倍矣

去川芎芍藥 加黃芪陳皮
山藥澤瀉五味山茱故帛

杜仲黃柏

滋補養榮丸專治男婦氣血兩虛
精神短少脾胃不足此藥大能
補氣養血

去川芎 加五味子黃芪

山藥山茱萸陳皮遠志

人參五味飲專治潮熱咳嗽紅痰
本方去川芎芍藥 加黃芪

柴胡桑白皮五味子地骨皮
枳殼陳皮前胡桔梗

○煩渴加烏梅○有熱加青蒿
知母

黃芪益損湯治諸虛勞倦客熱肌
肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減
食多渴咳嗽有血不止急服功
効如神

加肉桂黃芪半夏五味子

木香 桑白皮 知母 地骨皮
紫苑 鱉甲 纂元 桔梗 柴胡
天門冬 生地黃 石斛 枳殼
香附 麥門冬

黃芪十補湯 補虛勞 養血氣

去川芎 茯苓 加肉桂 黃芪
茯神 酸棗仁 半夏 陳皮 木香
北五味子 烏藥 麥門冬 沉香

鹿茸大補湯 補虛損 益氣血

去川芎 加肉桂 黃芪 山藥
北五味子 遠志 續斷 酸棗仁
石斛 白薑 阿膠 半夏 栝子仁
鹿茸

旋神飲子 治勞瘵 增寒壯熱 口乾
咽燥 自汗 煩鬱 咳嗽 嚴重 唾中
血絲 瘦劇 倦乏

去川芎 生姜 加茯神 黃芪
半夏 蓮肉 桔梗 麥門冬
五味子 烏梅

調元散 治小兒稟受元氣不足 顛
顛開解 肌肉消瘦 腹大 而腫 語
遲行 遲手足如筒 神色昏慢 齒
生遲

加茯神 山藥 石菖蒲 黃芪

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻 心中潰
悶 頭目眩暈 四肢怠惰 百節煩
疼 痰逆 嘔吐 嫌聞 食氣 好咽 鹹
酸

本方去白朮 當歸
加半夏 橘皮 細辛 紫蘇

附

十全大補湯

①治氣血俱虛發熱惡寒自汗盜汗肢體倦怠或頭痛眩暈口乾作渴久病虛損遺精白濁二便見血小腹作痛小便短少大便乾澀或咳而不利虛勞諸虛不足五勞七傷飲食不進

八珍湯加芪桂 各一匁

右煎服

補男婦諸虛勞傷生氣血壯脾胃無以踰是方

法天地之成數故曰十全大補用是方者必加姜棗不然則失立方之旨也芎歸芍藥以補血參朮苓甘以補氣芪桂芍甘姜棗以建中乃古之復方也成氏日姜棗為使不時專發散以脾

主為胃行津液姜棗之用專行脾之津液而和榮衛○氣

血俱虛陰陽並損加連 此段加味吾不

知其可也○發熱加柴○嗽加會○

痰加守○汗加蠟○虛寒甚加

附永○骨蒸倍加柴○氣弱加

參○惡寒加桂○肌熱加錄○

虛勞發熱加柴錄芩○不時而

熱或無定處或從脚心起此無

根虛火也加會門○虛弱之人

遍身痛倍桂加守○久病虛損

眼目昏暗見物不明久服無肉

外一障之患加多沉附姜棗○

產後勞四股煩疼時發寒熱
 不思飲食加續會門姜棗○凡
 瘥病有出汗多變瘥有因去血
 過多元氣虧極或外邪相搏以
 致牙關緊急四股瘳強或陰火
 內動或腰背反張肢體搖擗若
 有汗而不惡寒者曰柔瘥若無
 汗而惡寒者曰剛瘥由去血過
 多筋無所養故傷寒汗下過多
 潰瘍膿血太泄多患之乃敗症
 也急以此湯治之如不應急加
 附

○按此湯治諸病屬氣血兩

虛挾寒者也宜刪挾寒二字可也八珍加黃

芪肉桂乃管建中氣故也○骨蒸勞熱加

錄平分是他家之秘也東垣云地

骨皮治在表無定之風邪傳戶有汗之骨蒸○男

婦氣血虛弱而眩暈加陳守

定丹溪云無痰不作眩若因風痰用此段加味正所謂

王道也再詳所以眩之因出入相濟事必昌矣○食

積刺或時赤刺或時水瀉或

完穀俱出加連曲澤守膠砂

芸姜氣血虛人患痢日久不

混雜未免得此失彼之弊知者以意加裁可也○一

切產病欲死者刺項髮際正

中而出血且其上灸三三壯

而甦尚可用此湯殊傷寒汗

下過多後或金瘡產後去血

過多後或諸瘡膿血太泄後

間成瘡證時時以此湯得救

矣詳前〇產後諸虛百損五勞

七傷自汗盜汗諸執亦然丹溪

日產後當以太補氣血為主雖有雜病以未治之茲以此方治產後之諸虛極佳極佳〇手足麻木

或疼痛去芪加陳守丸膝羸

附即濟世全書〇夢遺精滑加味八仙湯

屬氣血虛損加山茱萸會門

此龔氏醫按之治法也詳壽世保元〇產後乳

汁自出用此湯而愈未產而

乳自出者亦可批日產前乳汁自出謂之

乳泣乃氣血之太虛也若不補住則生子多不肯宜加芩

膠倍芩產後乳汁自出加酸遠味

△薛新甫曰凡人元氣素弱或因起居失宜或因飲食勞倦或因用心太過致遺精白濁自汗盜汗或

內熱潮熱或口乾作渴咽痛舌裂或胸乳膨脹脇肋作痛或頭頸時

痛眩暈目花或心神不寧或寤不寐或小便赤澀莖中作痛或便溺

餘瀝臍腹陰冷或形容不充肢體畏寒或鼻息急促或更有一切熱

衆方見巨別補卷之五

症皆無根虛火但服此方固其根本諸症自息

△李中梓曰丹溪曰實火可瀉芩連之屬虛火可補參芪之屬凡人根本受傷虛火游行泄越于外若設政其執變成危症多致難救此方以四物補血以四君補氣佐以芪充實滕理加以肉桂導火歸原金匱要畧曰虛者十補勿一瀉之此方是也

△龔子才曰有病久血虛氣不歸元而嘔者宜用此方婦人因諸精妖怪狐狸猫犬成精被其纏添以致面黃肌瘦不似人形本方加茯神遠志酸棗仁石菖蒲麥門冬

△戴元禮云虛勞症皆因不量才力勉強云爲憂思過度嗜慾無節或病失調理積久成勞其証頭旋

眼昏身疼脚弱心怯氣短自汗盜

汗或發寒熱或五心常熱或往來

潮熱或骨蒸作熱夜多惡夢晝少

精神耳內蟬鳴口中無味飲食減

少此皆勞傷之症也五臟雖皆有

勞心腎爲多心主血腎主精精竭

血燥則勞生焉治勞之法當以調

心補腎爲先不當用峻烈之劑惟

當溫養滋補以久取效天雄附子

之類投之適足以發其虛陽緣內

無精血不足當此猛劑然不可因

有熱純用甜冷之藥以傷其胃氣

獨用熱藥者猶釜中無水而進火

也過用冷藥者猶釜下無火而添

水也非徒無益而又害之宜用十

全大補湯或雙和散養榮湯或七

選用珍散樂令建中湯皆可

之

一陳湯 五

①治一切痰飲脾胃濕化多痰化為百病

陳守各五苓三甘一半

右入姜煎服和劑方有烏梅一個○偏頭

痛在右加芎芷芸荊升在左合

四物湯加荊芎細蔓紫冷○頂

痛加芎本升柴蔓細芎○痰在

腰膝膝下腫痛加蒼離通柏薢

膝○痰在胸腹中作痛或痞滿

加伽曲芽砂○痰在脇下作痛

或漉漉有穀加柴青芎芍○痰

在經絡中或胸背手足臂膊作

痛者在上加芸薏威○在下加

離膝通○冬月加烏附行經○

風痰壅盛喘急咳嗽不寧加芸

薏星根皂○熱痰為病腹脹喘

滿加苓連丹蔓滑膏瀝○濕痰

身重倦怠加蒼伽星○寒痰加

永附漏益○氣痰加蜜栝砂枳

矮菰○燥痰加蔓杏貝會○陰

虛咯血痰嗽加天麥一門電栢

貝欬苑陰虛則半夏○氣虛石

痰加參伽○血虛有痰加斤天

其人素血虛又有濕痰者宜此
加味若因血虛而致痰者非
玉膏則不可
○帶血者加芩芍須要子細

○咳嗽白痰者肺之風寒也風

痰加星桔芸實○寒痰加永官

附○食積痰加查曲菰實連○

痰飲者痰在胸膈間痛有聲加

菰砂薑實芹芎蒼童白芥○痰

涎者渾身胸背脇痛加白芥砂

蜜茵菰實斤冷○濕痰流注者

渾身有腫塊加蔓枳蒼冷羌芸

翹斤菰砂蜜紅瀝姜汁○脾虛

生痰加參伽芍實砂桔○酒痰

加葛根砂曲芽○飲酒嘔噦吐

痰加砂梅○痰瀉者或多或少

或瀉或不瀉脉沉滑加蒼砂預

車通朴姜梅灯同春名加○若

瀉不止去朴加訶行○肥人頭

痛者氣虛濕痰加參朮細芎芷

羌桔荊○瘦人頭痛者血虛痰

火加地斤芩芎細羌桔○腹中

水鳴因熱而痰者痰飲加芩連

丹○痛甚加永似○腰背重注

走串痛者是痰加蜜茵乳索砂

蒼羌冷斤仲○風寒濕流注經

絡而腰痛加麻蒼芎芷芸羌○

濕痰流注脇內作痛加星蒼芎

姜○瘧後飲食少進四肢無力

面色痿黃合四君子湯六君子湯用治

瘧後諸症誠當耳若心下痞須加黃連枳實加連實

姜○關格上焦痰壅兩手脉盛

加星枳實關格二症不可呶呶看過且非一陳之所

能濟若只上焦痰盛而吐逆不能咽物此藥才當○太

小便不通皆是痰膈中焦氣滯

於下焦加通小便不通加木通大便不行加枳殼

○痰鬱火邪在下焦大小便不

利加芎升芸柴謂之升發一陳

湯宋氏謂一陳加升芸柴能使大便潤而小便長是此藥也

○噯氣內經作噯胃中有火有痰者

加砂多蜜益實連朴苳○眩暈

嘈雜火動其痰加丹芩連○胃

口有熱時作惡心加連芩姜是得

數○婦人帶下屬濕痰者胃中

痰積流下滲入膀胱加一朮升

柴又云氣虛合四君子湯血虛

加芎升

按此方治痰之聖藥也隨證

而照加減以無不治痰飲按王氏曰痰皆動於脾濕寒少而熱多也濕在肝經謂之風痰

濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰雖有臟腑上下之佐使而二陳之去濕行氣亦不可無也唯其陰血不足陰火上逆肺受火侮不得清肅下行由是津液凝濁成痰不成血者當以潤劑如門冬地黃枸杞之屬滋其陰使上逆之火得返其原而息焉而痰自清矣又腎虛不能納氣歸原出而不納則積積而不散則痰生焉當用八味丸若用二陳立見其殆由乎標本不同故也

△徐春甫曰古人用二陳湯治痰所以實脾土燥脾濕是其本之治也脾實而濕燥則痰自清飲自散何變病之有王節齋謂二陳為實脾燥濕以治其標則誤也夫痰因脾濕為痰之原久則變為頑痰老痰之類當因其形證觀其緩急而分治之是則諸方皆以治標而後立者又曰二陳湯加減咳嗽痰症多方用之只除陰虛血虛火盛肺燥乾咳嗽而痰咯噎不出不可用其餘悉可對証加味而用之△吳山甫曰濕痰為患此方主之濕痰者痰之原生於濕也水飲入胃無非濕化脾弱不能剋制停于膈間中下二焦之氣薰蒸稠粘稀則曰飲稠則曰痰痰生於濕故曰濕痰是方也半夏辛熱能燥濕茯苓甘淡能滲濕濕去則痰無由以生所謂治病必求其本也陳皮辛溫能利氣甘艸甘平能益脾益脾則土足以制濕利氣則痰無能留滯益氣治其本也利濕治其標也或問有渴半夏非宜去半夏之燥

而易貝母括蕞之潤曰渴而不能飲水者雖渴猶宜半夏此濕為本熱為標故見口渴所謂濕極而兼勝已之化實非真像也唯明者知之

△趙繼宗曰丹溪言一陳湯一身之痰都管治痰之要藥也世醫執之凡有痰者皆用夫半夏其性燥烈若風痰寒痰濕痰食痰則相宜至於勞痰失血諸痰用之反能燥血液而加病不可不知詳見本論及用藥法甚好學者宜考全篇

△汪石山云俗以半夏燥而有毒代以貝母不知貝母治肺金燥痰半夏治脾土濕痰何可代也若美味膏梁炙煇皆能生脾胃濕熱故涎化為痰久則痰火上攻令人昏憤口禁偏廢僵仆寒濕不語生死

且夕自非半夏南星曷可治乎若以貝母代之則翹首待斃矣

附方

按易簡一陳湯自仲景小半夏湯橘皮湯中家化乃古之偶方也仲景又有半夏茯苓橘皮湯治嘔消飲和中順氣亦即一陳湯之原方也

枳桔一陳湯開胸膈去痰

加枳實 桔梗

枳縮一陳湯理脾胃順氣寬中消痰飲

加枳實 縮砂

芩連一陳湯治痰火

加黃芩 黃連

丁香一陳湯治寒痰順氣進食

加丁香 藿香

倍朮一陳湯治脾胃中有濕痰致泄瀉

即本方加倍白朮

竹茹一陳湯治胸中有熱膈上有

痰嘔吐不止

加竹茹

白朮湯治胃氣不和及吐痰

加白朮栝榔木香 去陳皮

二朮二陳湯治因胃濕嘔吐清水
不已

加白朮蒼朮

加味二陳湯治酒麪積熱成痰手
臂痛及痰攻腰腿并身麻痺

加蒼朮姜黃枳殼大棗

二陳木通湯治關格飲食不下二
便不通服之探吐

加木通滑石人參蘆

桂附二陳湯治瘧寒多熱少腰足
冷

加官桂附子大棗

麥冬二陳湯治婦人肺火咳嗽嘔

吐痰飲

加麥冬白朮當歸黃芩

香橘湯治七情所傷中脘不快痰
氣

去茯苓加香附大棗

導痰湯治法詳中卷

加枳殼南星

溫膽湯詳見下

加枳實竹茹

滌痰湯治中風痰迷心竅不能言

加枳實桔梗南星竹茹石菖

香橘飲治氣滯痰眩

加木香砂仁白朮

加味茯苓湯治脾不攝涎痰迷心

竅失事健忘

加人參益智香附

清氣化痰丸清利頭目涼膈化痰

合涼膈散

藿香養胃湯治嘔吐

合平胃散 加藿香 去茯苓

八解散

詳見上卷 第十一

合四君子湯 加藿香 朴

千縉湯治痰涎上壅喉中有聲

去陳皮茯苓 加皂角

桔梗半夏湯治冷熱不調胸膈痞

滿痰涎不利氣逆嘔噦

去甘艸茯苓 加桔梗

橘皮半夏湯治積氣痰痞不下飲

食嘔吐

去甘艸茯苓

黃連消暑丸治伏暑煩渴而多熱

痰又治傷暑瘧疾

去陳皮 加黃連

白龍湯治酒積有痰

去陳皮甘艸 加晉礬

一賢湯治痰飲

去茯苓半夏 加食鹽

半夏湯治酒積宿食痞消痰飲

去茯苓甘艸 加桔梗枳實

茯苓半夏湯治停痰留飲胸膈滿

悶嘔逆惡心吐痰水又治伏暑

煩渴而多熱痰加黃連更妙又

治傷暑嘔而痰又治傷酒惡心

嘔逆吐山宿酒昏冒眩暈頭痛

如破

去陳皮甘艸

加味二陳湯治遺精

加白朮桔梗石菖蒲黃柏

知母梔子升麻柴胡

附 加味二陳湯

①治一切癰病○發於風痰則

宜用沉香天麻湯○癰雖屬干

耳詳見後之三十一

苓 星 陳 萆 實 桔

丹 守 苓 各一 蜜 五分

辰 五分

右入姜煎服○氣逆加軾○元

香調辰砂末同服

△張子和曰大凡癰病多是肝經風火之勝痰鬱膈間故先吐之汗之次服瀉青丸下之再次服東垣安神丸守真龍薈丸之類不獨防

風通聖散而已丹溪謂大率行痰為王用芩連南星半夏瓜蒌尋火尋痰分多少治之觀朱張二氏之按則加味二陳湯得其半矣

附 加味二陳湯

①治痰厥運倒批曰痰厥運倒屬元氣虛弱者

不唯去枳實且此方亦不宜用學者詳之

陳 守 苓 斤 實 桔

杏 各一 良 砂 各七 蜜

官 甘 各三

右入姜煎服○氣逆加軾○元

氣虛弱土實

△痰症爲變極多至如煩燥眩暈顛狂倒仆不語手足不能動者尤痰之甚變者也而仲景有四百子和有五痰陳言有二因以其病因治法各別不可一例而混施也雲林以加味二陳總治痰厥運到吾所不敢是也先輩謂痰厥因內虛受寒痰氣阻塞手足厥冷麻痺眩暈脈沉細若不用大劑六君子加附子和星香入竹瀝姜汁救之則誤事矣豈加味二陳能濟乎哉

附

枳縮二陳湯

①治涎在心膈上攻走腰背嘔

噦大痛龔子才曰先用鵝翎探吐痰涎出後用此方

實砂守陳苳各一

朴茴索各八分蜜漏

永炒各五分甘三分

右入姜煎加瀝磨木香服

△友松子曰素患氣痰濕痰之人一時胸膈痛甚本方加竹瀝姜汁服之大効又加川烏治寒疝小腹痛陰囊冷者亦驗

附

香砂二陳湯

①治傷生冷瓜果海味魚

鯉一應寒物而胸中痞滿

陳苳各一苓一守

身方知知補補者中

砂 曲 甘 各六分

右入姜煎服此方傷食之主藥尤能消食予連年與此湯取奇効難勝計者也

按已上四方切得數奇故別

立方銘備倉卒之搜覽者也

今友松子曰醫統曰早晨嗽多者此胃中有食積此時火氣流入肺中而然也謂食積痰嗽者多食飲食鬱久成痰也予多用此方或加山查杏仁輩

五苓散 六

①治汗後中暈煩燥小便不利而渴

澤 一匁 加 赤苓 猪 各一匁

桂 半匁

右為末清米飲調服或入姜棗

煎服 仲景傷寒論第二十一方

金匱第十一篇俱用白茯苓其赤苓者乃後人為道兩下而易之也且五苓為末以白飲服方寸匕七多飲暖水取汗汗出則病愈矣今人多作煎劑所以治病其効亦少矣謹後 ○熱甚去桂加苓

○中暑煩渴身熱頭痛霍亂泄

瀉小便赤少心神恍惚宜此湯

身方知知補補者中

或為末熟湯調下愈如加滑二

甚可○喘咳煩心不得眠加膠天麻

○恍惚加辰○伏暑身熱大渴

未解合人參白虎湯○濕熱所

傷身熱煩渴小便赤以宜此湯

羅謙甫曰春夏之交人病如傷寒其人汗自出肢體重痛轉側難小便不利此名風濕非傷寒也陰雨之後卑濕或引飲過多有此症但多服此方○身腫小便通利濕去則愈

無汗倍加羌○黃疸發熱倍加

茵○水腫從腰以下俱腫加蜜

茵○虛寒小便不通加斤枳膝

通甘灯○小便虛弱不禁者合

四物湯加會山茱○男婦赤濁

合妙香散名香苓散用天麥二

門煎湯而下○濕瀉者瀉水多

而腹不痛腹響雷鳴脉細加預

陳蒼術訶訶砂甘姜梅灯○傷寒

三四日往來寒熱自利者本方

合小柴胡湯入姜棗名柴苓湯

一切發熱憎寒者邪在半表半

裡宜此湯傷寒三四日往來寒熱邪在半表裡只用小柴胡湯可也前症兼脉浮弦小便不利渴飲飲水者宜合五苓與之其義庶當然而此法乃活人所定者也學者當知

癰發寒熱病在表裡陰陽不分

亦然

癰發于太陽少陽之分寒熱甚而加咽渴小水不利者宜以此柴苓湯分利之若土燥水虛之人妄利小水則稼穡亦從而枯耳

○無汗加麻有汗用者謹之

加枝寒多加官熱多加苓○去

桂名四苓散○小便不禁有熱

加連柏會山茱○飲酒伏暑鬱

發為疸煩渴小便不利加茵

金

茵陳五苓散也治脈沉渴欲飲水小便不利而發黃者之主藥非特為酒疸之設也金匱治酒疸論有四其畧曰酒黃疸者或無熱小腹痛欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之云云此先正示人治病求因之法也學者宜讀全文

公吳山甫曰太陽隨經之邪直達

膀胱其人如狂者此太陽之邪不傳他經自入其腑也五苓散王之使陽邪由溺泄也又曰傷寒小便不利而渴者此方主之雖然小便不利亦有因汗下之後內以津液而致者不可強以五苓散利之強利之則重以津液益虧其陰故曰太下之後復發汗小便不利者以津液故也勿治之得小便利必自愈

公俞嘉言曰今世之用五苓散者但知其為分利前後水穀之方不知其為分利表裡陰陽之方方下所云多飲暖水汗出愈之文總置不錄何其淺哉

附方

澤瀉湯治心下有支飲其人苦冒眩

澤瀉五兩白朮二兩水煎服

猪苓散治嘔吐病在膈上思水者猪苓澤瀉茯苓為散服方寸匕

四苓散治濕生於內水瀉小便不利即本方去桂

茵陳五苓散治疸症小水黃赤而澀本方加茵陳

茯苓澤瀉湯治胃反吐而渴飲水者本方去猪苓加生姜甘艸

加味五苓散治伏暑及胃濕泄或煩渴小便澀加車前生姜灯心

山梔五苓散治小兒臍突加梔子為末以灯心湯蜜水調下

金砂五淋散治五淋加海金砂芍藥滑石石葦甘艸

辰砂五苓散治中暑煩渴心神恍惚等症加辰砂

春澤湯治病後渴及霍亂吐瀉枯燥而煩渴即合四君子加麥門

桂苓白朮散治胃暑濕氣吐瀉轉筋腹痛即合益元散加寒水石石羔

桂苓甘露飲治暑熱一症煩渴即合益元散加寒水石

東垣茯苓湯治胃疸陽明積熱食已輒飢面色黃瘦胸滿脇脹小

便閉澁

去猪苓 加陳皮桑白皮
赤芍藥人參石膏

大橘皮湯治濕熱內甚心腹脹滿
水泄小便不利大便滑洩
加橘皮木香滑石枳榔甘艸

百朮調中丸治脾胃不和心下堅
痞脹滿肚疼噫腐霍亂吐瀉水
穀不消久痢赤白膿血相雜羸
瘦不思飲食

加神麴人參木香乾姜甘艸
右為末麴糊丸姜湯送下

甘露散治伏暑煩渴引飲
本方去桂 加滑石人參甘
艸 為末食遠白湯調服

加味四苓散

①火瀉者腹痛一陣瀉一陣後
去如湯後重如滯瀉下赤色小
水短赤煩渴脉數是也用此湯

苓 加 猪 澤 瀉 芍

丹 陳 各一 甘 五 梅 一 蒼 一
分 分 分 分 分 分

右入灯艸煎服○飽悶加朴砂

去瀉○腹痛去加加朴砂蜜薤

○嘔噦惡心加藿梅蓮砂仁○

小水短赤去澤加通車○口燥

煩渴去澤蒼加連門蓮梅葛○

瀉多不氣虛脫昏倦去澤蒼加

參氏○夏月暑濕加濕○瀉
多煩燥去蒼澤加連參辰梅○
瀉多不止去澤丹加衍參○發
熱脉數加柴苓

按治濕之劑殊視小水不通
或澁而可與此湯也四苓散
治火瀉熱瀉發熱五苓散治
濕瀉退下濕柴苓湯治嘔疾
寒熱皆其功有數多故不舉
治例而可知者也

△張子和曰夫暴注水瀉不已即
內經所謂注者下也注下水利也
暴速甚者屬火慎不可驟用重藥

穀乾姜豆蔻之類縱瀉止亦轉生
他疾只可分陰陽利水道而已

△友松子曰戴氏云腹痛瀉水腸
鳴痛一陣瀉一陣者火也丹溪黃
連丸河間天水散涼膈通聖散暑
月薤芩湯桂苓甘露飲皆可選而
用之學者宜廣考不可偏執此一
方

△徐春甫云濕熱甚者瀉下如熱
湯四苓散加滑石黃芩梔子木通
之類如腹中疴痛瀉下清冷喜熱
手溫熨口不燥渴乃寒瀉也五苓
散倍桂加肉蔻有氣加木香病甚
者更加下香附子作丸服之効

胃苓湯 〔七〕

①治脾胃不和暑濕停飲泄瀉

腹痛水穀不化陰陽不分不伏

水土一切一切二字太執故刪治泄瀉之

總司也友松子曰此方燥脾滲

故能治因濕腫脹者多驗然亦

其人腎水不虧乃可用之設或

不服水土而患水腫者用之可

也然猶有法焉如泄瀉而小便

不利若津液偏滲於大腸大便

瀉而小便少者用此方分利之

若陰陽已分而小便短少者此

脾肺氣虛不能生水宜補中益

氣加麥門五味佐以腎氣丸若

誤用滲泄分利復傷陽氣陰無

所生而小便益不利則反

成腫脹之証而疾危矣

蒼 陳 朴 猪 仰 苓

澤 瀉 連 甘

右入姜棗煎服原方無芍藥黃

五苓一方合用故名胃苓焉此

方乃龔氏治因暑濕泄瀉之變

方非通用之法也既去其桂增

入連芍仍稱原名變亂古方述

惑世人非其大焉然而陽臟之

壯夫夏月瀉利服之猶可若陰

臟之人不服水土泄瀉者氣

虛加參○虛寒加永炒○水瀉

加滑○食積加曲芽查○痰多

加守○勝濕一字疑是倒置加芸升〇

暴痢赤白相雜腹痛裡急後重

加木檉○久瀉加升久瀉則非

當詳有虛有寒有脫之異○腹痛加官○黃

胖者飲食無味四肢無力行步

倦怠脉澀而濡是也減桂加薑

守腹香薷稜菰童既曰減桂則

是原方也又後○脾胃不和而黃腫去芍連

加桂如小便赤澀加滑

○按此方五苓散與平胃散

等分故傷食之泄瀉專可用

焉若瀉不止加訶原方胃苓

湯雖以平胃散亦所傷之食以五苓散

參於濁之濕然而未可專用

症有新久人○夏月之泄瀉

有虛實故也去桂加芍連常桂半減用

之何者桂太陽之引經也是也夏月用桂

瀉下而後澀滯當用此湯○之說詳于后○夏月雖先

夏月瀉下身冷咽乾不欲衣

按伏熱在內故合解毒湯而

安夏月有伏熱者有伏○夏

月患痛風按因暑濕而身體

骨節痛故用此湯而愈用上

力而痛止乃因濕滯之邪而非

風滯之痛也學者詳之○

水腫小便澀少大便結是乃

食滯與濕熱所為也加枳曲

查砂腹脹入姜燈煎服而安

○或語云此方四五月至八

九月專用之何者治暑濕之

故也

批曰楊仁齋日用藥中

病不必盡劑矯枉則過
正也所貴酌量權度一毫無
過用焉奈何一胃苓自四五
月至八九月而專
用而無忌憚乎

△李南豐曰濕瀉者如水傾下腸
鳴身重腹不痛也交腸瀉者太小
便易位而出此因氣不循故道清
濁渾淆所致當分利陰陽使氣順
各安其位用此方治之又曰黃症
通用五苓散胃弱合平胃散去朴
加茵陳梔已實又曰水腫因不服
水土者此方治之

△吳山甫曰蒼朮厚朴陳皮甘艸
平胃散也所以燥濕白朮茯苓猪
苓澤瀉桂五苓散也所以利濕脾
胃強健者宜主此方

△友松子曰世俗謂之下痢者先
聖所謂腸癖仲景所謂滯下也謂
太便欲出而不通順故也又仲景
稱下痢者即今之泄瀉也古人於
病之名目無不有理焉學者思之
△批曰傷食之瀉要辨輕重虛實
豈可專用一胃苓耶設曰傷濕泄
瀉或專可用如傷麪而瀉者加萊
服子腹痛加木香瀉其去厚朴加
炮薑此特舉治傷食瀉之一端餘
可例推

△批曰夏月泄瀉妙在肉桂一味
俗醫或去或減甚為失法夏月人
多冷飲而壞脾以致瀉者居多且
人陰氣在內其可以不和乎又
曾世榮言小兒泄瀉宜用五苓散
以瀉內火滲土濕內有桂能抑肝
而扶脾又和劑暑月解毒用桂苓

丸圖經治夏月煩渴用桂蜜膏此皆得用桂之妙也若人氣旺有火則宜酌之不可一例而自愚

附方

前方胃苓乃後人增損不足法也故附方加裁俱從

原方

原方活人胃苓湯治感暑濕挾飲食泄瀉煩渴

即平胃散五苓散相合

蒼朮陳皮厚朴茯苓猪苓

澤瀉桂朮白朮甘藷

右剉水煎入鹽少許如作末藥湯服更可

加裁胃苓湯治腫

去白朮桂加白芷神麴

山查香附砂仁檳榔木瓜

大腹皮

消腫調脾順氣湯治水腫消脹滿

順氣和脾除濕利水

去白朮茯苓桂加山萸砂仁

木香檳榔大腹皮香附枳殼

桔梗三稜莪朮桑白皮木瓜

大茴香木通人參梔子防已

牽牛

茯苓參濕湯治濕熱發黃汗黃尿

赤

去厚朴白朮桂甘艸

加枳實黃芩茵陳木通梔子

防已

白朮木香散治喘嗽腫滿

去蒼朮厚朴加木香檳榔

滑石生姜

東垣茯苓湯治因傷冷飲水泄瀉

注下不一夜十餘次變作白痢或

變赤痢腹中疼痛食減熱躁四

肢沉困無力

去陳皮厚朴白朮

加當歸芍藥黃芩升麻柴胡

加減薤芩湯治霍亂身熱口渴此熱暑中也

本方去蒼朮陳皮厚朴加香薷乾葛天花粉

芍藥湯 八

①治下痢赤白初起積滯不行裡急後重頻上圉而去則少腹痛

芍 二 苓 連 芩 各一 虎 各七

枳 蜜 桂 甘 各五

右煎空心服回春去虎桂加枳

○後重窘迫甚者倍虎加芒

○痞滿氣不宣通加實

毒下血加栝

○壯盛人加虎

○虛弱人去虎

太黃只此方亦不宜用無見庸工不辨虛實動手便用此方虛人受苦寒脾胃不支氣血耗散而邪獨盛行固多至百餘次致不起者往往

○按用此方而

行血則便膿自愈和氣則後重

自除

公友松子曰此方劉河間所製也痢疾初起裡急後重而便膿血所謂行血則便膿自愈和氣則後重

自除此方是也蓋謂便膿血血之
滯也故曰行血自愈奔迫後重氣
之實也故曰和氣自除矣但膿血
赤白亦有氣病血病之分後重裡
急亦有氣實血虛之異此又不可
不察然而今時俗醫才見痢疾不
辨其所因輒投此方鮮不以為後
難矣劉宗厚曰治痢大法火熱者
寒之清之氣滯者和之積滯者去
之氣虛而降者升舉之血虛者補
養之予曰外感者發之內濕者參
之傷食者除之冷者溫之盛者和
之虛者補之豈特一端耳學醫者
宜留心焉又潔古云後重則宜下
腹痛則宜和身重則除濕脉弦則
去風膿血稠粘以重劑竭之身冷
自汗以熱藥溫之風邪內結宜汗
之驚漉而利宜溫之此猶治痢之
玄關也

附方

回春芍藥湯初痢宜清之

本方去肉桂大黃

加枳殼升麻

導氣湯治下痢膿血日夜無度裡
急後重

去肉桂甘卹加枳殼

四黃散治痢疾發熱膿血不止後
重者

去檳榔木香肉桂加黃柏

枳殼滑石桃仁白朮

黃芩芍藥湯治瀉痢腹痛身熱脉

洪數者及膿血稠粘者

黃芩八分甘卹後二芍藥五

右咀分二貼水煎食前服○按
仲景此方乃芍藥湯之祖劑也

故並及之

附

調和飲

①治紅白痢○下痢稍久者宜

調和

芍三斤一匁 弓 連 苓

嬰各一匁 升三匁

右煎空心服○紅痢依本方○

白痢加吳一匁○赤白痢加伽苓

陳各一匁○按治諸痢用通利

藥後未已直服此方調理而愈

△友松子曰嗟乎醫道之微也今

人不習靈素耻者本則曰以方書求幸逢逢殺人何其容易哉如痢疾初起不辨所因便用芍藥湯及稍久改用調和飲其積熱而痢赤白者或得愈若年高與體弱者脾胃虛而氣弱者無不受厥害焉治是病者宜小心審其所因而後藥之

附

參歸芍藥湯

①治痢久一二十日去多不止

者

芍一匁半 參 斤 苓 預

陳各一匁 砂七分 甘

右入燈腳梅蓮

此三味治痢之要藥用之者不可不

煎服○噤口痢不食者胃

口極熱加連參蓮梅梗○腹痛

裡急後重者是熱積氣滯加蜜

枳腹痛裡急後重熱積氣滯則

山藥蓮肉烏梅收澁之物宜

斟酌之其大腸虛脫不能自收

而後重者又非枳榔輩之所能

治矣用藥之法詳后○未除者加升少○

痢作痛者熱流下加苓炒○痢

後發熱不止或虛坐努力者俱

是血虛倍加升芍芩○積中有

紫血是瘀血加芍紅○按下痢

久不止者用此方宜調養氣血

按下痢久不止者體虛氣弱尤當純補及加芍子肉蔻半夏

壯蠟等藥澁之然須以陳皮為佐恐太澁亦非中正

按三方皆治痢之主藥也初

痢宜芍藥湯日久日久二字衍不

止用調和飲氣血虛弱者參

歸芍藥湯○脾胃虛而膿血

不止者胃風湯方見瘧痢兼

作者柴苓湯皆因加減以取

平効若未愈則宜用和中湯

不有不愈者也

全友松子曰痢久一二十日未愈不止用參歸芍藥湯雖似穩當若氣陷虛脫者宜審別治如氣陷者

東垣益氣湯虛者選要十寶湯脫者局方養臟湯之類

△按腹痛裡急後重雖一痢病而分三症如腹痛甚下墜異常用桃仁滑石行之挾熱而痛用黃芩挾寒而痛加干姜之屬如裡急有積滯者大黃枳殼虛坐努責血虛裡急者當歸芍藥之屬後重當和氣積與氣墜下者兼升兼消升謂升麻防風消謂木香枳櫛又有用粟殼等固澀之劑亦愈者由大黃枳櫛輩瀉其邪已而大腸虛滑不能自收而重者固其滑收其氣而愈也學者用藥宜詳思而試焉

附

和中湯。

①痢疾百方不應脾胃彌虛弱而下如醬油脉弦數或白變紅

痢者專可用此湯也

餘大朴大枳大童各婆中

砂各蜜小永各甘少

右煎服○此方產前後痢病得

數奇

又方和中湯不効則宜此湯必

有奇妙

餘各二斤各二芩各二嬰一

棋各一蜜各一周七

右煎服○此方東井叟之配

劑也友松子曰此二和中湯前治積滯後重乃和氣之方

也後治濃血稠粘乃行血之方
也用之痢疾初起腸胃未至於
虛者並有效驗如方前之論久
痢胃虛之症則翹首待斃耳昔
日延壽醫院製此方亦唯以治
痢疾初起未至於虛者之設也
後學無稽妄立邪說
而誤先輩罪甚大矣

一婦新產十餘日後腹發熱
微痛大便不通去周加枳芩
四五貼而愈又一婦患前證
故前劑三貼而下滯血更得
平安

余友松子曰和中湯治痢疾百方
不應脾胃彌弱白變紅痢者之言
吾斯之未能信也今醫治痢峻用
下劑及苦寒破滯太過不無後患
况老人虛人遂致元氣虛陷反不
能支胃氣既虛其痢益甚夫陽氣
下陷入陰中則脫血陣陣而下者
有之醫尚謂爲血痢不已仍用苦
寒寢致脈絕四肢厥冷而死者曷
可勝記哉按王金壇日久下膿血
或如死猪肝色或五色雜下頻出
無禁有類痢疾俗名刮腸此乃藏
腑俱虛脾氣欲絕故腸胃下脫若
投尋常痢藥則誤矣用六柱飲去
附子加益智白芍或可冀其萬一
云司命者鑒諸

附方

濟生四柱散治元藏氣虛直陽耗
散腹臍冷痛泄瀉不止

人參 附子 木香 茯苓

右入生姜鹽少許煎空心服滑
泄不止加肉蔻訶子名六柱散

活人有白朮無訶子按回春泄門有八柱散乃此方變化矣

八柱散治腸胃虛寒滑泄不禁○滑瀉者日夜無度腸胃虛寒不禁脉沉細是也即滑瀉也

人參去蘆白朮去蘆肉苁蓉煨

乾姜炒訶子煨栗穀蜜炒

甘卿炙附子麩裹煨去皮臍

各等分

右剉一劑姜一片烏梅一箇燈卿一團水煎溫服○照前理中湯加減相同理中湯見回春

連解毒丸黃連解毒湯也

①治太熱不止乾嘔煩渴錯語呻吟不眠或傷寒汗吐下後熱

不退諸般積熱實火者太効

連一苓 栢丹各二

右水煎活人原方以黃連為君○腹滿嘔

吐或欲作利者加守三枚朴苓各二

姜片三○三焦實火內外皆熱

煩渴小便赤口生瘡加翹芍柴

各等分○狂亂喜笑不休者此心

火盛先行吐法而後加守瀝竹

葉姜汁○臟毒下血者必在糞

後名遠血加翹槐細甘謂之八

寶湯○婦人赤白帶下屬壯盛

而有寒熱者合四物湯加倍連

尤効即解毒補血湯

按清熱之劑也○二十餘歲

婦人筋漏如湧身熱口渴合

四物湯煎湯與棕灰而安○

又孕婦有先證合四物湯加

升伽而安

小丹陽坊曰解毒四品味甚苦人

數服故卒投之多作嘔吐瀉下飲

食不進等之變故勿常用單方也

唯合諸方而用之假令痰兼火則

二陳湯合之血病兼火則四物湯

合之氣虛兼火則四君子湯合之

凡諸病有熱則四品之中選而用

之最濕火之妙劑也古書曰此方

太倉公火劑湯也火甚者必炒過

或以酒或以姜汁或加生薑茱萸

等溫藥經所謂飲其所主先其所

因是也

全按活人此方以伊尹二黃湯加

減之法也或謂倉公火劑湯即此

也以予言之火劑湯即二黃湯也

耳

觀其治病可知其法也此以古方

三補丸治心膈實熱方中加梔子

耳

全友松子曰道壽先生戒勿常用

單方者言其常也至如傷寒裡熱

不退加石膏大黃芒硝陽毒發斑

可餌立致殺入丹溪翁所謂虛火可補

附方 本方變法多今擇簡要者載之

大金花丸

即本方為丸

大黃湯治天行疫不解壯熱四肢煩痛不欲飲食

去苓 加虎

三黃石膏湯治暑毒深入熱結在裡譫語發渴不欲近衣大便秘結小便赤澀者

合白虎湯 加玄參

加減瀉黃散治黃疸大能降火

加茵 澤 苓

生地黃黃連湯治婦人血風症因脫血崩漏不止血枯燥熱不除循衣撮空揚手擲足錯語失神氣粗鼻乾此陽九陰八之候急

宜服之

去黃柏 加生地黃防風

解毒補血湯治經水不住

合四物湯

阿膠散治三焦火盛吐血衄血及婦人經水先期屬血熱者

去黃芩 加阿膠

加味解毒湯治婦人血虛發熱經水愆期

本方加當歸芍藥

水煎服効加白朮茯苓極効名

解毒金花散

清心湯治心經蘊熱動作不常及譫妄便秘等症

本方去黃柏 加連翹大黃

薄荷甘艸朴硝

為細末蜜少許竹葉同煎溫服

通玄解毒丸治中外諸邪熱毒癰

腫瘡疽筋脉拘攣咬牙驚悸一切熱毒並宜服之
去黃柏 加大黃牽牛滑石

既濟解毒湯治上熱頭目赤腫而痛腹中積滯胸滿困臥太便秘

用大黃黃連 黃芩 甘柳 桔梗 柴胡 升麻 連翹 當歸身

右水煎食後溫服

三黃石膏湯詳見陶氏六書不及詳載
加玄參知母石膏甘柳

回春黃連解毒湯治傷寒太熱不止煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱內甚及汗吐下後寒涼諸藥不能退其熱者

黃連 黃芩 黃柏 梔子

柴胡 連翹各二錢

右剉下劑水一鍾煎服

白虎湯 十

①治傷寒汗吐下後心煩悶渴欲飲水而脉洪大

膏四兩 雷一兩 甘一分 粳一合

石水煎②熱盛煩渴不止及發

赤斑脉虛加參一名化斑湯

一方加玄參大便不固熱不退

加蒼○脉尺寸俱長汗大出身

如水石加桂○老幼及虛人昏

方知矣

冒謔語或小便澀起臥無度或

煩而不眠加丹老幼及虛人發熱謔語雖是白

虎湯症尤當加人參以扶元氣此乃仲景之法也○上

焦煩渴而不欲多食謂之高消

加參或加升栢詳后人參白

虎湯治消渴方○瘧疾表裡俱熱時時惡寒

有汗而大渴口乾加參

按此方除熱之劑也○夏因

暑熱而遺尿加參栢○一男

熱不甚大便瀉不省人事脉

浮大無力背出斑是死証加

參蒼取驗死証服白虎爭能得生當是危証也

而後小柴胡湯合四君子湯

而調理則全愈

△吳山甫曰傳入於胃邪入裡矣

表無其邪故不惡寒裡有實熱故

反惡熱熱越故有汗裡燥故作渴

邪盛故脉大邪在陽明故脉長白

虎西方金神也五行之理將來者

進功成者退如秋金之令行則夏

火之炎息此方名曰白虎所以行

清肅之令而除熱也此方唯傷寒

內有實熱者可用之若血虛身熱

症象白虎唯脉之虛實為辨也誤

服白虎必死△李中梓曰太陽中暍得此頓除

熱見白虎而盡矣立秋後不可服

服則不能食多成虛羸○李東垣

日石膏足陽明藥也故仲景治傷

寒陽明，症身熱，目痛，鼻乾，不得臥，身以前，胃之經也，胸前，肺之室也，邪在陽明，肺受火邪，故用辛寒以清肺氣，所以有白虎之名。又治三焦皮膚大熱，入手少陽也。凡病脈數不退者，宜用之。胃弱者，不可用。△友松子曰：傷寒發熱煩渴不止，及發赤斑而脈虛者，白虎尤似難投。滑伯仁曰：發斑脈多沉伏或細而散，或絕無脈者，血之波瀾發斑者，血散於肌膚故脈伏云云。白虎加人參湯治之。又曰：凡夏暍及暑癰或熱病入胃，俱可以斟酌加人參用之最穩。所以然者，人患此症，莫不由元氣虛而成也。白虎猛烈，故以甘溫相緩。

△又曰：暑月發癰，身熱口渴欲水，脈長實者，用之。加人參尤妙。保命集去甘粳，一加白芷治癰疾熱多寒少下後微邪未盡者，名曰芷湯。一加桂枝黃芩治症同前，名桂枝石膏湯。

附方

仲景人參白虎湯治發熱自汗煩渴者

本方加人參

白虎加蒼朮湯治夏暍太熱不止

口渴及大便不固者

加蒼朮

化斑湯治斑毒

加人參玄參

一方用糯捨粳

白虎加桂湯治瘧疾但熱不寒者

加桂

桂枝黃芩湯治瘧服藥寒熱轉太者，知太陽陽明少陽三陽合病

也

去粳米 加黃芩人參半夏
柴胡桂枝

桂枝石膏湯治瘧先寒後熱熱多
寒少

去粳米甘艸 加桂枝黃芩

梔子仁湯治傷寒陽毒發狂煩燥
面赤咽痛熱渴

去粳米 加梔子仁赤芍藥
大青黃芩升麻杏仁柴胡

豉

人參竹葉湯治汗下後表裡虛煩
不可攻者

去知母 加竹葉人參半夏
麥門冬生薑

麥煎散治榮衛不調夜多盜汗四
肢煩疼肌肉消瘦

去粳米 加滑石地骨皮

葶藶白苓赤芍杏仁麻黃
右爲末浮麥煎湯服

三和甘露飲大治消渴有此証者
每日必須進一二服

去粳米 加猪苓滑石澤瀉
茯苓白朮葛粉天花粉

治渴人參白虎湯治膈消上焦煩
渴不欲多食

加入參黃芩杏仁

加味白虎湯治陽明經汗後脈洪
大而渴或身熱有汗不解

加入參梔子五味子麥門冬

理中湯 十一

①治五臟原作中寒口噤失音
四肢強直兼治胃脘停痰冷氣
刺痛及臟毒下寒泄利腹脹太
便或黃或白或黑或有清穀

參 加 炒 永 炒 甘 炙

右入姜棗煎服○若為寒氣濕
氣所干者加附名附子理中湯
若中附毒者甘呷乾姜等分或
黑豆煎湯解之不可不知也○

霍亂吐瀉加童陳名治中湯嘔

吐者治中湯加喬守姜○泄瀉

加陳苓名補中湯○溏泄不止

者補中湯加附○不喜飲食米

穀不化加砂附陳苓○霍亂吐

下心腹痛手足厥冷去伽加附

生名四順湯一名四順湯○心膈急

痛手不可近加實苓○渴欲飲

水加瑞○霍亂轉筋加膏友松

霍亂轉筋脈沉弱或浮散宜加木瓜理脾以伐肝○臍

上築者腎氣動也即奔豚也去伽加

桂○悸多加苓若寒加永○腹

痛去伽加附○飲酒過多及炙

燂熱食發為衄加芎熱因熱用乃從治之

法也又○腹瀉下利脉沉遲而

微加附○痢冷症加附桂苓○

胃寒嘔吐清水冷涎脉沉遲加

苓附官藿喬守砂姜梅按此乃

寒吐之加味也因其藥品有差

故正之原用理中湯去甘卿加

茯苓陳皮藿香丁香香半夏砂仁

官桂各等分生姜二片烏梅一

个水煎徐若寒極手足冷脉微

吐不出加附去官圓春云煩燥

○噯氣有胃寒者去參苓加蜜

益陳朴莎藳○沈厥者胃寒所

生加椒楸○口舌生瘡飲食少

思大便不實此中氣虛也手足

冷腹痛加附口舌生瘡因虛火

乃溫養中下一焦以收浮散之

火矣須察脉及舌可也脉或浮

大而無力或洪數而散其舌則

雖赤而無皮或飲食不知其味

○體虛感雨濕而嘔吐加童陳

守婆○去甘加陳守入姜煎服

治胃氣虛寒作惡心亦治船暈

虛人船暈者用此方若平常

按此湯治寒之劑也○乾霍

亂心腹絞痛不吐瀉足冷脉

沉欲絕者先用鹽湯探吐而

後加婆朴蒼砂莎蜜枳陳桂

即名霍亂腹痛額頭黎黑手

理中湯

足收引脉無氣以息者此中

寒暴死也加附

按此方不唯能治乾霍亂

而耳戴元禮曰霍亂吐利不止元氣耗散病勢危篤或米粒不入或口溫喜冷或惡寒戰掉或發熱煩躁欲去衣被此蓋內虛陰盛却不可以其喜冷欲去衣被為熱宜理中湯加附子不効則四逆湯並宜救十分冷服

臍停寒腹痛身怯泄瀉青黑

不止加陳婆冬桂梅

圓春原方有良

姜灯心生姜棗名理中湯也巳下五箇即此方之加減也

○若寒極手足冷脉沉細去

桂加附○腹痛滿去參加砂

朴木區藏藥心去桂加喬守

○瀉不止加蒼朮○風汗去

藿桂加芪○飽悶去桂加朴

砂治寒瀉理中湯加減止此

○飲食不節

過食生冷腸鳴泄下加童陳

砂

大凡瀉瀉服理中湯小便不利大便反泄者不知氣化之過也本肺不傳化以純熱之藥治之是以轉泄少服則不止多服則愈熱所以不分若加陳皮青皮之類治之則可經云勝脫者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

○急陰證手足冷指田青少

腹痛囊縮加附陳守喬苓多

曲沉入姜棗鹽少煎服如急

陰不省人事用鹽填臍中火

艾炙之以醒為度。○傷寒自利不渴寒多而嘔或腹痛下利霍亂吐瀉手足厥冷者用附錄諸證皆退而吐不止則百無一生

△張長沙曰太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛又曰自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之黃氏曰宜以理中湯循循而用之

△吳山甫曰太陰自利不渴寒多而嘔腹痛鴨溇霍亂此太陰有真寒也本方主之太陰者脾也自利渴者為熱不渴者為寒脾喜溫而惡寒寒多故令嘔寒者肅殺之氣故令腹痛鴨溇者後便如鴨之溇亦是虛寒所致霍亂者邪在中焦令人上吐下瀉手足搐霍而目睛亂也霍亂有陰陽二症此則由寒而致故耳病因於寒故用乾姜之溫邪之所湊其氣必虛故用人參白朮甘粳之補

△孫兆云陽病深熱而厥畢竟脈緊外症煩躁而揭衣被也陰厥脈沉遲而形靜也若不能辨陰陽者且以理中湯加倍甘粳為丸試之是陽厥便見熱症是陰厥便見寒症可漸進理中四逆也加甘粳一倍名四順丸

△三因方曰理中湯能止傷胃吐血以其方最理中脘分利陰陽安定血脈患人果身受寒氣口受冷物邪入血分血得冷而凝不歸經

絡而妄行者其血必黯黑其色必白夫其脈微遲其身不太熱者不用薑桂而用涼血之劑殆矣○曹氏必用方云吐血須煎乾姜甘艸與服或四物理中湯亦可○王宇泰云飲酒傷胃吐血理中湯加枳朮子乾葛茅花

△王肯堂曰本方加茯苓黃連名連理湯且如今當暑月若的知暑瀉合用暑藥的知冷瀉合用熱藥中間有一等盛暑又復內傷生冷非連理湯不可下泄無度泄後却彈過響肚門熱小便赤澀心下煩渴且又喜冷此藥為宜

△張仲景曰霍亂頭痛發熱身疼痛而熱多欲飲水者五苓散主之寒多不飲水者理中湯主之友松子按寒甚嘔而泄亦來微遲者急加附子以救之

△按仲景云久病瘥喜出唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之理中丸東垣云多唾或唾白沫者胃口上停寒也藥中加益智仁

附方

和中湯治小兒脾胃不和泄瀉腸鳴

去人參 加厚朴

溫中湯治脾虛嘔吐咳嗽白利

去乾姜

黃芪湯治二焦氣虛自汗等症

加黃芪白芍

連理湯治盛暑內傷生冷又治瀉泄

加黃連茯苓

四順丸見前孫兆論

即本方加甘艸一倍

增損理中丸治結胸服大小陷胸湯不愈者宜與之一丸水煎服如不解復與之不過五六丸効加瓜蒌牡蠣枳實黃芩

丁香理中湯治嘔吐腹痛屬寒者加丁香

枳桔理中湯治結胸雖痛而無煩躁等症此因下後虛逆寒氣獨猶結也

加枳殼桔梗

當歸理中湯由心脾血不足舌無故常自痺者不可作風治

加當歸

理中丸治轉筋霍亂上吐下瀉肚腹痛及乾霍亂俗名攪腸沙并真陰寒證手足厥冷○雲林云此即理中湯改爲丸土能塞水之義若仍作湯則不効矣

去白朮加茯苓

爲末煉蜜爲丸每重一錢細嚼淡薑湯送下忌食米湯

加味理中湯治腸胃虛弱腹痛身

怯泄瀉青黑

加厚朴茯苓

治中湯治霍亂吐瀉者

加橘紅青橘

○若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥○若嘔吐甚者加丁香半夏

和實理中湯治傷寒結胸先以桔

梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胸痞欲絕心膈高處急痛手不可近者

加枳實茯苓

寒厥附子理中湯治中寒厥倒
加附子吳茱萸肉桂當歸
陳皮厚朴

七氣湯 十二

①治七情所傷及勞役飲食不
節滿悶短氣

守五參桂甘各一

右入姜煎服○七氣心腹刺痛

加索一乳二分二名加味七氣湯婦

人猶加芎斤各一

△廬山嚴用和曰治七氣為病及

外感風寒為心痛

△劉宗厚曰此方出太陽例寒則
氣收宜辛散之甘緩之治氣虛寒
鬱藥也

△友松子曰常用此方因七氣為
病心腹痛者加陳皮木香以行其
氣若帶血症而痛甚者每加延胡
乳香以和其血或再加芍藥之屬
若氣鬱嘔吐加茯苓厚朴或加木
香

△愚按陳無擇二因方有七氣叙
論證治極詳而治虛人七氣為患
則用此方調之補之若實人者乃
用大七氣湯消之散之誠為補瀉
之妙訣也學者擴之則治七氣之
要瞭焉在心自矣丹溪有氣無補
法者世俗之謬論也之語豈欺我
哉○二因方云本方治臟腑神氣

不守正位為喜怒憂思悲驚恐時
鬱不行遂聚涎飲結聚攻心有如
坏塊心腹絞痛不能飲食時發時
止發則欲死○大七氣湯論治見
次附方

附方

加味四七湯治寒邪客心搏痛

本方加白芍藥白茯苓厚朴

枳殼紫蘇

加味七氣湯治七氣病發心腹刺

痛不忍欲死

加玄胡索乳香

加味七氣湯治心腹絞痛諸虛冷
氣滿痛

加當歸芍藥厚朴黃芪乾姜

蜀椒

桂枝四七湯治因風冷寒邪心腹

作痛

○桂易桂枝

加白芍白茯苓厚朴枳殼

紫蘇

加減七氣湯治七氣鬱結五臟之

間互相剋射陰陽不和揮霍變

亂吐利交作

去甘艸加厚朴芍藥茯苓

紫蘇橘皮

豆蔻散治五種膈氣能治氣補勞

通血脉益脾胃去痰

加肉豆蔻木香厚朴赤茯苓

檳榔訶子青皮陳皮郁李仁

五膈丸治五膈食生冷即心胸痞

滿氣不通痰如刺引背噎食即

不下心下堅痛即欲吐得吐即

已甚者手足逆冷上氣

去半夏加麥門冬川椒

細辛乾姜遠志附子

黃連湯治腹滿痛大便秘胸中有熱腹痛欲嘔

加黃連乾姜芍藥大棗

息賁湯治肺之積在右脇下大如覆杯久不愈病洒洒寒熱氣逆喘咳發為肺癰

加吳茱萸桑皮苦葶藶

附

天七氣湯一名四七湯

①治七情不節致臟氣不平心腹脹滿又治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮在咽喉間咯不出噎不下及中脘痞滿上氣喘急

守五苓四一朴三蘇一

右入姜煎服○七情所傷鬱結臟腑氣不和平腹痞悶加蒺藜

○七氣鬱結五臟互相刑剋陰陽不和揮霍變亂吐利交作加

芍四陳二參一入姜棗

△友松子曰戴元禮曰七情飢飽嗽無非傷動臟腑止氣致和上逆結成痰涎肺道不理宜順氣為先本方加桑白杏仁五味人參阿膠△龔西園治七情四氣以致膈噎翻胃加枳實砂仁陳皮蘇子甘艸各四七調氣湯○東井翁治七氣心痛加沉香枳殼烏梅○予每用是方治七氣心痛多加香附以利之或甘艸以緩之○危氏治心氣

鬱拂鬱發敢驚本方加茯神遠志
石菖蒲甘艸○王晉堂曰審知是
思慮過度宜本方去茯苓加半夏
人參菖蒲審知是盛怒成痰面色
青黃或兩脇脹滿本方加枳殼木
香

公友松子曰此方乃仲景先生治
婦人咽中如有炙轆之半夏厚朴
湯也千金方作胸滿心下堅咽中
帖帖如有炙肉吐之不出吞之不
下後來陳無擇收入二因方號太
七氣湯治喜怒不節憂思兼并多
生悲恐或時振驚致藏氣不平憎
寒發熱心腸脹滿飢餓兩脇上塞
咽喉有如炙轆吐嚥不下皆七氣
所生云

指迷七氣湯

①治五積六聚狀如癥瘕隨氣
上下發作有時心腹痞痛攻刺
脇肋上氣窒塞喘嗽小腹脹
大小便不利此方積塊屬寒者
宜用也

棧 莢 童 陳 藿 桔
桂 益 莎 甘

石人姜煎服○心脘痛加矮枳
○加虎栝治諸般痞積面色痿
黃肌體羸瘦四肢無力皆緣內
有蟲積或好食生米或好食壁

泥或好食茶炭鹹辣等物者只
此一服除根空心服後食頃腹
心痛當下○七情相干陰陽不
得升降氣道壅滯攻衝作疼去
稜加守姜棗○校冷腹痛七氣
四肢面色青白加守姜棗

按治七氣及蟲積聚之方也

○一小女患痔腫痛已潰壞
血多下俄發心痛欲死加味
七氣湯一貼而安○心痛甚

者太七氣湯加梅沉枳切得
奇效○胸支因蟲而腹不食
顏色青者指迷七氣湯加枳

而安○常有積之人患瘧寒
熱往來腹皮堅張無汗數方
不應指迷七氣湯加承麻二

貼而安○積塊屬寒者宜指
迷七氣湯若屬熱者宜用柴

平湯時時取卒功

△戴元禮曰積有定形聚無定處
並宜十味太七氣湯吞下尊貴紅
丸子又多飲人結成酒癖腹脇積
塊脹急疼痛或全身腫滿肌黃少
食宜本方紅酒煎服○濟生方稜
莪陳益菰各一餘分二方無二
稜有半夏一方有木香枳榔○戴
元禮治五積法○肝積在左脇下

狀如覆杯，或如蠶，或嘔逆，或痛在兩脇，牽引小腹，足寒，轉筋久，則如癰，名曰肥氣。宜本方煎熟，待冷，却以鐵器燒通赤，以藥淋之，乘熱服。○肺積在右脇下，大如覆杯，氣逆背痛，或心氣喜忘，目瞋，膚寒，皮中時痛，如虫緣針刺，久則喘咳，名曰息貫。宜加桑皮半夏杏仁。○心積起臍上，直至心大如臂，腹熱，咽乾，心煩甚，則吐血，名曰伏梁。宜加石菖蒲半夏。○脾積在胃脘，大如覆杯，痞塞不通，昔痛，心夜飢減，飽見腹滿，吐瀉，足腫，肉消，久則四肢不收，名曰痞氣。宜本方下紅圓子。○腎積發於小腹，奔上至心，上下無時，如豚奔走，飢見飽減，小腹急腰痛，口乾，目昏，骨冷，久則骨疼，名曰奔豚。本方倍桂，加茴香炒棟二肉。△張潔古曰：壯人無積，虛人則有之。皆由脾胃怯弱，氣血兩衰，四時有感，皆能成積。若遽以磨堅破結之藥治之，疾似去而人已衰矣。故善治者，當先補虛，使血氣壯，積自消。如滿座皆君子，則小人自無容地也。不問何藏，先調其中，能使飲食是其本也。用此方者，宜知此矣。

加味四七湯 四

①治七情之氣結成痰，狀如梅核，或如破絮，在咽喉之間，咯不出，嚥不下，或中脘痞滿，氣不舒。

快或痰涎壅盛上氣喘急或因
痰飲惡心嘔吐此藥最效功不

盡述但婦人女子患此最多此按

方以仲景半夏厚朴湯而變故
治梅核氣有如鼓枘之應矣

苓 朴 蘇 梗 守 陳

童 實 砂 星 曲 各一

多 枳 益 各五

右入姜煎服

按王十情鬱結生痰在咽喉

間吐不出吞不下氣不快者

善治痰飲之藥也○婦人上

氣喘急胸膈痞悶嘔吐白沫

與此湯而安○然而痰涎在

喉嚨不下得奇効

△楊仁齋曰梅核氣者室礙於咽

喉之間咯之不出噎之不下如梅

核之狀者是也始因悲怒太過積

熱蘊隆乃成厲痰鬱結致有斯疾

耳治宜導痰開鬱清熱順氣如半

夏陳皮香附川芎山梔子仁黃芩

枳殼蘇子之類是也如老痰凝結

不開以鹹軟之海石是也

翼西園原方 蘇梗 半夏

厚朴 茯苓 枳實 南星

砂仁 神麴 各一錢 陳皮 青皮

各七 枳殼 荳蔻 益智 各三分

原無粳米宜刪之

附方

加味四七湯治七情之氣結成痰

涎狀如破絮或如梅核在咽喉
之間咯不出嘔不下或中脘痞
悶氣不舒快或痰涎壅盛上氣
喘急或因痰飲惡心嘔吐等症
半夏 白茯苓 厚朴 紫蘇
桔梗 枳實 甘艸
右剉姜棗煎服

分心氣飲

十四

①治男子婦人一切氣不和多
因憂愁思慮忿怒傷神或臨食
憂戚或事不隨意使抑鬱之氣
留滯不散停於胸膈之間不能
流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎
塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭
目昏眩四肢倦怠面色痿黃口
舌乾苦飲食減以日漸羸瘦或
大腸虛秘或因病之後胸中虛
痞不思飲食並皆治之

藕二

陳腹

桑卷

各五

分

苓

守

芍

通官

各二

甘

半

右入姜棗燈煎食遠服

和劑方

餘各一 楊仁齋直指方無卷芍
有木槵枳莪門桔藿雀治論見
後 ○加枳槵治氣百病最能

升降陰陽調順二焦其功難以

盡述○一方去芍藥加桔枳木

枳實我養治憂急鬱怒諸氣痞

滿○水氣面目浮腫加猪澤車

瓜門葶醫林名小○氣塊加莢

○性急加柴○多怒加芩○食

以加砂曲因食滯者乃可○咳嗽加桔

守○胸膈痞悶加實薤○三焦

不和加桂○氣閉加藿○氣滯

腰痛加瓜枳○上焦熱盛加芩

○下焦熱盛加丹○翻胃加沉

按此方散氣降氣之劑故專

治氣鬱之主方也專治一字

○憂鬱得嗽加枳會批曰憂鬱得嗽

用杏仁枇杷葉之類可也

若用五味子則氣轉閉矣

因七情面目浮腫腹脹肢腫

加猪澤瓜○七情氣結于中

心腹痞痛不可忍加枳實

○氣逆上而腰足下焦冷蒼

桔湯不効故與此湯切得奇

効是乃氣鬱故也批曰外感風寒濕症

或脚氣痲氣等症而足冷者

五積散虛陽挾痰氣而上攻致下部冷者蘇子降氣湯心氣拂鬱而氣不能升降以致上熱下冷者分心氣有腎中真陽虛者水火不交濟者清

濁一氣相干，犯者并似氣逆，上而使腰足下焦冷者，豈可氣飲責効哉？

○洒淅寒熱

盜汗頭痛咳嗽，五心煩熱，常心不快，至暮虛熱，夜不寢，脉弦而數，似勞證。滋陰降火湯不効，謂是窄人氣鬱，故去羌減半蘇加和枳，而安。○因氣腦成腫，氣脹滿，此方有數奇。○氣不順，如痛風，一身痛，此湯切得奇妙。

△友松子曰：此方藥品乃散氣，宜鬱之劑也。方前論許多病証，總因氣滯而正氣未虛者，用之。夫此藥能分利，心胸間鬱滯之氣，故名焉。若正氣虛弱而心氣鬱結者，用之不唯無益而反害人。宜薛氏歸脾湯調補之可也。又病後虛痞不思飲食，數字誠為未穩，設使脾氣虛弱作痞，虛寒作脹，宜四君六君等方，或加姜桂補之可也。潔古所謂養正積自除。

△又曰：此手足太陰例藥也。夫聖曰：諸氣怫鬱皆屬於肺。又曰：鬱病多在中焦。所以宋人收入和劑局方治諸氣不和分散一切抑鬱之氣耳。然而世俗恃此一方，概治心氣未為善也。啓玄子七情分治之理，何栢齋五臟用藥之法，朱丹溪六鬱易劑之權學，皆審明於胸次了了而用是方，則無差矣。此方既曰分心氣，併無黃連木香沉香葛

蒲獨活細辛之類如何能分乎以陰之氣哉內經啓九氣之病喜氣所致爲笑不休爲毛草焦爲肉病爲陽氣不收其則爲狂之諸症其可用此疎散之藥乎至於劉守真原病式曰氣爲陽而王輕微諸所動亂勞傷乃爲陽火之化神狂氣亂而爲熱病者多矣張戴人和之曰河間治五志獨得言外意凡見喜怒哀思恐之症皆以平心火爲主又勞者傷於動動便屬陽驚者駭於心心便屬火二者亦以平心火爲主云此二公慣用苦寒瀉陽之藥故有是倡然猶未言疎散之藥能治心氣病矣

附方

祕方分心氣飲治症同本方

木香 丁香 人參 香附

白朮 大腹子 藿香 大腹

皮 桑白皮 艸菓 桔梗

麥門 厚朴 陳皮 紫蘇

甘艸

一方 加枳實半夏

右姜棗灯心煎溫服

直指真方分心氣飲治憂思鬱怒

諸氣痞滿停滯噎塞不通大小

便虛秘

紫蘇莖葉半夏枳殼青皮

陳橘紅大腹皮桑白皮木通

赤茯苓南木香枳榔蓬莖朮

麥門冬桔梗辣桂香附

藿香甘艸 右剉姜棗煎服

導水茯苓湯治水肿頭面手足偏

身腫如爛瓜之狀

赤茯苓 麥門冬 澤瀉

衆方見巨細補丸

白朮各二兩 桑白皮 紫蘇 檳榔 木瓜各壹兩 大腹皮 陳皮 砂仁 木香各柒錢半
右咬咀每服半兩水貳盞燈心或拾伍根煎至捌分去滓空心服

準繩分心氣飲治因氣滯而成脹滿者

卽本方無羌活甘州一味用生薑灯心水煎食前服

若氣實者加枳殼枳櫛喘者加蘇子葶藶

寬中湯 十五

①治七情四氣傷于脾胃以致

陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆

遂成五膈之病一切冷氣並皆

治之

莎 朴各一匁 童 陳 喬

砂各四匁 多二匁 甘五匁 蜜三匁

右爲末姜鹽湯點服予常用此方依和劑

爲散其効更著今人唯作煎劑故其驗也遲矣 ○七氣

沉滯飲食不下氣滿膨脹其人壯其

脈沉實者宜此湯

按治七情鬱結之方也○好

酒之老僧頭重胸膈痞滿不

食間食則欲嘔數方不應加

連葛煎服

胸膈痞滿不食食則欲嘔用此藥而

効者恐不唯酒積而耳呵呵

○少女十一

歲從六月初至七月下四腰

痛時止時發今痛甚泣聲響

隣五日絕穀大便結如咽石

芒加枳芩芍煎服一貼而痛

減三日而向食氣五日而太

便通得安全

此女子莫非重積之患耶學者

詳○女子十七八歲因氣惱

而吐血心腹刺痛堅如石冷

如冰雪經水四五箇月不通

脈沉緊而數衆醫束手故予

加蘇婦承煎服得奇妙

此乃合正

氣天香湯之例而治積滯氣俱得之矣然而不明脈色使人不能無遺議也

△王宇泰曰嘔吐胸滿膈脹關格

不通不食常飽食則常氣逆而吐

此因盛怒中飲食而然宜一陳湯

加枳實木香不効則五膈寬中湯

右因脾胃陽火內衰其脈沉微而

遲者以辛香之藥溫其氣却宜嘉

禾散五膈寬中湯之類乃以益陰

之藥佐之

△友松子曰七情四氣相傷以致

陰陽不和胸膈痞滿停痰氣逆遂

成五膈之病者用之數貼而有効

丹溪所謂氣之鬱滯久留清道非

猶香熟不足以行是也然而用於

遂成膈病者而不可用於久患膈病者也遂成二字謂七情相傷日久因成膈病或繼成膈病之意也今之醫流只認五膈寬中之題凡遇膈症不問新久而卒試孟浪殺人咎將誰執

附方

秘方神仙九氣湯治九氣膈氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣怒氣山嵐瘴氣積聚堅牢如杯心腹刺痛不能飲食時生時來發則欲死

本方去厚朴砂仁白豆蔻加葶澄茄烏藥石菖蒲官桂小茴香

枳殼散治五種積氣二焦痞塞胸膈滿悶背脊引痛心腹膨脹脇肋刺痛飲食不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短氣煩悶常服順氣寬中消痰癖積聚散驚憂患怒

去香附丁香砂仁加枳殼三稜莪朮益智枳櫛官桂乾姜

參附止氣散治虛弱氣不和等疾奇効

去香附厚朴加入參川芎乾姜藿香茯苓黃芪當歸官桂白芷白朮附子半夏

順和湯

十六 順氣和中湯

①治嘔吐翻胃嘈雜吞酸痞悶

噫氣噎膈心腹刺痛惡心吐痰

水

陳鹽水炒 苳 丹 各一分 伽 八分

苓 守 各七分 連 曲 各六分 實

五 分 砂 分 甘 分

右入姜長流水入嬌泥攪勻煎

至七 入瀝姜汁童便不拘時溫

服○氣虛加參芪○血虛加芎

斤○氣惱或氣不舒暢加矮蜜

○胸膈飽悶加葡萄○心下嘈雜

醋心加吳倍連伽○嘔吐不止

加藿用

按順氣和中之劑善治胸痛

退上氣消食積殊以王胸中

有濕熱鬱痰而煩悶嘔吐或

嘈雜吞酸者也○飲酒之人

食油膩物腹痛吐瀉不止去

實加藿永得奇効○夏月胸

痛吐血是氣惱之人故倍連

加蜜而安○小兒七八歲因

咳而面赤痰如線而不絕此

湯二三貼而愈今疑是食積痰乎

婦人送于夫而面赤胸塞

酒新寒熱時妄語有乾嘔加

柴苓而如故。○常飲酒從去
秋呃逆至今春不止且胸痛
痰支不食惡寒今驚水穀不
通而迎予言酒毒而此湯三
四貼得大驗其後依體倦去
實加參而愈。○瘧間日發不
食口苦乾嘔熱多寒少他療
不効加柴苓珍栝二貼而落
○七十餘歲尼飲食俱以卒
吐甚胸痛脉沉細加蕎麥而
得安全。

△友松子曰此方主治多因飲食
不節痰飲停滯因痰生火以致方
下所言諸症用之的當若痰火漸
熾血液俱病者或七情過用脾胃
內虛者當有別治焉不可膠柱鼓
琴。

附方

消食清鬱湯治饕餮悶亂惡心發
熱頭痛。

去白朮砂仁 加山查川芎
麥芽蒼朮藿香

清鬱豁痰湯治噎氣吞酸乃胃中
有熱膈上有痰令人嘔吐清水
等症。

去白朮枳實 加蒼朮川芎
山查木香

保中湯治嘔吐不止飲食不下
去香附神麴枳實加藿香

防風通聖散 十七

①治中風一切風熱大便閉結
小便赤澀頭面生瘡眼目赤痛
或熱極生風舌強口噤或鼻生
紫赤風刺癢疹而為肺風或為
風厲而世呼為大風或腸風而
為痔漏或腸鬱而為諸熱譫妄
驚狂並皆治之

芸 芎 斤 芍 虎 芒
翹 苟 麻 荆 伽 丹
各半 膏 桔 苓 各一 滑
兩 兩 兩 兩 兩 兩

一方土金加藤參守

右入姜煎

氏原方白朮荆芥山

梔 各用二錢五分 右甘 脚一兩二錢五分

方後日嗽加半夏半兩又曰如

服藥不可無生薑同煎 劉廷瑞

方有縮砂無芒硝 賈同知方亦

無芒硝

○白利去芒虎○白汗去

麻○飲酒中風身熱頭痛如破

加葱白○咳嗽喘急加守桔菀

○耳鳴因酒過 一本 加柴枳桔

童星荊○癰疹通治如身疼加

蒼羌○痰嗽加守○一切大風

癰狂加嬰地牡○兩耳聾者厚

味動胃火加酒煨虎○膽移熱

於腦則辛頰鼻淵加苟連○頭

頂偏腫連一日如半壺其脉洪
大此風乘陽明經氣血俱多風
腫去芒虎加姜葱煎服取汗
以艸莖刺鼻中出血其腫立消
○治風熱瘡疥癬久不愈○癢
頭瘡用本方為末酒浸焙乾凡
三次食後白湯調服日三服至
頭有汗効○小兒身常發熱風
斑及脚指紅腫去芒虎加力連
為末服

按此方雖古法用表裡各熱
二焦實火而其實火用黃連

解毒湯腸胃實熱用大承氣

湯風熱症專用此湯○或語

云春夏專用通聖散秋冬專

用五積散是乃時令表裡之

方也批曰乃楊仁齋之刺語也然而專字太執宜刪

之詳詳五○狂亂症解毒湯不

効則用此湯此湯若不効則

備急圓可也○打撲者倍斤

虎加紅沒○疥癬楊梅瘡

良久者用此湯間有驗

△王宇泰曰此表裡氣血藥也治一切風毒積熱瘡腫脉侯弦洪實數浮緊而氣血實盛者不可缺此

若飢饉之後胃氣虛者須當審察
非太滿太實不用○又曰近見有
祕傳外科家方以是方加人參黃
芪蒼朮赤茯苓金銀花名消腫托
裡散如表証多者當從此方以辛
甘爲王散之也裡証多者方可從
變

△潘思敬曰仲景調胃承氣湯後
人一變加連翹梔子黃芩薄荷謂
之涼膈散至河間又一變於涼膈
中加防風川芎歸芍麻黃石膏桔
梗滑石荊芥白朮謂之防風通聖
乃古之復方也

△友松子曰吳山甫曰劉守真氏
長於治火其妙大率在此方也標
齋謂天地之間不可無此方至
者諒得六氣之病機矣是亦可以
曉時師偏於溫補之弊也驗西昌

曰此方表裡通治之輕劑用川芎
當歸芍藥白朮以和血益脾所以
汗不傷表下不傷裡之妙劑也予
因再舉一二醫案以表用藥之法
○杜清碧學道武夷至婺源病腦
疽自治不愈朱丹溪往視之曰何
不服防風通聖散清碧曰已服數
四矣丹溪曰盡以酒製之清碧乃
悟服不盡劑而愈○萬邦字曰太
風病宜分上下氣血治之在上者
以醉仙散取涎血於齒縫中出在
下者以再造散取惡物重積于谷
道中出後用通聖散加減如眉毛
脫落肌膚折裂加苦參天麻蟬蛻
○又按其太黃芒硝麻黃二味對
症旋入者深爲有理也如欲發汗
則去硝黃倍麻黃欲泄下則去麻
黃倍硝黃十變萬化由乎人矣○

龍子才治狂亂本方加桃仁牡丹
生地○孫一奎云嘗治鼻淵以本
方除硝黃其滑石石膏減半倍加
辛夷花先服三五貼而再用此為
丸每服七十九丸早晚白湯服半斤
則愈○楊登父治梅瘡加土茯苓
大劑煎服

附方

通聖菊花丸治目因風熱赤腫隱
澹難開怕見風日矣

加菊花地骨生地

一方加縮藿菊蒼去麻芒

通聖天麻丸治風眼

加天麻菊花熟地

雙解散治解利四時傷寒內外所
傷

即本方合益元散一兩加葱白

十葉豆豉一合生薑半兩水一

碗煎八分溫服一半取吐吐后

服一半稍熱出汗

加減防風通聖散治風疾

去大黃芒硝石膏滑石

加烏藥羌活天麻殭蚕

氣弱加木香痰盛加半夏南星

枳實

辨症雙解散治傷寒溫暑熱病在

表頭眩身熱肢節疼痛邪熱在

餘服此得汗而愈

去當歸大黃芒硝黃芩

加羌活前胡枳殼葱

水一鍾煎至一鍾去查熱服○

汗後身靜內熱去麻黃荊芥羌

活姜葱之類○六七日大腑燥

結入大黃朴硝煎服

仙水通聖散治風熱上壅頭目昏

眩明耳目消痰飲清神氣

去麻黃芩硝加砂仁藿香

菊花蒼朮

烏藥順氣散 因

①治卒中風手足不遂言語蹇

澁四肢骨節疼痛肩膊麻痛筋

脉拘攣及脚氣步履艱辛婦人

血風老人冷氣

麻 蘇 陳 芍 蚕

正 根 桔 各一 永 炮 甘

各半

右入姜棗煎服和劑方後云此方治四時傷寒

○寒熱頭痛加葱白○身體不

能屈伸為末溫酒調下○瘡痒

抓之成瘡薄苛煎湯調下○中

風一身俱麻加參伽斤門芍○

久癱瘓去麻加定芸羌守星蜜

斤○口眼喎斜加連薑羌芸荊

瀝姜汁○遍身痛加斤官乳沒

○臂痛加羌芸官一作圓春苓一作

蘇○背心痛合行氣香蘇散

加蒼守苓○脚膝浮腫加藤搖

佳○腰痛加膝伸曲○眼眩加

細茶細辛細茶一味○四肢冷痺加附

官○婦人血風加芸薹荊○胸

膈脹滿加實莪○虛汗去麻加

芪○潮熱去承加苓○二三年

不能行合獨活寄生湯○拘攣

加瓜蒌○濕氣加蒼朮○心

腹刺痛加面○手足不能起床

加續蕤○陰積浮腫合五積散

○臂痛因風者或乳婦以臂枕

兒傷於風寒而致臂痛者宜此

湯○白虎歷節走注骨節疼痛

加瓜沒蘇方○四肢冷痛加附

官

按卒中風先用八味順氣散

六七貼以順正氣次與此湯

以可順表氣友松子曰卒中風先用八味順

氣之言大似無警刪之可也

卒中醒後因風者易老加減

小續命湯或和劑排風湯氣

滯而風加之者烏藥順氣散

真氣虛而風乘之者薛氏人

參三三生飲其餘類症對症用

○中風口眼喎斜或肩膊

及背麻痺不仁或脚膝痿弱

或言語蹇澁皆宜此湯○臂
痛冷起手甚艱五積散合九
文湯未効則此湯加羌活而
安○乳婦以臂枕兒則其臂
麻痺不仁疼痛若因風者宜
此湯若因寒者宜五積散
濕者蠲痺湯已上二
法詳見圓春之五

△吳山甫曰中風偏身麻痺語言
蹇澁口眼喎斜喉中氣急有痰者
主之此治標之劑也然必邪實初
病人方可用之若氣虛病久者則
勿與也宜以補劑兼之

△龔子才曰治風尤理氣氣順則
痰消除理其氣庶可收効理氣者
氣鬱氣滯肩膊麻痛之類此七情
也本方合八味順氣散加細辛防
風名加味順氣散○張二錫曰病
人昏憤四肢不遂舉世皆以中風
名之殊不知類中者十居八九局
方烏藥順氣散中麻黃白芷乾姜
殭蚕等風藥恐非無外邪者所宜
今增損之一以順氣化痰為主凡
一切氣氣厥氣膈氣痛七氣為患
之仙品即本方去麻黃乾姜白芷
殭蚕甘州加青皮香附半夏前胡
名增減烏藥順氣散有火加涼藥
一二三味隨病出入

△友松子曰凡治中氣之法其火
因七情鬱滯或偏身麻痺肩膊麻
痛或口眼喎斜氣急有痰等症人
壯和實者寧可多進烏藥順氣仍
以酒化蘇合香圓間服為捷若用

補藥反塞氣道致邪滯於經絡綿延不脫者有矣若氣弱人中之者則宜用八味順氣順氣開鬱然石隨症補養是為適中歷觀時醫認得元字脚者孰定八味順氣以為穩當目不識丁者把着烏藥順氣以為經驗總不察其道理一概用藥豈法也耶

附方

大烏藥順氣散治諸風左癱右換疎風化痰順氣神效

本方去麻黃乾姜姜蚕白芷加當歸生地黃白芍藥

紫蘇 香附 砂仁 黃芩 半夏 防風 地龍 乳香 沒藥 沉香

防風至寶湯治中風痰涎壅盛口眼喎斜四肢癱瘓麻木不知痛

痒不能動履身若無骨者
去枳殼桔梗乾姜加當歸
芍藥防風羌活天麻青皮
牛膝黃連南星半夏黃芩
梔子連翹

祛風除濕湯治中風癱瘓筋骨疼痛

去麻黃姜蚕于姜加當歸
赤芍半夏白茯苓蒼朮白朮
黃連黃芩防風羌活

天台散治中風手足癱瘓或疼痛
加防風羌活威靈仙天麻
續斷當歸乳香沒藥麝香

秘傳順氣散治諸風口眼歪斜半身不遂左癱右換遍身腫痛麻

木或成風毒瘡出膿者
加青皮人參白朮茯苓半夏
細辛防風

加味烏藥順氣散治口舌歷節走
注骨節疼痛

加木瓜沒藥蘇木

參合湯治背心一點痛

加茯苓紫蘇羌活香附半夏
蒼朮

加味順氣散

增減烏藥順氣散併見前

八味順氣散 十九

治中風先服此藥以順其氣
次用治風之藥

伽苓 薑 芷 陳 參

參 各二 甘 一

石煎服

濟生方云仍以酒化蘇
合香圓間服有風之人

亦先宜服此
或加星蜜以收

痰氣○或痰盛加守 姜 二 片 ○

氣厥者與中風相似何以別之

風中身溫氣中身冷先以此湯

按有四君子湯補脾胃中氣

藥也芷去手陽明經風痿通

腎胃間氣陳理肺氣童泄肝

氣若風在手陽明而肝肺腎

胃之氣實者專可用之

友松子曰

此嚴氏方劉氏評也然而肝肺腎胃之氣實者可用數字下得成執以予言之謂肝肺腎胃之氣不順者用之則不失中矣又曰但人身經有十二皆能中邪五臟之氣互有勝負此方安能盡其變乎又况真氣先虛之人亦難用此云云此尤

○卒倒不知人事

痰涎壅盛難痰不仁舌強不

語與此湯間求驗

友松子曰用此方治

痰涎壅盛誠有聖焉龐安常有謂人身無倒上之痰天下無逆流之水故善治痰者不治痰而治氣氣順則一身之津液亦隨氣而順矣用此方以治痰宜加茶葉功勝導痰化痰諸湯

○卒中風醒後七

氣拂鬱而手足厥或癱瘓痺

痛者亦間得奇効○或語云

一切鬱病氣弱者妙也又云

諸病共有少眩暈者用之

△嚴用和曰人之元氣強壯榮衛

和平腠理緻密外邪焉能為害或

因七情飲食勞役致真氣先虛榮

衛空疎邪乘虛而入故致此疾若

內因七情而得者法當調氣不當

治風外因六淫而得者亦當先調

氣後依所感六氣治之此良法也

宜本方主之

△吳山甫曰中風正氣虛痰涎壅

盛者宜此方主之○人參白朮茯苓

甘卿四君子湯也經曰邪之所湊

其氣必虛故用四君子以補氣治

痰之法利氣為先故用青皮白芷
合烏陳皮以順氣氣順則痰行而
無壅滯之患矣此標本兼施之法
也

附方

人參順氣散治感風頭痛鼻塞聲

重及一應中風服此藥疎通氣

道然後進風藥

去青皮烏藥茯苓 加乾姜

川芎 桔梗 厚朴 麻黃 葛根

勻氣散治心脾疼

加沉香羌活紫蘇半夏天麻

木香木瓜

○予以此藥治虛人喘氣其効
尤著

順風勻氣散中風中氣半身不遂

口眼喎斜先服此云詳後

去陳皮茯苓 加天麻沉香

紫蘇木瓜

加味順氣散治風先理氣氣順則

痰消徐理其風庶可收効理氣

者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此

七情也

人參 白朮 去油 白茯苓 去

半夏 姜汁 青皮 去穢 陳皮

川芎 白芷 枳殼 去穢 桔梗

烏藥 細辛 防風 姜蚕 炒

乾姜 麻黃 甘艸

右剉生姜三片棗一枚水煎服

按右方治中風諸病并遍身手

足疼痛麻木者宜之

導痰湯 三十一

①治風濕痰一切痰涎壅盛或胸膈留飲痰塞不通

守 四 星 實 苓 陳 各

甘 半 夕

右入姜煎服○如久嗽肺燥熱

去守加會 九 杏 五 ○憎寒壯熱

頭目昏沉迷悶上氣喘急口出

涎沫證類傷寒此因七情內傷

以致痰迷心竅神不守舍狀如

鬼祟加連婁桔苓參伽 各 一 入

姜棗煎加瀝姜汁服各之清熱

導痰湯○按清熱導痰湯痰迷

心竅不省人事一服立省真神

方也○一方清熱導痰湯去棗

半減參加芥蜜 各 五 名加減導

痰湯治中風痰涎壅盛不能言

語牙關緊急有熱者也

按卒中風先此湯或八味順

氣散烏藥順氣散選用而後

尋治經絡臟腑左右之方而

當療○咳嗽喘急咯吐不成

加桑軼而安

△友松子曰嚴氏云人之氣道貴

乎順順則津液流通決無痰飲之患古方治飲用升下溫利之法愚見不若以順氣爲先分導次之氣順則津液流通痰飲運下自小便中出矣予嘗用此法治七情相干氣滯生涎聚爲痰飲者即用本方或加烏藥香附沉香木香以順氣或加參朮以培脾或加苓連以清熱或加澤瀉白朮以滲之或加桂枝白朮以行之或加桔梗防風以提之或加枯薑麥門以潤之其餘痰症因於氣生於濕者多主之以增損

附方

清心導痰湯啓迪翁治因痰火症頭重足輕頭目眩暈項痛胸痞脈實數者加羌活獨活黃連天麻黃芩

梔子當歸

順氣導痰湯嚴武治論見本篇

加烏藥藥香附木香沉香

苓連導痰湯治痰火

加黃芩黃連

祛風導痰湯治風痰爲患頭目眩暈者

加羌活

防風黃芩蒼朮

滌痰湯治痰迷心竅精神恍惚或

語言蹇澀

加苓連遠志石菖礞仁竹瀝

姜汁

寧神導痰湯治中風痰迷心竅舌

強不能言

加木香人參菖蒲

簡易葉氏分涎方治風痰留滯膈

間喘滿惡心涎唾不利

本方去茯苓甘艸加棟參

苦梗

良方驅痰飲子治痰飲頭痛背痛飲食嘔惡皆痰飲之證

去枳實甘艸加青皮艸菓

加味導痰湯治內傷七情致痰迷心竅神不守舍狀如鬼祟憎寒壯熱頭痛上氣喘息口出涎沫等症若作傷寒用藥則誤矣加白朮桔梗人參瓜蒌黃芩黃連大棗入竹瀝姜汁溫服

止麻消痰飲治口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心並遍身麻木本方枳實換和枳殼加黃連瓜蒌仁黃芩桔梗天麻細辛

血虛加當歸○氣虛加參○亦有十指麻木胃中濕痰死血加一二朮矣

軾降氣

三蘇子降氣湯也

①治虛陽上攻上盛下虛痰涎壅盛

軾守各五桂陳各二斤

西朴甘各二

右入姜棗煎服○治虛陽上攻

喘促咳嗽○治鼻衄不止

按治虛陽上攻喘促咳嗽足冷者若足不冷者無十分之功○水腫脹滿痰喘氣急欲絕者間與此湯得奇効若雖得奇而心體困乏者不治也

△按準繩有川芎沉香無肉桂若虛冷人加肉桂黃芪若因風痰蓄熱去肉桂加南星若加川芎細辛茯苓桔梗名大降氣湯

○楊氏曰治腳氣通用之方○王氏治咳嗽短氣虛喘加入參五味杏仁鹽梅紅棗○友松子治虛陽上攻致鼻衄者加茅花耳鳴者加蟬退○胸膈痛多因積冷與痰氣而成五膈寬中之類若膈痛氣上急者此方去前胡加木香○勞力太過吐血不止加入參阿膠

附方

小降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

紫蘇 烏藥 白芍藥 陳皮 甘艸 右咀姜煎食遠服

大降氣湯治上盛下虛膈壅痰實喘嗽咽乾不利

本方加川芎細辛桔梗 白茯苓

紫蘇子湯治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脈虛緊而滿

去肉桂前胡加大腹皮枳實木香木通白朮枳實人參

俞山人降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅痰實喘滿咽膈不利煩渴引飲頭目昏眩腰脚無力四肢倦怠咳嗽兼治風濕脚氣

紫蘇子

微炒

前胡

去蘆

厚朴

去蘆皮

薑汁浸

炒香半夏麴

炙

甘肅

炙

橘皮

白

去

五加皮

薑汁

當歸

洗去

桂心

不見

炮

黃耆

去蘆

人參

去蘆

附子

去

炮

皮桔梗

各

卷括

乾薑

各用

半兩

右爲麤末每服二錢水煎一盞

半紫蘇三葉生薑二片棗子一

枚同煎七分去滓食後服

蘇子降氣湯治男女虛陽上攻氣

不升降上盛下虛膈壅痰多咽

喉不利欬嗽虛煩引飲頭目昏

眩腰疼脚弱肢體倦怠腹肚疴

刺冷熱氣瀉大便風秘澀滯不

通肢體浮腫有妨飲食

川當歸

去蘆

甘肅

炙

厚朴

去蘆皮

前

胡

去蘆

各

陳皮

去

肉桂

去

各二兩

紫蘇子

半

夏麴

各五

兩

右爲細末每服二大錢水一盞

半入生薑二片棗子一枚蘇五

葉同煎至八分去滓熱服不拘

時候常服清神順氣和五臟任

滯氣進飲食去濕氣產出者爲

秘傳降氣湯治男子婦人上熱下

虛之疾凡飲食過度致傷脾胃

酒色無節耗損腎元水土交攻

致陰陽關隔遂使氣不升降上

熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈

不快咽喉乾燥飲食無味下弱

則腰脚無力大便秘澀裏急後

重膈腹冷痛治以涼則脾氣怯

弱腸鳴下利治以溫則上焦壅

熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不差宜先服此藥却以所王藥治之無不効者

五加皮 骨碎補 地骨 桔梗 訶子 半夏 艸菓 枳殼 柴胡 陳皮 甘艸 桑白皮

石爲麝散每服一錢紫蘇三葉 生姜二片水一盞同煎食後服

小續命湯

【臣】

①治平暴中風不省人事半身

不遂口眼喎斜手足顫掉語言

寒澁肢體麻痺精神昏亂頭目

眩暈痰涎壅盛筋脉拘攣不得

轉側及脚氣緩弱不能動履屈

伸諸風服之皆驗東垣曰中風

自汗者不可重發其汗故此藥

亦不可輕用也按此方出自千金方

芸一匁 麻 離 桂 苓

杏 芍 芎 參各一匁 附

甘各半匁

右入姜棗煎服

按唐天氏曰金匱本方有石膏

當歸無附子防風防已按本方石膏當歸固不可無而附子防風防已尤不可缺此恐傳寫者之脫簡矣予常合金匱和劑之

藥而併用其効尤著○又按玉機云古今錄驗有白朮無杏仁○急救無川芎杏仁只十味○延年無防風○機要春夏加石膏知母秋冬加桂附○精神恍

惚加神速○骨節痛有熱倍芍

去附○心煩驚悸加犀角○

骨節痛有寒濕倍加桂附○嘔

逆腹脹倍參加守○燥悶大便

澀去附倍芍入瀝○臟寒下痢

去離苓倍附加朮○自汗去麻

杏加朮○脚膝弱加膝解○身

疼加朮羌活○腰痛加嬰仲○

失音倍杏○易老云內經云開而閉須知暴中風邪也宜先

以加減續命湯隨症治之

風無汗惡寒麻黃續命湯主之加倍麻

芸杏○中風有汗惡風桂枝續命湯主之

倍加枝芍杏已上一症皆太陽經中風也

○中風身熱無汗不惡寒白虎續命湯主之

加雷膏倍甘去附易老無去附之

○中風身熱有汗惡風加葛

桂枝已上一症陽明經中風也○中風無

汗身涼附子續命湯主之倍加附甘加

承此症大陰經中風也○中風有汗無熱

桂枝續命湯主之倍加桂枝附甘此症少陰

經中風也

○中風六經混淆係之少陽厥陰肢節

變痛

麻

不仁

羌活連翹續命湯主之

加羌

翹

原用小續命八分羌羌活四分連翹五枚

治剛

柔

一症之通用也○產後中風

脚氣最爲要藥然手足搐搦者

當去附

按不可用多汗者大抵身冷

或四肢厥冷而拘急不仁者

宜○一婦一千餘歲產後三

十有奇日腰足冷腹痛甚膝

屈不伸脉沉遲加附得奇妙

△虞天民曰先哲製小續命湯以

治中風初病無汗及手足癱瘓關

節不利表實等症此急則治標之

藥也後人不分表裡虛實通用以

治中風之証故張易水授東垣以

加減之法夫中風無汗表實者固

宜有汗表虛之証雖有加減之法

恐不可以膠柱鼓瑟也

△王宇泰曰治風之法解表攻裡

行中道二法盡矣然不可執也如

小續命湯亦麻黃桂枝之變麻黃

桂枝若不施於冬月卽病之傷寒

而施於溫熱之症未有不殺人者

其可執乎

△友松子曰張三錫曰病人昏憤

四肢不遂舉世皆以中風名之殊

不知類中者十居八九云云此誠

風家之司命醫門之教誡也學者

其可不審虛實真假而施通使之

法乎嗟醫難言也張介賓所謂風

病類証最多倘不能察其表裡又

不能辨其虛實。但以風之爲名。多用風藥。不知風藥皆燥。燥復傷陰。風藥皆散。散復傷氣。以內傷作外感。以不足爲有餘。是促人之死也。醫者臨機。用此等方。務要小心。
△批曰。以此方通治剛柔。一症。吾又未能信也。設使症因風濕而患。項強。掣頭。口噤。身反張者。用此方。亦必有加減焉。所以然者。發熱無汗。反惡寒者。名曰剛症。宜去桂。增麻黃。若發熱汗出。而不惡寒者。名曰柔症。宜去麻黃。增桂。此效仲景麻黃桂枝之法也。然而症非只一端。學者臨病。務要博考。
△批曰。產後中風。最爲要藥。數字恐爲未然。設使產後真中風邪。只以華陀愈風散等方。微微汗之。可也。丹溪云。產後中風。口眼喎斜。必用大補氣血。然後治痰。當以左右手脉。分其氣血多少。以治切。不可作中風治。用小續命及發表治風之藥。王宇泰云。產後中風。若不得已。用小續命及羌活等發散之藥。必詳氣血。以四物四君子相與各半。停對分兩服之。可也。

附方

續命煮散。獨活續命湯也。治中風。不省人事。漸覺半身不遂。

加獨活全蝎白花蛇。

千金大續命湯。治中風脉緊滑卒。

然瘖啞及偏枯賊風。

無人參防已。有石膏當歸。

荆瀝。

錄驗續命湯。治中風痺身不收口。

不能言。冒昧不知痛處。拘急不能轉側。○劉宗厚曰。治太陽外。

感風邪之藥然外感挾寒者多
故用桂枝等輩千金等方所收
此類之藥甚多無分經絡不辨
虛實寒熱所謂雖多亦奚以為
易老分六經庶乎活法也
卽本方無防風防已附子
有當歸石膏

千金方名西州續命湯

醫林續命煮散治風氣留滯心中
昏愊四肢無力口眼瞶動或時
搖擗

去麻黃防已黃芩杏仁附子

加獨活當歸遠志葛根熟地
細辛荊芥半夏

大全八寶回春湯治因風痰脈絡

拘急痰涎壅盛飲食不進

去防風杏仁加黃芪白朮

半夏生地熟地烏藥干姜

當歸茯神陳皮沉香川烏

加減大續命湯治入風經臟奄忽

不能言四肢垂曳皮肉痛癢不

自知

獨活麻黃各二兩芎藭防風

當歸葛根生薑桂心

茯苓附子細辛甘艸各一兩

右十二味咬咀以水一斗

二升煮取四升分五服老小半

之矣

大秦朮湯 三

①治中風手足不遂舌強不能言用之養血則筋自榮

朮 羌 活 獨 活 桂 枝 芍 藥

膏 芩 薤 白 芩 芍 藥 各二

苓 一 芎 細 甘 各半

右煎服○天陰雨加生姜○春

夏加雷○心下痞滿加實

○治血弱陰虛不能養筋筋燥

而手足不能運動指爪乾燥屬

風熱甚者

②按此方榮血養筋故脉浮

大數而四肢麻木肌肉瞤動

則二歲內當發中風是其為

養生專用也若脉微細者回

春養榮湯可也○俄手足痿

腰不立舌軟不能言者不分

左右專用之也

宜觀天民
西日之論

△機要曰中風外無六經之形証

內無便溺之阻隔知血弱不能養

筋故手足不能運動舌強不能言

語宜養血而筋自榮此方主之

△友松子按通真子方有當歸共
一十六味才成養血之功天民所
謂無內外証當從乎中治宜養血

通氣宜本方或羌活愈風湯之類
然而血弱者加倍四物氣虛者合
四君黃芪有痰者合二陳又當察
病機審氣宜全在活法度其權量
可也

公天民曰此方用羌歸芍藥地黃
以補血養筋甚得體既曰外無六
經之形証但當以用羌活秦艽引
用以利關節其防風獨活細辛白
芷石膏等藥恐太燥而耗血雖用
川芎只可六分之一尤宜加竹瀝
姜汁同制最好連者詳之

△喻西昌曰此方既云養血而筋
自榮何得多用風燥之藥既欲靜
以養血何復用風以動之是其方
與言悖矣業醫者當深入理要具
隻眼可矣○丹溪纂要云用此方
必的係風邪所中有外感而無內
傷者斯可不則不可輕用

附方

愈風湯

治論見圓
春中風門

去熟地川芎茯苓

加蔓荊枳殼人參知母梅杞

柴胡甘菊麻黃黃芪地骨

桂枝薄荷杜仲蒼朮

共二十六味

機要羌活愈風湯治中風內外無

邪服此藥以行中道及治風濕

內弱風熱體重或瘦而肢體遍

枯或肥而半身不遂

前愈風湯合大秦艽湯

再加前胡厚朴防已半夏

共三十三味

羅仙羌活愈風湯治腎肝虛筋骨

弱語言難精神昏憤

去白朮芎加黃芪人參

蔓荊子枳殼黃連地骨皮知母
甘菊麻黃薄荷枸杞當歸杜
仲柴胡半夏厚朴防己蒼朮
肉桂前胡

秦艽飲治五疸口淡耳鳴脚弱發
寒熱小便白濁

去羌活獨活白芷石膏黃芩
生地黃細辛 加當歸官桂
陳皮小艸半夏

參伍秦艽湯痛風腰背手足肢節
疼痛血虛氣弱經絡結澁寒滯
而然也午後夜甚者血弱陰虛
午前早上甚者氣滯陽弱痛甚
者乃曰白虎歷節風走注風膝
大脛痠曰鶴膝風是也

去白芷白朮茯苓石膏細辛
加當歸天麻蒼朮車釐五加皮
黑狗脊黃連黃柏紅花黃芪
人參牛膝杜仲

大防風湯

因

①去風順氣活血壯筋又治痢

後脚弱緩痛不能行履名曰痢

風或兩脚腫痛足脛枯腊名曰

鶴膝風一切麻痺痿軟風濕挾

虛之候服之其効如神

用藥
眼目

伽一匁 芎各一匁 芎各一匁 附各七分半

芍各一匁 仲各一匁 芎各一匁 附各七分半

羌各一匁 參各一匁 膝各一匁 甘各一匁

右入姜棗煎服

按治痿痺之聖藥也此方可

治不足之痿弱不可用有餘

之風痺前方有膏此方有附

當著於心一方也○腰不立

身痺痛或刺後鶴膝風專用

之而可也

△虞天民曰此方用歸芎芍藥熟地而補血用參芪白朮甘艸以補氣用羌活防風散風濕以利關節用牛膝杜仲以補腰膝用附以行參芪之氣而走周身脉絡蓋治氣血兩虛挾風濕以成痿痺不能行者之聖藥也觀其治刺後風可知也然可以治不足之痿弱而不可以治有餘之風痺也

附方

加味防風湯治左右手足皆癱瘓

本方加木香烏藥木瓜獨活

薏苡仁肉桂

三痺湯治男婦血氣凝滯手足拘

攣風痺氣痺等症當與第二

十九方獨活寄生湯參看

去附子白朮熟地易生地

羌活易獨活加續斷肉桂

細辛茯苓秦艸

圓春加味十全大補湯治左右手足皆癱瘓者此血氣之太虛也

愚按龔氏此方雖托名十全大補實出於大防風湯也何則只此方中去川芎一味而加獨活木瓜苡仁烏藥沉香木香肉桂等七味其用之者宜詳諸

一防飲治痢後感寒濕脚膝腫痛名鶴膝風

加防已革薺

加減除濕湯 三十五

①治右半身不遂手足癱瘓筋

骨疼痛

加一分 苓 斤 赤芍 陳

守 蒼 連 苓 枳 枳

羌 各一分 芷 參 芎 桔

芸 甘 各八分

右入姜煎服○身痛加姜黃○

足痛加膝離威

按治氣虛與濕痰兼以久手

足癱瘓者也予連年試此方

一應癱瘓不相應矣久字專

要也次方亦然批曰此方乃龔子才就丹

溪翁之東南之人皆是濕土生痰痰生熱熱生風也中風大率主氣虛有痰或挾火與濕之言而製作也若是此等類中用之決効若他症之癱瘓用之不相應豈待言哉久

字專要數字大非
醫家之言故刪之

△王金壇曰丹溪云大率多痰在
左挾死血與無血在右挾氣虛與
痰亦是無本杜撰之談不必拘之
偏枯之症未有不因直氣不周而
病者也故治療之方不用黃芪為
君人參當歸芍藥為臣防風桂枝
鉤藤竹瀝荊瀝姜汁韭汁葛汁梨
汁乳汁之屬為之佐使而雜香乎
烏附羌獨之屬以涸榮而耗衛如
此死者醫殺之也○友松子曰此
丹溪已後之法言誠彥脩之忠臣
也若曰以左右分血氣陰陽則言
醫者無不喃喃豈金壇之不及此
乎哉

附方

五論湯治中風之妙劑也

括云風火氣濕虛五論探玄微
下方皆可療增損始為奇增損
之法詳于濟世全書

本方去蒼朮烏藥枳殼白芷
桔梗 加生地熟地天麻獨
活黃柏南星

臨服入竹瀝姜汁

加減潤燥湯 國

①治左半身不遂手足癱瘓呵

欠嚏噴口眼喎斜頭目眩暈痰

火熾盛筋骨時痛心悸頭痛

芍 二斤 一匁 芎 一匁 伽 苓

星守各一陳鹽各一地芋

酸冷各八膠各八卷嬰

芸桂各六紅甘各四

酒三定一

右水煎入瀝姜汁服○手不遂

倍加芩桂○足不遂倍加栝膠

按治因血虛與瘀血而久手

足癱瘓者也若久左右手足

皆癱瘓者血氣兩虛宜加味

十全大補湯方在

△王宇泰曰此乃原於血虛血熱

挾痰挾火經絡肌膚之間先以有

其病根後因感冒風寒或過嗜醇

酒膏粱而助痰火或惱怒而逆肝

氣遂有此半身不遂之症其在於

經絡肌表筋骨之間尚未入藏府

並以此方治之

△友松子曰此方又就丹溪之中

風在左半身不遂者屬死血與無

血宜四物湯加桃仁紅花竹瀝姜

汁之言而盡蛇添足其成一干一

味也醫鑑號愈風潤燥湯言孫尚

書之傳回春表此一方一曰除濕

一曰潤燥則可知非為中風邪之

附方

愈風潤燥湯孫尚書方治半身不

遂手足欠利，語言費力，呵欠噴嚏，面目口眼喎斜，寬弛，頭目眩暈，痰火熾盛，筋骨時疼，頭或痛，心腫。

川芎、當歸、生地黃、熟地黃、紅花、牛膝、南星、羌活、天麻、防風、半夏、橘紅、白茯苓、黃芩、桂枝、白朮、甘草、神酸、棗仁、白芍、藥黃、栝。

右剉水煎入竹瀝薑汁溫服。

勻氣散 〔七〕

①治腰腿疼，手足不能屈伸，半身不遂，口眼喎斜，風氣中風，中氣用風藥而十無一愈，即服之見効。

伽倭 各一
參 各一
定 各一
參 各一
泉 各一

芷 童 各五
甘 各五
蘇 瓜 各三
分

右入姜棗煎服。○心脾疼加苓。

守 各一
陳蜜羌 各一
入姜煎服。
醫林治心脾痛，之勻氣散也。 半日効。

按中風症風藥不効，則此湯合。陳湯數得奇効。又腰腿痛者，亦得尚可，有加減消息。

也

△俞嘉言曰：勻氣之說甚長。身內之氣有通無塞，外風自不能久居而易於解散。故知勻氣即調氣之旨，非有兩也。取其方以治口眼喎斜之右急左緩者，然倍用生熟甘艸，加苡仁以緩其急，加麥冬、歲蕤、竹瀝以熄其風，又得効方。去白芷、蘇葉可常服也。

△按氣道不順以致半身不遂者，宜用醫林集要勻氣散風氣腰痛亦宜治。虛人、疝氣亦有良驗。

附方

醫林勻氣散：凡傷重先下此藥，調氣然後服損藥。

茴香 青皮 厚朴 白芷
烏藥 杏仁 陳皮 麥蘗
前胡 桔梗 蒼朮 粉朮

右爲粗末，姜棗煎服。

消氣散：治血氣凝滯、心脾不和、腹急中滿、四肢浮腫、飲食無味、小便不清。

去白朮 烏藥 白芷 天麻 木瓜
甘艸 加木香 半夏 桔梗
陳皮 茯苓 艸蓂腹皮

減味勻氣散：治氣道不順致手足難以屈伸、口眼喎斜等症。此乃中氣之候，不可用風藥，去白芷、紫蘇。

疎經活血湯 〔天〕

①治遍身走痛如刺、手足痛尤

甚左屬血多因酒色損傷筋脉
空虛被風寒濕熱感於內熱包
於寒則痛傷筋絡是以晝輕夜
重且以疎經活血行濕此非白
虎歷節風也

涂レ沂一分一分一地一分一蒼一分一膠一

陳一嬰一歲一游一分一苓一分一

芎一離一卷一芸一芷一分一各一六一

甘一分一四一

右入姜煎服○痰加星守一分一各一一一

○上身及臂痛加桂一分一○下身

並足痛加瓜通栢屋一分一各一一一○氣

虛加參伽板一分一各一七一○血虛倍四

物湯加紅一分一

按治痛風屬血虛者故遍身

走痛日輕夜重○懷妊婦人

潮熱咳嗽吐痰盜汗肩足注

痛脉細數滋陰降火湯不効

故此湯去膝嬰得奇効○傷

酒食邪乘經絡虛為痛風與

此湯而安○中風之人周身

或手足痛用上下加味而得

奇驗

△按此方去羌活靈仙防風防已

四味即汪石山醫學原理加味四
物湯也治血為風熱所觸而作痛
風者如痛在上重在風宜加羌活
桂枝威靈仙○如痛在下重在濕
倍牛膝加防已不通黃柏○若氣
虛加入參黃芪白朮○血虛倍歸
芍加紅花○如有痰加南星半夏
生姜○學者用藥當從其源勿逐
其流可也況夫羌活靈仙防風防
已俱是猛峻風藥耗人元氣虧人
精血其血因酒色損傷筋脉空虛
之際可妄用乎必不得已則就加
味四物之上下氣血之加減甚為
的當若肝血虛腎精竭而左足痛
甚晝輕夜重之病峻補猶恐不及
豈可以疎經活血言哉

獨活寄生湯

三五

①治腎氣虛弱冷臥濕地腰背
拘急筋攣骨痛當風取涼過度
風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩
弱疼痛牽引脚重行步難艱並
白虎歷節風痛○中濕而偏枯
冷痺者腎氣虛也

搖寄如無膝仲代續朮

細桂芎芩苓參

斤芩芸各等分甘減半

右入姜煎空心服○夫腰背痛
皆由腎氣虛弱臥冷濕地當風

得之不速治喜流脚膝為偏枯
冷痺緩弱疼痛或腰痛攣脚重
痺宜急服此○治肝腎虛風濕
內攻兩脛緩縱攣痛痺弱不仁
足膝攣重又治白虎歷節風神
効

是腰痛之王方也按因虛而
為中濕脚氣痛風腰痛此之
四症並治兼以癱瘓中風亦

取驗

△孫思邈曰夫腰背痛者皆由腎
氣虛弱臥冷濕地當風得之不時
速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩

弱疼痛或腰痛攣脚痺痺宜急服
此方又曰新產竟或患腰痛不得
轉動及脚腰攣痛不得屈伸痺弱
者宜服此湯除風消濕若風虛下
利者除生地黃三因作氣虛
下利去地黃

△陳良甫曰治足三陰虛風濕所
侵脚膝歷節作痛此方加續斷共
十六味

△肘後有附子一枚無寄生人參
當歸甘艸

△赤水無芍藥有續斷

△李南豐曰一方有附子如歷節
風并脚氣加乳香沒藥酒糊為丸
服

△王肯堂曰風傷腎而腰痛其脉
必帶浮或左或右痛無常處牽引
兩足宜五積散加防風全蝎或獨
活寄生湯又治風濕腰痛

△張二錫曰治肝腎虛弱感冒風濕致濕痺兩足緩縱軟弱不仁
△徐氏曰遇天陰則腰痛或久坐而痛者濕也宜此方
△陳無擇曰近人將治歷節風并脚氣流注甚効

附方

辨疑羌活續斷湯治脾腎氣虛涉水臥濕汗冷成痺濕流經絡風濕偏枯腰膝疼痛脚重行步不順

本方去獨活桑寄生

加羌活白芷續斷

三痺湯治男婦血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾
去桑寄生加續斷黃芪棗

肘後獨活湯治歷節風并脚氣流

注甚有効

有附子無寄生人參甘艸

當歸

又方治一切遍身骨節疼痛或流注作痛不可忍
者

去寄生牛膝杜仲秦艸細辛

桂

加羌活天麻南星陳皮黃芩

又方一男子兩胯痛不可忍
者臨

川徐擴吾試効

本方去細辛川芎芍藥茯苓

防風甘艸加黃芪蒼朮小

茴木瓜

右爲細末酒打麪糊爲丸服

經驗加味獨活湯治腎氣虛寒以

致腰腹痠痛不能走動或腿股冷痺等症其効尤著

加延胡茴香附子

清濕化痰湯 三十

①治周身四肢骨節走注疼痛
牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶
或作腫塊痛難轉側或四肢麻
痺不仁或背脊心一點如冰冷脉
滑乃是濕痰流注經絡關節不
利故也

星田 陳苓 蒼朮
冷芷 附子 蜜
甘 二分

右煎入瀝姜汁服○頭頂痛加
芎藭○手臂痛加枝○脚痛加

膝柏離游瓜○骨體痛甚及有
腫塊作痛者名曰痰塊加乳沒
硝海石

按治遍身走痛屬濕痰者故
因痰而咳嗽或脇痛或肩痛
或胸痛皆治○一男有咳嗽
而背脊心一點如冰冷與此湯
得平効

△友松子曰汪石山云痰本人之
津液由榮衛不清凝結而成在左
同肥氣在右同息貫入肺則咳流
大腸則瀉入腎為湧水在上則面
浮在下則跗腫在中則肢滿痞膈
隔於經隧則偏枯塞於肉分則麻

木不仁在經絡中則胸背臂膝作痛蓋痰之為物隨氣升降無處不到故也今日濕痰流注經絡周身骨節疼痛用丹溪上下手足加減似有理焉如丹溪又曰驚痰則心胞痛飲痰則成脇痛四肢不舉冷痰則骨痺氣刺痛氣痰則攻注走不定如斯之類雖云是痰曰驚曰飲曰冷曰氣俱能作痛其可以清濕化痰一方而能周濟乎學者臨症審察勿陷偏門

清心抑膽湯 三

①治癩屬氣血虛而兼痰火者平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癩之疾

浙 芎 伽 苓 陳 守

實 苴 連 苳 各一

門 芎 參 遠 各六 甘 四

右入姜煎服

按氣血虛而痰火上心胸故為眩暈為癩狂此方王之一百不如心故言間真偽同人而高聲語或忿怒或罵詈與此湯得數奇○產後血暈心悸多汗熱甚言語錯亂日見

不實與此湯而安

余友松子曰此方醫鑑稱清心溫
膽湯雲林之製也乃合集驗之清
神千金之溫膽金匱之門冬得効
之定志御藥院之八珍等數方而
作此一方也治癰之法須分陰陽
二症丹溪謂大率先當祛痰順氣
清火平肝而以黃連瓜蒌南星半
夏之類尋火尋痰分多分少治之
有熱者以涼藥清其心有痰者必
用吐法吐後用東垣安神丸及平
肝之藥青黛柴胡川芎之類此治
陽癰之法也陰癰亦本於痰熱所
作醫以寒涼攻下太過損傷脾胃
變而損陰宜用溫平補劑及治痰
之藥此方是也學者宜采之
公華陽軒曰此方又治男子婦女
思想無窮所願不遂夢遺精滑夜
不安眠或怔忡健忘驚悸暗風狂
妄等症挾痰火者用之

附方

加減溫膽湯主治痰燥者痰火作
熱煩燥也痰詰者痰火作熱驚
惕不安錯語失神也痰迷心竅
神不守舍因憂思鬱結驚恐傷
心心不自安神出舍冥工使人煩
亂悲歌叫罵奔走不識人也
已上三條俱宜此方
去川芎芍藥遠志菖蒲香附
而茯苓易茯神加山梔辰砂
酸棗仁
入棗烏梅煎服再入竹瀝

沉香天麻湯 三

①治因恐懼發癰病搐搦痰涎
有聲目多眵睛強項背一時許
脉沉微而急方醒後每見皂衣
人即發多服犀牛腦麝鎮墜之
藥已四年餘此證尚在又添行
步動作神思如痴先灸兩躡各
一七壯次服此藥

羌 五 搖 四 定 芸 守 附
各二 沉 益 川 烏 各二 斤
蚕 甘 各一
各半

右入姜煎服

②救癰癰壞證之劑 此說杜撰不可

信也詳

于後 ○一人足厥冷則有

小腹差上心胸物怔忡或膈
塞而心中沉困煩悶如欲絕
或食遲則無力生眩暈心如
乘舟車久與此湯而安○男
子下血或痢婦人產後脫血
多失血後有此證四物湯不
効則與此湯而可若蟲出加
練棋

△嚴用和曰小兒神氣尚弱因而
被驚神志無依又動於肝肝主筋
故癰膜筋攣肝脉小急經云恐則

氣下精怯而上焦閉以羌活獨活
苦溫引氣上行又入太陽爲引用
故以爲君天麻防風辛溫以散之
當歸甘艸辛甘溫以補氣血之不
足又養胃氣故以爲臣附子川烏
益智太辛溫行陽退陰又治客寒
傷胃腎主五液入脾爲涎以生姜
半夏燥濕化痰沉香辛溫體重氣
清主怯安神故以爲佐

△友松子曰劉宗厚曰此方用太
熱之藥乃從權以救前治之失非
常治之道也歷觀今時醫流纔看
癰症不管陰陽虛實便投此方蓋
不可知其何意也學者不可陷入
於死地以喪已之陰德

△又曰予蚤年學業師用此方有
加枳實南星茯苓芩連梔子木品
予問其所以答曰乃啓迪翁之法

也沉香天麻湯治風痰清心導痰
湯治痰火若風痰兼火而關熱者
合一方以投之此用權之法也

△按癰證本從熱治然亦有壞證
而成陰者如錢仲陽所治王氏子
吐瀉諸醫藥下之至虛變慢驚手
足痙攣而身冷醫復與八正散錢
曰不能食而胃中虛若利大小便
卽死久則脾腎俱虛當身冷而閉
目必用益黃散史君子丸補脾遂
能飲食後又不語錢以地黃丸補
腎一月而安由此觀之癰疾旣成
壞証豈復用一活防風殭蚕之類
而疎散其真氣者哉

清心化痰湯 三

①治精神不守喜笑不常言語錯亂サクレシニホリニミ妄見妄言ニイヒノホリ登高罵詈ヒメリスラ

星守 陳苓連 沂

地芎 參 酸ササ 菖セウ 各一タ

甘二分

右入姜煎服

②按治一切癲疾之主方也

△按雲林曰癲者喜笑不常而癲倒錯亂之謂也故心熱甚則多喜而為癲也癲為心血不足治以安神養血兼降痰火此方主之若心經蓄熱發作不常或時煩燥鼻眼覺有熱氣者清心湯加石菖蒲清

湯即涼膈散加黃連麥門

△友松子曰治癲之法豈止一端

執此一方以為治一切癲疾之主方者實局人之臆見也何則若上實者從高抑之在上者因而越之陽明實則脈伏或長而大宜下之鬱者發之虛者補之使陰陽均平則病瘳矣醫而不知此把住清心化痰一方而為治一切癲疾之主方者乃誤甚也此言雖出龔氏之筆然而龔氏亦何曾拘于一方而耳其所編之書中多載各方治法者是也學者宜觀其書而後可以立言矣

衆方規矩刪補卷之中

終

