

長沙證文

紙  
339



門  
武  
399  
卷



長沙證彙序

方法皆本也。古今無有  
異議焉。但唐宋以還名  
家方治方彙。陸續鄭  
重。豈翅亦不之也乎。怪  
乎。由漢以子。周秦庶皆  
之道。史傳以哉。屢之乎。  
其方生保。後也安得廣  
施之。人邪。續有仲系  
氏造論。傷言金道二

長沙證彙

書。而見之而已。今閱此冊。分分。皆立病門。了照彼二書。錄各方於其下。錯綜銓次。深造其理。因家曰。長沙謬。漢子人。所以垂後。今人所以後古。乃本立道生。是作者微肯也。作者分播如暈浦。去。田中原仲。予素不解方伎。然逢燕。此人

為好古之名。而莫能回方之士。故附一辭云。

實政三年辛亥十月穀旦

浪華後學

播州 奧田元繼識



鎌田禎書





方則人巧既加。而切用  
自異。雖志于一。兼之能  
不審。方法之意。得其切  
也難矣。世之庸醫。當不  
留意於茲。頑守為經。後  
投藥劑。其驗不見。則為  
方之咎。屬稱之治。醫於  
射。志射而不中。反修於  
靶也。何切之有哉。夫欲  
為高醫者。不可不先達

長沙正經證彙序


夫仲景氏方論。悉古之遺訓。而  
對證奏効焉。後之業醫者。亦莫  
不講焉。然其文高古。往往意在  
文外。得其旨趣。最難矣。且雜之  
以陰陽傳經脈說。或曰補。曰能。  
曰寒熱。相協成說。是皆古疾醫  
所不論。大失經義矣。遂使後人  
不知古之方方。各有妙而存者。  
二千有餘年矣。舉世莫能覺悟  
焉。方今

國運隆盛。醫亦益造其道。然多  
拘因名。而隨證案方者。特鈔矣。  
間有知之者。亦不察依證之淺

深緩急而方亦異焉。余深以為憂。於是就仲景氏書輯其方證相對者分門聚類始能為編藏之家久矣。近濱天祐與元純二生請梓以公之世使一時醫者知治術妙用唯在證方相的當而無復餘論也已。余深好其志再加釐正以授之。雖未能盡得方意庶幾乎免舍本求末之譏云爾。

日本寬政庚戌春三月

田中榮信 撰



凡例

- 一 此編披長沙氏正經、彙括諸章、去煩歸簡、欲易見也。如其傷寒論辨別有逢原撰、不贅于此。
- 一 世有傷寒類證者、其書本陰陽六經、主脉狀、其杜撰謬妄、不可勝計。且與仲景氏之意、大有逕庭也、不必取。
- 一 編中有證同方異者、蓋依有病毒之淺深緩急也、又不立發熱門者、熱之於病十八九、仲景氏依熱之大小有無耳、別無可處之方、無可加減之藥、病愈熱從之。
- 一 此編傷寒金匱中、或有證無方、或有方無證者、其他可疑者、皆不載。

之以俟識者耳

男 田中榮恒 謹識

○ 目次

○ 嘔吐門 附 噎 涎 沫 初丁ヲ

○ 大便不通門 附 鞭 難 五丁ウ

○ 小便不利門 附 難 自 七丁ヲ

○ 上衝門 附 氣 逆 上 氣 十二丁

○ 腹痛門 附 滿 脹 少 腹 十二丁

○ 結胸門 附 胸 痺 十六丁

○ 心下痞 鞭 門 附 心 痞 堅 滿 十七丁

○ 胸脇苦滿門 附 痛 十九丁

○ 心下悸門 附 臍 下 悸 廿二丁

○ 惡寒門 附 惡 風 寒 寒 熱 廿二丁

○ 厥冷門 附 厥 逆 廿五丁

○ 煩門 廿六丁

○ 汗出門 附 黃 汗 頭 汗 三十丁

○身疼痛門 附骨節痛

○頭痛門

○頸項強門

○渴門 附口乾舌燥

○頭眩門 附冒眩

○裏急門 附拘攣痛

○喘門 附咳

○諸黃門 附便膿血

○下利門 附身重

○水腫門 附身重

○短氣門 附不利

○咽痛門 附經水不調

○血證門

○不仁門

三十四

丁ウ

三十六

丁ヲ

三十七

同丁ウ

四十丁

ヲ

四十二

同丁ウ

四十四

丁ヲ

四十五

丁ウ

四十七

丁ウ

四十九

同丁ウ

五十丁

ウ

五十二

丁ヲ

五十四

丁ウ

五十五

丁ウ

五十六

同丁ウ

五十七

丁ヲ

○心中懊懣門

○身瞶門

○不得眠門 附卧起不安

○譫語門

○發狂門 附肺痿

○癰膿門

○蛇虫門

○陰疾門

○留飲門

○宿食門

○雜門

五十二

丁ウ

五十三

丁ヲ

五十四

丁ウ

五十五

丁ウ

五十六

同丁ウ

五十七

丁ヲ

五十八

同丁ヲ



諸方目次

○小半夏湯

五十九

○小半夏加茯苓湯

五十九

○大半夏湯

○吳茱萸湯

○大黃甘艸湯

五十九

○小薤胡湯

○乾姜人參半夏丸

○乾姜黃連黃芩人參湯

○葛根湯

六十一

○葛根加半夏湯

○桂枝湯

○桂枝加桂湯

○桂枝加芍藥湯

○桂枝去芍藥湯

○桂枝加葛根湯

六十一

○桂枝加黃耆湯

○枳朮桂枝湯

○桂枝加附子湯

○桂枝去芍藥加附子湯

○桂枝加厚朴杏子湯

○桂枝去芍藥加皂莢湯

○桂枝加大黃湯

○桂枝加龍骨牡蠣湯

○桂枝加芍藥生姜人參湯

○桂枝去桂加茯苓朮湯

○桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

○半夏瀉心湯

○甘艸瀉心湯

○生姜瀉心湯

○十棗湯

○大薤胡湯

六十一

六十一

○黃芩人參湯

○黃芩湯

○黃芩加半夏生姜湯

○四逆湯

○四逆加人參湯

○茯苓四逆湯

○通脈四逆湯

○通脈四逆加豬膽汁湯

○白通加豬膽汁湯

○附子粳米湯

○黃連湯

○茯苓澤瀉湯

○文蛤散

○豬苓湯

○豬苓散

○五苓散

六十一

六十二

六十三

六十四

○芫胡加苾硝湯

○真武湯

○白虎加桂枝湯

○芫胡加桂枝湯

○竹葉石膏湯

○甘艸乾姜湯

○小青龍湯

○半夏乾姜散

○皂莢丸

○芩甘姜味辛夏湯

○甘艸粉蜜湯

○人參湯即理中丸也

○生姜甘艸湯

○桔梗湯

○梔子生姜豉湯

六十四

六十五

六十六

○半夏厚朴湯  
 ○茯苓飲  
 ○橘皮大黃朴消湯  
 ○生姜半夏湯  
 ○調胃承氣湯  
 ○旋覆花代赭石湯  
 ○橘皮湯  
 ○橘皮竹茹湯  
 ○小承氣湯  
 ○大承氣湯  
 ○桂枝附子湯  
 ○桂枝附子去桂加朮湯  
 ○蜜煎導  
 ○豬膽汁方  
 ○麻仁丸  
 ○厚朴三物湯

六十五  
 六十六  
 六十六  
 六十七

○抵當湯  
 ○茯苓戎塩湯  
 ○蒲灰散  
 ○滑石白魚散  
 ○桃花湯  
 ○八味丸  
 ○桂枝甘艸附子湯  
 ○葵子茯苓散  
 ○越婢湯  
 ○越婢加朮湯  
 ○越婢加半夏湯  
 ○大黃硝石湯  
 ○茵陳蒿湯  
 ○小建中湯  
 ○芫胡桂枝乾姜湯  
 ○芫胡加龍骨牡蠣湯

六十七  
 六十八  
 六十八  
 六十八  
 六十八  
 六十八  
 六十九  
 六十九



消礬散  
 桃核承氣湯  
 天雄散  
 大陷胸湯  
 土瓜根散  
 大陷胸丸  
 小陷胸湯  
 茯苓杏仁甘艸湯  
 橘皮枳實生姜湯  
 薏苡附子散  
 括蕪薤白半夏湯  
 括蕪薤白白酒湯  
 桂枝人參湯  
 赤石脂禹餘糧湯  
 大黃黃連瀉心湯  
 瀉心湯

七十三  
 七十四  
 七十四  
 七十四  
 七十五  
 七十五

附子瀉心湯  
 木防已湯  
 木防已去石膏加茯苓芫硝湯  
 桂姜棗艸黃辛附湯  
 枳朮湯  
 甘遂半夏湯  
 赤丸  
 麻黃湯  
 厚朴大黃湯  
 苓甘五味姜辛湯  
 葶藶湯  
 大黃附子湯  
 半夏麻黃丸  
 茯苓甘艸湯  
 桂枝甘艸湯  
 苓桂甘棗湯

七十五  
 七十六  
 七十六  
 七十六  
 七十七  
 七十七

長沙醫藥

○大青龍湯

○桂枝二越婢一湯

○桂枝麻黃各半湯

○芍藥甘草附子湯

○附子湯

○防已黃耆湯

○白虎加人參湯

○蜀漆散

○牡蠣湯

○白通湯

○白虎湯

○當歸四逆湯

○當歸四逆加吳茱萸生姜湯

○烏梅圓

○桂枝甘草龍骨牡蠣湯

丁七十九 丁七十九 丁七十八 丁七十八 丁七十七 丁七十七

○乾姜附子湯

○黃連阿膠湯

○猪膚湯

○麻黃加朮湯

○三物黃芩湯

○梔子乾姜湯

○桂枝二麻黃一湯

○麻黃杏仁甘草石膏湯

○黃耆桂枝苦酒湯

○麻黃杏仁薏苈甘草湯

○頭風摩散

○芫胡去半夏加枳實湯

○白頭翁湯

○白頭翁加甘草阿膠湯

○文蛤湯

○澤瀉湯

八十一 八十一 八十一 八十一 八十一 八十一 八十一 八十一 八十一 八十一

長沙醫藥 目錄

○雞屎白散

○葛根黃連黃芩湯

○一物瓜蒂湯

○麻黃醇酒湯

○猪膏髮煎

○梔子蘗皮湯

○麻黃連軹赤小豆湯

○梔子大黃豉湯

○麻黃甘艸湯

○防已茯苓湯

○麻黃附子甘艸湯

○黃耆建中湯

○苓甘姜味辛夏仁湯

○牡蠣澤瀉散

○梔子甘艸豉湯

○半夏散及湯

八十一

八十二

八十三

○甘艸湯

○苦酒湯

○栝葉湯

○黃土湯

○赤小豆當歸散

○桂枝茯苓丸

○礬石丸

○黃耆桂枝五物湯

○雄黃薰

○蝕齒方

○蛇牀子散

○狼牙湯

○蜘蛛散

○枳實梔子豉湯

○甘麥大棗湯

○礬石湯

八十三

八十三

八十四

八十四

長沙醫藥 目錄

- 苦參湯
- 薏苡附子敗醬散
- 排膿湯
- 排膿散
- 茵陳五苓散
- 杏子湯

諸方名目次畢

長沙正經證彙

播磨 田中榮信愿仲 編選  
 南部 村尾茂喬維遷  
 越後 奥田邦憲祐菴  
 播磨 菅原成美專輔  
 同 河野敬明淳治 校

○嘔吐門附唾涎沫噫噦  
 ○諸嘔吐穀不得下者小半夏湯一  
 ○嘔家本渴渴者為欲解今反不渴  
 心下有支飲故也同方○胃反嘔吐  
 者大半夏湯三○食穀欲嘔者吳茱  
 萸湯四○食已即吐者大黃甘艸湯  
 五○嘔而發熱者小茈胡湯六○傷  
 寒五六日嘔而發熱者同方○妊  
 娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸七○傷



寒本自寒下，醫復吐下之，寒格更逆吐下，若食入口即吐，乾姜黃連黃芩人參湯。八○太陽與陽明合病，不下利但嘔者，葛根加半夏湯。十○太陽中風，汗自出，淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴乾嘔者，桂枝湯。十一○產後中風，續得之數十日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，心下悶，乾嘔，汗出者，同方。

右十二法，嘔吐不得食，或發熱證。

○嘔心下痞，鞭者，大半夏湯。三○嘔而腸鳴，心下痞者，半夏瀉心湯。廿七○傷寒中風，醫反下之，其人下利，日數十行，穀不化，腹中雷鳴，心下痞，鞭而滿，乾嘔，心煩不得安，甘艸瀉心湯。廿八○太陽中風，下利嘔逆，表解者，乃可攻之，其人漉漉汗出發，作有時，頭痛。

心下痞，鞭滿，引脇下痛，乾嘔，短氣，汗出不惡寒者，十棗湯。三十一○傷寒發熱，汗出不解，心下痞，鞭嘔吐而下利者，太芫胡湯。三十二○大陽病，過經十餘日，反二三下之，後四五日，芫胡證仍在者，先與小芫胡湯。六、嘔不止，心下急，鬱鬱微煩者，大芫胡湯。三十三○卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，小半夏加茯苓湯。三十四○乾嘔下利者，黃芩人參湯。三十五○乾嘔而利者，黃芩加半夏生姜湯。三十六

右九法，嘔吐心下痞，鞭下利證。

○少陰病，吐利，手足厥冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯。四○嘔而脈弱，小便復利，身有微熱，見厥者，四逆湯。三十七○既吐且利，小便復利而大汗出，下利清

穀內寒外熱脉微欲絕者同方○吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者同方○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之同方○少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆或乾嘔或咽痛通脉四逆湯八十一○少陰病下利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪膽汁湯四十一

右七法嘔吐下利厥逆證

○腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐者附子粳米湯四十二○傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯四十三○諸黃腹痛而嘔者小此胡湯六

右三法腹痛嘔吐證

○胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯四十四○吐後渴欲得水而貪飲者文蛤散四十五○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯四十六○嘔吐而病在膈上後思水者猪苓散四十七○先渴後嘔為水停心下小半夏加茯苓湯四十八○中風發熱六七日不解而煩有表裏証渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散四十九

右六法嘔吐渴証

○傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔小柴胡湯五十一○陽明病脇下鞅滿不大便而嘔舌上胎者同方○本太陽病不解脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱同方○產婦云大便堅嘔不能食

按本字从

者同方○傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利芫胡加芫硝湯四○嘔而胸滿者吳茱萸湯四

右六法胸脇苦滿嘔証

○少陰病腹痛小便不利四支沈重疼痛自下利或嘔者真武湯四○溫瘧者身無寒但熱骨節疼痛時嘔者自虎加桂枝湯五○傷寒六七日發熱微惡寒支節疼痛微嘔心下支結者芫胡加桂枝湯五

右三法支節疼痛嘔証

○傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯五○傷寒云云得之便厥咽中乾煩躁吐逆者甘艸乾姜湯五

右逆証

○乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯四○婦人吐涎沫小青龍湯四○傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或喘者同方○乾嘔吐逆吐涎沫者半夏乾姜散五○欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠者皂莢丸六○欬逆倚息不得卧小青龍湯四時復冒者芫桂五味甘艸湯七反更欬胸滿者芫甘五味姜辛湯五冒者必嘔嘔者復內半夏芫甘姜味辛夏湯七○假令瘦人臍下悸吐涎沫而癩眩此水也五芫散四○虻虫之為病令人吐涎沫心痛發作有時甘艸粉蜜湯八○大病差後喜唾久不了了者理中丸九

右九法乾嘔

○肺痿吐涎沫者桂枝去芍藥加皂莢湯廿○肺痿效唾涎沫不止咽燥而渴者生姜甘草湯卒○肺痿吐涎沫而不咳者甘艸乾姜湯辛○欬而胸滿振寒咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰桔梗湯卒○全證桔梗白散卒

右五法肺痿肺癰吐涎沫濁唾証

○發汗吐下後虛煩不得眠心中懊憹若嘔者梔子生姜豉湯辛○胸滿心下堅咽中怏怏如有炙肉吐之不出吞之不下者半夏厚朴湯碎○心胸中有停痰宿水自吐出後心胸間虛氣滿不能食茯苓飲碎○鱠食之在心胸間不化吐復不出速下除之

按乾嘔字

橘皮大黃朴硝湯碎○病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無奈生姜半夏湯碎○太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩者調胃承氣湯卒○陽明病不吐不下心煩者同方

右七法病有心胸中欲嘔吐不出証

○傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石湯碎○傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生姜瀉心湯廿九

右二法心下痞鞭愛証

○乾嘔噦若手足厥者橘皮湯辛○噦逆者橘皮竹茹湯辛○黃疸病小

便色不變欲自利腹滿而喘噦者小  
半夏湯一○大便不通噦數讖語者  
小承氣湯二

右四法  
噦逆証

○大便不通門 附鞮難

○中惡心痛腹脹大便不通者走馬  
湯三○少陰病六七日腹脹不大便  
者急下之大承氣湯二○大下後六  
七日不大便煩不解腹滿痛者此有  
燥屎也同方○陽明病脈遲雖汗出  
不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘  
有潮熱者可攻裏大承氣湯二發熱  
惡寒若腹大滿不通者小承氣湯二

右四法大便不  
通腹脹滿証

○傷寒若吐若下後不解不大便五

後作証  
當後

後作証  
當後

六日上至十餘日日晡所發潮熱不  
惡寒獨語如見鬼狀但發熱讖語者  
大承氣湯二○陽明病讖語有潮熱  
反不能食者胃中必有燥屎也同方  
○二陽併病太陽証罷但發潮熱手  
足熱熱汗出大便難而讖語者下之  
則愈同方○產後七八日無太陽証  
少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁  
發熱者不食食則讖語同方○傷寒  
六七日目中不了了睛不和無表裏  
証大便難身微熱者同方○病人小  
便不利大便乍難乍易時有微熱喘  
冒不能卧者有燥屎也同方○得病  
二三日云須小便利尿定鞮乃可  
攻之同方○陽明病潮熱大便微鞮  
者可與大承氣湯二不鞮者不與之

○陽明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕則讞語，小承氣湯主之。  
○大便不通，噦數讞語者，同方。  
○太陽病，若吐，若下，若發汗，微煩，小便數，大便因鞕者，同方。  
○傷寒，不大便六七日，頭痛，有熱者，同方。

右十二法，不大便，讞語有燥屎証。

○傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔，不渴，若其人，大便鞕，小便自利者，桂枝附子去桂加朮湯主之。  
○陽明病，自汗出，若發汗，小便自利者，此為津液內竭，雖硬不可攻之，當須自欲大便，宜蜜煎導而通之。若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導。蜜煎導方：大猪膽汁方。○太陽病，云云，小便數者，大便必鞕，不更衣

十日無所苦也，渴欲飲水者，五苓散主之。

○大便則難，其脾為約，麻仁丸主之。

○痛而閉者，厚朴三物湯主之。

右五法，不大便，鞕難證。

○陽明病，脇下鞕滿，不大便而嘔，舌上白胎者，小茈胡湯主之。  
○產婦云云，大便堅，嘔不能食者，同方。

右二法，不大便，嘔證。

○陽明証，其人喜忘者，必有畜血，屎雖鞕，大便反易，其色必黑，抵當湯主之。  
○病人無表裡証，發熱七八日，雖脈浮數者，可下之，不大便者有瘀血，同方。

右二法，大便，鞕有瘀血証。

○小便不利門 附 難自利自調

○小便不利者茯苓戎塩湯一○小便不利者蒲灰散二○小便不利者滑石白魚散三○服桂枝湯或下之仍頭項強痛翁翁發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加苓朮湯四○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也大承氣湯五○少陰病二三日至四五日腹痛小便不利便膿血者桃花湯六○虛勞腰痛小腹拘急小便不利者八味丸七

右七法小便不利或腹痛証

○傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯一○風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短

氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者桂枝甘艸附子湯二○妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩者葵子茯苓散三○少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四支沉重疼痛自下利者真武湯四

右四法小便不利有水氣証

○黃疸腹滿小便不利而赤自汗出大黃硝石湯一○裏水者一身面目黃腫其脉沈小便不利故令病水越婢加朮湯二○黃汗之病兩脛自冷又從腰以上必汗出下無汗腰體弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利桂枝加黃耆湯三○傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯四○陽

明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗刺頸而還小便不利渴引水漿者此為痰熱在裏身必發黃同友○太陽病身黃脈沈結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血証諦也抵當湯○男子黃小便自利小建中湯○黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱除熱必噦噦者小半夏湯一

右八法小便不利或自利黃疸証

○傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或心下悸小便不利者小此胡湯六○傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔此胡桂姜

湯○傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者此胡加龍骨牡蠣湯

右三法胸脇苦滿小便不利証

○太陽病發汗後若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散○本以下之故心下痞與瀉心湯瀉痞不解渴而口燥煩小便不利者五苓散○陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯○小便不利者有水氣其人若渴者括萹瞿麥丸

右四法小便不利渴証

○太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難屈伸者桂枝加附子湯○效逆倚息不得卧云



手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足  
痺其面翕然如醉狀因復下流陰股  
小便難時復冒者苓桂五味甘艸湯  
碎○妊娠小便難飲食如故者歸母  
苦參丸碎○婦人少腹滿如敦狀小  
便微難而不渴生後者此為水與血  
俱結在血室也大黃甘遂湯碎

右四法小  
便難証

○傷寒八九日風濕相搏身體疼煩  
不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而瀼  
者桂枝附子湯主之○時若其人大便  
鞭小便自利者桂枝附子去桂加朮  
湯碎○陽明病自汗出若發汗小便  
自利者此為津液內竭雖硬不可攻  
之當須自欲大便宜蜜煎導而通之  
蜜煎導方碎大猪膽汁方碎若及土

瓜根方○喻著之病其人身體重腰  
中冷如坐水中形如水狀反不渴小  
便自利飲食如故苓姜朮甘湯百○  
太陽病六七日表証仍在脉微而沈  
反不結胸其人發狂者以熱在下焦  
少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈  
抵當湯今

右四法小  
便自利証

○太陽病若吐若下若發汗微煩小  
便數大便因鞭者小承氣湯碎○傷  
寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒  
脚攣急云云甘艸乾姜湯碎芍藥甘  
艸湯百○肺痿吐涎沫而不咳者其  
人不渴必遺尿小便數者甘艸乾姜  
湯碎

右三法小  
便數証

○夫短氣有微飲當從小便去之八  
味丸<sub>五</sub>○婦人病飲食如故煩熱不  
得卧而反倚息者但利小便則愈同  
方○夫短氣有微飲當從小便去之  
苓桂朮甘湯<sub>百四</sub>○諸病黃家但利其  
小便假令脉浮當以汗解之桂枝加  
黃耆湯<sub>七</sub>

右四法當利小便証

○太陽病無汗而小便反少氣上衝  
胸口噤不得語欲作剛瘧葛根湯<sub>九</sub>  
○陽明病發潮熱大便溏小便自可  
胸脇滿不去者小茈胡湯<sub>六</sub>○傷寒  
不大便六七日頭痛有熱者與承氣  
湯<sub>五</sub>其小便清者知不在裏仍在表  
也桂枝湯<sub>十</sub>○腸癰者小腹腫按之  
即痛如淋小便自調時時發熱自汗

出復惡寒大黃牡丹湯<sub>百</sub>

右四法小便可証

○嘔而脉弱小便復利身在微熱見  
厥者四逆湯<sub>五</sub>○既吐且利小便復  
利而大汗出下利清穀同方○傷寒  
有熱少腹滿應小便不利今反利者  
為有血也抵當丸<sub>百三</sub>○男子消渴小  
便反多以飲一斗小便一斗八味丸<sub>五</sub>

右四法小便可証

○上衝門附上氣氣逆

○太陽病下之後其氣上衝者可與  
此方桂枝湯<sub>十</sub>○燒鍼令其汗鍼處  
被寒核起而赤者必發奔豚氣從少  
腹上衝心者桂枝加桂湯<sub>十一</sub>○傷寒

若吐若下後，心下逆滿，氣上衝胸，起則頭眩，苓桂朮甘湯。真○欬逆，手足厥逆，氣從小腹上衝咽喉，手足痺，其面翕然如醉狀，因復下流陰股，小便難，時復冒者，苓桂五味甘艸湯。治其氣衝，若面熱如醉狀，此為胃熱上衝，熏其面，加大黃以利之。苓甘姜味辛夏仁黃湯。真○心胸中大寒痛，嘔不能飲食，腹中寒，上衝皮起出，見有頭足，上下痛而不可觸近者，大建中湯。真○太陽病，無汗而小便反少，氣上衝胸，口噤不得語，葛根湯。九○病如桂枝証，頭不痛，項不强，胸中痞鞅，氣上衝咽喉，不得息者，瓜蒂散。真

○大逆上氣咽喉不利者，麥門冬湯。右七法，上衝心，胸証。

頁○欬逆上氣時時唾濁，但坐不得眠者，皂莢丸。真○欬而上氣，此為肺脹，其人喘，目如脫狀，越婢加半夏湯。卒○肺癰胸滿，脹一身面目浮腫，鼻塞，清涕出，不聞香臭，酸辛，欬逆上氣，喘鳴迫塞，葶藶大棗湯。真○心下痞，諸逆心懸痛者，桂枝枳實生姜湯。真○傷寒解後，虛羸少氣，氣逆欲吐者，竹葉石膏湯。真○胸痺，心中痞，留氣結在胸，胸滿脇下逆搶心者，人參湯。真○全証，枳實薤白桂枝湯。真

右八法，上氣逆証。

○腹痛門 附滿脹少腹滿痛

○心腹諸卒暴百病，若中惡，客忤，心腹脹滿卒痛，如錐刺，氣急口噤，停尸

卒死者三物備急圓<sup>二</sup>○心腹卒中痛者，茈胡桂枝湯<sup>一</sup>○治中惡心痛，腹脹大便不通，走馬湯<sup>三</sup>

右三法，心腹卒痛証

○腹中寒氣，雷鳴切痛，胸脇逆滿，嘔吐者，附子粳米湯<sup>一</sup>○心胸中大寒痛，嘔不能飲食，腹中寒上衝皮起，出見有頭足，上下痛而不可觸近，大建中湯<sup>二</sup>○傷寒五六日，中風，往來寒熱，胸脇苦滿，默默不欲飲食，心煩喜嘔，或腹中痛者，小茈胡湯<sup>六</sup>○諸黃腹痛而嘔者，同方○傷寒胸中有熱，胃中有邪氣，腹中痛，欲嘔吐者，黃連湯<sup>一</sup>

右五法，腹中痛嘔吐証

○婦人懷妊，腹中疝痛，當歸芍藥散

○婦人腹中諸疾痛者，同方○婦人有漏下，或妊娠下血，若腹中痛者，芎歸膠艾湯<sup>一</sup>○產後腹痛煩滿，不得卧，枳實芍藥散<sup>二</sup>○產後腹痛，以枳實芍藥散<sup>一</sup>不愈者，此為腹中有乾血，著臍下，下瘀血湯<sup>七</sup>

右五法，婦人腹中痛証

○寒疝，腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺諸藥不能治，烏頭桂枝湯<sup>一</sup>○腹痛，云云，寒疝，遠臍苦痛，發則自汗出，手足厥冷，大烏頭煎<sup>二</sup>○寒疝，腹中絞痛，拘急不得轉側，發作有時，使人陰縮，手足厥逆，烏頭湯<sup>三</sup>○寒疝，腹中痛，及脇痛，裏急者，當歸生薑羊肉湯<sup>四</sup>○產後，腹中疝痛，並治寒疝，同方

右五法、寒、痼、腹中痛証

○傷寒、腹中急痛者、先與小建中湯、卒不差者、與小建中湯、六○虛勞、裏急、悸、衄、腹中痛、夢失精、四肢痠痛、手足煩熱、咽乾、口燥、小建中湯、三○婦人腹中痛、同方、○治婦人產後、虛羸不足、腹中刺痛不止、吸吸少氣、或苦少腹中急、摩痛引腰背、不能食飲、當歸建中湯、項

右四法、腹中裏急痛証

○少陰病、至四五日、腹痛、小便不利、四肢沈重、疼痛、自下利者、真武湯、九○少陰病、至四五日、腹痛、小便不利、下利不止、便膿血者、桃花湯、四

右二法、腹中痛、小便不利証

○發汗不解、腹滿痛者、急下之、大承

按本字五函

氣湯、三○病、腹中滿痛者、此為實也、同方、○大下後、六七日、不大便、煩不解、腹滿痛者、此有燥屎也、同方、○本太陽病、醫反下之、因爾腹滿、時痛者、桂枝加芍藥湯、三○大實痛者、桂枝加大黃湯、三○痛而閉者、厚朴三物湯、三○陽明中風、脈弦浮大而短氣、腹都滿、脇下及心痛、小建中湯、六

右七法、腹滿痛証

○腹滿不減、減不足言、大承氣湯、三○少陰病、六七日、腹脹不大便者、同方、○陽明病、脈遲、雖汗出不惡寒者、其身必重、短氣、腹滿而喘、有潮熱者、此外欲解、可攻裏也、同方、三若腹大滿、不通者、可與小承氣湯、三○病、腹滿發熱十日、脈浮而數、飲食如故、厚

朴七物湯頭并○傷寒吐後腹脹滿者  
調胃承氣湯并○太陽病過經十餘  
日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反  
澀腹微滿鬱鬱微煩同方○發汗後  
腹脹滿者朴姜甘半參湯并○腹滿  
口舌乾燥此膈間有水氣已椒薑黃  
九頭并○二陽合病腹滿身重難以轉  
側口不仁而面垢譫語遺尿白虎湯  
并○傷寒下後心煩腹滿臥起不安  
者梔子厚朴湯并○下利腹脹滿身  
體疼痛者先溫裏乃攻其表溫裏四  
逆湯并攻表桂枝湯土○陽明病脉  
浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗  
出不惡寒反惡熱身重心中懊憹舌  
上胎者梔子鼓湯并

右十二法腹脹  
滿或不大便証

○黃疸腹滿小便不利而赤自汗出  
大黃硝石湯并○傷寒七八日身黃  
如橘子色小便不利腹微滿者茵陳  
蒿湯并○黃疸病小便色不變欲自  
利腹滿而喘噓者小半夏湯一○黃  
家日晡所發熱而反惡寒膀胱急小  
腹滿如水狀大便必黑時澹者消礬  
散并

右四法腹  
滿黃疸証

○太陽病不解熱結膀胱其人如狂  
血自下下者愈但少腹急結者桃核  
承氣湯并○虛勞腰痛小腹拘急小  
便不利者八味丸并○脚氣上入少  
腹不仁者同方○夫失精家小腹弦  
急陰頭寒目眩髮落桂枝加龍骨牡  
蠣湯并天雄散并

右四法小  
腹拘急証

○太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯垣○傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也抵當丸百三○太陽病六七日表證仍在脈微而沈不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈抵當湯半○太陽病身黃脈沈結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血証諦也同方○產後七八日無太陽証少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱云大承氣湯三○帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散垣

○婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此為水與血俱結在血室也大黃甘遂湯九○腸癰者小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒大黃牡丹湯五○傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而咳或小便不利小腹滿或喘者小青龍湯四

右九法少腹滿  
痛有瘀血証

○結胸門 附胸痺

○傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊心下痛按之石鞭者大陷胸湯垣○傷寒五六日嘔而發熱者云若心下滿而鞭痛者此為結胸也同方○太陽病脈浮而動數膈內拒痛短氣

躁煩心中懊懣心下因鞭則為結胸  
同方○傷寒十餘日熱結在裏復往  
來寒熱者與大芫胡湯尋但結胸無  
大熱者此為水結在胸脇也同方○  
結胸者項亦強如柔瘕狀下之則和  
大陷胸丸垣○小結胸病正在心下  
按之則痛小陷胸湯垣○病在陽應  
以汗解之云寒實結胸無熱証者  
同方垣自散卒○病人手足厥冷脉  
乍緊者邪結有胸中心中滿而煩饑  
不能食者當須吐之瓜蒂散垣○病  
如桂枝証頭不痛項不强胸中痞鞭  
氣上衝咽嗑不得息者同方

右九法  
結胸証

○胸痺胸中氣塞短氣者茯苓杏仁  
甘艸湯垣○胸痺胸中氣塞短氣者

橘皮枳實生姜湯垣○胸痺心中痞  
留氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳實  
薤白桂枝湯垣○全證人參湯垣○  
胸痺緩急者薤苳附子散垣○胸痺  
不得卧心痛徹背者括蕞薤白半夏  
湯垣○胸痺之病喘息欬唾胸背痛  
短氣者括蕞薤白白酒湯垣

右七法  
胸痺証

○心下痞鞭門附痞心中痞堅滿  
○傷寒中風醫反下之其人下利日  
數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭  
而滿乾嘔心煩不得安甘艸瀉心湯  
共○傷寒汗出解之後胃中不和心  
下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹  
中雷鳴下利者生姜瀉心湯共○嘔

按  
字



而腸鳴，心下痞者，半夏瀉心湯。廿七○  
 傷寒五六日，嘔而發熱，芫胡証具。云  
 云若心下滿而鞭痛者，此為結胸也。  
 大陷胸湯，主之。但滿而不痛者，為  
 痞。半夏瀉心湯。廿七○嘔心下痞，鞭者，  
 大半夏湯。三○傷寒發汗，若吐，若下，  
 解後，心下痞，噫氣不除者，旋覆花  
 代赭石湯，碎。○太陽病，外証未除而  
 數下之，遂協熱而利，利下不止，心下  
 痞，鞭者，桂枝人參湯，主之。○傷寒發熱，  
 汗出不解，心下痞，鞭，嘔吐而下利者，  
 大芫胡湯，主之。○傷寒服湯藥，下利不  
 止，心下痞，鞭，服瀉心湯，主之。已復以他  
 藥下之，利不止，醫以理中，與之，利  
 益甚，赤石脂禹餘糧湯，主之。○太陽中  
 風，下利嘔逆，表解者，乃可攻之，其人

漿，漿汗出，發作有時，頭痛，心下痞，鞭，  
 滿引脇下痛，乾嘔，短氣，汗出不惡寒  
 者，十棗湯，主之。

右十法，心下痞，  
鞭嘔，下利証。

○卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，  
 小半夏加茯苓湯，主之。○心下痞，按之  
 濡者，大黃黃連瀉心湯，主之。○傷寒大  
 下後，復發汗，心下痞，惡寒者，表未解  
 也，表解乃可攻痞，攻痞瀉心湯，主之。  
 表桂枝湯，主之。○婦人吐涎沫，醫反下  
 之，心下即痞，當先治其吐涎沫，小青  
 龍湯，主之。涎沫止，乃治痞，瀉心湯，  
 主之。○本以下之故，心下痞，與瀉心湯  
 主之。痞不解，其人渴而口燥煩，小便不  
 利者，五苓散，主之。○心下痞而復惡寒  
 汗出者，附子瀉心湯，主之。十四

右六法，心下痞証

○膈間支飲，其人喘滿，心下痞堅，面色鰲黑，其脈沈緊，得之數十日，醫吐下之不愈者，木防已湯。木防已去石膏加茯苓芫花湯。○心下堅大如盤，邊如旋杯，水飲所作，桂枝芍藥黃辛附湯。○全證，枳朮湯。○太陽病，脈浮而動數，短氣躁煩，心中懊憹，心下因鞅，則為結胸，大陷胸湯。○傷寒五六日，嘔而發熱，云云，若心下滿而鞅痛者，此為結胸也，同方。○傷寒六七日，結胸熱實，脈沈而緊，心下痛，按之石鞅者，同方。○太陽病重發汗而復下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮熱，從心下至少腹鞅滿而痛不可近，同方。○病者

脈伏，其人欲自利，利反快，雖利心下續堅滿，甘遂半夏湯。○下利，按之心下鞅者，急下之，大承氣湯。○

右九法，心下堅鞅証

○按之心下滿痛者，大芫胡湯。○服桂枝湯，或下之，仍頭項強痛，翕翕發熱，無汗，心下滿微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白朮湯。○傷寒若吐，若下後，心下逆滿，氣上衝胸，起則頭眩，芫桂朮甘湯。○心下有痰飲，胸脇支滿，目眩者，同方。○心痛微背背痛，微心赤丸。○

右五法，心下滿痛証

○胸痹，心中痞，留氣結在胸，胸滿，脇下逆搶心，人參湯。○全證，枳實薤白桂枝湯。○心中痞，諸逆心懸痛

者桂枝枳實生姜湯厚○傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者  
施子豉湯厚

右四法心下痞或痛証

○胸脇苦滿門附痛

○傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔者小  
此胡湯六○大陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛者與此胡湯六脉但浮者與麻黃湯厚○陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小此胡湯六○本  
太陽病不解脇下鞕滿乾嘔不能食往來寒熱同方○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者

國字本  
凶玉本

同方○陽明病脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者同方○傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利云先宜小此胡湯六以解外後此胡加芒硝湯厚○傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便利渴而不嘔此胡桂姜湯厚○腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐者附子粳米湯厚○心下有痰飲胸脇支滿目眩者苓桂朮甘湯厚

右十法胸脇苦滿或嘔証

○支飲胸滿者厚朴大黃湯厚○嘔而胸滿者吳茱萸湯厚○太陽病下之後脉促胸滿者若惡寒者加附子桂枝去芍藥湯厚○效而倚息云而反更效胸滿者苓甘五味姜辛湯

長沙醫案  
二十五  
○效而胸滿振寒脉數咽乾不渴  
時出濁唾腥臭久久吐膿寒如米粥  
者為肺癰桔梗湯辛○全證桔梗白  
散辛○太陽與陽明合病喘胸滿者  
麻黃湯鹽○傷寒八九日下之胸滿  
煩驚小便不利譫語一身盡重不可  
轉側者此胡加龍骨牡蠣湯碎○肺  
癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕  
出不聞香臭酸辛效逆上氣喘鳴迫  
塞葶藶大棗瀉肺湯夏

右九法胸滿或效誣

○夫有支飲家效煩胸中痛者十棗湯辛○效而引脇下痛者同方○太陽中風下利嘔逆云頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者同方○太陽病過經十餘日心

下溫溫欲吐而胸中痛大便反溼腹微滿鬱鬱微煩者調胃承氣湯八○效有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰葶藶湯鹽○發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯堊○病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無奈生姜半夏湯碎○心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近者大建中湯夏○心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣滿不能食者茯苓飲碎○脇下偏痛發熱其脉緊弦者大黃附子湯夏○病如桂枝証頭不痛項不强胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者當吐之瓜蒂散夏

身法論  
心下悸  
右十一法  
胸中  
痛或脇下痛証

○心下悸門 附臍下悸

○心下悸者半夏麻黃丸垣○傷寒厥而心下悸者茯苓甘草湯垣○發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯垣○太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯垣○傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或心下悸小便不利小茈胡湯六○卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯二

右六法  
心下悸証

○傷寒二三日心中悸而煩者小建

中湯三○虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥同方○發汗後其人臍下悸者欲作奔豚苓桂甘棗湯垣五○假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癩眩此水也五苓散七

右四法  
心中悸或臍下悸証

○惡寒門 附惡風往來寒熱振寒

○太陽中風嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯十一○太陽病頭痛發熱汗出惡風者同方○陽明病脈遲汗出多微惡寒者同方○產後中風續得之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出者同方○傷寒大下後復發汗心

下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表桂枝湯  
十一攻痞大黃黃連瀉心湯垣○心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯百四  
○太陽病脈浮而動數頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之膈內拒痛短氣躁煩心中懊憹心下因鞅則為結胸大陷胸湯垣○陽明病脈遲雖汗出不惡寒者云云大承氣湯詳主之若汗多微惡寒者外未解也若腹大滿不通者小承氣湯詳○腸癰者小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒也大黃牡丹湯百三

○太陽中風脈緊發熱惡寒身疼痛右九法惡寒發熱汗出証

不汗出而煩躁大青龍湯垣○傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外証未去者茈胡加桂枝湯詳○太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者桂枝二越婢一湯垣○太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也桂枝麻黃各半湯垣

右四法惡寒發熱不汗出証

○大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯詳○吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者同方○傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾

煩燥吐逆者，甘艸乾姜湯。汗○發汗病不解，反惡寒者，芍藥甘艸附子湯。汗○惡寒，脈微而復利，四逆加入參湯。汗○太陽病，下之後，脈促，胸滿而若惡寒者，桂枝去芍藥加附子湯。汗○少陰病，得之一二日，口中和，其背惡寒者，當灸之，附子湯。汗

右七法，汗吐下後，惡寒或厥冷証

○黃家，日晡所發熱，而反惡寒，此為女勞得之，膀胱急，少腹滿。云云消礬散。汗○穀疸之為病，寒熱不食，食則頭眩，心胸不安，久久發黃，茵陳蒿湯。汗○裏水者，一身面目黃腫，其脈沈小，便利，惡風者，越婢加朮附湯。汗

右三法，惡寒發黃証

○太陽病，項背強，八九反汗出，惡風

者，桂枝加葛根湯。汗○太陽病，發汗遂漏不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸者，桂枝加附子湯。汗○風濕相搏，骨節煩疼，掣痛，不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，身微腫者，桂枝甘艸附子湯。汗○風濕，脈浮，身重，汗出，惡風者，防己黃耆湯。汗○妊娠有水氣，身重，小便不利，洒淅惡寒，起即頭眩，葵子茯苓散。汗

右五法，汗出惡風証

○太陽病，頭痛發熱，身疼，腰痛，骨節疼痛，惡風，無汗而喘者，麻黃湯。汗○太陽病，項背強，八九無汗，惡風者，葛根湯。汗

右二法，無汗惡風証

○太陽中熱者，喝是也。汗出惡寒，身熱而渴者，白虎加人參湯。○傷寒無大熱，口渴渴，心煩，背微惡寒者，同方。○傷寒病若吐，若下後，七八日不解，熱結在裏，表裏俱熱，時時惡風，大渴，舌上乾燥而煩，欲飲水數升者，同方。

右三法，惡寒渴証。

○傷寒五六日，中風，往來寒熱，胸脇苦滿，默默不欲飲食，心煩喜嘔，小柴胡湯。○傷寒四五日，身熱惡風，頸項強，脇下滿，手足溫而渴者，同方。○婦人，中風，七八日，續得寒熱，發作有時，經水適斷者，此為熱入血室，同方。○本太陽病不解，脇下鞕滿，乾嘔不能食，往來寒熱者，同方。○傷寒五六

日，已發汗而復下之，胸脇滿，微結，小便不利，渴而不嘔，但頭汗出，往來寒熱，心煩者，此胡桂姜湯。○瘧寒多微有熱，或但寒不熱者，同方。○傷寒十餘日，熱結在裏，復往來寒熱者，大柴胡湯。○瘧多寒者，名牡蠣、蜀漆散。○牡蠣、牡蠣湯。○

右九法，寒熱往來及瘧証。

○欬而胸滿，振寒，咽乾，不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿，寒如米粥者，桔梗湯。○企證，桔梗白散。○

右二法，振寒証。

○厥冷門 附厥逆

○吐利汗出，發熱惡寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆湯。○大汗出，大



利而厥冷者同方○嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者同方○大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者同方○下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯○少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒同方○吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯○少陰病下利脈微者與白通湯想利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯○少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯

右九法手足厥冷吐利証

○寒疝腹中絞痛拘急不得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆烏頭湯

百升○寒疝遠臍苦痛發則自汗出手足厥冷其脈沉弦者大烏頭煎○寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛烏頭桂枝湯○寒氣厥逆者赤丸

右四法寒疝逆証

○病人手足厥冷脈乍緊者邪結有胸中心中滿而煩瓜蒂散○乾嘔噦若手足厥者橘皮湯○欬逆云云手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者苓桂五味甘艸湯○傷寒脈滑厥者裏有熱也白虎湯○手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯

右五法手足厥冷証

○傷寒厥而心下悸者，茯苓甘草湯。  
 證○傷寒，脈浮自汗出，小便數，心煩，微惡寒，云云，得之便厥，咽中乾，煩躁，吐逆者，甘草乾姜湯。  
 證○厥而皮水者，蒲灰散。  
 證○吐逆者，烏梅圓。  
 證○少陰病，飲食入口則吐，心中溫溫欲吐，復不能吐，始得之，手足寒，脈弦遲者，云云，若膈上有寒飲，乾嘔者，四逆湯。  
 證○少陰病，身體痛，手足寒，骨節痛，脈沈者，附子湯。  
 證

右六法，厥或手足寒，証。

○煩門

○太陽病，初服桂枝湯，反煩不解者，先刺風池，風府，卻與桂枝湯，則愈。  
 桂枝湯。  
 證○傷寒，發汗解，半日許，復煩。

者，同方。  
 證○傷寒，八九日，下之，胸滿煩驚，小便不利，讞語，一身盡重，不可轉側者，此胡加龍骨牡蠣湯。  
 證○傷寒，二三日，心中悸而煩者，小建中湯。  
 證○虛勞，裏急，悸，衄，腹中痛，夢失精，四肢痠痛，手足煩熱，咽乾，口燥者，同方。  
 證○少陰病，下利，脈微者，與白通湯。  
 證○利不止，厥逆無脈，乾嘔，煩者，白通加豬膽汁湯。  
 證○夫有支飲家，欬煩，胸中痛者，十棗湯。  
 證○欬有微熱，煩滿，胸中甲錯，是為肺癰，葶藶湯。  
 證

右八法。

○火逆下之，因燒鍼煩躁者，桂枝甘草龍骨牡蠣湯。  
 證○太陽中風，脈緊發熱惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁，大青龍湯。  
 證○發汗，若下之，病仍不解。

煩躁者茯苓四逆湯四○少陰病吐利手足厥冷煩躁者吳茱萸湯四○黃汗之病云云劇者不能食身疼重煩躁小便不利桂枝加黃耆湯六○得病二三日脈弱無太陽証胡證煩躁心下鞭云云小承氣湯六大承氣湯六○產後七八日無太陽証少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱云云同方○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者同方○陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者同方○太陽病脈浮而動數咽內拒痛短氣躁煩心中懊憹心下因鞭則為結胸大陷胸湯五

右十法煩躁証

○虛勞虛煩不得眠者酸棗仁湯五

○發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯五○下利後更煩按之心中濡者為虛煩同方○下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表証乾姜附子湯五○傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急云云得之便厥咽中乾煩燥吐逆者甘艸乾姜湯五○產後腹痛煩滿不得卧者枳實芍藥散五○婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者但利小便則愈八味丸五

右七法煩躁不得眠証

○傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯五○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧者黃連阿膠湯。○陽明病不吐不下心煩者調胃承氣湯。○病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者瓜蒂散。○傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安甘艸瀉心湯。○傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者芫胡桂姜湯。○少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯。○傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔者小芫胡湯。六

右九法  
心煩証

○服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯。○傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者同方。○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者同方。○發汗已脈浮數煩渴者五苓散。○中風發熱六七日不解而煩者有表裏証渴欲飲水水入則吐者同方。○本以下之故心下痞與瀉心湯。○痞不解其人渴而口燥煩小便不利者同方。○病在陽應以汗解之反以冷水瀉之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散。○不差者五苓散。

煩七法

○傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，桂枝附子湯。  
 昨○風濕相搏，骨節煩疼，掣痛不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，桂枝甘艸附子湯。  
 六○濕家身煩疼，麻黃加朮湯。  
 傷寒六七日，發熱微惡寒，支節煩疼，微嘔，心下支結，芫胡加桂枝湯。  
 溫瘧者，其脈如平，身無寒但熱，骨節疼煩，時嘔，白虎加桂枝湯。

煩五法

○病人煩熱，汗出則解，又如瘧狀，日晡所發熱，脈實者，宜下之，脈浮虛者，宜發汗，大承氣湯，桂枝湯。  
 ○婦

人有草蓐，自發露，得風，四肢苦煩，熱頭痛者，與小芫胡湯。  
 六、頭不痛，但煩者，三物黃芩湯。  
 頃○發汗，若下之而煩，熱胸中窒者，梔子豉湯。  
 頃

煩三法

○太陽病，過經十餘日，仍在者，先與小芫胡湯。  
 六、嘔不止，心下急，鬱鬱微煩者，大芫胡湯。  
 頃○大陽病，若吐，若下，若發汗，微煩，小便數，大便因鞮者，小承氣湯。  
 頃○太陽病，過經十餘日，心下溫溫，欲吐而胸中痛，大便反澹，腹微滿，鬱鬱微煩者，調胃承氣湯。  
 頃○傷寒，醫以丸藥大下之，身熱不去，微煩者，梔子乾姜湯。  
 頃

煩四法

長沙醫集

汗出門 附黃汗盜汗

○太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯上○太陽中風汗自出者惡寒淅淅惡風翕翕發熱同方○太陽病發熱汗出者同方○陽明病脈遲汗出多微惡寒者同方○產後中風續得之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出証同方○病常自汗出者同方○病人藏無他病時發熱自汗出者同方○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者脈實者宜下之與大承氣湯下脈浮虛者宜發汗桂枝湯上○服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯上如前法若形如瘧日再發者汗出必解桂枝二麻黃一湯上○太陽病項背

強八八及汗出惡風者桂枝加葛根湯上○太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯上○風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風桂枝甘艸附子湯上○心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯上○風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃耆湯上

右十四法汗出惡風發熱証

○凡芪胡湯病証而下之若芪胡証不罷者復與芪胡湯六必蒸蒸而振却發熱汗出而解○陽明病脇下鞅滿不大便而嘔云身濇然而汗出解也同方六○傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大芪胡湯

○陽明病發熱汗出多者急下之  
大承氣湯時○太陽病發汗汗出不  
解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動  
欲擗地者真武湯時○太陽中風下  
利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱  
汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引  
脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒十棗  
湯時

右六法汗  
出發熱証

○太陽中熱者喝是也汗出惡寒身  
熱而渴白虎加人參湯時○服桂枝  
湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者  
同方時○太陽病發汗後大汗出胃  
中乾燥不得眠欲飲水者少少與飲  
之令胃氣和則愈若脈浮小便不利  
微熱消渴者五苓散時○太陽病其

人發熱汗出復惡寒不嘔云云渴者  
同方○傷寒汗出而渴者五苓散時  
主之不渴者茯苓甘艸湯時

右五法汗  
出渴証

○汗出譫語者以有燥屎在胃中也  
大承氣湯時○二陽併病太陽証罷  
但發潮熱手足熱熱汗出大便難而  
譫語者同方○陽明病其人多汗以  
津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譫  
語小承氣湯時

右三法汗  
出譫語証

○發汗後不可更行桂枝湯汗出而  
喘無大熱者麻黃杏仁甘艸石膏湯  
小承氣湯時○下後不可更行桂枝湯汗出而  
喘無大熱者同方○陽明病脈遲雖  
汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿

而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也  
汗多微發熱惡寒若腹大滿不通者  
小承氣湯辛○陽明病脈浮而緊咽  
燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒  
反惡熱身重心中懊懣舌上胎者施  
子豉湯垣

右四法汗  
出喘証

○吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手  
足厥冷者四逆湯辛○既吐且利小  
便復利而大汗出下利清穀內寒外  
熱脈微欲絕者同方○下利清穀裏  
寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯辛  
○吐已下斷汗出而厥四肢拘急不  
解脈微欲絕者通脈四逆加猪膽汁  
湯垣

右四法汗出  
吐利厥冷証

○風水惡風一身悉腫脈浮不渴續  
自汗出無大熱越婢湯辛主之惡風  
者加附子○腸癰者小腹腫按之即  
痛如淋小便自調時時發熱自汗出  
復惡寒也大黃牡丹湯垣○傷寒脈  
浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣  
急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得  
之便厥咽中乾煩燥吐逆者甘艸乾  
姜湯辛芍藥甘艸湯垣○二陽合病  
腹滿身重難以轉側口不仁而面垢  
譫語遺尿若自汗出者白虎湯垣○  
寒疝遠臍苦痛發則自汗出手足厥  
冷其脈沈弦者大烏頭煎垣○陽明  
病自汗出若發汗小便自利者此為  
津液內竭雖硬不可攻之當須自欲  
大便蜜煎導辛大猪膽汁方垣



石六法自汗出証

○黃汗之病，身體腫，發熱，汗出而渴，狀如風水，汗沾衣，色正黃，如藥汁，脈自沈，黃耆桂枝苦酒湯。頤○黃汗之病，云從腰以上必汗出，下無汗，腰體弛痛，如有物在皮中狀，桂枝加黃耆湯。十六○黃疸，腹滿，小便不利而赤，自汗出，此為表和裏實，大黃硝石湯。卒○陽明病，發熱，汗出，此為熱越，不能發黃也，但頭汗出，身無汗，劑頸而還，小便不利，渴引水漿者，此痰熱在裏，身必發黃，茵陳蒿湯。卒

右四法黃汗証

○傷寒五六日，已發汗而復下之，胸脇滿，微結，小便不利，渴而不嘔，但頭汗出，往來寒熱，心煩者，此胡桂姜湯。

九○太陽病，脈浮而動數，云云，頭暈發熱，微盜汗出，而反惡寒，云云，心下因鞞，則為結胸，大陷胸湯。頤○傷寒十餘日，熱結在裏，復往來寒熱者，與大芫胡湯。頤但結胸無大熱者，此為水結在胸脇，但頭微汗出者，同方。○產婦鬱冒，其脈微弱，不能食，大便反堅，但頭汗出，小芫胡湯。六○風水，脈浮為在表，其人或頭汗出，表無他病，病者但下重，從腰以上為和，腰以下當腫及陰，難以屈伸，防己黃耆湯。頤○陽明病，下之，其外有熱，手足溫，不結胸，心中懊憹，饑不能食，但頭汗出者，梔子鼓湯。頤

右六法頭汗出証

○身疼痛門附骨節痛

○少陰病，身體手足寒，骨節痛，脈沈者，附子湯。  
 ○病歷節不可屈伸，疼痛者，烏頭湯。  
 ○脚氣疼痛不可屈伸，同方。  
 ○寒疝，腹中絞痛，拘急，不得轉側，發作有時，使久陰縮，手足厥逆，同方。  
 ○寒疝，腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺諸藥不能治，烏頭桂枝湯。  
 ○少陰病二三日，不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沈重，疼痛，自下利者，真武湯。  
 ○發汗後，身疼痛，脈沈遲者，桂枝加芍藥人參生姜湯。  
 ○霍亂，頭痛發熱，身疼痛，熱多欲飲水者，五苓散。  
 ○主之，寒多不用水者，理中丸。  
 ○病者，一身盡疼，發熱，日晡所劇者，麻黃杏仁薏苡甘草湯。

湯十五○病發熱，頭痛，脈反沈，若不差，身體疼痛，四逆湯。  
五

右十法，身疼，痛或腹痛証

○下利後，身疼痛，清便自調者，急當救表，桂枝湯。  
 ○吐利止，而身疼痛，不休者，同方。  
 ○下利，腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃四逆湯。  
 ○及其表，桂枝湯。  
 ○傷寒，醫下之，續得下利，清穀不止，身疼痛者，急當救裏，後身疼痛，清便自調者，急當救表，同方。

右四法，下利，身疼痛証

○太陽病，頭痛發熱，身疼，腰痛，骨節疼痛，惡風，無汗而喘者，麻黃湯。  
 ○太陽病，脈浮緊，無汗發熱，身疼痛，八九日不解，同方。  
 ○太陽中風，脈緊發熱，惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁者，大

青龍湯百六

右三法無汗  
身疼痛証

○太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯大○大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯碎○黃汗之病從腰以上必汗出下無汗腰體弛痛如有物在皮中狀刺者不能食身疼重煩躁小便不利桂枝加黃耆湯共○其人身体重腰中冷如坐水中形如水狀云苓姜朮甘湯百

右四法汗出  
身疼痛証

○風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風桂枝甘艸附子湯六○傷寒八

九日風濕相搏身体疼煩不能自轉側不嘔不渴若其人大便鞅小便自利者桂枝附子去桂加朮湯碎○濕家身煩疼麻黃加朮湯煩○傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外証未去者此胡加桂枝湯碎○溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔者白虎加桂枝湯碎

右五法  
節煩疼証

頭痛門

○太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯上○傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯碎其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗同方○產後中風續得之數十日不解頭微

長沙外臺

頭痛

三十一

痛惡寒時時有熱同方○婦人在草  
蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者  
小茈胡湯<sup>六</sup>○乾嘔吐涎沫頭痛者  
吳茱萸湯<sup>四</sup>○太陽病脈浮而動數  
頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表  
未解也膈內拒痛心下因鞭則為結  
胸大陷胸湯<sup>垣</sup>○病發熱頭痛脈反  
沈者若不差身體疼痛當救其裏四  
逆湯<sup>碎</sup>○太陽中風下利嘔逆表解  
者乃可攻之其人熱熱汗出發作有  
時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛十棗  
湯<sup>辛</sup>○頭風摩散一友垣○霍亂頭  
痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓  
散<sup>悍</sup>主之寒多不用水者理中丸<sup>九</sup>

右十法  
頭痛証

○頸項強門

○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇  
下滿手足溫而渴者小茈胡湯<sup>六</sup>○  
得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足  
溫醫二三下之不能食而脇下滿痛  
面目及身黃頸項強小便難者同方  
○結胸者項亦強如柔痙狀下之則  
愈大陷胸丸<sup>垣</sup>○服桂枝湯或下之  
仍頭項強痛翁翁發熱無汗心下滿  
微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓  
朮湯<sup>廿五</sup>

右四法  
項強証

○太陽病項背強八八無汗惡風者  
葛根湯<sup>九</sup>○太陽病項背強八八反  
汗出惡風者桂枝加葛根湯<sup>廿</sup>○太  
陽病其証備身體強八八然脈反沈

長沙論... 渴  
遲此為瘧，括薑桂枝湯。<sup>七</sup>

右三法，項背強証。

○渴門 附口乾舌燥

○渴欲飲水不止者，文蛤散。<sup>四</sup>○傷寒汗出而渴者，五苓散。<sup>七</sup>○霍亂頭痛發熱，身疼痛，熱多欲飲水者，同方。  
○太陽病，小便數者，大便必鞭，不更衣，十日無所苦也。渴欲飲水，少少與之，但以法救之。渴者，同方。  
○病在陽，應以汗解之，反以冷水灌之，若灌之，其熱被劫，劫不得去，彌更益煩，肉上粟起，意欲飲水，反不渴者，服文蛤散。<sup>四</sup>○若不差者，五苓散。<sup>七</sup>○瘧病發渴者，芫胡去半夏加栝蒌湯。<sup>四</sup>○下利欲飲水者，以有熱故也，白頭翁湯。<sup>四</sup>○

傷寒四五日，身熱惡風，頸項強，脇下滿，手足溫而渴者，小芫胡湯。<sup>六</sup>○傷寒五六日，中風，徃來寒熱，胸脇苦滿，默默不欲飲食，心煩喜嘔，或渴者，同方。  
○肺痿，欬唾涎沫不止，咽燥而渴者，生姜甘艸湯。<sup>辛</sup>○太陽病，重發汗而復下之，不大便，五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮熱，大陷胸湯。<sup>四</sup>○黃汗之為病，身體腫，發熱，汗出而渴，狀如風水，汗沾衣，黃者，桂枝苦酒湯。<sup>四</sup>

右十二法，渴欲飲水証。

○胃反吐而渴，欲飲水者，茯苓澤瀉湯。<sup>四</sup>○吐後渴欲得水而貪飲者，文蛤湯。<sup>四</sup>○傷寒表未解，心下有水氣，乾嘔發熱而咳，或渴，小青龍湯。<sup>四</sup>○

先渴後嘔，為水停心下。小半夏加茯苓湯。  
 ○少陰病，下利六七日，欬而嘔，渴心煩，不得眠者，猪苓湯。  
 ○嘔吐而病在膈上，後思水者，猪苓散。  
 ○中風發熱六七日，不解而煩，有表裏証，渴欲飲水，水入則吐，名曰水逆。五苓散。

右七法嘔吐渴証

○小便不利者，有水氣，其人若渴者，括蔞瞿麥丸。  
 ○若脈浮發熱渴欲飲水，小便不利者，猪苓湯。  
 ○太陽病發汗後，大汗出，胃中乾，煩躁不得眠，欲飲水者，少少與飲之，令胃氣和，則愈。  
 若脈浮，小便不利，微熱消渴者，五苓散。  
 ○本以下之，故心下痞，與瀉心湯，痞痞不解，其人渴而口燥煩

小便不利者同方。○發汗已，脈浮數，煩渴者同方。○男子消渴，小便反多，以飲一斗，小便一斗，八味丸。

右六法渴小便不利証

○服桂枝湯，大汗出後，大煩渴不解，脈洪大者，白虎加人參湯。  
 ○傷寒病，若吐，若下，後七八日不解，熱結在裏，表裡俱熱，時時惡風，大渴，舌上乾燥而煩，欲飲水數升者，同方。  
 ○傷寒無大熱，口燥渴，心煩背微惡寒者，同方。  
 ○太陽中熱者，暍是也，汗出惡寒，身熱而渴，同方。  
 ○傷寒脈浮發熱無汗，其表不解者，不可與白虎湯。渴欲飲水，無表証者同方。  
 ○陽明病，脈浮而緊，咽燥，口苦，腹滿而喘，發熱汗出不惡寒，反惡熱，身重，若渴欲飲水，口

乾舌燥者同方

右六法大煩渴引飲証

○虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥者小建中湯碎○少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之大承氣湯碎○少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之同方○傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急云云便厥咽中乾煩燥吐逆者甘艸乾姜湯碎○欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿桔梗湯碎○全證桔梗白散碎○腹滿口舌乾燥此膈間有水氣已椒薑黃丸碎○陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱心中

懊懣舌上胎者梔子豉湯碎

右八法口舌咽乾燥証

頭眩門 附冒眩

○傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩者苓桂朮甘湯碎○心下有痰飲胸脇支滿目眩者同方○太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯碎○穀疸之為病寒熱不食食則頭眩心胸不安久久發黃茵陳蒿湯碎○妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩葵子茯苓散碎

右五法頭眩証

○假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癩

眩此水也五苓散<sup>七</sup>○心下有支飲其人若冒眩澤瀉湯<sup>九</sup>○卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏加茯苓湯<sup>二</sup>○夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落者桂枝加龍骨牡蠣湯<sup>三</sup>○發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按之者桂枝甘草湯<sup>四</sup>○欬逆倚息不得卧小青龍湯<sup>五</sup>主之手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺時復冒者苓桂五味甘艸湯<sup>六</sup>○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也大承氣湯<sup>十</sup>

右七法  
眩悸証

○裏急門附拘攣痛

○傷寒腹中急痛者先與小建中湯<sup>一</sup>不愈者與小建中湯<sup>六</sup>○虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠痛小建中湯<sup>二</sup>○虛勞裏急諸不足黃耆建中湯<sup>三</sup>○寒疝腹中痛及脇痛裏急者當歸生姜羊肉湯<sup>四</sup>○夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落者桂枝加龍骨牡蠣湯<sup>五</sup>天雄散<sup>六</sup>○太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯<sup>七</sup>○太陽病過經十餘日云嘔不止心下急鬱鬱微煩者大建中湯<sup>八</sup>○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈但少腹急結者桃核承氣湯<sup>九</sup>○黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱



急少腹滿身盡黃其腹脹如水狀大便必澹消礬散八原

右九法裏急痛証

○大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯五○吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者同方○吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加猪膽汁湯九○寒疝腹中絞痛拘急不得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆烏頭湯恒○虛勞腰痛小腹拘急小便不利者八味丸五

右五法拘急厥逆証

○傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急芍藥甘草湯百○瘧為病胸滿口噤卧不著席脚攣急必齟

齒大承氣湯三

右二法學急証

○轉筋之為病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹者雞屎白散百九

右一法轉筋証

○喘門附咳嗽

○喘家作桂枝加厚朴杏仁佳干○大陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯干○黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘噦者小半夏湯一○胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣拮婁薤白酒湯恒○病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤然無奈生姜半夏湯七○傷寒若吐若下後不解不大便五

長沙遺集

喘

六日發潮熱微喘直視脉弦者大承氣湯三○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也同方

右七法  
喘証

○太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯五○陽明病脉浮無汗而喘者同方○太陽與陽明合病喘而胸滿者同方

右三法  
汗証

○發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草石膏湯五○下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者同方○太陽病桂枝証醫反下之利遂不止喘而汗出者葛根黃連黃芩湯五○陽明病脉遲雖

汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱大承氣湯三○陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出云云心中懊憹舌上胎者梔子豉湯五

右五法  
汗証

○傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而咳或喘者小青龍湯四○傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴者同方○欬逆倚息不得卧小青龍湯四主之云云反更欬胸滿者用桂苓五味甘艸湯七去桂加乾姜細辛以治其欬滿五○欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者越婢加半夏湯六○傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩

喜嘔或咳者小茈胡湯六○少陰病  
二三日不已至四五日腹痛小便不  
利四支沈重疼痛或咳者真武湯  
○欬家其脉弦為有水十棗湯  
夫有支飲家欬煩胸中痛者同方○  
欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皂  
莢丸

右九法咳喘  
或發熱証

○欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時  
出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為  
肺癰桔梗湯○全證桔梗白散  
○肺癰喘不得卧者葶藶大棗湯  
○肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞  
清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘  
鳴迫塞同方○欬有微熱煩滿胸中  
甲錯是為肺癰葶藶湯○肺痿欬

唾涎沫不止咽燥而渴者生姜甘州  
湯

右六法肺  
癰咳喘証

○諸黃門

○黃疸病茵陳五苓散○諸黃瓜  
蒂湯○黃疸麻黃醇酒湯○諸  
黃猪膏髮煎○傷寒身黃發熱者  
梔子蘘皮湯○諸病黃家但利其  
小便假令脉浮當以汗解之桂枝加  
黃耆湯○黃家日晡所發熱而反  
惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿  
身盡黃消蠶散○穀疸之為病寒  
熱不食食則頭眩心胸不安久久發  
黃茵陳蒿湯

右八法黃疸  
或發熱証

○黃疸腹滿小便不利而赤自汗出  
大黃硝石湯卒○傷寒七八日身黃  
如橘子色小便不利腹微滿者茵陳  
蒿湯卒○陽明病發熱汗出此為熱  
越不能發黃也但頭汗出身無汗劑  
頸而還小便不利渴引水漿者此為  
痰熱在裏身必發黃同方○裏水者  
一身面目黃腫其脉沈小便不利故  
令病水越婢加朮湯卒○得病六七  
日脉遲浮弱惡風寒手足溫醫二三  
下之不能食而脇下滿痛面目及身  
黃頸項強小便難者小茈胡湯六

右五法身黃小便不利或難証

○傷寒痰熱在裏身必發黃麻黃連  
軹赤小豆湯規○男子黃小便自利  
小建中湯卒○太陽病身黃脉沈結

少腹鞭小便不利者為無血也小便  
自利其人如狂者血証諦也抵當湯  
卒○黃疸病小便色不變欲自利腹  
滿而喘噓者小半夏湯一

右四法身黃小便自利或痰血証

○諸黃腹痛而嘔者小茈胡湯六○  
酒黃疸心中懊懣或熱痛者梔子大  
黃豉湯百九十九

右二法黃疸腹痛証

○黃汗之為病身体腫發熱汗出而  
渴狀如風水汗沾衣色正黃如麤汁  
脉自沈黃耆桂枝苦酒湯十四○黃汗  
之病云又從腰以上必汗出下無  
汗腰體弛痛如有物在皮中狀桂枝  
加黃耆湯六

右二法黃汗証

○下利門 附便膿血

○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者四逆湯五○脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者同方○吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者同方○既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絕者同方○大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者同方○大汗出大下利而厥冷者同方○下利腹脹滿身體疼痛者同方○少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕者通脉四逆湯八○下利清穀裏寒外熱汗出而厥者同方○少陰病下利脉微者與白通湯九利不止

厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪胆汁湯四

右十法下利清穀厥逆証

○乾嘔下利者黃芩人參湯三○太陽與陽明合病自下利者黃芩湯三若嘔者黃芩加半夏生姜湯四○乾嘔而下利者同方○傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者大芫胡湯三○少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯四○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯五

右六法嘔而下利証

○太陽病外証未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裡不解者桂枝人參湯五○傷寒中風醫

死脫字

反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安甘艸瀉心湯艾○傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者生姜瀉心湯艾○病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯垣○下利按之心下鞭者急下之大承氣湯三

右五法心下痞鞭而下利証

○熱利下重者白頭翁湯垣○下利欲飲水者以有熱故也同方○產後下利者白頭翁加甘艸阿膠湯垣○少陰病下利脉微者與白通湯垣利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪

胆汁湯厚○下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之大承氣湯三○下利脉反滑當有所去下之乃愈同方○下利不欲食者當下之同方○下利差後至其年月日時復發者以病不盡故也同方○太陽與陽明合病者必自下利葛根湯九○太陽病桂枝証醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯垣○少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四支沈重疼痛自下利者真武湯厚○傷寒服湯藥下利不止醫以理中厚與之利益甚赤石脂禹餘糧湯垣○少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯垣

右十三法下利或熱或身疼証

長少登

○少陰病下利便膿血者桃花湯四  
○少陰病二三日至四五日腹痛小  
便不利下利不止便膿血者同方○  
下利便膿血者同方

右三法便  
膿血証

○水腫門附身重

○風水惡風一身悉腫脉浮不渴續  
自汗出無大熱越婢湯心○裏水者  
一身面目黃腫其脉沈小便不利故  
令病水越婢加水湯心○裏水若惡  
風者同方加附子○裏水麻黃甘  
湯言○風水脉浮為在表其人或頭  
汗出表無他病病者但下重從腰以  
上為和腰以下當腫及陰難以屈伸  
防已黃耆湯類○風濕脉浮身重汗

濕一作水

出惡風者同方○風濕相搏骨節煩  
疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出  
短氣小便不利惡風不欲去衣或身  
微腫者桂枝甘艸附子湯六○皮水  
為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶  
聶動者防已茯苓湯言○水之為病  
其脉沈小屬少陰浮者為風無水虛  
脹者為氣水發其汗即已麻黃附子  
甘艸湯言浮者杏子湯二百○黃汗之  
為病身體腫發熱汗出而渴狀如風  
水汗沾衣色正黃如蘗汁黃耆桂枝  
苦酒湯類○欬逆倚息不得卧云  
其人形腫者苓甘姜味辛夏仁湯四  
○大病差後從腰已下有水氣者牡  
蠣澤瀉散五○肺癰胸滿脹一身面  
目浮腫鼻塞葶藶大棗湯頁

右十三法，一身水腫，或小便不利証。

○妊娠有水氣，身重，小便不利，洒淅惡寒，起即頭眩，葵子茯苓散。○腎著之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水狀，及不渴，小便自利，苓姜朮甘湯。○黃汗之病，云云，從腰以上必汗出，下無汗，腰髀弛痛，如有物在皮中狀，桂枝加黃耆湯。○陽明病，脈浮而緊，咽燥口苦，腹滿而喘，發熱汗出，不惡寒，反惡熱，身重，心中懊懣，舌上胎者，梔子豉湯。○少陰病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四支沈重，疼痛，自下利者，此為有水氣，真武湯。○陽明病，脈遲，雖汗出，不惡寒者，其身必重，短氣，腹滿而喘，有潮熱，小承氣湯。○傷寒八九

日，下之，胸滿煩驚，小便不利，譫語，一身盡重，不可轉側者，此胡加龍骨牡蠣湯。

右七法，一身重，或痛証。

○短氣門

○胸痹，胸中氣塞，短氣者，枳實芍藥散。○全證，橘皮枳實生姜湯。○夫短氣，有微飲，當從小便去之，八味丸。○全證，苓桂朮甘湯。○風濕相搏，骨節煩疼，掣痛，不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，桂枝甘草附子湯。○陽明中風，脈弦浮大而短氣，腹都滿，脇下及心痛，小茈胡湯。○麻黃湯。○陽明病，脈遲，雖汗出，不惡寒者，其身必



重短氣腹滿而喘有潮熱大承氣湯  
葶小承氣湯云○太陽病脉浮而動  
數膈內拒痛短氣燥煩心中懊憹心  
下因鞭則為結胸大陷胸湯云○胸  
痺之病喘息欬唾胸背痛短氣者括  
蕪薤白酒湯云○太陽中風下利  
嘔逆云乾嘔短氣汗出不惡寒者  
十棗湯云

右十法短氣或汗出身痛証

○發汗吐下後虛煩不得眠心中懊  
憹若少氣者梔子甘艸豉湯云○傷  
寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉  
石膏湯云

右二法少氣証

○咽痛門 附咽喉不利

○少陰病咽中痛者半夏散及湯云  
○少陰病二三日咽痛者甘艸湯云  
○全證不差者桔梗湯云○少陰病  
咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦  
酒湯主之云○少陰病下利清穀裏  
寒外熱手足厥逆云或咽痛者通  
脉四逆湯云○少陰病下利咽痛胸  
滿心煩者猪膚湯云

右六法咽中痛証

○病如桂枝証頭不痛項不强胸中  
痞鞭氣上衝咽喉不得息者瓜蒂散  
耳云○欬逆倚息不得卧云手足厥  
逆氣從小腹上衝胸咽手足痺云  
苓桂五味甘艸湯云

右二法上衝咽証

○大逆上氣咽喉不利者麥門冬湯

頁○婦人咽中如有炙燔半夏厚朴湯啐○狐惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐甘州瀉心湯共

右三法咽不利証

○血證門附經水不調

○心氣不定吐血衄血者瀉心湯  
○吐血不止者栝葉湯  
○吐血衄血者黃土湯  
○下血先便後血此遠血也同方  
○下血先血後便此近血也赤小豆當歸散  
○虛勞裡急悸衄腹中痛夢失精  
○傷寒脉浮緊不發汗因致衄者麻黃湯  
○傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯  
其小便清者

知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄桂枝湯

右八法吐血衄血証

○太陽病六七日表証仍在脉微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈抵當湯  
○太陽病身黃脉沈結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血証諦也同方  
○陽明証其人喜忘者必有畜血也同方  
○病人無表裏証發熱七八日至六七日不大便者有瘀血也同方  
○產婦腹痛以枳實芍藥散  
假令不愈者此為腹中有乾血著臍下下瘀血湯  
○傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也抵當丸

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者此為水與血俱結在血室也。大黃甘遂湯。○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈。但少腹急結者桃核承氣湯。○陽明病云但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯。卒

右九法  
瘀血証

○婦人中風七八日續得寒熱為熱入血室其血必結小茈胡湯。六。○婦人經水不利下者抵當湯。○經水不利下瘀血湯。○婦人宿有癥病經水斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者桂枝茯苓丸。○婦人有漏下者或半產後因續下血都不

絕者有妊娠下血者芎歸膠艾湯。○惡寒脈微而復利利止亡血也四逆加人參湯。○婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物者礬石丸。○帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者土瓜根散。○

右八法經水不  
調或亡血証

### ○不仁門

○寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治烏頭桂枝湯。○血痺病云身體不仁如風痺之狀黃耆桂枝五物湯。○脚氣上入小腹不仁者八味丸。○二陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讖語遺尿白虎湯。○

不仁

右四法  
不仁証

○心中懊懣門

○發汗吐下後，虛煩不得眠，若劇者，必反覆顛倒，心中懊懣者，梔子豉湯。填若少氣者，梔子甘草豉湯。填若嘔者，梔子生姜豉湯。○陽明病，下之，其外有熱，手足溫，不結胸，心中懊懣，饑不能食，但頭汗出者，梔子豉湯。填

○陽明病，脈浮而緊，咽燥，口苦，腹滿而喘，心中懊懣，舌上胎者，同方。○黃疸，心中懊懣，或熱痛者，梔子大黃豉湯。填

○陽明病，下之，心中懊懣而煩，胃中有燥屎者，大承氣湯。○太陽病，脈浮而動數，膈內拒痛，短氣躁煩，心中懊懣，心下因鞭，則為結胸，大陷

胸湯 十一

右六法，心中懊懣証

○身瞤門

○太陽病，發汗，汗出不解，其人仍發熱，心下悸，頭眩，身瞤動，振振欲擗地者，真武湯。○黃汗之病，云云，若身重，汗出已輒輕者，久久必身瞤，即胸中痛。云云，桂枝加黃耆湯。○太陽中風，脈緊發熱惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁者，大青龍湯。填若脈微弱，汗出惡風者，不可服，服之則厥逆筋惕肉瞤，此為逆也。

右三法身瞤証

○不得眠門 附 卧起不安

○虛勞虛煩，不得眠者，酸棗仁湯。○太陽病，發汗後，大汗出，胃中乾，煩

躁不得眠若小便不利微熱消渴者  
五苓散得○少陰病下利六七日欬  
而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯得○  
下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜  
而安靜不嘔不渴無表証乾姜附子  
湯得○發汗吐下後虛煩不得眠若  
劇者必反覆顛倒心中懊憹者梔子  
豉湯得若少氣者梔子甘艸豉湯得  
若嘔者梔子生薑豉湯得○陽明病  
脈浮緊咽燥口苦腹滿而喘云云若  
加燒鍼必怵惕不得眠云云梔子豉  
湯得○欬逆上氣時時唾濁但坐不  
得眠者皂莢丸得  
右七法煩躁  
不得眠証  
○產後腹痛煩滿不得卧者枳實芍  
藥散得○婦人病飲食如故煩熱不

得卧而反倚息者八味丸得○少陰  
病得之二三日以上心中煩不得卧  
者黃連阿膠湯得○胸痺不得卧心  
痛徹背者枳實薤白半夏湯得○肺  
癰喘不得卧者葶藶大棗湯得○欬  
逆倚息不得卧者小青龍湯得○病  
人小便不利大便乍難乍易時有微  
熱喘冒不能卧者有燥屎也大承氣  
湯得

右七法不  
得卧証

○傷寒下後心煩腹滿卧起不安者  
梔子厚朴湯得○狐惑之為病狀如  
傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安  
蝕於喉為惑蝕於陰為狐蝕於上部  
則聲啞甘艸瀉心湯得○蝕於下部  
咽乾苦參湯得洗之蝕於肛者雄黃

長沙醫集  
卷之四  
五十四

薰之去○傷寒脉浮醫以火迫劫之必驚狂起卧不安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯碎

右三法斷起不安証

○譫語門

○陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎也大承氣湯碎○汗出譫語者以有燥屎在胃中也同方○傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀但發熱譫語者同方○二陽併病太陽証罷但發潮熱手足漿漿汗出大便難而譫語者同方○陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譫語者小

承氣湯碎○大便不通噓數譫語者

同方○產後七八日無太陽証少腹堅痛此惡露不盡不大便煩躁發熱食則譫語至夜即愈同方○下利譫

語者有燥屎也同方○陽明病譫語發潮熱脉滑而疾者同方○傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也調

胃承氣湯碎○傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急若胃氣不和譫語者同方○傷寒八九日下之

胸滿煩驚小便利譫語一身盡重不可轉側者此胡加龍骨牡蠣湯碎○二陽合病腹滿身重難以轉側口

不仁而面垢譫語遺尿白虎湯碎○本太陽病不解脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下者小此胡湯

國字本

六若已吐下發汗溫鍼譫語此胡証  
罷此為壞病以法治之  
右十四法譫語  
或有燥屎証

○發狂門

○太陽病六七日表証仍在脈微而  
沈反不結胸其人發狂者以熱在下  
焦少腹當鞞滿小便自利者下血乃  
愈抵當湯全○太陽病身黃脈沈結  
少腹鞞小便不利者為無血也小便  
自利其人如狂者血証諦也同方○  
太陽病不解熱結膀胱其人如狂血  
自下下者愈但小腹急結者乃可攻  
之桃核承氣湯研

○傷寒醫以火迫劫之必驚狂起卧

右三法有痰  
血發狂証

不安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡  
蠣湯共○傷寒八九日下之胸滿煩  
驚小便不利譫語一身盡重不可轉  
側者此胡加龍骨牡蠣湯碎

右二法  
驚狂証

○癰膿門附肺痿

○欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時  
出濁唾腥臭久久吐膿寒如米粥者  
為肺癰桔梗湯全○全證桔梗白散  
碎○肺癰喘而不得卧者葶藶大棗  
湯夏○肺癰胸滿脹一身面目浮腫  
鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上  
氣喘鳴迫塞同方○欬有微熱煩滿  
胸中甲錯是為肺癰葶藶湯全○癰  
膿以麥粥下之枳實芍藥散碎

長沙醫集 癰膿 卷六

右六法  
肺癰証

○腸癰者小腹腫按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒也  
○腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脉數此為腸內有癰膿  
○附子敗醬散二十五

右二法  
腸癰証

○肺痿吐涎沫者桂枝去芍藥加皂莢湯廿  
○肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴者生姜甘州湯卒  
○肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數甘州乾姜湯三

右三法  
肺痿証

○蛇蟲門

○蛇之為病令人吐涎心痛發作有時甘州粉蜜湯八  
○小兒疳虫蝕齒一方廿七  
○蛇厥者其人當吐蛇冷病者靜而復煩烏梅圓五

右三法  
蛇虫証

○陰疾門

○溫陰中坐藥蛇牀子散廿  
○少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯廿  
○陰狐疝氣者偏有大小時時上下蜘蛛散廿  
○寒疝腹中絞痛拘急不得轉側發作有時使入陰縮手足厥逆烏頭湯昇  
○夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落桂枝加龍骨牡蠣湯廿  
○風水脉浮為在表其人或頭汗出表無他病病者



但下重從腰以上為和腰以下當腫  
及陰難以屈伸防已黃耆湯百六○狐  
惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不  
得閉起卧不安蝕於陰為狐苦參湯  
百四洗之雄黃薰百三○陰癰腫土瓜根  
散百五○胃氣下泄陰吹而喧者猪膏  
髮煎百六

右九法  
陰病証

○留飲門

○病懸飲者十棗湯百三○支飲胸滿  
者厚朴大黃湯百四○支飲不得息者  
葶藶大棗湯百五○病溢飲者當發其  
汗大青龍湯百六○小青龍湯百七

右四法  
留飲証

○宿食門

○宿食在上脘當吐之瓜蒂散百一○  
有宿食當下之大承氣湯百二○大病  
差後勞復者若有宿食者枳實梔子  
豉湯百三

右三法  
宿食証

○雜門

○婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈  
所作數欠伸者甘麥大棗湯百四

右一法

○火邪桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡  
蠣湯百五

右一法

○脚氣冲心者礬石湯百六

右一法

攝灘 福岡貞勝良察 再

全 濱田天祐吉夫 校

浪速 奧田元純謙安 校

長沙正經證彙終

長沙正經證彙諸方

播磨 田中榮信愿仲 編選

攝津 奧田元純謙安 校

一 小半夏湯 半夏升 生姜升

右二味以水七升煮取一升半分

温再服

二 小半夏加茯苓湯 加茯苓三兩

大半夏湯 半夏升 白蜜升

人參兩 右三味以水一斗二升

和蜜揚之二百四十遍煮取二升

半温服一升餘分再服

四 吳茱萸湯 吳茱萸升 人參兩

生姜兩 大棗枚 右四味以

水七升煮取二升去滓温服七合

日三服

五 大黃甘艸湯 大黃兩四 甘艸兩一  
右二味以水三升煮取一升分温再服

六 小茈胡湯 茈胡半 黃芩兩三  
人參 甘艸兩三 半夏兩半

七 乾姜人參半夏丸 乾姜 人參各兩  
半夏兩二 右三味末之以生

八 乾姜黃連黃芩人參湯 乾姜  
黃芩 黃連 人參各兩三 右四  
味以水六升煮取二升去滓分温再服

九 葛根湯 葛根兩四 麻黃兩三 桂枝  
芍藥兩二 生姜兩三 甘艸兩二  
大棗兩二 右七味以水一斗先煮葛麻減二升去沫內諸藥煮取三升去滓温服一升覆取微似汗

十 葛根加半夏湯 加半夏半升  
桂枝湯 桂枝 芍藥 生姜兩三  
甘艸兩二 大棗兩二 右伍味以

咀以水柒升微火煮取三升去滓適寒温服一升服已須更飲熱稀粥一升餘以助藥力温覆令二時許

十一 桂枝加桂湯 加桂二兩

十二 桂枝加芍藥湯 加芍藥三兩

十三 桂枝去芍藥湯 去芍藥

桂枝加葛根湯 加葛根四兩

桂枝加黃耆湯 加黃耆二兩

桂枝加附子湯 加附子一枚

桂枝去芍藥加附子湯 去芍藥加附子一枚

桂枝加厚朴杏子湯 加厚朴二兩杏仁五十個

桂枝去芍藥加皂莢湯 去芍藥加皂莢二枚

桂枝加芍藥大黃湯 加大黃一兩芍藥三兩

桂枝加龍骨牡蠣湯 加龍骨牡蠣各三兩

桂枝加芍藥生薑人參湯 加芍藥生薑各一兩人參三兩

桂枝去桂加茯苓朮湯 加茯苓朮各三兩去桂

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 桂枝生薑 蜀漆兩三 甘草兩二 龍骨兩四 牡蠣兩五 大棗廿枚 右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

半夏瀉心湯 半夏半升 黃連兩一 黃芩 人參 乾姜 甘草兩三 大棗十二 右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

甘艸瀉心湯 半夏瀉心湯方內加甘艸一兩

生薑瀉心湯 半夏瀉心湯方內減

乾姜二兩加生姜三兩  
十棗湯 芫花 甘遂 大戟各等

右三味各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕贏人服半錢溫服之平且服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

大茈胡湯 茈胡碎 半夏半

黃芩 芍藥各三 生姜兩

枳實四 大黃兩 大棗十二

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

黃芩人參湯 黃芩 人參 乾姜

各三 桂枝兩 半夏半 大棗

十二枚 右六味以水七升煮取三升分溫三服

黃芩湯 黃芩三 芍藥 甘艸各

兩 大棗十二 右四味以水一

斗煮取三升去滓溫服一升

黃芩加半夏生姜湯 加半夏半升

生姜三兩

四逆湯 甘艸兩 乾姜半兩

附子一枚 右三味以水三升

煮取一升二合去滓分溫再服強

人可大附子一枚乾姜三兩

四逆加人參湯 加人參一兩

茯苓四逆湯 茯苓兩 人參兩

甘艸兩 乾姜半兩 附子一枚

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

八

通脉四逆湯

甘艸兩 乾姜兩

附子一枚 右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服

九

通脉四逆加猪膽汁湯 加猪膽汁

半合如無猪膽以羊膽代之

十

白通加猪膽汁湯 葱白四莖 乾姜

兩 附子一枚 人尿合 猪膽汁

合 已上三味以水三升煮取一

升去滓內膽汁人尿和令相得分

十一

附子粳米湯 附子一枚 半夏半

兩 甘艸兩 大棗枚 粳米半

右五味以水八升煮米熟湯成去滓温服一升日三服

十二

黃連湯 黃連 桂枝 甘艸

乾姜各三兩 半夏半 人參兩

十三

茯苓澤瀉湯

茯苓半斤 澤瀉兩

甘艸 桂枝各二兩 朮三兩 生姜

兩 右六味以水一斗煮取三升

內澤瀉再煎取二升半温服八合日三服

十四

文蛤散

文蛤兩 右一味為散以

沸湯和一錢匕服湯用五合

十五

猪苓湯

猪苓 茯苓 阿膠

滑石 澤瀉各一斤 右五味以水

四升先煮四味取二升去滓內下

十六

猪苓散

猪苓 茯苓 朮各等

右三味杵為散飲服方寸匕日三

大棗樹 右七味以水一斗煮

取六升去滓温服一升日三服夜

二服

長沙遺書

卷三

服

五苓散

猪苓

茯苓

朮各銖

澤瀉

銖兩六

桂枝

右五味

為末白飲和服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈

芫胡加苾硝湯

於小芫胡湯方內

加苾硝六兩

真武湯

茯苓

芍藥

生姜各兩

朮兩

附子枚

右五味以水八

升煮取三升去滓温服七合日三服

白虎加桂枝湯

於白虎湯方內加

桂枝一兩

芫胡加桂枝湯

芫胡兩

半夏合

半

甘州兩

大棗枚

桂枝

人參

生姜

黃芩

芍藥各兩半

竹葉石膏湯

竹葉把

石膏觔

半夏

人參兩

麥門冬升

甘州兩

粳米

右七味以水

一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米温服一升日三服

甘州乾姜湯

甘州兩

乾姜兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服

小青龍湯

麻黃

芍藥

乾姜

桂枝

細辛

甘州兩

半夏

五味子各半

右八味以水一

斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓温服一升

半夏乾姜散

半夏

乾姜各等

長沙醫藥

卷三

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之

皂莢丸 皂莢兩八 右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三九日三服夜一服

苓甘姜味辛夏湯 茯苓兩四 甘艸兩二 乾姜兩二 五味子升 細辛兩二 半夏升 右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服

甘艸粉蜜湯 甘艸兩二 粉兩一 蜜兩四 右三味以水三升先煮甘艸取二升去滓內粉蜜攪合和煎如薄粥溫服一升

人參湯 一名理中丸 人參兩三 甘艸兩三 乾姜兩三 朮兩三 右四味以水八升煮取三升溫服一升

日三服

生薑甘艸湯 生薑兩五 甘艸兩四 人參兩三 大棗樹五 右四味以水七升煮取三升分溫三服

桔梗湯 桔梗兩一 甘艸兩二 右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服

桔梗白散 桔梗 貝母各三 巴豆分 右三味為末內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者吐膿血膈下者瀉出

梔子生薑豉湯 於梔子豉湯方內加生薑五兩

半夏厚朴湯 半夏升 厚朴兩三 茯苓兩四 生薑兩五 乾蘓葉兩二

長沙證彙



右五味以水七升煮取四升分温四服

五 茯苓飲 茯苓 人參 朮各三兩

枳實兩二 橘皮兩二 生姜兩四

右六味以水六升煮取一升八合分温三服如人行八九里進之

六 橘皮大黃朴消湯 橘皮兩一 大黃

朴消兩二 右三味以水一大

升煮至小升頓服

七 生姜半夏湯 半夏兩一 生姜汁升一

右二味以水三升煮半夏取二升

內生姜汁煮取一升半小冷分四

服日三服夜一服嘔止停後服

八 調胃承氣湯 大黃兩四 甘艸兩二

芒硝兩一 右三味以水三升

煮取一升去滓內芒硝更上火微

煮令沸少少温服

九 旋覆花代赭石湯 旋覆花 甘艸

各三兩 代赭石兩一 人參兩二 半

夏兩一 半夏兩五 大棗兩二

右件七味以水一斗煮取六升去

滓再煎取三升温服一升日三服

辛 橘皮湯 橘皮兩一 生姜兩一 右二

味以水七升煮取三升温服一升

下咽即愈

辛 橘皮竹茹湯 橘皮兩一 竹茹兩一 生

姜兩一 大棗兩十 甘艸兩一

右六味以水一斗

煮取三升温服一升日三服

辛 小承氣湯 大黃兩四 枳實兩三 厚

朴兩二 已上三味以水四升煮取

一升二合去滓分温二服初服湯

當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

三 大承氣湯 大黃兩 厚朴半 枳實<sup>五枚</sup> 芒硝<sup>三</sup> 右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

四 桂枝附子湯 桂枝兩 大棗<sup>十二</sup> 甘草 生姜<sup>各三</sup> 附子<sup>一枚</sup> 右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

五 桂枝附子去桂加朮湯 去桂加朮四兩 右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服二服都盡其人如冒狀勿怪即朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

六 蜜煎導 蜜<sup>七</sup> 右一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀擾之勿焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

七 猪膽汁方 大猪膽<sup>一枚</sup> 瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出

八 麻仁丸 麻子仁<sup>半</sup> 芍藥<sup>半</sup> 厚朴<sup>一</sup> 枳實<sup>半</sup> 大黃<sup>一斤</sup> 杏仁<sup>一升</sup> 右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十九日三服漸加以知為度

九 厚朴三物湯 厚朴<sup>八</sup> 枳實<sup>五</sup> 大黃<sup>四</sup> 右三味以水一斗二升

十 長沙瘧瘵

十一

十二

先煮二味取五升內大黃煮取二升溫服一升以利為度

抵當湯 水蛭 蠱虫各三箇 桃仁

二十 大黃兩 右四味為末以

水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

茯苓戎鹽湯 茯苓半 戎鹽大彈丸

一枚 朮兩 右三味先將茯苓朮

煎成入鹽再煎分溫三服

蒲灰散 蒲灰分 滑石分 右二

味杵為散飲服方寸匕日三服

滑石白魚散 滑石 白魚各二

亂髮燒二 右三味杵為散飲服

方寸匕日三服

桃花湯 赤石脂斤 乾姜兩 粳

米升 右三味以水七升煮米令

熟去滓溫服七合內赤石脂末方寸匕日三服一服愈勿服

八味丸 乾地黄兩 澤瀉 茯苓

各三 山茱萸 薯蕷各四 桂

枝 附子各一 牡丹皮兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日再服

桂枝甘肅附子湯 甘肅 朮各二

附子枚 桂枝兩 右四味以水

六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則愈

葵子茯苓散 葵子斤 茯苓兩

右二味杵為散飲服方寸匕日三

服小便利則愈

越婢湯 麻黃六 石膏半 生姜

三 甘肅兩 大棗十五 右五

長沙登覽

味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

越婢加水湯 加水四兩又加附子一枚

越婢加半夏湯 加半夏半升

大黃硝石湯 大黃 消石 黃蘗

略四 梔子十五枚 右四味以水

六升煮取三升去滓內消石更煎取一升頓服

茵陳蒿湯 茵陳蒿六兩 梔子十四

大黃兩 右三味以水一斗先煮

茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

小建中湯 桂枝 甘艸 生姜各

芍藥兩 大棗十二 膠飴

一升 右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服

四 芫胡桂枝乾姜湯 芫胡半 甘艸

兩 黃芩 乾姜 桂枝 牡蠣

略三 括蕒根兩 右七味以水

一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

五 芫胡加龍骨牡蠣湯 芫胡兩 半

夏合 人參 桂枝 龍骨 牡

蠣 茯苓 鈎丹 生姜略半

大黃兩 大棗六枚 右十一味以

水八升煮取四升內大黃更煮取二升去滓溫服一升

六 括蕒瞿麥丸 括蕒根兩 瞿麥兩

附子枚 茯苓 薯蕷各三

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服

三九日三服不知增至七八九以

小便利腹中温為知

碎 苓桂五味甘艸湯 茯苓 桂枝各

兩 五味子半 甘艸兩 右四

味以水八升煮取三升去滓分温

三服

碎 歸母苦參丸 當歸 貝母 苦參

各四 右三味末之煉蜜丸如小

豆大飲服三九加至十九

碎 大黃甘遂湯 大黃兩 甘遂 阿

膠兩 右三味以水三升煮取

一升頓服之其血當下

百 苓姜朮甘湯 茯苓 乾姜各四

朮 甘艸兩 右四味以水五

百 芍藥甘艸湯 芍藥 甘艸各四

升煮取三升分温三服腰中即温

右二味咬咀以水三升煮取一升

半去滓分温再服之

百 大黃牡丹湯 大黃兩 牡丹兩

桃仁五十 瓜子半 芒硝三

右五味以水六升煮取一升去滓

內芒硝再煎沸頓服之有膿當下

如無膿當下血

百 抵當丸 水蛭二十 蟅虫二十

桃仁二十 大黃三 右四味杵

分為四丸以水一升煮一丸取七

合服之啐時當下血若不下更服

百 苓桂朮甘湯 茯苓兩 桂枝三

朮兩 甘艸兩 右四味以水六

升煮取三升去滓分温三服

夏

苓甘姜味辛夏仁黃湯 茯苓兩

甘艸兩 乾姜兩 五味子半

細辛兩 半夏 杏仁脍半 大

黃兩 右八味以水一斗煮取三

升去滓溫服半升日三服

夏

大建中湯 蜀椒合 乾姜兩 人

參兩 右三味以水四升煮取二

升去滓內膠飴一升微火煎取一

升半分溫再服如一炊頃可飲粥

二升後更服當一日食糜溫覆之

夏

瓜蒂散 瓜蒂 赤小豆各一

右二味各別搗篩為散已合治之

取一錢匕以香豉一合用熱湯七

合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓

服之不吐者少少加得吐乃止

夏

麥門冬湯 麥門冬升 半夏升

人參 甘艸兩 粳米合 大

棗樹 右六味以水一斗二升煮

取六升溫服一升日三服夜一服

夏

葶藶大棗湯 葶藶丸如 大棗

樹二 右先以水三升煮棗取二

升去滓內葶藶煮取一升頓服

夏

桂枝枳實生姜湯 桂枝 生姜各

兩 枳實兩 右三味以水六升

煮取三升分溫三服

夏

枳實薤白桂枝湯 枳實兩 厚朴

兩 括蕞實枚 薤白半 桂枝

兩 右五味以水五升先煮枳朴

取二升去滓內諸藥數沸分溫三

服

夏

三物備急圓 大黃 乾姜各一

巴豆分 右藥各須精新先搗大

黃乾姜為末研巴豆肉中合治一  
千杵用為散蜜和丸亦佳密器中  
貯之莫令散氣

三 走馬湯 巴豆 杏仁 楮 二 右二

味以綿纏槌令碎熱湯二合捻取  
白汁飲之當下老少量之

四 當歸芍藥散 當歸 芍藥 各一斤

茯苓 朮 各四兩 澤瀉 芍藥 各一斤  
作三兩 右六味杵為散取方寸  
匕酒和日三服

五 芎歸膠艾湯 芎窮 阿膠 甘

艸 艾葉 當歸 各二兩 乾地黄  
各兩 芍藥 各四兩 右七味以水五升  
清酒五升合煮取三升去滓內膠  
令消盡溫服 升日三服不差更  
作

六 枳實芍藥散 枳實 芍藥 各等

右二味杵為散服方寸匕日三服  
并主癰膿以麥粥下之

七 下瘀血湯 大黃 桃仁 各二十

枚 蟅虫 各十枚 右三味末之煉蜜和  
為四丸以酒一升煎一丸取八合  
頓服之新血下如豚肝

八 烏頭桂枝湯 烏頭 桂枝 各五

兩 右一味以  
蜜二升煎減半去滓以桂枝湯五  
合解之得一升後初服二合不知  
即服三合又不知復加至五合其  
知者如醉狀得吐為中病

九 大烏頭煎 烏頭 各一枚 右以水三

升煮取一升去滓內蜜二升煎令  
水氣盡取二升強人服七合弱人  
五合不差明日更服不可一日再

服  
烏頭湯 麻黃 芍藥 黃耆 甘

川烏頭五枚 炙咀以蜜

升煮取一升去滓內蜜煎中更煎

之服七合不知盡服之

當歸生薑羊肉湯 當歸三 生薑

兩五 羊肉斤 右三味以水八升

煮取三升溫服七合日三服

當歸建中湯 當歸兩 芍藥六

桂枝 生薑兩 甘草兩 大

棗枚 二 右六味以水一斗煮取

三升分溫三服加飴糖六兩湯成

內之於火上煖令飴消

厚朴七物湯 厚朴斤 枳實枚

甘草兩 大黃兩 三 桂枝兩 生

姜兩 五 大棗枚 右七味以水一

斗煮取四升溫服八合日三服

厚朴生薑甘草半夏人參湯 半夏

厚朴 生薑各半 人參兩

甘草兩 二 右五味以水一斗煮取

三升去滓溫服一升日三服

已椒薑黃丸 防已 椒目 大黃

葶藶兩 一 右四味末之蜜丸如

梧子大先食飲服一九日三服稍

增

六 梔子厚朴湯 梔子枚 四 厚朴兩

枳實枚 四 已上三味以水三升半

煮取一升半去滓分三服溫服

梔子鼓湯 梔子枚 四 香鼓兩

右二味以水四升先煮梔子得二



消礬散

消石 礬石各等 右二

味為末以大麥粥汁和服方寸匕  
日三服病隨大小便去小便正黃  
大便正黑是候也

桃核承氣湯

桃仁五十 大黃兩

桂枝 芫硝 甘艸各二 右五  
味以水七升煮取二升半去滓內  
芫硝更上火微沸下火先食溫服  
五合日三服當微利

天雄散

天雄 龍骨各三 桂枝

兩 朮兩 右四味杵為散酒服  
半錢匕日三服不知稍增之

大陷胸湯

大黃兩 芫硝升 甘

遂錢一 右三味以水六升先煮大  
黃取二升去滓內芫硝煮一兩沸

內甘遂末溫服一升得快利止後  
服

土瓜根散

土瓜根 芍藥 桂枝

麋虫各三 右四味杵為散酒服  
方寸匕日三服

大陷胸丸

大黃半 葶藶半 芫

硝 杏仁各半 右四味搗篩二  
味內杏仁芫硝合研如脂和散取

如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕  
自蜜二合水二升煮取一升溫頓  
服之一宿乃下如不下更服取下  
為度

小陷胸湯

黃連兩 半夏半 枳

實一枚 右三味以水六升先  
煮枳實取三升去滓內諸藥取二  
升去滓分溫三服

長沙燈籠

后

茯苓杏仁甘艸湯 茯苓兩三 杏仁

五十 甘艸兩一 右三味以水一

斗煮取五升溫服一升日三服不

差更服

橘皮枳實生姜湯 橘皮斤一 生姜

半斤 枳實兩三 右三味以水五升

煮取二升分溫再服

薏苡附子散 薏苡仁兩五 附子

枳 右二味杵為散方寸匕日三

括蕪薤白半夏湯 括蕪實枚一 薤

白兩三 半夏半斤 白酒斗 右四

味同煮取四升溫服一升日三服

括蕪薤白白酒湯 括蕪實枚一 薤

白半斤 白酒斗 右三味同煮取

二升分溫再服

桂枝人參湯 桂枝 甘艸各四

朮 人參 乾姜各兩三 右五味

以水九升先煮四味取五升內桂

更煮取三升溫服一升日再服夜

一服

赤石脂禹餘糧湯 赤石脂斤一 禹

餘糧斤一 已上二味以水六升煮

取二升去滓三服

大黃黃連瀉心湯 大黃兩二 黃連

兩一 右二味以麻沸湯二升漬之

須臾絞去滓分溫再服

瀉心湯 大黃兩二 黃連 黃芩各

兩一 右三味以水三升煮取一升

頓服之

附子瀉心湯 黃連 黃芩各一

大黃兩二

附子枚一

右四味切三

味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

**木防已湯** 木防已三兩 石膏雞子大

桂枝二兩 人參兩 右四味以水六升煮取二升分溫再服

**木防已去石膏加茯苓芫花湯** 去石膏加茯苓四兩芫花三合

**桂姜棗艸黃辛附湯** 桂枝 生姜 甘艸 麻黃各三兩 細辛二兩 大棗二枚 附子一枚 右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如虫行皮中即愈

**枳朮湯** 枳實一枚 朮二兩 右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中臍即當散也

**甘遂半夏湯** 甘遂一枚 半夏半升 芍藥五枚 甘艸指一枚 右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

**赤丸** 茯苓 半夏各四兩 烏頭細辛各二兩 右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大先食酒飲下三丸日再服夜一服不知稍增之以知為度

**麻黃湯** 麻黃三兩 桂枝二兩 甘艸二兩 杏仁十枚 右四味以水九升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微汗

**厚朴大黃湯** 厚朴尺 大黃兩 枳實四枚 右三味以水二升煮取

右三味以水二升煮取

一升分温再服

茯苓五味姜辛湯 茯苓兩 甘艸

乾姜 細辛各三 五味子半

右五味以水八升煮取三升去滓  
温服半升日三服

葶藶湯 葶藶半 桃仁五十 薤

苡仁 瓜瓣各半 右四味以水

一斗先煮葶藶得五升去滓內諸  
藥煮取二升服一升再服當吐如

膿

大黃附子湯 大黃兩 附子枚

細辛兩 右三味以水五升煮取

二升分温三服若強人煮取二升  
半分温三服服後如人行四五里

進一服

半夏麻黃丸 半夏 麻黃各等

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲

服三九日三服

茯苓甘艸湯 茯苓 桂枝各二

甘艸兩 生姜半 右四味以水

四升煮取二升去滓分温三服

桂枝甘艸湯 桂枝兩 甘艸兩

右二味以水三升煮取一升去滓

頓服

茯苓甘棗湯 茯苓半 桂枝兩

甘艸兩 大棗枚五 右四味以

甘爛水一斗先煮茯苓減二升內  
諸藥煮取三升去滓温服一升日三

服作甘爛水法取水二斗置大盆

內以杓揚之水上有珠子五六千

顆相逐取用之

大青龍湯 麻黃兩 桂枝 甘艸

略二 杏仁個十 生姜兩三 大  
棗樹二 石膏雞子大 右七味以  
水九升先煮麻黃減二升去上沫  
內諸藥煮取二升去滓溫服一升  
取微似汗

桂枝二越婢一湯 桂枝 芍藥  
甘艸 麻黃各銖 生姜三銖  
石膏二銖 大棗枚 右柒味咬  
咀以五升水煮麻黃一二沸去上  
沫內諸藥煮取二升去滓溫服一  
升

桂枝麻黃各半湯 桂枝一兩十銖  
麻黃 芍藥 甘艸 生姜各一兩  
杏仁二十個 大棗枚 右七味以  
水五升先煮麻黃一二沸去上沫  
內諸藥煮取一升捌合去滓溫服

陸合

芍藥甘艸附子湯 芍藥 甘艸各  
兩 附子一枚 已上三味以水五  
升煎取一升五合去滓分溫服

附子湯 附子二枚 人參二兩 朮四兩  
茯苓 芍藥各三兩 右五味以水  
八升煮取三升去滓溫服一升日  
三服

防己黃耆湯 防己兩 黃耆五兩  
朮 生姜各三兩 甘艸二兩 大棗  
十二 右六味以水六升煮取三  
升分溫三服

白虎加人參湯 於白虎湯方內加  
人參三兩

蜀漆散 蜀漆 雲母 龍骨各等  
右三味杵為散未發前以漿服半

長沙遺書

錢  
牡蠣湯 牡蠣 麻黃各四 甘艸

二兩 蜀漆兩 右四味以水八升  
先煮麻黃蜀漆去上沫得六升內  
諸藥煮取二升若吐則勿更服

白通湯 葱白<sub>四</sub> 乾姜<sub>兩</sub> 附子  
一枚 右三味以水三升煮取一升  
去滓分溫再服

白虎湯 知母<sub>兩</sub> 石膏<sub>斤</sub> 甘艸  
兩 粳米<sub>合</sub> 右四味以水一斗  
煮米熟湯成去滓溫服一升日三  
服

當歸四逆湯 當歸 桂枝 芍藥  
各<sub>三</sub> 細辛 通艸 甘艸各<sub>二</sub>  
大棗<sub>五</sub> 附子 右七味以水八升煮  
取三升去滓溫服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生姜湯 加吳  
茱萸二升生姜半斤 右九味以  
水六升清酒六升和煮取伍升去  
滓溫服分五服一方水酒各四升

烏梅圓 烏梅<sub>三百</sub> 細辛<sub>兩</sub> 乾  
姜<sub>兩</sub> 附子 桂枝 人參 黃蘗  
各<sub>六</sub> 右十味異擣篩合治之以  
苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五斗  
米下飯熟擣成泥和藥令相得內  
臼中與蜜杵二千下圓如梧桐子  
大先食飲服十圓日三服稍加至  
二十圓

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯 桂枝<sub>兩</sub>  
甘艸 龍骨 牡蠣各<sub>二</sub> 右四  
味以水五升煮取二升半去滓溫

長沙醫藥

服八合日三服

酸棗仁湯 酸棗仁<sub>二</sub> 甘艸<sub>一</sub>

知母 芎藭 茯苓<sub>各二</sub> 右五

味以水八升煮酸棗仁得六升內

諸藥煮取三升分溫三服

乾姜附子湯 乾姜<sub>一</sub> 附子<sub>一枚</sub>

右二味以水三升煮取一升去滓

頓服

黃連阿膠湯 黃連<sub>二</sub> 阿膠<sub>三</sub>

芍藥<sub>二</sub> 黃芩<sub>一</sub> 雞子黃<sub>二枚</sub>

右五味以水五升先煮三升

升去滓內膠烱盡少冷內

攪令相得溫服七合日三

猪膚湯 猪膚<sub>一</sub> 右一味以水一

斗煮取五升去滓加白蜜一升白

粉五合熬香和相得溫分六服

麻黃加朮湯 於麻黃湯方內加朮

四兩

三物黃芩湯 黃芩<sub>二</sub> 苦參<sub>二</sub>

乾地黄<sub>二</sub> 右三味以水六升煮

取二升溫服多吐下虫

梔子乾姜湯 梔子<sub>四</sub> 乾姜<sub>二</sub>

已上二味以水三升半煮取一升

半去滓分二服溫進一服

桂枝二麻黃一湯 桂枝<sub>七</sub> 麻黃<sub>十</sub>

芍藥<sub>六</sub> 麻黃<sub>六</sub> 生姜<sub>一</sub>

大 杏仁<sub>六</sub> 甘艸<sub>二</sub> 大

棗<sub>五</sub> 右七味以水五升先煮麻

黃一二沸去上沫內諸藥煮取二

升去滓溫服一升日再服

麻黃杏仁甘艸石膏湯 麻黃<sub>四</sub>

杏仁<sub>五十</sub> 甘艸<sub>二</sub> 石膏<sub>半</sub>

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

**煩**黃耆桂枝苦酒湯 黃耆五兩 桂枝芍藥各三兩 右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒隔故也

**煩**麻黃杏仁薏苡甘草湯 麻黃一兩 薏苡仁半兩 甘草一兩 杏仁一兩 右剉麻豆大每服四錢匕水盞半煮八分去滓溫服

**煩**頭風摩散 大附子一枚 塩豨 右二味為散沐了以方寸匕已摩疾上令藥力行

**煩**此胡去半夏加栝蒌湯 於小此胡

湯方內去半夏加栝蒌根四兩

**煩**白頭翁湯 白頭翁二兩 黃栢 黃連 秦皮各三兩 右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服一升

**煩**白頭翁加甘艸阿膠湯 加甘艸阿膠各二兩

**煩**文蛤湯 文蛤 石膏各五兩 麻黃 甘艸 生姜各三兩 杏仁五十粒 大棗十二枚 右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出即愈

**煩**澤瀉湯 澤瀉五兩 朮二兩 右二味

**煩**雞屎白散 雞屎白 右一味為散取方寸匕以水六合和溫服

**煩**葛根黃連黃芩湯 葛根 黃連 黃芩

長沙論要 卷之...



三 黃芩 甘艸 各二 右四味

以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

一物瓜蒂湯 瓜蒂 二十 右剉以

水一升煮取五合去滓頓服

麻黃醇酒湯 麻黃 三 右一味以

美清酒五升煮取二升半頓服盡

猪膏髮煎 猪膏 斤 乱髮 如雞子 大 三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

梔子蘘皮湯 梔子 五枚 黃蘘 二

甘艸 一 右三味以水四升煮取

一升半去滓分溫再服

麻黃連翹赤小豆湯 麻黃 連翹

生姜 各二 甘艸 一 赤小豆

生梓白皮 各一 杏仁 四十 大

棗 十二 已上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮

取三升分溫三服半日服盡

梔子大黃豉湯 梔子 枚 二 大黃

一 枳實 梔 豉 升 右四味以

水六升煮取二升分溫三服

麻黃甘艸湯 麻黃 兩 四 甘艸 兩 二

右二味以水五升先煮麻黃去上

沫內甘艸煮取三升溫服一升

防已茯苓湯 防已 黃耆 桂枝

各三 甘艸 兩 茯苓 兩 右五

味以水六升煮取二升分溫三服

麻黃附子甘艸湯 麻黃 甘艸 各

兩 附子 枚 右三味以水七升

先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升日三服

黃耆建中湯 於小建中湯方內加

黃耆一兩半

苓甘姜味辛夏仁湯 茯苓兩 甘

艸 乾姜 細辛 略三 五味子

半夏 杏仁 略半 右七味以水

一斗煮取三升去滓溫服半升日

三服

牡蠣澤瀉散 牡蠣 澤瀉 括蘂

根 商陸根 蜀漆 葶藶 海

藻 各等 右七味異擣下篩為散

更入臼中治之白飲和服方寸匕

小便利止後服日三服

梔子甘艸豉湯 於梔子豉湯方內

加入甘艸二兩

半夏散及湯 半夏 桂枝 甘艸

各等 已上三味各別擣篩已合

治之白飲和服方寸匕日三服若

不能散服者以水一升煎七沸內

散兩方寸匕更煎三沸下火令冷

少少嚥之

甘艸湯 甘艸兩 右一味以水三

升煮取一升半去滓溫服七合日

二服

苦酒湯 半夏枚四 雞子枚

右二味內半夏著苦酒中以雞子

殼置刀環中安火上令三沸去滓

少少含嚥之不差更作三劑

栝葉湯 栝葉 乾姜 略二 艾三

右三味以水五升取馬通汁一升

合煮取一升分溫再服

黃土湯 甘艸 乾地黄 附子

朮 阿膠 黃芩 略三 竈中黃

長沙醫藥

土辟 右七味以水八升煮取三升分温二服

十一 赤小豆當歸散 當歸耐 赤小豆

丸 右二味杵為散漿水服方寸匕日三服

十二 桂枝茯苓丸 桂枝 茯苓 牡丹

桃仁 芍藥各等 右五味末

煉蜜和丸如兔屎大每日食前服

一丸不知加至三丸

十三 礬石丸 礬石分三 杏仁分 右二

味末之煉蜜和丸棗核大內藏中

劇者再內之

十四 黃耆桂枝五物湯 黃耆 桂枝

芍藥各三 生姜兩 大棗枚

右五味以水六升煮取二升温服

七合日三服

十五 雄黃薰 雄黃 右一味為末筒瓦

二枚合之燒向肛熏之

十六 蝕齒方 雄黃 葶藶 右二味末

之取臘日猪脂鎔之以槐枝綿裹

頭四五枚點藥烙之

十七 蛇牀子散 蛇牀子 右一味末之

以白粉少許和令相得如棗大綿

裹內之自然温

十八 狼牙湯 狼牙兩 右一味以水四

升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯

瀝陰中日四遍

十九 蜘蛛散 蜘蛛樹 桂枝兩

右二味為散取八分一匕飲和服

日再服蜜丸亦可

二十 枳實梔子鼓湯 枳實枚 梔子耐

枚 鼓升 右三味以清漿水七

長沙醫藥

升空煮取四升內枳實梔子煮取  
二升下鼓更煮五六沸去滓温分  
再服覆令微似汗

甘麥大棗湯 甘艸<sub>三</sub> 小麥<sub>升</sub>

大棗<sub>樹</sub> 右三味以水六升煮取  
三升分温三服

礬石湯 礬石<sub>二</sub> 右一味以漿水

一斗五升煎三五沸浸脚良

苦參湯 苦參<sub>碎</sub> 槐白皮 狼牙  
根<sub>略</sub><sub>四</sub> 右剉以水五升煎三升  
半洗之

薏苡附子敗醬散 薏苡仁<sub>分</sub> 附

子<sub>分</sub> 敗醬<sub>分</sub> 右三味杵為散  
取方寸匕以水二升煎減半頓服

排膿湯 甘艸<sub>二</sub> 桔梗<sub>三</sub> 生姜

一兩 大棗<sub>樹</sub> 右四味以水三升

煮取一升温服五合日再服

排膿散 枳實<sub>六</sub> 芍藥<sub>六</sub> 桔

梗<sub>分</sub> 右三味杵為散取雞子黃  
一枚以藥散與雞黃相等揉和令

相得飲和服之日一服

茵陳五苓散 茵陳蒿末<sub>分</sub> 五苓

散<sub>分</sub> 右二物和先食飲方寸匕  
日三服

杏子湯 方未見

攝灘 福岡貞勝良察  
全 濱田天祐吉夫  
浪華 奧田元純謙安  
行梓

長沙正經證彙諸方終

方法之意。熱視病證之  
變。凡病為同而分異。  
亦有同異而分同。同不  
同。異不異。皆證之相似  
也。如玉人患石之似玉。  
相斂者患斂之似斂。不  
相似之物。愚者之所大  
惑。而智者之所加慮也。  
以表播之田。厚仲。此一  
冊子。名曰長沙證彙。蓋

此書也。集長沙福中其  
病狀之相似者。建以分  
類。各載其主方。欲使每  
疑惑之患。是田氏之所  
等於。而飲之。所以好  
其志也。書以題此卷首。  
寬政二年庚戌之春。

平安 吉益猷修夫題



長沙正經證彙後序

古之良醫者不察聲形而  
去病之在膏肓矣。故為欲  
為良醫者必先方法焉。曩  
日吾 張海先生就傷寒  
金匱二經因證立門。聚方  
其示以人小子名曰長  
沙正經証彙。而不出者  
數年。而為古人所謂方證  
相的當者。目擊遂存矣。雖  
秦澤疾醫。豈亦外于此也。  
乎。頃日請之 先生再加

釐正且附方劑方卷末肇  
錄粹庶乎使後學之士解  
方証疑惑之憂焉爾若友  
先生之微旨則有逢原  
一書不具於此于時寬政  
二年庚戌季春日  
受業門人浪速

奧田元純謹題并書



夫以唐宋以來長沙道  
衰世之習醫者唯宗李  
朱焉噫不塞不流洎  
者皆是也獨我友張海  
田氏專精學醫託志仲  
景氏常自謂人是活物  
也治方之妙在於此  
語豈容易也哉此篇甫  
成質諸東洞先生先生  
大喜之因將副一序亡

幾先生逝矣其文亦不  
成寫於今為憾予在同  
社親與聞此事因作一  
言證張海子費力此書  
之始末云

天明三年癸卯仲夏播  
磨醫警松下原正跋



寬政三年辛亥夏五月日

溫故堂  
撫松亭藏

傷寒論逢原  
嗣出  
蒙醫語纂要  
近刻

書肆  
江戶  
大坂  
京都  
須原茂兵衛  
村上宗助  
柳原喜兵衛  
林宗兵衛



