



門七武
942
卷 1

證治摘要

附家方

證治摘要序

蓋傷寒論雖欲乎疾醫之道

然具在焉且徵越人之傳

道之明也炳猶日星矣蓋張

機沒莫傳其法者而晉有王

醫令者雖為之羽翼蛇足其

說鶻突其論降迨六朝兵風

扇動之際雖有雷敷僧深之

輩皆唱妄張異詭詭無稽愈

出愈亂然靡有正其非者而

唐而宋元之諸家說雖有逕

庭辟之盲子辨黑白似其中

偶然耳獨至明又可差異頭

角而自負新規勃宰理窟之

務猶尚出彼繩也未矣均是

數深之徒於是乎疾醫之法

能不亂而斯道大變烏乎更

冕旒為種帽之兆歟悲夫我

神祖自歸放牛馬來昇平阜

昌文運所殖有良山子出艾

昌文運所殖有良山子出艾



荊棘闢古道然而蓬之心未
全除也東洞翁繼興異撰破
圍出類溯古豪俊卓見燭於
彼日沒之國迷暗之醫復明
越人之術於我日出之邦
於是著方極諸胥也四方負
笈者靡然嚮風矣余曰窺門
牆者仰其巍巍耳欲觀文物
之美周旋之儀非攝齊則不
能焉吁風木不停翁既逝矣
其唯方極乎而文宗簡易辭
多省略是以膚淺之徒驟難
通曉也頃中川先生執刀之
暇不拘方之今古視其可者
采采掇捋鳩成斯篇夫欲濟
河海求舟然無乘快風不駛
也欲返越裳嚮南然非得指
南不到也然則此舉也翁之
快風而撥之指南也或曰撥
云隨証治之然則謂之指南

猶可也翁曰多味者可疑如
此余未信矣惡惡知之夫翁
之教即撥之道也其唯傷寒
論乎欲通傷寒論必始於方
極然學不師古手未泚此者
安達其意耶一旦對病心與
目違亦盲子辨色耳夫欲入
室者先升堂而階之自欲追
跡於張氏自此升我乃先生
之力豈不多耶此唯學緒餘
已雖然頗見其志焉文久壬
戌黃鐘月雲窻金謙撰



此處為書中內容，文字極其模糊，難以辨認。

凡例

一 本文稱醫言者香川氏所
著行餘醫言也說約醫事
說約也

一 貫和田氏所著百疾一
貫也紀聞即方輿紀聞也

一 秘錄華岡之門人本間氏
所著瘍科秘錄也

一 小言南陽所著醫事小言
也

一 雖後世醫書活用古方自
有經驗者取之所以見古
方之妙也

一 夫後世之醫書雖大義粗
乖然宋元以降醫書之駭
又安可謂無半策片簡之
可取乎其不虛語者取之

一 學者察諸
予弱齡受業於東郭子之

門人施治者十餘年矣而立後來江戶入綱齋中川先生門遂為養子中川氏者東洞翁之徒也或曰和田氏者東洞家除籍人也不知然否然有其言深切可取者故姓々記之

一 享保以降醫風一變東垣丹溪之流頗廢焉曰雜方家曰古方家曰蘭方家雜方家者以半強之古方半弱之後世方施治焉和田氏之流而已此輩極多矣各病門之後載方輿之方以備參考

一 東洞先生不取病名與病因然自漢以前相傳之病名有不取之則不便者特假以載藥方耳凡病宜隨症治之後學勿拘泥于病

名誤治焉

一 本文中往往有稱本書者即證治秘訣也予家藏之

小柴胡湯○大柴胡湯

傷寒五六日，往來寒熱，胸脇苦滿，心下痞，鞭而嘔者，用小柴胡湯。若鬱々微煩，大便鞭者，兼用大柴胡湯。若清便自調，而有渴者，小柴胡加石膏湯。漸加渴者，小柴胡合白虎湯。

小承氣湯○調胃承氣湯

張子和曰：一日一便，乃常度也。按病人亦然，殊傷寒者，以大便快通為佳。故陽明篇曰：大便鞭則譫語，小承氣湯主之。若一服譫語止，更莫復服。又曰：胃氣不和，譫語者，少與調胃承氣湯。方極以腹滿與急迫區別。此二方，凡用柴胡及白虎等之症，宜腹滿而大便鞭者，兼用小承氣湯。急迫

而大便鞭者，兼用調胃承氣湯也。

白虎湯○大承氣湯

傷寒六七日，大渴引飲，舌上乾燥而煩者，用白虎湯。至七八日，舌上黑，胎乾燥，潮熱便秘，腹滿譫語者，用大承氣湯。此症而有大渴引飲，則白虎承氣並用。重者白虎五貼，承氣五貼。胃實甚者，用承氣五貼而僅有大便一行。此症強人可治。羸者危矣。是初用達原飲，及柴胡桂枝湯等，而失取汗，是以十分之邪氣皆輻湊腹，故見此症。初起用麻黃大青龍，而三日發汗，則邪氣半從汗去，決不至此重症也。余累試累驗，凡傷寒陽症初起，十之八九

宜用大青龍麻黃分量極多發汗之神方無長於斯但大便滑利一二行者亦有變陰凝故用麻黃湯為佳近來信吳又何徒不知發汗有効於外邪初與達原輩而誤入性命者多矣故表而出之至汗下後變症之治法則詳于本論故不贅于此

麻黃附子細辛湯○麻黃附子甘草湯 陰症初發以此二湯微汗之若陰陽疑似之症則先用麻黃湯服後不微汗但惡寒者宜撰用此二湯微汗後變症之治法詳于本論

按外臺必効療天行病及温病一二日者用麻黃石膏葛根等厚覆取汗以當知吳

千金引小品云

又可之非

千金方云傷寒雅士之辭云天行温疫是田舍間號耳○肘後方云貴勝雅言總呼傷寒世俗因號為時行○外臺許仁則論天行病云此病方家呼為傷寒○傷寒論集成云王叔和以冬時者為傷寒以他時者為時行寒疫大非古義也盖疫即傷寒傷寒即疫其謂之疫取諸役役不住其謂之傷寒取諸所感之源下略○按温疫論邪在膜原之說如捕風捉影妄誕附會迷後人不可從矣

傷風

本事方云今傷風古謂之中風按後世又謂之感冒桂枝湯大陽病頭痛發熱汗出惡風者

桂枝加葛根湯 大陽病項背強几几反汗出惡風者
 桂枝加厚朴杏子湯 桂枝湯証而胸滿微喘者
 葛根湯 太陽病項背強几几無汗惡風者
 桂枝麻黃各半湯 桂枝湯麻黃湯二方証相合者
 桂枝二麻黃一湯 桂枝湯証多麻黃湯証少者
 桂枝二越婢一湯 桂枝湯証多越婢湯証少者
 柴胡桂枝湯 小柴胡湯與桂枝湯二方証相合者
 小柴胡湯 胸脇苦滿或寒熱往來或嘔者
 柴胡姜桂湯 小柴胡湯症而不嘔不痞上衝而渴腹中有動者
 小柴胡加桂枝湯 小柴胡

湯証而上衝者
 小青龍湯 或加石膏
 咳喘上衝頭痛發熱惡風乾嘔者

附班疹

大青龍湯 葛根湯加石膏或桔梗
 大柴胡湯或加芒消石膏
 蟬針表裏俱解腫不消者日以水蛭八九枚令吮腫上
 白虎湯 治發斑口燥煩躁而渴者
 應鐘散
 按丹溪耳下頤頰腫為蝦蟇瘟
 回春頭頂腫起曰大頭瘟
 正宗合二症名時毒曰夫時毒者天行時氣之病也初起與風寒相類惟頭面耳項發腫為真云
 初用大青龍而發汗後小柴胡加石膏湯施

蟻針十二三日而愈，偶有膿潰者，宜從外治之法。發斑初發，葛根湯熱劇者，大青龍湯煩躁而渴者，白虎湯。或兼用犀角，後藤香川二翁治時毒初用七味敗毒散，十味敗毒去人參，前胡獨活，和田氏療時毒內陷咽喉腫痛者，用桔梗湯或涼膈加石膏湯。○方輿載六物敗毒散，及連翹湯牛蒡芥連湯。

中寒

附子理中湯 治五藏中寒，口噤四肢強直，失音不語。昔有武士守邊，大雪出帳外，觀膽忽然暈倒。時林經作隨行醫官，灌以此藥兩劑遂醒。

乾姜附子湯 治中寒卒然暈倒，或吐逆涎沫，狀如暗

風，手脚攣搐，口噤，四肢厥冷，或復燥熱。三方只載此三方中寒病門蓋等此

中寒之證，由平素體氣虛弱，冬月出外一時為嚴寒所中，則口噤失音，偏体拘急，四肢厥冷，畏寒腹痛，脉息沉微，昏沉不知人事者，宜急用熱酒入生姜汁和而灌之。候少甦醒，然藥用姜酒，脉出者生，不出者死。灸法神闕丹田關元。

用艾火各灸三七壯，手足暖脉至，知人事，汗出即生。如無汗，手足不暖，不省人事者，死危證。○謙齋曰：中寒者，後世所謂傷寒直中陰症也。有持亦云。○按病源，千金及翼外臺聖濟皆無中寒病門。至宋末始立一病門。予意中寒者，凍死之輕者也。良山翁云中寒者凍病也。櫟窓先生編輯

寒者凍病也。櫟窓先生編輯

急救選方合中寒與凍死為一病門大得予意世俗稱中寒者傷風症或無症者間亦有焉宜隨證治之○方輿載桂枝湯及桂枝人參湯當飯四逆同加吳茱萸生姜湯四逆湯

霍亂 宜與傷食門參考

白虎加人參湯 金匱云大

陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴○按聖濟中

喝門初載白虎湯其主治云治中熱喝頭痛汗出惡

寒發熱而渴 五苓散 脉浮小便不利微

熱消渴者○治傷暑煩渴引飲無度方○治傷暑身

熱口乾煩渴心神恍惚小便赤澀大便泄瀉者○霍亂

按水泻加滑石効○霍亂

頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之寒多

不用水者理中丸主之○渴欲飲水水入則吐者名

曰水逆○按嘔吐或加半夏生姜去桂

理中湯 按千金霍亂門治

中湯即此方也方後文云若轉筋者加石膏三兩三

因方亦加石膏醫通云脉雖沉細而轉筋煩躁發熱

者當作熱治大抵霍亂一毫口渴轉筋者即係熱症

謙齋云轉筋皆熱症聖濟霍亂轉筋門無附子劑外

治有淋足附子湯東郭云四逆湯証有轉筋輕而不

甚者也別錄及活人書濟世本中轉筋或用附子劑

宜詳察而處方也

吳茱萸湯 少陰病吐利，手足厥冷，煩躁欲死者。

按此方主嘔吐煩躁，四逆湯主下利厥冷。○有持曰：

霍亂後，手足厥逆者，四逆湯之所主也。此症而嘔不止，煩躁者，吳茱萸湯症也。

此湯以嘔吐為準。世醫用小半夏等無效，術、冬、東、手時用此方，奏意外之效。然藥苦烈，宜少々頻服之。

桂枝湯 吐利止而身痛不休者。

小半夏湯 或加茯苓

茯苓四逆湯 ○四逆湯或加參 ○通脈四逆加猪膽汁湯

雞屎白散 治轉筋入腹者

治霍亂轉筋入腹欲死，聖濟生薑五兩切，右一味用無灰酒一斗煎取八合頓

服便差

灸足外踝骨尖上七壯，治轉筋十指拘攣不能屈伸。景

霍亂吐瀉不已，灸天樞、氣海中脘、四穴立愈。正傳

霍亂已死而胸中尚有煖氣者，灸之立甦。其法以塩填

滿臍孔，灸之不計壯數。正傳

按此灸極妙，吐利厥冷，煩躁、冷汗出者，灸神闕數十壯，屢得效。霍亂治法無捷於斯。

轉筋不止，起死之方，灸承筋。又不止則灸湧泉。外臺

又轉筋灸承山。針經指南

千金方霍亂治四逆，吐少嘔多者，用附子粳米湯。心下痞

用井州瀉心湯。凡此病定一日不食為佳。

備急圓 ○大承氣湯

此二方治乾霍亂

乾霍亂之狀，心腹脹滿，攪刺疼痛，煩悶不可忍，手足逆冷，甚者流汗如水，大小便不通，求吐不出，求利不下，須臾不救，便有性命之慮，宜急與巴豆等三味丸服之，服取快利，外臺許仁則論。三味丸即備急丸也。

病源云：其腸胃先挾實，故不吐利，名為乾霍亂也。○案奇効厚朴湯療乾霍亂，即大承氣加良姜湯也。千金治乾霍亂有塩吐方，正傳云：乾霍亂死在須臾，升降不通，故也。宜吐以提其氣，最良法。景岳○舌捲囊縮，轉筋入腹者死。○和田氏轉筋甚者，用良方吳茱萸湯，吳茱萸木瓜食塩三味等分，同炒令焦，水煎服。○回春云：夏月有四証傷寒

傷風中暑熱病，疑似難明

按夏月不拘遠行家居，狂熱

無汗者，傷風寒之類也，宜用

麻黃大青龍等而發汗也，有

汗而渴者，中暈也，宜用白虎

五苓等也。○古云：暑傷氣分

汗如傾。○方輿載香薷飲及

消暑湯生脉散。○中暈者，

麻黃加朮湯。濕家身煩疼

發其汗為宜。○麻黃杏仁薏苡

身盡痛發熱日晡所劇者

○濕家始得病時可與此

方。外臺。桂枝附子湯。身疼煩不

能自轉側者。桂枝附子湯。身疼煩不

桂枝附子湯。身疼煩不

桂枝附子湯。身疼煩不

前方証而大便堅小便自

利者

其艸附子湯 主治見痛風

病因考及說約中濕門載五苓散香川氏云小便不利四肢浮腫而渴者良山翁云濕氣從小便去也○和田氏中濕初發有汗者用桂枝加木湯○按金匱云中濕之脈沉而細小便不利大便反快此中濕之一候也中濕初一身盡痛不異痛風然如法施治則不踰月而瘥不似痛風在并弥歲月金匱謂中濕死症者因其誤治也意中濕者痛風之輕者也

癰

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

柴胡桂枝湯 柴胡姜桂湯

陰癰為陽癰宜

柴胡去半夏加栝蒌湯

癰病發渴者亦治久癰

柴胡加芒消湯 欲成癰母

者

白虎加桂枝湯 溫癰者

牡蠣湯○蜀漆散○夾鐘丸

大柴胡湯○張會卿云小柴

胡湯加常山二錢截癰如

神

截癰湯方 常山 草菓

知母 貝母 各等 石 四味

以酒三勺漬之夜露一宿

發日早晨以水二合煮取

一合服臨發查再煎服或

草菓代栝榔最効

又截癰方 發日早晨用備

急丸一分或用吐劑亦効

按外臺有草常山湯煎法服

法如截癰湯間日瘥五六發

則宜服截菓每日發者宜候

十四五日後邪氣漸衰而截之截某宜陽癰不宜陰癰陰癰者宜候數發之後為陽癰而截之陰陽謂晝夜也小兒癰疾因蟲者或兼服鷓鴣菜湯癰用附子劑者希有焉○千金癰門有附子劑三方外臺八方宜隨證治之凡癰瘡後禁飲酒房事遠行○癰并癰母灸法脊際自七九至十三四推○癰振寒少熱面青大便溏泄者用棗附湯濟生○和田氏截癰灸法灸大椎尖頭七壯或灸章門不截則灸崧山尚無効者灸湧泉○又云凡癰者惡寒始於足指頭有此症者癰症不具亦為癰治而可也○又云癰用常山劑不愈者化毒丸二分發日早晨冷水服有効者必下

黑便也若瞑眩則輕者用冷水重者冷水內朱或石膏攪服或藍葉煎服○又云癰母用鼈甲類難治者用化毒丸二分効○按醫方考云癰發時獨寒無熱脉遲者用七專湯即附子大棗生姜也○又去癰發時頭疼身熱脊強脉浮者大陽症也麻黃羌活湯主之麻黃羌活防風甘草四味也○癰疾寒熱轉大者從卯至午發宜柴胡湯從午至酉發者邪在內宜大承氣湯從酉至子或至寅發者邪在血宜桃仁承氣湯下之微利後更以小柴胡湯撤其邪可也規矩○治癰病苦渴齧烏梅枚右一味以水三盞煎取一盞半去烏梅和蜜一匙分二服○癰脉弦而緊宜下浮大

者宜吐，強遲者宜溫。傳○牛
山云：凡瘧疾，二三發之中，宜
用發散劑。○方輿載柴胡、鼈
甲湯及鼈甲一味酒服散藥。

痢

葛根湯 痢有表証者，用此
湯三四日，宜發汗。

葛根加半夏湯 前方証而
嘔者。

葛根黃連黃芩湯 痢惡寒
止，有熱者。○或下利，脈促
喘而汗出者。

黃芩湯 痢腹拘急，心下痞
者。

黃芩加半夏生姜湯 前方
症而嘔者。

大柴胡湯 心下痛，有身熱
者。

論曰：發熱，心下痞，嘔
吐而下利者。○按之心下

滿痛者。

厚朴七物湯 ○痢腹滿者。○
或中脘否塞者。紀聞

大承氣湯 身熱腹滿，心下
痛甚，口舌乾燥者。○論曰

自利清水，心下必痛，口
乾燥者。○下利三部云，按

之心下堅者。○下利脈遲
而滑者。

白頭翁湯 熱利下重者。○
下利欲飲水者，以有熱故

也。○熱多，難用下劑者。紀聞
白頭翁加甘草阿膠湯 熱

利下重，帶膿血者，產後下
利虛極。金匱○按產後痢，妙

黃連湯 ○半夏瀉心湯
熱解痢減，心下痞，或痞鞭，
食不進者，且撰用此二方。

六物黃芩湯 ○桂枝人參湯
真武湯 痢陰症或遺尿者。

桂枝加芍藥大黃湯 大實

痛者

小建中湯○桃花湯○

赤石脂禹餘糧湯

禹餘糧丸方家治久痢久溏

無熱無後重用附子不止

灸腹不愈飲湯直下食粥

直下日羸瘦向死者禹

餘糧 赤石脂各五分 阿片

小豆粒許 津輕上品

右三味糊丸一劑二度白

湯下即愈起死回生累用

累驗勿多服多服則發嘔

吐

黃連阿膠湯 久痢心中悸

而煩不得眠便膿血者

大黃牡丹皮湯 膿血痢下

赤白如魚腦者

桃核承氣湯 下紫黑色腹

痛後重異常者瘀血也

下如魚腦加飯姜効

鯽魚鱠 痢五六日腹痛不

止者 ○承氣丸

紫丸 痢腹痛甚者

用五分厚或一分

真村翁云痢疾久不愈者腸

中裏面外皮爛而下赤白如

魚腦用大黃牡丹湯或薏苡

附子敗醬散等則速愈此儼

賜癰之治法者也和田氏贊

之曰卓見也○按和田氏實

候而下如魚腦者用牡丹湯

虛候者用千金駐車湯其方

黃連六兩當歸阿膠各三兩

乾姜二兩右四味煎服凡此

二方及右之諸方皆痛在臍

以上只桃花湯及禹餘糧湯

禹餘糧丸者痛少々在小腹

者也痛在臍以上者禁用止

澁之藥常識此勿誤○入門

云凡痢下如竹筒或如屋漏

水塵腐色氣短飢逆者不治

或純下血小便不通唇紅下後身熱脉弦洪者俱不治又云無積不成痢也○我邦之先輩說痢病因者多端外邪挾宿食為得○痢脉細數者凶○痢脉沉實為吉候○痢初發不忌脉浮數數日後見浮數者凶○脉大者邪氣進也○脉遲或沉者不日下利止也○腹痛始終不止者惡候○下重無附子症○古人赤屬熱白屬寒之說難信赤白俱有下重者皆熱也○膿血利者赤痢白痢是也○痢舌純紅者惡症也舌紅如無皮狀有渴者惡症也或真武湯症亦有此古候○痢七八日不問陰陽灸足三里則利減者也○痢冷服菜菔汁妙治煎湯中加菜○謙齋云予有一

得療痢脉實者不拘症為實宜疎滌脉虛者不論症可為虛○腸澼下膿血脉沉小細安靜者生洪大數身熱者死○療純下白如鼻涕者方後灸臍下一寸五十壯良○說約灸法素有宿癥惡藥氣者或腰力罷者宜灸中脘天樞腰眼自十一至十六兼治痺痢不了者○血痢用膠艾四物加厚朴規方○按和田氏噤口痢用參連湯參連各等分也休息痢用子和無憂散與村氏試効也云蘭醫云赤白痢不用下劑白痢最禁之云牛山云老人小兒痢八九十行者必死也和田氏云小兒痢疾至百行者宜先與如神丸不然暴脫者也又云痢數日之後發熱者多死

證治摘要

卷

也○按如神阿片丸也良山
翁亦用○方輿載桂枝湯及
河澗芍藥湯四逆散參連湯
藥皮湯千金駐車圓錢氏白
朮散無憂散當飯湯

泄瀉

葛根湯○桂枝湯 泄瀉有

表症者宜撰用此二方或

加木茯苓

五苓散 治傷暑身熱口乾

煩渴心神恍惚小便赤澀

大便泄瀉者○按水瀉

加滑石効

猪苓湯 少陰病下利六七

日欬而嘔渴心煩不得眠

者

生姜瀉心湯 心下痞鞭乾

噫食臭腹下有水氣腹中

雷鳴下利者

耳艸瀉心湯 下利日數十

行穀不和腹中雷鳴心下

痞鞭而滿按此湯症以雷

鳴穀不和下利者若無雷

桂枝人參湯 利下心下痞

鞭表裏不解者

人蔘湯 前方証而無表症

者

四逆湯 下利清穀者○真

武湯○白通湯 少陰病下

利脉微者

赤石脂禹餘糧湯 醫以理

中與之利益甚理中者理

中焦此利在下焦

禹餘糧方家見痢

當歸四逆加吳茱萸生姜湯

泄瀉因疝者 予屢患疝

瀉輟食食鯉魚膾二碗即

愈

沼氏云五更瀉八味丸有効

泄瀉灸十一二三四腰眼

病因

古云泄而腹脹脉弦者死○
 三因方云古方泄利與滯下
 共為一門千金又以宿食不
 消在熱痢類門類混濫後學
 難明不可甄別也泄瀉病門
 ○按泄瀉久不愈者宜每日
 餌食雞肉大効鯉魚亦効○
 謙齋云泄瀉有用下劑宜詳
 腹診腹底有塊者可下之○
 方輿載桂枝加朮湯四逆散
 錢氏白朮散紫散高良姜湯
 調中湯
 沼田侯留務加川太平妻患
 泄瀉半年其症微熱微渴昼
 夜十三行清川氏療之三月
 不治高井氏療之三月不治
 請予予到則妻曰二醫食禁
 甚嚴不肉食半年食不進羸
 瘦如此予答曰草根木皮有治

病者則禽獸魚虫亦豈莫治
 病者悉禁之者不學之甚者
 耳魚鳥治泄瀉者雞肉鯉魚
 鯽魚等也內人此中何嗜荅
 曰雞肉也即與猪苓湯兼赤
 石脂禹餘糧湯三食之間亦
 令餌食雞肉與卵廿日許半
 愈一月而全愈

傷食 宿食

瓜蒂散 宿食在上脘當吐
 之

大承氣湯 腹滿甚者○論
 曰脉數而滑者實也此有
 宿食下之愈○病腹中滿
 痛者此為實也當下之

小承氣湯○走馬湯○備急

圓○塩湯探而吐之

桂枝加芍藥湯○桂枝加芍

藥大黃湯○橘皮大黃朴消

湯 一切魚腥食傷宜此湯

○吳茱萸湯○理中加附子湯 吳崑曰中焦痛甚脉沉遲者

四逆湯 治吐下而汗出小便復利或下利清穀裏寒

外熱脉微欲絕或發熱惡寒四肢拘急手足厥方金

霍亂

療菌毒方金掘地作坎以水沃中攪令濁名地漿飲之

解河豚毒 一時倉卒無藥急以清麻油多灌取吐出毒物即愈

獨嘔庵云中河豚魚毒者少覺懊惱須直探吐急服藍

汁一盞若入糞少許若瓜蒂未一錢須臾吐盡則十

治八九

一書云河豚魚毒用砂糖有

効

宿食不吐不利腹痛甚者多

灸上腕中腕天樞吐利為

度若吐瀉後痛不止者概

屬疝瘕宜灸天樞及十一

至十四動○乾霍亂用走

馬湯等不吐下者多死令

多飲酒至醉有效和○傷

食之症胸膈痞塞吐逆噦

酸噫敗卵臭食頭痛發

熱惡寒病似傷寒但身不

痛為異也要○菌毒宜先

用地漿水和○方輿載

桂枝藿香湯及平胃散養

脾湯

嘔吐反胃膈噎

小半夏湯 諸嘔吐穀不得

下者○方極云治吐而不

渴者

小半夏加茯苓湯 大半夏湯 胃反嘔吐者○

外臺云治嘔心下痞鞭者
半夏瀉心湯 嘔而腸鳴心
下痞者

生姜瀉心湯 心下痞鞭乾
噫食臭腹下有水氣腹中
雷鳴下利者

旋覆花代赭石湯 心下痞
鞭噫氣不除者

吳茱萸湯 食穀欲嘔者○
嘔而胸滿者○紀聞云大
小半夏者常嘔也此湯食
則嘔也又嘔吐有饘雜者
用此

甘草乾姜湯 煩躁吐逆者
紀聞云無煩躁亦可用嘔
吐苦味之藥不應者或宜
此湯

大黃甘草湯 食已即吐者
○方極云治大便秘閉急
迫者

甘草
用之

猪苓散 嘔吐而病在膈上

後思水者解意與之思水
者○惡阻并產後嘔逆大
効和田

五苓散 渴欲飲水水入則
吐者名曰水逆

茯苓澤瀉湯 胃反吐而渴
欲飲水者

附子粳米湯 主治見
腹痛 紀聞云
此湯腹痛為準

半夏瀉心湯 主治見
心下堅滿為準反胃嘔吐
俱用紀聞

小柴胡湯 因腹候用之
真武湯 水氣為準與半夏
半夏湯及姑洗丸相反腹
濡弱脉沉細又有搏擊見
緊狀者脉與症不相應者
為虛候也反胃及游囊亦
有用之紀聞

橘皮湯 乾嘔噦若手足厥者○和田氏云霍亂嘔吐不止用四逆輩不治急用此湯得效

生姜半夏湯 胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微

心中憤々然無奈者○有持云此湯主治要之惡心之症耳素問傷寒金匱無

惡心字蓋仲景後之病名也按肘後方

桃核承氣湯 膈噎因瘀血者○膈噎因瘀血者十中八九因飲者二三也故有

用桃核承氣或乾漆丸等吐血而治者紀開

濕漆丸 ○姑洗丸 夾鐘丸 ○紫圓

烏梅丸景仲 治反胃雜開子 七宝丸 治反胃之說

化毒丸 治反胃貫

古云嘔家聖藥是生姜千金之說信矣然氣逆作嘔生姜散之痰與水作嘔半夏逐之

嘔有熱有寒生姜於寒症最佳若遇熱嘔不可無烏梅也

○治久患反胃聖濟硫黃細研半兩與水銀一分再研姜汁糊丸服

○本艸反胃門云靈砂鎮墜反胃神丹也○本艸反胃

門云砒石同巴豆附子黃蠟丸服噎膈門云雄黃輕粉石鹼蓬砂砒石並化積

垢通噎膈由是觀之聖濟治嘔吐輒紅丸反胃噎膈用之定有效方見附錄

○易簡方膈噎反胃用養生丹要訣用靈砂丹皆水銀劑也○醫通云瘀血在膈

證治摘要

阻滯氣道而成者代抵當
丸作效子大服二錢去枕
仰卧細々嚥之但飲熱湯
及椒姜輒呃者即瘀血也
○反胃而胸中嘈雜不寧
或作或止其人懊懷面上
有白點者作蟲積治之○
王肯堂云瘀血則脉洪桃
仁承氣湯下之○脉浮緩
者生沉瀯者死傳○大便
如羊糞者不治年過五十
者多不治口中多出沫者
必死濟世○和田氏云癖囊
局方安中散有效南陽亦
云其方其艸十兩宿砂延
胡良姜乾姜茴香桂枝各
五兩牡蠣四兩右八味為
末每二錢熱酒調下南陽
去宿砂三倍牡蠣水煎服
方後云忌酒肉麵餅一切

厚味塩茶又小言有治膈
噎河豚魚方○和田氏云
反胃者朝食暮吐暮食朝
吐也癖囊者二三日或四
五日十餘日而吐也又有
三日亦吐不止者多吐水
也反胃無腹痛吐時無煩
悶癖囊有腹痛吐有煩蓋
癖囊亦屬反胃也今世真
反胃者少也多癖囊之類
也膈噎者噎食胃反無噎
食膈噎難治反胃間有愈
者反胃有腹痛者膈噎之
變症也○一男子患膈噎
諸藥無效思食河豚而死
煮食之不死翌日復食之
通計食之三日而全愈○
反胃証不強以食絕其湯
水飢則以飯炒香乾啖之
一些湯水不可進兩三日

後竟不復吐，飲食如初。然
後用井蔗湯七升，姜汁一
升，和勻服。秘驗方○猫胞衣
治反胃，燒灰入硃砂末少
許，壓舌下，一醫用甚効○千金
云灸通谷五十壯，治辟囊。
○千金治反胃，飲白馬尿
即止。○外臺治反胃，服驢
小便二合，有効，翌日復服
二合而愈。病若深，七日服
之良。○按辟囊之名，始千
千金，至宋盛稱之。○方輿
載千金吳茱萸湯及安廩
湯，安中散，破棺湯，獨參湯，
滾痰丸，治反胃大驗方。

橘皮竹茹湯 噦逆者
生姜半夏湯 予不拘金匱
煮法，半夏一兩，生姜二兩，
以水一合半，煮取八勺服。

屢得効，乾嘔噦，若手足厥
者，○噦之重者用之。

小承氣湯 治噦便秘，數謔
語。○呃逆雖有手足厥逆，
大便堅者，定屬火熱，下之
則愈。醫

半夏瀉心加吳茱萸湯 心
下痞鞭者
吳茱萸湯 一男子下利，未
全已，發噦吐蛇，服此湯得
愈。方輿

黃連解毒湯 熱毒或瘡腫
內攻發噦者。紀開
四逆湯 ○真武湯
七寶丸 ○南呂丸

治噦 柿蒂 丁香 各錢二加
生姜五片，水煎服。
又方 切豆 右一味剉水
煎服。

醫林云噦以紙燃鼻嚏而止
或云猪膽汁熊膽治噦
治噦服藥無効者世濟

硫黃 乳香 各等 為末以

酒煎急令患人嚥之

又方 用雄黃二錢酒一盞

煎七分世齊

灸 期門 關元 腎俞

痞根

一男子痢重噦起灸痞根及

數處得愈方○產後呃逆最

為惡候急灸期門宜服四逆

加人參湯或桂心五錢姜汁

三合和水煎服醫○和田氏

云吳茱萸噦之聖藥○古人

云痢病後及諸病後發噦者

難治脉緩者易治脉代者危

正傳

聖濟噦門有水銀丸麝香丸

主治云治諸般噦逆○方輿

載滾痰丸

水腫

越婢湯 風水惡風一身悉

腫脉浮不渴續自汗出無

大熱○腫在上部發汗可

說解者考審其症而後可與

○先生曰欬喘不已小便漸

短少遂為腫滿者當與大

小青龍麻杏芍石厚朴麻

黃湯等或兼施神祐丸滾

痰丸之類方輿

越婢加水湯 皮水越婢加

木湯主之 苧艸麻黃湯亦

主之金

苧艸麻黃湯 千金云有人

患氣急積久不瘥遂成水

腫如此者眾諸皮浮水攻

面目身體從腰以上腫皆

以此湯發汗悉愈○金匱

即極方 黃麻 艸湯

外亭 裏水 作皮

即極麻方
湯附其
從金
鑑氣
水作
風水

云諸有永者腰以下腫當
利小便腰以上腫當發汗
乃愈○按入門古麻茸湯
即此湯方後云如肢冷屬
少陰加附子

麻黃附子湯 水之為病其

脈沉小屬少陰浮者為風

無水虛脹者為風水發其

汗即已脈沉者宜麻黃附

子湯浮者宜杏子湯金匱

云杏子湯未見恐是麻杏

黃牛石湯金鑑載杏子湯麻

味也蓋依魏註

越婢加朮附湯 治水腫惡

寒無大熱骨節微疼小便

清利大便自調或滑者

大陷胸湯 水飲在胸腹而

腫者兼用之不拘痛有無

也

桃花湯 水腫兼用下

木防已湯 水病心下痞鞭

煩渴者

○氣急心下痞堅為準為脚

氣衝心狀者用之開紀

木防已去石膏加茯苓芒消

湯木防已湯症而不煩渴

二便不利者

防已黃耆湯 治水病身重

汗出惡風小便不利者

防已茯苓湯 治四肢

動水氣在皮膚而上衝者

真武湯 按腫上陷而不起

無熱腹濡弱大便滑或溏

者

八味丸 腰以下腫者○按

此丸緩症也氣急之証勿

用之

牡蠣澤瀉散 大病後腫者

五苓散 感濕而腫者訣要

猪苓湯 和田氏用之

證治摘要

桂枝茯苓丸合五苓散湯
大黃牡丹湯 右二方主產

後腫

本艸云血腫紅花二兩杵爛
入水半盞取汁服之不過

三服便痊

鯉魚湯 鯉魚長七八寸者
鱗與

腸昆布三方三寸山椒錢右

以水一升八合煮取四合

吞其汁旦食鯉每日一劑

赤小豆藥 赤小豆合生商

陸根錢二十右二味以水四

合煮爛去商陸食小豆

加減麻黃連軹赤小豆湯

治瘡痂內攻腫滿者 依

本方去生梓白皮加商陸

赤小豆錢商陸五分大棗三

麻黃連軹杏仁生姜各二分

其艸各右八味以水二合

煮取六勺或加反鼻或兼

用犀角

仲呂丸○姓賓丸○紫圓○

元生丸○七室丸○犀角

一老醫云水腫心下苦悶者

大抵柳湯四苓散合方有效

或兼犀角○和田氏遍身流

腫用千金麻子湯附子劑也

流腫先右手腫又左足腫之

類不定處遂及一身內攻腫

用東洋赤小豆湯及連堯湯

產後腫用琥珀湯五苓散加

琥珀反鼻以水一合冬瓜汁

一合煎服○水不可治者有

五唇黑缺盆平臍出背平足

下平滿水病忌腹上出水出

水者一月死針○古云身有

熱者水氣在表可汗之身無

熱者水氣在裏可下之患人

腹上用手按之有窩者可治

濕也○又云餘處有腫肩項

證治商書

七

水氣去瘦削者死在近○腹脹如鏡光者惡○無腫呼吸促迫者惡○腫卒消者禍在反掌○水腫卒發大熱者後必衝心○水氣一旦減再腫滿者惡○水腫腹見青筋者惡○小言云水腫有咳者動悸劇者自心下催水氣者脉數者皆惡○準繩云血腫者皮膚間有紅縷赤痕入門云四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分醫林溫白丸方後血腫其人有赤黑紫文用桃仁紅花赤豆蘓木煎湯下○按水腫秘結者兼用承氣丸及仲呂丸雜賓丸瘡痂內攻腫滿者麻黃連軹赤小豆湯劇者兼用紫圓實腫兼赤小豆藥虛腫兼鯉魚湯虛腫右側臥則直右多腫左側臥則直左多

腫者必死矣勞病并諸病後瘦極而後腫者必不治○和田氏云水腫有如拳者在心下名水結不治症也縱一旦得治亦再發而死○醫林水腫門有輕粉丸巴豆丸○方輿載單香薷湯及郁李仁湯紫蘇子湯麻子湯麻子小豆湯連翹湯赤小豆湯防已散琥珀湯瓜子仁湯實脾飲

厚朴七物湯 腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故

主腹滿氣脹方金十

厚朴三物湯 痛而閉者

枳子厚朴湯 心煩腹滿臥起不安者○廣義云心煩當做虛煩看腹滿亦非實

厚朴生姜半夏其艸人參湯

不接
痛物必

證治類要
古

發汗後腹脹滿者此亦虛

大承氣湯 腹滿不減減不

足言當下之

大紫胡湯 按之心下滿痛

者此為實也當下之

大黃并遂湯 婦人少腹滿

如敦狀小便微難而不渴

生後者此為水與血俱結

在血室也

抵當湯開經

大黃牡丹湯 鼓脹因瘀血者

按方輿載瓜子仁湯牡丹

湯去消黃加薏苡湯也其

主治云治瘀血致腹滿鼓

脹者又云腹脹有塊按之

痛不移處口不惡食小便

自利大便黑面黃手掌赤

紋肌膚甲錯有此等之候

者決為血症也宜擇用下

瘀血藥

即十金腸癰湯

非遂半夏湯飲見癰

人參湯加附子 腹平滿大

便滑者

赤小豆藥 ○仲呂丸

七寶丸 ○煎圓

鼓脹灸法栗山孝庵傳

先以味嚼填滿神闕別取土

器錐鑿小孔於其心以安臍

上熟艾一錢分為三炷灸於

孔上令火氣通臍味嚼甚厚

則火氣不通甚薄則灸後臍

爛火氣微通為度徹之一日

三回尽一錢艾也灸前項以

繩度腹圍病深者灸後七日

腹減五分以為驗焉至輕者

則得遽減三寸二便隨多或

下如赤小豆汁者腹滿漸減

六七十日外全愈 ○按此灸

法原出外臺及景岳全書陰

症最有効云

登治諸要

原出

雞

天醴

治鼓脹

雄雞

取臘月內

川芎

赤

酒煮

糊丸

大

每服五十九

溫酒下

一方

治鼓脹

身乾黑瘦

多渴

煩悶

馬鞭草

細剉

曝乾

勿令見火

或水煎

至味出去

粗溫服

六月

採用

皂莢

主腹脹

胸腹脹滿

研丸

服取利甚妙

金匱

曰病者腹滿

按之不痛

為虛痛

者為實

可下之

血成

脹腹上青紫

筋見或手

足有紅

縷赤痕

小水利大便

黑

金匱下瘀血湯

或抵當丸

醫

○古云鼓脹

臂細臍凸

足心及背

平滿青筋

繞腹皆

不治

○手足羸瘦

腹臃脹者

名蜘蛛

蠱不治

○脉浮大者

生虛小

危急

○按本艸云

銀

治積滯

鼓脹宜用

大抵

脹滿腹高

脹者宜下劑

或一醫

云脹滿初發

用大黃

其遂湯

有效又云

初起用生

漆丸

身體生痒

發疹後可用

桃核

牡丹湯等

或有愈者

病因考

鼓脹門治方

用熊膽

灸自九

至十六

○方輿載瓜

子仁湯

及分消湯

杜原湯

黃疸

茵陳蒿湯

黃疸初起

此湯

○茵陳五苓散

梔子

蘼皮湯

身黃發熱者

梔子

大黃湯

酒黃疸心中

懊懣

或熱痛

大黃

消石湯

黃疸腹滿小

便不利

而赤自汗

出此為

表和裏實

當下之

證治

黃疸

此

證治

黃疸

此

證治

黃疸

此

證治

黃疸

此

小柴胡湯 諸黃腹痛而嘔者

大柴胡湯 前方証而劇者

小建中湯 開紀 男子黃小便自利○心中悸而煩或腹痛者主之開紀

桂枝加黃耆湯 開紀 諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之○黃疸有表症者用之開紀

麻黃醇酒湯 按本艸綱目

麻黃條載此湯方後云頓服取小汗同書黃疸門云麻黃傷寒發黃表熱煎酒取汗由是考之金匱脫取汗二字宜補之○三因此湯主治云脉浮緊者以汗解之

紅礬丸 家方見黃疸心下痞

消礬散 用之者兼

瘰癧疽方 針取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥苗穰麥苗亦得范註云小麥也

四逆湯加茵陳 醫墨名茵陳四逆湯

一物瓜蒂湯 ○備急圓○大承氣湯 以上三方主急黃

病源急黃候云卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也又云得病但發熱心戰者是急黃也外臺瓜蒂散主治云急黃欲得水喫氣息喘糜眼黃聖濟瓜蒂散主治云急黃煩熱口乾醫林急黃用巴豆丸聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

聖濟治急黃藥品

有瓜蒂巴豆消黃犀角石
膏○按外臺許仁則療急
黃始得大類天行病者用
麻黃劑取汗

○金匱云額上黑微汗出手
足中熱薄暮即發膀胱急
小便自利名曰女勞疸腹
如水狀不治○疸而渴者
難治疸而不渴者其疸可
治○心中懊懣而熱不能
食時欲吐名曰酒疸○酒
疸心中熱欲吐者吐之愈
按瓜○穀疸之為病寒熱
不食食即頭眩心胸不安
久久發黃按茵陳○五疸
實熱脉必洪數其或微濡
証屬虛弱○丹溪曰不必
分五等是濕熱如盪麵相
似○五疸久々寢黑者皆
難治○大便秘而渴者

死小便利不渴者生○
按黃疸腹中有塊者年過
五十者多難治

黃胖

茯苓飲加厚朴湯

四苓散加橘皮湯

梔子厚朴湯 腹滿者

紅礬丸 治黃疸黃胖并

嬰孩疳氣好食生米土炭

及下血家動悸甚者○茯苓

飲去人參生薑加厚朴

黃連綠礬 茯苓 木橘

皮 厚朴 黃連 枳實 枳實 錢

綠礬 燒為紅 枳實 六錢

代其 十錢 右七味為末 醋糊

益佳 為丸 梧子大 每服七八十

丸 白湯下

身面黃白浮腫手足爪甲枯
皸專為短氣身體倦怠目中
淡白此病以首認氣急爪反

登名商

家

為第一證決，即是黃胖也。行
譚○此病好食生米茶葉之
類，又云腫及四肢者，腫及腹
者，飲食減少者，皆難治。又云
黃腫多因蟲積食積之為害
也。案玉○按黃胖一名黃腫，久
不愈則下血，虛里動悸甚，地
黃劑無効，紅礬丸多服，大効。
久年不愈而腫，則可從水腫
之治法，難治。○方輿載外臺
半夏湯及平胃散。

癥瘕疝

苓桂甘棗湯 臍下悸者欲

作奔豚者，按腹痛衝胸

桂枝加桂湯 氣從少腹上

衝心者，按世俗所謂

茯苓甘草湯 厥而心下悸

者○心下悸上衝而嘔者，

苓桂術甘湯 心下逆滿氣

上衝胸，起則頭眩，

大黃黃連瀉心湯 心煩心

下痞，按之濡者，

半夏瀉心湯 心下滿而不

痛者，此為痞，此方主之。

黃連湯 腹痛，按心下痞痛

者，此湯。心下痞鞭，不痛者，

半夏瀉心湯。

小柴胡湯○大柴胡湯

柴胡桂枝湯 治寒疝腹痛

柴胡姜桂湯○桂枝加芍藥

湯○桂枝加芍藥生薑人參

湯○小建中湯○大建中湯

大烏頭煎 治寒疝繞臍痛，

若發則自汗出，手足厥冷，

脈沉緊者。

烏頭桂枝湯 寒疝腹中痛，

逆冷，手足不仁，若身疼痛，

灸刺諸藥不能治，○治寒

登治高要北

七

疝腹中絞痛拘急不得轉側發作有時便中人陰縮手足厥逆外臺按腰腹引陰囊痛脉弦緊

當歸四逆加吳茱萸生姜湯

內有久寒者○治烏頭桂枝湯証而緩者又治陰癰

大黃附子湯○脇下偏痛發熱其脉緊弦者

吳茱萸湯 痛從陰囊上衝脇下者 劇者加烏頭

苓姜朮甘湯 腰重冷者仲呂丸○夾鐘丸○元生膏

蟻針○備急圓○七宝丸○化毒丸

行餘醫言云蓋癥即積積即癥同上而非有異又謂之癖

癥即聚聚即癥亦是同一而非有異又謂之疝又謂之疝

究竟癥疝即積聚之異名耳同書疝門云疝即聚又即癥

又云疝者鬱氣之凝滯而為痛者也多在少腹○張介賓

曰能大能小能左能右近胸助而如臂如指則謂之疝癥

下臍腹而為脹為急則謂之疝癥○方輿載小品牡蠣奔

豚湯及千金瀉脾湯同書云寒疝附子粳米湯証而痛在

心胸者用小品蜀椒湯附子粳米湯加蜀椒乾姜方也又

疝氣用附子劑或當飯四逆等而無効腰不伸者有用五

苓散加茴香而奏効者又同書疝用禹功散及無憂散又

云疝忌藹藹愈後亦勿食○按凡治心腹痛及諸痛諸方

中有茸艸則勿減茸艸分量茸艸少則無効○吳樞本藏

篇云腎下則腰尻痛不可以
俛仰為孤症聖濟云疝氣臍
腹疼痛腰曲不伸此症食時
及二便轉側之時假人手甚
為煩擾之患予得妙法攤元
生膏於綿片徑四寸許以貼
于腰日二次發水泡則鍼而
取水復貼膏二三日而能屈
伸坐臥復故奇々妙々屢試
屢効○久年積聚疝有脊骨
突出或背肉隆起者難治者
也治之法內與對症方秘結
者時々用丸散下之外隆起
上貼元生膏六七日糜爛處
施蟻針去惡血復施元聖蟻
針如前四五度則無不愈矣
又久年腹痛有七宝化毒之
証○日本橋第四街梁川店
老嫗年六十五患疝腰不得
屈伸衆治無効林頭常置搜

器扶于人尿已三年請予即
與當歸四逆加茱萸生姜湯
兼承氣丸而腰部貼元生膏
徑四寸日々取毒七日而半
愈半月而全治此症元生之
功大○蘭醫某詰予曰子能
用發泡膏蘭書有發泡七友
子知其用法乎答曰予所用
者漢方而茱萸一味也非蘭
方也某曰未聞漢有此方其
出何書乎答曰千金外臺聖
濟皆有此方子何不學之甚
其閉口去○方輿載牡蠣奔
豚湯及瀉脾湯柴胡鼈甲湯
寬中湯當飲大黃湯千金吳
茱萸湯桂心湯蜀椒湯五苓
加茴香湯禹攻散無憂散○
一婦年四十自每月經行六
七日前左少腹痛甚呻吟聲
徹四隣經行後六七日而痛

登治簡要
卷一

漸止，每月廿日在病林，衆治無效，已十年，請予予視其背，左腰肌肉僅隆起，方三寸許，乃與當歸四逆加吳茱萸生薑湯兼并遂丸，腰肉隆起處貼大元生膏，廿日許而愈，後月不再發，此症元生之功大，橫沙侯臣湯河氏妻也。

蟲

烏梅圓 治蛇厥

烏梅圓去附子湯 不可附

子者

鷓鴣菜湯

一方 鷓鴣菜 二錢 忍冬 一錢

桂枝 二錢 并艸 丁子 各一分

右五味漬水少時去渣煮

一兩沸頓服或以水一合

煮取七勺去渣冷服

并艸粉蜜湯 蛇蟲之為病 令人吐涎心痛發作有時

毒藥不止

大建中湯 或加烏梅

烏梅丸 方 烏梅 蜀椒

乾姜 各等 右三味為末糊

丸梧子大每服四五十丸

白湯送下

濕漆丸 作癩癩狀者 關

紫圓 ○ 七宝丸

靈樞云 中熱則胃中消穀消

穀則蟲上下作 ○ 金匱云 腹

中痛其脉當沉若弦反洪大

故有蛇虫 ○ 病源云 蛇虫長

一尺亦有長五六寸其發動

則腹中痛去來上下痛有休

息亦攻心痛口喜吐涎及吐

清水貫傷心者則死 ○ 入門

云 凡蟲症眼眶耳下青黑面

色痿黃臉上有幾條血絲如

蠅爪分明飲食不進肌肉不

生沉重寒熱若不早治相生

登治諸要

症

不已貫心殺人○醫通云諸蟲嗜食米紙茶葉泥炭之類又云心腹中痛上下往來發作有休時喜涎出者蟲也按門載金匱○玄治翁云小兒夜熱者蟲也○南陽云唇色如塗朱眉目間蒼黃色者為蟲候○東郭翁云小兒頭痛劇者十中八九蟲也有時大食有時不食者時々卒倒者手足難屈伸者多蟲症皆宜鷓鴣菜湯此湯症多臍傍有塊允用此湯則止夕殮脯時臨卧平旦三服七日用之而不下蟲者非此湯症也○按腹痛發作有時者為蟲候用鷓鴣菜湯或粉蜜湯而嘔者宜大建中加烏梅湯或烏梅圓去附子湯或兼家方烏梅丸允用殺蟲諸藥而蟲難下

者兼用紫圓粉鉛粉也藥肆稱唐土者是也家翁所著粉辨詳論之○方輿載棋榔雀虱散及奧村氏烏梅丸

癩癩狂健忘驚悸不寐

小柴胡湯○大柴胡湯○柴胡姜桂湯此三方因腹

候用之健忘或用之柴胡龍骨牡蠣湯胸滿煩

驚小便不利謔語者桂枝加龍骨牡蠣湯

腹中拘急動悸劇者小建中湯心中悸而煩者

大黃黃連瀉心湯心煩心下痞按之濡者

瀉心湯心氣不定心下痞按之濡者或加朱砂石膏

黃連解毒湯喜笑不止者白虎湯狂癩煩渴者

龍骨代鐵砂效

登名病要上

耳麥大棗湯 婦人藏躁喜
悲傷欲哭象如神靈所作
數欠伸

梔子豉湯 虛煩不得眠
酸棗仁湯 煩躁不得眠者

鷓鴣菜湯 因蟲者

桃核承氣湯 ○抵當湯

右二方因瘀血者健忘或
用之

瓜蒂散 狂癩壯實者

大承氣湯 醫通發狂去厚
朴加鐵落

石膏黃連其艸加鐵砂湯
主治見急慢驚門加辰砂
益佳

姑洗丸

○南呂丸

七宝丸

○紫圓

一老醫云狂五瀉心皆效○

古云癲脉大滑者生沉小緊
急者不治熱狂脉實大者生

沉小者死○子和狂癩用吐

劑○正傳云癩可吐狂宜下

又用水銀劑○要訣入門癩

狂用抱膽圓即水銀劑也○

全書發狂用巴豆丸苦參丸

○醫通狂用瓜蒂癩用靈砂

丹養生丹皆水銀劑也○方

輿發狂狂走用將軍湯大黃

一味也又用防已地黃湯癰

癩者用風引湯不寐用千金

酸棗湯流水湯健忘用歸脾

湯又發狂古金五兩以水五

合煮取一合入朱砂一匕服

有効○一貫云癲癩有蛇蟲

之候者鷓鴣菜湯兼用濕漆

丸穢物下蟲亦下者愈不下

者難治也癲癩卒厥之時脉

平也健忘多因瘀血者茯苓

杏仁其艸湯有効○田中氏

云癲癩用三聖散一吐後用

入鉛方有効○不寐龜井氏
用茸艸瀉心湯○按行餘醫
言痼病門後載不食之症云
不食之症云予所見及餘三
十人多是婦女而男子只有
二三其症他無所苦不思秬
食或食麥飯糯米粉或豆腐
屑云或終日不喫食餅而不
飢而自數日至數月以及數
年然形體不瘠脉多平緩間
或痞或痛苦強與之食必吐
云遇此症以措而不治乃為
真治法云予見此症二人皆
婦女也一人者好食糞食他
物則吐三年而復故一人者
只飲湯與他食則吐一年許
而復故皆措而不治真奇疾
也

勞病 失精盜汗陰痿

小建中湯 治虛勞裏急悸

衄腹中痛夢失精四肢痠
痛手足煩熱咽乾口燥者
○千金云凡男女因積勞
虛損或大病後不復常苦
四體沉滯骨肉疼酸吸々
少氣行動喘悒或少腹拘
急腰背強痛心中虛悸咽
乾唇燥面赤少色或飲食
無味陰陽廢弱悲憂慘感
多臥少起久者積年輕者
百日漸致瘦削五藏氣竭
則難可復振治之方

黃耆建中湯 虛勞裏急諸
不足 汗按大病後或產後盜
汗不止者加龍骨牡蠣

當歸生薑羊肉湯 治腹中

寒疝虛勞不足○按我邦
無羊可代用朝鮮產乾牛
肉中神氏以雞肉代羊肉
桂枝加龍骨牡蠣湯 脉得

證治類編 卷五

諸孔動微緊男子失精女
子夢交按發汗後盜汗不
此不可附子者用

灸艸湯治虛勞不足汗
出而悶脉結心悸者從千
金翼

八味丸補心
字虛勞腰痛少腹拘

急小便不利者○紀聞云

此方腰痛為準今之虛勞

此方症少矣冷勞定有効

小柴胡湯○柴胡姜桂湯

大柴胡湯○三物黃芩湯

麥門冬湯大逆上氣咽喉
不利止逆下氣

酸棗仁湯虛勞虛煩不得
眠

加減當歸芍藥散料

去澤加地黄五味麥門或

加參耆桂之類

懶肝散後時治冷勞又主鬼

症一門相染○紀聞云此

方勞瘵初發冷熱俱用虛

勞不用此方虛勞者有裏

急腹痛手掌煩熱等症瘵

者自初無如斯症有脉細

濕漆丸數咳嗽吐沫之症

治失精久不愈實杜蠟炒
右一味以酢糊為丸桐子

千金云夢泄精灸三陰交二

七壯又灸腎俞百壯

治陰痿露蜂房燒研酒服
此方出本艸本朝醫考宗

嗣經驗

治自汗盜汗五倍子一錢
錢枯

磬分五右為末用津唾調填

滿臍中以絹帛繫縛一宿

即止又有龍骨五倍子酢

調貼臍方

古云陰虛生內熱，又曰勞傷心腎而得之。心主血，腎主精，精竭血燥，則勞疾生。○明醫雜著云：午後發熱，咳嗽盜汗，飲食少進，甚則痰涎帶血，脈沉數，肌肉消瘦，此名勞瘵，最重難治。又曰：到脈細數則難為矣。○回春云：虛勞不受補者，聲啞者，生眠瘡者，發熱不休，形體瘦者，不治。○紀聞云：疝久不愈，為虛勞狀者，宜歸姜羊肉湯。然我邦無羊，代牛肉，惡牛肉之臭氣者，當飯建中湯，令餌食牛肉佳。○方輿輒云：女子十七八歲，經閉為勞瘵者，金匱大黃廔蟲丸有效。主治中腹滿，二字眼目也。又有如此症，用鼈甲芒消劑而全愈者。○方輿勞病煩熱者，用五蒸湯，乾血勞，苦煩熱者，用三物黃芩湯。又用本事方鼈甲五味子地骨皮三味丸，及朝鮮干牛丸，逍遙散。○按急勞之名，在聖惠及聖濟，或謂之暴急勞疾。又云：與熱勞相似，半月或一月死，人多不知也。予所見者，月餘而死。聖惠蝦蟆丸治急勞煩熱。蝦蟆一枚，胡黃連三麝香龍腦各一，右糊丸，予弱齡治勞病，用輕粉九日，一分二三日，惡症蜂起，不日而死。勞病忌峻藥，慎之。○凡勞病內與對症方，宜餌食鰾魚，間有愈者。

肺痿肺癰

桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫，治肺痿涎唾多，炙甘草湯。

心中温々液々者
生姜其艸湯 治肺痿欬唾

涎沫不止咽燥而渴
其艸乾姜湯 肺痿吐涎沫

而不欬者其人不渴必遺
尿小便數所以然者以上

虛不能制下故也此為肺
中冷必眩多涎唾

金匱云寸口脉數其人欬口
中反有濁唾涎沫者為肺痿

○聖濟肺痿門云或欬不
得欬欬則出乾沫胸中隱々

痛者是也○回春云無膿者
肺痿也○外臺蘇遊傳屍論

云氣急欬者名曰肺痿○良
方劫勞散証治云勞嗽寒熱

盜汗唾中有紅線名曰肺痿
由是觀之肺痿者為勞病

亦可徵香川氏丹波氏南陽
亦云本艸云魚肺

桔梗湯

加薏苡尤効

欬而胸滿振寒脉數咽乾
不渴時出濁唾腥臭久久

吐膿如米粥者為肺癰桔
梗湯主之千金作桔梗三

兩今從之○子和依此方
如薏苡糯米正宗依此方

加貝母紫苑杏仁名四順
散

桔梗白散

主治同桔梗湯

葶藶湯

欬有微熱煩滿胸

中甲錯是為肺癰

葶藶大棗瀉肺湯
肺癰喘不得卧

犀角○鯉魚膾正宗有犀角
薏苡仁粥代飯日食之

乾柿宜日食之
一男兒六歲患肺癰吐膿血
與桔梗湯加薏苡兼犀角每
日令食薏苡仁粥及鯉魚膾

善治
種者
佳

乾柿十餘日，膿血日減，月餘而全愈。○栗山先生患肺癰，服黃昏湯而全愈。黃昏合歡木也，用皮而佳。此方出千金及外臺。黃昏一枝，大右一味，以水二合，煮取一合，服。方輿○肺癰用薏苡根搗汁，頓熱服之，其効最捷。已潰未潰皆○可挽回，諸方不及也。又云：薏苡為肺癰專藥，根汁最効。朝通悉醫。○一方：華治肺癰，蘆若芽，大井艸中，石二味，濃煎服。○又方：岡生々乳分三糊丸，七日服。

金匱云：効即胸中隱々痛，脉反滑數，此為肺癰，咳唾膿血。

○按：枯梗湯。○潘氏續：燭試肺癰法，凡人覺胸中隱々痛，嗽有臭痰，吐在水內，沉者是癰膿，浮者是痰。集義云：今

驗果如其言，又以雙著斷之，其斷為兩段者，是膿，其粘著不斷者是痰，亦一試法也。○醫通云：肺癰初起，脉不宜數大，潰後最忌短瀼，脉緩滑面白者生，脉弦急面赤者死。若潰後大熱不止，胸中隱痛，痛在左畔，喘汗面赤，膿痰腥穢不已者，難治。若喘鳴不休，唇反咯吐膿血，色如敗濁，滯臭異常，飲食難進，爪甲紫而帶灣，手掌皮如枯樹，面艷紅，聲啞，鼻煽者不治。○按：肺癰五十以上者難治。一書云：一老儒患肺癰，用正宗金鯉湯全愈。○方輿初用四順散，或錄驗枯梗湯，後用葦莖湯，或黃昏湯。

腸癰

大黃牡丹皮湯 腸癰者小

登治高要社

卷九

聖濟
膿成
未成
皆下

腹腫痞按之即痛如淋小便
便自調時發熱自汗出
復惡寒其脉遲緊者膿未
成可下之當有血脉洪數
者膿已成不可下也

薏苡附子敗醬散 腸癰之
為病其身甲錯腹皮急按
之濡如腫狀腹無積聚身
無熱脉數此為腸內有癰
膿

排膿散 ○排膿湯

大黃牡丹湯去消黃加薏苡

湯 即千金腸癰湯也

伯州散 按腸癰外潰者腸

癰湯兼伯州或桂枝丸料

加薏苡黃耆若盜汗出者

者歸建中或附子劑等餌

食雞卵鰻鱺鯽魚重者宜

託外科

千金云腸癰之為病小腹重

而強抑之則痛小便數似淋
時々汗出復惡寒其身皮皆
甲錯腹皮急如腫狀其脉數
者少有膿也其脉遲緊者未
有膿也其者腹脹大轉側聞
水聲或遠臍生瘡或膿從臍
中出或大便出膿血 ○入門
云癰生小腸分尤可大腸分
近肛門者難治肛門破者即
死 ○正宗云潰後膿腥臭穢
或流敗水濁痰虛熱更增不
食者死 ○本艸云薏苡仁冬
瓜仁甜瓜仁皆治腸癰敗醬
除癰腫黃耆除腸胃間惡血
皂角刺治腹内生瘡

諸失血

瀉心湯 心氣不定吐血衄

血 ○心下痞為準九竅出

血皆用輕者加地黃重者

加生地黄汁

證治高要上

四

黃連解毒湯 瀉心湯症而重者尿血重者亦用、小柴胡湯或加連 諸失血胸脇苦滿者、

麥門冬湯 或加地黄或石膏治咳血并血症後上逆

栝葉湯 吐血不止者○吐血用諸方不止者下血不止者亦效馬通汁代童便佳

黃土湯 下血先便後血此遠血也亦主吐血衄血○不拘先便後血而可也吐血衄血共脈緊者有此湯之症又崩漏脈緊者用之有效

猪苓湯 治尿血重者兼用黃連解毒湯尿血無痛血淋有痛治方一也

芎歸膠艾湯 香川氏吐血

欬血尿血用之、

桃核承氣湯 治吐血覺胸中氣塞上吐紫血

童便 褚氏遺書云欬血飲溲溺則百不一死又集解云治欬血吐血及產後血運陰虛久嗽火蒸如燎

○昔者一醫患吐血百治無效日服童便五合月餘而全愈

犀角 治吐血衄血下血

紅礬丸 治久下血面色青黃動悸劇者

荆芥湯 治九孔出血荆芥一味煎服○鼻衄不止用之

治下血奇方 亂髮霜 每服五分白湯下日三

聖濟唾血不止蒲黃一味研細每服三錢匕冷水調下○

治下血奇方 亂髮霜 每服五分白湯下日三

聖濟唾血不止蒲黃一味研細每服三錢匕冷水調下○

治下血奇方 亂髮霜 每服五分白湯下日三

吐血門有單人參散○治血
 血龍骨末五倍子末枯礬少
 許各一味吹鼻中○食治門
 治吐血用大豆濃煎汁治下
 血又食野猪肉○舌上出血
 黃栢一味為散每服二錢已
 ○正傳舌上出血如線槐花
 炒末摻之又蒲黃炒焦傳之
 ○諸失血皆是陽盛陰虛悉
 宜四物湯加知栢為主治○
 治衄血灸大椎啞門二三壯
 ○方輿灸法治下血無度脊
 中對臍一穴五壯或十壯衄
 血亦可又灸足三里二穴○
 古云失血大概俱是熱症脉
 宜沉細設見洪大後必難治
 ○要訣吐血嗽血用養正丹
 靈砂丹皆水銀劑也○山照
 氏和田氏吐衄咳血用參連
 湯○謙齋曰專音聲人吐血

者多有焉○和田氏云大吐
 血其血不止者或昏暈者俱
 灸鳩尾穴其艾火如中指頭
 數百壯開其閉塞血能止數
 得効又云失血瀉心湯加荆
 芥一二錢大効又云大吐血
 症用麥門冬湯加連石膏屢
 得効○五竅出血以井花水
 當面連噴幾口急分開頭髮
 用粗紙數層蘸醋令透搭在
 顛門其血即止○一書云明
 礬治諸失血每服半錢大麥
 煎湯送下多用則嘔少許度
 々可用又蘭書有明礬血竭
 二味方○蘭書云吐血出於
 肺者胸中微痛而熱口中其
 咽喉中痒咳血其血必為泡
 沫甚則立死血線亦出於肺
 惡候也吐血出於胃者惡心
 而吐血血反多其色黯赤凝

結與食物交出其血不為泡沫此症無不愈矣○醫言云吐血從胃脘逆升上出於口也衄從頭中滲漉下洩道出於鼻也吐血逆上故多死衄順下故死者至希古人並稱吐衄俱為劇症者非矣○方輿輒云吐血後惡心嘔吐者乘血在內未盡也又瀉心湯治九竅出血按葶加生地黃犀角名犀角地黃湯○按吐血後不寐黃連阿膠湯有效又吐衄血不止茅花加其艸少許煎服有效此方在外臺又蒿雀霜亦有效要訣衄血用單茅花湯山脇氏二白湯治吐血唐白及白茅根二味水煎服○方輿載獨參湯及參連湯犀角地黃湯痰飲咳嗽

大青龍湯○小青龙湯

病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龙湯亦主之

小青龙加石膏湯 肺脹欬

而上氣煩躁而喘脉浮者

心下有水○咳嗽吐白沫

殆欲成勞者又喘哮多用

之

越婢加半夏湯 咳而上氣

此為肺脹其人喘目如脫

狀脉浮大者○乾咳者又

哮喘多用之

射干麻黃湯 欬而上氣喉

中如水雞聲外臺水上

皂莢丸 欬逆上氣時々唾

濁但坐不得卧○痰粘著

胸中難出者

麥門冬湯 大逆上氣咽喉

不利止逆下氣者○聲啞

者効

麻黃甘草加杏仁生姜湯

治風寒咳嗽多痰語音不

出者麻黃杏三味等傷風

咳嗽語音不出者先服此

湯取微汗熱解後語音不

出者服麥門冬湯

其遂半夏湯病者脉伏其

人欲自利利反快雖利心

下續堅滿此為留飲欲去

故也○利反快與心下堅

滿為準

十棗湯脉沉而弦者懸飲

內痛○病懸飲者○欬家

其脉弦為有水○夫有支

飲家欬煩胸中痛者○夫

心下有留飲其人背寒冷

如手大○此諸症之中有

一症則宜用此湯
姑洗丸 十棗湯証輕者

未防已湯 膈間支飲其人

喘滿心下痞堅面色鰲黑

其脉沈緊得之數十日醫

吐下之不愈未防已湯主

之虛者即愈實者三日復

發復與不愈者宜未防已

湯去石膏加茯苓芒消湯

主之

苓桂朮甘湯 短氣有微飲

當從小便去之

茯苓飲 治心腹中有停痰

宿水自吐出水後心腹間

虛氣滿不能食消痰氣令

能食○吐宿水為準

枳朮湯 心下堅大如盤邊

如旋杯水飲所作○此湯

症按腹則轉々有聲此湯

効遲或兼用其遂半夏湯

小柴胡湯○柴胡姜桂湯○

登第商...

四

四逆散 此三方久咳或因
腹候用之

苓桂五味甘草湯

苓甘五味姜辛湯

苓甘五味姜辛夏湯

苓甘姜味辛夏仁湯

以上五方咳嗽無表症者

可用之金匱証治有可疑

者宜從方極主治

真武湯加乾姜細辛五味子

○水飲與裏寒合而作嗽

腹痛下利指直

瓜蒂散 子和痰飲咳嗽用

之

南呂丸 秘結者兼用之

七寶丸 紫圓

金匱云其人素盛今瘦水走

腸間漉漉有聲謂之淡飲飲

後水流在腹下飲唾引痛謂

之懸飲飲水流行歸於四肢

當汗出而不汗出身體疼重

謂之溢飲軟逆倚息短氣不

得卧其形如腫謂之支飲○

夫心下有留飲其人背寒冷

如手大○胸中有留飲其人

短氣而渴四肢歷節痛○膈

上之病滿涎欬吐發則寒熱

背痛腰疼目泣自出其人振

々身暈劇必有伏飲○按後

世以痰懸溢支留伏為六飲

○方輿載厚朴麻黃湯澤漆

湯清肺湯百合知母湯三拗

湯紀開曰將成勞咳者用小

青龍加石膏湯有效疫邪解

後或瘡後咳嗽不已巨里動

悸劇將成勞狀者百合知母

湯有效世稱痰癆者似癰癧

內用滾痰散外用傅藥其方

大黃芒消五倍子天南星各

等分

白五

登名商

白五

白五

等分南星生則大効。○要訣
咳用犀角鹿茸胡桃諸嗽加
喘氣急者用水銀劑。○治三
十年嗽金千部根二十斤搗
取汁煎如飴服方寸匕日三
服深師加蜜二斤外臺加飴
一斤。○治嗽不止方必効生
姜五兩錫半升火煎熟食
瘡段侍御用之有効。○又干
金有姜汁砂糖方。○治失音
不語齊普菜菔汁入姜汁服。

喘哮

桂枝加厚朴杏子湯
小青龍加石膏湯 嗽而上
氣煩躁而喘脉浮者心下
有水

大青龍湯 喘有表症者
麻杏苒石湯 喘惡寒止者
越婢加半夏湯 嗽而上氣
此為肺脹其人喘目如脫

狀脉浮大者。○醫宗必讀
云一令愛久嗽而喘百治
無効一日喘甚煩躁余視
其目則脹出鼻則鼓扇脉
則浮而大肺脹無疑以此
投之一劑而減再劑而愈
射于麻黃湯 喘已作咳者
水防已湯 心下痞堅氣急
者

皂莢丸 哮喘不得卧者
南呂丸 ○姑洗丸 ○七宝丸
紫圓 ○化毒丸 ○救喘丸
治哮喘用芋麻根和砂糖爛
煮時々嚼嚥下永絕病根
又用猫兒頭骨燒灰酒調
二三錢一服便止正傳
上氣喘嗽沙糖姜汁煎嚥
又喘息欲絕飲韭汁一升

哮喘輕粉丸有効小
本

喘脉宜浮遲不宜急疾數直視謔語喘滿者不治正傳○九喘作於大病之後者上喘咳而下泄瀉者婦人產後因亡血過多者多危殆醫統○方輿載干縉湯及參連湯喘四君子湯

眩暈

苓桂朮甘湯 心下逆滿氣

上衝胸起則頭眩者發作

澤瀉湯

心下有支飲其人

苦冒眩者○頭眩不止為

準

五苓散 臍下有悸吐涎沫

而顛眩此水也○夏日眩

有効

小半夏加茯苓湯 卒嘔吐

心下痞膈間有水眩悸者

嘔吐而眩者効

應鐘散 秘結者兼用之

眩暈不可當者以大黃酒

炒為末茶清調下正傳

苓桂朮甘湯合瀉心湯

治失血後并產後眩暈

當歸芍藥散料中三倍芍

歸煎服兼用回生散

真武湯 此湯症希有焉

南陽云眩暈白虎湯有効

元生膏家 貼百會

聖濟有灸百會塗蓖麻子取

膿血之法此元生為勝○要

訣用靈砂丹

大便閉

三承氣湯 隨證用之

麻仁丸 或為湯加桃仁

蜜煎導○承氣丸

三黃湯 或加茸艸煎服

按平生秘結之人大黃茸

艸湯加芍藥為散服或煉

蜜服芎黃散煉蜜服亦佳
耳遂丸○輕粉丸○巴豆丸
聖惠治大小便閉脹悶欲死

輕粉錢一麻油合相和服
本艸燥結門治冷閉附子為
末蜜水服○按是希有之
証若有此症則宜與對証
附子劑聖濟謂之冷秘即
用附子劑

方輿載宣明論倒換散大黃
荊芥二味也

小便閉

猪苓湯 加車前子或消石

桃核承氣湯

八味丸 產前後小便閉用

之

施整胎術泄閉術男子脉
緊者或用之

大黃耳遂湯 治小便閉劇

証

黃丹膏 黃丹錢十 巴豆個五

右二味先研巴豆內黃丹

加蜜少許相和塗紙貼臍

下一寸五分

六物解毒加反鼻湯 治徽

毒家小便閉○方中十倍

土茯苓三倍大黃加反鼻

二錢以水二合五勺煮取

五勺頓服累用累驗土茯苓

茶上品細剉用

治小便不通方 朴消一味

細研為散每服二錢匕酒

調下聖濟

治小便不通臍下急痛脹悶

欲絕 塩升 右一味錘

中炒令極熟布帛裹慰臍

下以小便通快為度聖濟

古云小便閉皆宜吐之以提

其氣氣升則水自降○丹

溪云吾以吐通小便用瓜

此湯
濃煎
深松

蒂之類

聖惠轉胞條八味丸治小腹

急痛不得小便按急痛為準

又云以蒲黃畏患人腎令頭

至地二度即通

小便閉八正散有奇效倒換

散亦有効梅毒家小便閉

亦八正散有効紀聞

淋

猪苓湯加消石湯治諸淋

并膿淋血淋加車前子或

浮石

大黃牡丹湯加反鼻

六物解毒加阿膠滑石湯

治膿淋小便赤澁莖中痛

者

土茯苓上品細通艸

忍冬剉二錢滑石阿

膠各七分大黃各半茸各三

石各八味以水三合煮

石味六加
毒物解湯

取一合半內膠烱尽分温

服忌海腥煎炒鹵塩房事

等件一日服三劑尽不愈

者加至四五劑至重者七

倍土茯苓三倍大黃倍餘

藥加反鼻二錢以水四合

煮取二合五勺再以水三

合半煮取二合俱合和空

心一日一夜服尽雖膿淋

至重者用此湯七日而無

不奏効矣若或大勢已解

莖中有痛者日用七宝丸

一分許七八日而無不愈

者矣屢用屢驗○服藥中

宜日食雞卵三四枚雞肉

愈佳此先輩之試驗也

黃連解毒湯治血淋

桃核承氣湯

大黃耳遂湯

諸淋秘結少

腹滿者兼用之

登諸醫書

四九

承氣丸○七宝丸

崔氏療尿血方 大黄末

芒消半匕各石二味冷水和

頓服之立止

治熱淋聖濟 消石一味研細

蜜水服

惠美氏方書淋門有猪苓湯

加附子此方冷淋定有效按

淋疾小便赤洪莖中痛者用

猪苓湯或加車前子大黄出

膿者猪苓加消石湯血淋猪

苓湯加浮石或兼用承氣丸

不愈者用黃連解毒湯或因

腹候兼用桃核承氣湯世所

謂自微毒來膿淋者用加味

六物解毒湯或大黃牡丹湯

兼用輕粉丸○古云淋疾脉

盛大而實者生虛細而瀦者

死○方輿載八正散通天再

造散○一貫云遺尿者臍上

一二寸右之方有凝結者用

縮泉散則自消消則遺尿亦

愈縮泉散方雞屎二錢桂枝

五分右二味為末酒服方寸

匕日三灸十六俞章門凡腰

部佳八膠尤良灸七日而大

抵愈本艸雞屎燒灰一味酒

服又淋疾膿出者海浮石燒

為末温酒服一錢日二有效

○一婦人年三十患膿淋小

便晝夜四百餘行尿道痛甚

號泣聲徹四隣且經閉二年

常坐臥草蓐之中易醫廿二

人而不治三年請余余即與

加味六物解毒湯七倍上品

土茯苓三倍餘藥加及鼻二

錢濃煎一日服尽七日而經

水下四五日痛漸緩尚用前

方通計二十八日而瘥去草

蓐坐臥如常而尿道痛不全

治、又日與七宝丸一分十日許而全愈、

消渴

白虎加人參湯 大渴舌上

乾燥而煩、欲飲水數升者

麥門冬加石膏湯

調胃承氣湯 中消消穀善

饑不甚渴、小便赤數、大便

硬者、門入○消穀為準

腎氣丸 男子消渴、小便反

多以飲一斗小便一斗○

紀聞云此症小便生泡如

膏○門入云小便混濁如

膏淋然、

枯萋瞿麥丸 小便不利者

有水氣其人若渴○一老

醫曰、入夜舌乾、不得眠者

經久必為消渴、宜用此煉

蜜緩々服、

文蛤散 非文蛤亦可用、常

之海蛤煎用大効

炙甘草湯 加黃連知母或

黃耆鹿角

繅絲湯 治三焦渴如神

如無繅絲湯却以原蠶繭

殼絲煎湯代之大効

治消中、日夜尿七八升者、千金

鹿角炙令焦、末以酒服五

分匕、日三、漸加至方寸匕

蝸牛散 蝸牛性燒存右一味

為末、每日一錢、至一錢五

分、白湯送下、妙惠美三

治渴利、小豆汁方聖小豆限不

多右一味、水煮熟、擣爛、細

布絞取汁、不拘時頻服

消渴有蟲者、苦楝根皮焙乾

入麝香少許、水煎空心服

本艸云○小麥作粥飯食○

薏苡仁煮汁飲○田螺煮

汁飲○蜆并田螺浸水飲
○冬瓜汁○梨汁○藕汁
皆治消渴

天花粉者治消渴之聖藥聖傳

天花粉餅代飯日可食

消渴三禁飲酒房室鹹食金十

岐伯曰脉實病久可治脉弦

小病久不可治傳正

方輿載生津湯其方自外臺

來麥門黃耆括萎其艸人參

黃連牡蠣地黄知母右九味

或加石膏○紀聞云或用干

金鉛丹散其方鉛丹胡粉其

艸澤瀉石膏括萎根白石脂

赤石脂八味等分為散每服

二錢水調下日三夜一鉛丹

久服腸痛則宜減之

中風

瓜蒂散 五十以下偏枯痰涎滿胸者可吐之腹氣不

聖濟四倍根

堅實者決不可與吐考

按正傳獨聖散則一物瓜

蒂散也其主治云治諸風

痰盛及諸癩痰飲壅溢等

症

藜蘆湯 治証同前

吐方考云藜蘆華產為可

尤多毒用之若二分若三

分田中氏云中風用此湯

功勝於瓜蒂

備急丸 卒中風口噤者

按全書解毒雄黃丸主治

云治中風牙關緊急及痰

涎咽喉腫閉牙關緊閉開

口灌下子用備急圓其功

同於雄黃丸

瀉心湯○附子瀉心湯

大柴胡湯○小建中湯

四逆散加乙切艸 家翁用

之

大青龍湯

古今錄驗續命湯 治中風

痺身體不能自收口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側○不遂痰喘有熱為準

烏頭湯 半身不遂及左右

手足蜷攣者烏頭湯微汗之門○中風自衄來者脉多緊也用之

葛根加木附湯

桂枝加木苓附湯

真武湯 振々搖者

八味丸○南呂丸

十棗湯○姑洗丸

控涎丹主治云治痰涎留在胸膈上下變為諸病或頸項胸背腰脇手足膝髀隱痛不可忍筋骨牽引鈞痛走易及皮膚麻痺似乎

中風不語用氣調承加飯取後物加姜蠶

癰癩不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又治頭痛不可舉或睡中流涎或咳唾喘息或痰迷心胸並宜此藥數服痰涎自失諸疾尋愈○按控涎丹原出聖濟名趁痛丸治風毒走注疼痛方也三因名之控涎丹控涎十棗二方所主治略同只有輕重之分耳十棗之輕者用控涎控涎之重者用十棗而可也

大承氣湯 食厥者

重者兼備急圓○腹滿為準

桃枝承氣湯 因瘀血者

濕漆丸 同前

黃耆桂枝五物湯 身體不

仁如風痺狀者○按此湯

勿減生姜減則無效

七宝丸 按要訣中風昏沉
不省人事痰涎壅盛者用
養生丹予用此丸

元生膏

○ 螞針

中人半身不遂而精神如
故不如癡者內用對症方
外貼此膏於不遂之手足
六七日糜爛處施螞針去
惡血復貼膏施螞針如斯
二三月施治則病十治八
九病人倚杖緩步而行三
四里大効

治三年中風

金干 松葉一斤

細切以酒一斗煮取三升
頓服汗出立瘥

治中風不語

大豆煮汁煎

稠如飴舍之并飲汁○又

殭蠶七枚為末酒服本

炒豆紫湯

治中風口噤

○用鵝豆五升清酒一斗

炒令烟絕投酒中待酒紫
赤色去豆量性服之○按

千金大豆紫湯豆淋酒聖
濟大豆酒皆同方也千金

云中風口喎日服一升破
傷風產後瘕病并諸病服

之大効

白礬散

濟聖 治中風舌強不

得語白礬生桂枝各二

二味搗羅為散每服一錢

匕安舌下有涎吐出即語

韭汁

治中風失音華日

竹瀝湯

金干 治四肢不收心

神恍惚不知人不能言

竹瀝升二生葛汁升一生姜汁

合三右三味相和溫暖分三

服平旦日晡夜各一服○

又有荆瀝竹瀝姜汁三味

等分方○又治中風口噤

不知人者方服荆瀝一升

卒中風口噤不得開灸機關

○又方服淡竹瀝一升

分少近前灸五壯即得語

回生散方治中風口噤

每服二錢酒送下○又荆

芥薄荷等分煎服有奇効

一醫云中風風引湯有効○

凡初中時昏沉口噤不能進

藥急以生半夏末吹入鼻中

或用通關散搐鼻內提起頭

髮立甦有嚏可治無嚏不可

治或急以手指掐刺人中即

醒其或不醒者急以三稜針

刺手十指甲角十井穴將去

黑血就以氣針刺谷二穴

人中一穴覺稍醒即多灌香

油或加麝香一二分或姜汁

亦可世濟

初病暴仆昏悶不省人事或

痰涎壅盛舌強不語兩寸脉

浮大而實急用吐法人迎脉

緊急或六脉浮盛者急續命

湯表之○大法中風脉浮遲

者吉急疾者凶正傳○若中人

髮直吐清沫搖頭上攢面赤

如粧汗絳如珠或頭面赤黑

眼閉口開手撒遺尿聲如鼾

睡俱不可治要訣○山東洋云

中風者心胸間蓄熱也宜石

膏劑○按中風有齕者脉浮

大痰涎壅盛者遺尿者凶兆

○後藤氏用艾鼻酒載附錄

○方輿載通關散參連湯滌

痰湯無憂散艾鼻酒

脚氣痿躄

越婢加朮湯治下焦脚弱

○脉浮惡風無大熱為準

越婢加朮附湯

按千金越婢湯即此方主

證治篇

治曰治風痺脚弱方方後云覆取汗

烏頭湯 治脚氣疼痛不可

屈伸○煎法可從大烏頭

疼痛為準

煎方 八味丸 治脚氣上入小腹

不仁 桂枝加朮苓附湯 以上之

五方無衝心狀者用之

木防已湯○同去石膏加茯

苓芒消湯 此二方中加吳

茱萸氣急心下痞堅有衝

心狀者用之兼用仲呂鞋

賓紫圓等

吳茱萸湯加橘皮紫蘊湯

半夏厚朴加吳茱萸橘皮湯

乾濕脚氣氣急而胸動劇

者將衝心之兆也撰用右

二方脚脛施螞針時々用

紫圓一二分或三四分下

之則無不愈矣若小水短

少胸膈滿悶短氣喘息嘔

吐者是衝心也宜決意用

紫圓一錢

螞針足上廉下廉絕骨承

山之近所不拘經穴除動

脉并禁刺穴麻痺處悉施

螞針出血出紫黑血者尤

有効血止即診巨里動則

安定也此為驗大抵一日

兩脚水蛭十五枚許為限

日々施之四五日或六七

日而止妙不可言

元生膏 冬春此膏代螞針

犀角 毒氣攻心煩悶者

每服五分日二或三

仲呂丸○鞋賓丸○紫圓

七室丸○赤小豆藥○灸八

所金 生姜湯 治脚氣胸滿吐

逆不下食或吐清水涎沫
生姜兩五右一味絞取汁煎
合熟每服半合以熟湯半
盞調勻服之

治脚氣衝心悶亂不知人醫
大豆一升水三升濃煎取
汁頓服半升如未定可更
服半升

松葉酒方見治脚氣骨節疼
痛

虎骨酒 治脚氣差後腰脚
不遂者生地黄錢十六干膝

錢七桂枝木瓜虎脛骨各五
蝮蛇錢二右六味漬醇酒錢八

合三日去渣每飲一杯日
二夜一

或曰脚氣衝心金匱風引湯
有效

要訣云脚氣喘急者此係入
腹仍佐以養生丹劑水銀

揚大受云脚氣是為壅治當
以宜通之劑使氣不長成壅
也壅既成而盛者砭惡血而
去其重勢○外臺云脚氣脉

三種以緩脉為輕沉緊為次
洪數者為下○方輿載大小

拱榔湯木菜湯拱蘓湯外臺
犀角湯大拱榔湯方拱榔分六

半生姜錢一橘皮紫蘓木瓜分六
菜萸各五分石六味以水二合

煮取一合○或曰拱榔末用
則大効○按聖惠方此方加

木香少許主治云治脚氣衝
心煩悶喘促凡乾濕脚氣巨

里動甚者將衝心之兆也禁
附子劑犯之必殺人宜用吳

茱萸消黃甘遂巴豆等下之
脚氣嘔吐有半夏無効者或

用犀角無効者將衝心用紫
圓一錢大効脚氣氣急之症

初脚脛數所施，蟻針出血，則衝心氣急之候，脫然去，此予所經驗也。○又痿躄者，脚脛有毒也，三陰交絕骨邊貼元生膏有效，輕者灸亦效。內用對症方，不可附子者，用黃耆桂枝五物湯，方中勿減生薑。南茅街米商伊勢屋喜兵衛，注管某年二十三，脚氣一身，洪腫，巨里如奔馬，滿悶短氣，嘔吐不下，食大小便不通，眾醫辭去，予與水銀三錢，小便通，一合許，前証如故，復與元生丸，小便利，亦一合許，而無驗，決意與紫圓一錢，吐瀉二十餘行，下蛔虫五條，前証頓退，調理二十日而全愈。○京橋五郎兵衛街紙戶伊勢屋作兵衛，主管嘉兵衛年二十一，患脚氣腫滿，始無衝心之狀，予與木防已去石膏加茯苓芒消湯，六七日，一朝衝心氣急嘔吐甚，與紫圓一錢，暫時而吐，復與紫圓一錢，吐瀉十七八行，下蛔虫六條，前証頓退，復與木防已湯，二十日而全愈。

痛風 霍麟風

桂枝附子湯

甘草附子湯

風濕相搏骨

節煩疼，掣痛不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，或身微腫者。

痛風大抵此湯症多有焉

烏頭湯

病歷節不可屈伸

疼痛○脈緊者用之

桂枝芍藥知母湯

諸肢節

疼痛，身體羸瘦，脚腫如脫，頭眩短氣，温々欲吐。○肢

節疼痛為準○霍膝風或

加當飯川芎

葛根加木附湯

越婢加木附湯

麻黃加木湯 不可附子者

越婢加木湯 同前

古今錄驗續命湯

姑洗丸 治風毒走注疼痛

聖濟

七宝丸 痛風有不宜附子

劑者初用麻黃加木等六

七日熱解後後藤氏解毒

劑兼用七宝丸

蒸劑方蓮葉 苦薏忍冬等

分石三味盛袋以水一升

許煮令熱狹于板絞以慰

痛處加烏頭益效○按痛

風劇症遍身走痛如刺日

夜不眠叫號聲徹四隣者

雖內用烏附劑非外用蒸

劑則不能就眠昼夜慰之

六七日則大勢已解而病

人能睡至此休蒸劑又服

前方數日痛不全去者兼

服七宝丸一分或二分七

八日而無不愈者矣

及鼻酒○松葉酒

蟻針○元生膏

治歷節風痛 獨活 羌活

松節各等分用酒煮過服外

又方川木通二兩煎頻服服

後一時許遍身發痒或發

紅丹勿懼遍身上下出汗

即瘥集要

威靈仙為痛風要藥為末酒

下或丸服以微利為効本

沒藥同虎脛骨末酒服治歷

節風痛不止本○入門痛風

門下体痛條痛甚加乳香沒

藥熱者合大承氣湯下之○

按以上奇方不可附子者宜
用○一貫云痛風痛夜甚者
用桂枝茯苓丸料兼紅藍花
酒又金鈴散痛風痔疾用之
牽牛子一味為散每服五分
或七分酒服日三○方輿載
千金犀角湯大防風湯金鈴
散赤龍皮湯

療霍膝風方 烏頭 桑寄

生雲母 丁香 防已 天

麻各等 右六味為粗末分取

一錢五分漬醋一合製造方

五寸許箱石菖根鋪其底厚

五分所燒石雞子置石菖上

灌所漬之醋于石藥氣發揚

急蓋之令不漏氣為要即移

箱於患所之下以衣覆之乃

去蓋藥氣徹肉中而汗出於

患所如此者日數次腫日減

而復故○安政乙卯冬關東

脚腫不細為異

大地震江戶士民被壓傷者
夥矣時患卒霍膝風者數人
皆惡寒發熱身體痛或右膝
或左腫大而痛不能起居初
與越婢木附湯而發汗三四
日而身痛去但膝頭腫大而
痛不去與桂枝芍藥知母湯
膝頭施蜈蚣針數枚每日取血
月餘而全愈○按痛風雖舌
有胎身有熱口中和者宜用
烏頭附子也口中和者一切
鹹味烟草類不變味是也大
便難者可日兼用黃鐘姑洗
丸等也

頭痛

大承氣湯 入門頭風門云

有偏痛年久便燥目赤眩

暈者氣鬱血壅而然宜大

承氣湯下之○一男子卒

偏頭痛甚叫號驚四隣諸

醫治萬應

治無効經三日予與大承氣湯三貼下利數行而全愈

白虎湯

舌上黃黑者與方

舌上乾燥頭盡痛無渴亦可用

小柴胡湯○大柴胡湯

因腹候用之或加石膏

吳茱萸湯 乾嘔吐涎沫頭痛者

桂姜棗艸黃辛附湯

頭痛無熱唯惡寒大便自可脉沉細全陰狀者

六物解毒湯 主微毒頭痛

○方中十倍土茯苓三倍大黃倍餘藥煎法服法禁忌如淋疾門加味六物解毒湯用之不差者或兼施七宝丸或貼元生膏於百會六七日蜚針去惡血如

此四五次則無不痊矣元生膏○蜚針

世稱宿疾頭痛藏無他病者必頭有惡血也施元生蜚針即效

應鐘散 茶清送下○姑洗

丸○南呂丸○瓜蒂散○塩湯

李東垣曰頭痛久不已則令人喪目胸膈有宿痰之致然也先以茶調散吐之○按外臺葛氏卒頭痛如破用塩湯吐之方輿載常山艸湯張子和亦用瓜蒂散

本艸云頭痛欲死消石末吹鼻內又一物瓜蒂吹鼻中

按小兒卒頭痛甚反覆顛倒發作有時者蛔蟲也宜用鷓鴣菜湯婦人月事之時及產

前後頭痛輕者當飯芍藥散
料兼用草香附子散宿疾頭
痛輕者以三稜針刺懸顱懸
鬚絲竹空腫子髎等○一書
云真頭痛者手足厥冷爪甲
青引腦巔泥丸盡痛若其厥
冷上肘膝者死速灸百會數
十壯作大劑參附湯頻服免
死者間有焉○頭痛脉浮滑
易治短瀼難治訣脉

肩背痛

葛根湯 項背強几々

桂枝加葛根湯○葛根木附

湯○大陷胸湯 因留飲而

肩背強者又龜背者兼之

姑洗丸 大陷胸之輕者○

有持云治項背強痛或臂

不能舉者

當歸四逆加吳茱萸生姜大

黃湯 疝氣從肋骨邊至脊

及肩強痛者

南呂丸○應鐘散

元生膏○螞針

元生膏貼患部後施螞針

復秋直施螞針即效

紫圓 醫通云當肩背一片

冷痛背脊疼痛古法用神

保丸神保也

一貫云龜胸龜背一也龜胸

後必成龜背也對症方多加

山慈姑令長服兼用紫圓間

日夜服自二三分加至四五

分小兒者用一分許十五歲

以下可治十五以上不治○

方輿載六物敗毒湯提肩散

本事方椒附散

心痛 胸痺結胸

枳實薤白桂枝湯 胸痺心

中痞留氣結在胸胸滿脇

下逆搶心

栝蒌薤白白酒湯 胸痺之病，喘息咳唾，胸背痛，短氣，寸口脈沉而遲。

栝蒌薤白半夏湯 胸痺，不得臥，心痛徹背者。

按心痛徹背，疑似真心痛者，先與此湯，兼用大陷胸湯，九痛丸，備急丸，亦用。

大陷胸湯 心痛及結胸，將成，龜胸者，皆用之。

九痛丸 治九種心痛，備急圓 心痛用此丸，聖濟。

小陷胸湯 心中結痛者，○ 枳子豉湯 一種為懊惱狀者，心痛，有一種為懊惱狀者，用之。

茯苓杏仁耳艸湯 胸痺，胸中氣塞，短氣，茯苓杏仁耳艸湯，主之。橘枳姜湯亦主之。○ 胸痺，輕症，氣塞短氣。

為準 橘皮枳實生姜湯 此方主治與前方異，宜從方極。桂枝生姜枳實湯 心中痞，諸逆，心懸痛。

薏苡附子散 胸痺緩急者，○ 急症用之，緩急二字，詳見本書。○ 一貫云：白酒湯之劇症，痛甚，手足厥冷者，此散有效。

大建中加烏梅湯 因蟲者，人參湯 ○ 耳草乾姜湯 姑洗丸 ○ 失笑散 桃仁承氣湯 心痛，脈弦有死血，丹。

必効療 蠅心痛方，蠅 熊膽如大豆，和水服，大効。心胸痛奇方，嚴酢半合，雞卵一箇，相擾頓服，神驗。武氏田

胸痺痛如錐刺服韭汁吐去惡血，升生韭根五

升生韭根五

升生韭根五

升生韭根五

升生韭根五

升生韭根五

靈樞云真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死古人云非藥所能治也○和田氏云真心痛痛在膻中煩躁反覆顛倒脉結代用大陷胸丸痛久而難治○真心痛自古為必死然宜用此方救之芭蕉搗取汁生酒調和服養生記引○入門云瘀血痛飲湯水燕下作飢乃素食熱物血死胃腕桃仁養氣湯輕者四物湯加桃仁紅花○醫通云蟲痛面有白斑唇紅能食或口中沫出痛有必休止○又云心膈大痛發厥嘔逆諸藥不納者越勢以鷲羽翎探吐痰涎盡而痛愈○按先是張介賓有此說聖濟并諸書心痛不用吐劑○古云脉沉細而遲者易治浮大弦長皆

難治○方輿載千金陷胸湯烏頭赤石脂丸栝榔雀鼠散枳縮二陳湯高良姜湯

治卒暴心痛事林廣記五靈脂炒半錢乾姜一分泡為末熱酒服立愈童便三服內○按

白酒宜用醇酒也家君有白酒辨北洲吉益氏云禮記曰其酒清白皆謂美酒也此蓋東洞先生之遺言也詳見本書

腹痛

大承氣湯 卒腹滿而痛煩悶口噤欲死者

備急圓 心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤

桂枝加芍藥大黃湯 桂枝加芍藥湯○小建中湯

小柴胡湯 胸脇苦滿腹痛者

大建中湯 心胸中大寒痛
嘔不能飲食腹中寒上衝
皮起出見有頭足上下痛
而不可觸近

附子粳米湯 腹中寒氣雷
鳴切痛胸脇逆滿嘔吐
黃連湯 胸中有熱胃中有
邪氣腹中痛欲嘔吐者

靈黃散 治血氣刺痛兼治
疝痛從少腹上衝心者

灸 內關 中脘 氣海
神闕 灸之 水分 膈俞

脾俞 胃俞 右八處灸
治疝并陰症腹痛
桃核承氣湯 腹痛因瘀血
者

桂枝茯苓丸 料加大黃紅花
湯治瘀血作腹痛者兼治
瘕後腹痛結毒并瘡疥內
攻腹痛 ○丹溪因跌撲損

傷瘀血作腹痛者用桃核
承氣湯加當歸紅花蘇木
入酒童便煎服下之

七宝丸 ○化毒丸
此二方治久腹痛

一書云久腹痛生漆丸有效
蒸劑方家 腹痛甚者熨之
一老醫曰產後少腹痛用下
劑而不愈者桂枝茯苓丸
料加當歸紅花延胡索大
効延胡索少腹痛專藥也
云

荻野氏云少腹痛無食積蟲
積皆蓄血與疝也 ○河澗心
腹痛不可忍者乳香沒藥酒
煎服 ○綿綿痛無增減沉遲
者寒痛也乍痛乍止脉數者
熱痛也痛不移處者是死血
也肚腹作痛或大便不通按
之痛甚瘀血在內也時痛時

證治摘要 卷五

止面白唇紅者蟲痛也春

○蟲痛肚大青筋往來絞痛痛定能食發作有時不比諸痛停聚不散又云瘀血痛必著一方門○和田氏云久腹痛不減食則不治宜以米一合五勺作中一日食也作粥最佳禁一切青菜油膩粘滑水飲乾硬物而施治則無不愈矣○方輿載安中散高良姜湯手捻散

腰痛

苓姜木耳湯 腰以下冷痛

腰重如帶五千錢者○干

金此方加桂枝澤瀉杜仲

午膝名腎著散粗散酒煮去滓服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

治疝氣腰痛打撲腰痛輕者

桃核承氣湯 治打撲腰痛

經閉腰痛日輕夜重者

桂枝茯苓丸料加當歸大黃

治前症輕者

當歸四逆湯 或加附子

八味丸 虛勞腰痛少腹拘

急小便不利者

大黃附子湯 腰痛脇肋痛

不大便脈緊因疝者

仲呂丸 ○元生膏

本艸腰痛門外治條云痰注

及撲損痛芥子同酒塗

治腰痛傳正 大黃生薑煎服

醫通云腰痛大便閉者用大

柴胡湯微利之○按平生

秘結四五日而腰痛者下

之愈

灸腰眼八節金十 章門病因

保命歌括腰痛門云委中二

穴主瘀血痛宜用三稜針刺

續命湯

出血大効○回春云日輕夜重者瘀血也○按要訣云腰痛有寒有濕有風有虛有閃挫方輿輓云腰痛病因寒因打撲帶下瘀血也愚按大凡寒症瘀血與濕也寒症輕者當飯四逆輩重者附子劑兼下劑瘀血重者桃核承氣湯輕者加味桂枝茯苓丸料又有苓姜朮并湯症屬濕後世名腎著腎著者腎受冷濕著而不去之義也傷寒中濕痘疹等之腰痛者客証也寒症并瘀血腰痛甚不得屈伸者以元生膏貼于腰拔出一毒則二三日而腰痛如忘能屈伸其法詳于疝及打撲門○方輿載附子劑酒服散藥乾漆劑酒服散藥子和無憂散禹攻散當飯浴湯

眼

大青龍湯○葛根湯

黃連解毒加車前子湯

苓桂朮并加車前子湯

大柴胡湯○大承氣湯

桂枝茯苓丸○桃核承氣湯

右桂桃二方治婦人屬血

証眼疾

應鐘散○黃鐘丸

四苓散加唐蒼朮 治雀目

七寶丸 赤眼赤色已去無

痛生翳者每日服一分許

洗眼方 黃連解毒湯加菊

花紅花并艸且加白礬少

許

治誤傷目方 生通艸葉搗

絞汁滴入眼中若無生者

以乾者細剉水煎頻々洗

之

又生水仙根搗絞汁滴入眼

鍼灸法 睛明風池太陽神庭上星額會前頂攢竹絲竹空承位目窻客主人承

光諸穴皆可用鍼或以三稜針出血八關亦可刺凡

近目之穴皆禁灸○大骨空小骨空二合谷翳風軒前足三里

二間命門水溝手三里諸穴宜灸方

眼科錦囊云風眼之名本邦之俗稱而非漢名也然書中

間有風眼之名目實是同名異証如所謂風眼爛弦頭風

風眼甚多矣不可混同矣本信

邦之風眼者輕症也○又曰風眼治法用吐劑或烏頭附

子之類有奇効不兼用攻下則至使眼珠破裂更在大陽

尺澤委中刺絡放血又於百

會顛顛貼用發泡膏或以糊劑塗著足躡屢用塗藥嗜鼻

之劑至於眼痛劇者灸少陵小炷三炷及三里三陰交女

室一曰女膝在踵之部赤白肉之分際蓋奇穴也各

二十壯○和田氏云風眼宜急用備急紫圓類若遲疑則

眼球破裂而至於失明○按風眼証滿目丹黃劇痛兩瞼

浮腫寒熱頭痛如割狀殆似陽証傷寒至其劇其則謔言

妄語瞳孔破綻竟致盲瞶急用紫圓一錢大下之大勢已

解而後用大青龍湯隨其腹証兼用瀉心大承氣桃核承

氣等○螞針以水蛭數枚令啞眼之內眥及外眥驗內

赤肉之處血滿自脫則以濕紙拭血數十度而血自止日

一次施之四五日而大勢已

解則隔日施之六七度病減
 十之八九赤眼治法無捷於
 斯○元生膏 小兒眼疾以
 此膏貼百會四五日而有奇
 効大人蟬針元生兼施則効
 速且項背強者貼此膏於風
 門肺俞邊即効○良山翁目
 赤腫痛用七味敗毒散○和
 田氏瘡疥愈後作眼病者用
 敗毒加石膏湯○家翁用涼
 隔加石膏湯
 治爛弦風方 膽礬或用土
 枯礬 右二味水解散洗患
 所極効
 治眼目暴翳或疼痛 一物
 瓜蒂吹鼻中令嚏此一小
 吐方也
 治稻麥芒入目中 蘘荷汁
 注目即出并眼目淚痛點
 之蒸

治麥芒入目 大麥煮汁洗
 之孫真人

治飛絲入眼 蕪菁根或葉
 揉爛帕包滴汁三兩點即
 出普濟方

治飛絲入目 芥菜汁點之
 如神摘玄方

治塵芒入目 蓮藕汁入目
 中音濟

治赤眼腫痛 梨實絞汁點
 之聖惠

按眼疾者宜托專門然僻邑
 無專門則如風眼急証至失
 明故記風眼赤眼治法之大
 略尔

方輿載六物敗毒湯連翹湯
 夏枯艸湯米苈散謝道人大
 黃湯通聖散通聖散方後云
 生翳膜者加米苈二錢因結
 毒者加土茯苓四錢

耳

小柴胡湯 大柴胡湯

葛根加大黃湯 應鐘散

紫胡加石膏湯 耳前後腫

者又治咳嗽後耳聾者妙

苓桂朮耳合瀉心湯 耳鳴

者

柴胡姜桂加鐵砂湯

耳鳴有動悸者

鷓鴣菜湯 小兒耳聾因蟲

者

七寶丸 治梅毒將耳聾者

聾耳流膿方 菖蒲根取水洗

先以綿杖子燃出膿令淨

次將菖蒲汁灌入盪洗數

次全愈最妙

又以水鏡洗耳中入椰子油

又韭汁入耳中亦效

治耳聾方 菖蒲附子各等

右為末以麻油和以綿裹

內耳中

治耳卒聾閉外芥子末人乳

汁和以綿裹塞之

又方巴豆十粒松脂半兩右二味

擣爛然如棗核塞耳中

又方附子一味以醇醋微火

煮一宿削如棗核以綿裹

塞耳中

又方醪醕二合溫灌耳中以

綿塞定半日許必有物出

即差

又本艸有猫尿及龜尿人尿

各一味滴入耳中方皆治

耳聾云

入門云耳鳴乃是聾之漸

按耳聾者難治唯因聾而

聾者可治也治法以椰子油

內耳中數日後以水鏡洗耳

中則如脂物出而全愈

元生膏 貼耳下或百會風

門邊○蜈針

灸 肩井三里

肺俞膏盲

鍼 刺尺中取血

一處女麻疹後兩耳聾閉一

醫將精香油滴入於右耳中

至次日將刺耳匙子徐々探

耳內挑出凝垢一箇大如芽

兒小指右耳忽覺清聰左耳

亦用此法而俱清聰久患頓

除方與○醫通耳病用涼膈

散家翁亦用之

鼻

葛根加石膏湯 鼻鼽者發

汗之又治腦漏頭痛者

小柴胡加石膏湯

治鼽鼻有息肉不聞香臭方

金瓜蒂細辛右二味各等

分為末以綿裹如豆大塞

鼻中

治鼻窒塞氣息不通聖瓜蒂

一味為散少許吹鼻中

竹葉石膏湯 治鼻塞或兼

頭痛者方與○鼻塞不聞香

臭者或用此湯子和用白

虎湯此症多有逆上氣

故用之紀

黃連解毒湯 有酒客鼻紫

赤而非真酒查鼻者用此

湯而不用傳藥又真酒查

鼻輕者用此湯可也

三黃梔子湯方與 治酒皴鼻

劇者 大黃 黃連 地

黃 葛根 紅花 芍藥

梔子錢各一 甘草分三 右

八味以水四合煮取二合

渣再以水四合煮取一合

半日二劑若病輕者小劑

減水可也服湯數日覺患

處痛癢逆將查鼻膏搽之

也熱既發之後外傳則須止內服則不須止也此方與之

鼓鼻膏

詳文也叙事精取之

乳香

硫黃

巴

方與

豆

輕粉

各等分或

右四

味為末蜜煉傳患處○按酒鼓鼻重者鼻頭紫赤而腫生小疹有痒無痛用三

黃梔子湯塗鼓鼻膏塗藥則大抵發痛宜日々刮刺

或施蟻針輕者硫黃杏仁二味等分為末以滾湯煉

之每夜擦之時々刮刺不服藥而愈禁酒番椒油膩

魚肉等

一貫云鼻痔瓜礬散門有効

按鼻痔不剪去根蒂則不

治宜托於專門

一書云鼻淵自梅毒來者六

物解毒加桔梗湯十倍土

茯苓

又腦漏用薰藥

元生膏

鼻病大抵此膏貼

百會効○蟻針

方輿載通聖散云鼻痔鼻淵

酒鼓鼻此方有効又載桔梗

解毒湯竹葉石膏湯辛荑湯

辛荑湯方辛荑防風細辛川

芎白芷五味也擇加大黃石

膏類○鼻不聞香臭者皂莢

勝於瓜蒂吹鼻中佳有息肉

不聞香臭者用瓜蒂辛荑湯

鼻病一切用之桔梗解毒因

毒鼻梁將破壞者用之關○醫通鼻病用涼膈散家君亦用本事方用犀角劑

牙齒

葛根加石膏湯

牙疳并牙

齒痛有表証者或項背強

者瀉心加石膏湯 牙疳并齩

齒者或牙疳多出血者
桂枝桔梗湯或加黃連齒痛者
調胃承氣湯 歷年齒痛黑

爛脫落口吸涼稍止者
小柴胡湯○大柴胡湯

小建中湯 右三方因腹候
用之

加減烏梅圓料 治蟲牙痛
甚

依本方去桂附加桔梗苦

參地黃 烏梅 細辛

乾姜 黃連 當版 蜀

椒 人參 黃栢 桔梗

苦參 地黃 右十一味

水煎先噙漱後嚥下加連

翹益佳

黃連解毒湯加石膏犀角

備急圓 七宝丸

元生膏 蟬針

按牙疳俗稱波久佐初寒熱

宜露
風亦
宜牙

瘡疹
麻或
後發
此症

頭痛牙齦腫痛變紫色試以

指按牙齦膿血微出氣息甚

臭顯頰下邊累累結核此症

似瞑眩于輕粉口中糜爛之

狀漸久則齦縫肉脫齒牙動

搖或脫落雖小患難治也日

久齒牙盡脫落則膿自止○

治法鍼齦縫出血塗朱礪加

人中白散與瀉心加石膏湯

或日用七宝丸一分許○走

馬下疳者牙疳之急証也初

寒熱如疫牙齦腫痛變紫暗

色下潰爛出膿血或唯紫血

大逆齒牙動搖多脫落其毒

浸淫於唇舌及顯頰幾處亦

穿孔流臭水或兩頰俱脫落

或唇鼻共缺尽而臭氣滿二

室六七日或十餘日而死○治法急

與備急圓五六分或一錢取下鍼牙

齦出血石榴皮煎汁加枯礬少許屢

漱以中白加朱硃散十分一
傳之與黃連解毒湯加石膏
犀角○一女子二歲患走馬
下疳忽人中生黑點暫時如
蚕豆大其毒及唇并牙齦兩
頰脫落急用備急圓下利四
五行用涼膈散隨愈漸漸生
肉和曰氏○按蟲牙痛不止
者貼元生膏於耳下半日許
發水泡無不愈者然齧齒不
拔去病牙則不全治也又有
牙齦腫痛之人頰之裏面亦
腫痛者試以指按頰則微內
而痛其痛處從外施蟻針出
血則即効耳輪及鼻端唇腫
痛者皆施蟻針為妙家翁牙
齒病用涼膈散○方輿載其
露飲涼膈散六味丸○有持
云余嘗患牙疳服瀉心涼膈
其他種種方劑無効服六味

丸全愈

口舌

瀉心加石膏湯○黃連解毒

湯○小柴胡加石膏湯

麥門冬加地黃湯 口舌乾

燥者或乾燥而糜爛者

當飯後藥散加麥門五味子

湯 口舌如無皮狀者如不

應加附子

理中湯 口舌生瘡大便不

實者○若手足逆冷腹痛

者加附子

硃硃散方家 治驚口瘡并口

舌生瘡糜爛 硃砂錢辰

砂分五石二味相和搽舌上

煉蜜塗亦佳○按此散口

瘡者傳之咽喉腫痛者吹

之若不愈者人中白五錢

加此散一錢用之奇効口

瘡糜爛日久延及胸中者

登台商

錦裹如無患子大含之嚥津凡口舌病陽症用傳藥

用附子劑者不用傳藥也

研耳散

治口中糜爛者

研砂黃栢耳艸各等分

元生膏

○ 蟻針

口瘡久不愈者肩背頸項

百會耳下額下貼此膏六

七日施蟻針去惡血如法

四五回則無不愈或含漱

劑用黃連解毒湯又青黛

黃栢等分給裹含之嚥津

城南散

治口瘡昆布燒存

性梅肉連核燒存

豆去殼枯礬二分

味研末傳瘡處○此方城

州烏羽嫗藥舌疽之秘方

也山昭氏傳之云

金粉散

治舌疔神方

研砂分七釐金分七釐砂分一錢

檀烏梅各五分金屑分三錢

為細末七分艾葉和紙裹

為二十一條一日嗅一條

要訣云曾有舌上病瘡久蝕

成穴累服涼劑不效後有

教服黑錫丹遂漸愈

瘡泡者舌下如小豆粒者出

為水泡大者如梅色赤透徹

有痛舌本強不能言語以指

按之軟而有水鍼之則黃液

或如白脂者出吹金鎖匙用

黃蓮解毒或紫胡加石黃○

重舌者舌下生息肉尖起如

舌端長者五六分七八分又

有左右生者腫痛舌強不能

語言流涎額下結核大人少

小兒多○治法鍼患處吹金

鎖水研之類與瀉心加石柴

胡加石、頷下結核，上貼發泡，尚不治者，剪斷，息肉，用前法。○木舌，木者不柔軟之意，舌腫短縮，不出齒牙之外，木強而不能卷舒，發熱惡寒，舌胎黃黑，牙關緊急，不能開口，痰涎多出，妨飲食，至重者死。○治法：服藥吹藥，與重舌同。頷下及耳下，貼發泡，待舌下之絡脉怒脹，變紫色，而用鍼瀉血。○先輩云：漢土無舌疔之名，和名也。要訣云：曾有舌上病瘡，久蝕成穴，金鑑云：舌疔者，百無一生，此定舌疔矣。初舌尖或舌下，或舌心，或左或右，固結如豆，或如栗子，經久瘡頭腐蝕，而為凹，食塩醋辛辣熱物，而不痛，毒至深，故也。腐蝕日深，固結月蔓，舌難轉動，語言蹇澀，至一年或二年。

此陳氏方
全皆
鐵古

舌缺盡而死，初無痛，亦從腐蝕生痛，或發寒熱。○治法：有痛者，瀉心湯加石膏、涼膈散，加石膏，無痛者，附子劑。外用五寶散、冰硼散、城南散、華岡氏金粉散，最有效。○右秘錄之略文也。全文見本書金鎖匙、冰硼散，見正宗。龔氏云：凡舌腫脹甚，宜先刺舌尖，或舌上，或邊傍，出血，泄毒，以救其急。惟舌下瀰泉穴，此屬腎經，雖宜出血，亦當禁忌。慎之。○張子和曰：余治一婦人，木舌脹，其舌滿口，諸藥不愈，余以銚鍼小而銳者，砭之，五七度，腫減，三日方平。計所出血，幾至盈斗。○方輿載涼膈散、清熱補氣湯、附子湯、八味丸。○說約：口舌病，用白虎湯。

咽喉

甘草湯

○

桔梗湯

少陰病二三日咽痛者可

與甘草湯不差者與桔梗

湯○甘草湯痛甚者有效

桔梗湯吐粘痰者用之

半夏散及湯

少陰病咽中

痛者○咽痛兼痰咳者效

半夏苦酒湯

少陰病咽中

傷生瘡不能語言聲不出

者○家傳煎法將磁器盛

苦酒五勺以半夏極細末

五分雞子白一枚調勻攪

令相得安火上令八九沸

下火少少含嚥之嚥時捫

鼻不令氣入可

大青龍湯○葛根加石膏湯

大柴胡加石膏湯○備急圓

元生膏○蜈針○鍼

按喉痺喉癰纏喉風乳鷺西

洋總謂之咽喉焮腫秘錄云

喉痺者咽喉之癰而又曰喉

癰又焦氏筆乘曰喉閉痺非

麻痺之義中藏經曰痺閉也

咽喉閉塞之謂也為刺縫臨

導劑瀾等曰勞肩腕者多有

此患初起項背強痛頭痛發

熱惡寒而咽喉腫痛醫視咽

之法以杉箸二枝紙裹壓病

人之舌令自引氣息於內則

能視也大抵從咽之左右腫

而及齒牙之盡處及舌本為

濃紫色飲津唾亦痛甚牙關

緊急不能隨意開口語言蹇

淡頤之下邊累累結核幾廢

飲食是尋常之喉痺而易治

決無死矣經六七日則自潰

膿血出速愈也○急喉痺謂

之走馬喉痺古云暴發暴死

迅速之病也急喉痺腫之及

外者謂之纏喉風即急喉痺之一証也急喉痺之候咽喉暴腫痛閉塞痰涎壅盛聲啞呼吸不利咽喉之外亦微腫變色舌上黃胎或黑胎惡寒發熱頭痛劇其狀如疫藥餌一滴亦不下二三日而死凡喉痺之死症其腫處深於常之喉痺食道氣管共閉塞幸自潰者亦膿血入氣管絕呼吸而死也○治法初發項背強者與葛根加石膏湯金鎖匙吹喉中輕者或消散腫痛益甚欲成膿者與大柴胡加石膏湯用備急圓下之膿已成則宜鍼若用鍼早則增痛宜候赤腫上生白點鍼之色變紫暗者亦乘血凝滯之候宜鍼而去膿血膿血多出則痛如失飲食亦從進不日而愈

愈纏喉風者驅風解毒湯多加石膏石膏咽喉病有效若咽喉壅閉藥餌一滴亦不下者咽喉左右貼大發泡鍼尺澤足少商瀉血○一貫云喉痺纏喉風名異而其因一也施其治亦同成膿者緩症也初其艸桔梗苦酒湯等所主也急喉痺纏喉風者急症也用雄黃解毒丸若無則用白散或用礬巴散即枯礬巴豆二味也又云驅風解毒湯多加石膏令冷服○中神氏云纏喉風瓜蒂末吹咽中吐粘痰一升餘即愈○方輿輒云急喉痺巴豆末吹咽中速效○華岡氏云纏喉風鍼咽中吹金瑣匙用驅風解毒加石膏湯劇者刺肩井少商大出血○方輿載六物敗毒湯涼

隔散升麻湯加味四物湯雄
黃解毒丸馬牙消一味含藥
○子和曰大抵治喉痺用鉞
出血最為上策但人畏鉞委
曲傍求瞬息喪命凡用鉞而
有鉞創者宜搗生姜一塊調
以熱白湯時時呷之則創口
易合○喉痺用鉞而創口痛
者傳生_子姜有效餘處鉞創痛
者亦效紀

證治摘要卷上終

言... 易加味日湯雄

... 咳... 喘... 痛... 易谷... 有傳... 者...

... 易... 喘... 痛...

... 易... 喘... 痛...



易知味四勿湯雄

易知味四勿湯雄

