





門 補 9  
342  
卷 2止

妊娠一產前後  
赤白帶下崩中漏下  
乳病十初生雜治十四  
驚口六吐哕七十丹毒十八  
夜啼客忤九馬脾風十二  
急慢驚馬十二疳癖二十  
痘瘡六十二麻疹九二打撲  
金瘡六傷風十三蟲獸傷四湯火  
破傷風六傷風十三蟲獸傷四湯火  
傷漆發瘡六骨哽七  
微瘡八癰疽二刺瘡七  
癩癧四十疥癬瘡九  
痔脫十五卒死五癩瘡十  
附錄家方二製鐵粉秘法  
三附方與所載後世方三辨  
附子瞑眩與中毒



卷之六目錄



證治摘要卷之下

東都 中川成章斐卿輯

婦人方

妊娠

乾姜人參半夏丸 治惡阻

小半夏湯 ○同加茯苓湯

按惡阻用右之方而不應

者盛水二合於器中投伏

龍肝一錢攪如作耳爛水

法而暫置靜處待其澄清

取其水一合半煮右之諸

方則不吐而能應神驗

猪苓散 治惡阻大効予苓

朮猪苓為湯用累用累驗

烏梅丸 治惡阻因蟲者每

服五分日三或四屢効

桂枝茯苓丸 婦人宿有癥

病經斷未及三月而得漏

下不止胎動在臍上者為

癥瘕害妊娠當下其癥





當歸芍藥散 婦人懷妊腹

中疝痛

芎歸膠艾湯 妊娠下血者

腰痛為準

○千金云因頓仆失踞腰腹

痛者○每孕必墜者

鯉魚○雞肉○雞卵

婦人有每孕二三月至四

五月墮胎者宜鯉魚作糰

食之一月三次又雞肉時

夕煮食之雞卵酒煮日食

之佳此方在外臺及本州

婦人藏無他病每孕墮胎

者予每令食此三物至臨

月分娩母子共康健屢效

若嫌鯉糰之腥者作鱠食

凡決定妊否之法詳于本書

又兒胎居偏者胎將墜經若

水下者婦人不時頓仆者致

胎動者右足彎急者吾門皆

用整胎術

葵子茯苓散 妊娠有水氣

身重小便不利洒淅惡寒

起則頭眩 加防已効餅

食赤小豆

大簇丸○黃鐘丸○按妊婦

不三食一便則生燥屎而

分娩不易秘結者宜撰用

此二丸

惡阻諸藥無効者候其有背

若凝結者宜施鍼灸與方

產前後

桂枝茯苓丸料 假產母腹

痛腰痛見漿水下方服名

催生湯○按和田氏催生

用芎歸湯芎歸二味各等

分水酒各半煎加桂枝減

半益効此方原在千金後

藤香川亦用

臨產雞子生吞一枚

免後即雞子生吞一枚



按是外臺及本艸所用，用之則產婦益氣力，累驗。

回生散

治血暈神方

荆芥穗

為末水服二錢

重者童便服，角弓反張，豆

淋酒下，荆芥二錢煎服，亦

效。

治血暈方

針半夏末吹鼻

中，或皂莢末內鼻中。

又以炭火投苦酒中，燼其氣

又服熊膽一分，或二三分。

禁暈術

論見產

挑核承氣湯 治胎死腹中

若胞衣不出及惡露澀滯

腹痛發暈者

靈黃散

治血氣刺痛并血

暈 云矢笑散刺痛者謂

芎歸膠艾湯 四逆加人參

湯 按產後先宜問血下

多少血下少而血暈者桂

枝丸加大黃湯兼靈黃散

或回生散施禁暈術重者

挑核承氣湯血下多而血

暈者芎歸膠艾湯加三七

兼回生散或血餘霜一錢

施遏崩及禁暈掀起術重

者四逆加人參湯此症多

難治

桂枝加附子湯

產後汗出

者 針金 ○外臺云產後忽悶

冒汗出不知人者是暴虛

故也取破雞子吞之便醒

若未醒可與童便一升甚

驗丈夫小便亦得

療胞衣不下者 方家 雲母

一錢為末和生姜汁以水

送下或白湯或酒服亦佳

又方皂莢末吹鼻中即下

又方鹿角為末每服一錢匕

溫酒下未下再服



方輿云胞衣不下者用桃核承氣有刺痛則兼失笑散又去血過多胞衣不下者或用附子劑良方心胸脹痛○下胞術見本書○按產後腹痛及少腹痛有與破血消黃劑下之而不愈者宜桂枝丸料加當歸延胡索兼失笑散百發百中和田氏云失笑產後之聖藥一醫云延胡索少腹痛之專藥信然疑似建中湯○家君云分娩後六七日子宮腫而不收如少腹有塊者宜用桂枝丸料按之痛者子宮也不痛者塊物也勿謬認用桃核牡丹湯等

大豆紫湯金治產後百病及中風痲瘖或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視

大豆 一合清酒 二合

右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熟焦煙出以酒沃之去滓服一升日夜數服小汗則愈一以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹中三日服此酒即瘳○按產後發痲角弓反張者以此酒多服回生散妙又聖濟云頓服竹瀝一升即愈

按子癰用柴胡龍骨牡蠣湯多加鐵粉効立野氏云子癰用殺蟲劑而治者十中八九也

枳實芍藥散 產後腹痛煩滿不得卧

下瘀血湯 服枳實芍藥散不愈者此為腹中有乾血著臍下此方主之亦主經



水不利  
產後血閉不下者益母艸汁  
入酒服聖惠

大承氣湯

產後七八日無

大陽證少腹堅痛此惡露  
不盡不大便煩躁發熱切  
脈微實再倍發熱日晡時  
煩躁者不食食則譫語利  
之即愈

當歸建中湯

治婦人產後

虛羸不足腹中刺痛不止  
吸吸少氣或苦少腹拘急  
痛引腰背不能食飲○方  
後云若去血過多崩傷內  
衄不止加地黃六兩阿膠  
二兩合八味湯成內阿膠

小柴胡湯○三物黃芩湯

婦人在草蓆自發露得風  
四肢苦煩熱頭痛者與小  
柴胡湯頭不痛但煩者三

物黃芩湯主之○和田氏  
云此二方產後將成蓐勞  
者用之

當飯生姜羊肉湯

產後腹中疔痛並治腹中  
寒疝虛勞不足○按我邦  
無羊代鹿肉或雞肉佳也  
千金產後虛損門有鹿肉  
湯二方聖濟產後虛羸門  
有烏雞湯一方蓐勞者宜  
日食雞肉雞卵鹿肉鯉魚  
等

參連湯○熊參湯

東洋一閑齋二先生血暈  
用此二方

瀉心湯

家君血暈并俗稱

血道藥者用此方或合茯苓  
桂木耳

大黃牡丹皮湯

產後小腹

有塊者或產後惡露澀滯



成水腫者有神効用消石  
佳

按和田氏產後水腫用瑰  
珀湯五苓散加琥珀及鼻  
湯也

承氣丸 產後秘結者兼用

按女子腹面倒首也說載  
本書轉胞治術子宮脫脫

肛膀胱脫諸術見于本書

紀聞云產後痙病荆芥末二

錢豆淋酒攪和下四五服而

有効又破傷風妙產後喘十

之七八難治大小青龍無効

參蘓飲或有效人參蘇木二

味也廣東人參佳若口鼻黑

氣起者加附子產後大渴引

飲十之八九必死矣用括萎

湯

方輿云難產及胎衣不下者

用獨聖散吐劑也又通關散

吹鼻中○方輿載獨聖散及

通關散蟹爪散葵子阿膠湯

午膝散回生湯交加散蜀漆

湯括萎湯參蘓飲奪命丹

桂枝茯苓丸料 經閉未結

塊者或頭痛或腹中拘攣

或手足瘡痺或眼中赤脉

疼痛羞明者皆主之或加

大黃又月事時腰腹痛者

加當皈紅花延胡索兼用

靈黃散神驗

桃核承氣湯 少腹急結者

急結急迫結實之謂也

大黃牡丹湯 少腹有堅塊

者

抵當湯 治瘀血者 九乘血

少腹鞭滿小便快利者一  
也腹不滿其人言我滿者  
二也腹急則以湯緩則以丸  
金匱云經閉不通者  
和田氏云經閉而不動者



宜此湯華岡氏云此方無速效二三月而有効宜為丸以酒長服

下瘀血湯 臍下毒痛及經水不利者○按此方為丸酒服効

赤丸脇山 治宿疝癥瘕蟲癖勞瘵以今丸 毒骨痛即濕漆丸

生漆為度 粉各十 石三味 以少蜜為丸白湯送下自三分至一

錢日一夜一加少蜜者厭乾固者也按此方經閉腹

痛者用之有効方輿主治云治乾血及蟲方後云

自三分至一錢終而復始以知為度又生々堂方書

此丸主治云治諸毒在裡難發泄者有持云用此丸

知者身體生痒必發赤疹

夷則丸 治腹中有堅塊而見血症者○以桃仁牡丹

湯送下每服六分日三浮石丸 治腹不滿其人言

我滿而腹皮見青筋者○按經閉數月少腹滿而無塊者此方主之

當歸四逆加附子湯 經閉惡寒足冷或腰脚痛脉緊

者○按此湯症大便冷秘之症間有焉

小柴胡湯○大柴胡湯 按經閉胸脇苦滿者用此

湯兼用破血之諸丸 鷓鴣菜湯 經閉因蛔蟲者

礬石丸 經水不利下白物者○予不為丸為散帛裹

如無患子大深納陰中下邊坐卧任意唯禁奔走三

日一換之以愈為度

下物可用者亦



紅藍花酒 紅花錢石一味  
以酒二合煎減半頓服一  
半

按金匱云治血氣刺痛經  
閉無刺痛亦可用

元生九方 經閉用諸藥而  
無効者此九一分砂糖湯  
送下

七宝丸 經閉因結毒者○  
聖濟經閉條有水銀劑二  
方主治云臍下結鞭疼痛

又一方主治云肢節痛腹  
脇結塊羸瘦欲變成勞二  
方俱方中有芫青硃砂

一方存 治經閉不行至  
一年臍腹痛腰腿沉重寒  
熱往來 芥子兩為末每  
服二錢熱酒食前服

又方金 治室女經閉 牡  
鼠屎兩炒研空心温酒服

二錢服本州云  
又馬鞭艸通月經○又絲瓜  
為末酒服通月經

和田氏云經水不通而逆行  
者必吐凝血者也用三黃湯  
臍下有塊者挑核承氣湯宜  
施刺絡○艮山翁云經閉宜  
日食辣茹浴温泉而佳也○

香川氏血枯經閉腹痛者用  
當飯建中湯少腹滿如鼓脹  
小便難而不渴者用大黃并  
遂湯又用辣茹丸○張子和  
治經閉大抵用吐方而後用  
破血劑○蘭說蓬砂治經閉

有番紅花蓬砂沒藥等方○  
或曰蠶蟲蝗之類也出石中  
川友三以蝗代蠶蟲有効見  
王字形于背者是也○東郭  
翁云經閉數月用破血劑無  
寸効經一年餘而腹無塊者

登台商要下



漏下者宜此湯

香附子一味為末，每服一錢，酒服，日三，經二月而有效。○方輿載千金地黃煎丸，良方千藤散。

赤白帶下崩中漏下

桂枝茯苓丸料，或加大黃，按磐石丸主治云：中有乾血，下白物，由是觀之，白亦血也，赤白帶下初起，宜用此湯兼磐石丸。

芎歸膠艾湯 治崩中漏下

去血過多，加三七或加附子，或兼用犀角。○按病源云：衝任氣虛，不能約制經血，故忽然崩下，謂之崩中。又云：血非時而下，淋瀝不絕，謂之漏下。

溫經湯 病下血數十日不止，暮即發熱，少腹裏急，腹滿，手掌煩熱，唇口乾燥。○

病下血者宜此湯

按有此症而腹無塊者，此交湯主之。又瘦弱之婦，每月經水過多，少腹無力，食不進者，此湯加黃連有效。

黃土湯 漏下有附子劑症，大抵脉緊也。用此湯則不白，血止者也。

黃連解毒湯 婦人年及五十以上，經水不絕者，或經水一月二度來者，大抵心下痞，脉數也。按壯婦亦此湯症間。

當歸建中加地黃阿膠湯 血症，心中悸而煩者，須用此湯，腹中急痛亦佳。

小柴胡湯 大柴胡湯 柴胡姜桂湯 此三方因腹狀用之，兼用破血丸。

芩姜木茸湯 ○當飯四逆加吳茱萸生姜湯 帶下腰痛



脚冷下白物者撰用此二方或兼灸治温泉

當歸芍藥散

礞石丸 下白物不止少腹

有塊者

四逆加人參湯 艮山先生

曰崩血甚四肢厥冷自汗

者四逆湯或加人參可也

東郭翁云余遇產後暴崩

或致暈者則用此方其功

非他方可企及也

解毒劑加桂芍歸 所下之

物臭氣甚者必因結毒也

此劑主之 醫事說約

和田氏云白帶下者有一

種因毒者此膿淋之類也

臭氣至甚矣用解毒劑甚

者兼輕粉丸

夾鐘丸 漏下腰腹疔痛下

血至少淋瀝者兼用此丸

治白崩方針 灸小腹橫紋

當臍孔直下百壯又灸內

踝上三寸左右各百壯○

灸八膠 小言

治五色帶下方針 服大豆

紫湯日三服

治崩中漏下赤白不止 金針

燒亂髮酒和服方寸匕日

三

又方 金針 鹿角燒末酒服日

三

蒲黃散 金針 治漏下不止方

蒲黃 升半 鹿茸當飯 兩各二

石三味為末酒服五分匕

日三不知稍加至方寸匕

蒲黃丸 醪 治月候過多血

傷漏下不止 蒲黃 微三兩

龍骨 半二兩 艾葉 一兩石三

味為末蜜丸梧子大每服

二十九煎艾湯下日再

每方寸服



方輿云、血崩及諸夫血危急者煎用人參二錢、不知服至數劑、又下白物如脂者、用無憂散兼坐藥、灸治、溫泉皆兼宜。○按無憂散、子和方也、予未試、又同書有烏賊骨牡蠣二味等分方、赤白帶下、久下不止者、用此散而止云、未試、或云治婦人白沃、不已方、風化石灰、右一味酸醬、艸搗汁和丸、

病因考帶下門云、治方灸、溫泉乾過臘魚、告天雀鷄、方輿載逍遙散及飯脾湯、獨參湯、瓜子仁湯、括萎根湯、無憂散、烏喆丸、

乳病

葛根加桔梗石膏湯 乳腫、乳癰、未成膿者用此湯、外塗鮒魚膏、

鮒魚膏

方家

播生鮒魚肉為

泥塗乳房、產後則倩他小兒、而令吮乳、後輕々揉軟、乳房則消散也、產前易消、散、產後難消、散、

葛根加及鼻湯

○伯州散、

乳癰將成膿者、用此二方、

大黃牡丹湯 乳癰毒深膿

少、不大便者、

芪歸建中湯 乳癰膿潰後、

盜汗出者、或加龍骨牡蠣、

或加附子、

小柴胡加石膏湯 治乳核

乳癰神驗、外以蔥湯蒸之、

貼水銀膏、即秘錄神水膏、

柴胡去半夏加桔萎橘皮連

翹湯 治乳癰不成膿、不

消散、久不愈者、外用前法、

貼神水膏亦得、

單橘皮湯 本艸黃橘皮附



方引張氏云婦人乳癰未成者即散已成者即潰痛不可忍者即不疼神驗不可云喻也用真陳橘皮湯浸去白晒麪炒微黃為末每服二錢射香調酒下初發者一服見效○又青橘皮附方引丹溪云婦人乳島因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成瘡名乳島不可治也用青皮四錢水一盞半煎一盞徐々服之日一服或用酒服

七宝丸 乳島初發青橘皮湯兼用此丸

水銀膏 ○ 排膿湯

按吾先師與綠山翁乳癰初起乳核乳癰皆用單青皮湯有奇效

本艸云燒存性

治乳癰初發腫痛結靱欲成膿令一服差樺皮散方以北來真樺皮燒灰酒服方寸匕令睡及覺已差

療乳癰腫痛方山脇氏

天瓜 當飯 并艸 各五錢

乳香沒藥 各一錢 鹿角 三錢

治乳癰疼痛濟聖 車前子 兩

為末每服二錢匕温酒調下

又方濟聖 打雞子一枚熟酒調下

治乳汁不出蘊積在內結成癰腫此名妬乳 露蜂房燒右一味研細 每服二錢匕水一盞煎至六分温服

鹿角散正 治乳癰新起結

治癰要下

七



腫疼痛增寒發熱但未成  
鹿角尖三寸用炭火內煨  
稍紅存性碾末每服三錢  
食後熱酒調服甚者再三  
服必消

治乳癰結鞭疼痛聖濟和泥  
蔥脾右一味細剉以水四  
升煮十數沸於瓷瓶子內  
盛熏乳腫處冷即再煖以  
差為度

又方聖濟露蜂房西右一味  
剉碎以醋五升煎至三升  
傾於瓷瓶子內乘熱熏乳  
上冷即再煖以差為度

聖惠方云白麪治乳癰不消  
炒黃醋煮為糊塗之即消  
乳泉散方家治產後乳汁不  
出或少者露蜂房霜錢  
地黃錢五右二味為末每服  
一錢以醴酒送下日三服

聖濟云露蜂房炒末酒服括  
萎根末酒服皆能下乳汁

本艸云穿山甲炮研酒服二  
錢能下乳汁名涌泉散

儒門事親乳汁不下條曰夫  
婦人有本生無乳者不治  
或因啼哭悲怒鬱結氣溢  
閉塞以致乳脉不行用精  
猪肉清湯調和美食於食  
後調益元散五七錢連服  
三五服更用木梳梳乳周  
回百餘遍則乳汁自下也

回乳方本艸大麥蘗炒研白  
湯服二錢麥芽二三兩  
炒水煎服亦效宜用新者

和田氏云乳嵩用青皮頗灸  
肩顯肘膠及七九以上

牛山云乳汁不通則結核成  
乳癰初結核寒熱者速揉  
和乳房則乳汁下結核自



消又云將成乳癰者白芷  
貝母各二兩為末温酒送  
下神驗

秘錄云小兒有齧乳頭如蟬  
而腐爛者名之乳疔亦曰乳  
頭破裂乳兒則益爛而難愈  
不乳兒則乳汁充滿而痛成  
乳癰雖小瘡難治宜攤中黃  
膏於綿片而貼瘡欲乳兒則  
去中黃膏攤遊奕膏於紙而  
貼之不當齒於瘡口又不濕  
瘡口而可也凡乳病禁鍼線  
勞肩○看乳相并乳母之乳  
汁法見于本書

聖濟乳癰門曰新產之人乳  
脉正行若不自乳兒乳汁蓄  
結氣血滯積即為乳癰產後  
乳結癰門曰產後多有此疾  
者以乳汁蘊積與氣相搏故  
也○方輿載柴桂湯排膿湯

梓葉湯蒲公英湯櫻皮湯

小兒方

初生雜治

并連大黃湯 小兒初生當

急進之吐下穢物 其

黃連 大黃 各五分 右三味

以水一合煮取五勺以絹

裹艾如乳頭沾取吮之

紫圓 千金云兒服如麻子

一丸百日兒服如小豆一

丸

一貫云小兒初生有心下至

臍下如梅核累累三四枚者

此胎毒也宜急治之經二三

月則難治并連大黃湯加麝

金紅花不消散者用山繭湯

兼用紫丸則必消散矣又顏

色青白陰狀者用五香湯其

重者用四逆湯雖然至小兒

用四逆則多難治也○病源



謂下用紫丸也

云小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱又云薄衣之法當從秋習之不  
 可以春夏卒減其衣則令中風寒從秋習之以漸稍寒如  
 此則必耐寒又云不能進乳哺則宜下之又云小兒始生  
 生氣尚盛無有虛勞微惡則須下之又云不下則致寒熱  
 或吐發癩或致下利此皆病重不早下之所為也○千金  
 方變蒸條云若良久之熱不可已少與紫丸微下熱歇便止  
 若於變蒸之中加以時行溫病或非變蒸時而得時行者  
 其診皆相似惟耳及尻通熱口上無白泡耳當先服黑散  
 以發其汗熱當歇便就瘥若猶不都除乃與紫丸下之  
 散者麻黃杏仁味也

又云蒸者甚熱而脉乱汗出是也近者五日歇遠者八九日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也又云凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐每候兒吐者乳太飽也以空乳乳之即消  
 幼々集成簡切辨證

小兒熱症有七○面腮紅○大便秘○小便黃○渴不止○上氣急○足心熱○眼黃赤○小兒寒症有七○面皎白○糞青白○肚虛脹○眼珠青○吐瀉無熱○足脛冷○睡露睛  
 簡易方云小兒臍風獨頭蒜切片安臍上以艾灸之口中  
 有蒜氣即止保嬰錄亦云○入門云撮口風面目黃赤氣喘啼聲不出舌強唇青撮口  
 聚面飲乳有妨○又臍風其



此方千金  
論有金

症臍腫突腹脹滿或日夜多啼  
不能飲乳甚則發搐撮口噤  
只是為內搐不治凡臍邊青  
黑爪甲黑者俱死○按直指  
方臍風撮口用紫丸又袖珍  
小兒方治臍風撮口瓜蒂散  
吹入鼻內啼則可療○良方  
云每日頻於無風處看小兒  
上脣頰內有白泡起以指甲  
刮破拭淨之○治襁褓中小  
兒臍風撮口法○聖右視小兒  
上下斷當口中心處若有白  
色如豆大此病發之候也急  
以指爪正當中指之自外達  
內指令匝微血出亦不妨又  
於白處兩盡頭亦依此指令  
內外斷應手當愈○治小兒  
臍久不乾赤腫膿出○聖當歸  
焙右一味為末極細少々著  
臍中頻用之○小兒諸病但

見兩眼無精光黑精無運轉  
目睫無蜂芒如魚眼猫眼之  
狀不治濟生○凡診小兒大指  
按三部一息六七至平和八  
九至發熱五至內寒聖惠○三  
歲後則以一指轉側辨其脉  
五六歲後脉六七至為平脉

千金通醫

千金云兒初生叫聲連延相  
屬者壽聲絕而復揚急者  
不壽○臍小者不壽○自  
開目者不成人○目視不  
正數動者大非佳○汗不  
流不成人○小便凝如脂  
膏不成人○頭四破不成人  
○早坐早行早齒早語  
皆惡性非佳人○陰不起  
者死○陰囊下白者死赤  
者死○卵縫通達黑者壽  
右相兒命短長法之按  
萃也全文載于本書

醫治諸書



家翁云初生小兒胸肋膨脹者胎毒也紫丸主之○按乎家初生小兒經二十四時而乳有胎毒者經三十六時而乳小兒以顛門之動緩者為無病之兒又握手而不開者為壯健開手者不成人赤子小便之狀如蒂形者壯健而能育也屢試屢驗後世方書有虎口三關視手紋法其論糊塗不可從矣○小言云臍帶將脫時不可浴兒浴則發臍風臍帶脫則宜灸瘡只小灸一炷而佳也但悉灸濕處不拘形經五六日而瘡口愈後宜冷浴必無臍風撮口之患

此論  
出千  
金及  
聖濟

驚口

耳連大黃湯 或加石膏  
瀉心加石膏湯 有熱者宜

此湯兼紫丸

紫圓 驚口用右之二湯兼

用此丸

朱礪散 方見口 用絹裹手指

蘸水拭口三五次塗此藥

按聖濟有枯礬辰砂二味等

分之塗藥吾先師用之有效

華岡氏用金鎖已水礪散內

服涼膈耳連大黃黃連解毒

等也和田氏云驚口用附子

者百人有一人必死方輿載

涼膈附子瀉心錢氏白朮散

吐哕

小半夏湯○同加茯苓湯

吐乳初發用此二方秘結

者兼紫丸不應者以伏龍

肝汁煎用

吳茱萸加黃連湯 治吐乳

將發驚者 吳茱萸 黃

連 生姜 各六分 人參

證治諸書

卷



大棗各二石五味以水一  
合五勺煮取五勺服

旋覆花代赭石湯  
一貫云吐乳噎氣腹鳴者  
此湯有效予未試

厚朴七物湯 家君吐乳腹  
滿者用之兼紫丸

紫圓  
理中加茯苓湯 吐乳下利

者或加附子  
七室丸 活幼口議云幼兒  
皮研粉一錢止服此立  
效膩粉丸錢七服夫  
湯九藿香 按戴氏嘔吐噎

風輕粉  
也異名

四逆湯 吐乳發搐者  
一貫云吐乳下利者或用  
井艸乾姜湯吐乳諸藥無  
効者炒米煎服有効吐乳  
後發搐惡候也發搐而吐  
乳者不然也吐乳發搐宜

四逆湯  
友人越川氏云吐乳將發驚  
者易其乳母則愈愈而後  
復令吮其乳汁佳雖實母  
乳汁可見之必愈妙

吐現候法 小兒有飽乳而  
含乳汁於口徐々吐乳者  
又有乳兒即抱持而動兒  
躄吐乳者皆此非病也乳  
兒而不少動兒躄吐乳如  
湧者為之吐現也

病源云凡小兒霍亂皆須暫  
斷乳又曰小兒吐利不止  
血氣變亂即發驚癇也  
入門云吐瀉不止久則變成  
慢驚與痺

丹毒  
大青龍湯○葛根加石膏湯  
小柴胡加石膏湯○大柴胡  
湯○黃連解毒湯 丹毒攻

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒

丹毒



心者急用此湯兼承氣或紫丸

調胃承氣湯○紫圓○鍼

雲門尺澤委中亂刺丹上

出血○螞針 施丹上

犀角 方輿云丹毒無大熱

色甚赤眼中生血絲或煩

躁者毒劇也宜用此

入門丹毒門云赤腫遊走遍

身不定其始發於手足或頭

面胸背令人煩悶腹脹其熱

如火痛不可言若入小腹陰

囊如青傷者死○又曰治法

先用針破去血外用拔毒涼

肌之藥敷又曰凡丹毒變易

非輕如經三日不治毒氣入

裏腹脹則死○按病源論丹

毒二十九種千金引肝後云

丹毒須針鑿去血聖濟云治

法用錄割明不可緩故也○

玉案云丹毒火症也小兒出

胎後多有此症近則五六日

或十日或半月遠則踰月後

或兩三月其病形不同○一

貫云丹毒發於陰股上至臍

及心下者難治發面部下至

腹及脚者易治○按病源云

留火丹之狀發一日一夜便

成瘡如棗大正赤色又丹發

兩臂赤起如李子謂之鬼火

丹也由是觀之丹毒突出而

腫者希有焉○千金有丹毒

塗藥赤小豆末以雞子白調

塗丹上乾即易○按丹毒宜

春冬鍼之夏秋施螞針而後

塗此藥○東郭翁曰丹毒無

陰症凡患丹毒人十中七八

腹石硬也丹毒自上来者鍼

俗曰腕力瘤處出血最効

方輿有犀角消毒飲連克湯



夜啼客忤

耳麥大棗湯 驚啼加鐵粉  
耳連大黃湯 ○紫丸

停乳者用此湯兼紫丸  
柴胡龍骨牡蠣湯 驚啼或

用此湯 ○小建中湯  
小柴胡湯 ○大柴胡湯

此三方因腹狀用之

小言云夜啼用紫丸等無効  
者灸不容天樞二三日數十

壯甚驗 ○聖濟云嬰兒氣弱  
府藏有寒每至昏夜陰寒與

正氣相擊神情不得安靜腹  
中切痛故令啼呼於夜名曰

夜啼按病源及千金之時  
珍曰小兒夜啼多是停乳腹

痛余每以蠟匱巴豆藥一二  
丸服之屢効 ○經驗良方云

小兒腹痛啼哭如口角青者  
蟲症也抱起稍止卧之則大

啼蓋臥則蟲攻上起則蟲攻  
下故也 ○按初生小兒有發

熱鼻塞不通不能吮乳大啼  
者用麻黃湯則愈若不愈者

胎毒在頭也以家方羌青膏  
貼百會則必愈累用累驗 ○

方輿云夜啼客忤一二歲之  
間病也 ○方輿載千金生地

馬脾風

麻杏耳石湯 馬脾風初發  
用此湯兼耳遂丸或紫丸

越脾加半夏湯 此湯麻杏  
耳石之一等重者也

瀉心湯 ○紫圓 ○姑洗丸 ○  
七宝丸 ○救喘丸 方家 ○化毒

丸 小言云用二分効  
醫學綱目云暴喘俗傳為馬

脾風也大小便硬宜急下之  
用牛黃奪命散後用白虎湯



平之馬脾風在百日內者不理○按奪命散黑白牽牛犬黃枳榔四味散藥也三歲兒每服二錢冷漿水下涎多加膩粉少許又同書有辰砂輕粉茸遂三味無價散曰治馬脾風悶亂入門馬脾風用麝香丸聖濟喘急門有砒石瓜蒂○小言云馬脾風惡病也重於驚風可十治一二○按馬脾風小兒之喘息也故病源千金及翼外臺聖濟無馬脾風病名往古長幼共謂之喘也馬脾風後世之俗稱也方輿載參連湯

急慢驚

葛根湯 金匱曰太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘥按驚風壯熱者宜用此發

還魂湯 方見此湯即傷寒論卒死 此湯加麻黃一兩者也

無汗表實卒然昏冒者用之與便閉裏實用備急等者不同宜詳診察焉

小柴胡加大黃湯 袖珍小兒方云療急驚風有熱者

柴胡龍骨牡蠣湯

驚惕不安動氣盛者

石膏黃連其艸加鐵砂湯

治急驚有熱瘈瘲劇者○本方加鐵砂一錢煎服或入蜜服○按滋德堂方有救急驚神方石膏十兩辰砂五錢研末用生蜜調下是亦類方也和久田氏和田氏此症用風引湯

大承氣湯 瘥為病胸滿口噤臥不著席脚攣急必斷



瓜蒂散 子和曰小兒三五

歲或七八歲至十餘歲發

驚涎潮搐搦如拽鋸不省

人事目瞪喘急將死者

輕者為驚風天吊重者為

癩病風搐可用吐涎及吐

之藥○按子和風搐反張

往往用吐劑詳于親

紫圓○走馬湯 急驚腹滿

口噤便秘者宜用此下之

屢驗千金云凡灸癩當先

下兒使虛乃承虛灸

姑洗丸 急驚痰涎壅盛者

或兼用之

理中加附子湯○真武湯

慢驚風下利者

通脈四逆加猪膽汁湯

白通加猪膽汁湯 慢驚慢

脾風下利者與通脈四逆

多灸神闕尚不愈者可與

白通加猪膽汁湯如無猪

膽則以熊膽代之亦可白

通人尿也男兒三歲為佳

醫方集解用五歲尿

灸慢驚風 神闕 氣海

天樞 章門

鍼 方輿云小兒稱驚風者

詳診之若有青紫筋者乃

為痲病可放而已本庄氏

云小兒有可刺絡之証如

急慢驚直視咬牙之類是

也

肘後療驚癩瘖製幼石

取熊膽一兩豆大和乳汁

及竹瀝汁服去心中涎効

驗

七宝丸 急驚發汗後或用

此丸有奇効本艸水銀條

云治小兒驚熱涎潮附方



云小兒癩疾急驚墜涎本  
艸小兒驚癩門云水銀輕  
粉並主驚癩風痰熱痰聖  
濟急驚門有水銀劑二十  
餘方

瓜法  
出年

有持云慢驚瓜章門有知覺  
者宜施治還魂湯急驚妙藥  
手足掣抽宜龍膽湯○病因  
考驚癩門云治方熊膽灸○  
按方輿載桂枝加桂湯風引  
湯龍膽湯參連湯衝心者用  
參連其劇者加熊膽二分名  
熊參湯又載烏蝎散通關散  
雄黃解毒丸○聶久吾云慢  
脾風者即慢驚夫治而甚者  
耳其實難大分別亦不必別  
立治法○寇氏驚風論曰倣  
傷寒陰陽二證之治而可也  
○小言云驚風者胎毒成塊  
不時奔騰者也瀉心大小柴

胡參連白虎熊參湯紫丸等  
可撰用又云小兒夢驚夢成  
魘者灸章門効○千金驚癩  
條云未下有實而灸者氣逼  
前後不通殺人又云大動手  
足掣癢者盡灸手足十指端  
○又云病發身軟時醒者謂  
之癩也身強直反張如弓不  
時醒者謂之瘞也○又云兒  
有熱不欲哺乳卧不安又數  
驚此癩之初也服紫丸便愈  
不愈復與之○聖濟云小兒  
急驚之狀身軀壯熱痰涎壅  
滯四肢拘急筋脉牽掣項背  
強直目睛上視牙關緊急古  
人謂之陽癩○又云小兒慢  
驚者癩病發於陰也其發則  
手足痠痠頭目搖動牙關噤  
緊神情如醉休作有時潮搐  
不定者謂之陰癩○薛氏曰

證治摘要下  
三



眠見睛者虛也眠不見睛者實也和田氏曰慢驚口噤為笑狀者凶○入門諸驚門云重者牙關緊急搖頭竄視張口出舌角弓反張身軀掣顛手足搐搦四肢蹇攣局方謂之八候

候痢法金十○弄舌搖頭○身熱小便難○意氣下而妄怒○臥夢笑手足動搖○臥惕々驚手足振搖○身熱目時直視○身熱頭常汗出○鼻口青時小驚○小兒髮逆上啼笑面暗色不變○眼不明上視喜陽○鼻口乾燥大小便不利此十一條候痢法之一也則為痢之初也○按三因方云小兒發痢俗云驚風由是觀之痢雅語驚風俗稱也至宋醫俗共謂之驚風也○外

臺引肘後療卒得痢方釣藤茸艸各等分煎服本艸驚痢條云此方主小兒寒熱十二驚痢胎風○預防驚風灸方并論驚風不治之症皆詳于本書

疳癖

茯苓飲加澤瀉黃連湯 治

小兒疳疾小便渾濁如米泔食易飢肚大青筋瘦弱者或枳實代其艸或兼鵝鵝菜丸或消黃丸每日宜餌食鰻鱺山蛤蟾蜍雞子之類

小柴胡湯○柴胡姜桂湯○大柴胡湯 此三方疳疾有

熱者用之或因腹狀用之小建中湯 腹痛者理中加茯苓湯 下利不渴者



猪苓湯 下利有渴者

紅礬丸 方見黃胖 痲疾好食生

未土炭紙茶土器等者三

四歲兒則每日服此丸五

六分七日而有效不用煎

湯而可也

鷓鴣菜湯 ○紫圓

痲疾有蟲者用此湯兼用

紫丸

七室丸 痲眼遮睛者有用

此丸症每日用五六粒

灸章門 有持云痲疾形氣

未衰者宜灸章門其効勝

於藥石播州有治痲名醫

十之八九灸章門

病因考痲疾門云治方灸自

九至十四痞根章門用熊

膽餌食山蛤鰻鱺

治小兒痲積腹脹如鼓 世濟

蝦蟇 去頭足皮腸止用

和田氏亦章門

人多在下濕處形大者是

此方出名選

本身四腿以白水入塩酒

葱椒煮熟與吃以愈為度

治痲勞秘方 大嘴烏霜

鰻鱺霜 分各等 右二味為糊

丸隨兒長少斟酌與之

牛山曰痲疾多生脾胃實熱

不宜補藥可用殺蟲劑白膜

遮眼者鱈魚肉炙食効 ○本

庄氏痲眼生昏翳者用鬼屎

丸 ○按本艸鬼屎主治云目

中浮翳勞瘵五痲痲瘡痔瘻

殺蟲解毒附方引普濟方云

痘瘡入目生翳用鬼屎日乾

為末每服一錢茶下即安 ○

和田氏曰痲疾痲勞烏鴉霜

為末白湯下大効又小兒腹

有塊所謂痲疾者後世家用

淨府湯無効濕漆丸有効 ○

按痲疾者小兒之積聚也錢

氏云痲塊者僻於兩脇聖濟



傷飽  
丁亥  
候詳  
本書

云僻在左右者癖也，因此考之吾門所用柴胡消黃等也。又素靈千金無癖疾，病源稱傷飽，哺露大腹下奚者，今之癖疾也。至宋盛稱之，錢氏曰：凡小兒癖在內，目腫腹脹，瀉刺青白，躄漸瘦弱，癖在外，鼻下赤爛，頻揉鼻耳，或肢躄生瘡。玉案癖疾門云：其症躄常熱，黃瘦，小便如泔，水惡心腹脹，毛髮粘，面色痿黃，生白點，肚有青筋，頭上生瘡，癆大便瀉下之類也。○方輿載千金八神湯及錢氏白朮散，毓嬰九○紀聞云：行遲語遲，不因毒者，六味丸有奇效。○胎黃之症，兒生下遍躄黃色如金，醫通用茵陳劑。醫林云：或衣被太暖，所致也，宜漸減綿厚衣被。云：予夏時嘗診赤

子衣被太暖而發黃色，予叱之令減衣被，黃色漸去。

痘瘡

葛根湯○桂枝加葛根湯

麻黃湯○大青龍湯

初熱至出齊，撰用此四方

桂枝加黃芪及鼻湯

伯州散 順痘起脹至灌膿

用此湯若起脹不十分者

兼用伯州令餌食鹿肉菜

黃連解毒湯 痘色過赤無

艷有熱者用前方兼用此

湯熱去痘潤澤則止此湯

用前方又發斑者亦兼用

此湯或用此湯兼用犀角

黃芪當歸生姜人參湯

療痘無險惡症而難貫膿

者黃芪當歸各二錢

人參一錢 生姜分右四味

以水二合煮取一合分溫



二服或加附子又加鹿茸及鼻類

犀角 錢氏曰痘瘡稠密不拘大人小兒生犀干澀器中新汲水磨濃汁冷飲服之又犀角主治時珍曰痘瘡稠密內熱黑陷或不結痂又頌曰角尖又勝生犀按痘瘡稠密三四歲者起脹至灌膿每日用犀角一錢十二三歲者日用二錢神驗

治驗見本書

大柴胡合調胃承氣湯

治熱毒熾盛不能起脹惡熱心煩舌胎口乾不大便或渴或煩躁外則乾枯焦紫者按玉機微義如此症用涼膈散主治云痘瘡已出發熱作渴脉實悶亂便實者

此主治香川先生也

白虎湯 主痘純紅臉赤而

眼紅口氣熱唇口腫痛煩躁悶亂循衣摸床小便赤大便秘身如火發斑謔語實熱等症並治口氣臭和田氏曰煩躁無渴者用黃連解毒湯此因毒攻心也桃核承氣湯 治痘毒深劇醫所不能療○南涯翁痘瘡熱毒熾盛乾枯焦紫將為黑陷者用此湯按痘瘡至用白虎承氣多難治也

猪苓湯 灌膿時下利者

禹餘糧丸 方家 下利不止者

熊膽 治毒氣欲衝心者

真武湯 灰陷白陷下利者

茯苓四逆湯 煩躁者

麥門冬湯 ○竹葉石膏湯

此二方治收靨時發渴者



桂枝茯苓丸加大黃紅花湯  
治收靨時腹痛者是熱毒  
凝滯瘀血作痛也

柴胡去半夏加枳實連翹湯  
治結痂後發熱或渴者若  
身熱壯盛大便秘結小便  
赤澀者兼用承氣丸或每  
日用犀角五分有效

承氣丸

紫圓

初發熱出齊之間用

麻黃附子細辛湯

治痘隱

隱在皮裏不透表無熱惡  
寒或痘一出而內陷如蚊  
迹或大便溏全陰狀者

蓋此症百人中有一人耳

鍼

委中尺澤 艮山翁曰

熱毒熾盛將痘色為紫色者

灌浴方 米泔八升入酒八

合以病人坐盤中灌浴周

灰白陷不用此方

正宗痘門初生紫黑

身急被浴衣不須拭乾卧  
覆取微似汗毒邪從汗外  
發沒者復起黯者忽赤  
紀聞云此方治痘毒盛如  
蚤斑蚊點難發者

痘疔以鍼挑破出毒血諸痘

隨即灌膿若挑破不痛不

出血者難治○紀聞云痘

疔大小不一痛至甚者也

色赤者輕紫黑色者重逆

痘有此症○本間氏曰痘

疔發面部者尤急可施治

內服宜痘瘡主劑中多加

犀角

痘癰及丹毒用水蛭大者五

六枚放腫毒頭上吮去惡

血可以消丹瘤癰腫○紀

聞云用鍼尤佳內服涼隔

散若攻心者黃連解毒加

消黃痘疔癰丹毒多不治



者、正宗痘癰門云、大如桃李、此多發、在收靨之後、身涼不渴者為吉、

痘瘡傷損者、白蜜七分、綠瓜水三分、相和、重湯溫之、筆蘸塗、日六、七次、與方

痘癢悶者、塗蜜、與方

痘起張前後、有紫黑惡痘、二三顆交出者、宜鍼、痘上出血、若多出者、針委中、尺澤、內服涼膈散、與方

蕃紅花湯、治痘毒煩悶者、

蕃紅花、分二、右一味、以水一合、煮取五勺、溫服、○此方有持之經驗也、又云、發脹之力、反鼻勝、乎鹿茸、南陽亦云、

先輩云、痘難收靨者、後必雜症生焉、痘後面黑者為佳、如

無痕跡者、恐生他疾、痘痛而手不可近者、為吉候、○小言云、或曰、痘瘡灰白、痒搨者、用

雞肉煎汁、有效、眼科錦囊云、預防痘瘡入目、

上好熊膽、調和淨水、點眼、目、日、兩次、必無一失、東郭亦云、南陽

痘毒迫咽、藥食不得下者、雄黃解毒丸、有效、持、○按痘科

鍵、痰塞喉中者、礬巴散、吹喉中、白礬、巴豆也、○痘瘡看法

治痘入目法、并詳于本書、○方輿載、外臺四物解肌湯、順逆湯、錢氏獨聖散、涼膈散、手捻散、連翹去麻黃湯、

麻疹

葛根湯、○麻黃湯、○大青龍湯、○小柴胡湯、治寒熱似

癰者、門



小承氣湯 治便秘三四日

者門

白虎湯 ○黃連解毒湯

壽世云麻疹已出謔語煩躁作渴者白虎湯合解毒湯

瀉心湯加芩 ○芩飯膠艾湯

此二湯或加犀角主諸失血醫通犀角地黄湯加荊芥

四苓散 ○猪苓湯 ○白虎湯

醫通曰泄瀉為麻疹之常候熱邪得以開泄也發熱時瀉小水短瀉者四苓散加水通滑石入門云煩渴作瀉者白虎湯兼猪苓湯

黃芩湯 ○白頭翁湯 ○乾姜

黃芩黃連人參湯 ○醫通云麻之作痢為熱邪內陷在正沒或沒後而痢下色

白者黃芩湯下膿血者白頭翁湯瀉久而成痢者乾姜黃芩黃連人參湯

桃花湯 得効方云麻後痢

桃花湯有効赤石脂和產形如臘色粉紅或淡紫切痕有光澤煎汁清澄無土臭者可用

越婢加半夏湯 治麻疹後

咳嗽不止者

柴胡去半夏加栝蒌連翹湯

大柴胡湯 或加石膏

犀角 麻疹後餘毒有熱者宜撰用右之方

入門云沒後餘熱內攻循衣摸牀謔語神昏喪智者死

○按此症宜黃連解毒犀角白虎承氣等頻服之或十救一

二矣 ○麻疹者火熱之病也春秋之間患之者至輕矣盛

醫通 能用 竹葉 石膏 湯



暑之時患之者至重矣，麻疹中或麻疹後患痢而多死矣，是無他，人身之火熱與天之火熱相搏故也。麻疹候法詳于本書。

打撲 金瘡破傷風

瀉心湯 治打撲損傷昏眩

不醒及血出不止者，金瘡

亦用，重者下九痛丸。

桃核承氣湯 治打撲不傷

瘀血凝滯腫痛者。

桂枝茯苓丸料加芎歸湯

治打撲輕症，此湯兼用

承氣丸 ○芎藭膏

蟬針 大打腰脊而瘀血凝

滯而痛不能屈伸者，急用

桃核承氣湯，攤芎藭膏於

綿片，大三四寸，以貼患處

日二次，一二日，而其痛如

失，能屈伸，累用累驗，後用

蟬針或亂刺去惡血，打撲輕者直用蟬針亦佳。

武羅牟都煎 治打撲損

傷 合歡花 皮無花以木

續斷 樟腦 右三味等分

以火酒煮，慰患處。

揚柏散 同前 治跌撲損傷

方 揚梅皮 無名異

小麥粉 黃柏 各等 右四

味為散，和醋或雞子白，以

敷患處。

茯苓杏仁甘草湯 治有瘀

血者，其人喜忘，不欲聞人

聲，胸中氣塞短氣，方傷損

門和田氏云，此湯症打撲

後發，疑似癩症之症者也。

芎歸膠艾湯 按千金傷損

門，大膠艾湯，即此湯加乾

姜一兩，其主治云，治男子

傷絕，或從高墜下，傷五藏



徵者唾血及金瘡傷經者  
走馬湯 治打撲劇症和田

東郭先生醫談有治驗

桂枝加朮附湯 打撲經年

月者此湯或兼梅肉散田武

按千金打撲氣絕者與熱小便二升三因方亦用入門云內傷血入藏府熱者童便入酒少許服立効又云人中白末每五分酒服効又云血冷則凝不可飲冷水引血入心即死又危症簡便云包莢末急吹入鼻如活生姜汁和香油灌之又急取百會穴灸三壯立甦正宗云用消黃劑不醒者用獨參湯正躰類要用參附湯

和田氏曰打撲久不愈者曼陀羅花水煎服發狂而愈○

秘錄云不問金瘡何處創口發疼痛脉浮數惡寒發熱頭痛大便秘小便少或嘔或渴或口舌乾燥或眩暈為常也若大脫血者創口失潤澤面色萎黃唇舌刮白妄言謔語面赤如狂脉沉微四肢微冷或喘或嘔吐不止或呃逆或寒戰或自汗出者皆凶候也又云金瘡內服輕重俱宜人參調榮湯大脫血虛候多者宜獨參湯人參湯疼痛不止寒熱久不止者宜逍遙散眩暈頭痛心下痞便秘者宜與苓桂朮耳湯瀉心湯合方也○按人參調榮湯華岡氏所作方也八物湯加蓬萊根牛皮消者也人參湯即理中湯也又正宗金瘡門載獨參湯八珍湯二方外止血摻藥等



也○千金金瘡條云血出便以石灰厚傅裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用聖濟云五倍子龍骨血竭皆單行止血正宗飛血不止者傳金刀散松香枯礬生礬也○病源云凡金瘡卒無汁者中風也腕折中風瘕候云若風入瘡內犯經絡所致瘕瘕者脊背強直口噤不能言也聖濟云金瘡中風水者以封裹不密所致也三因方瘕叙論云傷寒汗下過多與夫病瘡人及產後致斯病又本艸瘕風條云金瘡折傷癱疽產後俱有破傷風濕發瘕之症○按瘕與破傷風為同病見前文可知破傷風之名始于千金傷損門紫湯即大豆紫湯主治云破傷風入四躄角子反

酒豆一名

張口噤不能言云○秘錄云凡金創傷于利刃而發瘕者至少打撲損傷或竹木刺類多發此症

大豆紫湯方見中風門

醫說云以此酒用荆芥末

二錢能治瘕○紀聞云破

傷風瘕葛根承氣亦不應

者也此方有効

治因金瘡中風反強者雞屎

白豆淋酒方聖雞屎白

合大豆合右二味炒

令大豆焦黑次入雞屎白

同炒乘熱瀉於三升酒中

密蓋良久瀝去滓每服五

合如人行五里更一服汗

出佳未差即更作服之以

汗出為度服後宜喫熱生

姜稀粥○聖濟又有治瘕

方雞屎白一味浸酒吞

醫治高要下



治金瘡中風必效酒方聖  
蒜頂一破去心右一味以無

灰酒四升者蒜令極爛并  
滓每服取五合頓服之

治傷折不能避慎令中人中風  
發瘕口噤若已覺中風頸

項強直身中拘急者急先  
服此湯竹瀝飲方聖竹瀝

升右一味温之分作五六  
服發口灌之

武田氏秘錄云瘕破傷風桃  
核兼氣湯兼用紫圓凡瘕病

破傷風之類急刺合谷一寸  
五分後髮際四分商隱白各

三四分三里五分出血○凡  
產後之瘕病急先開子宮口

灸百會臍中○瘍科瑣言云  
創口乾涸則破傷風之徵也

脉微欲絕舌強不語或有少  
振慄之狀攻心自汗出者必

死之症也葛根加朮附湯兼  
用紫丸或續命湯或番紅花

以童便服或如聖散水煎服  
屢効凡此症藥宜多服脉沉

淡者多作瘕也宜用心○按  
破傷風瘕尤難治也不可附

子者宜以雞屎白豆淋酒多  
服回生散若不應者可用紫

圓一錢○方輿載獨參湯回  
生湯雞鳴散接骨木湯

蟲獸傷

元生丸方家風犬傷急可用此  
丸一分或二分酒下或砂

糖湯下不知加至三分五  
分服後小便淋瀝或出血

或下利是毒從二便去也  
見咬之初先餌以赤小豆

蕎麥麻油川鱗海魚烏獸  
及酒一切膏梁之類

元生膏 見咬之初急以此

如聖散芥一  
味也



膏貼傷口，日二次，經十三日，或一日一次，九貼，此膏二日，或三十日，令口不合甚妙。

黃連解毒湯 用元生丸一次，或二次，後用此湯二三日，以解其毒，後用葛根加大黃湯，或解毒劑等。

蝦蟆臙 後臙蝮蝮臙品，治狗咬傷。○瘍科瑣言云：風火傷者，蟾蜍生肉，浸醋食，以多為妙。

紫圓 狗咬傷毒甚者，用之。南陽曰：傷口報痊，數十日，惡風口渴，罨丸內吊，二溲閉結，呼吸及迫者，將發瘰，宜急理之，與紫圓而取下，又云：刺尺沢委中。

小品方云：若重發者，生食蟾蜍臙，絕良，又云：煩亂，已

作犬聲者，天靈蓋末水服方寸匕。

赤水玄珠云：經久宿毒，復發者，多難救，雄香散主之。

雄香散方 雄黃五錢麝香二錢右二味為末，作二服，酒下。

家翁治犬咬傷，葛根加大黃湯，加馬錢子，傷口貼元聖。

鼠咬傷，葛根加大黃湯，多加鼠尾草煎服，兼用雄香散傷

口貼元生膏，如風火傷法，食狸肉，或貓肉，妙。若發斑刺，去

惡血，本草云：雄黃主一切蟲獸傷，若無鼠尾草，以雄黃代

之，若無麝香，以青黛代之，亦可。古今錄驗有青黛雄黃等

分，水服方，曰治諸毒蟲傷。○和田氏云：鼠毒甚於犬毒，犬

毒至死者少，鼠毒至死者多矣。有成腫者，有成勞狀者，南

醫治諸毒下 三五



陽亦云，又云鼠毒馬錢子無効。○有持云一人鼠毒寒熱如癩，羸瘦如勞，遍身洪腫，垂死百治無効。一醫用雄香散，日日利水，洪腫速愈。予治諸蟲獸傷，屢効，實無比神方也。雄黃稱古渡者，赤色明徹，臭氣少者真，雞冠雄黃也。○秘錄云：蝮蛇咬傷，毒至甚，見咬則腫，見咬手則其毒下，至肩背足之毒，下及腰腹，治法以細帶緊紮腫，不至處，鍼傷，五六次，大出血，其毒如油，交血出，血盡則但毒出，尤不限傷口，腫處皆鍼之，大出血後，雄黃末和中黃膏貼之，用越婢加朮附湯腫消，後宜五物解毒湯，腫不消散者，每日宜刺而出血，若其毒至深腐敗者，宜參考癰疽及脫疽治法。

此三氏皆  
口和  
亦然

施治○蜂螫重症治法與蝮蛇咬傷同。○按醫學綱目，療蛇咬用雄黃麝香白芷聖惠方，蛇咬心頭熱躁，眼前暗黑，白礬并艸末等分水服一錢，即止。山脇氏原氏本間氏狗咬用白玉湯杏仁三錢桃根白皮二錢水煎服，和田氏并艸解毒湯加馬錢子雄黃煎成內鐵醬少許溫服，俱詳干本書。○方輿載其艸解毒湯通聖散雄香散。

湯火傷 灸瘡瘰癧

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨

牡蠣湯 惡寒甚者用此

柴胡龍骨牡蠣湯 大熱者

用此，又灸後發熱者

一滴膏 治金瘡出血及

湯火傷諸疼痛者 乳香

椰子油 各一 小麥 合二

登治獨下 年六



麻油合二右四味先以小  
麥內麻油中煮之二時許  
小麥變黑色以浮游為度  
澆過去麥內二味洋解以  
綿絮撮切者數片內膏中  
儲之

三味蒸劑方○三黃丸

按華岡氏謂湯火傷不可傳  
燥劑者確言也傳之火毒內  
攻也凡湯潑之及滿面者急  
去腐皮攤一滴膏於綿片貼  
之日二次若惡寒者與救逆  
湯至翌日有腐皮殘者則以  
蒸劑或湯蒸之去腐皮而貼  
膏若壯熱者與紫胡龍骨牡  
蠣湯凡湯火傷有腐皮殘者  
則後成癩痕取盡腐皮則愈  
後面部復故無一點之痕屢  
試屢効若湯火傷經二三日  
腐皮急難去者日蒸而去腐

葉氏  
已有  
此論  
而意  
同

華岡  
有持  
本問  
氏用  
四順  
清涼  
飲

皮後貼膏如此三四日以能  
取腐皮盡為妙若患人四五  
歲則宜不愈之間傍人看護  
不令搔面而可也又湯火燒  
手相者之治法詳于本書○  
千金方云凡火燒損慎勿以  
冷水洗之火瘡得冷熱氣更  
深轉入骨壞人筋骨難瘥又  
云治火燒悶絕不識人以新  
尿冷飲之○瘍醫大全云火  
傷宜用羌活一兩煎服俾火  
毒得汗外泄庶免內攻○武  
田氏秘錄云湯火傷內攻者  
石膏黃連甘州湯又火毒甚  
者用紫圓下之又遍身燒灼  
者急萊菔汁或童便隨使用  
之後以好酒盛甕中令病人  
浸入其內則雖重不至死此  
法  
出本草廣筆記○龔氏曰一人  
夜間回祿烟薰致死者以蘿



葡萄搗汁灌之即甦○按各瘡不早愈最効何則毒從此去故也若久爛而不愈者中黃膏加紅礬少許貼之即愈凡不問何瘡久爛不愈者貼之屢効又紅礬一味末傅嵌甲瘡妙也以塩湯洗而後傅也

治漆瘡蟹黃塗方聖濟生 蟹黃生 右一味取黃塗傅瘡上日三五度

按漆瘡輕者以生柳葉煎湯洗之又芒消浸湯洗之有効重者無如生蟹者不限黃搗碎全身塗之且食之則無內攻之患

漆瘡作癢譚氏方用蜀椒煎湯洗之○相感志云凡至漆所嚼川椒塗鼻上不生漆瘡本州蜀椒附方

諸骨哽竹木刺

療魚骨鯁在喉中衆法不能去外 取飴糖丸如雞子黃大吞之不去又吞○又方小嚼薤白令柔以繩繫中央持繩一端吞薤到哽處引哽當隨出○又方作竹篾刮令滑綿纏內咽中令至哽處可進退引之哽即出

療食諸魚骨鯁久不出方本 右以皂角末少許吹鼻中得鯁出多秘此方

治誤吞針方聖濟 磁石一彈丸大 右一味口含之即出

誤吞針刺哽咽疼痛者用亂麻筋一團搓龍眼大以線穿繫留線頭在外湯濕急吞下咽頃刺扯出其針頭必刺入麻中同出如不中節再吞再扯以出為度



此方原在  
瘡毒大全

漆毒噎咽，送巡至死。本朝經驗  
醞醋灌鼻孔中，立噴出。  
竹木刺硬深難出者，用螻蛄搗爛塗刺上，一時許其刺自然吐出，取去之則愈矣。  
華岡翁亦云：○按翁又云：針折入肉者，磁石末和膏貼之，即効。凡竹木刺硬深者，可托專門。

瘍科秘錄云：骨硬先完，嚙米飯一塊，則自脫者也。若不脫者，用吐方為良策。吐則骨硬等亦從而出，宜撰用雙礬水吐酒石雙礬水方礬石丹礬各五分，水一合，右三味混和頓服。

葛根湯 ○大黃牡丹皮湯 ○六物解毒湯 ○七宝丸 ○紫圓 ○黃連解毒加石膏湯 ○

黴瘡

朱礬散 方見吉門 ○解毒劑 川香 ○梅肉散 ○蟻針 ○伯州散 ○加味六物解毒湯 方見淋疾門 ○元生膏 ○

丹霞條 山 治上部結毒，頭痛、癭、瘰、及咽喉腐爛。方：鉛一分，錢二，水銀錢二，朱砂錢八分，沉香錢二，人參五分，右五味盛鉛土盞上火鎔化，內水銀柳著拌令相得，傾注于紙上，研至如泥，入朱砂沉香人參末三味和調，二十四分，填貯紙管，燃火吸煙，晝夜二次。

化毒丸 山 療黴毒沉深，兼理偏枯及一切痼毒腹痛。等：薰陸錢一，大黃雞冠雄黃亂髮霜各三錢，生石乳錢一，右五味糊丸，辰砂為衣，每服一分，日二夜一。

登治簡要下



瘡口  
貼破  
日三  
宜  
去  
膿  
後  
貼  
之

病重者日用至五六分  
下疳初起與葛根湯四五日  
後用六物解毒湯六七日熱解  
而用七寶丸九六日至七日  
服紫圓瘡愈口中腐爛者用  
黃連解毒加石膏湯石榴皮  
煎汁加枯礬少許含嗽日七  
八次朱礪散水解毒塗舌上腐  
爛愈後與解毒劑二十日許  
而止若陰莖皮腫者宜以鍼  
或蟻針日去惡血若痛劇臭  
氣甚者毒盛也可用梅肉散  
大抵七寶紫圓丸散方之分  
量半減而用之有效○尿道  
內發下疳瘡香川氏謂之竅  
內下疳華岡氏謂之內疳瘡  
世所謂自微毒來膿淋也難  
急治宜緩治之用加味六物  
解毒湯兼七寶丸日一分若  
陰莖腫者用蟻針或鍼去惡

瘡口  
貼破  
可

血又有用大黃牡丹湯秘錄  
猪苓加大黃湯兼粉丸○便  
毒消散則為結毒故難成膿  
者亦令強成膿為上策也宜  
與葛根湯兼用伯州散或負  
重任日強力足勞脚則起脹  
若尚不起脹者白芥子末酒  
和塗瘡上或貼元生膏則必  
成膿也膿潰則宜從腫瘍之  
治法後六物解毒湯兼用七  
寶丸日一分或二分若秘結  
者或用牡丹湯○楊梅瘡初  
用葛根湯發之後用六物解  
毒湯熱解後用七寶丸痛劇  
者用梅肉散下之本間氏云  
有瘡口膿汁凝固作蓋漸成  
堆者是不貼膏故也又曰難  
愈者宜化毒丸丹霞條○一  
貫云下疳下劑有效梅肉丸  
良疔瘡痛甚者可早用梅肉

瘡口  
貼破  
可



也。梅毒初有時々寒熱盜汗等症，宜先發表而後下之。經日數則無若症，脉見沉細者，也。方此時宜用五宝輕粉化毒等，又有用輕粉而下血者，多死者。一家傳云：梅毒久不愈，頭有腫，按之為凹而膿出，面色青黃，或頸項有瘰癧者，餌食雞肉有效。又為痿痺狀者，入反鼻酒劑等良。梅毒一切諸藥無效者，鼯鼠霜酒服妙也。又瘡毒推藥方：胡桃七箇為末，傅鼻柱，即鼻骨之毒，忽移他予傳之於或俗家也。試之妙，凡服輕粉後覺胸中如有飲或嘔者，石膏有效。○武田氏秘錄云：結毒實狀而重者，生々乳劑，虛狀者，餌食雞肉，實狀而諸藥無效者，宜薰藥。凡毒結眼者，非薰藥無

効。凡女子之結毒，多兼痰血，見勞瘵者也。宜兼用濕漆丸。五宝丹治上部結毒，食不進者，有大小柴胡症。○按吾門梅毒骨痛，烏頭湯兼七宝丸。元生膏貼結毒有效。一男子咽喉結毒，絕食五日，以膏攤於綿片，徑四寸，以貼結喉上，一夜而發水泡，翌日食糜粥，貼之六七日，而能飲食數日而愈。其他結毒於頭項手足等者，貼之治數人，屢効。○秘錄云：結毒治法，宜先與桂枝加朮附湯而動毒，後用輕粉化毒薰藥等，身體疲勞者，令餌食雞肉鰻鱺類。○按本間氏咽喉結毒，用薰藥涼膈加石，重者五宝丹，手足結毒，用解毒湯化毒丸，頭顱結毒，用薰藥防風通聖散，梅毒用解



毒湯翹玄湯薰藥陰囊結毒  
專斷截也凡結毒專外治者  
可託專門○按凡病人每病  
患附子劑之症者希有焉其  
人患下疳等則宜與葛根加  
朮附湯等後與桂枝加朮附  
湯不用他藥而愈此症用輕  
粉丸則多死矣○五郎兵衛  
街近江屋某三十五歲嘗患  
傷風或頭痛或腰痛或泄瀉  
等症每病非附子劑則不愈  
爾後患下疳予與葛根加朮  
附湯家人疑予非專門託外  
科治之與輕粉丸下利數行  
變症蜂起不日而死○一男  
子二十歲患蠟燭瘡素陰莖  
長四寸腐蝕而為二寸半先  
考與桂枝加朮附湯二十日  
不用他藥而腐蝕止生龜頭  
而復故只陰莖短於平素一

寸半○方輿載四物解毒湯  
及萎蕤湯桔梗解毒湯歲靈  
仙湯菟歸湯再造散五寶散  
紫金丹凌冬飲連克湯敗毒  
湯通聖散四順清涼飲逐毒  
散

癰疽

葛根湯 癰疽初發惡寒發  
熱頭項強痛者宜發表之  
發背初起未成及諸熱腫以  
濕紙榻上先乾處是頭著艾  
灸之不論壯數痛者灸至不  
痛不痛者灸至痛乃止其毒  
即散不散亦免內攻神方也  
李絳兵部手集

若不堪熱痛者宜隔蒜灸先  
以濕紙覆上立候紙先乾處  
為瘡頭記定然後用獨蒜去  
兩頭切中間三分厚安瘡頭  
上用艾炷於蒜上灸之每五



炆煨蒜再灸如瘡大有十數  
頭作一處生者以蒜搗爛攤  
患處鋪艾蒜散再換

桂枝加黃芪當歸湯  
伯州散 將成膿則宜與此

湯兼此散或合排膿湯  
大柴胡湯○黃連解毒湯

調胃承氣湯○大黃牡丹湯  
至十四五日大便秘結口

舌乾燥或生黑胎或嗜冷  
水及瓜菓腹滿譫語者宜

撰用此四方  
當歸芍藥散去澤瀉加參芪

湯○黃耆當歸生姜人參湯  
方見 瘡門○著歸建中湯○排膿

湯 割截之後與芪歸桂枝  
合排膿湯兼用伯州散若

膿稀薄則與歸芍散去澤  
瀉加參芪湯兼伯州散餌食

雞卵或芪歸姜參湯加鹿  
茸若腐肉難去只稀膿出

穢氣薰蒸漸々腐敗而深  
陷脉微弱身體羸瘦微惡

寒者右加減歸芍散料加  
附子若腐肉已去膿將盡

盜汗出者芪歸建中或加  
龍骨若消渴者麥門冬湯

加五味子栝蒌根若四肢  
攣急者芍藥甘草附子湯

等皆皆津液枯竭故也  
要訣云癰疽未潰之際增寒

壯熱狂言妄語如見鬼神膿  
去已多而大熱不休者似為

難治蓋毒之得膿猶傷寒表  
症之得汗汗已而反大熱則

為壞傷寒矣又云出膿過多  
而羸瘦者芍歸湯○方輿凌

冬飲諸腫毒服之未成者內  
消已成者即潰其方忍冬黃  
芪各一錢五分當歸三分耳

此方  
出和  
劑名



艸一分石四味以水二合煮  
取一合加酒更煎數沸溫服  
有奇効云予未試○華岡氏  
曰癰愈後半年或一年之間  
不可食蕎麥麻油○方輿載  
敗毒散及連堯湯涼膈散凌  
冬飲梓葉湯櫻皮湯

疔瘡

葛根湯○越婢湯○大青龍  
湯 面疔初發急用冰蛭  
三四十枚令吮血後宜撰  
用右之三方翌日亦施蟻  
針如前日大出血四五日  
則大勢已解者也

黃連解毒湯加連翹犀角

三黃湯加石膏

表熱已去裏熱者撰用之

大承氣湯 裏熱甚舌上黑

胎便秘腹滿煩悶將死者

大小柴胡湯 患處化膿後

荏苒寒熱往來者

加減當歸芍藥散料

膿多出腐肉盡去熱漸退

痛減者宜此湯

本艸引肘後方云疔腫垂死

菊花一握搗汁一升入口

即活此神驗方也冬月采

根○按試此方有神驗菊

花實治疔聖藥也

秘錄云有紅絲疔者發於合

谷及掌背指縫指節及跗上

指縫指節初生一點之小瘡

尖圓而如疥癬四畔微焮腫

紅絲自瘡上起立走注也發

于掌背者上攻至腋發于跗

上者至膝惡寒發熱也○治

法針刺紅絲盡處出血則不

上攻而自消也疔心亦針刺

而出血此症無至死者○紀

聞云疔發于手足腹背者可



治發于面者危矣發于人中  
及口吻者多死也○痘疔針  
刺而貼破敵入衽內服柴胡  
去半夏加括蕞連翹大黃湯  
或黃連解毒湯加犀角  
按千金云凡療丁腫皆刺中  
心至痛又刺四邊十餘下令  
血出又本間氏曰疔瘡不施  
針刺刀截之法則多難救也  
實確言也青洲翁云患疔者  
可嚴禁沐浴○素問曰膏梁  
之變足生大丁○按癰疽疔  
毒亦然宜淡薄飲食而免此  
患

瘰癧

翹玄湯

山脇方

治蛇盤瘰癧

頸筋凝硬

連翹一錢

參木通

升麻

羌活

山梔

牛艸

右八味煎服

夏枯草煎

治瘰癧神方

夏枯草

錢者百

八錢

貝母八錢

胃及微

右三味先以

線縫

以

醇酒二升

夏枯草一日

一夜煮取

五合絞去滓入

鯽魚更煮

半日許如膏下

火又去貝母

但食鯽魚汁

三日而盡

之若吐血則止

服

瘰癧科

瑣言云真瘰癧未變色

者用夏枯草煎

二劑則消散

也應者能食

不應者嘔吐又

云不可用斑

貓礬石等瞑眩

甚且有翻花

之憂又云瘰癧

與乳岩同物也

○秘錄云真

瘰癧九死一生

難治未成膿

者翹玄湯兼用

夏枯草煎此

方尤有奇驗

用二三劑則能

消散也間亦有

殘核至小而



不全消者不治亦不為害用此二方而不消散者宜令成膿葛根木附湯兼用伯州散  
○馬刀瘻生于頸核大楮圓而如馬刀宜柴胡加石湯夏枯艸煎不消散者與葛根加反鼻湯此症易成膿不為難治○微瘻化膿者易治不化膿者翹玄湯兼用丹霞條摩擦神水膏尚不消散者斷截如施便毒難化膿者之術斷截後貼破敵○結核於頸及頷下似瘻瘻者頗多眼病或咽喉病或服輕粉口中腐爛者或中兔毒者或痘瘡麻疹頭瘡久咳等皆成結核柴胡加石膏湯有神驗涼膈加石膏湯亦効凡瘻瘻結核餌食海藻昆布裙帶菜羊樞菜昆輪菜等則有消散之効○一

男子下疳愈後左耳下生結核大如挑家君與葛根加大黃湯三十日而半消散六十日而全愈

葛根加木附湯○伯州散

葛根加反鼻湯○柴胡加石

膏湯○葛根加大黃湯

千金方云一切瘻瘻以獨蒜

截兩頭留心大作艾炷稱蒜

大小貼瘻子灸之勿令上破

肉但取熱而已七壯日易蒜

日々灸之取消止○方輿輒

云灸瘻瘻上良瘻瘻一因氣

一因毒因氣者及其潰只黃

汁出因毒者稠膿出大凡稠

膿出者可治黃汁出者不治

本艸云夏枯艸治瘻瘻之聖

藥然非大劑多服則不能奏

効又云瘻瘻潰爛土茯苓尤

効○治瘻瘻潰爛方陸冷飯

毒謂也



冷飯  
團生  
茯苓  
異名  
也

圓切片或為末水煎服或入粥內食之須多食為妙江西所出色白者良忌鐵器發物○按景岳全書土革薛湯土茯苓一味也其主治云治楊梅瘡及癰瘰咽喉惡瘡癰漏潰爛筋骨拘攣疼痛皆妙  
治癰瘰方金十右用白殭蠶治下篩水服五分匕日三服  
十日瘡聖濟作一錢  
又方金狸頭一枚炙搗篩飲服方寸匕日二  
治癰瘰腫結內消方聖濟海藻一斤右一味用酒五升浸數日食後少飲酒  
又方聖濟蝸牛殼多不拘右一味搗為散每服二錢匕空心米飲調下日再至四十  
九日自消○按聖濟有蝸牛丸蝸牛半椀雞蘇半斤

也

治五種癰瘰杜蝸散方聖濟

杜蝸研連翹瓦上炒搗

右二味為散每服一錢匕臨臥酒調下

治癰瘰內消方聖濟小麥淨

右一味煮三五升頻喫即愈○按本艸癰瘰門云消瘰小麥醋浸同海藻末酒服

治癰瘰結聚不散鞭如石聖濟

大蒜三搗爛麝香研半

右二味和勻傅於帛上貼之一日二易旋擣最好

治鼠瘻方聖濟蟻螂燒存性

用醋調如糊先以塩湯洗瘡塗傅日再易

南星膏醫治皮膚頭面生

瘡或軟或硬不通

生南星大者一枚研加膏

無生者乾者為末

登治商要下

四



右醋調如膏先將小針刺令氣透以膏攤紙上如瘡大小貼覺痒則頻易貼本艸云鯽魚生搗塗惡核腫毒不散及癩瘡

肘后云芥子末和醋塗瘰癧青膏五爪龍細剉以麻油一升煮之令黑色布濾去渣內蜜蠟八十錢再煮以盛陶器安水中少時乃成膏如不成則更加蜜蠟適宜再煮之可也一切瘰癧貼之速消散也又貼乳腫痛妙也松岡玄達翁之試効也云

妙靈散集未氏治瘰癧滑石右為細末每服二錢單方同治瘰癧破與未破及膿血淋漓其効如神

壯蠣兩八 甘艸兩二 右

二味勻拌每服二錢

丹正 宗結 毒紫 也金丹

病因考云獨顆者為結核續連者為瘰癧此症宜餌食肉物和氣血能成稠膿而愈不然則不成膿只黃汁出難治浴溫泉且多灸肩井膏育身柱曲池等○說約瘰癧門家方順氣劑擇加果苓薏貝結或排毒劑解毒劑食療果羸餅灸溫泉○漫遊雜記瘰癧服瀉心湯兼服再造散又絲瓜黑燒酒服一錢日三與病法因考○方輿云真瘰癧自氣鬱滯生又云瘰癧自胎毒來者上草薺湯兼用玄龜丹又兼服再造散初起未甚者用忍冬花蒲公英各四五錢以水二碗煎朝夕代茶飲之飲多有○和田氏云瘰癧雞肉多食良灸法與病因考同外有



肩頤肘膠膝眼○按後世之方書療瘰癧門載十六味流氣飲予弱冠時一女子患瘰癧用流氣飲百餘日無寸效遂疲勞而死華岡氏云真瘰癧與乳竈同物也予意初與夏枯艸煎若不應則宜翹玄湯兼服七寶丸日一二分許然非久服之則無效三因方瘰癧門必勝丸方中有輕粉鯽魚白花蛇散方內有膩粉又蘭書以水銀為解凝劑瘰癧用之若病人壯實則薰藥亦定有效可試也

治疣方 川穀 其艸少 右水煎多服而妙也

方輿載夏枯艸湯瞿麥湯小柴胡湯逍遙散土萆薢湯桔梗解毒湯再造散逐毒散伯州散

疥癬癩瘡

葛根加反鼻湯或加大黃 桂枝加黃芪反鼻湯

濕疥重者發表後用此 六物解毒湯 疥瘡出膿久不已者土茯苓上品多用

有<sub>持</sub>效 莖麻子散○元聖膏○蟻針 按疥瘡初發香川氏用排毒劑和田氏用浮萍散本間氏用五物解毒湯即四物解毒加荊芥湯也

病因考疥癬門云治方土茯苓劑食雞肉及鼠肉則能發早愈禁外傳藥○和田氏云疥瘡初發用發表之藥七八日後用解毒劑○瘍科瑣言云疥瘡初發宜發表多食鼠肉狐肉即能發也○行餘醫言疥瘡門云若用外敷藥愈



之或浴冷泉取速効者甚則直成暴水脹而死○證治要訣云瘡癬疥此雖皮膚小疾不足為害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥癩嗜膚尤為煩擾甚至經年累月不能脫洒凡病此者不當專用外傳藥須內宣其毒可也○按濕疥重者初起與葛根加反鼻湯半月或一月許時々食雞肉鹿肉等十分發而後與桂枝加黃芪反鼻湯二三月或四五月膿盡欲愈時以蓖麻子散擦遍身只當避頭面及頸腋下肘膝手掌足心陰處肛門邊九七日休息一二日而入浴桶與六物解毒湯半月許而止是治濕疥之正法也如此則非止愈疥瘡從來之宿疾脫然而去香川氏謂外瘡之

發出者最是喜事亦宜戒正宗云夫疥者微芒之疾也發之令人搔手不閑實煩擾之病也思早愈之而勿用七寶梅肉等內攻而為暴水腫多至死者慎哉々々疥瘡初起有可附子者宜葛根加木附湯凡濕疥出膿時盜汗出故用桂枝加黃芪反鼻湯又乾芥雖輕者遠浴五六月而後可擦蓖麻子散決無內攻之患或與葛根加荊芥湯又疥瘡漸瘥手足處々結聚而出膿者宜貼元聖膏於瘡上或施蟻針妙也○頑癬初起未蔓延時貼元聖膏於瘡上後施蟻針或亂刺去惡血內服葛根加大黃湯○臙瘡者施蟻針又貼元聖膏或亂刺而出血內服葛根加大黃湯○



按香川氏謂疥癬癩瘡及腎囊風禁外敷速愈藥并溫泉者確言也予往々見犯此禁而死者可慎○方輿載浮萍散及苦參一味湯四順湯再造散治癩瘡楊梅皮湯

留和泉屋清助妻年五十頭上悉生小瘡膿汁凝固成痂不得梳者一年函二三輩療之不愈請予予與葛根加大黃湯以剪刀除去百會穴處膿汁凝固成痂者徑三寸貼元生膏日取毒水六七日癩爛處施蟻針十餘枚去惡血復施元生蟻針如前三次則膿汁尽落痂一月而全愈此症元生之功大

痔脫肛

當歸芍藥散加人參地黃湯等歸膠艾加三七湯

瀉心湯 斷截痔漏腸痔則宜用加味歸芍散料若出血過多則用膠艾加三七湯三七廣東人參也

桂枝茯苓丸料合瀉心湯 腸痔脫肛痔與桂枝瀉心合方又內痔不宜大黃劑者與桂枝解毒合方脫肛痔陽症大腫而疼痛者用桂枝瀉心合方腫上施蟻針而出血屢試屢效本方續集論脫

桃花湯傷寒 脫肛痔陰症無疼痛焮腫之患平生只有便信屢如廁裏急後重而大便不通唯脫肛脫肛則便信暫止歸則復如廁一日數行漸々脫肛長大後每度下血面色萎黃宜

或此湯加此良餘糧

登台商要下



此湯或云柴胡去半夏加  
芪歸升麻赤石脂湯神驗  
芎歸膠艾湯○黃連解毒湯  
紅礬丸方家

脉痔者無痛下血一次一  
二合或三四合俗稱波志  
利痔宜撰用此二湯虛里  
動高者兼用紅礬丸又有  
世俗稱切痔及裂痔者此  
亦大便交點血者也酒客  
多此症大便則痛甚肛門  
破裂也不宜大黃劑宜桂  
茯苓解毒合方或歸芍散解  
毒合方且灸長強每日一  
百壯

大黃牡丹皮湯 內痔無腸  
內破裂但痛甚者催痔漏  
之兆也宜與此湯

雄黃黃匱金 苦參湯匱金  
患痔人肛門生蟲謂之蟲

痔宜撰用此二方苦參湯  
金匱不載方金鑑載之苦  
參一升以水一斗煎取七  
升去滓燻洗日三

六物解毒湯○七宝丸  
徵痔用此二方看法詳于  
本書

蟻針 脫肛痔及杜痔施之  
有效予素有杜痔發則以  
水蛭八九枚令啞患處不  
愈則次日亦施之即愈

辰砂膏方家 治一切痔痛  
椰子油 辰砂 右二味  
冬時直合和攤於綿片貼  
之夏時加黃臘適宜內痔  
入此膏於肛門內

治痔方金十 以蒲黃水服方  
寸七日外臺云治下痔疾  
者 每大便常有血

治五痔小香連丸方聖濟  
黃連黃殼炒焦 右一味為末

登治簡要下  
五



以雞子清和丸，梧子大，每服十五丸，溫酒下十服取

治血痔地榆散聖地榆到

右一味，搗羅為散，每服二錢，飯飲調下，日三服

和田氏云一切痔疾除脫肛

皆金鈴散有效，兼用於解毒劑等可也。金鈴散牽牛○病

因考云，今之下血者，多痔也，內痔痛甚者，後為漏也。又云

脫肛，痔中之一症也，痔不下血者，灸腰眼八膠，脫肛者宜

餌食，大牢及兔雞卵。○說約痔漏脫肛門家方解毒劑馬

膏，或熊膽猪脂之類，點之，肛脫者塗之，以綿推入。○食療

鱉肉 牛肉 雞肉 雞卵 灸 溫泉 兔肉 塗熊膽取瘡止

治痔神驗

神良，一切方皆不及此。鱈魚泥 治痔痛 鱈魚去

鱗腸為泥塗痛處。治痔痛 蝸牛四五十頭以

麻油煮，以為膏，為度。蝸牛治痔

蟲痔坐藥 胡粉水銀各等分，調和綿裹，夜卧入穀道

中。肛門痒不可忍，殆似蟲痔者

半夏未和姜汁先洗肛門，後塗之，即愈。右四方武田氏秘錄

治痔疾下部發腫痛不能行者，聖半夏研令極細入

龍腦少許同研用津唾調攤，紙上貼之，良久有水

出，漸消矣。久冷五痔便灸脊中百柱，○

五痔便血失屎灸回氣百柱，穴在脊窮骨上針



南陽云痔疾下血及久下血  
用人參湯加茯苓得大効正  
宗痔漏下血用加味四君子  
湯醫訛腸澀用人參散取奇  
効皆同意也又云痔灸長強

八膠

治脫肛一醫傷寒論桃花

湯赤石脂禹餘糧湯二方

合和糊丸服赤石脂醋製

此方小兒最有効

又方直指慈石半兩火煨

醋淬七次為末每服一錢

又方千金以鼈頭炙研米飲

服方寸匕日二服

治脫肛歷年不愈千金鼈頭

一枚燒令烟絕治作屑以

傅肛門上進以手按之

有持云鼈頭內服外傅皆

妙

又方針蒲黃二兩以猪脂

和傅肛上內之二三度即

愈

脫肛藥餌方雞一頭去羽

腸以牛黃六分黑豆三合

入腹內縫以香酒三升煮

之以摘鑷拔出骨為度七

日食

一小兒三歲痢後脫肛四寸

動則肛觸衣而痛日夜號泣

里醫療之不愈經半年予以

陳壁土五倍子煎汁洗之傳

五倍子末與柴胡去半夏加

芪歸升麻赤石脂湯七日而

半收十五日而全愈

灸法千金病寒冷脫肛出灸

臍中隨年壯○脫肛歷年

不愈灸橫骨百壯○又灸

龜尾百壯龜尾即後

方輿載四物解毒湯凌冬飲

排膿散單牽午散再造散輕

登台商要下

五十四

出武  
田氏  
秘錄



粉丸

卒死

備急圓○走馬湯

還魂湯金匱 救卒死客忤死

麻黃兩四 桂枝兩二 甘草

杏仁個七十 右四味

以水八升煮取三升去滓

分令咽之通治諸感忤

方云主卒忤鬼擊飛尸諸

奄忽氣絕無復覺或已無

脉口禁不開去齒下湯

入口不下者分病人髮左

右足踏肩引之藥下復增

取一升史立 須

按還魂湯千金方及翼外臺

有桂枝二兩肘後千金翼皆

用麻黃四兩今從之金鑑云

便閉裏實者用備急丸無汗

表實者用還魂湯予意麻黃

分量多而加桂枝者徹表有

力故用之或曰然則稱麻黃

湯可也予答曰麻黃湯麻黃

三兩此湯麻黃四兩所以有

還魂之名也

救卒死方金匱 吹皂莢末鼻

中

又方金匱 灸心下一寸臍上

三寸臍下四寸各一百壯

差

又方後肘 灸臍中百壯○又

方令三人痛凡其人之人中

取醒

千金翼卒死門治卒忤方

灸人中三十壯又灸肩井

百壯

療卒死而口噤不開者外縛

兩手大姆指灸兩白肉中

二十壯

驚怖卒死本 溫酒灌之即

醒

入浴暈倒本朝 以冷水噴

面及澆周身苦酒一升灌口

登名商要下

五五



鼻中

療入井塚悶鼻方

本朝經驗

急

解患人衣，偃卧濕地上，以

醋，噴其面，蓋以草薦，半時

許，即甦。

召氏云：生姜一兩，酒煎，頓

服。

按：偶欲入舊井及土室，土窖

則當試下燈火於其中，其火

乍滅，則勿急入焉。入則忽中

惡氣而死，繼不死，必病矣。宜

灌醋二三升於其中，飲食酒

飯而後徐徐入焉。

療五絕方：針、灸、五絕者，一

曰自縊，二曰墻壁壓，三

曰溺水，四曰魘寐，五曰產

乳絕，皆取半夏一兩，細下

篩，吹一大豆許於鼻中，即

活。心下溫者，一日亦可活。

案本神綱目以縊死溺死壓死凍死驚死為五絕亦

方主此

救自縊死法在金匱略之

又方：金匱 皂莢細辛末吹兩

鼻中。

又方：金匱 凡救自縊死者，極

須按定其心，勿截繩，手抱

起，徐徐解之，心下尚溫者，

以氈氍覆口鼻，兩人吹其

兩耳。

又方：金匱 強卧以物塞兩耳

竹筒內，口中使兩人痛吹

之，塞口傍，無令氣得出，半

日，死人即噫噫，即勿吹也。

又方：金匱 藍青汁灌之。

願躡集施金匱之法，灸湧泉

瘍，醫大全云：必須心口尚溫，

大便未下，舌未伸出者，救

治。

召氏云：肛門出糞者，難治。或

云：縊死，人中溫而肉柔軟者，



施壽家之活法則甦若人中肉堅硬者不治

救壓死法因三以死人安著

將手袖淹其口鼻眼上一

食頃活眼開與熱小便若

初覺氣絕而不能言可急

劈口開以熱小便灌之打

撲者亦用此

按奇效單方云心頭溫者

急扶起將手提其髮用半

夏末吹入鼻內少甦以姜

汁同香油打勻灌之

救溺死法金十屈兩脚著生

人兩肩上死人背向生人

背即負持走行吐出水便

活

又方金十解死人衣灸臍中

凡落水經一宿猶可活

或云甦後灸臍中二三百壯

水死人忌烈火寒氣內攻

而至死

方輿云或曰溺死肛門未翻

者以醞醋灌之吐水而愈

一貫云溺死令服酢五六合

至一升又云溺死腹著背者

肛門翻者足小指不動者不

治

按千金落水死條云酢灌

鼻又本朝經驗用熱醋一

碗奇効願体集云水溺之

人夏月可救冬天難救冬

天醒後宜少飲溫酒夏天

甦醒後宜少飲粥湯又五

絕療法云溺死若五孔有

血者不活○有持云溺死

宜按揉其腹令吐水

救覺死法後臥忽不寤勿以

方輿云臍中百壯

登治病要下



又皂莢末吹兩鼻

又以蘆管吹兩耳

又方千金翼灸兩足大指聚毛

中二十一壯

救凍死法本冬月凍死略有

氣者炒竈灰包心上冷

即換待氣回少與酒粥不

可近火即死○灸神闕氣

海關元十五壯

肘後方云凡卒死中惡及尸

蹙皆天地及人身自然陰陽

之氣忽有乖離否隔上下不

通偏竭所致故雖涉死境猶

可治而生緣氣未都竭也○

甲乙經曰尸蹙者死不知人

脉動如故

癩

大養氣湯○大黃牡丹皮湯

七宝丸○瓜蒂散○紫圓○

蟻針○元生膏○鍼

神秘丸氏龜井治天刑病

大楓子錢五十荆芥大

黃藥皮櫻皮燒存性

苦辛爐甘石各五錢壺

盧燒存性一右八味細

末糊丸梧子大每服一錢

白湯送下日三服之十日

其夜臨臥酒服芫黃散一

錢至十一日早天服紫圓

強人五分羸者二分白湯

送下輕者一劑劇者二三

劑得愈禁酒生冷魚鳥房

事

松香散○松葉散

千金方惡疾門云有諸處不

異好人而四肢腹背有頑處

又云有直置頑鈍不知痛癢

者○按後世所謂死肌也此

病口眼喎斜者疑似於中風

發惡瘡者疑似於微瘡脫疽

登台商要下

五十一



等雖然餘病者無死肌此病必有死肌試刺針五分或一寸更不覺痛也癩病初發難決者宜先試刺針有死肌否而決嫌疑也○張會卿曰癩瘍砭刺之法子和張先生謂一汗抵千鍼蓋以砭血不如發汗之周徧也然發汗即出血出血即發汗二者一律又曰若惡血凝滯在肌表經絡者宜刺宜汗若惡毒蘊結於臟腑非蕩滌其內則不能痊若毒在外非砭刺遍身患所及兩臂腿腕兩手足指縫出血其毒必不能散全書廿四○本艸綱目水萍條發明頌曰治惡疾癩瘡遍身者濃煮汁浴半日多効此方甚奇古也○方輿輶云此方癩疾陽症者試之三五日而有奇効入浮

萍一斤於尋常浴桶中濃煮而浴之日三四度則不溫覆而汗自出內服浮萍散又云在陽者禁酒肉斷房事盡其治則可全愈但陰症合谷肉脫者決不治也○秘錄云素問并諸方書論癩之病因而云受不正之風而發乎意不然不慎飲食縱食禽獸諸肉及叔鱖鮓鱧魚鱣等自然生敗血作諸瘡瘍之病因也其中敗血凝滯劇者遂作癩風也雖自發者起於此因然傳父母之血脉而患者尤多○千金方云余以貞觀年中得一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之惟須求之於已不可一仰醫藥者也又云一遇斯疾即須斷塩常進松脂一切公私物務



按服  
二字  
疑  
下  
疑  
十字  
或

釋然皆棄猶如脫屣凡百口  
味特須斷除漸々斷穀不交  
俗事絕乎慶宇幽隱巖谷周  
年乃瘥瘥後終身慎房事犯  
之還發又云神仙傳有數十  
人皆因惡疾而致仙道何者  
皆由割棄塵累懷穎陽之風  
所以非止瘥病乃因禍而取  
福也

治惡疾方金煉松脂投冷水  
中二十遍蜜丸服二九遇飢  
即服之日三鼻柱斷離者二  
百日服之瘥斷塩及雜食房  
室

仙人治癩病神驗方千金取

松葉不問多少煮三五遍令  
苦味盡暴乾擣末如麪先食  
服二方寸匕日三漸增之或  
可至四兩隨人多少至一斤  
飢即服之能愈萬病又益壽

延年殺三蟲食入五藏動發  
若病難忍四肢重不仁婦人  
產後餘疾月水往來不得續

男女少者藥悉主之○本艸  
有服食辟穀方其文云千金

方用松脂十斤以桑薪灰汁  
一石煮五七沸漉出冷水中

旋復煮之九十遍乃白細研  
為散每服一二錢粥飲調下

日三服服至十兩以上不饑  
々再服之一年以後夜視目

明久服延年益壽○按凡治  
癩四月至八月為佳時輕者

用神秘及芎黃紫圓如法施  
蟻針或鉞針於赤斑及疥血

處取血三日一次如此二月  
許而愈後久服松葉散等益

佳尤禁酒肉房事全愈後亦  
三年禁之是治陽症輕者之

法也稍重者多不得全愈者  
登始簡要下



縱偶得全愈，非終身禁酒肉房事，則病必再發而不得為久完人。須決意為木食也。為木食則病必不再發矣。○我邦自古儒佛之道並行，修行而傲浮屠氏之徒，則世人信仰之如鬼神。孫氏所謂因禍而取福者也。○方輿載浮萍加大黃湯，通聖湯再造散，逍遙湯。

證治摘要卷之下大尾

附錄

養正丹

和劑

水銀

硫黃

細研

硃砂

細研

黑錫

水銀

結砂

子各

右用

黑蓋

一隻

火

上

鑄

黑錫

成汁

下水銀

以

柳枝

子攪

勻次

下硃砂

攪

令

不見

星子

放下

方

入

硫黃

末急攪

成汁

勻

如

酸

以醋洒

之候

出

研

細

糯米

煮糊

菜

豆大

每服

二十九

加至

三十九

食前

塩湯

棗湯

任

下

靈砂丹

同

水銀

一兩

硫黃

右

二味

新

銚內

炒成

入

水

火

鼎

煅煉

糊

圓

如

麻子

大

空

心

棗湯

來飲

井花

參

湯

任

下

量病

五

七

圓

忌

猪

羊

血

菜

豆

粉

證治摘要卷之下附錄



冷滑之物  
治嘔吐輒紅丸方聖

丹砂研砒霜研烟脂錢

巴豆取七粒右四味研細

鑄蠟少許入油三兩滴和

藥為劑以油單裹之大人

旋丸如菉豆大小兒如芥

子濃煎槐花甘草湯放温

下一丸勿熱食半時久

通經丸方本治經閉

桂枝 青皮 大黃 山

椒 莢木 乾姜 川烏

頭 當歸 乾漆 桃仁

各等 右十味為末老米

糊和醋丸梧子大每服二

十九空心温酒服

解毒劑 療微瘡便毒下疳

結毒發漏筋骨疼痛諸壞

症及癬膿瘡諸惡瘡膿淋

瘡 通艸 忍冬 大

黃 中 甘艸 少 右水二

合煮取一合內土茯苓五錢

則水四合煮取二合加減

法土茯苓樸椒萍蓬根牽牛

子升麻枳實隨症出入弱

人或泄瀉家方中將代枳

大便秘結或骨痛甚者須

用將咽喉痛加桔膿淋或

有水氣者加茱萸有水銀

輕粉毒用土茯苓最可也

說約

敗毒劑 治痛痺風毒瘟疫

類一切眼疾咽喉痛瘡腫

疥癬 茨 獨活 大 桔 芩

中 枳 柴 小 或 甘 小 生 姜

五分 右水二合煮取一合

加減法痛痺防風通艸忍

冬桂附子隨症出入足痛

加牛膝骨節痛甚加將咽

喉痛桔為主眼疾血多加

此方後二

所製



眼加倍升結毒眼加將  
狗咬寬中丸 青黛百草霜

錢各三 檳榔 木鼈 番木  
鼈 黑牽牛 杏仁 苓

連 大黃 雄黃 鐵粉  
各一 巴豆 雄黃 鐵粉

糊丸 大人三十丸 小兒十  
丸 白湯下 合十三味

元生丸 方家 主治經閉 天刑  
淋疾 水腫 風犬傷 瘰癧 馬

刀 不問新久 或已潰成漏  
深久不瘥 或癰疔便毒 一

切頑瘡 風濕流注 脚膝引  
痛 頭面發塊 或生瘡 或中

風 手足不仁 婦人帶下 赤  
白 或陰處糜爛等症

芫菁 桂 茯苓 芍 桃  
仁 牡丹 大黃 各五分 甘

艸 二分 石八味 糊丸 每服  
一分 砂糖湯送下

救喘丸 同 治喘咳倚息不得  
卧者 淡豆豉 十錢 蒸

枯白礬 錢三 礬石 錢一 右  
三味 丸 綠豆大 冷水 或沙

糖湯送下 七丸 甚者加至  
十餘丸 忌食熱物等 若服

後腹滿者 用瀉心大柴胡  
之類下之 或礬石代砒霜

砒霜則夜間露七夜 收研  
細

苓消丸 同 消石 錢十 茯苓 錢四  
右為末 糊丸 梧子大 每服

三五十九丸 以木防已去石  
膏加茯苓煎湯下 患水腫

病人 嫌消石之苦 烈者 用  
之佳 近來此丸代單霸王

塩丸有神驗 名桓文丸  
元生膏 同 馬知利膏 錢十

芫菁末 新者 錢二  
家傳制鐵粉法



鐵粉升 鹽分 以鐵粉入  
器中合鹽攪日曝乾以匕攪  
日五六次三四日而入土器  
以炭火熬之二時餘以變紫  
色為度製鐵鏽亦佳

方輿所載後世方應書肆之  
需錄之

瘟

六物敗毒散 一開 羌桔  
芩 甘 升麻 大黃

右以水二合煮取一合

方輿煮法如此下皆倣之

連翹湯

治傷寒熱毒變作

赤色癰疽丹疹腫毒及眼

赤痛生障翳悉主之自漏

蘆連翹中翹上芩芩

湯來 麻黃 升麻 各四分

枳實 大黃 各六分 右八

味熱盛者加芒消

喝

牛蒡茶連湯 觀方

香薷飲 同 生脉散 同

消暑湯 治中暑嘔而煩渴

者○即小半夏加茯苓加

石膏甘艸

良姜吳茱萸湯 治大吐大

瀉後轉筋甚者吳茱萸瓜

食塩三味等分同炒焦煎

服

瘡

柴胡鱉甲湯 瘡方見

肘後療諸瘡方 鱉甲三兩

右一味搗末酒服方寸匕

至發時令服三服兼用灸

無不斷者

一方談堃翁 常山栝榔甘

錢各三驗方 黑豆百粒 右四味水

煎服

河

河澗芍藥湯 方彙本方

參連湯 嘔吐全不食者

謂之噤口胃火甚也用此



證治摘要 下附錄 五

方濃煎終日細呷之如吐再服但一呷咽即開

藥皮湯外臺療熱病久下利

膿血方黃蘗三兩色子十二

枚黃連兩四阿膠兩二右四

味千金駐車圓治大冷洞利

腸滑下赤白如魚腦日夜

無節度腹痛不可堪忍者

如神丸木香黃連阿

片錢各二乳香沒藥錢各一

沉香分五右六味為末糊

丸綠豆大辰砂為衣每服

一丸冷水送下日三

無憂散和子黃耆木通

陳皮桑白皮錢各一胡椒

木香錢各半牽牛頭末

錢四右八味為末每服一

錢以生姜自然汁調下治

疝及留飲帶下開紀

當飯湯外臺療三十年下利

止諸痛方當飯兩一生姜

兩大棗枚二十右三味以

水四升煮取一升半分作

三服不差後作之

錢氏白朮散方

紫散下利後重不下膿血

者檳榔厚朴各三錢桔梗水

莎葛根各十錢枳實桂蓬朮

錢各十右八味末用煎服

亦得

揚起簡便方云肚腹微々作

痛罷即瀉瀉亦不多日夜

數行者用蕎麥麩一味作

飯連食三四次即愈○疝

瀉久不止者效

泄瀉經驗方景岳糯米一升

洗乾炒末入山藥一兩每

日用半盞入砂糖二匙川

椒末少許以極滾湯調食

聖藥 厚泄

方見



○久泄食不進者效  
調中湯方 治產後久泄紀

甘歸 桂芍 芩

附子 良姜 右七味

枳實大黃湯即小承氣湯

平胃散見方 加枳榔甘艸

桂枝藿香湯 桂 藿 木

香宿砂 吳茱 莢 木

甘七味

養脾湯 理中湯加茯苓宿

砂麥芽姜棗 平生虛弱

之人飲食易傷用之紀

千金吳茱萸湯 傷寒論吳

茱萸湯加半夏桂枝甘艸

安瀛湯 一帆青 茯苓各

錢石二味水煎溫服四五

日下利為知

療胃反大驗方 前胡

生姜各四 阿膠一 大麻子

仁吳茱各五 桂三 甘五 棗

十枚 右八味以酒二升水  
三升煮取一升七分再  
服

破棺湯 治膈噎 桃仁

杏仁 桑白 右三味水

煎溫服

一方 治嘔吐 水莎 良

姜 木香 烏梅 乾姜

丁香 六味

獨參湯 治反胃嘔吐喘促

粥湯入胃即吐 張介賓

單香薷湯後肘

郁李仁湯 治心腹滿大小

便不通氣急喘息者脚氣

腫滿發此証亦效 郁李

仁 杏仁 橘皮 茯苓

栝 桑白味六

紫蘊子湯 面腫氣急者脚

氣

濟生腎氣圓八味丸加車

前子牛膝

腫水

經

食傷



諸治摘要一附錄

麻子湯 治編身流腫方千金

麻子五升赤小豆三升商陸一

防風兩附子兩石五味

先擣麻子令熟以水三斗

煮麻子取一斗三升去渣

內藥及豆煮取四升去渣

食豆飲汁

麻子小豆湯 服桃花已渴

者大麻子香擣研以水

一搗取汁 合以水二

赤小豆 合煮取一合

二汁相和上火三五沸服

之此千金療水氣遍身洪

腫百藥不愈待死者方

連翹湯 治瘡疥內攻

腫 赤小豆湯 山赤豆五錢商陸

生薑各一麻黃七分連翹五分

桂二分大黃三分右七味以

水三合先煮小豆減一合

內諸藥煮取一合日二劑

或三劑加犀角或反鼻亦

佳 防已散 治妊孕腫滿喘促

小便不利 防已錢桑白

茯苓紫蘓各二木香錢姜

煎服

琥珀湯 治產後水腫

琥珀 朮 茯苓 桂 猪

澤 反鼻 右七味以水

一合冬瓜汁一合合煮取

一合

瓜子仁湯 方見

實脾飲 見方

赤小豆藥 赤小豆五錢大

蒜七分生薑五錢一分商陸

根一分條 右並碎破同水

煮爛去藥空心食豆旋

啜汁令盡腫立消

登治摘要一附錄



奇效... 附錄

氣 甘遂 近者新 大黃 分各 等  
右二味為末糊丸桐子大  
每服五分或一錢溫水送

脹鼓

瓜子仁湯 王治見  
分消湯 景方  
壯原湯 同  
半夏湯 外 主腹內左助痞

胖黃

痛者 夏 桔 枳實  
前胡 吳茱 鱉甲 分各三  
枳榔 五分 生姜 四分 人參 一分

疝瘕

牡蠣奔豚湯 品小 療奔豚氣  
後少腹起撞胸手足逆冷  
李根 六分 桂 八分 牡蠣 甘  
各三 右四味  
瀉脾湯 金十 主脾藏病氣實  
胸中滿不能食 茯苓 朴  
各半 夏 桂 生姜 各九

芩 甘 分各 四 人參 分三 八  
味常用加龍骨牡蠣或加  
石膏

療腹中疝氣連心以來相引  
痛緊急方 外 枳實  
各三 柴胡 兩 鱉甲 兩 右

寬中湯 芍 二分 錢 桂 生  
姜 各六 朴 甘 棗 枳

當飯大黃湯 外 飯 芍  
桂 乾姜 茱萸 參 甘  
大黃 右八味 ○ 疝痛從

助骨邊至背及肩者効  
桂心湯 集 療寒疝氣來往  
衝心腹痛 桂 兩 生姜 兩

吳茱 兩 右三味切以酒  
一大升煎至三合去滓分  
溫三服

蜀椒湯 品小 主寒疝氣心痛

證治商榷下附錄



言... 附子

如刺，饒臍腹中，盡痛，自汗

出欲絕，蜀椒二百，附子

一枚，粳米半升，乾姜兩半，夏

右七味，以水七升，煮取三

升，澄清，熱服一升。

烏梅丸 治蛇厥 烏梅

蜜丸 附子 乾姜 黃連 六

錢三十 椒四 乾姜十 黃連十

痛 檳榔 霍亂 散 療諸蟲心腹

桂 參 檳榔 霍亂 痛 檳榔

右八味 檳榔 霍亂 痛 檳榔

椒梅湯 諸蟲作痛，口中清

涎流出，湯飲不進，危在旦

夕者，烏梅 蜀椒 生

姜 煎服

將軍湯 治精神不守，言語

錯亂，妄見，妄言，少卧，少饑

狂走不常者，大黃一味

水煎，無時服之。

浸連湯 治諸氣疾，衝心直

狂癲

視煩悶，或吐血不止者，

參連 或各五分 右二味

水煎，加熊膽汁，名熊參湯

風引湯 除熱癰癩 大黃

乾姜 龍骨 桂 甘草

牡蠣 寒水石 滑石

赤石脂 白石脂 紫石

英 石膏 右十二

味 軒 麤 篩 以 韋 囊 盛 之 取

三指撮，井花水三升，煮三

沸，溫服一升，治大人風引

湯 熱方巢氏云脚氣宜風引

防已地黃湯 治病如狂狀

妄行，獨語不休，無寒熱，其

脉浮，防已 桂枝

防風 錢各三 甘草 錢二 右四



味以酒一盃浸之一宿絞取汁生地黄二斤以咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黄汁和分再服

酸棗湯金十治虛勞煩擾奔

氣在胸中不得眠酸棗升五參桂生姜各二石膏四茯苓知母各三兩甘

飯脾湯半治健忘怔忡驚悸

不寐者見方彙

流水丸病見勞久病不寐者效

單苦參丸發狂用將軍瀉

心類大勢解而後用此

調中湯錄古今療虛勞補益氣

力方麥門茯苓甘

桂飯芍各五棗錢七

柴苓枳木湯外療痲痺氣壯

熱兼咳久為骨蒸驗方

柴分茯苓木枳實六分各

積熱不歇即加芒硝取利

逍遙散見方

五蒸湯錄古今石膏一錢竹葉八

茯苓半葛根六參分

苓知母各四粳米二分

甘分二右十味

竹葉飲瘡滑蒸唇乾口燥

欲得飲水止渴方竹葉

一麥門夏一大棗二

枚甘生姜兩各三粳米五合

七味

流水湯品小主虛煩不得眠方

夏分二米一錢茯苓四或加生

地黃煎丸後方見虛勞羸瘦腹

滿不能飲食內有乾血肌

膚甲錯兩目黯黑者

甲子丸治勞嗽方五味

地骨皮兩各二鱉甲兩三右



三味為末煉蜜圓如桐子  
大空心溫酒或塩湯任意  
服三五十九

大武丸

治証同前下利者

乾牛肉

朝鮮薯蕷 蓮肉

茯苓

小茴香 各十錢 右五

味為末棗肉搗膏入好酒

和丸梧子大晒干空心酒

下

懶肝丸

治勞瘵方

懶肝炙干為末糊丸桐子

大白湯送下

四頃散

治肺癰吐膿

五心煩熱壅悶咳嗽氣急

不能安

貝母 紫苑

桔

杏仁 各四分

為湯或為末服

桔梗湯

療肺癰經時

不差方

桔 木 飯

半

敗醬 薏苡

癰肺

桑白 右八味以水四合

煮大豆半食取二合汁去

豆內清酒半合餘合諸藥

煮之

黃昏湯

十療欬有微熱煩滿

胸心

甲錯是為肺癰方

黃昏

一手掌大 右一味煎

服

一方

保壽治婦人腹痛如錐

刺每痛至死不敢著手此

腸癰毒也 山甲 白芷

貝母 疆蚕 大黃 右

煎服打下膿血自小便中

出即愈

犀角地黄湯

治傷寒及溫

病應發汗而不汗之內畜

血者及鼻衄吐血不盡內

餘瘀血大便黑面黃消痰

血方 犀角 兩 半 兩 兩 兩

牡丹 兩 右以水九升煮

血失

癰腸



痰飲咳嗽

取三升分三服喜忘如狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱但依方不須有所增加  
獨參湯 吐血甚欲絕脉沉手足逆冷者

射干麻黃湯 效而上氣喉

中如水雞聲 射干 五味 各六分 麻 生 姜 各四分

細辛 紫苑 款冬花 各三分 棗 一分

厚朴麻黃湯 效而大逆上

氣胸滿喉中不利如水雞聲脉浮者 朴 五兩 石 二兩

膏 子如雞 乾姜 細辛 各兩 杏 仁 各兩 半

夏 五 味 子 杏 仁 外 各 兩 半 小 麥 升 一 石 九 味 以 水 一 斗 二 升 先 煮 小 麥 熟 去 滓 內 諸 藥 煮 取 三 升 溫 服 一

升日三服

澤漆湯 上氣脉沉者 夏

升澤漆 三升 以東流水 五斗 煮取 一斗 五升

紫苑 生 姜 白 前 兩 各 五 兩 甘 苓 參 桂 兩 各 三 右 九 味

咳咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜尽

清肺湯 咳嗽用小青龍加石膏不已將成勞嗽者 開

百合知母湯 疫邪解後咳 嗽喝々巨里動悸者 百 合 知 母 右 二 味

獨聖散 和子夫富貴之人一切 涎嗽是飲食厚味熱痰之 致然也先用獨聖散吐之

三拗湯 見方

喘四君子湯 見方

倒換散 宜明治癰閉大小便 不通小腹急痛肛門腫痛

大便閉

喘

證治摘要附錄

社



大黃通便荆芥大便不通右為末每服二錢溫酒調

三黃湯治下焦熱結不得

大便三兩若大閉加芒消

八正散見方

通草湯治膿淋小便赤汝

生津湯麥門 杏 括萎

甘參連半牡蠣

知母右九味或加石膏

通關散諸卒暴厥牙關緊

急者先用此得嚏而進藥

細辛牙皂各等右為末

少許吹入鼻內有嚏可治

滌痰湯見方

反鼻酒痲偏枯痛痺瘀血

結毒等灸藥湯泉不治則

有反鼻酒之可復療焉行

氣活血散解痼其功屢

著反鼻頭尾取連皮去腹

培乾酒火交趾桂枝為

藥牛膝錢各二花柳分五

五味刺細布袋盛浸好酒

一升別入砂糖十五錢甕

氣脚

蘇茶紫蘇湯蘇莖分四

小栳榔湯外療脚氣心煩悶

氣急不安夏生薑



大抵柳湯方見脚氣入腹困悶

木菜湯金治脚氣入腹困悶

廣濟療脚氣氣急上衝心悶

欲死者分三柳榔三顯生薑

攪頭服分三童便不須煖者三味

犀角湯外脚氣冷氣悶心下

堅背膊痛上氣欲死者

吳茱 柳榔 青木香

犀角 半夏 生薑 右

六味

黑豆湯同療脚氣滿小便少

者 柳榔 桑白 右二

味以後方煎汁二合煮取

一合温服日三劑或加吳

茱生薑

黑豆一合半洗淨以水一

升二合煮取六合去滓更

煮前藥

附子湯金治濕痺緩風身軀

疼痛如欲折肉如錐刺刀

割附九分芍 桂 甘

茯苓 參各三分木加 右七

味

紫蘘子湯金治脚弱上氣

昔宋湘東王在南州患脚

氣困篤服此湯大得方方

蘇子 夏各一升前胡 朴

甘 飯各一橘三棗二 十

生薑一斤桂四分石十味以水

一斗三升煮取三升半分

為五服日三夜一

常山甘艸湯 寒熱日再三

發者 常山一分甘艸七分

虎骨酒方見脚氣

杉節湯 杉節四柳榔七大

腹皮兩青橘葉九片十 作



一服水煎分三服一日飲  
盡如大便通利黃水未愈  
過數日再進一服病根去  
為度外用杉節橘葉煎湯  
洗之神效

風痛

栝蘓湯 大黃二分 木香 甘  
分各一 生薑 分五 橘 枳實  
桂 紫蘓 分各三 栝榔 分六  
大防風湯 治一切麻痺痿  
軟風濕挾虛者 飯 芍  
半 耆 防風 杜仲 各  
錢 芎 附 分各七 參 羌  
午膝 甘 分各五 木 半 錢 姜  
棗  
犀角湯 治毒流入四肢歷  
節腫痛 干 犀角 分三 羚羊角  
一分 前胡 芩 射干  
半 各五分 大黃 升麻 分各六  
豆豉 升 石 丸 味  
赤龍皮湯 赤龍皮 防已

痛頭

午膝 忍冬 木通 羌  
活 大黃 防風 甘  
右丸味  
一方 羌活 防風 各等 右  
二味

金鈴散 治痛風及肛痔  
牽牛子 炒 右一味 每服一  
二錢 溫酒若白湯下 或加  
茴香 即是子和禹攻散 疝  
或用之

柴胡加石膏湯 治少陽陽  
明頭痛 口乾 身熱 惡寒 拘  
急 柴 錢二 石 錢三 甘 錢一 姜  
山牛湯 通 治 瘡 瘡 頭痛 不止  
土茯苓 錢四 忍冬 錢三 防風  
天麻 黑參 各一 辛荑 仁  
芎 各六 黑豆 五 粒 芽 茶 撮  
右水煎溫服

先生曰頭痛經久不差者  
兼施十痊丸或針出血



痛背肩

提肩散 榆皮五分 榆葉七分  
千屈菜 分右三味

治腎氣上攻項背不能轉側  
椒附散 本方事大附子六錢

以上者炮去右每末二大  
皮臍末之

錢好川椒二粒用白麪填  
滿水一盞半生薑七片同

煮至七分去椒入鹽通口  
空心服

陷胸湯 治胸中心下結積  
飲食不消 括萋實

大黃 黃連 各八分 右

四味

附子丸 治九種心痛即九  
去狼附子三巴豆去皮研心丸

脂者參 乾姜 吳茱 兩各研一  
右五味末之煉蜜丸如梧

子大酒下強人初服三丸  
日三服弱者二丸兼治卒

中惡腹脹痛口不能言又

治連年積冷流注心胸痛  
並冷衝上氣落馬墜車血  
疾等皆主之

枳縮二陳湯 見方  
治腰痛 錄經心 杜仲 桂 各三  
木 茯苓 各四分 干膝 澤瀉

乾姜 甘分各二 服後飲酒  
為妙

文仲葛氏療卒腰痛不得悅  
仰方 附子二分 桂分八 牡丹

分右三味治下節酒服一  
刀圭日再此主服助氣痛

如打者

小品療腰痛及積年痛者方  
芎 十 桂 八 木 甘 乾 漆

各五分 五味 搗末以酒服方  
寸匕日三

當歸湯 當飯三酒合五

洗眼方 白礬 連 甘

黃栢 紅花 右五味

眼

痛腰

痛心



芎藭散 芎藭 錢二 芩 連  
分 茯苓 甘 細辛 大黃 二各

謝道人大黃湯 療兩眼痛  
方 芎藭 五分 大黃 細辛

通聖散 因風鼻塞者戴人  
使服通聖散入生姜蔥根  
豆豉同煎三兩服大發汗

鼻立通矣  
辛荑湯 鼻方見

甘露飲 治牙疳去血口臭  
齒齲腫痛腐爛方見

六味丸 口臭牙齲赤爛腿  
膝痠軟或口鹹

松葉煎 青松葉 花椒  
丁香 桂 五倍子 水  
煎頻含之

涼膈散 見方  
當道飲 治口舌腐爛而痛

者 車前子 夏枯草 二各  
錢 右二味以水二合煮  
取一合去渣內蜜四錢烱  
消溫服

清熱補氣湯 見方  
方後云不差者與附子湯  
先生曰產後口舌痛者服  
消黃朱石類未嘗得治一  
老醫傳此方後屢試之功  
力大出人意表

羅不女牟土不 蘆薈末  
沒藥 錢各二 明礬末 錢八  
右四味入燒酒一合調頻  
含之

碧雪 治口瘡咽喉腫痛  
靛花 蓬砂 煇消 蒲  
黃 甘 各等 右五味為末  
每用少許摻舌上細細嚥  
下喉痛者吹入之

升麻湯 錄今升麻 石膏  
喉咽

喉咽



牡丹皮 甘分各等 右四味  
雄黃解毒丸 治急喉痺方

雄黃 鬱金 各一兩 巴豆 四粒  
右為末 醋糊丸 綠豆大

熱茶清下 七丸 吐出 頑涎  
即甦 未吐再服 如口噤以

物 斡開灌之 下咽無不活  
者 又小兒驚風 痰涎壅塞

及馬脾風 或痘毒攻咽 藥  
食不下者 冷水服 五七丸

神驗  
加味四物湯 治虛火上升

喉痛 并生喉瘡 喉痺 熱毒  
能降火 甚效 春

飯 芎 芎 芎 桔  
甘 黃栢 知母 花粉

馬牙硝散 治喉癰及傷寒  
熱後咽痛閉塞不通 毒氣

上衝 馬牙硝細研 每服一

娠妊

錢綿畏含 嚥津以通為度  
當歸散 婦人妊娠宜常服

飯 芎 芎 芎 桔  
半右五味 杵為散 酒服 方

寸匕 日再服 妊娠常服 即  
易產 胎無苦疾 ○先生曰

此方有整胎之功  
芎歸湯 見方 艱產大加雲母

獨聖散 難產及胎衣不下  
者 一吐之即出

通關散 胞衣不出者用此  
吹鼻中 得嚏即出 血暈亦

治動胎及產難子死腹中并  
下 妊兩兒一死一生服之

今死者出生者安神驗方  
金蟹爪 升一廿二 阿膠 兩三

三味 以水一斗 先煮蟹爪  
甘艸得三升 去滓 次內膠

令烺 頓服之 不能分再服



若人困物口內藥藥入即活

葵子阿膠湯金治胎死腹中

乾燥著背方葵子升一阿膠兩五右二味以水五升煮

取二升頓服之未出再煮服○先生曰水血下多子

道乾洪難出者此湯必效若無藥物以熱湯一盞內

鹿角菜令消頓服之或塗油牝戶亦是濟急之良法也

回生湯 飯 芍 芎 芩 半

木 茯 連 甘 桂 芩 參 丁香 木香

萍蓬 大黃 右十五味水煎或攪用此方雖不古

屢用屢效交加散方良治瘰癧或顫振或產後不省人事口吐痰涎

飯 荆芥分各等右為末每服三錢水一盞酒少許煎

至七分唯下咽即有生理大豆紫湯方見產後

新製下瘀血丸一開服枳實芍藥散不愈者此為腹中

有乾血著臍下此方主之亦主經水不利大黃錢三

桃仁各錢五各錢錢一右四味末之煉蜜和為三四丸以酒一合煎一丸

取半合蜀漆湯金治產後虛熱往來

心胸煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱嘔時輒甚又如微

瘧方 芩 三錢 者 錢 知 母 芍 各 四 分 蜀 漆 葉 桂

甘 苓 各 二 右 八 味 括 萎 湯 治 產 後 渴 不 止 方

括 萎 根 分 八 麥 門 分 各 六



甘 芋 各四 棗 十二 土瓜  
根 一錢 崔氏 右七味

二味參蘓飲 治產後瘀血

入肺 欬嗽喘急 參 兩一 蘓

木 兩二 右作一劑 水煎服 若

口鼻黑氣起 宜急用此藥

加附子五錢 亦有傳生者

奪命丹 治瘀血入胞 脹滿

難下 急服此藥 血即消 衣

自下 附子 半兩 乾漆 錢

炒烟 牡丹 兩一 大黃 兩一 右

為末 好醋一升 大黃末一

兩 同熬成膏 和前藥 丸梧

子大 温酒吞 五七丸

通仙丸 花麦大黃等分 丸藥

午膝散 治月水不利 膈腹

作痛 或少腹引腰氣 攻胸

隔 午膝 桂 芍 桃

仁 延胡索 飯 牡丹

各一 木香 錢二 右為末 每服

一錢 温酒調下 或每服三

五錢 水煎

紅藍花酒 先生曰 胞衣不

出 及產後 遍身痛者 亦佳

地黃煎丸 治月經不通 膈

下堅結 大如杯盤 發熱往

來 下利 羸瘦 此為血瘀 干

生地黄 取三十斤 乾漆 一斤

右二味 以漆末 內地黃汁

中 微火煎 令可丸 每服酒

下 如梧子大 三九 不知加

之 常以食後服 紀開云 此

羽澤散 治帶下方 白礬

杏仁 甘 各二分 丁子 水

片 各一 右五味 為末 薄絹

袋盛 以納陰中 坐臥 任意

但禁奔走 三日 一換 之以

愈為度 獨葭湯 治血崩及諸失血

證治摘要

十一



危急者。人參錢石以水一合煮取五勺温服不知服至數劑蓋暴崩危急之際非少々藥汁之所可得而救活矣庸醫不辨僅用人參五分或一錢以望其生宜哉其不得切

括萎根湯 括萎根 瓜萎

仁 百合 知母 薏苡

柴 芩 甘 右八味

烏菑丸 烏賊魚骨兩 菑根

一右二味為末雀卵清丸

小豆大每五丸或十九丸白

湯送下○亡血勞病用之

蒲公英湯 蒲公英 薏苡

用一錢 薯蕷 分飯 一酒 製水

六分 牡丹 分右五味以水

三合煮取二合其滓再以

水三合煮取一合一日服

盡試令男子服之亦覺乳

乳病

房起脹矣

治乳腫痛方 紫花地丁 擣

絞汁塗乳上

五物紅花湯 甘 連 大

黃 蔚金 紅花 右五

味

五香湯 外科毒氣入腹托裏

若有異症加減之 沉香

木香 丁香 乳香 麝

香 右五味 先生曰寒

症者宜用此方

山繭湯 山繭 紅花 蔚

金 右三味或擇加三稜

莪朮木香檳榔大黃甘草

丁子類

有不乳小便難者用乳汁四

合蔥白一寸煎三沸灌之

金花散 自梅花無盡藏來

連錢艸 紅花 大黃

連翹 藿香 升麻 錢

二

小兒初生



乳吐

沉香 檳榔 鬱金 乳香  
木香 錢各一 右十一味 為末  
和膠 飴多用 効治小兒頭  
瘡 世稱胃瘡者 大効 又治  
胎毒 一身發瘡 疥  
菜黃連湯 治吐乳 吳茱  
黃連 生姜 等分也

毒丹

犀角 消毒飲 治丹毒 壯熱  
狂躁 睡臥不安 荆 防  
錢各一 犀角 甘 各五  
干茅 四錢 如無犀角 代升麻 或  
微炒 加 芩連 石膏

啼夜

生地黃湯 針治小兒寒熱 進  
退啼呼 腹痛方 生 芩  
桂心 右二味

驚慢急

龍膽湯 治嬰孩寒熱 四肢  
製 搗吐 覘客忤 諸驚 疳方  
龍膽 釣藤 芍 柴  
甘 大黃 右六味

癩疔

烏蝎散 既為慢驚 外無八  
候 但吐瀉不止者 參  
木 茯 甘 川烏頭  
全蝎 南星 各一 姜棗  
水煎

痘

八神湯 針治心腹痞滿 萎黃  
瘦瘠 四肢痿 躄 繚 戾 服之  
可令克 悅方 芍 柴 各  
分大黃 參 各半 乾姜  
甘 各一 蠶甲 各半 右  
八味 外臺 有黃  
毓嬰丸 治疔方 大 芩 烏  
去 芩 瓜 燒 鱈魚 膽 一 錢 黃  
黑 四 錢 錢 五 錢 陸 錢 右 四 味 糊 丸  
藥 錢 五 錢 陸 錢 右 四 味 糊 丸  
芍藥 四物 解肌 湯 外 升 麻  
葛根 芍 芩 右 四 味  
順逆湯 飯 芍 芩 連  
甘 桔 連翹 黃耆  
生姜 九味

錢氏獨聖散 治痘疹 倒靨



陷伏 用川山甲取前足  
鬚上者燒存性為末每服  
四五分以米湯入少酒服  
之或紫艸湯亦可

手捻散

治當罨時腹痛不

罨其痛著在中腕乃熱毒  
凝滯瘀血作痛也 干姜

芍 桃仁 大黃 各五分

花 桂 半二分 右六味

先生曰諸瘡毒腹痛者屢驗  
連翹去麻黃湯 治結痂後

毒猶盛者

獨葭湯

治跌撲傷損或金

瘡出血過多昏沉不醒者

雞鳴散

治墜壓傷損瘀血凝

積痛不可忍 大黃 杏

仁 各二錢 右二味臨臥溫

服飲酒醉為度

接骨木湯

接骨木 飯

芳 芍 平 澤瀉 沉

打撲金瘡

香 大黃 右八味

治打撲折傷方

活脚魚 小

右研如膏內白砂糖和

勻傳患所汗出而愈骨損

者尤效

蔥慰法

治跌撲傷損 用

蔥白細切杵爛炒熱敷患

處如冷易之腫痛即止神

効

甘草解毒湯

甘草 忍冬

白礬 右三味以水二合

煮取一合獾犬咬傷加馬

錢子雞冠石煎成內鐵醋

水少許溫服兼灸之數十

日甚者併用寬中丸頻々

下之嘗治數十人莫一誤

者其他諸蟲獸毒皆能解

之此方越前奧村翁所立

而適所翁傳之

狗咬傷

杏仁甘艸口嚼搭

毒傷



傷火湯

羞微

傷處又宜銀杏塗傷處  
 四順清涼飲正治湯深火燒  
 熱極逼毒入裏或外被涼  
 水火毒內攻致生煩躁內  
 熱口乾大便秘實者翹  
 芍藥各一 薤白各一 防風  
 三白散以香油調敷  
 六物解毒湯 土茯苓 忍冬  
 通艸錢各一 芩錢五 大黃錢三 甘  
 四物解毒湯 銀花錢一 葎  
 菜各五 大黃錢三  
 土革薺湯 治楊梅瘡及瘰  
 癧咽喉惡瘡癰漏潰爛筋  
 骨拘攣疼痛皆妙景用土  
 革薺即土茯苓二三兩以  
 水三鍾煎二鍾不拘時徐  
 徐服之若患久或服攻  
 擊之劑致傷脾胃氣血等

症以此一味為主加對証  
 之藥無不神効

萎蕤湯

連通草 錢各一 仙  
 遺糧錢五 右七味以水一  
 升四合煮取七合一日服  
 盡若病重者用土茯苓五  
 十錢水率亦準之骨痛或  
 候耳鳴目赤

桔梗解毒湯

療結毒咽喉  
 口舌唇鼻破壞聲啞或成  
 癰癰者方 仙遺糧錢八  
 至錢二十 桔梗錢廿 芩  
 芍各三 大黃錢二 右

七味以水五合煮取三合  
 渣以五合再煮取二合米  
 一日服盡禁茶酒肉麪青

菜一切結毒諸症無名腫  
 毒腐敗經年不瘥者皆効

歲靈仙湯

飯 芩 芍



槐木 甘 大黃 午

膝 杜仲 龍膽 防風

歲 吳仙 各五 赤龍皮 五分

右十三味 浸酒一夜 以土

茯苓一斤 分為十二 以其

一合前藥 以水二碗 煮取

一碗 渣再 以水三碗 煮取

一碗 一日服 盡

芩黃湯 芩 大黃 荊芥

防風 右四味

薰洗方 治下疳瘡 微瘡 秘

錄方 今呼銀花煎 苦辛

川椒 金銀花 許各兩 右三

味 用水三四盞 煎數沸 先

薰後洗瘡 只拭乾 用三白

散 搽之

三白散 海牡蛎 煨葛粉

果 羸 右三味 未傳

箸歸湯 微瘡 便毒 疔瘡 或髮

際生瘡 梳下 薄 醫如 麩 或

手足肌膚紅點如班 隱肉

當服此方 使正氣足 而邪

自除也 參 耆 芩

甘 各一 錢 忍冬花 防

已 各一 錢 升麻 防風

川 山 甲 各 生 姜 右 十

玄龜丹 治遠年近日 楊梅

結毒 筋骨疼痛 日久 腐爛

臭敗 不堪 聞 或 咽喉 唇 鼻

破壞 諸藥 不效 者 妙也

龜板 放炭火上 炙焦 用新

上 反 安 酒 浸 濃 筆 蘸 塗

以 九 焦 為 末 二 次 石 決 明

童 便 內 清 之 一 次 硃 砂 亮

者 各 錢 共 再 碾 極 細 爛 米

飯 為 丸 麻 子 大 每 服 一 錢

量 病 上 下 食 前 後 筋 骨 疼

痛 酒 下 腐 爛 者 上 茯苓 湯

下 至 重 者 四 十 日 而 愈 木

作 硃 砂 六 錢

登 台 高 京 下 什 藥 二 五



十全丸 芎 苓 大黃

藤皮分各五 輕粉半錢 硃砂

錢連翹 苦辛 烏蛇

地骨皮錢各三 右十味為末

糊丸 梧子大 每服十五丸

白湯送下 日二夜一

先生可用粉丸症皆用此

方但下疳痛劇者用梅肉

丸開紀

四順湯原名四順 治血熱蘊

結壅滯不通或一身盡熱

或日晡肌熱或夜發熱皆

血熱也 飯芍 甘

大黃分各等 右四味

治疳瘡痛甚血不已者方

杏仁 雞子黃 右合研

塗患處

羅不女牛土方 下疳漸々

侵蝕不可遏止者當以此

洗若不愈者宜石聖湯

石聖湯 石聖湯三十錢 以

去渣不用 煇硝錢四 膽礬分三 右二

味投石聖汁中溫洗數次

若為水泡者去胆礬加礬

石一錢

十味敗毒湯 治瘡瘍嫩痛

寒熱脉緊有力 羌 桔

芩 枳實 柴 荆芥

防風 連翹 銀花 甘

生薑

涼膈散 治癰瘍熱毒熾盛

大便秘結

破棺丹治瘡瘍熱極汗多

大渴便秘謔語發狂等即

調胃承氣湯為丸者也

凌冬飲 諸腫毒服之未成

者內消已成者即潰 忍

冬 耆各一分 錢一分 飯三分 甘一分

右四味水煎加酒更煎數

沸溫服消渴後服此藥預

癰



防發癰

梓葉湯

治癰疽及一切腫

毒方

梓葉一錢忍冬一錢甘

艸五分

三味通草或加冬省

櫻皮湯

治癰腫瘰癧諸腫

毒方

櫻皮錢五桃仁錢二赤

龍皮

錢五石三味以水一升

煮取

七合頓服

鍼灸法

凡暴死者多是疔

毒急用

燈照遍身若有小

瘡即是

其毒宜急施鍼灸

夏枯草湯

治瘰癧已潰未

潰方

夏枯草錢甘艸分

右二味

或加翻等大黃又

明眼目

薤麥湯張潔治項邊馬刀方

翻薤麥

大黃甘

右四味

食後熱服十餘日

後灸

臨泣穴二七日六十

癰瘰 疔

日決効

浮萍散

治諸風癰疥癩瘡

浮萍

飯芎芍甘

荆芥

麻黃各等七味温

服出汗

苦參湯

遍身痒痛諸藥不

効久而

如癩癧者苦參

錢右一味

按葛洪破棺散

方以此物

酒煮服

四順湯

乾疥癢痒皮枯屑

起便秘者

浴湯方忍冬防風枳

實各十

荆芥湯花各二

錢淡竹葉

三百塩升右七

味熬盛袋煎浴

凡七八日

得愈

楊梅皮湯治臈瘡方楊

梅皮錢桔梗

茯苓甘

分右四味

初日以水一合

一合

煮取一合二日以

登台高厚下附錄 二十七



癩

合二勺煮取一合三日以  
一合三勺煮取一合四日  
以一合四勺煮取一合五  
日以一合五勺煮取一合  
以此為一劑大凡三劑得  
愈如毒深者服至五六劑  
萍湯治惡疾遍身生瘡浴  
浸半日大效本

通天散

大黃

皂角刺各

錢

牽牛子

反鼻

錢各六

分

或一錢

酒下

日二夜三

梅毒似癩眉毛脫者  
又久淋因毒者用之

門人稻良節問附子之用法  
於余答曰夫烏附之為性也  
猛烈也用之有瞑眩而愈者  
有不瞑眩而愈者有徒中毒  
者烏頭桂枝湯條云其知者  
如醉狀得吐者為中病也又  
桂枝附子去桂加朮湯條云  
如冒狀者此瞑眩而愈者也  
又用之其病頓愈氣宇快然  
者是无瞑眩而愈也又用之  
其病須臾增劇發頭痛眩暈  
或身軀不仁或發熱上逆嘔  
吐等症者中其毒也速止附  
子復問瞑眩而吐者與中毒  
而吐者何以辨之答曰瞑眩  
而吐者其病愈而後吐也中  
毒而吐者其病增劇而吐是  
其別也凡病用附子即愈心  
氣爽快者為方証相對也外  
科療結毒與為動其痼毒自



有徑庭然則附子之症候如何  
答曰仲景云無熱惡寒者  
又真武湯証曰腹痛下利附  
子湯証曰口中和由是考之  
無熱惡寒大便滑或溏口中  
和者可以為附子準的矣凡  
大便秘結者不中用之只冷  
秘之症用附子而大便快通  
是冬節薄衣之人或婦人月  
事之時一身冰冷少腹痛者  
多有此症然百人中一人耳  
又痛風一症用附子不數日  
則無功者若大便難者宜兼  
用大黃劑又有久服附子而  
患眼疾者速止附子不然恐  
後有致失明者矣慎諸々々  
中川成章誌

跋  
漢張仲景氏之書具悉治病  
之方法矣然學而不精泥而  
不通則誤治者亦不少也麓  
山中川先生家世軒岐嘗博  
撮古今之良方有合于仲景  
氏之旨意者躬親經驗者多  
年久之編一書成名曰證治  
摘要以授之子弟雖然醫者  
意也善得其意不膠于法善  
通其變而不誤于治則先生  
之所深望於子弟也夫元治  
甲子歲冬十二月  
門人 肥後支藩

大村守約識





證治摘要跋

中川良哉著

元治元世四月

京都

出雲寺文次郎

大坂

河内屋喜兵衛

同

河内屋茂兵衛

同

秋田屋太左衛門

江戸

須原屋茂兵衛

同

山城屋佐兵衛

同

英屋文藏



