



344

▲調經門

四物湯

簡易當歸散

清經四物湯

止經湯

元戎加味四物湯

歸芍湯

溫經湯

逍遙散

調經固榮湯

延胡索湯

小溫經湯

本事琥珀散

調經散

調氣養血湯

通經四物湯

海藏四物芩連湯

烏藥湯

調榮四物湯

阿膠四物湯

涼血四物湯

活血化痰湯

活血湯

桃仁散

珍寶飲





二香飲

通快四物湯

犀角清榮湯

順氣散瘀湯

經驗調經湯

補中益氣湯

加減益氣湯

加味八珍湯

四物芩朮湯

加減五積散

大補經湯

伏龍肝散

八珍益母丸

△經閉門 九

補中養榮湯

琥珀散

桂枝桃仁湯

紅花當歸散

滋血湯

牛膝散

熟地黃湯

逍遙散

養血通經湯

疏通飲

牡丹皮湯

六味地黃丸

養仁紅花四物湯

加減四物湯

立行飲

天花生地川芎益氣湯

十全大補湯

當歸六君子湯

△癥瘕門 十四

增味四物湯

十味消塊丸

桂心丸

磨積丸

養真湯

通經丸

牛膝散

四物調經湯

活血行經湯

歸脾湯

萬病丸

加味逍遙湯

治血瘕一方

小三稜煎

琥珀丸



神曲丸

通經丸

三稜丸

勝紅丸

加味大補湯

▲崩漏門 七

奇効四物湯

涼血地黄湯

益胃升陽湯

烏金散

黑金散

木香順氣散

必勝散

一方

和經湯

溫清飲

小薊湯

益母湯

芎歸膠艾湯

清榮湯

柴胡芍藥湯

升陽除濕湯

羅氏備金散

一方

斷泉神秘丸

如神旬

又方

一秘方

樗白湯

膠連飲

柴胡調經湯

復元養榮湯

艾煎圓

栢子仁湯

加味補中湯

補宮圓

一方

十全大補湯

一方

五灰散

獨行散

一方

獨聖散

固經丸

荊芥散

神應散

地黃丸

栢葉散



帶下門 二十七

加減八物湯

五積散

升陽除濕湯

加減六合湯

附桂湯

十六味保元湯

升陽燥濕湯

四仙散

芩檳樗皮丸

側柏樗皮丸

琥珀硃砂丸

芩木樗皮丸

收帶六合丸

滋榮收帶丸

清氣養榮湯

補元湯

保元湯

大靈丹

秘方

當歸煎丸

婦寶歸茸丸

疏實四物湯

玉仙散

秘方

清心蓮子飲

五苓四物湯

香風湯

獨活寄生湯

加味逍遙散

安全湯

白芷湯

地黃丸

栢葉散

苦練丸

延胡苦練湯

人參黃芪湯

加味益氣湯

歸脾湯

固經丸

固真丸

東垣赤白帶方

二白丸

一方

灸法

一方

一法

一方

止帶丸

香木丸

一方



一法

▲虛勞門 三十七

清肺湯

逍遙散

雙補寧嗽湯

海藏紫苑散

補肺湯

茯苓補心湯

却勞散

人參五味湯

滋陰至寶湯

滋陰地黃丸

十全大補湯

益氣湯

歸脾湯

▲出痘門 單

涼血地黃湯

涼血解毒湯

當歸養心湯

八物湯

瀉肝湯

大補湯

歸脾湯

▲雜病門 聖

袖珍桂香散

加味四七湯

菖蒲散

加添歸脾湯

柴胡抑肝湯

茯神散

小柴胡湯

清熱涼血湯

人參丸

消腫丸

消腫飲

葶藶丸

小調經湯

祛風活血湯

方

烏賊魚骨丸

芎歸湯

千金方

一方

又方



*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

▲求嗣 四十七

清痰養血湯 清燥養血湯

秘傳大補湯 六味地黃丸

長春廣嗣丹 白朮散

▲驗胎 四十八

驗胎散 艾醋湯

▲預防墜胎 同

八珍湯 安胎湯

芎歸補中湯 千金保胎丸

芎歸補中湯 固胎飲

千金保孕湯 白朮散

▲安胎 五十

金匱當歸散 安胎散



八珍湯 達生散

積穀滑胎散 一方

安胎散 安胎丸

束胎丸 一方

保氣散 護胎散

▲惡阻 五十三

參橘飲 保生湯

紫蘇和氣飲 半夏茯苓湯

歸原飲 調胃湯

茯苓丸 白朮湯

保生湯 仲景人參半夏丸

竹茹湯 半夏茯苓湯

一方 一方

竹茹湯 橘皮湯

茯苓補心湯

▲胎動 五十七

徐氏佛手散 紫蘇和氣飲

黃芪湯 小膠艾湯

川芎散 白朮散

膠艾湯 保安散

順氣飲子 釣藤湯

紫蘇飲 安胎寄生湯

安胎飲 加減安胎飲

養胎飲 一方

膠艾芎歸湯 安胎飲

▲胎痛 六十一



地黄當歸湯

安胎散

一方

一方

醫痰湯

一方

白木湯

一方

橘紅薑朴湯

一方

一方

藿香止氣散

當歸芍藥湯

一方

阿膠散

川芎散

和榮順氣湯

一方

火龍散

芎朴湯

砂仁湯

一方

八解散

胎漏

六十三

膠艾湯

一方

芎歸湯

加味道遙散

膠艾湯

靈効散

桑寄生湯

保氣散

乾桃散

如聖湯

八物湯

歸脾湯

膠艾四物湯

止漏散

苧根湯

二黃散

一方

加味四物湯

經驗方

和胎飲

奇聖散

枳殼湯

益氣湯

子淋

六十六



冬葵子散

地膚子湯

葵子散

車前散

加味四君子湯

又一方

子林散

▲轉胞 六十九

八味丸

紫蘊和氣飲

葵子散

一方

一方

安榮散

瞿麥湯

又一方

忘憂散

清利飲

檳榔散

全生茯苓散

丹溪參朮飲

通便飲

一方

杏仁丸

一方

一方

又方

▲遺尿 七十二

加味逍遙散

紫蘊飲

白薇芍藥湯

桑螵蛸散

▲大便閉 七十三

當歸湯

紫蘊飲

紫蘊和氣飲

當歸地黃丸

▲大小便閉 七十三

檳榔子湯

又方

溫胎飲

加四物湯

補中湯

芩挑四物湯

加味逍遙散

平安散

枳殼飲



大腹散

當歸散

防風和穀散

河梨勒散

紫蘇飲

▲子腫 七十四

澤瀉散

木通散

全生白朮散

鯉魚湯

茯苓湯

紫蘇飲

防風散

五皮散

生料平胃散

藿香正散

▲子氣 七十六

天仙藤散

腎著散

千金飲

商陸赤小豆湯

▲子煩 七十七

犀角散

人參散

竹葉湯

當歸飲

茯苓煎

麥門冬湯

除煩清心丸

門冬知母湯

知母飲

竹瀝湯

▲子懸 七十九

紫蘇飲

秘驗方

大聖散

白朮湯

一方

▲子癇 八十

葛根湯

防已湯

苓連四物湯

羚羊角散

羚羊角湯



▲子嗽 全一

天門冬湯

百合散

桔梗湯

馬兜鈴散

一方

茯苓補心湯

補中湯

一方

紫蘊和氣飲

▲傷寒 八十二

芎芷香薷散

參蘊飲

十全散

一方

一方

人參羌活湯

黃龍湯

一方

一法

芍藥湯

芎藭散

升麻六物湯

白朮散

表虛六合湯

表實六合湯

升麻六合湯

人參六合湯

厚朴六合湯

人參湯

▲痲疾 八十六

加味消遣散

清脾湯

加減和氣飲

人參養胃湯

驅邪湯

醒脾飲

▲痢疾 八十七

芩連芍藥湯

加味正氣散

連香飲

當歸芍藥湯

調和飲

當歸芍藥湯

芎朮香連丸

白朮湯



胃風湯

一方

歸薯糯米湯

一方

補中湯

▲泄瀉 九十一

藿香正氣散

苓朮散

調中湯

加味益中散

錢氏白朮散

胃苓湯

理中湯

補脾瀉肝湯

不換金正氣散

胃風湯

六君子湯

加減紫蘇飲

厚朴丸

豆蔻散

補中益氣湯

▲霍亂 九十二

藿香正氣散

人參散

人參白朮散

木瓜煎

益智飲

八解散

▲腹內兒哭 九十三

王連湯

又方

一法

▲子疳 九十四

四物湯

六味丸

茯苓補心湯

▲悲泣 同

大棗湯

淡竹茹湯

▲腰痛 同

鹿角散

通氣散



腎著湯

當歸湯

紫蘊和氣飲

獨活寄生湯

八物湯

杜仲丸

紫蘇飲

膠艾湯

小柴胡湯

歸脾湯

▲出痘 九十六

升麻葛根湯

參蘊飲

惺惺散

單胎散

安胎獨聖散

安胎飲

▲催生 九十八

芎歸湯

三合濟世湯

催生飲

催生湯

催生散

神應黑散

催生湯

加味芎歸湯

古桂香丸

催生柞木飲子

如聖散

順生丹

丹溪催生散

灸法

一方

快胎散

伏龍肝散

滑石散

安胎散

益氣湯

▲胞衣不下 百一

紅花酒

芎歸榆白湯

牛膝湯

奪命丹

芎歸湯

延胡索湯

二聖散

一方

一法

脫衣散



牛膝散

花蓋石散

失笑散

一法

▲小產 百四

芎歸補中湯

補氣養血湯

補血定痛湯

加味四物湯

加六君湯

聖愈湯

當歸散

十全大補湯

芎歸湯

▲血運 百六

醋炭薰鼻法

孤鳳散

局方妙香散

芎歸保元湯

清血散

清血散

七寶飲

芎歸湯

獨參湯

參蘓湯

黑神散

加味八物湯

芎歸煎芥湯

半夏茯苓湯

蒲黃散

散香餅

▲顛振門 百九

十全大補湯

神妙交加散

人參調榮湯

▲乍見鬼神 百



調經散

琥珀散

栝子仁散

加減八珍湯

芎藭湯

加減調血飲

逍遙散

開迷散

乾荷葉湯

妙香散

八珍散

▲不語 百十二

七珍散

茯苓補心湯

一方

加味逍遙散

胡氏孤鳳散

加減八珍湯

▲身熱不止 百十三

清熱飲

逍遙湯

當歸人參湯

補虛湯

十全大補湯

▲血斑門 百十四

清榮湯

逍遙散

茯苓補心湯

▲耳鳴 同

桃仁養血湯

加味芎藭湯

加味逍遙散

正血湯

柴胡八物湯

血參保元湯

補中益氣湯

▲多夢 百十五

益氣安神湯

清心蓮子飲

血參保元湯

▲驚悸怔忡 百十六



養心湯

妙香散

茯苓散

一方

一方

茯苓補心湯

歸脾湯

▲虛汗不止 百十七

麻黃根湯

黃芪湯

當歸黃芪湯

黃芪六一湯

十全大補湯

參附湯

人參湯

大補黃芪湯

一方

一方

止汗散

芪附湯

▲瘧病 百十九

十全大補湯

當歸補血湯

樂柳舉敗散

一方

▲中風 百二十

華陀愈風散

加味八珍湯

獨活湯

加減續命湯

祛風豁痰湯

芎歸養榮湯

補中湯

▲四肢筋攣 百二十一

十全大補湯

加味逍遙散

一方

▲癩癧 同

交加散

古并散

機要柴胡湯

八物湯



補中湯

大補湯

▲腳氣

百二十三

飛步飲

大防風湯

獨活寄生湯

人參八味丸

▲遍身痛

百二十四

趁痛散

五積散

和榮定痛湯

補散四物湯

補養四物湯

加減調榮湯

愈痛丸

大補湯

▲腰痛

百二十六

十全大補湯

勻氣散

吃力伽散

如神散

當歸黃芪湯

獨活湯

如神湯

獨活寄生湯

▲惡露不絕

百二十七

返魂丹

逍遙散

六君子湯

益氣湯

加味歸脾湯

大補湯

▲兒枕痛

同

失笑散

活血湯

延胡索湯

單五靈脂散

三聖散

安平飲

逐瘀湯

黑神散

十全湯

▲心腹痛

百二十九

加味異功散



大嚴蜜湯

失笑散

木槿湯

茯苓補心湯

加味五積散

▲小腹痛

百三十

玄胡索湯

山蘄養血丸

人參理中丸

一方

益氣湯

大補湯

▲脇痛

百三十一

八物湯

參朮柴胡四物湯

加四君子湯

芎藭調血湯

活血湯

▲腸癰

百三十二

薏苡仁湯

活血散瘀湯

加味逍遙散

益氣湯

胃風湯

大補湯

▲積塊

百三十四

四神散

一方

葛氏方

瑞竹堂方

翠杏經驗大補湯

▲血噎

百三十五

七味白朮散

清胃湯

熟地黃湯

竹葉歸芪湯

加味四物湯

加八珍湯

調血生津湯

清心蓮子飲

▲乍寒乍熱

百三十六

增損四物湯

增損柴胡湯



四物湯

當歸散

調榮湯

大調經散

十全大補湯

加減調血湯

和血湯

知母湯

小柴湯

八解散

補中湯

五積散

逍遙散

茯苓補心湯

加減四物湯

▲瘧疾

百二十九

橘半飲

加味消搖散

艸菓飲

人參養胃湯

加大補湯

補中湯

柴胡甘歸湯

▲傷寒

百四十一

羌蘘湯

逍遙散

七味白朮散

黃龍湯

八解散

茯苓補心湯

芎歸調血湯

補中湯

▲瘧勞

百四十二

猪腎湯

增損柴胡湯

十全大補湯

白茯苓湯

當歸羊肉湯

補中益氣湯

黃耆建中湯

加味大補湯

▲虛羸

百四十三

七賢湯

八物湯

佛手散

一方



十全大補湯

補中湯

▲嘔吐 百四十四

拒勝湯

加減抵聖湯

比和飲

十全大補湯

橘紅湯

八味理中丸

六君子湯

丁香散

▲霍亂 百四十六

白朮散

藿香正氣散

八解散

理中湯

參苓白朮散

▲頭痛 百四十七

當歸補血湯

加減四物湯

加味四物湯

益氣湯

薄荷湯

補中湯

八物湯

芎歸湯

茯苓補心湯

▲咳嗽 百四十八

異功散

參蘇飲

一方

旋覆花湯

知母散

加四物湯

加味四君湯

茯苓補心湯

補中益氣湯

▲喘促 百五十二

二味參蘇飲

奪命丹

參附湯

旋覆花湯

六君子湯

補中益氣湯



五味子湯

▲口鼻果飯 百五十一

二味參蘓飲 大補湯

▲咳噫 同

丁香散 卷活散

一方 參附湯

益氣湯 大補湯

▲血崩 百五十一

芎藭當歸芍藥湯 固經丸

熟地黄湯 百五十一 加逍遙散

和血理氣湯 烏金散

加味歸脾湯 補中益氣湯

十全大補湯 加城調血湯

補血湯 伏龍肝散

▲四肢浮腫 百五十四

調經散 正脾散

行濕補氣養血湯 加減吳茱萸湯

大調經散 四時氣 漢防已散

一方 金匱加減腎氣

消腫湯 血參澤瀉湯

一方 補中治濕湯

丹溪論 藿香正氣散

六君子湯

▲泄瀉 百五十七

一方 調中湯

胃風湯 八解散



治中散

益中散

錢氏白朮散

一方

芎歸調榮湯

▲痢疾

百五十九

調榮湯

當歸芍藥湯

沉香桃膠散

白頭翁湯

當歸調血湯

加減平胃散

胃風湯

宣明三聖散

良方加味四物湯

一方

一方

加味異功散

黃連飲

逍遙散

十全大補湯

當歸補血湯

▲大便秘

百六十六

滋腸五仁丸

阿膠枳殼丸

大補湯

橘杏丸

潤腸湯

八珍湯

加減調血湯

一方

加味逍遙散

參陳湯

▲小便不通

百六十四

利便飲

參歸升麻湯

橘紅散

一方

十全大補湯

木通湯

補中益氣湯

▲大小便閉

百六十五

桃仁散

人參散

加味四物湯

加味逍遙散



補中益氣湯

▲遺溺 百六十六

補中湯

六味丸

加味道遙散

參芪湯

白薇芍藥湯

補脾飲

滋榮養衛湯

▲小便頻數 百六十七

桑螵蛸散

補中益氣湯

六味丸

加味道遙散

一方

車前散

桑白皮散

一方

一方

▲淋症 百六十八

白朮湯

滑石散

瞿麥飲

加味消搖散

補中益氣湯

十全大補湯

▲陰脫 附腫痛 百六十九

補中湯

八珍湯

十全大補湯

補元湯

當歸黃耆湯

當歸飲

硫黃散

硫黃湯

四物湯

加味道遙散

桃仁膏

一方

一方

▲脫症 百七十

參芪湯

補中湯



一方

▲乳汁不出 百七十一

當歸補血湯 玉露散

成煉鐘乳散 化痰湯

益榮湯 柴胡飲

消風散 十全大補湯

▲乳自出 百七十二

十全大補湯 加味逍遙散

補中湯 歸脾湯

▲乳岩 同

逍遙散 連翹湯

十六味流氣飲 十全大補湯

歸脾湯 八味丸

胃風湯 補中益氣湯

▲牙齒 百七十三

十全大補湯 逍遙散

補中益氣湯

▲口舌 百七十四

八物湯 七味白朮散

補黃散 補中益氣湯

升麻湯

▲咽喉

加味八珍湯 益氣湯

加味其桔湯



經閉

紅嬰尾倍官  
茂丁

調經散  
治經水或前或後或多或少  
或逾月不至或一月再至

調經

四物湯 治衝任虛損月水不調臍腹  
疝痛此補血之本藥乃婦人衆疾之總  
司也

當歸 川芎 白芍 熟地黃

石水煎服○經水澁少加葵花紅花○  
經行身熱脉數頭昏加柴胡香薷○經  
行過三五日腹中綿綿走痛者此血行  
而滯氣未盡行也加木香檳榔子○月  
來血少者合四君子湯







蓮木 蘇木 各一錢  
川芎 肉桂  
甘艸 各五分  
紅花 三分  
木通 八分  
桃仁 二十箇  
右水煎服

○止經湯 治經水不時淋瀝或成片或下黑水面色青黃虛羸眼花

當歸 一錢  
白朮 八分  
芍藥 川芎 三分

熟地 香附子 阿膠 黃芩

蒲黃 炒 槲柏葉 砂仁 各七分  
甘艸

右入生姜水煎服

●海藏四物芩連湯 治經水如黑豆汁

四物湯 四兩 黃芩 黃連 各一兩

右為末醋糊為丸服

●四物湯加玄胡楨柳苦棟木香○主

經欲行臍腹絞痛

●烏藥湯 治婦人血海疼痛

當歸 甘艸 木香 各五分

烏藥 一兩 香附 二兩

右水煎服

●歸芍湯 治臨經并經後作痛者

當歸 川芎 芍藥 香附 各一錢

陳皮 人參 白朮 生地 各半

右入棗水煎服

●調榮四物湯 治月信過期而來及其色如淡紅水者此血虛也

熟地 當歸 各二錢 五味子 斷文

香附 敗龜板 醋炙各一錢 麥門 八分



三  
右入棗水煎服

●温經湯 血海虛寒臍腹疼痛月經不調脉沉緊者主之

當歸 川芎 牡丹 芍藥 官桂  
莪朮 人參 牛膝 各三錢 甘草 灸一錢

●阿膠四物湯 經水過多久不止者成血崩也用此湯涼血補血養脾

當歸 川芎 白芍 酒炒 生地 白朮 條芩 阿膠 炒 山梔 炒 地榆 荊芥

香附子 甘艸 白茯苓 經驗スルニ加炒補黃妙

右水煎服久不止者加茅根汁磨墨同服

●逍遙散 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱此足三陽三陰之藥散

血中之濕熱之劑

柴胡 當歸 芍藥 炒 茯苓 白朮 各一錢半 甘草 薄荷

右入姜棗水煎服○婦人年五十內熱晡熱經水兩三月一至此血虛有熱依本方加山茱萸治之而愈

●涼血四物湯 治月信先期而來及紫黑色者此皆血虛血熱也

當歸 王連 香附子 槐花 川芎 山梔子 各一錢 芍藥

生地 各二錢



右入灯心三十莖水煎服

●調經固榮湯 治月信色淡而稠粘肚腹疼痛者此痰也

白茯苓 橘紅 烏藥 香附

枳殼各八分 當歸 白芍 宿砂

地黃 半夏各一錢二分

右入大棗五枚水煎服

●活血化痰湯 經水過期而來色淡者痰多也

當歸 川芎 白芍 生地

陳皮 半夏 茯苓 甘草各等分

右入生姜水煎服

●玄胡索散 治氣血走作疼痛及月水

不調面色痿黃飲食減少產後諸疾

玄胡 莪朮 當歸 三棱

右為末每二錢空心酒調服如氣血發甚月水不調童便紅花煎酒調服

●活血湯 治衝任經虛經事不調不以多少前後並治

當歸 川芎 白芍藥 玄胡索

肉桂各二及

右每服四錢水一盞煎至七分食後熱服

●小溫經湯 治經候不調血臟冷痛

當歸 附子炮各等分

右水煎服



●桃仁散 治月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水腹堅痛身沉重欲眠多思酸物

桃仁 甘州炙 半夏 各三分 赤芍

生地 各一錢 澤蘭 牛膝 當歸

桂心 牡丹 人參 蒲黃 炒

川芎 各七分

右入姜水煎服

●木事琥珀散 治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣欲死者

三棱 莪朮 赤芍 劉寄奴

牡丹 熟地 官桂 蒲黃

甘菊花 當歸 各一兩

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下

●珍寶飲 治月信一月兩至或數日一至者此氣虛血熱也

當歸 白芍 人參 茯苓

生地 各一錢 蒲黃 二錢 香附 川芎

白朮 甘州 王連 各八分

右入大棗二枚水煎服

●丁香飲 臨經時肚腹疼痛者血滯而氣不順也

當歸 香附子 木香 川芎 各一錢



青皮 牡丹 枳殼 生地

蓬朮 各一錢二分

右入生姜水煎服

●加味八珍湯 治經水過期屬氣血兩

虛者

當歸 熟地 各一錢半 人參 芍藥 酒炒

茯苓 白朮 各一錢 香附子

陳皮 各八分 川芎 七分 甘草 五分

右水煎服

●通快四物湯 經候過期而來紫黑成

塊者氣鬱血滯也

當歸 川芎 白芍 生地 桃仁

紅花 牡丹 青皮 香附子

延胡 甘草

右水煎服

●四物芩朮湯 治經水過多者

依本方加白朮黃芩

右水煎服

●犀角清榮湯 錯經妄行於口鼻者是

火載血上氣之亂也

當歸 川芎 白芍 生地 黃芩

山梔子 牡丹 犀角 阿膠 炒

茯苓 陳皮 麥門冬 去心

右水煎服

●加減五積散 治婦人遇經行時浴身

遍身疼痛手足麻痺或在寒熱頭痛



目眩等症此乃觸經感冒也 方見帶下

依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜

棗

順氣散瘀湯 婦人經行之中氣惱鬱

結血亦凝滯心腹腰脇疼痛者宜此

當歸 川芎 芍藥 生地 桃仁

紅花 延胡 莪朮 青皮

香附子 陳皮 木香 甘草

右水煎服

大補經湯 治婦人氣血虛弱血海寒

冷經水不調或時心腹疼痛或下白帶

如魚腦髓或似米泔不分信期每月淋

瀝不止面色痿黃四肢無力頭目眩暈

肌休羸瘦

當歸 酒洗 白芍 酒炒 香附 各六分 熟地

川芎 各五分 白朮 茯苓 黃芪

玄胡索 陳皮 各四分 人參 砂仁

阿膠 炒 沉香 另研 小茴 酒炒 肉桂

粉艸 灸 吳茱萸 炒各三分

右入姜棗水煎服

經驗調經湯 治婦人經水或前或後

或多或少

當歸 熟地 香附 各一錢二分 白芍 酒炒

吳茱萸 炒 紫荊皮 肉蓯蓉 大腹 各一錢

川芎 條芩 各七分 粉艸 五分

右入姜棗水煎待經至之日服起一



八  
日一劑服至四劑而止經即對

●伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脉虛經血非時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

伏龍肝 赤石脂 各一兩 肉桂

甘草 各半兩 地黃 熟艾 各二兩 乾姜

當歸 各七錢 川芎 三兩 麥門 一兩半

右入棗水煎服

●補中益氣湯 婦人室女經候不調脉微食少體倦或熱此氣血藥血脫益氣之大法也

●八珍益母丸 專治氣血兩虛脾胃並

弱飲食少思四肢無力月經違期或先期而至或腰痠腹脹緩而不至或行期不收或斷或續或赤白帶下身作寒熱服之罔不効益益母調經為君佐以八珍滋補氣血也

益母草 四兩不見鐵器止

用上半截帶葉者

八物湯料

右為末蜂蜜丸彈子大空心蜜湯下  
凡如不能嚼者丸以細粒如小豆大每服二三十丸○脾胃虛寒者加砂仁一兩姜汁炒○腹中脹悶者加山查一兩  
○祇常多食者加香附子一兩



加藏益氣湯 治婦人多怒經行旬餘而方止淋瀝無期肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗月晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣

黃芪 人參 茯神 遠志 白朮  
當歸 麥門 五味子 牡丹  
龍眼肉 柴胡 升麻 酸棗  
灸其州

右入棗水煎服

經閉

補中養榮湯 治脾胃弱食少惡食泄瀉疼痛或誤服汗下攻剋之藥中氣不足血少而經水不行者若虛甚者補中

益氣湯

白朮 土炒 茯苓 各二錢 黃芪 三本  
當歸 川芎 柴胡 各一錢半 麥芽 七錢半  
甘州 少許

右入姜棗水煎服

牛膝散 治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻胸膈

牛膝 酒浸 桂心 赤芍 炒 桃仁  
玄胡 炒 當歸 酒浸 牡丹 各一兩 木香 三錢  
右為末每服一錢溫酒調下或三二錢水煎服

琥珀散 治心膈迷悶肚腹撮痛月信不通等疾



烏藥<sup>二兩</sup> 當歸<sup>酒浸</sup> 蓬朮<sup>醋煮各一兩</sup>

右為末每服二錢溫酒調下

●熟地黃湯 治大脫血或醉入房月事不行

熟地 澤蘭 白茯苓 人參

五味子<sup>炒</sup> 附子<sup>炮</sup> 禹餘糧<sup>製</sup>

當歸<sup>酒洗</sup>

右為末每服三錢水煎空心服

●桂枝桃仁湯 治經候頓然不行腹中作痛或上攻心脇欲死或因經脉不行漸成積塊臍下如覆杯

桂枝 芍藥 生地<sup>各二錢</sup>

桃仁<sup>七枚</sup> 甘州<sup>一錢</sup>

右姜水煎服

●消遙散 寡婦經閉因鬱悶百端心火無時不起或加之飲食厚味遂成痰火其症乍寒乍熱面赤心煩或時自汗用此湯加煖調治最可

白茯苓 白朮 甘州 白芍

柴胡<sup>各一錢</sup> 歸尾<sup>三錢</sup> 薄荷<sup>青八分</sup> 煨薑<sup>二分</sup>

右水煎臨服入酒少許

●紅花當歸散 主瘀血經行不行腹痛攻刺

赤芍<sup>九兩</sup> 當歸尾 牛膝 甘州

陵菴花 紅花 菘朮<sup>各二兩</sup> 肉桂

白芷<sup>各一兩半</sup> 寄奴<sup>五兩</sup>



右為末每三錢熱酒調下若血久不行  
濃煎紅花酒調下有孕不可服○一方  
有蘓末無菝

●養血通經湯 治婦人虛弱經閉發熱

咳嗽者

當歸酒洗 川芎

香附各一兩

牡丹三錢

柴胡六錢

黃芩酒炒

黃柏酒炒各六錢

知母酒童便炒

牛膝酒洗各八錢

桃仁

紅花二味量

右水煎服○不思飲食加白朮陳皮○

有塊加三棱莪朮

●滋血湯 治血熱經行不通致麻木肌

熱生瘡

馬鞭艸 荆芥各四兩 牡丹一兩 枳殼

赤芍 官桂 當歸 川芎各二兩

右四錢烏梅一箇水二盞煎一盞食煎服

●疏通飲 月事將臨之時適感暴怒肝

氣一發血隨氣升而不下令經閉者宜

此湯

青皮 官桂 木香各錢 當歸

香附 紅花 山查 桃仁各錢

右水煎入酒少許服

●牡丹皮湯 治室女經閉咳嗽發熱

牡丹 當歸各一錢半 芍藥 生地

陳皮 白朮 香附各一錢 柴胡



黃芩各七分 甘草四分

右水煎服

養真湯 婦人經閉不通臍下一塊已

經三載顏色如故百藥無效服此數劑

經行又投數服而塊消矣

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 益母艸

熟地 山茱萸 白茯苓 梔子炒

小茴酒炒 陳皮 香附酒醋米泔童便

右水煎服四核浸炒各等分

六味地黄丸 治婦女經閉發熱或咳

嗽等症

依本方加桃仁紅花

通經丸 婦女經閉半虛半寔者宜

以補兼施也

當歸 川芎 芍藥 生地 大黃

官桂 厚朴 枳殼 枳實 黃芩

蘓木 紅花 烏梅

右入姜棗水煎服

四物湯 加桃仁紅花 主婦人血枯

經閉

牛膝散 治婦人室女血閉不通五心

煩熱

紅花五 牛膝五 當歸尾各一 桃仁五

右為細末每服二錢溫酒下

加減四物湯 治衝任虛損月經不行

肌膚發熱如瘵疾狀



當歸 地黄 芍藥 川芎各二錢  
柴胡 半 黃芩 二錢 半

右水煎服

●四物調經湯 治經脈不行生寒熱腹中結塊冲動痛者此假食生冷傷感而致也 又加減四物湯上号

當歸 川芎 芍藥 柴胡 黃芩

枳殼 各八分 熟地 陳皮 莪朮 各五分

三稜 白芷 茴香 延胡 各五分

青皮 砂仁 紅花 甘州 各四分

白朮 香附 一錢 九拾九味

右入姜棗水煎服

●立行飲 治因食生冷以至經閉者

官桂 三錢 乾姜 木香 玄胡索 各錢

牛膝 蓬朮 歸尾 山查 各三錢 五分

右水煎臨服入酒少許

●活血行經湯 治因坐冷水而得寒氣以至經閉

香附 桃仁 紅花 山查 當歸

厚朴 各二錢 附子 官桂 各一錢

右入生薑水煎服

●補中益氣湯加川芎生地天花粉 主

內傷飲食勞倦損傷脾胃氣弱體倦發

熱腹痛腸鳴飲食減少而不生血者

●十全大補湯 主墮胎及多產百傷血

或俱服汗下尅代之藥以致血衰氣乏



古

不行者

●歸脾湯 因脾胃虧久內耗其血經不通者宜此湯

●六君子湯 加當歸因脾胃虛弱不能生血而月經不通者宜此湯

○補遺

●萬病丸 治月經瘀閉臍腹作痛及產後癥瘕等疾

乾漆 炒烟出青 白為度

牛膝 酒浸焙 各一兩

右為生地黄汁 升破器慢火熬膏丸

桐子大每服二十九空心米飲下

▲癥瘕

●增味四物湯 治婦人血積血瘕

當歸 川芎 芍藥 地黃 三棱

莪木 官桂 乾漆 炒烟及

各等分

右水煎服

●加味逍遙湯 治婦女血塊左腹脇疼

當歸 酒洗 芍藥 酒炒 白朮 土炒 茯苓

柴胡 各一分 莪木 七分 紅花 各三分 三棱 各五分 甘州 七分

右入煨生姜薄荷水煎服

●十味消塊丸 治婦人血食積瘕飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈雜眩運身熱

時作時止

癥瘕



王連 一兩五錢 一半以吳茱萸半兩

同炒去

益智 同炒去

川芎 梔子 三稜 莪朮 醋煮

麥麩 桃仁 各五錢 萊菔子

杏附子 童便 乾乾 山查肉 冬一兩

右為細末蒸餅丸梧子大每服九九姜

湯下

治血痕作痛臍下脹滿或月經不行發

熱體倦

當歸 桂心 芍藥 血竭

蒲黃 延胡 炒各六分

右姜棗水煎服或為末每服二錢空心

酒調下亦可

●桂心丸 治婦人血塊心腹疼痛寒熱

往來不思飲食脉弦數

青皮 乾漆 丁香 枳櫛子

當歸 桂心 赤芍 牡丹 各二分

大黃 薤仁 鱉甲 厚朴

三稜 延胡 各一分

右為細末蜜丸梧子大每服三九沸湯

下

●小三稜煎 治食癥酒癖血瘕氣塊時

發刺痛及積滯不消心腹堅脹逆嘔

穢

三稜 莪朮 芫花 一兩

右同入薑瓶內用米醋五升浸封瓶口



以灰水燉令乾却取出稜木將完花以  
餘醋炒令焦焙乾同為末醋糊圓如棗  
豆大每服十五圓姜湯桑白皮湯任下  
●**聖積丸** 婦人積氣內攻經候不調腹  
脇膨脹刺痛

京三稜 莪朮 各煨 附子 一兩 茴香 炒

川椒子肉 炒 芍藥 乾姜 炮各一兩半

巴戟 炒一兩 當歸 酒洗 艾葉 醋炒各一兩七小半

右為末酒糊圓如梧子大每服三十圓  
空心溫酒下

●**琥珀丸** 治婦人血痕小腹背相引痛

琥珀 芍藥 川烏炮 牛膝 酒浸

黨甲 莪朮 厚朴 當歸 各一兩

木香 桂 麝香 澤蘭 各

右為末酒糊丸梧子大每服二十九溫  
酒下

●**神效丸**

治婦人血塊如盤有孕難服  
峻藥者

香附子 醋炙 桃仁 一兩 海石 二兩 白朮 一兩

右為細末神曲糊丸梧子大每服二三  
丸淡塩湯下

●**通經丸** 治婦人血痕疼痛

桂心 青皮 大黃 酒濕紙 畏煨

川椒 莪朮 乾姜 川烏

當歸 桃仁 各等分

右為細末老米糊和醋丸梧子大每服



二十九空心淡醋湯或温酒下

●三稜丸 治婦人血癥血瘕食積痰滯

莪木 三稜 各二分 青皮 半夏

麥牙 各一分

右為粗末用醋三升焙乾為細末醋糊

丸梧子大每服十九温酒或米飲下

●勝紅丸 治婦人血積腹痛

青皮 莪木 三稜 各二分 陳皮

乾姜 炮 良姜 香附 炒二分

右為細末醋糊丸小豆大每服二十九

姜湯下

●十全大補湯 倍加莪木 婦女積塊

疼痛久不愈諸藥不効者用此最奇

如神

▲崩漏

●奇効四物湯 治肝經虛熱血沸騰崩

久不止潮熱者

當歸 地黃 芍藥 川芎

阿膠 炒艾葉炒黃芩各等分

右入棗水煎服

●涼血地黃湯 治血崩腎水陰虛不能

鎮守包絡相火故血走而崩

黃芩 荊芥 蔓荊子 各一分半 黃柏

知母 葛本 細辛 川芎 各二分

王連 羌活 柴胡 升麻

防風 各二分 生地 當歸 各五分 甘草

山崩



紅花 各少

右水煎服 心熱服

●益胃升陽湯 血脫益氣古聖人法也

先補胃氣以助生發之氣陽生陰長之理也

柴胡 升麻 各五分 甘草 當歸

陳皮 各一錢 人參 神曲 各一錢半

黃芪 三錢 白朮 三錢 黃芩 少

右水煎服 腹痛加芍

●烏金散 治暴下不止及帶下宿冷數

墮胎

敗樛皮 烏樛 乾姜

三味並燒存性各等分爲末每二錢煎

烏梅湯下

●果金散 治婦人血氣虛損經候不調

崩中漏下

鯉皮 乾姜 炮破胡希 黃牛肉腮

櫻櫚皮 亂髮 各一錢 烏賊魚 地黃

當歸 木賊 各半

右剉碎拌勻入在瓷瓶內盛泥固濟候乾以炭火五斤煨令通赤煙盡取於土內埋令冷取出研細每服三錢入麝香少許米飲空心調下

●木香順氣散 理胃氣順三焦

烏藥 木香 香附子 薑黃

砂仁 甘草



右入姜棗水煎服

●必勝散 治崩中下血過多不止

當歸 川芎 芍藥 地黄 各三

香附 二錢 黃芩 王連 人參 各一

右水煎服

●一方 治血崩奇驗

懷生黃 用砂仁陳皮煎 牡丹 六分

石棗 五分 山藥 五分 條芩 八分

蒲黃 炒六分 阿膠 炒八分 香附 醋炒 六分

白芍 酒炒 白朮 六分 王連 姜炒 八分

陳皮 五分 其艸 一分

右入姜棗水煎服

●一方 陳白芨經驗血崩方

益母草 半錢 沙參 八分 川芎 一錢 白芍 一錢

熟地 八分 香附 醋炒 一錢 阿膠 炒 一錢

蒲黃 炒八分 陳皮 二錢 白朮 一錢

其艸 少許

右水煎服

●溫有飲 治婦人經脈不任或如豆汁

五色相雜面色痿黃臍腹刺痛寒熱

任來崩不止

當歸 芍藥 地黄 川芎 王連

黃芩 黃柏 山梔 各一錢

右水煎服

●和經湯 凡婦人四十五六經水斷絕五

十二三復來或淋瀝或成片條漏下不



止此乃陰陽相返氣血妄行先服此藥

一二劑繼進調經大補湯

當歸 川芎 白芍炒 熟地 白朮

白茯苓 白芷 香附 條芩

酸棗仁炒 阿膠炒 蒲黃炒

右入生薑水煎服

●益母湯 治婦人血崩日久屬虛寒者

當歸 川芎 芍藥酒炒 熟地黃

條芩 陳皮 香附子醋炒 阿膠各一

益母炒 白朮各一 玄參

蒲黃炒各八分 芍藥四分

右水煎服

●小蘗湯 治血虛生熱或感暑氣而

血崩脈沉緩數

小蘗苦葉 白朮一 生地黃二

右水煎服

●清榮湯 治崩血久不止脈洪弦

黃芩三 芍藥一 芩艸少許

右水煎服

●芎歸膠艾湯 婦人有漏下者有半產

後因續下血都不絕者有妊娠下血者

主之

川芎 阿膠 芩艸各二 熟艾

當歸各三 芍藥四 熟地黃

右木酒煎服一方加乾姜二兩胡氏治

婦人胎動無乾姜○秘藏方加丁香去



其冊名丁香膠艾湯治崩漏不止臍下  
如水白帶白滑之物多聞如屋漏水下  
時有鮮血右尺脈時微洪者益心氣不  
足勞役及飲食不節所得

●升陽除濕湯 治女子漏下惡血月事  
不調或暴崩不止多下水漿之物皆攝  
養失宜脾胃虛而心胞乘之也

當歸 酒洗 各五錢 蔓荊子 七分 防風

炙甘草 升麻 藁本 各一錢 柴胡

羌活 蒼朮 黃芪 各一錢

右水煎服

●柴胡芍藥湯 治婦人經水漏下不止

其色鮮紅時值冬月先因勞役脾胃虛

弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂不思

飲食四肢困倦大便時泄後復因心氣

不足經水暴下不止微覺氣下行氣逆

氣短懶於語言此藥主之

柴胡 二分 炙甘草 生芩 各三分 白朮

蒼朮 當歸 芍藥 各一錢 黃芪 一錢

陳皮 熟地 各五分

右水煎空心溫服

●羅氏備金散 治婦人血崩不止

香附 四兩 當歸 一兩 二靈脂 兩

右空心酒調服五錢立効

●丁方治婦人崩漏因氣所使而下者

黃芪 人參 川芎 蒲黃



地榆各五分 白朮 當歸 白芍酒炒  
熟地 香附炒黑各一錢 升麻三分  
右水煎服

●如神飲 治血崩來如湧泉面黃肌瘦

蒲黃 艾葉 升麻 黃芩  
地榆各八分 歸身 柴胡 血見愁  
王連 山梔各一分 紫荊皮一分

右入灯心三十莖水煎服

斷泉神秘丸 治一切遠年近日血崩

等症并治婦天行當住行之不止

牡蠣 山梔 二連各一分 陳棕煨灰  
槐花各四錢 側柏各八錢 人參  
黃芪各八錢 蒼耳各二錢

右為末搗小蘗汁藕汁以二汁為丸每服一錢五分空心塩湯送下

●秘方 治血崩初起一服立効

當歸 蘄艾各一兩 升麻四錢  
荆芥穗三兩 炒黑

右為末每服三錢空心童便調下即止

又方 治崩淋經年不住手足俱有血絲露去血如流者

白芷一兩 百州霜 五靈脂  
荆芥穗各八錢 赤石脂四兩 王連四兩 熬汁

右為末以王連汁為丸如芥豈大每一

錢空心白滾湯送下

●膠連飲 治一切崩淋神効



黃連 當歸 阿膠 各二 赤芍

芡實 澤瀉 車前子 牛膝

山藥 各七 川芎 熟地 各一

右水煎臨服加入童便一小鐘

● 樗白湯 治崩漏不止

樗白皮 即臭椿根皮 二錢 益血 枯苓 涼血

當歸頭 止血 各二錢半 熟地 補血

地榆 收血 伏龍肝 川芎 各一

白芍 酒炒 生地 七 艾葉 炒六

右水煎臨服入醋少許

● 復元養榮湯 治血崩惡露去多心

神恍惚虛暈者

人參 一錢 酸棗 黃芪 白芍 酒

當歸 地榆 白朮 各一 荊芥 八分

遠志 五分 甘草 三分

右入棗水煎

● 柴胡調經湯 治經水不止其色鮮紅

項筋急腦痛脊骨強痛不安

炙甘草 當歸 葛根 各三 獨活

黃芩 升麻 各五 柴胡 七 羌活

蒼朮 各一 紅花 少許

右水煎空心服取微汗立愈

● 栝子仁湯 治婦人憂思過度勞傷心

經不能藏血遂致崩中下血不止

鹿茸 火去毛酒蒸焙 栝子仁 炒

川芎 當歸 各一 香附子 三兩



甘草 炙半 川續斷 一及半 阿膠 小豆

茯神 各兩

右入姜五片水煎服

●艾煎圓 治崩傷淋瀝不已小腹滿痛

常服益母草調經

食茱萸 湯洗 當歸 各七 熟地黄

白芍 各一兩半 川芎 石菖蒲 炒

人參 各一兩 熟艾 四兩

右為末酒糊圓梧子大每服五六九白

湯下

●補宮圓 治婦人諸虛不足久不妊娠

骨熱形羸崩中帶下並宜服之

鹿角霜 茯苓 白芷 白朮

烏賊魚骨 白薇 白芍 牡蠣 煨

山藥 各等分

右為末麩糊圓如桐子每服五圓米飲

空心送下

●補中益氣湯 治崩漏面色痿黃或時

赤覺腰腹臍下疼痛四肢困倦煩熱不

安

依本方加防風黃柏 炒黑 芍藥兼服

歸歸湯

●十全大補湯 治婦女經行過多血氣

虛耗胃氣不足故經血妄行

依本方或去芪加香附子

△補遺方



重  
丁方 治婦人血崩氣血兩虛而兼熱者

當歸 人參 黃芪 阿膠 荊芥

黃芩 酒炒 艾葉 醋炒 梔子 炒 黑地榆 各一

蒲黃 王連 酒炒 白朮 生地 各一

川芎 七分 白芍 酒炒 防風 各八分 甘草 三分

右入姜棗水煎服

五灰散 治血不止成血崩

蓮蓬殼 黃絹 血餘 百州霜

棕皮

右各燒灰加山梔炒黑蒲黃炒黑血竭  
共為細末調入煎藥服之或煉蜜為丸  
每服五十九清米湯送下

方  
崩漏有虛有熱虛則下溜熱則流通急  
則治其標用白芷湯調下百州霜服或  
甚者棕櫚灰後以四物湯加乾姜調補  
之蓋因寒用乾姜因熱用黃芩因勞用  
參芪

一方 又治血崩

陳槐花 一兩 百州霜

右為末每服一二錢溫酒調下

獨行散 治血崩

五靈脂 炒盡烟

右為末每服一錢溫酒調下又一方半

生半炒

固經丸 治婦人經水行過多不止



樗根皮七錢 白芍炒一兩 黃芩炒一兩

龜板炙一兩 黃柏炒三錢 香附童便浸二錢

右為末酒糊為丸每服十九白湯下

●獨聖散 治肝經有風血崩

防風

右為末每服二錢空心食前酒煮白麵

清飲調下極妙

●神應散 治血虛內熱血不歸源而崩

桂心

右燒存性為末每服一二錢米飲調下

●荆芥散 治風熱血崩

荆芥燈火燒焦

右為末每服三錢童便調下

●有葉散 治元氣虛弱崩中漏血年久

不愈亦治白帶

栝葉炒續斷酒 川芎 當歸 生地

鱉甲炙龜甲炙 烏餘糧各一兩

阿膠炙赤石脂 煨艾葉炒 牡蠣煨

地榆 鹿茸炙各五錢

右為末每服二錢粥飲調下

●地黃丸 治足三陰虧損經行數日不

止或兼帶下無子

熟地 山茱萸 蕪荑仁各一兩

乾姜三錢 白芍微炒 代赭石各一兩

白僵蚕炒厚朴 姜製各三錢

右為末蜜丸桐子大每服五七丸空心



五  
盈酒下

▲帶下

●加棧入物湯 治婦人赤白帶下屬氣  
血虛者

當歸 川芎 白芍酒炒 生地  
人參 白朮 茯苓 山藥  
杜仲酒炒 香附炒各 芎藭等分  
烏梅 一箇 其州減半

右入姜棗水煎服○肥人加半夏○瘦  
人加黃柏○飽悶去參加砂仁○腹痛  
加小茴延胡去參○冬加煨乾姜以許  
●五積散 治帶下屬虛寒者

蒼朮三分 桔梗一分 麻黃二分

枳殼炒 陳皮名八分 厚朴 乾姜名六分

當歸 川芎 芍藥 白芷 肉桂  
半夏 茯苓各四分 其州三分

右入姜水煎服○白帶下加香附茴香

○赤帶下加山梔黃柏去桂乾姜  
●升陽除濕湯 治赤白帶下屬血虛脾

弱濕痰滲下者升提之劑

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 地黃 白朮  
茯苓 蒼朮 陳皮 半夏  
香附米炒 砂仁 乾姜炒  
黃柏酒炒 知母酒炒 柴胡酒炒  
升麻酒炒 其州炙

右入生姜棗水煎服

帶



●加減六合湯 治婦人上有痰火下有

白帶下腹痛

當歸酒洗 白木

椿根皮酒炒

熟地酒洗焙

白芍酒炒 橘紅鹽水洗

甘草各一錢

知母酒炒 川芎各八分

茯苓灸四

黃柏酒炒 貝母各七分

右入生姜水煎服若上痰火盛加枯芩

七分

●附桂湯 治大寒白帶腥臭多悲不樂

附子三錢 桂一錢 黃芪半 人參七 黃柏分

知母 升麻 甘草各五分

右水煎服

●十六味保元湯 治赤白帶下白淫屬

虛者

貫仲去根 人參 巴戟各二錢

杜仲小苗鹽煎湯 黃芪 山藥

當歸 茯苓 獨活 蓮蕊

骨碎補各一錢 黃柏酒炒 升麻各七分

龍眼肉三枚 甘草生 石斛七分

右水煎空心服

●升陽燥濕湯 治白帶下陰戶中痛空

心而急痛身黃皮緩身重如山陰中如

水

黃芩 陳皮各五分 防風 良薑

乾姜 郁李仁 甘草各一錢

柴胡一錢 白葵花七朵



三九

右水煎熱服

●四仙散 治婦人白帶屬寒濕者宜之

蒼朮一兩 白芷 川芎

大附子酒浸 麩包煨

右為末每服五分空心好酒調下

●芩朮樗皮丸 治瘦人帶下多熱

黃芩 黃朮 硝石 川芎 海石

青黛 當歸 芍藥 樗白皮各等分

右為末醋糊丸服

●側柏樗皮丸 治白帶因七情所傷而

脉數者

樗白皮二兩 側柏葉酒蒸 黃柏

玉連各五 香附子 白朮

芍藥各一兩 白芷三錢 燒存性

右為末粥丸米飲下

●琥珀硃砂丸 治室女帶下

琥珀 木香 沒藥各四錢 乳香一錢

當歸四錢 鹿射香 硃砂各二分

右為末糊丸白湯下

●芩朮樗皮丸 治孕婦帶下

黃芩 白朮各三錢 樗白皮 芍藥

山茱萸各二錢半 白芷 玉連各二錢

黃朮一錢半

石為末酒糊丸溫酒下

●收帶六合丸 治赤白帶下肚腹疼痛

此藥能和脾胃燥中宮之濕提下陷之



氣化痰清火  
白木米泔 蒼木米泔 茯苓 當歸酒洗

白芍酒洗 陳皮鹽水洗去 熟地黃

椿根白皮洗 半夏各一兩 甘州灸各

防風九錢 升麻八錢 牡丹 黃柏酒炒各二兩

右為末酒糊丸如梧子大每服二十九  
空心米湯下鹽湯亦可

益榮收帶丸 治崩後氣下陷或白帶

小腹脹滿痛甚等症  
當歸酒洗 白芍酒炒 蒼木米泔製 茯苓

黃柏酒炒 椿根皮結各一兩 白木二兩

半夏八錢 防風 青皮醋炒 升麻各五錢

木香 甘州各四錢 川芎鹽水浸

香附子鹽水浸 炒六錢

右為末酒打糊為丸如梧子大每服二十九  
空心鹽湯米湯白湯任下

清氣養榮湯 治婦人氣血不調赤白帶下四支倦怠五心煩熱

當歸 生地 香附子 地榆各一錢五分

茯苓 澤瀉 牡丹 王連  
山茱萸各八分

右入灯心三十莖水煎服  
補丸湯 治婦人久因經水不調氣血虛弱赤白帶下神思倦怠

人參 白朮 當歸 茯苓  
川芎各一錢 白芍 生地黃 澤瀉



三

黃柏各八分 伏龍肝 一錢 苧艸 三分

右入棗水煎服

●保无湯 治赤白帶下久久不愈氣血

虧損

石斛 巴戟 人參 茯苓各一錢

黃柏 柴胡 苧艸 地骨皮各七分

王連一錢二分 荆芥 知母 升麻各六分

石入棗水煎服

●大靈丹 治婦人一切赤白帶下因此

久不孕音諸虛百損神効

當歸 人參各四兩 阿膠三兩 川芎

牡蠣 天麻各一兩 生地 丹皮

續斷 何首烏九蒸九晒 山梔 炒黑各二兩

耳艸八錢

右為末蜜丸每服三錢空心白滾湯送

下

●秘方 治赤白帶下

赤石脂一兩 川芎一兩 紫葢皮

赤茯苓各二兩

右為末醋打米粉糊為丸每服二錢空

心酒下

●當歸煎丸 治赤白帶下腹痛不食羸

瘦

當歸 赤芍 蛎礪 地黃 白芍

阿膠 續斷酒浸各一及 地榆 五分

右為末醋糊丸空心米飲下



主

婦寶歸身丸 治赤白帶下子宮虛冷

四物湯加白芷 柴胡 胡王連

牡蠣各一 香附子半斤醋浸一宿 直焙乾

右為末醋糊丸如梧子大每服五十九

空心醋湯下

疏實四物湯 治婦人室女赤白帶下

神方

當歸 川芎 芍藥 地黃

續疏實 各等分

右水煎服

玉仙散 治赤白帶下簡而易效捷

乾姜炒一兩 白芍酒炒一兩 香附炒一兩

甘草五錢

右為末每服三錢空心温酒送下

秘方 治婦人帶下

雞冠花白帶者用白花赤帶下者用赤花

右為末每服二錢空心酒調下

清心蓮子飲 治婦女赤白帶下五心

煩熱

石蓮肉 人參各二錢 黃芪蜜炙二錢

麥門 地骨皮 車前子

黃芩各一錢半 赤茯苓二錢 甘草二分

右入灯心五根 薑三片水煎服

五苓散合四物湯帶下通用

胃風湯 方見泄瀉 帶下屬虛寒者

獨活寄生湯 方見腰痛 合平胃散



加附子茴香 治帶下作腰痛

加珠珀道散 婦女帶下小腹重墜水

道滋痛者宜之

安金湯 治白帶下久不愈臭穢不可忍

肌體羸瘦

官桂 桂心 木香 川芎 白朮

人參 香薷根 黃芩 酒炒

王連 酒炒 當歸 各一 甘草 少許

右水煎服

白芷散 治下元虛弱赤白帶下

白芷 一 海螵蛸 二枚 胎髮 一團

右為末每服二錢溫酒調下

地黃丸 方血崩門

栢葉散 治元氣虛弱白帶 方見血崩門

苦練丸 治赤白帶下最妙

苦練 碎酒 茴香 炒 當歸 各等分

右為細末酒糊為丸如梧子大每服二十九空心溫酒送下

延胡苦練湯 治臍下冷撮痛陰冷大

寒白帶下

黃栢 一分 延胡 苦練子 各二分 附子 炮

肉桂 各三分 炙甘草 五分 熟地 錢一

右水煎溫服

人參黃芪湯 治婦人氣血俱虛久患

白帶瘦弱無力腰腿酸身熱面黃飲食

無味小便淋瀝服此全効



當歸 茯苓 各一  
白朮 芍藥  
地骨皮 人參 川芎 各七  
黃芪  
炙甘草 熟地黃 各五  
分  
石入棗水煎服和勻鹿角霜末五匙  
服

●加味益氣湯 治婦人赤白帶下

依本方加黃栢知母香附半夏草薢  
川練子

●歸脾湯 治赤白帶下加減用之

●固經丸 治濕熱帶下

黃栢 酒炒 香附 炒各一兩 山梔 炒黑  
敗龜 酒炙各二兩 白朮 白芍 炒各七  
錢半  
山茱萸 酒蒸 椿根皮 酒炒 苦參 各五  
錢

貝母 乾姜 炒各一錢

存為棗酒糊丸桐子大每服八九滾執  
水下

●固真丸 治白帶久不止臍腹冷痛陰

中亦痛

黃栢 酒洗 白芍 各五  
柴胡

白石脂 火煨 研末 當歸 酒洗

白龍骨 酒煮水飛日乾 乾姜 炮  
各未各錢

共為末麵糊丸如雞頭仁太空心白湯  
下以早飯屢之忌生冷硬物酒麵等

●東垣云葵花白者治白帶赤者治赤帶  
用之効

●二白丸 治白帶如神



石灰一兩 白茯苓二兩

右為末水丸每服二十九空心白水下

一法 治婦人白帶方

金櫻子三兩糯米半合白扁豆花二兩

黃荆子二兩蓮子二兩白麵二兩

右為末每服五錢入蜜三匙沸湯調下

半月即愈

冬法 治赤白帶下

槐皮一大塊中穿七眼先用麵圈圍

肚臍圍上槐皮艾灸肚內熱響去艾

即効

一法 治婦人赤白帶下

黃荆子炒

右為末每服二錢空心温酒調下

一法 治赤白帶下經年下好者

蛇麻子一兩 枯礬二錢

右為末煉蜜為丸如彈子大用絲綿包

裹放入陰戶內不過二三丸神効善安

胎暖子宮

一法 治婦人帶下腸有敗膿淋露不已腥穢

殊甚至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿

所致幸無已期須以敗膿乃愈

白芷一兩 單葉紅蜀葵根二兩

白芍 枯白礬各半兩

右四品為末以蠟丸梧子大空心及

飯前米飲下十九或十五丸候膿盡仍



服十全大補湯補之

止帶丸 治白帶下有奇効

當歸 酒洗 川芎 白朮 人參

山藥 杜仲 姜汁酒炒 香附 醋炒 青黛 煎

牡蠣 破胡紙 酒炒 續斷

椿根皮 此藥大治白帶酒炒各等分

右為細末煉蜜為丸桐子大每服一餘

丸空心清米湯吞下○腹痛加延胡茴

香去人參○飽悶加砂仁去人參○夏

月加栢○冬加煨乾姜少許○肥人加

半夏○瘦人加酒炒黃栢

香木丸 治白帶臍腹脹痛

香附 醋浸炙 陳皮 當歸酒洗 川芎

白芍 酒熟地 姜汁浸焙 蒼朮 米泔浸

右為細末酒糊為丸如桐子大每服二

一丸空心温酒送下

丁方 治白帶下如神

香附 八兩酒醋鹽湯童便各浸二兩浸三日炒 蒼朮 二兩

椿根皮 蜜水炒 砂仁 炒二兩 牡蠣 煨二兩

右為末糊丸桐子大每服五七丸空心

酒下

丁法 治婦人赤白帶下

茸松 川椒 朝腦

右等分為末煉蜜為丸櫻桃大送入陰

戶內立効

虛勞

虛



●清肺飲子 治婦女虛勞發熱咳嗽吐血先服此清熱止血後服逍遙散加減調理

當歸 川芎 黃芩 貝母  
知母蜜炒 阿膠 蒲黃炒 陳皮各八分  
芍藥酒炒 生地 天門 麥門  
前胡各一錢 薄荷六分 枳殼五分  
藕節一片 甘草炙三分

右水煎食後溫服

●逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏眩心忪煩赤口燥咽乾發熱盜汗戒食嗜卧及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱

陰虛榮衛不和咳嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸此脾虛肝實血虧所致也

甘草半兩 芍藥 當歸 茯苓  
白朮 芫胡各一兩

每二錢水一盞煨薑一塊薄荷少許煎七分熱服○五心煩熱加麥門地骨皮

●雙補寧嗽湯 治婦人血虛脾弱痰嗽喘熱

當歸酒洗 白芍酒炒 白朮炒 茯苓各二錢  
陳皮 前胡 桑白皮各一錢 知母  
貝母各二錢 梔子二錢 蘇子一錢  
杏仁十四箇 桔梗七分 甘草五分

右入生姜水煎服



●海藏紫菀散 治喉中有血虛勞肺痿

人參 紫菀 知母炒 貝母

桔梗炒 茯苓 阿膠炒各一兩 五味子

甘草灸各三分

右入姜水煎服

●補肺湯 治勞嗽五藏虧損肺熱發熱

盜汗自汗唾痰嗽喘

桑白皮炒 熟地黄各一錢 人參

紫菀 黃芪炒 五味子炒各五分

右水煎入蜜少許食後服

●茯苓補心湯 治婦女經水不調吐血

咳嗽發熱口乾喘急胸膈痞悶嘔吐痰

水

四物湯 參朮飲 合成一劑姜煎

水煎服

●劫勞散 治勞嗽發熱盜汗體瘦唾中

有紅或成肺痿

黃芪炒 人參 白茯苓 半夏

當歸 白芍酒炒 熟地黄 阿膠

五味子 甘草炒

右入姜棗水煎服

●人參五味湯 治諸虛百損氣血勞傷

涎喘欬膿或嗽咯血寒熱往來盜汗羸

瘦困乏一切虛損

黃芪 人參 白朮 茯苓 陳皮

當歸 熟地 五味子 柴胡



前胡 地骨皮 桑白皮 桔梗  
枳殼 耳艸

右入生姜水煎服○煩渴加烏梅青蒿

○咳膿加知母阿膠

滋陰至寶湯 治婦人諸虛百損五勞

七傷經脈不調肢體羸瘦此藥專調經

水滋血脈補虛勞扶元氣健脾胃養心

肺潤咽喉清頭目定心慌安神魄退潮

熱除骨蒸止喘嗽化痰涎收盜汗止泄

瀉開鬱氣利胸膈療腹痛解煩渴散寒

熱祛體疼大有奇効不可盡述

當歸 白芍 酒炒 扶苓 白朮 一錢

陳皮 知母 貝母 香附 八分

柴胡 酒炒 三分 薄芎 三分 地骨皮 八分

耳艸 三分 麥門冬 八分

右煨薑三片水煎服

●滋陰地黃丸 治婦人經水不調或不

通虛勞吐血衄血咳血便血發熱咳嗽

盜汗痰喘心慌一切虛損瘦怯之病

熟地 四兩 山藥 一兩 茯苓 牡丹

澤瀉 各一兩 天門冬 生地 酒洗 麥門

知母 酒炒 貝母 當歸 酒洗 山茱萸 酒

香附 童便浸炒 各二兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十

丸空心塩湯下痰唾淡姜湯下

●十全大補湯 加柴胡地骨治虛勞骨



蒸發熱○嗽加五味子○痰加瓜隻半  
夏○汗加芎藭

●補中益氣湯

●歸脾湯

▲出痘

涼血地黃湯 女人出痘其輕重固已  
一槩而論然十四歲之後天癸通者則  
又不同蓋天癸既至陰常不足痘瘡以  
氣為主血為附氣以充之血以濡之一  
有不足則變惡易生此又不可不察也  
且如發熱之初正遇經水如期而來此  
熱隨血解瘡自發出不必施治若遇四  
日而不止者則熱入血室血必妄行為

內動中虛之症矣宜此湯

當歸 川芎 白芍 生地黃

白朮 升麻 王連 人參

山梔 玄參 其艸

右水煎服

●涼血解毒湯 非經行之時於發熱而  
經忽至此毒火內熾逼血妄行之故瘡  
必多毒必盛急宜用此湯

當歸 白芷 升麻 紫艸 赤芍

桔梗 連翹 燈艸

右水煎服

●當歸養心湯 起發貫繫經水適來忽  
口瘡而不能言者乃血入少陰不能

出痘



榮於口也宜之

人參 當歸 生地 麥門

升麻 茸艸

右入灯心水煎服

八物湯 正當起發貫榮之時適遇經行三日不止者瘡必應起發而不起發應貫榮而不貫榮頂平形塌或灰白色或黑陷者宜此湯

依本方去地黃加黃耆木香附子

瀉肝散 經水不調之時適逢出痘身發壯熱神思昏沉言語狂妄如見鬼神尋衣撮空此行經之後血室空虛天行

邪熱乘虛而入宜此湯

羌活 當歸 梔子 龍膽

川芎 防風 大黃

右水煎服

十全大補湯 正值崩漏不止氣血俱虛之候適逢出痘此必能勝任宜大補氣血

或八物湯加木香官桂黃芪

歸脾湯 向來經閉不通血海乾涸逢出痘毒氣拂鬱於衝任之間宜此湯或逍遙散主之

▲ 雜病

桂香散 治婦人脾血久冷時作腹痛泄瀉



草豆蔻炒 甘草 白朮 良姜炒  
 砂仁各一兩 棗肉 厚朴 生姜各一兩  
 青皮 訶子各半兩 肉桂一分  
 右為末每服二錢入塩少許空心沸湯  
 點服

●加味四七湯 治婦人小便不順甚者  
 陰戶疼痛

半夏一兩 厚朴 赤茯苓各五  
 紫菀二分 甘草 香附子五分  
 右水煎加琥珀末一錢調服

●菖蒲散 治婦人月水溢陰腫痛  
 菖蒲 當歸各一兩 秦艽二分 吳茱  
 右入葱白水煎服

●加添歸脾湯 治婦人素鬱悶陰內痛  
 痒不時出水飲食少思肢體倦怠  
 依本方加丹皮梔子芍藥柴胡生草

●柴胡抑肝湯 治寡居獨陰無陽慾心  
 崩而多不遂是以惡寒發熱全類癆者

蒼朮 香附 梔子 地骨皮各一錢  
 赤芍 丹皮各一錢 柴胡一錢  
 青皮二分 川芎七分 神曲八分  
 生地黄 連翹各五分  
 右水煎服

●茯神散 治婦人與鬼交通其有言語  
 雜亂  
 茯神一錢 茯苓 人參 菖蒲各一錢



赤小豆 五分

右水煎服○醫賡赤小豆作赤芍

●小柴胡湯 治傷寒發熱經水過來晝

則明白夜則譫語此熱入血室也

依本方加生地

●清熱涼血飲 治熱入血室往來潮熱

如瘧之狀而無定期或一日兩三發者

麥門 丹皮 赤茯苓 各一錢

連翹 秦艽 生地 當歸 二分

川芎 各一錢 黃芩 赤芍 各一錢

右入灯心三十莖水煎服

●小柴胡湯 婦人身顫振口妄言諸藥

不効以為癘瘵所致詢其故蓋為素嫌

其夫而含怒久矣先用此湯稍可也又

用加味歸脾湯而愈

●人參丸 治月經不利而後化為水流

走四肢悉皆腫滿此名血分

人參 當歸 大黃 蒸熟切焙 桂心

麩麥 赤芍 白茯苓 各三兩 葶藶 炒

右為末煉蜜丸桐子大每服十五丸空

心米飲下

●消腫丸 治血腫症

人參 當歸 大黃 九蒸過各一兩 桂心

麩麥 蘇木 茯苓 葶藶

木香 各一兩 木通 五兩

右為末以水通煎湯法為丸每服二錢



空心米飲送下

●消腫飲 治症同前

五靈脂 肉桂 川芎 當歸 各二錢

牛膝 青皮 各一錢 玄胡索

黑牽牛 各二錢

右入生姜水煎服

●葶藶丸 治先小便利後至身面浮

腫經水不通此水化為血名水分

甜葶藶 炒別研 續隨仁 五錢

乾葶末 一兩

右用棗肉丸梧子大每服七丸煎扁竹

湯一如大便利減隨子葶藶各一錢加

白木半兩

●小議經湯 治經水失道流入四肢浮

腫 方見產後四肢浮腫

●祛風活血湯 血風者經水逆上攻於

腦間頭目悶迷不省人事甚而至滿面

滿頭皆成赤斑者此因經水適臨感冒

風邪所致蓋風之為氣善行而數變其

勢易上而難下其經水為風所激故致

倒流而上行也宜此湯

防風 當歸 川芎 各一錢 荆芥

紅花 生地 桃仁 青皮

香附 天麻 各一分

右水煎臨服入酒少許

又方 治症同前



蒼耳艸陰乾 小薊陰乾

右為末每服二錢酒調下

烏賊魚骨散 婦人血崩而心痛甚名殺血心痛由脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦用此藥而可也

烏賊魚骨炒

右為末醋湯調下失笑散亦効

芎歸湯 前症心血虛弱者宜此

每交接出血作痛此肝火動脾而不能攝血用補中益氣湯濟生歸脾湯而愈若出血過多而見他症但用此二方調補肝脾

千金 治交接出血方

桂心 伏龍肝

右為末酒服錢許

一方 千金療小戶瘰癧方

甘艸 生姜 芍藥 四分

桂心 三分

右以酒二升煎三四沸服

又方 小麥甘艸等分煎湯洗甚効



其味... 全... 朱... 心... 氣... 血... 養... 血... 湯... 肥... 盛... 婦... 人... 痰... 多... 軀... 脂... 滿... 溢... 閉... 塞... 子... 宮... 無... 子... 者... 用... 之... 消... 痰... 養... 血... 氣...

▲求嗣

●清痰養血湯 肥盛婦人痰多軀脂滿溢閉塞子宮無子者用之消痰養血氣

四物湯加白朮 茯苓 陳皮 枳實 半夏 砂仁 香附 甘草 竹瀝 右水煎服

●清燥養血湯 瘦人火多子宮乾燥無血用之清熱補血則求子

四物湯加入參 茯苓 黃芩 山梔 香附 苁艸 陳皮用生地黃 右水煎服

求嗣



●秘傳大補湯 此藥能調和氣血消血  
塊清上焦溫下焦求嗣之善劑虛寒之  
人最可也

當歸 地黃 莪朮 黃芪 芍藥  
人參 白朮 茴香 陳皮 牡丹  
延胡 茯苓各一分 木通 川芎  
吳茱 桂心各三分 甘艸二分  
附子一分

右水煎服

●六味地黃丸 治婦人久無孕育者男  
子無嗣必用之

依本方加香附 一刃童便炒

●長春廣嗣丹 男婦難嗣者此方主之

此則兼五臟六腑而調之最神驗之  
也 二倍五味

人參 天門 當歸酒洗 澤瀉  
山茱萸 石昌炒 赤石脂 五味子  
覆盆子 茯苓 車前子 木香  
栢子仁 各一兩 山藥 姜汁炒 巴戟  
川椒 去目與梗及閉口者炒出汁 牛膝酒洗 生地  
熟地 地骨皮 杜仲 各二兩 遠志  
肉蓯蓉酒洗 枸杞子 各壹兩 兔絲子酒洗 四兩  
右煉蜜作丸梧子大每服九九

▲驗胎

●驗胎散 經脈不行已經三月者

川芎一錢

驗胎



右為未每服艾葉煎湯調下覺腹內微動則有胎也如服後一日不動非胎必是經滯○婁氏綱目加當歸七分

●艾醋湯 如過月難明有無如月數未足難明

用好醋炆艾服半莖後腹中番大痛是有孕不為痛定無

▲預防墮胎

●八珍湯 主衝任不充氣血不足榮養其胎宜預服補氣血以防其墜墮此氣血兩補劑

●安樂湯 治胎氣不固時常小產宜預服此以固胎元此能清熱安血養胃故

也

四物湯加香附 阿膠 白朮

黃芩 砂仁 糯米 桑寄生

右水煎服

●芎歸補中湯 治婦人懷孕血氣虛弱不能榮養致數月而墮名半產

黃芪 人參 白朮 當歸 川芎

白芍 酒炒 乾姜 煨 杜仲 阿膠

五味子 木香 甘草

右水煎服

●千金保胎丸 凡女人受胎經三月而胎墮者雖氣血不足乃中衝脈有傷中衝脈即陽明胃脈供應胎孕至此特必

防胎



須節飲食絕慾戒怒庶免小產之患服此可以保全

當歸酒洗 阿膠 條芩炒 益母艸

續斷酒洗 香附酒醋搗末童便各浸三日炒以上各

二兩 川芎 艾葉醋煮 陳皮各一兩

砂仁炒 五錢 杜仲姜汁酒炒 白朮土炒

熟地姜汁炒各四兩

右為細末煮棗肉為丸梧子大每服二

十九空心米湯任下

芎歸補中湯 治婦人血熱性急常憎

小產服此保全

當歸一錢半 川芎一錢半 茯苓八分

黃氏 鐵黃芩酒炒 陳皮五分 白朮土炒

續斷酒浸 桑寄生酒浸 阿膠炒

香附魚便長 砂仁炒二分 甘艸五分

右入生姜水煎服

●固胎飲 胎氣不固常欲小產者

當歸 芍藥 川芎 熟地 阿膠各

香附 白朮 黃芩 砂仁各八分

糯米百粒

右水煎服

●千金保嬰湯 氣血不足每至三四月

隨胎者預服之

人參 黃氏 當歸 甘艸 黃芩

杜仲 桑寄生 續斷 芍藥

砂仁 梗米



手  
右水煎服

●白朮散 治婦人產後宿有風冷胎痿不長或失於將理動傷胎氣多致損墮常服壯氣益血保護胎臟

牡礪煨五 白朮 川芎各一兩  
蜀椒去目炒七及半

右為末每服一久空心溫酒調下

▲安胎

●金匱當歸散 安胎養血清熱孕婦時常宜服

當歸 川芎 芍藥 白朮  
條芩等分

口為細末每服二錢溫酒或湯調服

酒糊為丸名之安胎丸瘦人血少有熱胎動不安素慣半產者皆可服之以清其源而後無患○煉蜜為丸名當歸丸胎成後理肝健脾胎安子穩

●安胎散 素有熱者用之養血健脾清熱也

當歸 白朮各三錢 川芎一錢半 玉連炒  
砂仁各八分 甘州三分 生地 益母州  
條芩 蘓梗 香附童便炒各一錢  
右入生姜水煎服

●八珍湯 治產後體弱氣血不和發諸症者

當歸 川芎 茯苓 生地 白朮

安胎



人參各一錢 甘草五分 芍藥八分

右入棗二枚水煎服

●達生散 胎五六箇月後有諸疾者用

此方加減調治有神驗

大腹皮 錢一分 人參 紫蘓 陳皮 各五分

芍藥 白朮 當歸 各一錢 炙甘草 二分

右入黃楊腦七箇葱五葉水煎服或加

砂仁枳殼○春加川芎○夏加黃芩○

性急加黃連○有熱加黃芩○食積加

山查○食後易飢倍黃楊腦○氣虛加

參朮○氣實倍香附陳皮○血虛加歸

下○形實倍蘓○腹痛加木香肉桂○

有痰加半夏○秋加澤瀉○冬加砂仁

○胎動加金銀苧根○氣上加紫蘇

黃

●枳殼滑胎散 治胎氣不安能令滑胎

易產

枳殼二兩 甘草炒一兩

右為末空心沸湯點服日三服凡孕六

七月宜服之若妊婦稍弱者單服恐胎

氣腹痛王隱君加當歸 木香

●一方易產兼治諸疾下氣寬膈

枳殼五兩 甘草一兩 香附三兩

右為末每服二錢白湯調服

●安胎散 治胎氣不安或腹微痛或腰

間作痛或飲食不美或至五六箇月常



服數貼甚好

白朮 當歸 芍藥 熟地 各一錢

人參 川芎 黃芩 陳皮 各五分

甘草 砂仁 紫蘇 各三分

右入姜水煎服

●安胎丸 養胃清熱安胎之聖藥也

白朮 條芩 神麴 炒等分

右為細末粥丸每服二十九清米湯下

●求胎丸 至七八箇月內服之

黃芩 炒夏一兩春秋 白朮 二兩不見火

茯苓 七錢半冬五錢 陳皮 三兩不見火

右為末粥丸梧子大每服十九白湯下

○ 辭月用以養胎方

當歸 川芎 黃芩 陳皮 白朮

香附 各一錢 白芷 二分 甘草 二分

右水煎調益元散一錢服虛者加人參

七分

●保氣散 此藥安胎進食易產

紫蘇 大腹 枳殼 桔梗 砂仁

香附 甘草 各等分

右為末白湯下亦水煎服○一方有白

朮黃芩

●護胎散 治娠姪胎氣不安嘔吐不止

腰膝酸痛或有紅來

白朮 人參 黃芩 各二錢

艾葉 砂仁 各一錢五分

阿膠



右入姜棗水煎服

惡阻

參橘飲 治妊娠惡阻嘔吐喜酸惡食

人參 陳皮 厚朴 藿香

白木 各一錢 淡竹茹 五分

右入生姜水煎服

保生湯 治婦人經後不調或不行身

體無病精神如故惡聞食氣或嗜酸物

或時吐清水或六脉俱勻滑大乃是孕

脉也切勿作寒病治之宜服此劑

烏藥 橘紅 香附 艾葉 人參

白木 各一錢 甘州 五分

右入生姜煎服

紫蘓和氣飲 妊娠嘔吐不止乃惡阻也

紫蘓 當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 陳皮

大腹皮 香附子 白木 茯苓

半夏 砂仁 藿香 神曲 丁香

右入生姜水煎服

羅木無半夏茯苓湯 治惡阻心中憤悶頭目眩暈四肢怠倦百節煩疼胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好噉酸醎臥多起少全食不進

半夏 一兩 茯苓 地黃 各七錢 芍藥

旋覆花 陳皮 人參 各半 川芎

桔槲 甘州 各五分

惡阻



右人生姜水煎服○千金方有紫蘇細辛無旋覆花

●歸原散 治惡阻嘔吐不止頭痛全不入食諸藥不効

當歸 甘艸 川芎 人參 芍藥 丁香各五錢 白木 茯苓 陳皮各一兩半

桔槲 枳殼各二兩半 半夏 一兩 右入姜棗水煎服

●調胃湯 惡阻者惡心阻其飲食也宜此湯

當歸 白木 陳皮 香附炒 茯苓

半夏姜湯泡香油炒過不傷胎氣 藿香 神麴

砂仁各等分 甘艸減半

●小兒姜棗水煎服

●茯苓丸 治妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痛悶

赤茯苓 人參 桂心 半夏

乾姜炮 陳皮各一兩 白木炒 葛根

甘艸 枳殼各二兩

●右為末蜜丸梧子大每服十九米飲下

●白木湯 胃虛惡阻吐水甚者至十餘日粥漿不入者宜此湯

白木土炒一兩 人參五分 丁香 甘艸各二分

右人生姜水煎服

●保生湯 妊娠惡阻食少嘔吐或兼吐瀉作噎者



人參一錢 甘艸炒 白朮炒 香附 烏梅  
橘紅各五分

右人生姜水煎服

●仲景乾姜人參半夏丸 姓嘔吐不止者宜之

乾姜 人參 半夏

右細末糊丸梧子大米飲下

●竹茹湯 姓惡阻嘔吐食不下者

竹茹 陳皮各二兩 生姜 茯苓各四兩  
半夏五兩

右水煎服

●半夏茯苓湯 治雜癆脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏炒 陳皮各三錢 白茯苓二錢  
砂仁炒 苘艸炒 五分

右人姜棗烏梅水煎服

●一方 治雜惡食心中煩憤熱悶嘔吐

竹茹 麥門各二兩 前胡二兩 陳皮一兩  
芦根一握

右水煎服

●一方 姓惡阻嘔吐痰水不食

生芦根一兩 陳皮七錢 生姜一兩 檳榔子三錢

右水煎服

●竹茹湯 姓擇食嘔吐頭疼顛倒痰逆四肢不和煩悶

人參 陳皮 白朮 麥門各一兩



茯苓 厚朴 各半 甘州 分

右入姜竹茹水煎服

橘皮湯 妊娠嘔吐不下食者主之

橘紅 竹茹 人參 白朮 各十

生姜 一兩 厚朴 十二

右水煎服

茯苓補心湯 妊娠血虛氣盛有火而

惡阻嘔吐眩暈四肢怠倦全食不納者

宜此湯 陳皮 茯苓 紫蘊 半夏 桔梗

枳殼 西胡 葛根 人參 木香

當歸 川芎 芍藥 地黃 王連

姜汁 炒

右入竹茹生姜水煎服

胎動

徐氏佛手散 治婦人妊娠傷動或子

外腹中血下疼痛口噤欲死服之探之

不損則痛止已損便立下此乃徐玉神

驗方也 隨身備急方

當歸 二兩 川芎 一兩

右為末每三錢水煎入酒溫服或灌之

如人行五里再服不過三五服便效

一方有益母草

紫蘊和氣飲 妊娠因事動胎致胎不

安動撞不已及下血欲墜者

紫蘊 當歸 川芎 白芍 陳皮



大腹 香附 熟地 人參 白朮  
伏苓 黃芩 阿膠 砂仁 苧艸  
右水煎服

●黃芪湯 治氣虛胎動腹痛下水

糯米一合 黃芪 川芎

右水煎服

●小膠艾湯 治妊娠因頓仆挫跌胎動

不安或胎搶上逼心或腹痛血下

阿膠一兩二兩 指迷方加秦朮二兩

右水煎服

●川芎散 妊娠因舉重什跌損傷胎氣

不安臍腹疼痛或子死腹中

川芎一兩

右為細末每服一匙連進三服或胎即

下

●白朮散 治妊娠胎氣不和飲食不進

白朮炒 紫菀各一兩 白芷炒 人參各二兩

訶子正 青皮 川芎各三分 苧艸灸一分

右入姜水煎服

●膠艾湯 治妊娠或因頓仆胎動不安

腰腹疼痛

熟地 艾葉炒 芍藥 川芎 黃芪

阿膠 當歸酒浸 苧艸灸各一兩

右入姜棗水煎服

●保安散 妊娠胎氣不安心疼痛

當歸一兩半 人參一兩 阿膠半兩 苧艸兩



右水煎服

●順氣飲子 產前服之安胎

紫蘇 木香 炮 人參 艸豆蔻

茯苓 各一兩 艸 炒五錢 大腹子 一兩 氣弱 者不用

右入苧根糯米少許水煎服

●釣藤湯 治姙娠胎動腹痛面青冷汗

氣欲絕者

釣藤鈎 當歸 茯神 人參

桔梗 一錢 桑寄生 一錢

右水煎服

●紫蘇飲 胎氣鬱滯者

方子懸

●安胎寄生湯 治姙娠下血或胎不安

或腰腹作痛

桑寄生 白朮 各五分 茯苓 四分 艸 二分

右水煎服

●安胎飲 躄倦惡食或胎動腹痛或下

血發熱腰痛

地榆 艸 灸 茯苓 熟地 當歸

川芎 白朮 炒 半夏 阿膠

黃芪 炒 芍藥 炒 各等分

右入姜棗水煎服

●加減安胎飲 治胎動不安腹痛漏下

或胎上刺心短氣推婦氣血弱者宜服

之

人參 黃芪 芍藥 川芎 續斷



地黃 側柏葉 阿膠 當歸  
其艸 炙

右入姜水煎服

●養胎散 治胎動不安下血腹痛或子  
灰腹中

黃芪 人參 白朮 川芎 地黃  
吳茱 各等分 其艸

右水煎服

●一方治胎動沖心煩悶欲死安胎止痛

當歸 酒 川芎 人參 阿膠  
其艸 各 葱白

右水煎服

●膠艾芎歸湯 治胎動下血或少加砂

仁

阿膠 艾葉 川芎 當歸 各一錢

其艸 二分

右水煎服

●安胎飲 治娠妊胎氣不安及胎痛

陳皮 白朮 當歸 生地 砂仁  
香附 各一錢 日芎 黃芩

川芎 各一錢 二分

右入棗水煎服

▲胎痛

●地黃當歸湯 一名內補丸 治婦人有孕

胎痛

當歸 乙兩 熟地黃 二兩

痛



李

右水煎服

●當歸芍藥湯 治姙娠心腹急痛

芍藥炒 當歸 茯苓 白木炒

澤瀉各一錢 川芎

右水煎服

●安胎散 姙婦偶有所傷腹痛不安或

從高墜下重物所歷觸動胎元痛不可

忍及下血者甚妙

砂仁不拘多少

右和皮畧炒勿令十分焦黑去皮取仁

為末熱酒調服不飲酒者米飲或艾湯

塩湯皆可調服如覺胎中熱其胎却安

矣此方即驗大抵姙婦不可飲此常服

●一方 安胎易產

九姙娠二三箇月忽心腹疔痛不安者

當歸三錢 阿膠二錢 甘草各二錢 葱白四根

右水煎服

●一方 九姙婦四五箇月忽心腹疔痛

大棗十四枚 塩一錢炒

右為末取一撮許酒調服之即愈

●阿膠散 治姙二箇月忽心腹疔痛不

安

當歸 陳皮各一錢 白木炒 茯苓

川芎 阿膠各二錢 甘草炒三錢

右入姜棗水煎服

●一方 治姙娠心腹大痛氣欲絕者



空

川芎 當歸 茯苓 厚朴 各一兩

● 右水煎服  
川芎散 治婦素有冷氣冲心如刀割者

川芎 一錢  
人參 各五錢  
吳茱萸 各五分  
茯苓 各五分  
桔梗 各四分  
當歸 一錢  
製朴 五分  
芍藥 七分  
枳殼 各三分  
甘艸 各三分

● 右水煎熱服

● 豁痰飲 妊婦胸痛屬鬱痰者卜居八九用之屢有効

香附子 紫蘇 陳皮 茯苓 各一錢  
山梔子 三分  
甘艸 少許  
● 右入生姜竹瀝服

● 和榮順氣湯 治妊娠心痛

紫蘇 當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒  
陳皮 大腹皮 香附 各一錢  
延胡索 各五分  
乳香 各五分  
甘艸 二分

● 右入生姜水煎服

● 一方 治孕婦心痛不可忍  
銀朱 雞糞

● 右炒焦爲末二味等分和一處每一錢熱酒調服即出冷汗而愈

● 一方 治孕婦心疼  
玄胡 五分  
當歸 一錢  
乳香 五分  
甘艸 三分

● 右水煎服



●白朮湯 治內熱心痛

白朮 四錢 芍藥 三錢 黃芩 一錢 炒

右水煎服 忌食李雀肉

●火龍散 治妊娠心氣痛

艾葉 鹽炒 一兩半 茴香 炒 川練子 谷半 兩炒

右為末水煎

一 方 治寒邪所犯心腹作痛

桂枝 芍藥 炒 半夏 各一兩 茯苓

厚朴 枳殼 甘草 各五分 人參

紫蘇 各一錢

右入姜棗水煎服

●芎藭湯 治妊娠俄然心腹大痛

川芎 厚朴

右水煎服

●橘紅薑朴湯 治妊娠心腹痠痛不可

忍心嘔吐吞酸不思飲食

厚朴 陳皮 乾姜 茯苓 各一

甘草 五分 吳茱萸 六分

右水煎服

●縮砂湯 治孕婦腹痛吐逆

陳皮 白朮 砂仁 各一兩半 良姜 二分

紫蘇飲 治孕婦心腹疼痛

雷公炮炙論云心痛欲死惡不見延胡

又方 青竹茹一升酒二升煮二升分

二服

又方 破鷄子一枚調酒服之



●八解散 孕婦飲食停滯心腹疼痛者  
最妙

●藿香正氣散 妊婦心腹痛神驗  
二方見藿亂明

胎漏

●膠艾湯 妊娠點滴下血謂之漏胎是  
陰虛不足以濟火氣虛不足以固血故  
有此證也宜此湯

熟地 川芎 艾葉 當歸

甘草 阿膠 黃芪

右水煎服

●膠艾四物湯 治胎漏下血腹痛

當歸 川芎 芍藥 酒炒 地黃

阿膠 炒 白朮 黃芩 砂仁

香附 炒 糯米 艾葉 少許

右水煎服

●丁方 治胎漏下血

條芩 五白朮 一兩 砂仁 炒 阿膠 各三錢

右為細末每服二錢煎艾湯調服水煎服亦可

●止漏散 治妊娠下血如月信來者若  
致胞乾非特損子亦能損母

熟地黃 乾姜 炮各一兩

右為細末每服二錢一日夜三四服

●芎歸湯 治胎漏下血腹痛

當歸 川芎

漏



積産逆産三可ク

蜂蜜 麻油

右等分ニソ温服セシ  
ムルニ五所正ニ庄ス



李

右水煎臨服入酒童便各少許

●**苈根湯** 治孕婦無故下血腹痛不可

忍或下黃汗如漆如水如豆汁者

野葶根炒 金銀各兩

右用酒水各半煎服

●**加味逍遙散** 肝火盛而胎漏下血者

●**二黃散** 治胎漏下血或內熱肺熱或

頭痛頭暈或煩躁作渴或脇肋脹痛等

症

生地黃 熟地黃各等分

右為末每服三錢煎白朮枳殼湯調下

二黃須杵膏為丸庶藥不枯槁而有力

也

●**膠艾湯** 治妊娠頓仆胎動不安腰腹

疼痛或胎上搶或去血腹痛

阿膠一兩炙 熟艾葉數莖

右水煎服

●**一方** 治妊娠從高墜下腹痛下血

生地 益母草各二錢 當歸

黃芪炒各一錢

右入姜水煎服

●**靈効散** 治妊娠尿血此漏胎更甚

當歸 生地各一兩 芍藥 川芎

山梔子各六分 血餘煨存性 升麻

龍骨各三錢版 艾葉五錢

右為末每二錢空心童便調下



●加味四物湯 治妊娠下血不止

本方加艾葉 阿膠各一錢

右入烏梅水煎熱服

●桑寄生湯 治妊娠下血不止胎動不安

桑寄生 川歸 續斷 川芎

人參 香附子 阿膠 茯神

白朮 甘草

右入生姜水煎服

●經方 治妊娠胎動出血產門疼痛

黃連

右為細末酒調每一錢日二服

●保氣散 治頭仆傷胎漏血安胎寬氣

進食瘦胎

香附 砂仁 桔梗 枳殼 紫蘇

大腹皮 甘草 等分

右為末湯調下水煎服亦可

●和胎飲 治妊娠下血謂之漏胎

阿膠 鹿角屑 熟地 斷文 各一錢五分

白朮 黃芩 甘草 砂仁 一錢

右大黑棗二枚空心煎服

●乾桃散 治妊娠下血不止

乾桃 乃樹上乾不落桃 地榆 各等分

右為末每服二錢空心白滾湯調下

●奇聖散 治症同前

雄鷄肝三箇地榆二錢酒一碗煮熟

食之即止



李夫

●如聖湯 治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮 當歸酒浸 熟地黃 阿膠

白芍 川芎 續斷酒浸 甘草炙各等分

右入苧根少許生姜三斤水煎服

●枳殼湯 治妊娠胎漏下血及因事下血

白朮乙兩 枳殼 黃芩半兩

右水煎溫服

●八物湯 漏胎氣血兩虛者

●補中益氣湯 中氣下陷者

●歸脾湯 脾弱不能統血者

▲子淋

●冬葵子散 治子淋小腹疼痛胎動不

安

冬葵子炒 柴胡 桑白皮 赤茯苓

赤芍 當歸各等分

右入姜葱小煎服

●安榮散 治妊娠小便澀少遂成淋瀝謂之子淋

麥門 通州 滑石 當歸

燈心艸 苈艸各五錢 人參 川芎各兩

○一方川芎代細辛

右為細末每服二錢煎麥門冬調下○

此方恐滑石太重而滑胎若胎臨月可用若六七箇月已前俱不可輕用宜去此味或加梔子扁蓄石榆之類最穩

淋



李

麥亦能損胎不可用也

●地膚子湯 治子淋小便澀數

地膚子 車前子 各一錢 知母 黃芩

赤茯苓 白芍 枳殼 各七分 升麻

通艸 甘草 各三分

右水煎服一方用赤芍枳實加大黃無

車前子而茯苓代猪苓名之地膚大黃湯也

●薤麥湯 治子淋心煩悶亂

薤麥 赤茯苓 桑白皮 木通

葵子 各一錢 黃芩 炒 芍藥 枳殼

車前子 炒各五分

右水煎服

●葵子散 治子淋小便澀痛

冬葵子 滑石 木通

右入葱白水煎服

●又方 治子淋 地膚子

右水煎服

●車前散 治子淋或小便不通下焦有熱

熱

檳榔子 木通 陳皮 去白 赤茯苓

車前子 赤芍 當歸 滑石

石葦 炙各等分

右水煎服

●忘憂散 治雄心經蘊熱小便赤澀不利淋瀝作痛

利淋瀝作痛



突

琥珀 不拘多少 萱草根 一握

右以琥珀研為細末每服五分濃煎服

●加味四君子湯 孕婦作淋者三焦胞

絡元氣虛而胎墜屢迫溺道不能通利者

人參 白朮 茯苓 當歸 芍藥

其艸稍

右水煎服○五六箇月加升麻白藥○

八九箇月加木通大腹

●清利飲 治子淋濕熱不行肚腹作痛

木通 茯苓 麥門冬 車前子

大腹 各一錢半 淡竹葉 十五片

右入灯心三十莖水煎服

●又方 治姙因傷於房事以致淋瀝

人參 當歸 川芎 澤瀉

猪苓 各一錢五分 肉桂 白茯苓 各八分

右入大棗五枚水煎服

●檳榔子散 姙娠淋瀝小便不通作轉

胞治不効此方屢有効

檳榔子 赤芍 各等分

右水煎服

●子淋散 治姙小便澁痛頻數日子淋

麥門 赤茯苓 大腹 木通

其艸 淡竹葉 十枚

右水煎服

●全生茯苓散 治姙娠小便不通



赤茯苓 葵子 等分

右水煎服

▲轉胞

●八味丸 治妊娠小便不通名曰轉胞亦治子淋

腎氣丸加桂心附子各一兩是也

●丹溪參朮飲 治妊娠轉胞不得小便者此湯服之探吐數日愈

四物湯 加人參 白朮 半夏

陳皮 甘草

右入姜水煎

●紫蘇和氣飲 治妊娠小便淋瀝不通

紫蘇 當歸 川芎 白芍 陳皮

大腹 香附 木通 車前子

滑石 甘草

右水煎服

●通利飲 治妊小便不通因胎癢膀胱以致閉塞

赤茯苓 人參 各一錢 車前子

龍膽艸 木通 各二錢 甘草稍

川芎 各一分

右入灯心三十莖水煎空心服

●葵子散 治妊娠小便不利身重惡寒

起則眩暈及水腫者

葵子 五兩 茯苓 三兩

右為末每二錢匕米飲調下○萬氏曰



辛

妊婦素淡滋味不嗜辛酸病小便赤澀而痛者此胎熱也加赤芍條芩車前如小便不通恐是轉胞加髮灰少許極妙

一方 治妊娠小便難飲食如故

當歸 貝母 苦參 各二兩 滑石 半兩

右為末煉蜜丸小豆大每服二三十丸米飲下

治妊娠小便不通臍下妨悶心補煩亂

蔡子 榆白皮 各一兩 葱白 七莖

右水煎服

杏林丸 妊娠不得小便

杏仁 去皮尖炒黃

右搗丸灯心湯吞 七粒

一方 妊娠小便不通

滑石 末

右水和塗臍下○東井蜜丸如錢大敷臍中立通神妙

一法 用車前州汁調滑石末塗臍周圍四寸熱易之

又方 搗杏仁入滑石末飯丸小豆大每服十九白湯下

又方 紫菀為末井花水調下二錢轉胞者卒不得小便也

冬葵 五錢 山梔 五錢 木通 三錢 滑石 五錢

右水煎服外以山梔子冬葵子滑石為末田螺肉搗膏或生葱汁調膏貼臍



中立通

遺尿

加味逍遙散 治脬中有熱而遺尿

白朮炒 茯苓 芍藥酒炒 當歸 甘草

各一錢 柴胡 牡丹 梔子各五分

右水煎服

溫胎飲 治妊娠遺尿不禁

五味子 蘄艾 大茴香各二錢

牡蠣 川芎各一錢二分

右入生姜水煎服

紫蘇飲 妊娠胎氣不和小便頻數

度者

方子懸

四物湯加梔子 治妊娠遺尿屬肝經血

虛者

白薇芍藥湯 治妊娠遺尿不知出時

白薇 芍藥 等分

右為末酒服方寸匕日二三服

加益腎鹽三分 滾白湯調下

補中益氣湯 脾肺氣虛而遺尿失禁

者加益智

桑螵蛸散 治妊娠小便不禁

桑螵蛸二十箇

右為細末每服二錢空心米飲調下

大便閉

當歸湯 妊娠大便不通

便閉



當歸 川芎 芍藥 白朮

條芩 各一錢 杏仁 三分

右水煎服

●四物湯加黃芩桃仁 娠大腸血燥 便閉者宜之

●紫蘂飲 大腸氣滯便閉者 方子懸

依本方加杏仁黃芩

●加味逍遙散 心肝虛熱便閉者加車前子

●紫蘂和氣飲 治娠大便秘滯艱難

紫蘂 當歸 川芎 白芍 陳皮

大腹 香附 生地 王連 枳殼

甘草

右水煎服

●平安散 治娠上氣喘急大便不通

嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴 生姜 干姜 炮 陳皮 各一

川芎 五分 地黃 一分 炙甘草 四分

木香 二分

右水煎入燒鹽一捻溫服

●當歸地黃湯 治娠大便久不通

當歸 生地 白朮 黃芩

大腹皮

右水煎服

▲大小便閉

●楨榔子湯 治娠二便不通心腹脹



滿不食四肢煩熱

枳殼子 赤茯苓 大腹皮 木通

杏仁 五味子 各一 桑白皮

桔梗 各二 甘草 二分

右水煎服

●枳殼飲 治妊娠大便秘小便澀腹脹

煩悶

枳殼 三 防風 二 車前子 一 大黃 酒洗

甘草

右為細末每服一錢沸湯加蜜少許調

下

●大腹皮散 治妊大小便赤澀

枳殼 大腹皮 甘草 各

右水煎服

●當歸散 治妊娠因怒肚腹脹痛四肢

浮腫氣急作喘大便難小便澀產門腫

當歸 五 赤茯苓 枳殼 芍藥

川芎 各一 白芷 炮 木香 煨 甘草 各三

右用薑水煎氣弱枳殼減半大便秘加

蜜同煎

●防風枳殼散 治妊娠風秘

防風 二 枳殼 三 甘草 一

右為末每服一錢空心用白滾湯調日

三服

●訶梨勒散 治妊娠大小便不通腹脇



痞悶不思飲食

木通 枳殼 當歸 生地

各一錢 枳殼 各五分 訶梨勒 二箇去核 大腹皮 三分

石為末用童便一盞葱白二寸煎六分

調服一錢

紫菀飲

治妊婦氣滯大小便不利者

方子懸

▲子腫

澤瀉散 治妊婦氣壅身體腹脇浮腫

喘急氣促小便閉澀不利謂之子滿

澤瀉 桑白皮 枳殼 枳實

木通 赤茯苓 各等分

右入生姜水煎服

木通散 治妊婦身體浮腫四肢脹急

小便不利謂之子腫

木通 一錢 木香 柯子皮 各三分 香薷 一錢

枳殼 炒 五枚 枳實 五分 桑白皮 一錢

條芩 五分 紫蘇葉 一錢

右入生姜水煎服

金生白木散 治妊婦面目虛浮肢體

腫脹名曰子腫

白朮 兩 生姜皮 大腹皮 陳皮

茯苓 各五分 指迷方用茯苓多桑白

皮無朮

右為細末每服二錢米飲調下



鯉魚湯 治妊娠腹脹滿或通身浮腫  
小便不利或胎死腹中此方甚驗

當歸 芍藥 各一錢  
茯苓 一錢  
白朮 二錢  
橘紅 五分  
鯉魚 一尾不  
拘大小

右將鯉魚去鱗腸白水煮熟而去魚用  
汁一盞半姜七片煎至一盞空心服當  
見胎水下如水去未盡或胎死腹中脹  
悶未除再合一劑服之水盡脹除為度

茯苓湯 治妊娠面目虛浮肢體腫滿

當歸 川芎 芍藥 炒 地黃 茯苓  
澤瀉 白朮 炒 黃芩 山梔子 酒炒  
麥門 厚朴 甘州炙

右水煎服

紫蘇飲 治妊娠胎氣不和腹脹不食  
四肢腫滿小便澀少用之最妙

防風散 治脾虛遍身浮腫腹脹喘促  
小便不利

防風 三錢 桑白皮 炒 紫蘇莖葉  
赤茯苓 各五分 木香 二分

右入姜水煎服

五皮散 治胎水腫滿

大腹皮 桑白皮 生姜皮 橘皮  
茯苓皮 各一錢 木香 二分

右水煎服○李氏入門倍加木為君  
生料平胃散 治妊娠浮腫因脾衰血  
化成水



姜

蒼朮 厚朴 陳皮 甘艸

右入姜棗水煎服或為末用薑葉湯調下每服二錢

●霍香止氣散 半并翁曰妊娠腫脹尤可

▲子氣

天仙藤散 治妊娠三月成胎之後兩足自脚面漸腫至膝行步艱難喘悶妨食若黃腫甚至足指間有黃水出者謂之子氣

天仙藤 即青木香藤也 香附子 炒 陳皮

四甘艸 烏藥 木香 各等分

右入生姜三斤紫蘇五葉水煎服

●腎著湯 治妊娠腰脚腫

茯苓 白朮 各四兩 乾姜 炮 其艸 各二兩

杏仁 三兩

右水煎服

●千金飲 治子氣行步艱難

木香 防己 五加皮 地骨皮

各一錢 桑白皮 紫蘇 木瓜 各二分

右入灯心三十莖水煎服

●商陸赤小豆湯 治妊娠手脚腫滿等急

赤小豆 商陸 等分

右水煎服

▲子煩

子氣 子煩



犀角散 子煩者懷子而煩悶也此心  
肺有熱故也主之

犀角屑 地骨 黃芩 麥門  
赤茯苓 苒艸

右水煎入竹瀝少溫服

人參散 熱乘於心脾煩熱乾渴者用  
此湯最可

前方加人參葛根

竹葉湯 治妊娠苦煩悶

防風 黃芩 麥門 茯苓  
竹葉 數片

右水煎服

當歸飲 治子煩

當歸 川芎 阿膠 豆豉  
桑寄生 葱白

右水煎服

茯歸煎 治妊娠心驚膽怯終日煩悶

茯苓 當歸 麥門 黃芩

右灯心三十莖水煎服

麥門冬湯 治妊娠煩燥食少氣弱胎  
不安

白茯苓 人參 麥門  
防風 淡竹葉

右入生姜水煎服

除煩清心丸 治膽怯心驚煩燥口苦

知母 王連 天冬 來冬 五錢



夫

硃砂 三錢

右為末荷葉湯丸硃砂為衣每服二錢  
空心白滾湯送下

●門冬知母湯 治子煩熱悶心煩

麥門 茯苓 防風 知母

右水煎臨服入竹瀝一二匙

●知母飲 治妊娠心脾壅熱咽膈渴苦

煩悶多敬焉

赤茯苓 黃芩 黃耆 知母

麥門 甘州 各二兩

右入桑白皮水煎臨服入竹瀝同服

●竹瀝湯 治子煩

防風 黃芩 麥門 白茯苓

右水煎入竹瀝一合再煎數沸溫服

▲子懸

●紫蘗飲 治胎氣不和上逼心腹脹滿

痰痛謂之子懸或臨產驚心氣結連  
日不下或大小便不利

當歸 其艸 炒 大腹皮 人參

川芎 陳皮 白芍 炒各 紫蘗 一錢

右姜棗水煎服○龔氏醫鑿鑿腹痛加香

附木香○咳嗽加枳殼桑白皮○熱加

芩○嘔吐加砂○泄瀉加木苓○難產

加枳殼香附車前子

●秘驗方 治妊娠氣血不和懷胎近上

逼心於痛甚

懸



白朮 黃芩各二錢 艾葉三錢

右入葱白水煎服

●大聖散 治妊娠心忪夢驚心腹脹滿連膈急痛

白茯苓 川芎 麥門 黃芪炒

當歸各一錢 人參 甘草炒 木香各五分

右入薑水煎服

○白朮湯 治遍身痛或衝心痛欲死

白朮四錢 赤芍三錢 黃芩炒二錢

右水煎服忌桃杏雀肉

●丁方 治胎上逼熱痛下血或煩悶困

篤

葱白二十莖

右水濃煮飲胎未死即安胎已死即下

▲子癰

●葛根湯 治妊娠臨月忽發風痙悶亂不省人事吐逆眩倒少時醒後復發謂

之子癰

貝母 葛根 牡丹 防己 防風

當歸 川芎 桂心 茯苓 澤瀉

各五錢 甘草分半 獨活 石膏

人參 各一錢

右水煎溫服日三服其貝母令人易產未臨月者以升麻代之忌菘菜

●防已湯 治妊娠中風口禁四肢強直

角弓反張

癰



防已 五錢 羌活 一錢半

右為細末別用黑豆一合炒焦黑投好酒中沸定去豆調藥末攤開口灌之稍醒再灌有效

芩連四物湯 子癰者懷子癰什也此由血養其胎陰虛火元痰氣厥逆故令癰什也

當歸 川芎 芍藥 地黃  
黃芩 王連 半夏

右入生姜水煎服

羚羊角散 治妊娠中風頭頂強直筋脉挛急言語寒澀痰涎壅盛或時發及搐不省人事謂之子癰

羚羊角 獨活 酸棗仁炒  
五加皮各八分 薏苡仁 防風

當歸 川芎 茯神 杏仁各四分  
木香 甘州各二分

右入生姜水煎服

羚羊角湯 治一切子癰

羚羊角三錢 棗仁 五加皮 獨活  
各二錢 防風 當歸 川芎 羌活各八分  
右入生姜水煎服如痰涎多加貝母噴皮

子嗽

天門冬湯 治妊娠外感風寒久嗽不已謂之子嗽及惡熱因喉燥脉數咳嗽



甚則咯血者

主 天門 紫苑 知母 酒洗 桑白皮

蜜炙各 五味子 桔梗 各五分

右水煎服嗽血者加阿膠五分

●百合散 治妊娠咳嗽心煩不欲飲食

百合 紫苑 麥門冬 桔梗

桑白皮 竹茹 各一分 甘草 五分

石水煎入蜜半匙再煎二三沸去粗

溫服

●桔梗湯 治妊娠感風寒咳嗽喘急不食

茯苓 天門 各一分 桑白皮 桔梗

貝母 各五分 紫菀 人參 甘草 各三分

麻黃

右入生姜水煎服 有汗去麻黃

●馬兜鈴散 治妊娠咳嗽氣喘

馬兜鈴 桔梗 人參 甘草

貝母 各五分 陳皮 大腹 紫菀

桑白皮 各一錢 五味子 五箇

右入生姜水煎服

●一方 治妊娠欬嗽

紫苑茸 麥門冬 各一分 桑白皮

杏仁 炙牛艸 各二分 桔梗 二分

右入生姜竹茹水煎入白蜜一蛤殼許

再煎數沸溫服

○茯苓補心湯 治妊娠咳嗽痰喘發熱

喘急



當歸 川芎 白芍 地黃 陳皮  
茯苓 半夏 枳殼 桔梗 前胡  
乾葛 紫蘓 人參 甘艸

右入姜棗水煎服

●補中益氣湯 旌娠脾肺不足久嗽不止者宜之

●丁方 治旌痰嗽見紅

當歸 熟地黃 天門 麥門  
紫苑 各五分 桑白皮 蜜炙 杏仁  
桔梗 甘艸 黃芩 山梔  
五味子 阿膠 炒一分半

右水煎服

●紫蘓和氣飲 治旌娠咳嗽吐痰

紫蘓 當歸 川芎 白芍 陳皮  
人脂 香附 貝母 桑皮 杏仁  
甘艸

右入生姜水煎服

▲傷寒

●甘藷香蘓散 旌傷寒傷風勿輕服藥

發熱頭痛惡風身痛者用之

香附 紫蘓 各二錢 陳皮 一錢 川芎  
白芷 各五分 甘艸 一分

右入生姜水煎服

●參蘓飲 治旌娠感冒發熱頭痛咳嗽

陳皮 枳殼 桔梗 甘艸  
木香 各半兩 半夏 紫蘓

任傷寒



葛根 前胡 人參 茯苓 各七錢半

右入姜棗水煎服

十全散 治妊娠傷寒瘟疫壯熱

羌活 人參 茯苓 獨活 川芎

甘艸 枳殼 柴胡 白朮

桔梗 各等分

右入生姜薄荷水煎服

一方 傷寒安胎

白朮 黃芩 各等分

右水煎服

一方 治妊娠傷寒

柴胡 前胡 當歸 各七錢 人參 四錢

芍藥 生芩 各六錢 甘艸 三錢

右入姜葱水煎服

人參羌活湯 治妊娠感冒發熱頭痛

身體疼痛

羌活 茯苓 獨活 西芎 川芎

枳殼 桔梗 人參 葛根

陳皮 各一錢 甘艸 二錢

右入姜棗水煎服

黃龍湯 治傷寒寒熱頭痛嘔吐不食

脇痛半表半裏症及汗後瘵後發復餘

熱此方最妙

柴胡 二錢 黃芩 一錢 人參 甘艸 各一錢

右水煎服

一方 治傷寒百節疼痛壯熱不急治



卽落胎

柴胡 葛根 知母 石膏各六錢

大青艸八錢 山梔一兩 升麻八錢

葱白十四莖

右水煎服

一法 妊傷寒護胎法

井中泥 青代黑 伏龍肝

右為末攪勻塗於孕婦臍中二寸許加

乾再塗上以保胎孕也

方藥湯 治妊傷寒自利腹中痛食飲

不下脉沉者

芍藥 白木各兩 甘草 茯苓各五

黃芪一兩

右水煎服

芎藭散 治妊感風寒渾身壯熱頭

目眩暈

紫蘘 川芎 白芍 白朮

麥門冬 陳皮 乾葛各六分

甘草三分

右入姜水煎服

升麻六物湯 治妊傷寒發斑弱血

升麻二錢 山梔子 杏仁 大青艸

小章 甘草各一錢

右水煎服一方有黃芩

白朮散 治妊傷寒煩熱頭痛胎氣

未安或時吐逆不下食



白朮 橘紅 人參 前胡 川芎

麥門 赤茯苓 已上各一兩 其州

半夏 各半兩

右入生姜竹茹水煎服

●表虛不合湯 妊婦傷寒中風表虛自

汗頭痛頂強身熱惡寒脈浮而弱者

四物湯 四反 桂枝 地骨皮 各七

右水煎服

●表實不合湯 妊婦傷寒頭痛身熱無汗

脈浮緊者

四物湯 四兩 麻黃 細辛 各半兩

右水煎服

●升麻不合湯 妊婦傷寒下後過經不

愈溫毒發痲如錦文

四物湯 四兩 升麻 連翹 各七

右水煎服

●人參六合湯 妊婦傷寒汗下後咳嗽

不止者

四物湯 四兩 人參 五味子 各五

右水煎服

●厚朴六合湯 妊婦傷寒汗下虛痞脹滿

者

四物湯 四兩 厚朴 枳實 各五

右水煎服

●人參湯 妊婦傷寒熱退後用之養

氣潤津液



笑

人參 芍藥 地黃 麥門各二錢  
白朮 當歸 陳皮 柴胡各一錢  
甘草少

右水煎服

▲ 瘧疾

加味逍遙散 治妊娠瘧疾遠有奇効

當歸 芍藥 白朮各一錢 茯苓二錢

柴胡一錢 陳皮 半夏各八分 甘草三分

右入姜水煎服

清脾飲 治妊娠瘧疾寒少熱多或但

熱不寒口苦舌乾大便祕澁不進飲食

脈弦數者

青皮 厚朴 白朮炒 茵陳 半夏

黃芩 柴胡 甘草各五分 茯苓一錢

右入姜水煎服

加氣和氣飲 治孕婦瘧疾寒熱相半

并產後瘧疾

當歸 川芎 芍藥 青皮 陳皮

半夏 茯苓 枳實 枳殼 甘草

良姜 紫蘇 葛根 甘草

右入姜棗臨發日服

人參養胃湯 治妊娠瘧疾寒多熱

少外邪少而飲食多者

蒼朮 人參 茯苓 草蓐 半夏

陳皮 厚朴 藿香 烏梅 甘草

右入姜水煎服



●驅邪湯 治妊娠停食感冷發為瘧

良姜炒 白朮 草蓂 陳皮 藿香

砂仁 茯苓 各一兩 甘草各五分

右入姜水煎服

●醒脾飲 治子癍子痢口淡及曾傷風

冷

厚朴 艸薢 各五分 乾姜四分 甘草一分

姜棗水煎服

▲痢疾

●芩連芍藥湯 治赤白痢疾裏急後

重者宜此方

黃芩炒 王通炒 木香 枳殼炒 各五分

枳實炒 白芍炒 甘草各二分

右入生姜水煎服

●加味正氣散 治妊娠下痢自飲食醉飽

得者此方主之

陳皮 半夏 厚朴 藿香 蒼朮

芍藥 黃連炒 木香 五錢

枳實炒 枳殼炒 甘草各七分 芍藥各五分

右入生薑水煎服

●蓮香飲 治妊娠痢疾恐其墜胎用之

除濕熱扶持脾胃則愈

木香 王連 白朮 茯苓各一錢

白芍 陳皮 甘草各六分

右入灯心三十莖水煎服

●當歸芍藥湯 治妊娠痢疾久不愈腹中



矣

疔痛者宜此方能通暢血脉除濕養胃之劑

當歸 茯苓 白木 各二兩 芍藥 八兩

川芎 澤瀉 各四兩

右水煎服

調和飲 妊娠下痢稍久不愈者用之

調和氣血則愈

當歸 川芎 芍藥 王連

黃芩 桃仁 升麻 火炒

右水煎服

當歸芍藥湯 妊娠下痢赤白腹中疔痛

白芍 當歸 茯苓 澤瀉 白木

黃芩 各半錢 王連 木香 枳椇子

其艸 各三分

右水煎服○白痢腹痛甚者恐有寒也

去苓連加乾姜

芎朮香連丸 治妊娠下痢赤白穀道

腫痛

阿膠 白木 各五分 乳香 木香 各二錢半

枳殼 乾姜 炮各二錢 王連 一兩吳茱同炒

砂仁 炒川芎

右為細末醋糊丸如梧子大每服十九

白湯下

白木湯 孕婦下痢膿血

白木 黃芩 當歸



全

右水煎服

●胃風湯 妊娠腸胃虛弱風邪客之下痢膿血或如豆汁

人參 白朮 茯苓 當歸

川芎 芍藥 肉桂

右入粟水煎服腹痛加木香

●一方 治妊娠熱痢

王連 黃柏 各一錢 梔子 五分

右水煎服○嘔加陳皮生薑

●歸芪糯米湯 治妊娠下痢腹痛小便

澁滯

糯米 一合 當歸 炒 黃芪 各一兩

右水煎服

●一方 治臨產下痢

梔子 炒

右為末每服二錢白湯調下甚効

●補中益氣湯 治妊娠久痢屢用消導

理氣之劑腹內重墜胎氣不安者

▲泄瀉

●霍香正氣散 治妊娠泄利腹痛者

霍香 一錢 陳皮 紫蘇 厚朴 半夏

茯苓 桔梗 大腹皮 白朮 各一錢

甘草 五分

右入姜棗水煎服

●苓朮散 治妊娠泄瀉不止久則傷胎

白朮 茯苓 香附 各六分 王連 酒炒



卒

澤瀉 陳皮 各一錢 五味子 砂仁 炒

人參 山藥 各八分

右入棗水煎服

●調中湯 治妊娠世瀉兩脇虛鳴臍下

冷痛由食瓜果生冷等物及當風取凉

所致者

柯子皮 煨白木 各一錢 陳皮 良姜 炒

木香 芍藥 酒炒 甘草 炙各五分 肉蔻 五分

右入生姜水煎服

●加味益中散 治妊娠中氣不足飲食

停滯泄利腹痛

白木 炒二錢 茯苓 芍藥 炒各一錢

陳皮 木香 各一錢 甘草 炒

右為細末米飲調下

●錢氏白木散 治妊娠脾虛肌熱世瀉

者

人參 白木 茯苓 木香 藿香

葛根 甘草

右水煎服

●胃苓湯 治妊娠濕瀉兼治傷食泄瀉

蒼朮 厚朴 陳皮 猪苓 澤瀉

白芍 各一錢 白朮 炒 茯苓 各五分 肉桂 三分

甘草 炙一分

右入生姜棗水煎服

●理中湯 寒瀉者悠悠腹痛瀉無休止

色青脉沉遲也主此湯



全

人參 白朮 乾姜 炒各一錢 甘草 炙二分

右入姜棗水煎服

●補脾瀉肝湯 治脾虛肝實痛瀉不止

者

白朮 炒三兩 芍藥 炒二兩 防風 一兩

陳皮 炒兩半

右水煎服或為末白湯下

●不換金正氣散 治妊娠傷食泄瀉者

蒼朮 厚朴 陳皮 香香

半夏 甘草

右入姜水煎服

●胃風湯 治風冷來虛入客腸胃米穀

不化泄瀉注下腸鳴疼痛

方見產後泄瀉

●木君子湯 治妊婦中氣虛弱泄瀉不

止者用此湯加減調理而最可

●加減紫蘓飲 治妊娠泄瀉

紫蘓 川芎 白芍 酒炒 陳皮

大腹皮 香附子 炒 白朮

茯苓 甘草

右入生姜水煎服

●厚朴丸 治洞泄寒中

乾姜 炒 厚朴 等分

右水拌炒為末水糊丸梧子大每服五

丸米飲下

●豆蔻散 治虛寒泄瀉腹痛無度




厚朴二兩 肉豆蔻十箇 草豆蔻同

右入姜水煎服

補中益氣湯 妊娠由中氣不足而不

能升清降濁滑瀉痞悶者



霍亂

藿香正氣散 治內傷飲食外感風寒

吐瀉腹痛

藿香 陳皮 紫蘇 半夏 白芷

白朮 茯苓 桔梗 厚朴

大腹皮 甘州

右入姜棗水煎服

人參散 治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩

腹痛飲食不入

人參 厚朴 橘紅各一錢 當歸

乾姜炮 甘州各五分 辰砂中土一

右入棗水煎服

人參白朮散 治脾胃虛弱吐瀉或吐

瀉作渴不食

白朮 茯苓 人參 甘州炒 木香

藿香各五分 乾薑一錢

右水煎服吐甚加生姜汁頻飲之

木瓜煎 治吐瀉轉筋悶絕

吳茱萸 生姜各三分 木瓜一

右水煎服

益智飲 治妊娠霍亂腹痛吐逆不止

白朮 益智 枳殼 陳皮各三分



草豆蔻 良姜 炒各半及

右人生姜煎服

●八解散 治妊娠脾胃不和腹痛吐瀉者

白朮 茯苓 藿香 人參  
厚朴 陳皮 半夏 甘草  
右入生姜水煎服

▲腹內兒哭

●壬蓮湯 治兒在腹中叫哭

黃連 一兩

右水煎時時呷之

●又方用多年空屋下鼠穴中土一塊令  
妊婦噉之即止○一白右為末入麝香

少許酒調下○薛氏曰王連性寒麝香  
開竅當酌量用之

一法  
●一云臍帶上死瘡乃兒含口中因妊婦  
登高舉臂取物脫出兒口以此作聲令  
妊婦曲腰就地如拾物仍入兒口即止

▲子瘖

●四物湯 孕婦不語非病也但用此湯  
產後便語

●六味丸

●茯苓補心湯

▲悲泣

●大棗湯 治妊婦無故自悲

甘草 三兩  
小麥 三石  
大棗 十枚



全

右水煎

許學士云一婦無故數次悲泣是為  
臟燥用大棗湯而愈又程虎鄉內姓  
五箇月慘感悲傷亦投大棗湯而愈  
淡竹茹湯 治姓心虛驚悸臟燥悲傷  
或作虛煩

麥門 小麥 半夏 各一錢半 人參

茯苓 各一錢 苒艸 五分

右入姜棗竹茹少水煎服

一姓婦悲哀煩躁其夫詢之云我無  
故但自欲悲耳用此湯為主佐以八  
珍湯而愈

腰痛

●鹿角散 治姓娠腰痛如折不能轉側

鹿角 五錢

右以火燒令赤酒浸再燒再淬以碎為  
度細末酒調服

●通氣散 治姓娠腰痛

破胡帝

右炒為末空心每服二錢嚼核桃肉半  
箇以溫酒下之

●腎著湯 治姓娠腰痛體重腰冷如水

白朮 茯苓 乾姜 苒艸 各一錢

杏仁

右水煎服

●當歸湯 治姓娠腰痛

腰



當歸 三錢 白朮 二錢 甘肅 一錢

右水煎服○一方有阿膠

●紫蘓和氣飲 治妊娠腰痛狀不可忍

紫蘓 當歸 川芎 芍藥 陳皮

大腹 香附 破胡帝 小茴香

杜仲 甘肅

右水煎服

●獨活寄生湯 孕婦腎虛而感冷濕腰

痛者

獨活 桑寄生 杜仲 細辛

牛膝 秦苑 茯苓 芍藥 桂心

川芎 防風 甘肅 人參 地黃

當歸

右水煎服

●八物湯 治妊娠勞傷元氣腰痛者

當歸 川芎 芍藥 地黃 人參

白朮 杜仲 砂仁 阿膠 艾葉

茯苓 甘肅

右水煎服○脾胃不足者加白朮補骨

脂

●杜仲丸 治妊娠腰背痛

杜仲 續斷 酒浸 各等分

右為末煮棗肉丸桐子大每服十九酒

下米飲亦可

●紫蘓飲 妊娠氣血壅滯腰痛者最妙

方子懸



依本方加桔梗枳殼○或加杜仲續斷

●膠艾湯 治腰腹疼痛胎動欲落

熟地 艾葉 白芍煨 川芎

黃芪炒 阿膠炒 當歸 甘草炒

地榆各五分

右入姜棗水煎服

●小柴胡湯 肝火所動腰背疼痛者

依本方加白朮枳殼山梔

●歸脾湯 肝脾鬱結者

依本方加柴胡枳殼

▲出痘

●升麻葛根湯 發熱之初未分麻痘傷

寒傷食等症宜此解散庶無誤事

升麻 葛根各二錢 白芍一錢半 甘草一錢

右水煎服

●參蘇飲

●惺惺散 痘疹發熱之初未明是痘

體怯弱者主之

四君子 加細辛 天花粉

白芍 桔梗

右水煎服

●四單胎散 妊娠最忌出痘蓋熱能動

胎胎落則血氣衰敗必痘不能起發難

聚而命危矣此藥補氣血安胎解毒利

表疏邪



孕

當歸 川芎 白芍 人參 白朮  
茯苓 柴胡 黃芩 荆芥 防風  
白芷 粉葛 砂仁 紫艸 阿膠  
桔梗 甘草  
右水煎服

●安胎獨聖散 治妊娠出痘胎痛者此  
蓋熱而氣滯之故也

縮砂 炒

右為末酒也之五分

●安胎飲 孕婦出痘此方互用蓋氣血  
虛則胎不安氣血熱則胎不安氣血帶  
則胎不安矣此方主之  
人參 白朮 炒 茯苓 甘草

芍藥 酒炒 當歸 川芎 砂仁  
紫蘊 黃芩 酒炒 陳皮 香附 酒炒

大腹皮

右水煎服

▲催生

●芎歸湯 催生用此湯最可也謹莫改  
擊也

當歸 一兩 川芎 七錢

右分四服水煎臨服酒少許入○加并  
心各之出空散催生最穩當亦効捷○  
氣弱者加入人參

●三合濟世湯 治臨產艱難或一二月  
不下者

催生



矣

當歸三錢

川芎

枳殼各二錢

香附

大腹皮

紫蘇八分

甘州七分

右水煎待腰痛甚服之

●催生飲 催生立効

當歸

川芎

大腹

枳殼

白芷各等分

右水煎服

●催生湯 候產母腹痛腰痛見胞漿水

下方服

桃仁

赤芍

牡丹

白茯苓

官桂各二錢

右水煎服

●催生散 治難產并胞衣不下

白芷 伏龍肝 百州霜

滑石各等分

甘草減

右為細末用芎歸湯入酒童便少許調

前未服之二次立効

●神應集散 治橫生逆生難產

百州霜

白芷

右為末每二錢童便好醋各半以沸湯

浸服○陳氏良方名催生如神散大能

固血免血乾○李氏入門名古黑神散

治破水多則血乾○血虛芎歸湯下○

氣弱四君子湯下

●催生湯 治產婦陣踈難產經三兩日

不生或胎夾腹中或產母氣乏產道乾



滋饒覺陣痛破水便可投之

蒼朮二兩 桔梗一兩 陳皮六錢 白芷 桂心

甘州各三分 當歸 川烏 乾姜

厚朴 芍藥 半夏 茯苓 附子

南星各二錢 川芎一錢 枳實四錢

木香一錢 杏仁 阿膠各二錢

右為末每一錢溫酒下覺熱悶以新汲

水調白蜜下

李氏入門名之催生五積散

●加味芎歸湯 治交骨不開不能生

依本方加自來龜板一箇酥炙婦人

頭髮一握燒存性水煎服○李氏入

門各龜殼散

●古桂香丸 胎灰血乾或有寒者四物

湯下此丸

肉桂一兩 麝香一錢

為末飯丸菜豆大每十五丸○婁氏方

煖酒服須臾如手推下比之用水銀等

此藥不損血氣○一方單用桂末一錢

痛時童便下名救急散

○催生柞木飲子 治產難或胎爛腹中

滿悶其効如神

生柞木一尺 甘州大者

右水一碗半砂鍋內紙二重密封慢火

煎至一半候產母腹痛甚時溫飲一盃

不過一二服覺下車即生



如聖藥 用黃蜀葵華焙為末熱湯調  
下二錢若漏血胎胞乾澁難產併進三  
服即產如無華用葵子末半合調溫酒  
服尤妙若打撲胎死紅華酒調下

● 順生丹 治症同上

兔腦髓

去皮膜 研如膏

明乳香

一兩 細研

母丁香

末二兩

射香

一錢 研細

右以兔腦髓九雞頭大陰莖每服二九  
溫水下男左女右手握出  
兔腦髓日者尤佳

● 丹溪催生散

白芷

炒焦黑

百州霜

滑石

右為細末煎芎歸湯調下二三錢  
久難產 先露手足灸婦人右腳小指

● 頭尖三壯立產

一方用伏龍肝研末每服一錢酒調下

● 兒頭戴土而下不下男產而後血盛

● 快胎湯 難產通用

榆白皮

桂心

當歸

各三錢

冬葵子

炒一錢

右水煎加酒少許溫服若冷怔二二日  
不產者加附子炮紅花各少許

● 伏龍肝散 難產秘方

白芷

桂心

伏龍肝

半斤

右為末湯入海羅少許調下  
● 滑石散 難產腹痛小便不通小腹脹

滿



冬葵子 桂心 澤瀉 榆白皮等分  
其艸以

右入姜水煎服

安胎散 橫產逆產必胎腹痛

枳殼二 桂心 白芷各一 乾姜二  
雲母炒四及 二分

右為末熟湯入海羅少許服之

補中益氣湯 妊娠氣弱體倦難產者

用之此不催催也或加木香

胞衣不出

紅花酒 胞衣不下屢氣弱而瘀血盈

於胞者此方主之

紅花一兩  
炒

右以清酒五爵沃之溫服

芎歸榆白湯 治胎衣不下

川芎 當歸焙各半兩 榆白皮半兩

右每服三錢生地黃汁同溫酒調下

牛膝湯 治產兒已出胞衣不下臍腹

堅滿脹急疼痛及子死腹中不得出者

牛膝 煎雀麥各四兩 當歸 木通各六兩  
冬葵 五兩 滑石 八兩

右每三錢水兩盞煎八分稍熱服

奪命丹 治血流入衣中衣為血所脹

不得下治之稍緩脹滿腹中上冲心胸

疼痛喘急

附子半兩 牡丹皮一分 乾漆炒

胞衣



斤芳純煉官  
武益舞倍奴

滑葵

か減脱衣ニ



為未醱醋一升大黃末一兩同熬成膏  
和藥丸梧子大溫酒下五七丸

芎歸湯 胞衣不下因產母元氣虛薄  
者

當歸 一兩 川芎 七錢 肉桂 二兩

右水煎臨服入酒少許

延胡索湯 胞衣不下神方

川芎 二錢 當歸 一錢 延胡索 牡丹 各一分

右為末水煎入酒少許服一方有乾姜

二聖散 治產道乾胎衣不下

羌活 川芎 等分

右水煎入酒少許溫服

一方 治胞衣不下

伊龍肝

右研末每三錢溫水調下

胎衣不下 令產婦啣自己髮及屨屐口中

令嘔穢衣即下

脫衣散 治胞衣不下

牛膝 木通 各三錢 歸尾 二錢

冬葵子 二錢 滑石 四錢 枳殼 二錢

右水煎服

牛膝散 治胎衣不出腹中脹痛急服

此藥腐化而下緩則不效

牛膝 川芎 朴硝 蒲黃 各三錢

當歸 一兩 桂心 五錢

右每服五錢姜三片生地黃一錢水煎



●華蓋石散 治產後敗血不盡血迷而  
暈腹中胎衣不下至灰心頭熉者急用  
一服化水即出其効如神

花蓋石一兩 上色硫黃四兩

右和勻先用紙泥封固瓦罐一箇入二  
藥仍封固陰乾如急用以焙籠內灸乾  
用炭煨赤去火次日取出細研每服一  
錢童便熱酒下

●失笑散 婦人胞衣不出胸腹痛手不  
敢近用滾酒下此藥惡露胞衣並下

方兒枕痛

●<sup>一方</sup>單麻子仁塗母右腳心胎衣下急洗之  
緩則胎衣仍入

▲小產

●芎歸補中湯 治氣血虛欲產

艾葉代姜 阿膠炒 川芎 五味子炒  
黃耆炙 當歸 白朮炒 芍藥炒  
人參 杜仲炒各 甘草炙二  
一錢 分

右水煎服

若脾氣虛弱須用補中益氣湯

●補氣養血湯 治小產氣虛下血不止

人參 黃芪 當歸 白朮  
白芍酒 艾葉 甘草炙 阿膠  
川芎 青皮 香附 砂仁各等  
分

石水煎服

小產



●補血定痛湯 治小產瘀血心腹疼痛  
或發熱惡寒者

當歸 川芎 白芍酒炒 熟地各一錢

延胡七分 桃仁各三分 紅花各三分 香附

青皮 澤蘭 丹皮各五分

右水童便酒煎服

●四物湯 產後腹痛按之反不痛此血  
虛也

依本方加人參白朮茯苓

●六君子湯 腹痛而作瀉此脾虛也

依本方加破胡蒂肉豆蔻姜棗

●聖愈湯 治小產血虛五心煩熱睡臥  
不寧

地黃酒拌蒸 生地 黃芪炙

人參 川芎 當歸各一錢

右水煎服

●當歸散 治小產後氣血虛弱惡露內  
停增寒發熱宜服此藥

當歸 白芍炒 川芎

黃芩炒各一兩 白朮五錢

右為細末溫童便調下二錢

●十全大補湯 小產氣血薄弱發諸症  
者

●芎歸湯 小產後諸症宜加減用之



芎歸調血飲<sup>四</sup> 治產後諸病氣血虛損脾胃怯弱  
惡露不行去血過多飲食失節怒氣相冲以全  
無惡寒自汗口乾心煩喘急心腹疼痛肢肋脹  
滿頭暈眼花耳鳴口噤不語昏愴等症

當歸<sup>酒</sup> 川芎 白朮 茯苓 熟艾  
陳皮 烏茶 香附<sup>便</sup> 乾姜<sup>炒黑</sup> 益母  
丹皮 丹艸<sup>炒</sup> 姜枣水煎温服 芍藥<sup>酒</sup>  
惡寒發熱頭疼身痛脈大無力者氣血俱虛也  
加參芪去芎丹益餘見諸書

血運

醋炭薰鼻法 凡血暈不省人事者急  
治炭火以醋醋沃之使醋氣薰蒸入鼻  
則能收斂神氣自然精爽

孤鳳散 治產後血暈口噤閉目不語  
辰砂一兩 人參<sup>半兩</sup> 白礬<sup>煨</sup> 一兩

右爲末以竹管於鼻中輕輕吹入之立  
甦或以白湯調服之亦妙也此藥能補  
心鎮神

局方妙香散 產後心氣不足精神昏  
亂眩暈欲絕者

人參 黃耆 桔梗 甘州<sup>炒各</sup>  
五錢

血運



遠志炒一兩 辰砂三錢 別研 山藥一兩

木香三分 煨 茯神三錢

右為極末點白湯服之○春抱子按此藥能補氣血鎮心安神之聖藥本邦醫家号之安神散者也分量之增減因其家而有差異也

●芎歸保赤湯 產後氣大脫血虛極昏暈不醒者切不可驚哭叫動則驚散直氣乘昏暈死用此湯有奇效

當歸 人參 茯苓 黃耆 川芎

白朮 陳皮 香附子 童便炒

乾薑 炒黑 甘草 減半

右水煎服

●清魂散 治產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以致心神昏亂口噤眼花甚

闕絕

澤蘭 人參各一錢 荊芥三錢 川芎一錢

右為末每服二錢熱湯温酒各半調下

○李氏入門曰火載血上昏暈或挾風邪者宜此

清魂散 治產後惡血衝心昏暈

澤蘭 荊芥 當歸各二兩 川芎

五靈脂各五錢

右為末每服二錢酒灌下

●七寶飲 治產後血暈不省人事者此藥能調血和氣補虛歷驚



當歸 桂心 朱砂 茯苓

乾姜 炒 羚羊角 灰 川芎 人參 各等分

右為細末每服一錢酒童便調下

●苦盡湯 去血過多眼花頭眩昏悶煩

躁或見頭汗者主之甚者加炒乾薑入

參汗多加黃耆

當歸 二兩 川芎 一兩

右水煎入酒溫服○此藥攝血調血補

血之良劑也氣弱者加入參挾惡血者

加紅花

●獨參湯 治產後血暈下血過多不省

人事者氣血大脫而神不用兼治一切

失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰鳴

自汗盜汗或氣虛脈脫手足逆冷蓋血

生千氣故血脫補氣陽生陰長之理也

人參 二兩

右水一升煎半升溫服

●參蘓湯 治產後血暈

人參 一兩 甘蘓木 五錢

右童便酒水三物同煎服

●黑神散 治產後血迷血暈

黑豆 炒半升 熟地黄 當歸 酒洗 肉桂

乾姜 炮 其艸 灸 白芍

蒲黃 炒各四兩 生地黄 局方良方俱無此味便產須知有之

右為末每服二錢酒童便各半調服一

名烏金散○陳氏三因李師聖方去生



地加附子下灰胎妙○吳崑氏曰師云此方更治胞衣不下產難餘血奔心兒枕疼痛乍見鬼神等證蓋諸證皆血為患故並治之

●八物湯合二陳湯去芍治產婦氣血俱虛痰火泛上作運者

●芎歸荆芥湯 治產後血暈不省人事眼黑耳鳴

當歸 川芎 荆芥

右水煎臨服入童便少許服

●半夏茯苓湯 治產婦胸中宿有痰飲阻病不除產後多眩暈

半夏 茯苓 各二兩 陳皮 細辛

人參 芍藥 川芎 紫蘇

桔梗 甘草 各一兩二錢

右入生姜水煎服

●蒲黃散 治產後惡露不快血上搶心煩悶昏迷或在言

乾荷葉 炙 延胡 牡丹 生地黃

甘草 炙各二錢 蒲黃 生六分

右水煎服

▲顛振顛

●十全大補湯 產後顛振者乃氣血俱虧損虛火益盛生風此藥主之

●神妙交加散 治產後戰慄口牙噤急者

者 土厚切七七



當歸 荊芥 人參 各一錢半 乾姜 炒五分  
木香 沉香 各二分 炙甘草 少許  
石水煎溫服

●人參調榮湯 治產後戰振頭痛耳鳴  
或發熱

人參 焙 白朮 茯苓 各一錢  
當歸

川芎 黃耆 白芍 酒炒各八分

香附 童便製 桔梗 乾薑 炒黑

白芷 木香 各五分 甘草 炙二分

右水煎服

▲乍見鬼神

●調經散 治產後敗血停滯心神煩躁  
起臥不安如見鬼神言語顛倒

沒藥 琥珀 並細研 桂心 各一錢

芍藥 炒 當歸 細辛 半錢 麝香 少許

右為末每服半錢姜汁溫酒各少許調

下

●琥珀散 治產後瘀血攻心迷悶妄言  
見鬼者

琥珀 鐵粉 硃砂 麝香 各一錢

阿膠 人參 茯神 生地黃 各七錢半

右為末每一錢煎湯調下

●栢子仁散 治產後心血虧欠心神不  
守謔言妄語

栢子仁 遠志 去心 人參 桑寄生

防風 琥珀 別研 當歸 熟苻



芎藭炙

右水煎服

●八物湯去芍加琥珀栝子仁遠志硃砂  
金銀王瘀血迷心妄言妄見及心虛譫  
妄昏運

●芎藭湯 產後發在跳躍不顧羞恥欲  
上屋者乃各經血一齊乘虛上升迷其  
心竅而下部惡血又相奔騰其勢上而  
不下故也宜此湯

下當歸二兩 川芎一兩

右水煎臨服加童便一杯溫服

●加減調血飲 治產後言語錯亂面目  
赤紅或母罵欲走者用此有奇驗也

人參 白朮 當歸 川芎 茯苓

黃耆各一錢 香附子 陳皮 各八分

酸棗仁 山梔 麥門冬 各五分

辰砂三分別研 芎藭少許

右人生薑竹茹水煎服

●逍遙散 治產後面如火周身顛振在  
言亂語不分親疎足冷嘔逆不食脉滑  
數依本方加炒黑乾薑陳皮○春抱子  
曰此出半井鑿案集也此肝火脾虛而  
有痰故逍遙散加味而愈產後氣血太  
虛而亦有上件患能審而可施治○產  
後榮血迷於心絢歌唱無時踰垣上屋  
者依本方加桃仁紅花遠志生地蘓木



名之開迷散

●乾荷葉湯 產後敗血上衝發熱狂走  
脈虛大者

乾荷葉 生地黄 牡丹 各等分

右濃煎湯調生蒲黃末二錢服之即止

●妙香散 產後語言錯亂用當歸生地

黃湯調服之立効 方見血運

●小珍散 治產後血迷心竅言語不正

人參 石菖 生地 川芎 各一兩

朱砂 防風 各半 細辛 一錢 苒州 各半

右為末每服一錢薄荷湯下

●隱居澤蘭湯 治產後敗血上衝而狂  
亂

澤蘭 生地 當歸 芍藥 炒

生姜 各一錢 苒州 炒五分 大棗 四箇

右水煎服

▲不語

●七珍散 主產後敗血停畜上于於心

心氣閉澁舌強不能言語者

川芎 人參 石菖 生地黄 各一兩

防風 硃砂 各五錢 細辛 一錢

右為末每服一錢薄荷煎湯下○地黄

戀胸脾胃不快者以當歸代之尤妙

●茯苓補心湯 治產後心氣虛耗心血

下涎獨語不覺咽喉痛或舌本強言語

難出



茯苓 人參 前胡 半夏

川芎 各七錢半 陳皮 枳殼 紫菀

桔梗 乾葛 各半兩 當歸 一兩半 芍藥 一兩

熟地 一兩半 甘草 五分

右入姜棗水煎服○龔氏醫鑑音產後失音不語心肺二竅致侵血又感風邪客會歷故去陳皮川芎加防風升麻紅花南星薄荷

一方治產後不語

石菖蒲 石蓮肉 人參

右水煎服

加味逍遙散因大腸風熱不語者加防風白芷

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語

白礬 生

右研為末每服一錢熟水調下

加減八珍湯 產後心血空虛心無血

養口不能言精神短少

酸棗 石菖 人參 遠志 茯神

生地 桔梗 麥門 當歸 川芎

白朮 陳皮 甘草

右水煎入竹瀝姜汁少許溫服

身熱不止

清熱飲 產後身熱不止口乾煩渴日晡尤甚者血虛也宜大補其血不宜寒涼之劑及佐以溫熱則熱自除



當歸 人參 生地 芍藥 酒炒各一錢二分

地骨皮 牡丹皮 香附 各一錢

紅花 沙參 續斷 各八分

右入棗水煎服

●逍遙散 治產後血虛煩熱者 方見上

●當歸人參湯 治產後身熱口乾短氣

煩悶自汗頭痛者此因去血過多血虛

則陰虛生內熱也

當歸 人參 麥門 桂心

生地黃 各二錢 粳米 一合 芍藥 炒黃一錢

淡竹葉 二錢 大棗 一錢

右水煎服

●補虛湯 治產後虛熱甚

人參 白朮 各一錢 當歸 川芎

黃耆 陳皮 各五分 乾薑 炒黑四分

甘草 三分

右入薑水煎服

●十全大補湯 治產後氣血薄弱身熱

不止

▲血斑

●清榮湯 治產後血斑者此血虛血熱

感外邪表氣鬱滯不行血熱積蘊不散

故也此湯主之

當歸 川芎 芍藥 生地黃

柴胡 荆芥 沙參 甘草 減半

右水煎服



逍遙散 治產後離襦太早或燥浴身  
垢以感風惡寒發熱周身血斑

茯苓補心湯 治產後血斑目痛壯熱

耳鳴

桃仁養血湯 治產後惡血逆上耳塞  
鳴不聞聲音面赤頭痛

當歸 川芎 桃仁 生芩 各一

香附子 前胡 柴胡 牡丹 各一

紅花五分 甘草少

右水煎服

加味芎歸湯 難產去血過多氣困

耳鳴目眩

地黄 三錢 當歸 川芎 人參

黃芪 各二錢 白朮 柴胡 各一錢 甘草少

右水煎服

加味逍遙散 治產後煩赤口乾耳鳴

如蟬者

當歸 酒炒 芍藥 酒炒 白朮 茯苓

柴胡 各一錢 香附子 陳皮

桔梗 各一錢 山梔子 三分 甘草少許

右入姜薄荷水煎服

正血飲 治產後血逆耳鳴

人參 地黃 川芎 丁香 良姜

黃芩 酒炒 陳皮 蒼朮 酒炒 肉桂

桂心 白芷 厚朴 當歸 白芍

甘草



右水煎服

●八物湯加柴胡氣血兩虛而耳鳴者

●血參保元湯 治產後氣血虛弱邪氣

乘之耳鳴頭痛者

人參 當歸 川芎 白朮 茯苓

黃芪 各二錢 香附子 陳皮各一錢

藁本 六分 其艸少

右入姜水煎服

●補中益氣湯 由產後中氣不足耳鳴

不止者

▲多夢

●益氣安神湯 治產後夜多夢寐睡臥

不寧此屬心氣虛而有痰故也

生地 麥門 酸棗仁 炒遠志

人參 黃芪 蜜炙 茯苓 各一錢 膽星 各

小草 六分 當歸 茯神 各一錢 王連 八分

右入姜棗水煎服

●清心蓮子飲 治產後每夜夢回祿汗

出如浴口苦咽乾者 出東井醫案集

石蓮肉 人參 各二錢 黃芪 蜜炙 二錢

麥門 地骨皮 車前子

黃芩 各一錢半 茯苓 二錢 其艸

右水煎服

●血參保元湯 治產後夢異像致心驚

煩悶不眠者

人參 當歸 川芎 白朮 香附



陳皮 茯苓 黃芪 甘草

乾姜 炒黑 石膏

右入生姜棗水煎服調辰砂末温服

▲驚悸怔忡

●養心湯 治產後心血虛少神氣不寧  
驚悸怔忡

黃芪 茯苓 半夏 當歸 川芎

茯神 各半 柏子仁 酸棗 炒

人參 遠志 五朱子 辣桂 各二錢

甘草 炙

右入姜棗水煎服

●妙香散 治產後心氣不足驚悸怔忡

方見士運

●茯苓散 治產後心虛怔忡不定言語

錯亂

人參 甘草 山藥 當歸 各二錢

遠志 茯苓 桂心 麥門 各五錢

右入姜棗水煎服○一方無山藥而有

芍藥

●一方 治產後血虛驚悸少寐

琥珀 沒藥 當歸 辰砂

右為末每服二錢白湯下

●一方 產後驚悸亂語精神不定用硃

砂為細末酒調服錢許

●茯苓補心湯 治產後神氣虛心血下

足怔忡驚悸者



●歸脾湯 產後怔忡驚悸健忘用之最  
有奇効也

▲虛汗不止

●麻黃根湯 治產後虛汗不止身熱發  
渴驚悸不安

當歸 黃芪 炒 麻黃根 牡蠣 煨

人參 苈艸 炒等分

右水煎服

●黃芪湯 治產後虛汗不止因陰虛而

得 黃芪 白朮 防風 熟地 牡蠣

茯苓 麥門 苈艸 炙

右入棗水煎服龔氏壽世有當歸

●當歸黃芪湯 失血過多真氣虛耗白  
汗不止者

黃芪 炒 芍藥 炒各 當歸 三兩

右水煎服

●黃芪六一湯 產婦失血過多盜汗者

王之

黃芪 六兩 苈艸 一兩

右水煎服

●十全大補湯 治產後氣血兩虛汗不

止者

●參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒或手

足逆冷大便自利或臍腹疼痛吃逆不

食或汗多發瘰等症



人參一兩 附子炮五錢

右入姜棗水煎服去人參加芪名其附湯

●人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗內熱嘔熱等症

人參 當歸 等分

右水煎服

●大補黃芪湯 產後氣血兩虛自汗

黃芪 炙人參 肉從容 山茱萸

白朮 炒 當歸 肉桂 零炒 五味子 炒

耳艸 炙 川芎 防風 各一錢 茯苓 一錢

熟地

右水煎服

丁方 治產後自汗盜汗胃氣虛弱非別藥則嘔吐不能入

當歸 黃芪 各一兩 麻黃根

右每服二錢水煎

●丁方 治產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸

耳艸 炙一兩 附子 炮五錢 桂心

芍藥 炒各一兩

右入姜棗水煎服

●止汗散

牡蠣 為末 小麥麩 八兩 炒黃

右每服二錢用猪肉汁調

●芪附湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或口



際發湧四肢逆冷或吐瀉肢痛飲食不  
入及一切虛寒等症

黃芪一兩 附子炮五本

右入姜棗水煎服

▲瘧病

●十全大補湯 治產後牙關緊急腰背  
反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多  
元氣虧損所致也

●當歸補血湯 治產後去血過多因無  
血養筋令四肢掣急口噤如瘧

黃芪一兩 當歸五本酒浸  
洗淨

右水煎服

●活人舉鄉舉散 治新產血虛發瘧

者汗後中風發瘧亦然

煎芥穗不拘多少微炒

右為末每服三五錢外以大豆黃卷以  
熱酒沃之六黃卷用汁調下其功如神  
一方只以好酒調服○按此太陽厥陰  
經藥也按本州荆芥能發汗破結氣下  
瘀血除風濕癰亦是攻邪之藥若血氣  
果虛之人亦非所宜也  
一方 產後因去血過多血虛發瘧者  
用此

人參 黃芪 生地 白芍酒炒  
香附子 當歸 川芎 白朮  
茯苓 陳皮 牛艸



百子  
右水煎服

中風

● 華陀愈風散 治婦人產後中風口噤  
手足愈癱如角弓或產後血暈不省人  
事四肢強直或心腹倒繫吐瀉欲死

荊芥

焙為末每三錢豆淋酒調服或童便服  
之口噤者灌之○豆淋酒用大黑豆不  
拘多少炒焦投好酒中○王氏指迷方  
加當歸等分水煎服○按產後多有血  
病身強癱瘓而似中風者宜用此藥通  
血脈而清神或加當歸者為然非外因  
則藥也

● 加味小物湯 治產後中風口眼不正斜  
者

依本方加附子荊芥少加防風羌活  
右水煎服○翠松子曰用八珍補氣血  
以為主少佐以疏風之藥尤產後中風  
良劑此丹溪先生方也

● 獨活湯 產後血氣俱虛易受風寒風  
傷乎筋則痠寒傷乎筋則疼故令口噤  
背反也此方上之

獨活

生薑

防風 秦艽

桂心

白朮

人參 苁蓉

當歸

附子

葛根 防己

右水煎服

中風



●加減續命湯 治產後中風不省人事  
一 口眼歪斜半身不遂語言蹇澀手足顛  
搦

杏仁 官桂 膽星 橘紅各八分

川芎 防風 人參 黃芩

附子 各一錢 甘草 五分

右入生姜水煎服

●祛風豁痰湯 治產後血虛風痰壅塞

似中非中

陳皮 瓜蒌仁 半夏 紫蘇子各八分

烏藥 貝母 防風 當歸各錢

右入生姜水煎臨服加一小鐘

●昔蘇養榮湯 治產後血虛

牽引或筋惕肉瞤或驚悸戰掉不止脉  
大無力或虛細皆是氣血俱虛不能榮  
養筋脉

當歸 川芎 白朮 人參 茯苓

地黃 陳皮 香附子 黃芪

辰砂 甘草

右入姜棗水煎服

●補中益氣湯 產後中風用之加減調

理取妙

四肢筋攣

十全大補湯 產婦筋攣臂軟肌肉起

動此氣血俱虛宜此湯

●加味逍遙散 治四肢掣急屬肝經風



熱血燥者

一方 治產後氣血不足風邪所襲肢節疼痛背項強直

防風兩 赤芍兩 桂心各半 羚羊角兩

川芎 羌活 當歸 酸棗仁炒

牛房子炒各

右水酒煎服○前方如未應當用八珍湯更不應用十全大補湯

▲瘈瘲

交加散 治瘈瘲或顛振或產後不省人事口吐痰涎

當歸 荊芥等分

右為細末每服二錢水一盞酒少許煎

至七分灌下神效

●輿柳吉并散 治一切失血筋緊急產後盜汗後搐搦 方見前

●機要增損柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐咬牙昏目異症

柴胡八錢 黃芩炒四錢 人參

半夏各三錢 石膏四錢 知母二錢

黃芩炒五錢 甘草炙二錢

右入姜棗水煎服

●八物湯 治產後瘈瘲陰血去多陽火熾盛筋無所養而致此者

依本方加牡丹皮鈞藤

●補中益氣湯 前症屬陽氣脫陷者宜



此

依本方加姜桂

十全大補湯 陽氣虛敗者宜此

依本方加桂附

脚氣

飛步飲 治產後虛極足軟不能行者

人參 白朮 土炒當歸 牛膝

蓮子 各一錢五分 去心

右入棗水煎服

大防風湯 治產後脚弱緩痛不能行

履或兩脚腫痛足脛枯腩一切麻痺痿

軟風濕換履之候服之其効如神

熟苳 一分 白朮 一分 羌活 五分 人參 五分

川芎 七分 附子 七分 防風 一分

牛膝 酒浸 當歸 酒浸 黃芪 一分

甘艸 炙五分 芍藥 一分 杜仲 姜汁炒 一分

右入姜棗水煎服

獨活寄生湯 治風邪內攻兩脛腫痛

或緩縱變急痺弱

獨活 桑寄生 牛膝 杜仲

秦艸 細辛 肉桂 川芎 芍藥

茯苓 人參 當歸 熟苳

防風 各等分 甘艸 減半

右入姜水煎服

八味丸料倍人參 治產後脚踝腫滑



行步艱辛

▲遍身疼痛

●極痛散 治產後走動氣血升降失常  
留滯閉節筋脉引急遍身疼痛甚則腰  
背強不能俯仰

牛膝酒炒 當歸 官桂 白朮炒

黃芪炒 獨活 生姜各五分 韭白一錢

其坤炒

右水煎服加桑寄生尤可○三因曰此  
方特非治產後氣弱血滯兼能大陽經  
感風頭痛腰痛自汗發熱者治之

●五積散 產婦遍身頭項作痛惡寒拍  
急脉浮緊此風寒之症也宜此湯○李

氏入門去麻黃加人參香附茴香桃仁  
木香治餘血不盡流遍身腰脚閉節疼  
痛

●和榮定痛湯 治產後血氣留滯於經  
絡經日不散故遍身疼痛腰重難轉動  
手足頑麻身熱

當歸 肉桂 白朮 黃芪 獨活

羌活 白芷 牛膝酒炒各一錢 川芎

木香 紅花 香附子各半 其州小

右水煎服

●四物湯加炮姜紅花桃仁澤蘭 薛已  
曰產婦遍身疼痛者以手按而痛益甚  
是血瘀滯也用之補而散之



●四物湯炮姜人參白朮 若按而痛稍緩此血虛也用之補而養之

●加減調榮湯 產後去血過多遍身骨節痛難轉側者是血虛不能榮養節骨也宜此湯

當歸 川芎 白朮 茯苓 陳皮

生地 芍藥 人參 各二錢 紅花

牛膝 乳香 各五分 桂 三分 香附

木香 各七分 甘草 二分

右水煎服

●愈痛丸 產後遍身痛腰背不得轉側

手足不能動搖此敗血流凝不散故也

主治之 去瘀黃麻人參 香附 黃芩 芍藥

當歸 白芍 羌活 川芎

香附 各二兩 肉桂 五錢 延胡

桃仁 各八錢 乳香 沒藥 各三錢

右為末以酒為丸每服二錢空心白滾湯下

十全大補湯 治產後氣血虛弱遍身疼痛者

▲腰痛

●十全大補湯 真氣虛邪乘之腰痛者宜此湯

●白氣散 產後腰痛多是惡血停積於兩腎空隙之處其痛板急不能轉側得熱物慰之則緩者是也主此湯



烏藥 當歸 桃仁 各一錢半 杜仲

牛膝 桂 各一錢 川芎 五分

右水煎加酒一杯服之

吃力加散

產婦腰痛腹脹善噫諸藥

皆嘔此脾虛血弱也用之奇効也蓋白

朮能補脾且利腰膈間血故也

白朮 炮黃

右米泔煎服

如神散

治產後惡血停滯腰痛

當歸 桂 延胡 等分

右為末酒調下

當歸黃芪湯

治產後腰膝疼痛不可

轉側壯熱自汗身體強氣短

黃芪 二兩 當歸 三兩 芍藥 一兩

右入姜水煎服

獨活湯

治產後風邪頭眩腰痛不可

轉側四肢沉重行步艱難

獨活 川芎 芍藥 炒 桂心 續斷

生姜 桑寄生 各六分 當歸

防風 各八分

右水煎服

如神湯

產後敗血不散或感風濕腰

腳冷痛者宜之

生料五積散加薤仁

濁活寄生湯 治產後腰痛

惡露不絕



●返魂丹 治產後惡露不絕

益母草

右為末煉蜜丸彈子大每服一九米飲

下

●逍遙散 治肝氣虛而不能藏血者

●木君子湯 治脾氣虛而不能攝血者

●神中益氣湯 治胃氣下陷而不能統

血者

●加味歸脾湯 治脾經鬱熱而血不

歸源者

●十全大補湯 氣血兩虛者主之

▲兒枕痛

●朱葉散 產後經一二日腹痛者惡血

停滯而未盡去也名曰兒枕塊宜此

蒲黃 炒 五靈脂 各等分

右為細末每服二錢熬成膏白湯化下

●活血湯 治兒枕痛有奇効

當歸 赤芍 桃仁 烏藥

牡丹皮 延胡 香附 各一錢

桂 木香 各五分 川芎 七分 枳殼 三分

右入薑水煎服○此東井翁治驗方也

翠杏子加乳香屢用屢得効

●延胡索湯 治兒枕痛

延胡索 當歸 各一錢 琥珀

蒲黃 炒各五分 芍藥 炒三分 桂心 二分 紅花 七分

右水煎臨服入酒少許



●單五靈脂散 治產後小腹疼痛者名  
兒枕痛醋糊為丸氣虛四君子湯血虛  
四物湯下○一方五靈脂香附子為末  
醋糊丸甚者加桃仁一云用神麴糊丸  
白朮陳皮湯下

●三聖散 治兒枕痛

當歸 肉桂 玄胡 各等分

石為末每服二錢熱酒或童便調下

●安平飲 治產後一二月肚腹絞痛瘀  
血凝滯

芫仁 紅花 山查 歸尾

益母草 各二錢

右酒水各半煎服

●逐瘀湯 治產後瘀血凝滯頭痛發熱  
胸膈不寬肚腹絞痛

當歸 紅花 生地黃 各二錢

官桂 烏藥 桃仁 各一錢

右酒水各一鍾煎服

●果神散 治症同前 方見血運

●十全大補湯 產後腹痛綿綿不絕如  
芒刺者氣弱無力乃空痛大虛症也宜  
此湯

▲心腹疼痛

●加味異功散 治產後胸膈疼痛

陳皮 人參 白朮 茯苓 當歸

川芎 甘草 木香



右水煎服

●大服寶湯 治素有宿寒因產大虛寒

搏血血凝不散上衝心絡所致心痛

桂心 遠志 吳茱 乾姜 獨活

熟地 當歸 芍藥 各一錢 耳艸

細辛 各三分

右水煎服○鶴溪陳氏云此方本出千

金其用生乾地黄耳熟地泥血安能去

痛又云以最密湯治血痛用失笑散効

多矣

●失笑散 治產後惡血上攻心腹作痛

攻牙關緊急欲死者

炒蒲黃 五靈脂

右為末先用好醋調二錢熬成膏入水

一盞煎七分食前熱服○蓬溪李氏曰

失笑散不獨治婦人心痛血痛凡男女

老幼一切心腹脇肋少腹痛疝氣并胎

前產後血氣作痛及血崩經溢百藥不

効者俱能奏効屢用屢驗真近世神方

也

●木積湯 治產後七情感傷血與氣并

心痛

木香 枳櫚子 玄胡 金鈴子

三棱 養木 厚朴 桔梗

川芎 當歸 芍藥 黃芩

耳艸



右水煎服

茯苓補心湯 治產後血虛心胸煩痛

熟料五積散加莪朮 治食滯寒熱心

腹痛

▲小腹痛

延胡索湯 治產後惡血凝滯臍下作

痛或作寒熱

延胡 桂心 各半兩 當歸一兩

右為末每服二錢食前用熱酒調下

失笑散九効

當歸養血丸 治產後瘀血心腹脹痛

臍脚疼痛

當歸 赤芍 牡丹 延胡 炒各

桂心一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服三四丸温

酒下

人參理中丸 治陽氣虛弱小腹痛

或脾胃虛弱飲食少思或去後無度或

嘔吐腹痛或飲食難化胸膈不利

人參 白朮 乾姜 炮 草朮 炙各

右每服五錢水煎服

丁方 產後敗血停留少腹作痛者

辰別研 琥 沒並研細 當歸

右為末每服二錢白湯下

●補中益氣湯

●十全大補湯



兩脇脹痛

八物湯 產後氣血俱虛脇痛者宜此  
湯或加青皮柴胡

四物湯加人參白朮柴胡 產後脇痛  
屬肝經血虛者宜此

四君子湯青皮柴胡 肝經氣滯脇痛  
者宜之

芎歸調血湯 治產後兩脇疼痛

當歸酒洗 川芎 白芍酒 地黃酒洗

白朮 茯苓 香附童便炒 青皮

肉桂 甘草

右入姜棗水煎服

活血湯 左脇下有塊作痛不移者此

以血也宜此湯

歸尾 赤芍 桃仁 牡丹 玄胡

枳殼 香附子各一錢 川芎七分 紅花

官桂 木香另磨 青皮各五分

右入姜水煎服

腸癰

薏苡仁湯 產後虛熱多有腸癰之患  
腹中疝瘕煩毒不安或脹滿不食小便  
澀者用此方可也縱非癰但疑是便可  
服就有差互亦無害

薏苡仁 五又 牡丹 桃仁各三

瓜蒌四又

右水煎服○崇川陳氏加白芍



●活血散瘀湯 治產後惡露不盡或經後瘀血作痛或暴急奔走或男子校後瘀血流注腸胃作痛漸成內癰及腹中大便燥者並宜服之

川芎 當歸 赤芍 蘇木 牡丹  
枳殼 瓜蒂 桃仁各一錢 茯苓六分  
沙參三分

右水煎服

●加味逍遙散 治產後小腹疼痛久不愈或腸癰麻乳而滴小便淋瀝

依本方加連翹 山梔 牡丹

●補中益氣湯

●十全大補湯

▲積塊

●四神散 治產後留血不消積聚作塊急切疼痛

當歸 乾姜炮 川芎 赤芍各半錢

石為細末每服二錢溫酒調下

●一方 治產後血痕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸八分 桂心 芍藥炒 血竭  
蒲黃炒各六分 延胡炒四分

右為末每服二錢空心酒調下

●葛氏方 治症同前

桂心



右為末每服一錢空心酒調下

●瑞竹堂方 治產後血塊腹痛

京芎炒 當歸炒 熟地 芍藥炒 各半兩

蒲黃炒 二錢

右為末每服三錢溫酒調下

●翠松經驗木補湯 治產後積塊疼痛

腹脇牽急諸治不効或素有塊之女子

因產用力大過邪氣乘虛發作疼痛不

可忍元氣衰薄者用之最有神効也

當歸 人參 川芎 白芍 地黃

白朮 茯苓 黃芪各一錢 肉桂一錢

莪朮二錢 甘草五分

右入姜棗水煎服○春抱子曰此方異

邦一官所傳授半井先生秘傳也予屢用屢驗也

▲血暈

●七味白朮散 治中氣虛弱津液短少

口乾作渴或因吐瀉所致

人參 白朮炒 木香 茯苓

甘草炒 藿香 乾葛各一錢

右水煎服

●清胃湯 治產後胃火甚渴者

當歸 生地 茯苓 天花粉

葛根 麥門 五味子 黃芪

甘草

右水煎服



●熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚  
弱眼眩飲食無味此方養血通氣回津  
補腎

熟地黃一升 人參四升 麥門二升  
甘州炙一升 栝樓根六升

石糯米一撮薑三片棗二枚水煎服  
四物湯加人參烏梅葛根天瓜粉 主  
產後虛渴

●竹葉歸芪湯 治胃氣虛熱口乾作渴  
惡冷飲食者

竹葉一錢 當歸一錢 黃芪一錢 白朮一錢  
人參各一錢 麥門七分 甘州炒五分

右水煎服

●四物湯白朮麥門牡丹 產後發渴屬  
出血過多虛火上炎者宜此

●小珍湯加麥門五味子 產後而虛發  
作渴者宜之

●調血生津湯 治產後血虛煩渴不止

津液枯竭者

當歸 白朮 茯苓 熟地 陳皮  
人參 麥門 五味子 天花粉  
葛根 蓮肉 白芍 烏梅

右水煎服

清心蓮子飲 治產後心煩發渴

▲ 乍寒乍熱

●增損四物湯 治產後陰陽不和乍寒



乍熱如有惡露未盡停滯胞絡亦能令寒熱但小腹有異

當歸 人參 芍藥 川芎

炮乾姜 各一兩 甘草 四錢

右入姜水煎服

●增損柴胡湯 治產後虛弱寒熱如瘧

食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮

川芎 芍藥 各等分

右入姜棗水煎服

●四物湯 主治陰虛血弱寒熱者小熱加

茯苓為君熱甚加炒乾薑為使○寒熱

晝詳夜甚者去芍加此胡為主

●當歸散 治產後氣血俱虛恐增寒熱

宜服此以去惡露

當歸 白芍 川芎 黃芩 各一兩

白朮

右為細末每服二錢童便入溫酒調下

●調衛湯 治產後發寒皆緣乳汁不行以

致多寒

木香 木通 枳殼 各八分 當歸

穿山甲 漏蘆 芫胡 各一錢

甘草 二分

右水酒各一鍾煎服

●木調經散 治產後惡露未消寒熱自

汗或肚腹作痛



大豆一兩半 扶神一兩 琥珀一錢

右為末每服二錢空心濃煎烏豆此為補湯調下

十全大補湯 產婦惡寒發熱血氣虛寒者用之加炮姜

加減調血湯 治產後因脾虛食傷大陰寒熱如瘧者

人參 當歸 川芎 白朮 香附

砂仁 陳皮 茯苓 薑 木香

甘艸

右水煎服

和血湯 治產後惡露未盡留滯經絡作寒熱小腹痛者

當歸 生地黃 川芎 牡丹皮

柴胡 人參 紅花 肉桂 各一錢

甘艸

右水煎服

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯心胸煩悶

知母 四錢 赤芍 各三錢

肉桂 一錢 甘艸 二分

右水煎或四物湯加柴胡黃芩亦好

小柴胡湯 治產後惡露方下忽然斷絕寒熱往來晝靜暮強狂言此乃熱入血室也 依本方加生芩

八解散 產後飲食停滯心煩飽悶而



惡寒發熱者宜此感冒寒熱亦用之有  
効也

●補中益氣湯 因陽氣不足陰氣上入  
於陽中而惡寒者宜此

●五積散 產後惡露未盡瘀血入於絡  
又感寒邪寒熱如瘧者用之惡露自下  
寒熱除也

●逍遙散 產後寒熱如瘧者用此最可  
也

●茯苓補心湯 治產後血虛朝熱

●加減四物湯 治產後陰虛發熱或日

間明了暮則發熱增寒

本方去芍加柴胡

▲瘧疾

●橘半飲 治產後瘧疾有奇効

當歸 芫胡 生地各八分 白芷

半夏 橘紅 山查 川芎各一錢

右入生姜水煎服

●加味逍遙散 治產後瘧疾

當歸 酒洗 白芍 酒炒 白朮 土炒

柴胡 酒炒 各一錢 川芎 青皮 各六分

甘草 炙五分 茯苓 二錢

右入姜水煎服。東井治一婦人產後  
患瘧已四發且泄日六七行小便益少  
大便秘脈弦數九味清脾湯合逍遙散



而愈

●**葷果飲** 治產後痲疾寒熱相半或熱多者

半夏 茯苓 艸蓂 甘草 陳皮  
川芎 白芷 各一錢 紫菀 良姜  
青皮 各六分 葛根 一錢四分

右入姜棗水煎服

●**人參養胃湯** 治產後痲疾外邪少飲食多者

蒼朮 厚朴 半夏 各一兩 陳皮 七錢半  
藿香 艸蓂 茯苓 人參 各五錢  
甘草 三分 烏梅 一箇

右入姜棗水煎服○龔氏回春此方有

當歸川芎

●**加減木補湯** 治產後虛弱久痲寒熱不多而但微熱者邪氣已無只宜服此

黃芪 人參 白朮 茯苓 當歸  
川芎 白芍 地黃 柴胡 黃芩  
陳皮 甘草

右入姜棗水煎服

●**補中益氣湯** 產後痲疾誤用攻擊必劑綿延久不愈用此有神驗也○發於夜間者倍當歸○汗多及寒重加桂枝倍黃芪○熱多倍柴胡加黃芩○渴加麥門天花粉

●**柴胡芎歸湯** 治產後夜間陰痲



柴胡 桔梗 當歸 川芎 芍藥  
 人參 葛根 白朮 茯苓 陳皮  
 厚朴 各一錢  
 紅花 苧州 各三錢  
 右入薑棗烏梅水煎服

傷寒

產後傷寒 決不可用汗下之劑以其氣血俱虛汗則亡陽而傷氣下則亡陰而傷血若犯麻黃大黃多致不救惟以和解為主治而以血藥佐之

香附 紫蘇 各一錢  
 白芍 柴胡 陳皮 各一錢  
 右入葱白三莖水煎服

逍遙散 半井翁曰產後傷寒有用之

錢氏白朮散 東井曰產後傷寒稍熱

退飲食無味或微惡寒者用之

黃龍湯 治胎前產後傷風寒表症

表裡症及汗後瘧後勞復餘熱

柴胡 黃芩 人參 各二錢 其炒一錢

右水煎服。氣虛合四君子湯。血虛合古昔歸湯。表邪將傳裡幾至胎動者加阿膠白朮黃芩。萬氏曰產後傷寒專以清熱安胎為主或汗或下各宜隨其五臟表裡所見脈症主治勿犯胎氣故在表發汗以香蘇散為主方半表半裡則和解之以黃龍湯為主方在裡



則下之以黃連解毒湯為主方此吾家秘之秘活人甚多

●八解散 治產後傷寒感冒頭痛身熱惡風多汗飲食無味

人參 白朮 茯苓 陳皮 藿香  
厚朴各二錢 半夏一錢 甘草

右入姜棗

●茯苓補心湯 治產後惡寒發熱咳嗽謔言此血虛挾風邪用之可

●芎歸調血飲 產後惡寒發熱或大熱

頭痛體痛如傷寒狀脈大無力者是氣血俱虛也俗子或謂為惡露未盡而用逐瘀劑或為傷寒而用藥者夭折人之

天年上件是勞傷血氣症候此方最可宜臨時加減

當歸 白朮 白茯苓 熟艾  
陳皮 人參 烏藥 香附子  
乾姜 炒黑 黃芪 甘草

右入姜棗水煎服

●補中益氣湯

▲ 葶勞

●猪腎湯 治產後日淺久坐視聽言語多或運動勞力遂覺頭項及肢節皮骨疼痛乍寒乍熱此是葶勞也主之

當歸 芍藥 生芩 各二兩 桂心 一兩  
猪腎 一雙去脂膜 葱白 二合



右水煎服

●增損柴胡湯 治產後虛弱寒熱如瘧食少腹脹

柴胡 人參 丹朮炒 半夏炒 陳皮

川芎 白芍炒各等分

右入姜棗水煎服

●十全大補湯 治產後羸勞四肢煩疼時發寒不思飲食

依本方加五味子麥門續斷

●自來本散 治產後羸勞頭目四肢疼痛寒熱如瘧

白茯苓兩 當歸一 川芎 桂心

白芍炒 黃芪炒 人參各半兩 熟地半兩

右入猪腎一雙姜棗水煎服

●當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體

疼痛日久不愈名曰褥勞

當歸身七錢 人參七錢 黃芪一兩

生姜五錢

右入羯羊肉一斤煮取清汁五大盞

肉粗入煎藥慢火煮取四盞分六服

●補中益氣湯 產後羸勞乍寒乍熱體

瘦遍身疼相咳痰不食等症用之尤妙

●黃芪建中湯 治產後諸虛不足發熱

或惡寒腹痛

黃芪炒 肉桂各一兩 白芍炒一兩

甘草炒七錢



右入姜棗水煎服

十全大補湯去芎加續斷牛膝鱉甲桑寄生桃仁為末猪腎一對去脂膜薑一片棗三枚水二盞煎至一盞入煎末二錢葱三寸烏梅半箇荊芥五穗同水煎空心服王產後勞役過度虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發渴盜汗寒熱如瘧臂膊拘急

△虛羸

上散湯 治產後虛乏不食四肢倦怠心腹陣痛

人參 芍藥 酒炒 肉桂 甘州  
生薑 各一 當歸 一及 生地 二

右人棗水煎服

八珍湯 治產後氣血虛羸潮熱夢遺面色痿黃喘欬中滿五心煩熱

人參 白朮 茯苓 甘州 炙  
當歸 芍藥 川芎 地黃

右入姜棗水煎服

佛手散 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽

當歸 黃芪 川芎 各一 柴胡  
前胡 各半 五味子

右桃柳枝二寸大棗烏梅各一枚姜三片水煎服

一方 治產後虛羸不生肌肉



黃芩 當歸 芍藥 人參 各三錢  
桂心 甘州炒 川芎 生芩 各四錢  
大棗 十二枚

右水煎服

●十全大補湯 產后氣血未復形體虛弱發熱惡寒等症宜此湯

●補中益氣湯 產後勞傷元氣肌肉消瘦發熱虛喘飲食不進等用之而宜補脾胃胃氣一健則血氣自生諸症自愈

▲嘔吐

世勝湯 治產後敗血散於脾胃不能運化腹脹滿悶嘔吐不定

赤芍 半夏 澤蘭 人參

陳皮 各一錢 甘州 炙一石

右入生姜水煎服

●加減抵聖湯 治產後去血過多而氣無所主聚脾胃惡心嘔吐

人參 半夏 各一錢 陳皮 一錢 甘州 炙  
右水煎服

●比和飲 治產後因食傷致胃虛不納穀數日間食即惡心嘔聞藥氣亦嘔者

人參 白朮 土炒 茯苓 神曲 各一錢  
藿香 陳皮 砂仁 各五分 甘州 炙二分

右用十年已上陳倉米一合順流水二鍾煎沸伏龍肝研細攪渾澄清取一盞加薑棗同煎七分稍冷服別以陳倉米



煎湯時時服之日進此藥二三服而愈  
十全大補湯 產後失血過多或病久  
血虛血不歸元而嘔者主之

依本方加半夏陳皮藿香○半并翁  
日氣血衰薄瘀血冲胃嘔吐者依本  
方加延胡索最有神驗也春抱子曰  
誠發前入之未發愚常用屢効

橘紅湯 治產後嘔逆

橘紅一兩 半夏 甘草 炒各  
右入姜水煎服

八味理中丸 治產後血氣俱傷五臟  
暴虛肢體羸乏少氣多汗纒產直至百  
日常服壯氣補虛止嘔吐

人參一兩 甘草 炙半兩 乾姜 炮一兩 白朮 二兩  
砂仁 一兩 茯苓 一兩 麥蘖 炒 神曲 炒 各一兩

右為末米糊為丸梧子大每服二十丸  
食前姜湯下有痰者宜加半夏

六君子湯 中氣不足聞穀氣嘔者

丁香散 治產後脾胃氣寒心腹脹滿  
悶嘔吐不止四肢倦怠飲食不進

丁香皮 人參 枳櫛子 白朮  
桂心 當歸 厚朴 西胡 各三  
良姜 及甘草

右水煎服

霍亂

白朮散 治脾胃傷吐瀉腹痛煩渴



足逆冷或大便不實

白朮 橘紅 麥門 人參  
乾姜 炮各一兩 甘草 半兩

右入姜水煎服

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食  
頭痛寒熱或霍亂泄瀉或痰疾

藿香 一錢 桔梗 大腹 紫蘓

茯苓 白芷 半夏 陳皮

白朮 炒 厚朴 各一錢 甘草 炙五分

右入姜棗水煎服

八解散 產後中氣虛飲食停滯吐瀉  
腹痛者宜此湯

理中湯 脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少

思肚腹膨脹

人參 白朮 乾姜 甘草

右水煎服

參苓白朮散 治產婦脾虛氣滯吐瀉  
煩渴

人參 白朮 炒 茯苓 山藥 藿香

葛根 升麻

右為末米湯調下

▲ 頭痛

當歸補血湯 治產後頭痛屬風與血  
虛者

當歸 香附 酒炒 白芍 生地

枯芩 酒炒 川芎 各一錢 防風 蔓荊子



柴胡各五分 荆芥 人參 白朮

藁本各四分

右水煎服

●加減四物湯 治產後頭痛血虛氣弱

痰癖寒厥皆令頭痛

四物湯去芍加羌活防風細辛香附

子白芷白朮人參其州

右水煎服○如有汗者加芍藥桂生姜

○痰癖頭痛加茯苓半夏生姜○熱痰

頭痛加白芷石膏知母○寒厥頭痛加

天麻附子生姜

●加味四物湯 治產後血虛頭痛

當歸 生地黄 白朮 羌活

防風 香附各三錢 川芎 細辛

白芷各一錢 牛艸少

右水煎

●益氣湯 治產後氣虛頭痛

人參 黃芪 當歸 細辛

肉桂各一錢 白朮 白芷 白芍

地黃 防風 香附子 羌活

川芎

右水煎

●薄芎湯 治產後頭痛惡風自汗鼻塞

者風邪所干也

薄芎三錢 防風 羌活 人參

獨活 香附 荆芥 地黃 白芷



白朮 川芎 各二錢  
當歸 細辛 各一錢  
其艸

右入姜棗水煎

●補中益氣湯 治產後胃氣虛弱飲食

少思陽氣微弱頭痛者

●八物湯 氣血兩虛頭痛者

●芎歸湯 治血虛頭痛者

●茯苓補心湯 治產後血虛挾風邪頭  
痛者

咳嗽

●異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久

患咳嗽或狀滿不食面浮氣逆等症

人參 白朮 炒 其艸 茯苓

陳皮各一錢

右入姜棗水煎服

●參蘇飲 產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此

風寒所感也宜此湯

紫蘇 一錢 陳皮 一錢 枳殼 一錢

桔梗 一錢 前胡 二錢 半夏 一錢

乾葛 二錢 茯苓 一錢 人參 木香

其艸

右入姜棗水煎服

●一方 治風寒咳嗽

其艸 桔梗 各六分 款冬花 四分

麥門冬 生地黄 各一錢 二分

右水煎服



●旋覆花湯 治咳嗽最良 方見下

●知母散 治惡血上攻咳嗽不已

知母 貝母 茯苓 人參 各半

杏仁 各一兩

右水煎服

●加味四物湯 治產後咳嗽陰血虛者

當歸 川芎 芍藥 地黃 各一錢

人參 白朮 陳皮 桔梗 各五分

右水煎服

●加味四君子湯 治產後咳嗽久不止

肺氣虛者

人參 白朮 茯苓 各一錢 川芎

當歸 各六分 桔梗 三分 甘草 二分

右入姜水煎服

●茯苓補心湯 治產後咳嗽痰喘發熱

當歸 川芎 芍藥 地黃 陳皮

半夏 茯苓 人參 紫蘆 葛根

前胡 桔梗 枳殼 各一

木香 各五分 甘草 三分

右入姜水煎臨服入竹瀝姜汁溫服○

醫鑑云產後血虛發熱咳嗽吐痰喘滿

心荒口乾加五味子麥門冬

●補中益氣湯 治產後脾肺虛而咳嗽

不止者風寒所感加桔梗紫蘆

▲喘促

●二味參蘆飲 治產後血入於肺面黑



發喘欲死者

人參一兩

蘇木二兩

右水煎服

芎藭湯 治產後榮血暴絕而喘息者

川芎 當歸 芍藥

右水煎服

奪命丹 治產後惡露不快敗血停凝

上薰於肺令喘急者 方見胞衣

參附湯 產婦喘促自汗手足俱冷常

以手護臍腹此陽氣虛脫宜之

旋覆花湯 治傷風寒喘嗽太盛坐臥

不寧

旋覆花 赤芍 前胡 半夏

荊芥 甘州 茯苓 五味子

杏仁 麻黃 各等分

右入姜棗水煎 有汗者去麻黃

六君子湯 治產後肺氣虛弱喘促者

人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏

桔梗 甘草

右入姜水煎服

補中益氣湯 治產後中氣虛寒喘促

依本方加炮薑肉桂○陽氣虛脫更

加附子

五味子湯 治產後喘促脈伏而厥

五味子 枳炒 人參 杏仁 各二錢

麥門 陳皮 各一錢



右入姜棗水煎服

▲口鼻黑鼻衄

●二味參蘇飲 產後口鼻起黑氣及鼻衄者蓋胃脈俠口繞承漿鼻準厲脾土鼻孔屬肺金此胃虛肺損氣脫血灰之症急用此方加附子

人參一兩 蘇木二兩

右水煎服

●十全大補湯

▲咳噫

●丁香散 治心煩咳噫

丁香 白豆蔻 各半兩 伏龍肝一兩

右為末煎桃仁吳茱萸湯調下

●羌活散 治咳逆

羌活 附子炮 茴香 炒各半兩

木香 白薑 炮各一錢

右水煎入鹽一捻服

●一方 產後咳逆

乾柿 一箇

右切研水煎熟啣之即止

●參附湯 薛已曰前症屬胃氣虛寒

惡候如用前件之諸藥未應急用此

人參二錢 附子一錢

右水煎服

●補中益氣湯 中氣不足吃逆者

●十全大補湯



血崩

● 芎藭當歸芍藥湯 治產後血崩頭暈  
眼暗

當歸 川芎 芍藥 等分

右水煎服

● 固經丸 治產後血氣未復而有房事  
及勞役損傷致血暴崩或淋瀝不止

沒藥 赤石脂 補骨脂

木賊 各半 附子 一枚炮

右為末米糊為丸梧子每服二十九溫  
酒或陳米飲下

● 熟地黃湯 治產後崩中下血不止心  
神煩悶頭目昏重

熟地 一錢 蒲黃 炒黑 五分 茯苓 五分

桂心 二分 甘草 一分 阿膠 一錢炒得鹿

蜜瓜 微炒 一錢 芍藥 五分 伏龍肝 七分

蠶布 一錢燒 當歸 一錢

右入竹茹一錢水煎服

● 加味道遙散 治肝火血妄行者

● 和血理氣湯 治產後忽欲下血成斤

相似崩漏者

當歸 白鷄冠花 芍藥 各

木香 三錢 生地 香附 人參

阿膠 各五 側柏葉 炒黑 蒲黃 炒黑 各

右水煎服或為末每二錢空心米飲下

● 烏金散 治產後崩中下血過多不止



麒麟竭 赤芍

松墨 煨醋滓

亂髮要男子者 燒灰

百炒霜 延胡

桂 當歸

鯉魚鱗燒為末 各等分

右搗羅為末每服二錢溫酒調下

●加味歸脾湯 治脾鬱不能統血者

●補中益氣湯 治脾氣虛弱不能攝血者

者

●十全大補湯 治氣血兩虛崩血過多不止者

多不止者

●加減調血湯 產後血去不止是血虛

血熱也宜此

當歸 川芎 白朮 茯苓

生地黄 陳皮 香附 乾姜 炒黑

人參 黃芪 山梔 炒阿膠 荆芥

烏梅 甘草

右入姜棗水煎服○血甚不止加地榆

入茅根汁磨墨調服可也

●補血湯 治產後血崩不止經數日淋

瀝不止

川芎 當歸 白芷 人參 升麻

續斷各一錢 甘草炙 芍藥 地黄

益母草各二錢

右入姜水煎○崩血甚加龍骨血餘灰

●伏龍肝飲 治產後去血多不止頭重

痛眩暈

地黄 伏龍肝 黃芪 赤石脂各



人參五分當歸三分阿膠炮白朮

艾葉 川芎各二分 甘草少

右入姜水煎服

▲四肢浮腫

●調經散 治產後虛浮蓋敗血乘虛停積府臟流注肌肉腐壞成水令人面目四肢浮腫切不可用導水泄利之藥是謂重虛其虛多致夭亡此藥主之

沒藥一錢 別研琥珀一錢 別研桂心 赤芍

當歸各一兩 別研細辛 鹿射香五分 別研

右為細末每服一錢匙姜汁溫酒童便和調服搗菴王氏曰產後面黃四肢浮腫但調經散血行腫消則愈

●正脾散 治產後通身浮腫及婦人大

病後脾氣虛弱中滿腹脹等病

菘朮 香附 便浸 茴香

甘草炙陳皮 各等分

右為細末每二錢燈州木通湯下

●行濕補氣養血湯 治產後水腫腹脹

脾虛不能制水氣虛不能運化此藥補元氣養心血健脾胃以培其本清濕熱平肝木利水道以治其標

八物湯去地黃加紫菀陳皮厚朴木

通大腹萊菔子木香海金沙

右入姜棗水煎服○東井翁曰產後腫脹諸藥不効者此方屢得奇効



●加減茱萸湯 治婦人臍氣本虛宿挾  
風冷胸膈滿痛腹脹絞刺嘔吐惡心飲  
食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄利不  
止少氣羸困及因生產臍氣暴虛邪冷  
內勝宿疾轉甚

吳茱萸 一兩 桔梗 乾姜 炮 甘草 炙

麥門 半夏 防風 細辛

當歸 酒炒 茯苓 牡丹 桂心 各半

右木煎服

●大調經散 治惡露不消敗濁成腫滿  
喘急煩渴小便不利

黑豆 炒去皮 一兩 琥珀 一錢

右為細末每服三錢濃煎此系煎黑豆

湯下

●漢防已散 治產後水腫

防已 猪苓 枳殼 桑白皮 各一

商陸 其艸 各三分

右木煎服

●一方 治血虛氣腫水腫

澤蘭 防已 各等分

右為末每服二錢溫酒調下醋湯亦可

●金匱加減腎氣丸 治脾腎虛寒腰重

脚腫濕飲留積小便不利或肚腹腫脹  
四肢浮腫氣喘痰甚或已成水症其効

如神

白茯苓 三兩 附子 半兩 牛膝 肉桂



澤瀉 車前子 山茱萸 山藥  
牡丹 各一兩 熟地 四兩

右為末和地黃膏煉蜜丸桐子大每  
服七八十九空心米飲下

消腫湯 治產後惡露不盡身體腫滿  
小便澀少

紅花 茯苓 瞿麥 羌活  
香附子 各三錢 肉桂 琥珀

陳皮 各錢  
右水煎服

血參澤瀉湯 治產後浮腫

當歸 一分 澤瀉 地黃 芍藥  
川芎 人參 白朮 各一分 莪朮 各二分

陳皮 一分 其煎少許

右入姜水煎服

一方 治產後浮腫順流血氣腫自消

琥珀 肉桂 當歸尾 白朮  
茯苓 瞿麥 各一錢 白芍 沒藥 各八分  
紅花 三分

右為末酒調下不飲酒者湯酒少許調  
下○一方有陳皮

補中治濕湯 治產後腫脹最有奇驗  
也

人參 白朮 各一錢 蒼朮 茯苓  
陳皮 麥門冬 當歸 木通 各九分  
黃芩 五分 厚朴 升麻 各三分



右水煎服

●丹溪曰產後浮腫必大補氣血少佐以蒼朮茯苓使水自降大劑白朮補脾壅滯者香附子半夏陳皮監之有熱當清肺金麥門冬黃芩之屬

●藿香王氣散 治產後腫滿

●六君子湯

▲泄瀉

●產後瀉利用

陳皮 白朮 茯苓 川芎

芍藥 酒炒 黃芩 滑石 甘草 炙

石水煎服○一方無甘草有乾姜按二物皆不可缺

調中湯 治產右瀉利腹痛

沉細

高良姜 當歸 桂心 白芍

附子 炮 川芎 各 芍藥 各五分

右入生姜水煎服

●胃風湯 產後當風致泄瀉腹痛者宜

此湯

白朮 茯苓 當歸 人參 芍藥

川芎 桂

右入粟百粒水煎服

●八解散 治產後脾胃不和飲食停滯

瀉利腹痛

人參 白朮 茯苓 藿香 陳皮



厚朴 半夏 甘州

右入姜棗水煎服

●治中湯 治產後食滯泄利腹痛者

人參 甘州炙 乾姜 白朮 陳皮  
青皮 各等分 宿砂

右水煎服

●益中散 產後暴卒泄瀉如

白朮 二錢 茯苓 芍藥 各一錢  
甘州炙 三分 陳皮 一錢半

右為細末米飲調下

●錢氏白朮湯 產後肌熱泄瀉者

人參 白朮 炒 木香 茯苓  
甘州炙 藿香 各一錢

右水煎服

●方治產後泄瀉

黃芪 白朮 茯苓 白芍 酒炒  
川芎 乾姜 炒 滑石 甘州炙 各

右水煎服

●黃歸調榮湯 治產後泄瀉

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 黃芪  
乾姜 炒 白朮 炒 茯苓 香附子  
甘州炙

右入姜棗水煎服

▲痢疾

●調榮湯 產後瀉痢甚者或多少不一  
甚猶可施治然瀉比於痢則痢為難



而瀉全有調理大抵瀉者以補脾為主  
而以消食藥佐之痢者則以扶脾消食  
為主而以血藥佐之此方王之也

茯苓 當歸 生地 山查 各一錢

赤芍 木通 香附 牡丹 各六分

川芎 甘艸 烏梅 五箇

右水煎服

●當歸芍藥湯 產後痢疾久不愈者宜  
此湯能通暢血脉養胃之劑

當歸 茯苓 白木 芍藥 各二兩

川芎 澤瀉 各四兩

右水煎服

●沉香桃膠散 治產后痢疾赤白裏急

後重疔刺疼痛等証

桃膠 瓦上燒 沉香 蒲黃 紙屑 各等分

右爲末每服二錢陳米飲調下

●白頭翁湯 治產後下痢虛極

白頭翁 茸艸 阿膠 各二兩 王連

秦皮 各三兩

右水煎服

●當歸調血湯 產後下利紅多不抱新  
久用之調和氣血甚効

當歸 一錢 川芎 黃芩 酒炒

王連 酒炒 桃仁 各一錢 芍藥 酒炒

升麻 三分

右水煎服



●加減平胃散 治產後血痢久不止宜服此滋養脾胃調和氣血之劑

白朮 厚朴 陳皮 各二兩 木香

枳實 各三分 車前 七錢 桃仁

人參 玉蓮 阿膠 茯苓 各五錢

右入姜棗水煎服

●胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃水穀

不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁

或下瘀血日夜無度

人參 白茯苓 芎藭 桂

當歸 白芍 白朮 各等分

右入粟百粒水煎服○此方名為治風

而實非治風乃補血和血益胃氣之藥

下血痢而挾虛者實可倚仗

●宜明王聖散 治產後下血痢不止者

此專主止血之劑

烏魚骨 炒 燒綿灰

血餘灰 汁脂者各等分

右每服一錢煎石榴皮湯調下

●良方加味四物湯 治產後血痢此補

血溫血之藥也

四物湯 加阿膠 艾葉

右水煎服○保命集一方四物內加槐

花玉連御米穀各等分

●一方 治產後赤白痢疾

黃芪 人參 白朮 炒 茯苓 粟穀



其艸 各等分

右水煎服

二方 治產後血痢小便不通膈腹疼痛

生馬齒莧

右一品搗取汁三合煎一沸下蜜一合

調頭服

加味果功散 產後下痢久不止者用

此方調理氣血自愈

陳皮 茯苓 人參 白朮 各一錢

當歸 白芍 炒各一錢半 砂仁 山藥 炒

蓮肉 炒各七分 其艸 炙二分

右入薑棗水煎服

黃連飲 治產後赤白痢膈下氣痛

當歸 八分 厚朴 黃連 各二分

肉豆蔻 十枚 大其炒 大其米 炒

右水煎服

逍遙散 治產後脾虛肝實血鬱下

痢

良方十全大補湯 治產後病痢日久

諸藥不愈六脉沉弱大凡痢脈宜沉宜

弱但此藥而愈

四君合四物加黃芪肉桂

右姜棗煎幾加白蜜半匙再煎數沸服

良方當歸補血湯 治姪下痢產後下

痢腹痛小便澀

糯米 一合 當歸 炒 黃芪 各二兩



石水煎服。按此二方不分經絡補血之劑。今人治痢而用此者甚多。殊不知血氣虛脫之人與夫胎前產後之證。此法不可無也。

大便秘

滋腸五仁丸 治產後血氣虛損大腸

閉塞傳道艱難

杏仁 桃仁 各一兩 栢子仁 五錢

松子仁 二錢 都李仁 一錢

橘紅 四兩 研末

右五仁別研為膏合橘皮末和勻再研煉蜜丸如梧子大每服十九清米飲下。一方加當歸稍五錢。

阿膠枳殼丸 治產後大便秘澀

阿膠 枳殼

右為末蜜丸桐子大滑石末為衣溫水

下二十九丸如或未通再服

十全大補湯 產婦去血過多而大便

燥秘者宜此湯

橘杏丸 治產後氣秘者

橘皮 杏仁

右為末煉蜜丸梧子大每服二十九丸

飲下

潤腸湯 治產後大腸枯燥大便不通

者

當歸 桃仁 棗仁 生芩



杏仁 各一錢  
青皮 二錢

右水煎臨服加生蜜五錢調服

●八珍湯加桃仁杏仁 產婦大便七日

不通飲食如常腹中如故此腹未滿也  
用之而愈

●加減調血湯 治產後去血過多太膈

乾燥無血大便閉結不通者

當歸 熟地 香附 牡丹 菔仁

生苜 杏仁 黃芩 紅花 麻仁

厚朴 枳殼 身炒

右水煎服

●一方 治產婦大便不通者

人麻仁 人參 枳殼 杏仁

右水煎服即通

●加味道道散 產後大便秘者妙

●來陳湯 產後便閉通而後宜此湯

當歸 芍藥 桃仁 陳皮 各

川芎 地黃 肉桂 人參 各

紅花 少許

右水煎服

▲小便不通

●利便飲 治產後津液燥竭小便不通

木通 當歸 車前子 生地 各一錢

白芍 川芎 白朮 澤瀉 各八

甘草 二分

右入灯心三十莖水煎服



●參歸升麻湯 治產後虛熱小便不通

人參 當歸 生地 知母 酒炒

黃柏 酒炒 赤茯苓 猪苓 澤瀉

枳殼 牛膝 山梔 各一錢 升麻 少許

甘草 減半

右入灯心一團水煎服

●橘紅散 治脾氣不利小便不通

橘紅

右為末每服二錢空心温酒下

●一方 治肺氣不利小便不通者

杏仁 十四箇

右去皮尖炒食之

●十全大補湯 產後小便數日不通諸

藥不効者用此有神驗也此下產春抱子師傳之秘授屢得奇妙也

●木通湯 治產後小便益不通陰閉疼痛者

滑石 當歸 木通 各二錢 瞿麥 少許

枳實 二分 肉桂 一分

右水煎服

●補中益氣湯 產婦元氣虛而不能輸

化者宜此湯或六味丸兼進

▲大小便閉

●桃仁散 治膀胱積滯血澁大小便秘

桃仁 葵子 滑石 苳櫚子

右為末每服二錢空心葱白湯調下



產婦大小便不通諸藥不應將危矣令  
飲人乳而通一用牛乳亦通

人參散 治產後二便不通身體發熱  
目旋頭重心空

川芎 白芷 桔梗 當歸 各一  
人參 茯苓 各半升

右水煎服

加味四物湯 治產婦二便閉腰脚重

當歸 川芎 芍藥 地黃 木通  
茯苓 牛膝

右水煎服

加味道遙散 加桃仁通炒治二便閉

虛

補中益氣湯 產婦虛弱二便不通者  
有神効也或兼用六味地黃丸

遺溺

補中益氣湯 產婦遺溺失禁屬脾肺  
陽虛者主之

六味丸 前症屬肝腎陰虛者宜此

加味道遙散 前症肝脾血虛者宜此

參芪湯 治產婦氣虛遺尿者

人參 黃芪 茯苓 當歸 酒洗  
熟地 白朮 陳皮 升麻 各一錢

肉桂 各五分 益智仁 八分 草薢 三分

右入姜棗水煎空心服

白薇芍藥湯 治產後虛熱小便不禁



白薇 芍藥

右為末溫酒下

●補脾飲 治胞破小便淋瀝者

生絹黃色者一尺 白牡丹用根并皮 白芨各一錢

右水一碗煎至絹爛溫服後忌言語否則無効

●滋榮養衛湯 治產婦身體虛瘦遺尿

失禁及小便頻數夜陰殊甚

人參八分 白朮一錢 山藥一錢

益智七分 山茱萸酒浸七分 當歸酒洗一錢

白芍酒炒一錢 黃芩蜜炙一錢 酸棗仁炒七分

甘草炙四分

右水煎服

▲小便頻數

●桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便頻數或

為遺尿

桑螵蛸三十箇炒 鹿茸酥炒 黃芪各二兩

牡蠣煨 人參 厚朴 赤石脂各二兩

右為末每服二錢空心米飲下

●補中益氣湯 膀胱氣虛小便頻數用

之可也

●六味九 肝腎陰虛小便頻數者宜此

●加味道遙散 治脾氣有熱小便頻數

者宜此

●一方 產后小便頻數者



益智仁

右為末米飲下

●車前散 治產後小便數及出血

車前子 黃芩 蒲黃 生地

蛎礪 芍藥 等分

右為末米飲下

●桑白皮散 治產後尿數遺尿

黃芪 麻仁 桑白皮

茯苓 人參 厚朴 赤石脂 各二

右為末米飲下 一方茯苓作伏龍肝

●一方 治產後小便不禁

雞屎 燒灰

右空心酒服方寸

●一方 右同症

雞尾毛 燒為末酒下

▲淋症

●白茅湯 治產后淋疾

茅根 八兩 薏麥 茯苓 各二

桃膠 滑石 苈州 各一

冬葵 人參 各二 石首魚腦骨 各二

右入姜灯心水煎服

●滑石散 治熱淋

滑石 五分 通艸 車前子

右為末以漿水調服

●瞿麥飲 治小腸有熱小便澀痛或為

血淋



藜麥 黃芩 冬葵子 各二兩

通州 二兩 大棗 十二枚

右水煎服

●加味逍遙散 治產後因熱客工解水

道溢痛或腫痛出膿者

當歸 酒洗 芍藥 酒炒 白朮 茯苓

柴胡 各一錢 牡丹 梔子 各五分

甘草 稍二分

右入生姜薄荷水煎服

●補中益氣湯 產婦膀胱之氣虛損不

能運用水道故滯而不通而成諸淋也

用此湯補元氣則水道運行而愈

●十全大補湯 治產婦虛弱患淋諸藥

不効者最有神驗也

▲陰脫王門不閉

附腫痛

●補中益氣湯 產後生腸不收皆由氣

虛血弱所以懸下也但養氣和血其物

自收宜此湯

依本方去柴陳加川芎

●八珍湯 治產後子腸不收者

依本方加升麻防風以酒炒黃芪為

君

●十全大補湯 產後王門不閉氣血虛

脫者

●補元湯 治產後王門不閉

人參 三錢 川芎 熟地 白朮



紫河車 芍藥 各一錢  
五味子

升麻 各三分

石八棗水煎服

當歸黃連湯 治產陰脫 謂陰戶官中脫下也

當歸 芍藥 黃芪 人參 各三錢

升麻 半錢

右水煎服未收再服

當歸散 治婦人陰脫又名病癩

當歸 黃芩 芍藥 各一兩

蝟皮 半兩燒存性 牡蠣 煨一兩

右為末溫酒或米湯調下忌登高舉重

硫黃散 治產後勞陰脫

硫黃 烏賊魚骨 各半 五味子 二錢

右為細末參患處

硫黃湯 治產後玉門不斂

硫黃 四兩 吳茱 兔絲子 各二兩

肥床子 一兩

右水煎洗玉門

四物湯 加防風薑本治產後陰痛

右水煎服

加味逍遙散 婦人元氣充實初產下

門不閉腫炊作痛小便不利此肝經濕

熱壅滯加車前牛膝

桃仁膏 治產後陰腫妨悶

桃仁 枯礬 五倍子

右礬倍為末研桃膏拌勻傳之。春抱



按一方有五味子無五倍子

一方 治產後陰挺出腫痛

五倍子 蛇床子 荊芥 枳殼

右各五錢水煎溫洗之

●新產陰門挺出不收數日衆方不應者以馬膏塗之即入收

▲脫肛

●參茸湯 治產婦用力過度脫肛者

人參 黃芪蜜水炒 當歸 生芩

白朮 芍藥炒 茯苓各一錢 升麻

桔梗 陳皮各五分 甘草各三分

右入姜棗水煎食煎服

●補中益氣湯 治產後脫肛溫肺補腸

胃

依本方加柯子樗根皮○一婦素有

痔難產數日脫肛腫痛出水中氣下

陷依本方加茯苓芍藥而愈

新產肛門翻出不收者以馬膏塗之

即入收

▲乳汁不出

●當歸補血湯 產後無乳者氣體怯弱

婦宜此湯

當歸 二錢 黃芪 一兩

右入葱白十莖水煎服

●玉露散 治乳脈不行身體壯熱頭目

昏痛大便澀滯



早土

人參 茯苓 桔梗 芍藥各一錢  
甘州 炙六分

右水煎服

成煉鍾乳散 治乳婦氣少血衰脉虛  
不行乳汁絕少

成煉鍾乳粉

右研細抄二錢濃煎瀉蘆湯調下

化痰湯 治產後氣血盛壅閉乳汁不  
行

瓜棗仁 柴胡 木通 桔梗

瞿麥各二錢 陳皮 青皮 白芷

茯苓 連翹各一錢 甘州

右入姜煎頻服 更摩乳房

益榮湯 治婦人屢經產血氣虛弱乳  
汁通少

當歸 瓜棗仁 芍藥各三錢 地黃

麥門 糯米各二錢 人參一錢 甘州

右水煎 或瓜棗根末一品每服一錢  
米飲下

柴胡飲 歲少初經產乳房脹乳脉不  
行者風熱也

葛根 薄荷 川芎 麥門各二錢

陳皮 香附子 柴胡 通州

白芷 桔梗 瓜棗仁 人參各一錢

甘州

右水煎



消風散 治產後感風邪乳房腫痛

牛膝 三錢 荊芥 一錢 防風 一錢

其艸

右水煎服 早不散成乳癰

十全大補湯 治產婦形體羸瘦乳汁不出者

乳自出

十全大補湯 產後乳汁自出屬氣血

兩虛者宜之

加味逍遙散 前症屬肝經血熱者

補中益氣湯 前症屬胃氣不足者

歸脾湯

乳岩

逍遙散 治乳房腫痛

連翹湯 治產後乳汁內結腫硬疼痛

者

連翹 升麻 各一錢 玄參 芍藥

白欬 防已 射干 各五分 杏仁

其艸 各五分

右水煎服

十六味流氣飲 治乳岩

當歸 川芎 芍藥 黃芪 人參

肉桂 厚朴 桔梗 枳殼 烏藥

木香 檳榔子 白芷 防風

紫蘓 其艸

右水煎服



十全大補湯

歸脾湯

八味丸

胃風湯

補中益氣湯

前症已潰破元氣薄弱者選用上件五方而有神驗也

▲牙齒

十全大補湯 產後氣血俱虛而火動

齒齦浮動者宜此湯

逍遙散 產後發熱齒痛日晡益甚者

脾經血虛也加升麻

補中益氣湯 治胃經虛熱齒牙作痛

○壽世加熟地牡丹芍藥茯苓

▲口舌

八物湯 產後氣血俱虛口舌生瘡或

齒齦腫潰者宜此湯

七味白朮散 產後口舌生瘡口乾飲

湯不食者乃胃氣虛而不能化生津液

也宜此湯

補黃散 治產後脾胃虛熱口舌生瘡

畏冷飲食者

人參 白朮 炒各 錢 陳皮 甘州 炒各 五分

右入姜棗水煎服

補中益氣湯 治產後口舌生瘡發熱

惡寒不思飲食者此中焦虛熱也



依本方加麥門冬五味子

●**升麻湯** 治產後上膈壅毒口舌生瘡  
咽喉腫痛

升麻 白芍 人參 桔梗  
乾薑 各一錢 甘草 三分

右入生薑水煎服

▲咽喉

●**加味小珍湯** 產後喉痛服清熱劑益  
甚者此膀胱經血虛也蓋膀胱之內脈  
上行至喉而還矣此方主之

人參 白朮 茯苓 當歸 川芎  
芍藥 地黃 各一  
柴胡 各六分 黃柏 酒炒 五分 甘草 三分 牡丹

右水

●**補中益氣湯** 治產後咽喉腫痛飲食  
無味肢體倦怠面目紅口乾等症

●**加味其桔湯** 治產後咽喉腫痛飲食  
難下

甘草 六分 桔梗 三分 玄參 六分 川芎  
陳皮 瓜蒌 各三分 柴胡 一分

右水煎服

右方凡九百二十有餘種



該書望十丈夫莫望一婦人何言乎  
 蓋婦人之病與男子不同者亦有數焉  
 所謂月信不調經閉癥瘕崩中帶下胎  
 前產後等證男子無之且其性執滯而  
 妬嫉愠怒是以自然脾氣虛衰心血不  
 足百病蜂起矣此比男子十分難治不  
 亦言之深乎故古今方書皆異卷別貯  
 方然汗牛充棟之書非常人所能盡蓄  
 况良方非一書所能盡載也知雖欲初  
 學之徒臨症求應方卒難得乎因茲攝  
 陽下津春抱子採掇有功之良劑數百  
 首而題之曰婦療方彙也敢非饋識者  
 賢哲閱之勿謂爾云

平安書舖玉枝軒醫書藏板目錄

證治雜編	王宇泰著 百冊	痘疹證治大還	陳震述 一卷
證治要決	戴元禮著 六冊	痘疹金鏡錄	翁世撰 三冊
濟陰綱目	汪懋濟著 八冊	痘疹神書	張介賓著 六冊
濟瀉集頭書	與堂著 二冊	醫方聚要	余須玄竹著 十二冊
濟瀉集鈔	名古學醫撰 七冊	丹溪心法附餘	廿五冊
同發語欽	關本抱子著 十冊	王宇泰醫鏡	金沙王正 著四冊
醫宗粹言	羅周彥撰 二十冊	正傳或問頭書	苗村撰 著一冊
大成誦和語欽	關本抱子述 四冊	本神綱目	和名入 二十九卷
病名彙解	芦川正立著 八冊	本神備要	汪叔菴撰 二冊
婦人產帶記	所直陳朝 撰集一冊	片玉本艸	芦川正立編 壹卷
幼科發揮	萬全著 四冊	本艸正編	張介賓著 壹冊



幼科良方

張介賓撰 壹卷

嬰童百問

魯伯嗣著 十冊

方書摘要

小川宗本著 五冊

傷寒全集

張介賓著 三冊

增補方書摘要

未刻

傷寒條辨

方有執述 八卷

切要方義

上山澤作 五冊

傷寒六書辨疑

七冊

頭書切要方義

未刻

傷寒活人書

朱奉儀著 八卷

石室祕錄

陳士鐸撰 十卷

傷寒方彙

太倉良宗撰 壹冊

諸血祕錄

馮兆張述 壹冊

婦人方彙

春抱子著 一卷

勞瘵祕錄

同先生著 二卷

十四經和語抄

岡全抱子著 四冊

大成論

盧陵孫子著 一冊

新方彙

張介賓著 一冊

編註金匱要略

李南星撰 十卷

大成論診解

五卷

醫仙圖像

正田盧安著 一冊

日用集驗方

王夢蘭述 一冊

寓意州

喻嘉言撰 六冊

獲命方

張介賓撰 三卷

百乙選方

王瓊著 二十冊

治痢神書

張介賓撰 合刻三卷

治瘧以喻

張介賓述 一卷

纂言方考

名古屋玄醫著 二冊

痧脹玉衡全書

携李郭志遠 右陶著 五冊

同頭書

北山壽安著 二冊

宜明方論

劉河間撰 五卷

瘧痢證治大還

同編 二卷

嚴氏濟生書

嚴用和著 八冊

瘍科選粹

陳文治作 十二卷

試驗切要祕方

王夢蘭著 一冊

醫壘元戎

王好古著 一冊

增補古今方揮

一冊

活幼心書

曾世榮德顯著 三冊

救扁瓊言

費建中著 一冊

醫書大全

熊宗立作 十二卷

針灸資生經

王叔權述 七卷

醫方詳解

春抱子著 十一冊

二火辨妄

吉村恂益撰 三冊

病家要覽

中山三柳述 一冊

醫方明鑑

四卷

補注原病式

相慶堂撰 五冊

刪補眾方規矩

北山壽安著 四冊

魯府禁方

四冊



種杏仙方

四冊

博愛心鑑

大明魏直著  
二冊

啓迪集

道正撰  
十冊

萬氏家抄

四明萬表選集  
八冊

骨繼療治重法記

高志登著  
三冊

本草雋

牛任山安著  
一冊

雷真君活人方

陳玉鐸作  
未刻

活刺經驗

附和漢人參考  
三州加藤玄順著  
一冊

脉神章

張介賓著  
未刻

傷寒緒論

張介賓著  
未刻

痘疹一覽

陰有闕著  
未刻

同續論

張介賓著  
未刻

滑伯仁素門抄

未刻

婦人新編

張介賓著  
未刻

痘疹證治大還

陳元慶述  
未刻

傳忠錄

張介賓著  
未刻

京都書舖

堀川通高辻上町

植村藤右衛門

江戸出店

通本石町十軒店角

植村藤三郎

大坂出店

高麗橋壹町目

植村藤三郎



