




增補醫方月鑑

十武
345



70

75

80

85

90

武庫
345
卷

敘



予退食之暇日讀

醫方朗鑑竊補其

闕拾其遺以藏之

於家也久矣頃門

人數輩乞上梓以

公於天下予不得

拒輯為一卷題

增補醫方朗鑑

55

60

65

70

75

80

85

90

9

敘

予退食之暇日讀

醫方朗鑑竊補其

闕拾其遺以藏之

於家也久矣頃門

人數輩乞上梓以

公於天下予不得

拒輯爲一卷題曰

增補醫方朗鑑鳴



呼雖未免魚魯之
誤其於活人手段

豈多讓古乎豈多

讓古乎

文化五年八月

丹波賴理撰



增補醫方朗鑑

目錄

風病

諸風附風熱 賊風 附風毒 偏

風附風退 緩弱 風非 附癱瘓

風急 附腰痛 風 附失音 柔

反張風濕及痺 脚氣 風毒

脚弱痺嶺南瘴氣 脚氣 脚氣

嘔逆及衝心煩悶脚氣腫滿

脚氣上氣及心腹脹急風狂

風驚恐失志喜忘及妄語癩

風眩附頭目 頭回風 風多汗及

虛汗三應疹 白虎 雜療 脚

氣灸法三六

傷寒三九

發汗附春冬 宜吐 宜下 發

汗吐下後附 不得眠 宜溫 雜

治咽喉痛及口瘡 煩渴 便不利 汗不止及盜汗

噦下利及膿血 鼻衄吐唾血

目錄

及下血 差後病 虛煩 虛羸
不得眠 目生翳 匿瘡 陰傷易
瘡 兼日醫 勞復食復 百合病 狐惑
雜療 六四

天行病 八四

喉咽痛 咳嗽 發斑 八五

溫疫 八七

霍亂 九九

吐利 腹痛吐利及心腹痛 霍
亂不止及洞下洩痢 脈絕手足

冷 煩躁及煩渴 乾嘔 轉筋
上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣

中焦熱及寒洩痢 下焦熱及虛

寒 灸法 八八

痢

水穀痢 水痢 冷痢 白痢 十

熱毒痢 赤痢 赤白痢 血痢

及膿血痢 久痢 洩痢不禁及

腸滑痢 許仁則方 雜療 十五

瘧 十八

療瘧及許仁則方 五藏及胃瘧

溫瘧 山瘧瘧 久瘧 勞瘧 三

及發作無時瘧 牝瘧 灸瘧 三

雜瘧

嘔吐噦 二五

乾嘔 嘔噦 噦 嘔吐逆 噫

醋 反胃 三一

膈氣 三三

五膈 七氣 五噎 諸噎 骨

哽 誤吞物 三六

飲癖 三七

痰飲 痰厥頭痛及風痰 溢飲

支飲 留飲 酒癖飲及癖飲 四五

飲癖 癖結 痰癖 四六

積聚癥瘕奔豚 四八

積聚 癥瘕 奔豚氣 四九

胸心腹病 五四

胸痺 胸痛 心痛 諸氣心痛 五八

腹痛 心腹痛及脹滿痛 心腹

脹滿及鼓脹 腹內諸氣及脹不

目錄

二

下食ラ胸脇肋痛及滿悶寒疝ラ咳嗽ラ・七二

咳嗽 卒咳嗽ラ暴熱咳及ラ久效ラ嗽短氣ラ咳逆及厥ラ

逆飲逆ラ咳嗽膿血ラ咳嗽唾拍ラ上氣ラ・八十

上氣 上氣效身面腫滿ラ上氣

喉中水鷄鳴ラ因食飲水上氣ラ短氣

上氣及氣逆不得臥ラ嗽上氣ラ肺痿ラ肺癰ラ

五臟勞ラ・八十九

肝 筋極ラ膽ラ附髓ラ虛實心ラ脈虛實ラ

小腸虛實ラ脾ラ肉極ラ胃ラ肺ラ

氣極ラ大腸及虛實ラ腎ラ骨

極ラ精極ラ附失ラ尿精ラ夢失精ラ

膀胱虛實ラ腰痛ラ・十カ

虛勞ラ・十八

五勞七傷 補益ラ羸瘦ラ少氣

不足及裏急ラ腎氣不足 陰痿ラ小便利ラ不得眠ラ盜汗ラ汗出

不止ラ骨蒸ラ尸注

骨蒸ラ尸注ラ附鬼氣ラ諸瘧ラ・三三

永病ラ・三四ラ

水腫 風水ラ皮水ラ卒暴腫滿ラ

水氣 水腫欬逆上氣及氣滿胸ラ

急ラ石水 水蠱ラ水腫大小便ラ

澀 雜療ラ・四丁

黃病ラ・四五

諸黃ラ急黃ラ黃汗ラ黃疸ラ女

勞疸及黑疸ラ酒疸及穀疸ラ許

仁則療諸黃方ラ

血病ラ・四九

吐血唾血及衄血下血尿血

消渴ラ・五二

消渴 渴利虛經脈澀成癰膿ラ

消中消渴ラ渴後小便多恐生諸

瘡ラ虛勞小便白濁如脂ラ

淋ラ・五七

諸淋ラ石淋ラ血淋ラ熱淋ラ勞

許仁則淋及五淋灸法
小便病：六

小便不通 小便不利

色如紅 胞轉 小便不禁 小便赤

便數多及許仁則方 遺尿尿淋

大便病：六十五

大便難及不通 關格大小便不

通 灸法

風病

●諸風 附風熱風寒

小續命湯 治卒中風欲死 身體緩急 口目不正 舌強不能語 奄奄忽忽 神情悶亂 諸風服之皆驗 令人處方

麻黃 防己：黃芩

桂心 芍藥 甘艸 芎藭

杏仁：防風 附子：生薑

右十二味 咬咀 以水一斗二升 先

煮麻黃三沸 去沫 內諸藥 煮取三

升 分三服 甚良 不瘥 更合三四劑

必佳 取汗 隨人風 輕重 虛實 也 有

人脚弱 服此方 至六七劑 得差 有

風疹家 天陰 節變 輒合服之 可以

防瘡 一本云 恍惚者 加茯神 遠志

如骨節煩疼 本有熱者 去附子 倍

芍藥：小品千金翼同 深師古今錄

芍藥：驗有白朮 不用杏仁 救急無

西州續命湯 治中風 痺身體不知

風病 諸風

自収口不能言、冒昧不識人、拘急背痛、不得轉側方。

麻黃六兩、石羔四兩、桂心二兩、甘艸

芎藭、乾姜、黃芩、當歸各二兩

杏人三枚

右九味、咬咀、以水一斗二升、煮取麻黃、再沸、掠去上沫、後下諸藥、煮取四升、初服一升、猶能自覺者、勿熟眠、臥可厚覆、小汗出已、漸減衣、勿復大覆、可熟眠矣、前服不汗者、後復一升、汗後稍々五合、一服安穩、乃服勿頓服也、汗出則愈、勿復服、飲食如常、無禁忌、勿見風、并治上氣欬逆、若面目大腫、但得臥服之大善、凡服此湯不可者、人口噓其背、湯則下過矣、病人先患冷汗者、不可服此湯、若虛羸人、但當稍與五合為佳、間有輒行此湯、與產婦及羸人、喜有死者、皆為頓服三升、傷多且湯濁不清故也、但得清

澄而稍々服、微取汗者、皆無害也、胡洽方、古今錄驗、名大續命湯、按外臺有生、姜、郁、李、人、防、風、三、味、療、中、風、人、臍、及、四、肢、拘、急、不、隨、緩、氣、風、方、云、

治心風虛熱發即恍惚煩悶、半身不仁、寧急方、千

荊瀝、竹瀝各升、枸杞根、白皮

生麥門冬升、香豉合、人參、茯苓

苓、梔子、人黃、芎藭

桂心、細辛、杏仁、防風

石羔、白鮮皮各兩、生姜、甘艸

右十八味、咬咀、以水二斗、和竹瀝、煮取三升、分四服、相去如人行六七里、凡五劑間、三日服一劑、一兩防、三兩

治虛熱恍惚驚邪恐懼方、同

荊瀝升、竹瀝升、香豉合、牛黃

鐵精、天門冬、竜齒、茯苓

梔子各兩

右十二味、咬咀、以水二斗、煮取三升、風病、諸風

升去滓下牛黃鐵精更煎五六沸
取二升七合分五服温服去十里
久

薏苡仁湯外療諸風方

薏苡仁五合 葶藶 生姜 茯神
西生犀角末二兩 烏梅七枚 麥門冬
心竹瀝各三兩 白蜜一合

右九味切以水八升緩煮取二升
七合汁絞去滓內竹瀝白蜜攪調
細々飲之不須限以迴數多少亦
不限食前食後亦不限晝夜冷暖
盡又合服亦不限數多少此飲但
合服勿輕尤佳以防風候忌食米
醋油脂陳敗難消等物以前方療
暴風手足癱瘓言語蹇澀神情恍
惚遊風散走或出諸四肢瘡痺有
所不獲似緣風候即合服之十日
服一劑甚佳吳昇處

●賊風附歷節風

大定心湯千 治心氣虛悸恍惚方

人參 茯苓 茯神 遠志

赤石脂 竜骨 乾姜 當歸

甘艸 白朮 芍藥 桂心

紫苑 防風各三兩 大棗三十枚

右十五味咬咀以水一斗二升煮

取三升半分五服日三夜二

乾姜附子湯千 治心虛寒風半身不

遂骨節離解緩弱不收便利無度

口面喎邪方

乾姜 附子各兩 桂心 麻黃各四兩

右五味咬咀以水九升煮取二升

分三服三日後服一劑

荊瀝湯同 治心虛寒陰氣傷寒損心

驚悸悸語聲寬急混濁口喎冒昧

好自笑反風傷心方

荊瀝三升 母姜一升 麻黃 白朮

芎藭各五兩 防風 桂心 升麻

茯苓 遠志 人參 菴活

當歸各三兩 防己 甘艸各三兩

風病 賊風附歷節風 三

右十五味、咬咀、以水一斗五升煎
麻黃兩沸、去沫、以下諸藥、煮取三
升、去滓、下荊瀝、姜汁、煎取四升、分
四服、日三夜一、

半夏湯 千温中下氣、治脾寒、語聲憂
懼、舌本捲縮、噎喜無度、惛悶恍惚、
脹滿方、

半夏 大麻仁熬研 生姜各

芍藥 茯苓 五味子 桂心

橘皮各三 白朮四 附子五 甘艸二

大棗三

右十二味、咬咀、以水一斗二升、煮
取三升、去滓、下大麻仁脂、更上火、
一沸、分二服、

烏頭湯 治寒疝、腹中絞痛、賊風入
腹、攻五臟、拘急、不得轉側、叫呼發
作、有時使人陰縮、手足厥逆方、

烏頭十五枚 大棗十 甘草二 芍

藥四 桂心六 老姜一

右六味、咬咀、以水七升、煮五味取

三升、去滓、別搗烏頭去皮、四破蜜
二升、微火煎、令減五六合、內湯中
煮、兩小沸、去滓、服一合、日二間食
強者三合、以如醉狀為知、不知增
之、

甘草湯 外療心腹絞痛、賊風入腹、脹
滿拘急、不得氣息、並轉筋寒、中下
重、温中止痛、利大小便方、

甘草炙 防風各 吳茱萸 乾地

黃 芍藥 當歸 細辛 乾

姜各一

右八味、咬咀、以水五升、煮取三升
分再服、良、忌海藻、菘菜、生葱、菜、蕪
荑、

防風湯 治身體四肢節解如墮、腕
腫、按之皮陷、頭眩短氣、温々悶乱、
欲吐者方、

防風 白朮 知母 桂心各

芍藥 芍藥 杏仁 甘草各

半夏 生姜

右十味，咬咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。古今錄驗方無半夏杏仁芎藭，用附子二枚為八味。

羌活湯 同 治中風身體疼痛，四肢緩弱不遂，及產後中風方。

羌活 桂心 芍藥 葛根 麻黃 乾地黄 各三兩 甘草 二兩 生姜 五兩

右八味，咬咀，以清酒三升，水五升，煮取三升，溫服五合，日三服。

防己湯 同 治風歷節，四肢疼痛，如槌鍛，不可忍方。

防己 茯苓 白朮 桂心 生姜 各兩 甘草 三兩 人參 二兩 烏頭 七枚

右八味，咬咀，以苦酒一升，水一斗，煮取三升半，一服八合，日三夜一，當覺焦熱瘡，忿々然，慎勿恠也。若不覺復，合服以覺乃止。凡用烏頭，皆去皮熬令黑，乃堪用，不然至毒，人宜慎之。千金翼不用苦酒。

烏頭湯 味酸則傷筋，傷則緩，名烏頭湯。

曰泄，鹹則傷骨，傷則痿，名曰枯。枯泄相搏，名曰斷泄。榮氣不通，衛不獨行，榮衛俱微，三焦無所御，四屬斷絕，身體羸瘦，獨足腫，大黃汗出，脛冷，假令發熱，便為歷節也。○病歷節不可屈伸主之。一云治脚氣疼痛，不可屈伸。

麻黃 芍藥 黃耆 各五兩 烏頭 一枚

右五味，咬咀，四味以水三升，煮取一升，去滓，內蜜煎中，更煎之，服七合，不知盡服之。

延年療歷節風，四肢頭面腫方。外黃耆 一分 獨活 八分 生地黄 切三兩 鼠粘子 三升 暴乾 豆豉 一升 熬

右五味，搗篩為散，一服方寸匕，飲汁日二服，加至二三匕，忌蕪荑、蒜、麩、猪肉。一方無鼠粘子。

治濕風，風體痛，欲折肉，如錐刀所刺方。附子 乾姜 芍藥 茯苓

風病 賊風附歷節風 五

人參 甘草 桂心色 白朮色
右八味、咬咀、以水八升、煮取二升、
日三服、一方去桂心用乾地黄二兩
犀角湯同 治熱毒流入四肢、歷節腫痛方、

犀角二兩 羚羊角一兩 前胡 黃芩
梔子仁 射干各一兩 大黃 升麻
各一兩

右九味、咬咀、以水九升、煮取三升、去滓分三服、

石羔湯逐風毒方

石羔雞子大 雞子二枚 甘草一尺 麻黃
杏仁三枚

右五味、咬咀、以水三升、破雞子、內水中、烱令相得、內藥、煮取一升、服之、覆汗、令不出、燒石、慰取汗、出為佳、

●風毒

淡師芍藥湯外療中毒風腫、心腹痛、達背迫氣、前後如疼痛方

芍藥 細辛 桂心 甘草炙

當歸 吳茱萸 獨活各二兩 乾地

黃二兩 生姜五兩 桃仁四十枚 去皮

右十味、切、以水九升、煮取三升、分為四服、宜利者、加大黃二兩、忌海藻、菘菜、生葱、蕪荑、生菜、

●偏風附 脹退、緩弱、攣急、腰脚痛

延年急療偏風、膈上風熱、經心藏恍惚、神情天陰、心中愴々如醉、不醒方、同

淡竹瀝三升若熱多用竹瀝冷多則用煎瀝 羚羊

角一兩 石羔十枚 茯神六分

右四味、以水一斗、合竹瀝、煮取一升五合、去滓、食後欲消、分為三服、常能服之、永不畏風、發忌酢物、

候氏黑散金 治大風、四肢煩重、心中

惡寒、不止者、外臺治風顛

菊花一分 白朮一分 細辛三分 茯苓二分

牡蛎三分 桔梗八分 防風一分 人參三分

礬石三分 黃芩五分 當歸三分 乾姜三分

風病 風毒 偏風 六

芎藭三分 桂枝三分

右十四味，杵為散，酒方寸匕，日一服。初服二十日，溫酒調服，禁一切魚肉、大蒜、常宜冷食。六十日止，即藥在腹中不下也。熟食即下矣。冷食自能助藥力。

仲景三黃湯千 治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食方。

麻黃半斤 黃芩六兩 黃耆二兩 細辛二兩

獨活一兩

右五味，㕮咀，以水五升，煮取二升，分三服。一服小汗，兩服大汗，心中熱加大黃半兩，脹滿加枳實六銖，氣逆加人參十八銖，心悸加牡蛎十八銖，渴加桔萸十八銖，先有寒加八角附子一枚。此方秘不傳。

獨活寄生湯同 夫腰背痛者皆由腎氣虛弱，臥冷濕地，當風得之，不時速治，喜流入脚膝為偏枯冷痺，緩

弱疼重，或腰痛，掌脚重痺，宜急服此方。

獨活三兩 寄生古今錄驗 杜仲
牛膝兩 細辛 秦艽 茯苓
桂心 防風 芎藭 乾地黄
人參 甘草 當歸 芍藥各三兩

右十五味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服，溫身勿冷。風虛下利者，除乾地黄，服復取菟藟葉，火燎厚安席上，及熱眠上，冷復燎之。冬月取根，春取莖，熬以之佳。其餘薄藥不及菟藟蒸為愈也。諸處風濕亦用此法。新產竟，或患腹痛不得轉動，及腰脚寧痛，不得屈伸，痺弱者宜服。此湯除風消血，肘後有附子人參，當歸，甘草，當歸。

● 風非附 癱瘓風柔風

竹瀝湯千 治四肢不收，心神恍惚，不知人，不能言方。

竹瀝二升 生葛汁一升 生姜汁三合

風病 風非七

右三味相和溫暖分三服平且日
晡夜各一服夕訖覺四体有異似
好次進湯方

竹瀝升一生葛汁合五芎藭 防己

附子 人參 芍藥 黃芩

甘草 桂心各二兩 生姜各四兩 羚羊角

石羔六兩 杏仁枚 麻黃 防風

各二兩半

右十六味、咬咀、以水七升、煮減半、
內瀝、煮取二升五合、分三服、取汗
間五日、更服一劑、頻與三劑、漸覺
少損、仍進後方、

竹瀝升三 防風 升麻 羚羊角

防己 桂心 芎藭各三兩 麻黃

右八味、咬咀、以水四升、合竹瀝、煮
取二升半、分三服、兩日服一劑、常
用加獨活三兩最佳、此方神良、頻
進三劑、若手足冷者、加生姜五兩、
白朮二兩、若未除、更進後方、

竹瀝升一 甘草一本作根三兩 人參 芎藭

獨活 升麻各二兩 防風 麻黃

芍藥各 生姜 石羔 羚羊角

防己 桂心 黃芩 附子一本

作杏人 白朮各一

右十七味、咬咀、以水八升、煮取二
升半、分三服、相去如人行十里久、
更服、若有氣者、加橘皮、牛膝、五加
皮、各一兩、

獨活煮散千 治諸風痺方、

獨活八兩 芎藭 芍藥 茯苓

防風 防己 葛根各 羚羊角

當歸 人參 桂心 麥門冬

石羔各 磁石十兩 甘草三兩 白朮五兩

右十六味、各切、剉、分為二十四分、
每分入生地黄、切一升、杏仁二七
枚、以水二升、煮取七合、或日晚、或
夜中、或日一服、或間日服、無所忌、

石羔散外 療柔風体痛、自汗出方、

石羔二兩 甘草二兩

風病

風痺

八

右二味，搗篩為散，以酒服方寸匕，
可以七服。武家黃素方。

●風懿附 口噤失音口喎尸厥

獨活湯干 治風懿不能言，四肢不收，
手足攣曳方。

獨活四兩 桂心 芍藥 桔梗根

生葛各兩 生姜六兩 甘草三兩

右七味，咬咀，以水五升，煮取三升，
分三服，日三。

石南湯同 治六十四種風注，走入皮

膚中，如蟲行，腰脊強直，五緩六急，
手足拘攣，隱疹搔之，則作瘡，風尸
身癢，卒風面目腫起，手不出頭，口
噤不能言方。

石南 乾姜 黃芩 細辛

人參各兩 桂心 麻黃 當歸

芍藥各兩 甘草二兩 乾地黄六兩 食茱

萸三兩

右十二味，咬咀，以水六升，酒三升，
煮取三升，分三服，大汗勿怪。

治中風，口噤不知人者方同

芥子一升 酢三升

右二味，煮取一升，薄頭以布裹之，
日一度，肘後以治卒不得語。

治中風面目相引，口偏著耳，牙車急，
舌不得轉方同

獨活三兩 竹瀝 生地黄汁各一升

右三味，合煎取一升，頓服之，即愈，
又方同

大皂莢一兩，去皮子，下篩，以三
羊大酢和，左喎塗右，右喎塗左，乾
更塗之。

滾師四逆湯外療卒中風不能言，厥
逆無脈，手足拘急者方。

山茱萸 細辛 乾姜各一兩 麥

門冬一升 甘草二兩

右五味，切，以水七升，煮取二升，分
為四服，忌海藻、菘菜、生葱菜。

攝生飲回 治一切卒中，不論中風，中
寒，中暑，中濕，及痰厥、氣厥之類，不

省人事初作即用此方無熱者用

南星濕紙半夏姜湯木香各一

蒼朮生細辛石菖蒲甘艸

生各

右判一劑生薑七片水煎溫服痰

盛如全蝎炙二枚仍先用通關散

搯鼻若牙緊者用烏梅肉搯和南

星細辛末以中指蘸藥擦牙自開

烏藥順氣散治男子婦人一切風

氣攻症四肢骨節疼痛遍身頑麻

頭目旋暈及癱瘓痰語言蹇澀筋

脈拘攣又治脚氣步履艱難脚膝

軟弱婦人血風老人冷氣上攻胃

臆兩脇刺痛心腹膨脹吐瀉腸鳴

麻黃去根陳皮去白烏藥去木

川芎白殭蚕去霜枳殼去穢

白芷甘草炒桔梗各一乾姜炮半

右為細末每服三錢水一盞生薑

三片棗一枚煎至七分溫服如四

時傷寒增寒壯熱頭痛肢體倦怠

加葱白三寸同煎併服出汗差如

閃挫身體疼痛溫酒調服遍身瘙

痒抓之成瘡用薄荷參葉兼服常

服疎風順氣孕婦不可服

奪命湯治中風卒倒不省人事口

面喎斜失音不語但吐涎沫或口

噤不開目瞑垂死一切風疾

黑豆合烏雞糞馬牙消研

竜胆去芦頭研各一分

右四味先將雞糞及豆同炒熟次

入竜胆馬牙消拌勻以酒三盞煎

二盞去滓分三服不拘時溫服

救生散治卒中風

白礬湯洗去半夏滑焙天南星各等

右三味生用為細散每服以好酒

一盞藥末二錢匕生薑三片煎七

分通溫灌之當吐涎扶令正坐經

一復時不得令臥如臥則涎難出

良久再依法煎藥一錢後嘗服半

錢

風病 風懿

治中風病不語喉中如曳鋸口中沫出取涎丸方同

天南星大者一枚去浮皮剉中面用火逼酢藜蘆分一乾黃色判

右二味搗研為末用麪糊丸如梧桐子大每服三丸溫酒下良久吐涎為效吐不止用冷葱湯呷即止

白礬散同治初中風失音不語昏冒不知人先宜吐風痰令省覺次可服諸湯散吐痰

白礬二兩生用生薑一兩連皮搗碎水二升煮取一升二合

右二味先細研白礬為末入濃煎生薑湯研瀉分三服旋々灌須臾吐痰毒眼開風退方可救治若氣衰力弱不宜用猛性藥吐之設吐得痰毒別增痰勢

防風湯局治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱甚効此藥溫

和不虛人

防風去芦半夏湯洗獨活去

秦艽去苗麻黃去根節升麻

白芍藥人參去甘草炙遠志

去防己黃芩石羔當歸

白朮各一兩

右為鹿末入半夏片子令勻每服肆錢水二中盞生薑茶片煎至一盞瀘去滓取清汁陸分入射香末少許食前臨臥帶熱服

獨活湯聖治中風腰脚疼痛不可忍足脛痛痺

獨活去芦黃耆剉半防風去茯苓

去桂皮去白鮮皮去羚羊角各

一分酸枣人炒半桃人一兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服空心日午夜臥各一

麻子湯子治大風周身四肢掣急風行在皮膚身勞強服之不虛人又

風病 風懿

治精神蒙昧者方

秋麻子三升 防風 桂心 生姜

石羔 橘皮各二兩 麻黃三兩 竹葉

葱白各握香鼓一合

右十味，哎咀，先以水二升半，煮麻子令極熟，漉去滓，取九升，別煮麻黃兩沸，去沫，內諸藥汁中，煮取三升，去滓，分三服，空腹服，當微汗，汗出以粉塗身，極重者，不過三兩劑，輕者一兩劑，瘥，有人患大風，賊風刺風，加独活三兩，比之小續命湯，准當六七劑。

白微湯

本毒方

人平居無苦疾，忽如死

人身不動，搖然不知人，目閉不能開，口噤不能言，或微知人，惡聞人聲，但如眩暈，移時方寤，此由己汗過多，血少，氣併於血，陽独上而不下，氣壅塞而不行，故身如死，氣過血還，陰陽復通，故移時方寤，名曰爵冒，亦名血厥，婦人多有之，宜

之

白微

當歸

洗去芦，薄切，焙乾各一兩

人參

去芦半兩 甘草一分

右鹿朮，每服五錢，水二盞，煎至一

盞，去滓，温服。

●角弓反張

倉公當歸湯千 治賊風，口噤，角弓反

張，身強直，瘳者方。

當歸

防風各半兩

独活二兩

附子

一枚，細辛二兩，麻黃三兩

右六味，哎咀，以酒五升，水三升，煮

取三升，服一升，口不開者，格口內

湯一服，當蘓，二服小汗，三服大汗，

栝蒌桂枝湯金 太陽病，其証備，身體

強，几々然，脈反沉遲，主之。

栝蒌根

桂枝

芍藥

甘柳

二兩，生姜二兩，大棗十二枚

右六味，以水九升，煮取三升，分温

三服，取微汗，汗不出，食頃，啜熱粥

發之。

風病 角弓反張

葛根湯金 太陽病無汗而小便反少，氣上衝胸，口噤不得語，作剛瘧主之。方見傷寒

大承氣湯同 瘧為病，胸滿，口噤，臥不着席，脚挛急，必齧齒，可與此湯。方見傷寒

● 風濕及痺

麻黃加木湯金 濕家身煩疼，可與此湯發其汗為宜，慎不可以火攻之。

麻黃三兩 桂枝二兩 甘草二兩
去節 去皮 炙

杏仁七十箇 白朮四兩
去皮尖

右五味以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸藥，煮取二升半，去滓，溫服八合，覆取微似汗。

麻黃杏仁薏苡甘草湯同 病者一身盡疼，發熱日晡所劇者，名風濕。此病傷於汗出當風，或久傷取冷所致也，可與此湯。

麻黃去節 甘草二兩 薏苡仁半兩
而湯泡 炙 杏仁十箇 皮尖炒

右剉麻豆大，每服四錢匕，水盞半，煮八分，去滓，溫服，有微汗，避風。

防己黃耆湯同 風濕脈浮，身重汗出，惡風者，主之。

防己一兩 甘草二兩 黃耆二兩 白朮半兩
去 炙

右剉麻豆大，每抄五錢匕，生姜四片，大棗一枚，水盞半，煎八分，去滓，溫服，良久再服。○喘者，加麻黃半兩，胃中不和者，加芍藥三分，氣上衝者，加桂枝三分，下有陳寒者，細辛三分，服後當如蟲行皮中，從腰下如水，後坐被上，又以一被繞腰以下，溫令微汗差。

緩師療風濕百節疼痛，不可屈伸，痛時汗出方。外

芍藥四兩 甘草三兩 芎藭四兩 附子四兩
三兩炮 四破

右四味，哎咀，以水五升，煮取二升，分再服，相去十里，頓服，忌同。

附子湯 同 療風濕相搏、骨節煩疼、不得屈伸、近之則痛、白汗出、短氣、小便不得利、惡風、不欲去衣、或一身流腫方、

桂心三兩 白朮三兩 附子二枚炮 甘草三兩
右四味、咬咀、以水六升、煮取三升、分三服、微汗即止、若汗出煩者、稍服五合、驃騎使、吳諧、以建元、八年八月二十六日、始覺如風、至七日卒起、便頓倒、髀及手皆不隨、通引腰背疼痛、通身腫心多滿、至九月四日服此湯一劑、通身流汗、即從來所患悉愈、本方不用生姜、既有附子、今加生姜三兩、忌同、

天門冬湯 同 療風濕、體疼、惡風、微腫、

天門冬三兩 葛根四兩 生姜三兩 桂心四兩 麻黃三兩 芍藥二兩 杏仁五枚 甘草二兩
右八味、切、以水一斗、煮取三升、分三服、取汗、忌鯉魚、深師無芍藥、名天門冬湯

黃耆湯 治血痺、陰陽俱微、寸口關上微、尺中小緊、外症、身體不仁、如風狀方、

蜀黃耆 人參要畧無 芍藥 桂心查 生姜六兩 大棗十二枚
右六味、咬咀、以水六升、煮取二升、服七合、日三服、令盡、

治遊風、行走無定腫、或如盤大、或如甕、或著腹背、或著臂、或著脚、悉主之方、

海藻 茯苓 防風 獨活 附子 白朮查 大黃五兩 常歸 鬼箭查

右九味、咬咀、以酒二斗、漬五日、初服二合、漸加以知為度、千金翼防己湯外主風濕、四肢疼痛、李急浮腫方、

木防己三兩 茯苓四兩 芍藥三兩 桂心三兩 甘草六兩 大棗十二枚 麻黃三兩 桑根白皮切、二升
風病 角弓反張 十四

右九味以水一斗二升煮麻黃減一升內藥煮取三升分三服々漸汗出令遍身以粉々之慎風冷

脚氣

千金第一竹瀝湯外療兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

甘草二兩秦艽一兩葛根一兩附子二枚

黃芩一兩麻黃一兩防己一兩杏仁五枚

防風半兩升麻一兩茯苓三兩細辛一兩

竹瀝五升桂心一兩乾姜一兩

右十五味切以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汁忌海藻菘菜

猪肉酢物生菜生葱翼方無茯苓杏仁有白木

又第二大竹瀝湯同療卒中風口噤不能語言四肢緩縱遍痺掣急痛

風經五臟恍惚恚怒無常手足不隨方

竹瀝二斗獨活二兩芍藥二兩桂心二兩

防風二兩麻黃一兩白朮二兩葛根二兩

而二生薑三兩茵芋二兩細辛二兩茯苓三兩

而三防己一兩烏頭一兩炮一兩人參一兩石羔一兩

而一黃芩二兩芎藭一兩甘艸二兩

而一黃芩二兩芎藭一兩甘艸二兩

右十九味切以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一狀相當即服忌同翼方無白朮

又第三竹瀝湯同療風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩疼四肢不

攀皮肉不仁口噤不能語方

當歸二兩防風三兩生薑八兩白朮三兩

人參二兩黃芩三兩芎藭二兩細辛二兩

桂心二兩茯苓三兩甘艸二兩附子二枚

秦艽三兩葛根五兩升麻二兩麻黃二兩

蜀椒二兩

右十七味切以甘竹汁一斗九升煮取四升分五服忌同翼方有芍藥通神無茯苓黃芩芎藭

石膏湯干治脚氣風毒熱氣上衝頭

面々赤矜急鼻塞去來々時令人昏憤心胸恍惚或苦驚悸身体

風病 脚氣

十五

戰掉手足緩縱或酸痺頭目眩重
眼反鼻辛熱氣出口中或患味甜
諸惡不可名狀者友

石羔 竜胆 升麻 芍藥
貝齒 甘州 鼈甲 黃芩
羚羊角各二兩 橘皮 當歸各二兩
右十一味 咬咀以水八升煮取三
升分為三服

蕪恭凡人八月氣自漸定非意氣
大發者作半夏獨活湯多唾或睡
覺心忪心悶風熱故也竹葉湯食
後服之為佳如不已作後湯服之
方

麥門冬三兩 茯苓二兩 石羔四兩
小麥五兩 竹葉切 生姜二兩
右六味切以水五升煮取一升二
合食後分再服相去七八里久忌
酢物

又尋常氣滿三日兩日服一劑湯方同
檳榔七枚 橘皮一兩 厚朴二兩 生姜四兩

吳茱萸二兩
右五味切以水二升煮取一升二
合分三服相去五六里久復服之
此藥性温去冷氣

●風毒脚弱痺

千金麻黃湯外療惡風毒氣脚弱無
力四肢不仁失音不能言毒氣衝
心有人病者但一病相當即服第
一服此湯次服第二第三第四方
麻黃一兩 防風二兩 大棗三十枚 當
歸二兩 茯苓三兩 升麻二兩 芍藥二兩 白
朮二兩 芍藥二兩 麥門冬三兩 黃芩二兩
桂心二兩 杏仁三十枚 甘草二兩

右十四味切以水九升清酒二升
合煮取二升半分四服日三夜一
覆令小汗粉之莫令見風忌海藻
菘菜生葱桃李雀肉酢物

第二服獨活湯同

獨活四兩 乾地黄三兩 芍藥二兩 葛根
桂心三兩 生姜五兩 麻黃二兩 甘
風病 風毒脚弱痺 十六

草二兩

右八味切以水八升清酒二升合煮取二升五合去滓分四服日三夜一犯之一世不愈忌同脚弱特忌食瓠子藪菜

第三服兼補厚朴湯并治諸氣欬逆氣嘔吐方同

吳茱萸升一半夏高洗乾地黄二生

姜一芎藭二桂心二厚朴二當歸二人參二黃耆三甘艸三

右十一味切以水二斗煮猪蹄一

具取一斗二升去上肥内清酒三

升合煮取三升分四服相去如人行二十里久忌同

又第四服風引湯兼補方同

獨活四人參二附子一大豆二

桂心二防風二芍藥二當歸二

茯苓三黃耆二乾姜二甘艸三

升麻三

右十三味切以水九升清酒三升

合煮取三升半去滓分四服相去二十里久忌同

越婢湯同療風痺脚弱方

麻黃六石膏半斤白朮四大

附子一枚生姜三大棗十五枚甘艸炙

右七味切以水七升先煮麻黃再

沸去上沫内諸藥煮取二升分三

服覆取汗一方用附子二枚忌海

藻菘菜猪肉冷水桃李雀肉等此

景方本云越婢加朮湯又無附子

胡洽云若惡風者加附子一枚多

加白朮

唐侍郎大續命湯同主手足牽急及

不隨此方苦脚氣上又中風四肢

壯熱如火牽急或縱不隨氣衝胸

中方

當歸二芍藥一桂心一麻黃一

去芍藥一石羔一生薑三人參一

防風二黃芩一杏仁四甘

風病 風毒脚弱 十七

右十二味切以水九升煮取三升
去滓分四服忌海藻菘菜生葱等

小續命湯同療中毒風口不能言咽
中如塞或緩或急身體不自收胃
味不知痛處拘急不得轉側方

麻黃二兩 甘草兩 桂心兩 石羔
二兩 芎藭二兩 乾姜二兩 黃芩一兩 當歸
二兩 杏仁二枚

右九味切以水九升煮取二升去
滓分二服薄取汗莫見風不差復
作禁如藥法無療久失聲上氣呃
逆面目腫皆愈服湯已多体虛互
兼補忌海藻菘菜生葱等

千金風引湯同療兩脚疼痛腫或不
仁拘急屈不得行方

麻黃二兩 吳茱萸一兩 獨活二兩 秦
朮一兩 石羔二兩 杏仁二枚 白朮三兩 茯
苓二兩 桂心一兩 人參一兩 細辛一兩 乾
姜二兩 防風一兩 附子一兩 芎藭一兩 甘
草二兩 附子二兩

右十七味切以水一斗六升煮取
三升分三服取汗佳忌海藻菘菜

生葱生菜桃李雀肉醋等物

小風引湯同主中風腰脚疼痛弱者
方

獨活二兩 防風二兩 當歸二兩 茯苓三
兩 大豆二升 人參三兩 乾姜二兩 附子一
兩 石斛二兩 甘草二兩

右十味切以水九升酒三升煮取
三升去滓分四服夕別如人行十

里久忌海藻菘菜猪肉冷水醋等
一有無乾姜石
斛有桂心黃耆

千金大醫甲湯同療脚弱風毒壅痺
氣上及傷寒惡風温毒及山水瘴
氣熱毒四肢痺弱方

醫甲一兩 防風一兩 麻黃一兩 白朮
一兩 吳茱萸五合 知母一升 麻一升 大
東三枚 貝齒七枚 茯苓一兩 橘皮一
升 芎藭一兩 杏仁一兩 犀角半兩 生薑
三兩 人參一兩 赤小豆三升 青木香半
兩

風病 風毒脚弱痺 十八

射香三銖 羚羊角一分 犀角一分 麥門冬二兩
大黃二兩 薤白五枚 烏頭一枚 石羔二兩
雄黃一分 半夏二兩 洗當歸一兩 芍藥一兩
甘草一兩

右三十一味，切以水二斗，煮取四升，去滓分六服，相去十里久，得可止。一方用大黃二分，畏下可用一分也。一方用羚羊角二分，毒盛可用三分也。忌海菜、苋菜、苾菜、桃李、雀肉、酢物、羊肉、錫等。一方有山菜、母升麻、橘皮等。莫翼方無知、麝、當歸、葶藶。

小驚甲湯 同 療身體虛脹，如微腫，胸心痞滿，有氣壯熱，少腹厚重，兩脚弱方。

驚甲三兩 升麻三兩 黃芩三兩 麻黃三兩
羚羊角二兩 前胡四兩 桂心三兩 烏梅三枚 杏仁三兩 薤白二兩

右十味，以水一斗，煮取二升七合，去滓分三服。此常用若体強壯，須利者，加大黃二兩，忌葷菜、生葱。

濁活湯 治脚痺方。

獨活四兩 當歸 防風 茯苓
芍藥 黃耆 葛根 人參
甘草各二兩 大豆二升 附子一枚 乾姜二兩

右十二味，以水一斗，清酒二升，合煮取三升，分三服。風緩湯同。治脚弱，拳体痺不仁，熱毒氣入臟，胸中滿塞不通，食即嘔吐方。

獨活 麻黃 犀角各三兩 一角半 升大束 烏梅各二枚
桂心 鼈甲 升麻 橘皮
枳實 甘州 吳茱萸 大黃
各一兩 生姜 石羔各七枚 貝齒七枚

右十七味，以水一斗，煮取四升，取四升分五服，日三夜二，不差至三劑必瘥。烏頭湯 治風冷脚痺疼痛，挛弱不可屈伸方。

烏頭 細辛 蜀椒各 甘草

秦朮 附子 桂心 芍藥各二兩
乾姜 茯苓 防風 當歸各三兩
獨活四兩 大朮三兩

右十四味，以水一斗二升，煮取四分，分五服。若熱毒多，服亦佳。

千金甘艸湯外：療脚弱、身洪腫、胃反食、穀吐逆、胸中氣結不安、而寒熱下痢不止、小便難、服此湯即益。亦服女麴散，利小便，腫消服大散，摩膏有驗方。

甘草一斤 人參一斤 半夏一斤 桂心三兩
小麥八合 大朮二枚 生姜八兩
萊菔二升 蜀椒各三兩 出汁

右九味，切，以水一斗三升，煮麥取一斗，去麥內諸菜，煮取四升，一服，六合，作六服。忌海藻、松菜、羊肉、饒生葱。

●嶺南瘴氣脚氣

犀角旋復花湯外：夫脚氣之疾，先嶺南稍來，江東得之，無漸或微覺疼

痺，或兩脛腫滿，行起屈弱，或上入少腹，不仁，或時冷，或時熱，小便秘澀，喘息氣衝喉，氣急欲死，食嘔不下，氣上逆者，皆其候也。是先覺此證，先與此湯方。

犀角三兩 旋覆花二兩 橘皮三兩 茯苓三兩
大朮二枚 香豉一升 紫蘇莖一握
生姜三兩

右八味，切，以水八升，煮取二升七分，分三服，相去十里。久服之，以氣下，小便利為度。如其不下，服後大

犀角湯，忌醋物。崔氏名小犀角湯，備急同。
大犀角湯同：崔氏療脚氣毒衝心，變成水，身體遍腫，悶絕死者。

犀角三兩 旋復花二兩 白朮二兩 桂枝二兩
防己二兩 黃芩二兩 生姜三兩 香豉一升
橘皮三兩 茯苓三兩 前胡四兩 桑根白皮四兩 紫蘇葉一握 大朮十枚

右十四味，切，以水九升，煮取二升七分，分三服，相去十里。久取下氣。

為度，若得氣下，小便利，脚腫即消。能食，若服湯訖，不下，氣急不定，仍服後湯。忌桃李雀肉、生葱、醋物。以

又方

按千金名犀角麻黃湯

甘草二兩 犀角一兩 防風二兩 桂心三兩

杏仁二兩 獨活二兩 防己二兩 石羔四兩

芎藭二兩 麻黃三兩 生姜三兩 白朮三兩

當歸二兩 羚羊角一兩 犀角一兩 黃芩一兩

右十五味，切，以水二斗，先煮麻黃，取八升，汁下，藥煎三升，分三服，相去十里，久，三服訖，覆取汗，五日後，更服一劑，取汗同前。忌海藻、菘菜、桃李、雀肉、生葱。

又若腫已消，仍有此候者，急服此湯。

麻黃二兩 半夏一兩 洗五兩 射干一兩

獨活二兩 犀角一兩 羚羊角一兩 青

木香一兩 橘皮一兩 杏仁一兩 升麻一兩

吳茱萸一兩 人參二兩 茯苓二兩 防己二兩

二兩 前胡二兩 枳實二兩

右十七味，切，以水九升，煮取四升，分五服，相去二十里，久，中間進少粥，以助胃氣。此湯兩日，服一劑，取病氣退乃止。以意消息之。若熱盛喘煩者，加石羔六兩，生麥門冬一升，去心，去吳茱萸。若心下堅，加蠶甲一兩，炙，忌羊肉、醋物、錫、莧菜。以上三方出。

延年嶺南瘴氣，面脚腫，乍寒乍熱，似

瘰癧狀，脚腫氣上，心悶，欬嗽，推緩頑痺，友外。

大麻人一兩 升麻一兩 射干一兩 葛

薄一兩 甘草二兩 麻黃一兩 大黃一兩

豉三合 芒硝半兩

右九味，切，以水六升，煮取二升，去滓，乃內芒硝，分三服，微利一二行，解毒熱，忌羊肉、錫、海藻、菘菜。

●脚氣，嘔逆及衝心煩悶。

延年茯苓飲，外主脚腫，氣急上氣，心風病，脚氣瘡氣。

悶熱煩嘔逆不下食方

茯苓 紫蘘葉三兩 杏仁三兩 橘皮

升麻三兩 紫胡三兩 生姜四兩 犀角

屑二兩 檳榔十二枚 皮子并

右九味切以水八升煮取二升五

合去滓分溫三服如人行八里久

忌醋物

礬石湯金 治脚氣冲心

礬石二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五

沸浸脚良

半夏湯千 治脚弱氣上入腹々急上

衝胸氣急欲絕方

半夏一升 桂心八兩 乾姜五兩 甘草

人參二兩 細辛各二兩 附子各二兩 蜀椒

合二

右八味以水一斗煮取三升

分三服初稍稍進恐氣衝上格塞

不得下小々服通人氣耳

廣濟療脚氣急上衝心悶欲死者同

栝柳三顆 生姜三合 童子小便二升

新者不須暖

右三味攪頓服須臾即氣退若未

全差更服最佳利三兩行無所忌

又療脚氣心煩悶氣急臥不安方同

半夏一升 湯洗去滑 生姜八兩 桂心三兩

栝柳半升

右四味切以水八升煮減半內栝

柳人末煎取二升八合緩去滓分

溫三服々別相去如人行五六里

進一服利為度

又療脚氣攻心悶腹脹氣急欲死者同

吳茱萸三升 木瓜切二合 栝柳二十顆 碎

竹葉切二升

右四味以水一斗煮取三升分三

服得決利即差忌生菜熟麵蕎麥

蒜等物

文仲若毒氣攻心手足厥絕此亦難

濟不得已作此湯十愈七八方同

金云治脚氣入腹困悶

欲死腹脹菜羹湯方

吳茱萸六升木瓜二枚

右二味以水一斗三升煮取三升

分三服或以吐汗便溼蕪菜云服

得活甚易但鑽擊少時熱悶耳此

方是為起死是高麗老師方與徐

王方相似故應神妙備急千金蕪

木瓜可取吳茱萸一色煮服又方加

青木香三兩犀角二兩屑又云此

湯起死人

又脚氣冷毒悶心下堅背膊痛上氣

死者方同

吳茱萸三升枳實二升青木香二兩

犀角三兩半夏八兩生姜六兩

右六味切以水一斗煮取三升分

三服大効破毒氣尤良備急

犀角湯同蕪菜云若風熱輕但毒氣

入胃唯心悶煩索水灑胸面乾嘔

好叫喚欲斷絕者服此湯効方

犀角屑青木香屑羚羊角屑

人參 竹茹 沈香 射香登

石羔八兩雞舌香二兩麥門冬去

茯苓各三兩射干二兩

右十二味切以水六升煮取二升

二合分四服相去六七里晚再服

如覺眼明心悟若強人作三服此

謂救疾已試大驗若嘔逆不下食

水漿即吐出者加半夏四兩洗生

姜二兩橘皮一兩加水一升半煮

取二升三合忌五辛羊肉錫醋物

近効救脚氣衝心此方甚効同

枳實六顆

右一味搗篩取童便了小半升微

溫和未強半頓服如一炊久不轉

動更取半准前服令盡得通即好

甚良

文仲療脚氣入心悶絕欲死者同

半夏三兩洗切 生姜汁二升

右二味內半夏煮取一升八合分

四服極効忌羊肉錫

脚氣腫滿

風病 脚氣逆及衝心煩悶 二十三

崔氏療氣遍身腫方外

大豆二大升以水一斗 粟白皮煮取五升去豆

右四味將三物以前豆汁浸經宿煮取二升絞去滓添酒二合內藥中隨多少服之忌醋物救急同

又療遍身腫小便澀者用麻豆方主之療脚腫氣同

烏豆一斗水四斗煮 粟白皮切 大麻子二升熬

右三味以豆汁內藥煎取六升一服一升日二服三日令盡

又方同

烏豆五升 粟根白皮切四升二物 取一斗以水二斗煮

半去滓 大麻子一升 橘皮二兩 升麻二兩 生姜二兩 杏仁二兩 猪苓二兩 丹參三兩

右九味切將七物內前粟皮豆汁中煮取四升朝二服相去如三食久藥消進食々消又更進二服此

二方並唐尚書送

桃花散同 療脚氣及腰腎膀胱痛水及痰飲方

收桃花陰乾量取一大升但隨虛滿不須按捺擣為散紗羅下之溫清酒和一瓶令盡通利為度空腹服之須臾當轉可六七行但宿食不消化等物總泻盡若中間覺饑虛進計軟飯及糜粥極安穩不似轉藥虛人廢朝謁但覺腰脚輕快使人踴躍食味倍佳脚先腫者一宿頓消如囊中貯物傾却相似又無毒易將息唯忌胡蒜猪肉三月內腹虛大都消息慎生冷酸滑五辛酒麪及粘食肥膩四五日外諸食復常

文仲療脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者方同

柘柳殼汁中或茶飲中豉汁中服柘柳人散方寸匕利甚快穩良

風病 脚氣腫滿 二十四

蕪荩防己湯 同 主通身體滿小便澀

上下痰水不能食夕則脹者方

桑白皮五兩 大豆五升以水二升

一斗并桑白皮煮取

去滓防己一兩 橘皮五兩 赤茯苓一兩

麻黃三兩 生姜五兩 旋復花一兩

杏人八十枚 紫蘘葶葉二兩

右十味切以前件藥汁煮取三升

去滓分為三服力弱者分為五服

相去六七里久微覆當大汗小便

利腫氣消下冷多加茱萸四兩熱

多加玄參四兩忌酢物

紫蘘湯 同

紫蘘葶一兩 甘草炙 橘皮各一兩半

生姜三兩 枳實五枚

右五味切以水五升煮取二升分

三服相去十里久若能長食服之

永令氣消下忌海藻菘菜

脚氣上氣及心腹脹急

紫蘘子湯 千 治脚弱上氣昔宋湘東

王在南州患脚氣困篤服此湯大

得力方

紫蘘子 半夏各一升 前胡 厚朴

甘草 當歸各二兩 橘皮三兩 大棗二十枚

生姜一斤 桂心四兩

右十味咬咀以水一斗三升煮取

三升半分為五服日三夜一○局

友名蘘子降氣湯治男女虛陽上

攻氣不升降上盛下虛膈壅痰多

咽喉不利咳嗽虛煩引飲頭目昏

眩腰疼脚弱肢體倦怠腹肚疔刺

冷熱氣瀉大便風秘澀滯不通肢

體浮腫有妨飲食

枳實湯 同 療上氣

枳實三枚 杏仁四七枚 去

右二味以小便一大升煮取半升

分為二服相去五六里許此方甚

下氣一日一服之佳如腹中欲須

利枳實并子搥碎如煎煮取汁服

之即快利也

又方

風病 脚氣上氣及心腹脹急 二十五

楸榔七枚 生姜高切 橘皮二兩
杏人三十枚

右四味切以水四升煮取一升五合分二服相去七八里久或作半劑一服亦得氣脹發則服之差止又若覺冷氣攻喉方同

當會吳茱三五粒即氣散

●風狂

茯神湯千治五邪氣入人體中見妄語有所見聞心悸跳動恍惚不定方

茯神 人參 菖蒲 茯苓各三兩
赤小豆四兩

右五味咬咀以水一斗煮取二升半分三服

●風驚恐失志喜忘及妄言

治中風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚憤々心煩悶耳鳴方千

遠志 黃耆 茯苓 甘艸
芍藥 當歸 桂心一方 麥門冬 人參各三兩 獨活四兩 生姜五兩

附子一兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取四升每服八合人羸服五合日三夜一

治奄々忽々朝痿暮劇驚悸心中憧憧胸滿不下食陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人声定志下氣方千

人參 茯苓 遠志 甘草
枳實 當歸 竜齒 桔梗各三兩
半夏 桂心各四兩 黃耆四兩 生姜六兩
茯神二兩 大棗二十枚

右十四味咬咀以水一斗二升先煮粳米五合令熟去滓次內藥煮取四升一服八合日三夜二

補心湯同治心氣不足心痛驚恐方
遠志 蒲黃一方用 人參 茯苓各兩

右四味咬咀以水一斗煮取三升半分三服

又方同治心氣不足腹背相引痛不風病 風狂風驚恐失志

能俛仰方 或作補心湯

茯神 黃芩 遠志 乾地黄

麥門冬 石羔 半夏

附子 桂心 生薑 甘草

阿膠 糖 大棗

右十四味，咀咀，以水一斗，煮取三

升去滓，內糖及膠，更煎取二升二

合分三服，此方前卷心虛實篇，大

小定心湯，同治虛羸心氣驚弱多驚

方

茯苓 桂心 甘草 芍藥

乾姜 遠志 人參 大棗

右八味，咀咀，以水八升，煮取三升

分四服，日三夜一、

崔氏療熱風驚掣心忪恐悸風邪狂

叫發走者服此湯亦差，朱四頰用

之，極效方，外

茯神 杏仁 升麻

白鮮皮 沙參 竜齒

寒水石 石羔

生麥門冬 去心

右九味，切，以水一斗二升，煎取二

升去滓，分温為三服，相去十里，若

甚者，減水三升，內竹瀝三升，先用

水煮九沸，然後內竹瀝，煮取三升，

服如上法，忌酢物

癩

水銀丸 外療癩疾積年不差，得熱即

發方

水銀 麥門冬 烏蛇脯 炙

乾地黄 鐵精 竜角 研

人參 防風 子芩 升麻

熊胆

右十一味，搗篩，蜜和丸，如梧子，食

後以生鹽乳汁下二十九，漸々加

至三十九，日再不利，忌蕪荑生菜，

熟麩，蕎麥，炙肉，蒜，粘食

崔氏療暴得驚癩，立驗方 同朱四

吊藤皮 茯神 黃芩 升麻

白鮮皮 沙參 竜齒 石羔

風病 癩

二十七

八 蚱蟬 七枚去翅足
而 炙研湯成內 寒水石 六兩
研 甘竹 瀝 熟內之

右十一味切以水九升煮取三升
温分三服相去六七里久若小孩
子患藥各減量取多少細々飲之
立差忌醋物

●風眩附頭風旋

人參湯翼 治頭眩屋轉眼不得開方

人參 當歸 防風 黃耆
芍藥 麥門冬 獨活 白朮

桂心 各三兩

右九味以水一斗煮取三升
分三服 千金

防風湯 治風眩嘔逆水漿不下食
輒起即眩倒發有時手足厥冷
方

防風 防己 附子 乾姜

甘艸 蜀椒 桂心 各三兩

右七味以水四斗煮取二升
分三服 日三 古今錄驗用
白朮 一兩

又方同 治頭風眩欲倒眼旋屋轉腦
痛方

防風 枳實 杏仁 芎藭 各三兩

茯苓 麻黃 前胡 生姜

半夏 各二兩 細辛 二兩 竹瀝 三升

右十一味以水六升合竹瀝
煎取二升七分合分三服三兩劑佳

大三五七散 治頭風眩口喎目斜

耳聾方

天雄 細辛 山茱萸 乾姜

各二兩 薯蕷 防風 各二兩

右六味治下篩清酒服五分匕日
再不知稍加 千金翼云亦
治面骨疼痛

小三五七散 治頭風目眩耳聾方

天雄 薯蕷 山茱萸

右三味治下篩以清酒服五分匕
日再不知稍增以知為度

續命湯 治風眩發則煩悶無知口
沫出四体角弓反上口噤不得
言方

竹瀝一升 生地黃汁一升 龍齒四兩

生薑 防風 麻黃各五兩 防己三兩

附子三分 石羔七兩 桂心二兩

右十味，以水一斗，煮取三升，分三服。有氣加附子作一兩。紫蘇子五合，橘皮半兩，已服續命湯，口開，四肢尚未好定，而心中尚不除者，紫石湯主之。方凡後紫石湯散是也。

賁豚湯同 治氣奔急欲絕方

吳茱萸一升 石羔 人參 半夏

芎藭各三分 桂心 芍藥 生姜

各四分 生葛根 茯苓各十分 當歸

四兩 李根皮一斤

右十二味，以水七升，清酒八升，煮取三升，分三服。

防己地黃湯同 治言語狂錯，眼目霍

霍，或言見鬼，精神昏亂方

防己 甘草各二兩 桂心 防風

各三兩 生地黄五斤，別切，勿合葉，漬疾小，輕用一斤。

右五味，以水一升，漬一宿，絞

汁著一石，取滓著竹簣上，以地黃

著藥滓上，於五斗米下蒸之，以銅

器承取汁，飯熟，以向前藥汁合絞

取之，分再服。

薯蕷湯十 治心中驚悸，而四肢緩，頭

面熱，心胸痰滿，頭目眩冒，如欲搖

動者方

薯蕷 麥門冬 人參各五兩 生

地黄 前胡 芍藥各八分 枳實

遠志 生姜各三分 茯苓 茯神

各六分 半夏五分 甘草 黃芩 竹

葉各二分 秫米三合

右十六味，以水一斗，煮取三斗，煮米減一斗，內半夏復減九升，去滓下藥，煮取四升，分四服。無江水處，以千里東流水代之，按手令上頭也。秦中無江水，湮溜水可用，諸葛灌叙由尚取之。

白朮附子湯外 療風虛，頭重眩，苦極

風病 風眩附頭風旋 二十九

不知食味、暖肌、補中、益精氣。方傷寒發汗門甘附子湯是也。

廣濟療熱風頭旋、心悶、衝風起即欲

倒方外

麥門冬去心 山茱萸 茯神 苦

參各分 地骨皮 薯蕷 人參

蔓荆子 沙參 防風 芍藥

枳實 大黃各分 甘菊花 竜胆

各四分

右十五味、搗篩、蜜丸、每食訖、少時

以蜜水服、如梧子大、二十九丸、日二

漸加至三十九丸、不利、忌酢物、熱麪

炙肉、蒜、猪肉、魚、粘食。

又療頭面熱、風頭旋、眼澀、項筋急、強

心悶、腰脚疼痛、上熱下冷、健忘、方

同

肉豆蔻十顆 人參 犀角屑 枳

實各六分 黃連 白朮 大黃各分

甘州炙苦參 旋復花各分 枳

榔人十顆

右十一味、搗篩、蜜和、丸如梧子、以

酒服、飲二十九丸、漸加至三十九丸、日

三服、無問食前後服之、不利、忌生

菜、熱麪、蕎麥、酒、蒜、猪肉、海藻、菘菜、

桃李、雀肉等。

又療心虛、感風頭旋、心忪、痰飲、禁心

悶、昏々、惚々、不能言語、宜微吐痰、

此候極重、秦艽、飲子吐方、同

秦艽 常山 人參 羚羊角

層各二兩 甘州三兩 生用

右五味、切、以水六升、煮取二升、絞

去滓、分溫二服、日再、如人行四五

里久、進一服、取快吐、不利、忌生菜、

生葱、熱麪、蕎麥、猪魚肉、海藻、菘菜、

延年療頭風旋、不食、即吐方、同

前胡三兩 白朮 防風 枳實炙

茯苓各三兩 生薑四兩

右六味、切、以水六升、煮取二升、去

滓、分溫三服、忌桃李、雀肉、酢、

又療風邪氣未除、發即心腹滿急、頭

風病 頭面風 三十

旋眩運欲倒方同

芎藭 独活 防风 白朮

杏仁去皮 枳實炙各 茯神兩三 生

姜兩四 羚羊角屑 黃芩兩各

右十味切以水九升煮取三分分

為三服日三忌桃李雀肉大酢蒜

麪等

防风飲同 療風痰氣發即頭旋嘔吐

不食方

防风 人參 橘皮各三 白朮

茯神各三 生姜兩四

右六味切以水六升煮取三升去

滓分溫四服中間任食一日令盡

忌大酢桃李雀肉蒜麪等物

●頭面風

治中風頭痛發熱耳頰急方十

麻黃 葛根 石羔 桂心兩各

附子 芍藥 甘州 秦艽

防风各三 生姜兩五

右十味咬咀以水一斗煮取三升

分三服覆取汗

治頭中痛熱風熱方同

竹瀝三升 升麻 生姜 杏仁兩各

芍藥 柴胡各 石羔 生葛根

兩各八

右八味咬咀以水六升合竹瀝煮

取二升七分三服

犀角湯同 治風毒熱頭面腫方

犀角 生姜各 苦參 栝蒌根

防风各 石羔兩六 黃芩 青木香

升麻各 防己兩半 竹葉二

右十一味咬咀以水七升煮取二

升分三服相去里許久內消不利

延年療風熱頭痛掣動方外

防风 黃芩 升麻 芍藥各

竜骨 石羔碎各 乾姜兩三 竹瀝二

右八味切以水六升和瀝煮取二

升六合去滓分溫三服日晚再忌

蒜麪猪肉油膩

又療風勞氣吐逆不能食四肢骨節

風病 頭面風

酸疼頭痛頂重友同

茯苓三兩枳實炙橘皮 人參

芍藥二兩生薑四兩

右六味切以水五升煮取三升去滓分温三服日晚再服忌麪蒜醋物

●風多汗及虛汗

凌師療風汗出少氣友同趙子高法

防風十分白朮九分牡蠣三分

右三味持篩為散以酒服方寸匕日三增至二三匕惡風倍防風少

氣倍朮汗出面腫倍牡蠣忌桃李

雀肉胡荽大蒜青魚酢等物

石羔散同療風虛止汗

石羔研甘艸炙各四分

右二味合持下篩為散先食以漿水服方寸匕日三夜再服忌海藻

菘菜等

刪繁療大虛汗出欲死若自汗出不止

友同

麻黃去節附子炮各一兩牡蠣二兩

右三味搗下篩以一合藥白粉一

升合和令調以粉汗上一方粉二

升忌猪肉冷水

●癰瘰

石南湯干治六十四種風淫液走入

皮中如蟲行腰脊強直五緩六急

手足拘攣癰疹瘰之作瘡風尸身

癢卒面目腫起手不得上頭口噤

不得言方方見風病風熱門

治風癢癰疹心迷悶乱友同

天雄 牛膝 桂心 知母各分

桔萸根 白朮各分 防風六分

人參二兩 乾姜細辛各分

右十味治下篩酒服半錢匕加至一匕為度

崔氏療風疹遍身友外

麻黃去節生薑各三兩防風二兩芎藭

芍藥 當歸 薤藜子 甘艸

獨活 烏喙 人參各兩

右十一味切以水九升煮取二升

風病 癰瘰白虎風

八合絞去滓分溫三服，訖進粥食三日，慎生冷，酢滑猪肉，冷水，海藻，菘菜。

●白虎風

羌活湯 聖治白虎風痛甚如蠶

羌活 防風 秦朮 芎藭 當歸 各一兩 牛膝 酒浸 附子 去度 大腹 連皮用 桃仁 湯浸去皮尖 右九味 剉如麻豆 每服五錢 入生姜一朮大 同煎服 日二夜一

●雜療

川芎散 治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎 細辛 羌活 槐花 甘艸 炙 香附子 石羔 各半 荊芥 薄荷 菊花 防風 去 茵陳 各一兩 右為末 每服二錢 食後茶清調下 日三服 動風物忌

犀角升麻湯 本正檢正希鼻昔患鼻

額間痛或麻痺不仁如是者數年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不

開口、雖言語飲食亦相妨、左額與頰上常如糊急、手觸之則痛、予作足陽明經絡受風毒、傳入經絡、血凝滯而不行、故有此症、或者以排風小續命透水丹之類與之、皆不效、予製此湯、贈之服數日而愈、

上等犀角 鎊兩一分 真川升麻 兩一分 防風 去 剉 羌活 去 剉 白芷 不見火 黃芩 去 剉 川芎 洗 白附子 炮 各一分 炙 甘草 一分

右鹿末、每服四大錢、水一盞半、煎至八分、去滓、通口服、食後、臨臥日三四服、

芎附散 本治五種痺腿、并臂間發作不定、此脾胃虛、衛氣不溫、分肉為風寒濕所著、

小川芎 附子 炮去皮 黃耆 蜜炙 白朮 防風 去 剉 當歸 洗去 乾地黃 桂心 柴胡 甘艸 各一分 右為末、每服四錢、水一盞半、生

姜三片、枣一介、同煎至七分、去滓
食前、日三服、常服不生壅熱、兼消
積冷。

清陽湯準 治口喎、頭急、緊、胃中火盛、
必汗不止、而小便數也。

紅花 黃柏酒 桂枝已上 生甘
艸 燕木各一分 炙甘草一分 葛根一分
當歸 升麻 黃耆二

右咬咀、作一服、酒三盞煎至一盞三
分、去滓稍熱、食前服訖、以火熨摩
緊急處即愈、夫口喎筋急者是筋
脈血絡中大寒、此藥少代燔針、劫
刺破惡血、以去凝結、內泄衝脈之
火熾。

蠲痺湯生 治周痺、及手足冷痺、脚

腿沉重、或身體煩重、背項拘急、

當歸酒 赤芍藥煨 黃耆 姜黃

羌活各一分 甘草五分

水二鍾、姜三片、枣二枚、不拘時服、
又去者、加海桐皮、白朮者、各舒

筋湯

麗澤通氣湯醫通 治久風鼻塞、

羌活 獨活 防風 蒼木去

節麻油 升麻 葛根各八 麻黃

連翹四分 川椒五分 白芷七分 甘草七分

生姜三片 大棗一枚 葱白三寸

水煎、食遠服、冬日倍麻黃、加細辛

三分、夏日去獨活、加石羔三錢、忌

一切冷物、及風涼處坐臥、

防風散千 治脚痺、并治毒氣上衝心

胸、嘔逆、病癥、積氣、疝氣、諸病、相當

即服之、友、

防風 麻黃 芎藭 人參

芍藥 當歸 茯苓 半夏

甘草 橘皮各一分 鱉甲 生姜

桂心各一分 杏仁二兩 赤小豆一升 貝子

烏梅各一分 大棗三枚 吳茱萸五升 犀角

羚羊角各一分 薤白五升

右二十二味、咬咀、以水一斗、煮取

三升、分三服、一日令盡、一方用水

風病 雜療

一斗二升，間食糜，一方半夏二兩
隨時用。

換柳散 仁存 治風毒脚氣腫痛。

橘葉 杉木節 各一握

右童子尿一盞，醇酒半盞，煎陸分。

憑清果熟調，換柳末二錢，食前服。

生鐵落散 韋 生鐵四十斤，入火燒赤。

沸砒上銀之，有花出如蘭，如蛾紛。

紛墮地者，是鐵落，用水二斗，取一

斗，入後藥。

石羔 三兩 竜齒 研 白茯苓 去皮 防風

去芦 玄參 秦艽 各一兩

右為鹿散，入鉄汁中，煮取五升，去

查，入竹瀝一升，和勻，温服二合，無

時，日五服。

沉香天麻湯 宝鑑 治癩症，或小兒因

恐懼發搐，搦痰涎有聲，吐沫嚼舌，

目上視，項背強直者，亦主之。

沉香 益智 川烏 各二錢 天麻

防風 半夏 附子 炮各三錢 羌活

甘艸 當歸 姜蚕 各一兩 独活 四錢

右水煎温服。

茯神湯 本 治因驚，語言顛錯。

茯神 去木 熟乾地黄 酒晒九蒸 白

芍藥 川芎 當歸 洗去芦 薄

白茯苓 皮 桔梗 炒 遠志 去心 洗

黃人參 去芦已上 各一兩

右為細末，每服二錢，水一盞，燈心

枣肉同煎，至七分，不拘時候。

麻黃湯 聖 治頭面風熱，煩躁，皮肉如

乱鍼刺痛。

麻黃 去根 杏仁 去尖 桔梗 去芦

秦艽 去苗 薄荷葉 牡丹皮 去心 防

風 去 芍藥 升麻 黃芩 去黑 紫苑

去苗土 半夏 湯洗去 羌活 去芦 各一分

右十三味，麈尾節，每服二錢，水

一盞，入生姜三片，煎至七分，去滓

食後臨臥熱服。

酸棗人湯 同 治風毒散攻下焦，冷注四

肢痠痛，脚膝濡痺，及風邪于藏心恍

風病 雜療 三十五

惚筋脈拘急

酸枣人炒二兩 薏苡人炒一兩 人参三

茯神去木一兩 麥門冬去心焙半兩

右五味鹿角膠每服四錢匕水一
盞煎至七分去滓熟服不時日三

加味道遙散得効治患顛疾歌唱無時

踰牆上屋乃榮血迷於心包所致

加遠志去心桃仁去皮尖蘓木紅

花各一錢水一盃半煎方見服後

病退却用平胃散內減厚朴三分

之二加生蒼朮二倍川升麻等蒼

朮一半水一盃半煎一盃服之全

安須常服以絕其根

薏苡人散方同治脚氣痺痿煩疼掣

痛行步不得氣滿心胸咽塞壅悶

不得眠臥宜服之

薏苡人二 地骨皮一 五加皮三

木通二 木香三 羚羊角一 牛

膝一 去一 右七味搗篩為散每服四錢以水一

中盞煎至六分去滓不計時候溫服

●脚氣灸法

凡脚氣初得脚弱便速灸之并服竹

瀝湯灸訖可服八風散無不瘥者

惟急速治之若人但灸而不能服

散服散不灸如此者半瘥半死雖

得瘥者或至一二年復更發動覺得

便依此法速灸之及服散者治十

十愈此病輕者登時雖不即惡治

之不當根源不除久々期於殺人

不可不精以為意初灸風市次灸

伏兔次灸攢鼻次灸膝兩眼次灸

三里次灸上廉次灸下廉次灸絕

骨

凡灸八處第一風市穴可令病人

起正身平立垂兩臂直下舒十指

掩著兩髀便點當手中央指頭髀

大筋上是灸之百壯多亦任人輕

者不可減百壯重者乃至一處五

六百壯勿令頓灸三報之佳第二

伏兔穴令病人累足端坐以病人手夫掩橫膝上夫下傍共曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得窟解是灸之五十壯可至百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一云在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百壯第六上廉穴在三里下一夫亦附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一夫一云附脛骨外是灸之百壯第八絕骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可日夕報之三日之中灸令盡壯數為佳凡病一脚則灸一

脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡者合四處灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不瘥速以次灸之多益佳一說灸絕骨最要人有患此脚弱不即治及少腹腫大上氣於是乃須大法灸隨諸膈及諸關節腹背盡灸之并服八風散往々得瘥者諸管膈節解法並在別卷中覺病入腹若病人不堪痛不能盡作大灸但灸胸心腹諸穴及兩脚諸穴亦有得好瘥者凡量一夫之法覆手并舒四指對度四指上中節上橫過為一夫夫有兩種有三指為一夫者此脚弱灸以四指為一夫也亦依支法存旧法梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿大衝陽陵泉絕骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然谷涌泉承山束骨等凡一十八穴旧法多灸百會風府

五臟六腑踰募，頃來灸者，悉覺引氣向上，所以不取其法。氣不上者，可用之。其要病已成，恐不救者，悉須灸之。其足十趾去指奇一分，兩足凡八穴。曹氏名曰八衝，極下氣有效。其足十趾端，名曰氣端。日灸七壯，氣下即止。病者非深相委，慎勿為人灸之。慎之，凡灸八衝，須小作艾炷。千金方

徐論患腳氣，皆春發夏甚，秋輕冬歇。大法春秋宜灸，冬差可行，夏都不可灸。既瘡敗，又不得覆風冷，因人反更增病。冬時血凝，又逆天理，急不得已，無藥物處，可灸一二要穴，不遍身多灸。脚氣病論，毒從下上，亦有從上向下者。或云灸上毒氣便上謬矣。此見毒氣攻處，疼痛如刺，隨病即灸，火微便瘳，不拘上下。凡毒氣所衝，如賊欲出，得穴即出，豈在大門也。風毒所攻，亦復如是。此皆經試，万不失一，必不為悞耳。外臺

又云若氣上擊心不退，急灸手心三七炷，氣即便退。若未退，即悶，兼煮豉酒熱飲，逐之。即差，不去，即取烏特牛屎一大升，煖服，以利為上。縱至三服，五服，弥佳。

又若已灸脚而胸中氣猶不下，滿悶者，宜灸間使五十炷，兩手掌橫文後，一云三寸，兩筋間是。

又若胸中氣散而心下有脈洪大跳，其數向下，分入兩髀股內，令人心急忪悸者，宜以手按捻少腹下兩傍，接髀大斜文中，有脈跳動，便當文上灸跳三七炷，即定。灸畢，皆須灸三里二十炷，以引其氣下也。

唐論若手指本節間疼，稍入臂者，宜灸指間疼處七炷，即定。又若心胸氣滿，已灸身脛諸穴，及服湯藥而氣獨不下，煩急欲死者，宜灸兩之

心下、當中陷處、各七炷、氣即下、此
穴尤為尤為極要、而不可數灸、但
極急乃灸七炷耳、以前諸灸法、並
經用所試皆驗、灸畢應時即愈、故
具錄記之、凡灸不廢湯藥、攻其
內、灸洩其外、譬如開川驅賊、夕則
易出、若閉戶逐之、賊無出路、當反
害人耳、

傷寒

發汗附春冬

桂枝湯傷 太陽中風陽浮而陰弱、陽

浮者熱自發、陰弱者汗自出、啻々

惡寒、淅々惡風、翕々發熱、鼻鳴乾

嘔者主之、●太陽病發熱汗出者

此為榮弱衛強、故使汗出、欲救邪

風者主之、●太陽病頭痛發熱汗

出惡風者主之、●太陽病下之後

其氣上衝者、可與之、若不上衝者、

不得與之、●太陽病三日已發汗、

若吐若下、若溫鍼仍不解者、此為

壞病、桂枝不中與之也、視其脈証

知犯何逆、隨証治之、桂枝本為解

肌、若其人脈浮緊發熱汗不出者、

不可與之也、當須識此勿令誤也、

凡服桂枝湯吐者、其後必吐膿血

也、●太陽病初服此湯反煩不解

者先刺風池、風府，却與之，則愈。●
太陽病，外證未解，脈浮弱者，當以
汗解，宜此湯。●太陽病，外證未解，
不可下也，下之為逆，欲解外者，宜
此湯。●太陽病，先發汗，不解而復
下之，脈浮者不愈，浮為在外，而反
下之，故令不愈，今脈浮，故知在外，
當須解外，則愈，宜此湯。●病常自
汗出者，此為榮氣和，榮氣和者，外
不諧，以衛氣不共榮氣和諧，故爾，
以榮行脈中，衛行脈外，復發其汗，
榮衛和則愈，宜此湯。●病人藏無
他病，時發熱，自汗出，而不愈者，此
衛氣不和也，先其時發汗，則愈，宜
此湯。●傷寒不大便，六七日，頭痛，
有熱者，與承氣湯，其小便清者，知
不在裏，仍在表也，當須發汗，若頭
痛者，必衄，宜此湯。●傷寒發汗，已
解，半日許，復煩，脈浮數者，可更發
汗，宜此湯。●傷寒醫下之，後身軀

疼痛，清便自調者，急當救表，宜此
湯。●傷寒大下後，復發汗，心下痞，
惡寒者，表未解也，不可攻痞，當先
解表，後乃可攻痞，解表宜此湯。
●陽明病，脈遲，汗出多，微惡寒者，
表未解也，可發汗，宜此湯。●病人
煩熱，汗出則解，又如瘧狀，日晡所
發熱者，屬陽明也，脈實者，宜下之，脈
浮虛者，宜發汗，宜此湯。●太陰病，
脈浮者，可發汗，宜此湯。●下利腹
脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃攻
其表，攻表宜此湯。●吐利止，而身
痛不休者，當消息和解其外，宜此
湯，小和之方。

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生姜三兩
去皮切 大棗十二枚

右五味，以水七升，微火
煮取三升，去滓，適寒溫，服一升，服
已須臾，飲熱稀粥一升餘，以助藥
力，溫覆令一時許，遍身絳々微似

有汗者益佳，不可令如水流離，病必不除。若一服汗出病差，停後服，不必盡劑。若不汗，更服依前法，又不汗，後服小促其間，半日許，令三服盡。若病重者，一日一夜服，周時視之。服一劑盡，病証猶在者，更作服。若汗不出，乃服至二三劑，禁生冷、粘滑、肉麪、五辛、酒酪、臭惡等物。

桂枝加厚朴杏子湯傷喘家作桂枝湯，加厚朴、杏子佳。●太陽病，下之微喘者，表未解故也。主之方，於桂枝湯方內加厚朴三兩、杏仁五十粒，餘依前法。

桂枝麻黃各半湯傷太陽病，得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒，熱多寒少，其人不嘔，清便自可，一日二三度發，脈微緩者，為欲愈也。脈微而惡寒者，此陰陽俱虛，不可更發汗，更下，更吐也。面色反有熱色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒。

主之方

桂枝二兩十六銖 芍藥 生姜切 甘草
桂枝去皮 麻黃各二兩 大棗四枚 杏仁二十枚
湯浸去 皮尖及兩仁者

右七味，以水五升，先煮麻黃，一二沸，去上沫。內諸藥，煮取一升八合，去滓，溫服六合。本云桂枝湯三合，麻黃湯三合，併為六合，頓服將息，如上法。

桂枝二越婢一湯傷太陽病，發熱惡寒，熱多寒少，脈微弱者，此無陽也，不可發汗。主之方。

桂枝去芍藥 麻黃各二兩 石膏二十四銖 大棗四枚 甘草八銖

右七味，以水五升，煮麻黃一二沸，去上沫。內諸藥，煮取二升，去滓，溫服一升。本云當裁為越婢湯，桂枝湯合之，飲一升，今合為一方。桂枝湯二分，越婢湯一分。

葛根湯傷 太陽病項背強几々無汗惡風主之。●太陽與陽明合病者必自下利主之。

葛根四兩 麻黃三兩 桂枝三兩 生薑五兩 甘草二兩 芍藥二兩 大棗十二枚

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗餘如桂枝法將息及禁忌諸湯皆倣此葛根加半夏湯傷 太陽與陽明合病不下利但嘔者主之方

於葛根湯方內加半夏半升即是

麻黃湯傷 太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者主之。●太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜此湯。●太陽病十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脇痛者此小柴胡湯脈但浮者與之。●太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在

在此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄乃解所以然者陽氣重故也主之。●脈浮者病在表可發汗宜此湯。●脈浮而數者可發汗宜此湯。●傷寒脈浮緊不發汗因致衄者主之。●脈但浮無餘証者與此湯若不尿腹滿加噦者不治。●陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜此湯方

麻黃三兩 桂枝二兩 甘草二兩 杏仁七十枚 去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

大青龍湯傷 太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者主之若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也。●傷寒脈浮緩身不疼但重作

有輕時無少陰証者，與此湯發之。

麻黃六兩 桂枝二兩 甘草二兩 杏仁四十枚 生姜三兩 大棗十枚 石

羔如雞子 大研

右七味，以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，取微似汗，勿多者，溫粉撲之，一服汗者，停後服，若復服汗多，亡陽遂虛，惡風煩躁，不得眠也。

小青龍湯傷寒表不解，心下有水

氣乾嘔，發熱而欬，或渴或利，或噎，或小便不利，小腹滿，或喘者，主之。

傷寒心下有水氣，欬而微喘，發熱，不渴，服湯已，渴者，此寒去欲解也，主之方。

麻黃去節 芍藥 細辛 乾姜 甘草炙 桂枝各三兩 五味子半升 半夏半升

右八味，以水一斗，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，若渴去半夏，加栝蒌根。

若微利，去麻黃，加芫花如一雞子，熱令赤，若噎者，去麻黃，加附子一枚，若小便不利，少腹滿者，去麻黃，加茯苓四兩，若喘者，去麻黃，加杏仁半升，去皮尖。

桂枝附子湯傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔，不渴，脈浮虛而澀者，主之方。

桂枝四兩 附子三枚 生姜三兩 大棗十二枚 甘草二兩

右五味，以水六升，煮取二升，去滓，分溫三服。

去桂加白朮湯傷寒桂枝附子湯證，而其人大便鞕，心下鞕，小便自利者，主之方。

附子三枚 白朮四兩 生姜三兩 甘草二兩 大棗十二枚

右五味，以水六升，煮取二升，去滓，分溫三服，初服，其人身如痺，半日許，復服之，三服，都盡，其人如冒汗，傷寒發汗。

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

傷寒發汗

狀勿怪，此以附子朮併走皮內，逐水氣，未得除，故使之耳。法當如桂四兩，此本一方一法，以大便艱，小便不利，去桂也。以大便不艱，小便不利，當加桂附子三枚，恐多也。虛弱家及產婦宜減服之。

甘州附子湯傷風濕相搏，骨節疼痛，掣痛不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，或身微腫者，主之方。

甘州二兩附子一枚炮 白朮二兩 桂枝四兩

右四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。初服得微汗則解，能食，汗止復煩者，將服五合，恐一升多者，宜服六七合為妙。

麻黃細辛附子湯傷少陰病，始得之，反發熱，脈沉者，主之方。

麻黃二兩 細辛二兩 附子一枚炮 去皮破八片

右三味，以水一斗，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

麻黃附子甘州湯傷少陰病，得之二三日，此湯微發汗，以二三日無裏證，故微發汗也，方。

麻黃二兩 甘州二兩 附子一枚炮 去皮破八片 右三味，以水七升，煮麻黃一兩沸，去上沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

陽毒升麻湯千金 治傷寒一二日，便成陽毒，或服藥吐下之後，變成陽毒，身重，腰背痛，煩悶不安，狂言，或走，或見鬼，或吐血，下痢，其脈浮大，數，面赤斑々如錦文，咽喉痛，唾膿血，五日可治，至七日不可治，宜服方。

升麻 甘州各半 當歸 蜀椒 雄黃 桂心各六兩

右六味，咬咀，以水五升，煮取二升，分三服，如人行五里，進一服，溫

覆手足毒出則汗夕出則解不解
重作服之得吐亦佳仲景無挂心
有驚甲手大
一片肘後典千金同古今錄驗
有梔子六銖驚甲如手一片
陰毒甘艸湯千金治傷寒初病一二
日便結成陰毒或服藥六七日已

上至十日變成陰毒身重背強腹
中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下
堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑
四肢厥冷其脈沉細緊數仲景云
此陰毒之候身如被打五六日可
治至七日不可治也方

甘艸升麻當歸蜀椒
驚甲一兩

右五味咬咀以水五升煮取二升
半分三服如人行五里須臾進一
服溫服發汗毒當從汗出汗出則
愈若不汗則不徐重作服仲景方
去蜀椒
陰且湯千金治傷寒肢節疼痛內寒
外熱虛煩方

芍藥甘艸乾姜黃芩

挂心四兩大棗五枚

右六味咬咀以水一斗煮取五升
去滓溫服一升日三夜再服令小
汗

解肌湯千金治傷寒溫病方

葛根四兩麻黃三兩黃芩芍藥
甘艸五兩大棗十五枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升
飲一升日三服三四日不解脈浮
者宜重服發汗脈沉實者宜以駛
鼓丸下之延年秘錄有
挂心一兩

小品射干湯外臺主春冬傷寒秋夏
中冷欬嗽曲拘不得氣息喉鳴啞
失聲乾嗽無唾喉中如哽者方

射干二兩半夏五兩杏仁三兩去皮
乾姜二兩甘艸二兩紫苑二兩肉桂二兩
吳茱萸二兩當歸二兩橘皮二兩麻黃二兩
去獨活二兩

右十二味切以水一斗煮取三升
去滓溫分三服始病一二日者可

服此湯汗後重服勿汗也病人者
初服可用大黃二初秋夏月暴雨
冷及天行暴寒熱伏於內宜生薑
四代乾姜除菜莖用枳實高忌羊
肉海藻菘菜錫生葱

延年療傷寒骨節疼頭痛眼睛疼效
嗽知母湯方外

知母二貝母三乾葛三芍藥三
石膏四黃芩三杏仁一去皮
梔子仁三兩

右八味切以水七升煮取二升五
合去滓分為三服如人行八九里
再服忌蒜麪七日

●宜吐

瓜蒂散傷 病如桂枝證頭不痛項
不強寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝
喉咽不得息者此胸為有寒也當
吐之宜此散方

瓜蒂一分赤小豆一分
右二味各別搗篩為散已合治之

取一錢匕以香豉一合用熱湯七
合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓
服之不吐者少々加得快吐乃止
諸亡血虛家不可共之○病手足
逆冷脈乍結以客氣在胸中心下
滿而煩欲食不能食者病在胸中
當吐之宜此散

肘後療傷寒汗出不歇已三四日胸
中惡欲令吐者方外

豉三升鹽一
右二味以水七升煮取二升半去
滓內蜜一升又煮三沸頓服一升
安臥當吐如不吐更服一升取吐
為效

張文仲療傷寒近効方凡胸中惡痰
飲傷寒熱病瘴瘧須吐者方外
鹽末天匙

右一味以生熟湯調下須臾則吐
吐不快明且更服甚良備急
同

●宜下

大承氣湯傷 陽明病脈遲雖汗出不
傷寒 宜吐宜下

惡寒者、其身心重、短氣、腹滿、而喘、有潮熱者、此外欲解、可攻裏也、手足濇然、汗出者、此大便已鞅也、此湯主之、若汗多微發熱、惡寒者、外未解也、一法與桂枝湯其熱不潮、亦可與承氣湯、若腹大滿不通者、可與小承氣湯、微和胃氣、勿令至大泄下、
●陽明病、潮熱、大便微鞅者、可與此湯、不鞅者、不可與之、若不大便六七日、恐有燥屎、欲知之法、少與小承氣湯、湯入腹中、轉失氣者、此有燥屎也、乃可攻之、若不轉失氣者、此但初頭鞅、後必溏、不可攻之、攻之必脹滿、不能食也、欲飲水者、與水則噦、其後發熱者、必大便復鞅而少也、以小承氣湯和之、不轉失氣者、慎不可攻也、●傷寒若吐、若下後不解、不大便五六日、上至十餘日、日晡所發潮熱、不惡寒、獨語如見鬼狀、若劇者、發則不識人、循

衣摸牀、惕而不安、一云、順衣安

喘、直視、脈弦者生、濇者死、微者但

發熱、讞語者、此湯主之、若一服利、則止後服、●陽明病、讞語有潮熱、

反不能食者、胃中必有燥屎、五六枚也、若能食者、但鞅耳、宜此湯下

之、●汗出讞語者、以有燥屎在胃中、此為風也、須下者、過經乃可下

之、下之若早、語言必亂、以表虛裏實故也、下之愈、宜此湯、●二陽併

病、大陽證罷、但發潮熱、手足絳々、汗出、大便難而讞語者、下之則愈、

宜此湯、●陽明病、下之心中懊憹、

而煩、胃中有躁屎者可攻、腹微滿、

初頭鞅、後必溏、不可攻之、若有燥

屎者、宜此湯、●病人煩熱、汗出則解、又如瘧狀、日晡所發熱者、屬陽

明也、脈實者、宜下之、脈浮虛者、宜發汗下之、與此湯發汗、宜桂枝湯

腹滿痛者，此有燥屎也，所以然者，本有宿食故也。宜此湯。●病人小便不利，大便乍難乍易，時有微熱，喘冒^在不能臥者，有燥屎也，宜此湯。●得病二三日，脈弱無太陽柴胡証，煩燥，心下鞕，至四五日，雖能食，以小承氣湯，少少與，微和之，令小安。至六日，與此湯一升，若不大便六七日，小便少者，雖不受食^{二云}，但初頭鞕，後必溏，未定成鞕，攻之必溏，須小便利，尿定鞕，乃可攻之。宜此湯。●傷寒六七日，目中不了了，睛不和，無表裏証，大便難，身微熱者，此為實也，急下之。宜此湯。●陽明病發熱，汗多者，急下之。宜此湯。●發汗不解，腹滿痛者，急下之。宜此湯。●腹滿不減，々不足言，當下之。宜此湯。●陽明少陽合病，必下利，其脈不負者，為順也。負者，失也。互相剋賊，名為負也。脈滑而

數者，有宿食也。當下之。宜此湯。●少陰病，得之二三日，口燥咽乾者，急下之。宜此湯。●少陰病，自利清水，色純青，心下必痛，口乾燥者，可下之。宜此湯。●少陰病，六七日，腹脹不大便者，急下之。宜此湯方。

大黃^{四兩} 厚朴^{半斤} 枳實^{五枚}
芒硝^{三合}

右四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，內大黃，更煮取二升，去滓，內芒硝，更上微火，一兩沸，分溫再服，得下餘勿服。

小承氣湯 同陽明病，脈遲，雖汗出，不惡寒者，其身必重，短氣，腹滿而喘，有潮熱者，此外欲解，可攻裏也。手足微然汗出者，此大便已鞕也。大承氣湯主之。若汗多，微發熱，惡寒者，外未解也。^{一法與}桂枝湯其熱不潮，未可與承氣湯。若腹大滿不通者，可與此湯。微和胃氣，勿令至大泄下。

●陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與此湯之入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以此湯和之不轉失氣者慎不可攻也●陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭則譫語此湯主之若一服譫語止者更莫復服●陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者此湯主之因與承氣湯一分腹中轉失氣者更服一分若不轉氣者勿更與之明日亦不大便脈反微澹者裏虛也為難治不可更與承氣湯也●大陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與此湯和之愈●得病

二三日脈弱無太陽柴胡証煩躁心下鞭至四五日雖能食以此湯少之與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不受食大便但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須小便利尿定鞭乃可攻之宜大承氣湯●下利譫語者有燥屎也宜此湯方

大黃^{四兩}厚朴^{三兩}枳實^{三枚}

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯同傷寒脈浮自汗出小

便數心煩微惡寒脚掣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩燥吐逆者作甘州乾姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘州湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與此湯●問

傷寒

宜下

四十九

曰、証象陽且按法治之、而增劇、厥
逆、咽中乾、兩脛拘急、而譫語、師曰、
言夜半手足當溫、兩脚當伸、後如
師言、何以知之、答曰、寸口脈浮而
大、浮為風、大為虛、風則生微熱、虛
則兩脛挛、病形象桂枝、因加附子、
參其間、增桂令汗出、附子溫經、亡
陽故也、厥逆、咽中乾、煩躁、陽明內
結、譫語煩亂、更飲甘艸乾姜湯、夜
半陽氣還、兩足當熱、脛尚微拘急、
重與芍藥甘艸湯、令乃脛伸、以散
氣湯、微溲則止其譫語、故知病可
愈、●傷寒不大便、六七日、頭痛有
熱者、與承氣湯、其小便清者、一云小便
青知不在裏、仍在表也、當須發汗、
若頭痛者、必衄、宜桂枝湯、●發汗
後、惡寒者、虛故也、不惡寒、但熱者、
實也、當和胃氣、與此湯、●太陽病
未解、脈陰陽俱停、一作微必先振慄、
汗出而解、但陽脈微者、先汗出而

解、但陰脈微、一作尺者下之而解、
若欲下之、宜此湯、●傷寒十三日、
過經、譫語者、以有熱也、當以湯下
之、若小便利者、大便當鞅、而反下
利、脈調和者、知醫以丸藥下之、非
其治也、若自下利者、脈當微厥、今
反和者、此為內實也、此湯主之、●
太陽病、過經十餘日、心下溫、欲
吐而胸中痛、大便反溲、腹微滿、胃
弱微煩、先此時、自極吐下者、與此
湯、若不尔者、不可與、但欲嘔、胸中
痛、微溲者、此非柴胡湯証、以嘔故知
極吐下也、●陽明病不吐、不下、心
煩者、可與此湯、●太陽病、三日發
汗不解、蒸々發熱、屬胃也、此湯主
之、●傷寒吐後、腹脹滿者、與此湯、
大黃四兩去皮 甘艸二兩 芒硝半升
清酒洗 右三味切、水三升、煮二物至一升、
去滓、內芒硝、更上微火、一二沸、溫
頓服之、以調胃氣、

麻子仁丸同 跌陽脈浮而濇，浮則胃氣強，濇則小便數，浮濇相搏，大便則鞭，其脾為約，此丸主之。方

麻子仁二升 芍藥半斤 枳實半斤 大黃一斤 厚朴一斤 杏仁一斤 脂作 芒硝二

右六味，蜜和丸，如梧桐子大，飲服十丸，日三服，漸加以知為度。

大柴胡湯

同 太陽病過經十餘日，反

二三下之後，四五日柴胡症仍在者，先與小柴胡，嘔不止，心下急，少安，鬱々微煩者，為未解也，與此湯，下之則愈。●傷寒十餘日，熱結在裏，復往來寒熱者，與此湯，但結胸無大熱者，此為水結在胸脇也，但頭微汗出者，大陷胸湯主之。●傷寒發熱，汗出不解，心中痞鞭，嘔吐而下利者，此湯主之。方

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半升 枳實四枚 大黃二兩 生姜五兩

右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，溫服一升，日三服，一方加大黃二兩，若不加，恐不為大柴胡湯。

柴胡加芒硝湯

同 傷寒，十三日不解，胸脇滿而嘔，日晡所發潮熱，已而

微利，此本柴胡證下之，以不得利，今反利者，知醫以丸藥下之，此非其治也，潮熱實也，先宜服小柴胡湯，以解外，後以此湯主之。方

柴胡二兩 黃芩二兩 芒硝二兩 甘草二兩 芍藥二兩 半夏半升 大黃二兩 芒硝二

右八味，以水四升，煮取二升，去滓，內芒硝，更煮微沸，分溫再服，不解更作。

十棗湯

同 太陽中風，下利嘔逆，表解者，乃可攻之，其人漉々汗出，發作

有時，頭痛，心下痞，鞭滿，引脇下痛，乾嘔，短氣，汗出不惡寒者，此表解

傷寒

宜下

五十一

裏未和也。此湯主之方。

芫花熬甘遂 大戟

右三味等分，各別搗為散，以水一升半，先煮大棗肥者十枚，取八合，去滓，內芫末，強人服一錢匕，羸人服半錢，溫服之，平旦服，若下少病不除者，明日更服，加半錢，得快下利，後糜粥自養。

桃核承氣湯

同

太陽病，不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，夕者愈，其外不解者，尚未可攻，當先解其外，夕解已，但少腹急結者，乃可攻之，宜此湯方。

桃仁

五十箇

大黃

四兩

桂枝

二兩

甘草

芍藥

二兩

芒硝

二兩

右五味

以水七升

煮取二升半

去滓

內芒硝

更上火

微沸下火

先食

溫服五合

抵當湯

同 太陽病六七日，表證仍在，脈微而沉，反不結胸，其人發狂者，

以熱在下焦，少腹當鞭滿，小便自利者，下血乃愈，所以然者，以太陽

隨經瘀熱，在裏故也。此湯主之。●

太陽病，身黃，脈沉結，少腹鞭，小便不利者，為無血也，小便自利，其人

如在者，血証諦也。此湯主之。● 陽

明證，其人喜忘者，必有畜血，所以

然者，本有久瘀血，故令喜忘，尿雖

鞭，大便反易，其色必黑者，宜此湯

下之。● 病人無表裏証，發熱七八

日，雖脈浮數者，可下之，假令已下

脈數不解，合熱則消穀喜飢，至六

七日，不大便者，有瘀血，宜此湯方。

水蛭熬 各三十箇

蟅蟲熬 去翅足熬 桃仁 二十箇

去皮 酒洗 大黃 酒洗

右四味，以水五升，煮取三升，去滓

溫服一升，不下更服。

抵當丸 同 傷寒有熱，少腹滿，應小便

不利，今反利者，為有血也，當下

之，不可餘藥，宜此丸方。

傷寒 宜下

五十二

水蛭三箇 塗蟲三箇 去翅足三箇 桃人三箇

右四味，搗分四丸，以水一升，煮一丸，取七合服之，啐時當下血，若不下者更服。

蜜煎同 陽明病，自汗出，若發汗，小便自利者，此為津液內竭，雖鞭不可攻之，當須自欲大便，宜此煎導而通之。若土瓜根及大猪胆汁，皆可為導方。

食蜜七合

右一味，於銅器內，微火煎，當須凝如飴狀，攪之勿令焦著，欲可丸，併手捻作挺，令頭銳，大如指長二寸許，當熱時急作，冷則鞭，以內穀道中，以手急抱，欲大便時乃去之，疑非仲景意，已試甚良。又大猪胆一枚，泻汁和少許，法醋以灌穀道內，如一食頃，當大便出宿食惡物，甚效。

發汗吐下後附 不得眠

桂枝加芍藥生姜各一兩人參三兩，新加湯，傷發汗後身疼痛，脈沉遲者主之。

桂枝二兩 芍藥四兩 甘草二兩 人參三兩 大棗十二枚 生姜四兩

右六味，以水一斗二升，煮取三升，去滓，溫服一升，本云桂枝湯，今加芍藥，生姜，人參。

桂枝去芍藥加蜀漆竜骨牡蛎救逆湯同 傷寒脈浮，醫以火迫劫之，亡陽，必驚狂，臥起不安者，主之方。

桂枝三兩 甘草二兩 生姜三兩 大棗十二枚 牡蛎五兩 蜀漆三兩 竜骨四兩

右七味，以水一斗二升，先煮蜀漆，減二升，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，本云桂枝湯，今去芍藥，加蜀漆，牡蛎，竜骨。

桂枝二麻黃一湯同 服桂枝湯，大汗出，脈洪大者，與桂枝湯，如前法，若傷寒發汗後，不得眠。

形似瘡，一日再發者，汗出必解，主之方。

桂枝二兩十七 芍藥二兩 麻黃六兩 去節一兩六 生姜一兩六 杏仁十六箇 甘草一兩二 大棗五枚

右七味，以水五升，先煮麻黃一二沸，去上沫，內諸藥，煮取二升，去滓，溫服一升，日再服。本云桂枝湯二分，麻黃湯一分，合為二升，分再服，今合為一方，將息如前法。

桂枝甘肅湯同 發汗過多，其人又手自冒心，心下悸，欲得按者，主之。

桂枝四兩 甘草二兩 右二味，以水三升，煮取一升，去滓頓服。

厚朴半斤 生姜半斤 半夏半斤 厚朴半斤 去皮炙 生姜半斤 切洗 半夏半斤 後，腹脹滿者，主之方。

甘肅二兩 人參一兩 右五味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

芍藥甘肅附子湯同 發汗病不解，反惡寒者，虛故也，主之方。

芍藥各三 甘肅各三 附子一枚 炮去 右三味，以水五升，煮取一升五合，去滓，分溫三服，疑非仲景方。

真武湯同 太陽病，發汗，身出不解，其人仍發熱，心下悸，頭眩，身瞤動，振欲擗地者，主之方。

茯苓各三 芍藥各三 白朮各三 附子一枚 炮去 皮破 八片 右五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服七合，日三服。

茯苓桂枝甘草大棗湯同 發汗後，其人臍下悸，欲作奔豚，主之方。

茯苓半 桂枝四兩 去皮 甘草二兩 大棗十五枚 右四味，以甘爛水一斗，先煮茯苓，減二升，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。●作甘爛水法，取

傷寒 發汗後不得眠 五十四

水二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之

麻黃杏仁甘草石羔湯同發汗下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與此湯方

麻黃四兩杏仁五兩甘草二兩石羔半斤碎

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

柴胡桂枝乾姜湯同傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也主之方

柴胡半斤桂枝三兩乾姜二兩枳實根四兩黃芩三兩牡蠣三兩甘草二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈
梔子豉湯同發汗後水藥不得入口

為逆若更發汗必吐下不止發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹此湯主之

●若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生姜豉湯主之

●傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也主之

●陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤々反譫語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者主之

●陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者主之

●下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜此湯方

梔子十四箇香豉四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分為二服溫進一服

傷寒 發汗吐下不得眠 五十五

梔子甘草豉湯同 主治見梔子豉湯下

梔子去苗 甘草去心 香豉四合

右三味以水四升先煮梔子甘草取二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服

梔子生姜豉湯同 主治見梔子豉湯下

梔子去苗 生姜五兩 香豉四合

右三味以水四升先煮梔子生姜取二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服

茯苓四逆湯同 發汗若下之病仍不解煩燥者主之方

茯苓四兩 人參一兩 附子一枚生用去 甘草炙乾姜半

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日二服

茯苓桂枝白朮甘草湯同 傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊發汗則動經身為振

振搖者主之方

茯苓四兩 桂枝三兩 白朮三兩 甘草炙 右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

乾姜附子湯同 下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表証脈沉微身無大熱者主之方

乾姜一斤 附子一枚生用去皮破八片 右二味以水三升煮取一升去滓頓服

桂枝去芍藥湯同 太陽病下之後脈促胸滿者主之若微寒者桂枝去芍藥加附子湯主之方

桂枝三兩 甘草三兩 芍藥三兩 大棗十二枚 右四味以水七升煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯去芍藥將息如前法

桂枝去芍藥加附子湯同 主治見桂枝去芍藥湯下

傷寒發汗下後附不得眠 五十六

桂枝三兩 甘草二兩 生姜五兩 大枣十二枚
附子一枚炮去

右五味以水七升煮取三升去滓
温服一升本云桂枝湯今去芍藥
加附子將息如前法

桂枝去桂加茯苓白朮湯同服桂枝
湯或下之仍頭項強痛翁夕發熱
無汗心下滿微痛小便不利者主
之方

芍藥三兩 甘草二兩 生姜切 白朮

右六味以水八升煮取三升去滓
温服一升小便利則愈本云桂枝
湯今去桂枝加茯苓白朮

桂枝加芍藥湯同本太陽病醫反下
之因尔腹滿時痛者屬太陰也主
之大實痛者桂枝加大黃湯主之
方

桂枝三兩 芍藥六兩 甘草二兩 大枣十二枚
生姜切

右五味以水七升煮取三升去滓
温分三服本云桂枝湯今加芍藥

桂枝加大黃湯同本太陽病醫反下
之因尔腹滿大實痛者主之●太
陰為病脈弱其人續自便利設當
行太黃芍藥者宜減之以其人胃
氣弱易動故也下利者先煎芍藥方

桂枝三兩 大黃二兩 芍藥六兩 生姜切
甘草二兩 大枣十二枚

右六味以水七升煮取三升去滓
温服一升日三服

柴胡加竜骨牡蛎湯同傷寒八九日
下之胸滿煩驚小便不利讞語一
身盡重不可轉側者主之方

柴胡四兩 竜骨 黄芩 生姜切
鉛丹 人參 桂枝去皮 茯苓各二兩
半夏二合 大黃二兩 牡蛎二兩 大枣六枚

右十二味以水八升煮取四升内
大黃切如碇子更煮一兩沸去滓
温服一升本云柴胡湯今加竜骨

傷寒 發汗吐下後附不得眠 五十七

等

桂枝甘草竜骨牡蛎湯同 火逆下之

因燒針煩躁者主之方

桂枝二兩 甘草二兩 牡蛎二兩 竜骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去

滓温服八合日三服

葛根黃芩黃連湯同 太陽病桂枝証

醫反下之利遂不止脈促者表未

解也喘而汗出者主之方

葛根半斤 甘草二兩 黃芩三兩 黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升

內諸藥煮取二升去滓分温再服

桂枝人參湯同 太陽病外證未除而

數下之遂協熱而利下不止心

下痞鞭表裏不解者主之方

桂枝四兩 別切 甘草二兩 白朮三兩 人參

三兩 乾姜二兩

右五味以水九升先煮四味取五

升內桂更煮取三升去滓温服一

升日再夜一服

麻黃升麻湯同 傷寒六七日大下後

寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不

至嗔咽不利唾膿血泄利不止者

為難治主之方

麻黃二兩 升麻二兩 當歸二兩 知母

大黃六兩 芍藥六兩 芎藭六兩

天門冬六兩 桂枝六兩 茯苓六兩

甘草六兩 石羔六兩 白朮六兩 乾姜

同上

右十四味以水一斗先煮麻黃一

兩沸去上沫內諸藥煮取三升去

滓分温三服相去如炊三斗米頃

令盡汗出愈

大陷胸丸同 病發於陽而反下之熱

入因作結胸病發於陰而反下之

一作因作痞也所以成結胸者以

汗出大早故也結胸者項亦強如

柔痙狀下之則和宜此丸友

大黃半斤 葶藶子半升 芒硝半升

杏仁半升 炙黑

傷寒

發汗吐下後陷不得眠

五十八

右四味、搗篩二味、內杏仁、芒硝、合研如脂和、散取如彈丸一枚、別搗甘遂末一錢匕、白蜜二合、水二升、煮取一升、溫頓服之、一病乃下、如不下更服、取下為效、禁如藥法、

大陷胸湯 同 太陽病、脈浮而動數、浮則為風、數則為熱、動則為痛、數則為虛、頭痛發熱、微盜汗出、而反惡寒者、表未解也、一云頭眩 醫反下之、動數變遲、膈內拒痛、痛即眩 胃中空虛、客氣動膈、短氣躁煩、心中懊憹、陽氣內陷、心下因鞅、則為結胸、主之、若不結胸、但頭汗出、餘處無汗、劑頸而還、小便不利、身必發黃、主之、**傷寒六七日、結胸熱實、脈沉而緊、心下痛、按之石鞅者、主之、傷寒十餘日、熱結在裏、復往來寒熱者、與大柴胡湯、但結胸無大熱者、此為水結在胸脇也、但頭微汗出者、主之、** ● 太陽病、重發汗、而復下之、不

大便五六日、舌上燥而渴、日晡所

小有潮熱、一云日晡所 心下至

少腹、鞅滿而痛、不可近者、主之、**傷寒五六日、嘔而發熱者、柴胡湯**

證具、而以他藥下之、柴胡症仍在

者、復與柴胡湯、此雖已下之、不為

逆、必蒸蒸而振、却發熱、汗出而解、

若心下滿、而鞅痛者、此為結胸也、

主之、 ● 但滿而不痛者、此為痞、柴

胡不中與之、半夏瀉心湯主之、

大黃 六兩 芒硝一升 甘遂一錢

右三味、以水六升、先煮大黃、取二

升、去滓、內芒硝、煮一兩沸、內甘遂

末、溫服一升、得快利、止後服、

小陷胸湯 同 小結胸病、正在心下、按

之則痛、脈浮滑者、主之、**寒實結**

胸、無熱證、與此湯、白散亦可服、

黃連 一斤 半夏半升 栝蒌實一枚

右三味、以水六升、先煮栝蒌、取三

升、去滓、內諸藥、煮取二升、去滓分

傷寒 發汗後不得眠 五十九

溫二服、

白散同主治見小陷胸湯下、

桔梗三分巴豆一分去皮心熬黑研如脂貝母三分
右三味為散、內巴豆更於白中杵之、以白飲和服、強人半錢匕、羸者

減之、病在膈上必吐、在膈下必利、不利進熱粥一杯、利過不止、進冷粥一杯、身熱皮粟不解、欲引衣自覆、若以水噴之、洗之、益令熱、却不得出、當汗而不汗則煩、假令汗出已、腹中痛、與芍藥三兩、如上法、

半夏瀉心湯同傷寒五六日、嘔而發熱者、柴胡湯證具、而以他藥下之、已下之、不為逆、必蒸蒸而振、却發熱、汗出、而解、若心下滿、而鞭痛者、此為結胸也、大陷胸湯主之、但滿不痛者、此為痞、柴胡不中與之、宜此湯方、

半夏半升洗黃芩 乾姜 人參

甘州參黃連一兩大棗十枚

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、再煎取三升、溫服一升、日三服、

大黃黃連瀉心湯同心下痞、按之濡、

其脈關上浮者主之、●傷寒大下後、復發汗、心下痞、惡寒者、表未解也、不可攻痞、當先解表、乃可攻痞、解表宜桂枝湯、攻痞此湯主之方、

大黃二兩黃連一兩

右二味、以麻沸湯二升、漬之、須臾絞去滓、分溫再服、臣億等看詳大諸本、皆二味、又後附子瀉心湯用大黃黃連、黃芩、附子、恐是前方中亦有黃芩、後但加附子也、故後云附子瀉心湯、本云加附子也、○嘉按千金、友治心氣不足、吐血、衄血、瀉心湯、與林氏說合、當依本方、加黃芩一兩、

附子瀉心湯同心下痞、而復惡寒、汗

出者、主之方、

大黃二兩黃連一兩黃芩一兩附子一枚

炮去皮破別煮取汗

傷寒

發汗下後不得眠

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁溫再服

生姜瀉心湯同傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者主之方

生姜切甘草三兩人參三兩乾姜一兩黃芩三兩半夏半升黃連一兩大棗十枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服附

子瀉心湯本云加附子半夏瀉心湯甘草瀉心湯同躰別名耳生姜瀉心湯本云理中參黃芩湯去

挂枝朮加黃連并瀉肝法

甘草瀉心湯同傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不

得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中

虛客氣上逆故使鞭也主之方

甘草四兩黃芩三兩乾姜三兩黃連一兩半夏半升大棗十枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

旋覆代赭湯同傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下

痛氣上衝咽喉眩暈經脈動惕者久而成瘕傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者主之

旋復花三兩人參二兩生姜五兩代赭一兩甘草二兩半夏半升大棗十枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫一升日三服

梔子厚朴湯同傷寒下後心煩腹滿臥起不安者主之方

梔子十四枚厚朴四兩枳實四枚黃芩二兩

右三味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進服得吐者止後服

梔子乾姜湯同傷寒醫以丸藥大下傷寒發汗吐下後不得眠

傷寒發汗吐下後不得眠

之身熱不去，微煩者，主之方。

梔子去心 乾姜一兩

右二味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，溫進一服。

潑師酸棗湯，外療傷寒，及吐下後，心煩，乏氣，晝夜不眠方。

酸棗仁四升 參門冬一升 甘草二兩

蜆母二兩 茯苓二兩 芎藭二兩 乾姜三兩

右七味，切，以水一斗六升，煮酸棗，取一斗，去棗，內藥，煮取三升，去滓，溫分三服。忌海藻、菘菜、大醋。按金匱無

●宜溫

四逆湯，傷寒，脈浮，自汗出，小便數，

心煩，微惡寒，腳掣急，反與桂枝，欲攻其表，此誤也，得之便厥，咽中乾，煩躁，吐逆者，作甘草乾姜湯與之，以復其陽。若厥愈，足溫者，更作芍藥甘草湯與之，其脚即伸。若胃氣不和，嘔語者，少與調胃承氣湯。若

重發汗，復加燒針者，主之。●傷寒，

脈下之，續得下利，清穀不止，身疼

痛者，急當救裏，宜此湯。●病發熱，

頭痛，脈反沉，若不差，身體疼痛，當

救其裏，宜此湯。●脈浮而遲，表熱

裏寒，下利，清穀者，主之。●自利不

渴者，屬太陰，以其藏有寒故也，當

溫之，宜四逆輩。●少陰病，脈沉者，

急溫之，宜此湯。●少陰病，飲食入

口則吐，心中溫々欲吐，復不能吐，

始得之，手足寒，脈弦遲者，此胸中

實，不可下也，當吐之，若膈上有寒

飲，乾嘔者，不可吐也，當溫之，宜此

湯。●大汗出，熱不去，內拘急，四肢

疼，又下利，厥逆而惡寒者，主之。●

大汗若大下利，而厥冷者，主之。●

下利，腹脹滿，身體疼痛者，先溫其

裏，乃攻其表，溫裏宜此湯。●嘔而

脈弱，小便復利，身有微熱，見厥者，

難治，主之。●吐利，汗出發熱，惡寒，

傷寒 宜溫

四肢拘急手足厥冷者主之方

甘草兩乾姜兩附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚乾姜三兩

通脈四逆湯同少陰病下利清穀裏

寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者主之
●下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主之方

甘草兩附子大者一枚生用去皮破八片乾姜

三兩強人可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脈即出者愈面色赤者加葱九莖腹中痛去葱加芍藥二兩嘔者加生姜二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脈不出者去桔梗加人參二兩病皆與方相應者乃服之

通脈四逆加豬膽湯同吐已下斷汗

出厥四肢拘急不解脈微欲絕者

主之方

甘草兩乾姜兩附子大者一枚生用可四兩

破八片豬胆汁半合

右四味以水三升煮取一升二合去滓內豬胆汁分溫再服其脈即來無豬胆以羊胆代之

四逆加人參湯同惡寒脈微而復利

利止亡血也主之方

甘草兩附子一枚生用去皮破八片乾姜兩

人參兩

右四味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服

當歸四逆湯同手足厥寒脈細欲絕

者主之若其人內有久寒者宜當

歸四逆加吳茱萸生姜湯方

當歸三兩桂枝三兩芍藥三兩細辛

甘草二兩通艸二兩大棗二十五枚擘一法

傷寒

宜溫

右七味以水八升煮取三升去滓
温服一升日三服

當歸四逆加吳茱萸生姜湯同主治
見當歸四逆湯下

當歸^{三兩}芍藥^{三兩}甘草^兩通草^{二兩}
桂枝^{三兩}細辛^兩生姜^{半斤}吳
茱萸^{二升}大棗^{二十五枚}

右九味以水六升清酒六升和煮
取五升去滓温分五服一方水酒各四升

甘草乾姜湯同傷寒脈浮自汗出小
便數心煩微惡寒脚挛急反與桂
枝欲攻其表此誤也得之便厥咽
中乾煩躁吐逆者作此湯與之以
復其陽若厥愈足温者更作芍藥
甘草湯與之其脚即伸也

甘草^兩乾姜^兩

右二味以水三升煮取一升五合
去滓分温再服

附子湯同少陰病得之一二日口中
和其背惡寒者當灸之此湯主之

●少陰病身體痛手足寒骨節痛
脈沉者主之方

附子^{一枚炮去}茯苓^{三兩}人參^{二兩}
白朮^{四兩}芍藥^{三兩}

右五味以水八升煮取三升去滓
温服一升日三服

●雜治

小柴胡湯傷寒五六日中風往來
寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心
煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或
腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小
便不利或不渴身有微熱或欬者
主之●血弱氣盡膜理開邪氣因
入與正氣相搏結於脇下正邪分
爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲
飲食藏府相連其痛必下邪高痛
下故使嘔也一云藏府相連其病必下而中痛此
方主之●服柴胡湯已渴者屬陽
明以法治之●得病六七日脈遲
浮弱惡風寒手足温医二三下之

傷寒 雜治

不能食而脇下滿痛、面目及身黃、
頭項強、小便黃者、與柴胡湯、後必
下重、本渴、飲水而嘔者、柴胡不中
與也、食穀者噦、●傷寒、四、五日、身
熱、惡風、頭項強、脇下滿、手足溫、而
渴者、主之、●傷寒、陽脈濇、陰脈弦、
法當腹中急痛、先與小建中湯、不
差者、此湯主之、●傷寒、中風、有柴
胡證、但見一證、便是、不必悉具、凡
柴胡湯病證、而下之、若柴胡證不
罷者、復與此湯、必蒸蒸而振、却發
熱、汗出而解、●太陽病、過經十餘
日、反二三下之、後四五日、柴胡證
仍在者、先與此湯、嘔不止、心下急、
鬱々微煩者、未解也、與大柴胡湯、
下之則愈、●傷寒、十三日不解、胸
脇滿而嘔、日晡所發潮熱、已而微
利、此本柴胡證、下之以不得利、今
反利者、知醫以丸藥下之、此非其
治也、潮熱者實也、先宜服此湯、以

解外、後以柴胡加芒硝湯主之、●
婦人中風、七八日、續得寒熱、發作
有時、經水適斷者、此為熱入血室、
其血必結、故使如瘧狀、發作有時
主之、●傷寒、五、六日、頭汗出、微惡
寒、手足冷、心下滿、口不欲食、大便秘
鞭、脈細者、此為陽微結、必有表、復有
裏也、●脈沉、亦在裏也、汗出為陽
微、假令純陰結、不得復有外証、悉
入在裏、此為半在裏、半在外也、
●脈雖沉緊、不得為少陰病、所以
然者、陰不得有汗、今頭汗出、故知
非少陰也、可與此湯、設不了了者、
得屎而解、●傷寒、五、六日、嘔而發
熱者、柴胡湯證具、而以他藥下之、柴
胡證仍在者、復與此湯、此雖已下
之、不為逆、必蒸蒸而振、却發熱、汗
出、而解、若心下滿、而鞭痛者、此為
結胸也、大陷胸湯主之、但滿而不
痛者、此為痞、柴胡不中與之、宜半

夏瀉心湯●陽明病發潮熱大便
濇小便自可胸脇滿不去者與此
湯●陽明病脇下鞅滿不大便而
嘔舌上白胎者可與此湯上焦得
通津液得下胃氣因和身濇然汗
出而解●陽明中風脈弦浮大而
短氣腹都滿脇下及心痛
又按之氣不通鼻乾不得
汗嗜臥一身及目悉黃小便難有
潮熱時々噦耳前後腫刺之小差
外不解病過十日脈續浮者與此
湯●本太陽病不解轉入少陽者
脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱
尚未吐下脈沉緊者與此湯若已
吐下發汗溫針譫語柴胡症罷此
為壞病知犯何逆以法治之

●嘔而發熱者主之方

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 半夏半升
甘草炙 生姜各三兩 大棗十五枚
右七味以水一斗二升煮取六升

去滓再煎取三升溫服一升日三
服若胸中煩而不嘔者去半夏人
參加枳實一枚若渴去半夏人
參合前成四兩半枳實根四兩若
腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若
脇下痞鞅去大棗加牡蛎四兩若
心下悸小便不利者去黃芩加茯
苓四兩若不渴外有微熱者去人
參加桂枝三兩溫覆微汗愈若欬
者去人參大棗生姜加五味子半
升乾姜二兩

柴胡桂枝湯同傷寒六七日發熱微
惡寒支節煩疼微嘔心下支結外
證未去者主之●發汗多亡陽譫
語者不可下與柴胡桂枝湯和其
榮衛以通津液後自愈方

桂枝去皮 黃芩半兩 人參半兩 甘草半兩
半夏二合 芍藥三兩 大棗六枚 生
姜半斤 柴胡四兩

右九味以水七升煮取三升去滓

傷寒

雜治

六六

温服一升，本云人参汤，作如桂枝法，加半夏、柴胡、黄芩，按如柴胡法，今用人参作半剂。

小建中汤 同 伤寒，阳脉沉，阴脉弦，法当腹中急痛，先典此汤，不差者，小柴胡主之。● 伤寒二三日，心中悸而烦者，主之方。

桂枝 三两 去皮 甘草 二两 炙 大枣 十二枚 擘 芍药 六两 生姜 三两 切 胶胎 一分

右六味，以水七升，煮取三升，去滓，内饴，更上微火，消解，温服一升，日三服，呕家不可用建中汤，以甜故也。

炙甘草汤 同 伤寒，脉结代，心动悸，主之。

甘草 四两 炙 生姜 半斤 切 人参 二两 生地黄 一斤 切 桂枝 二两 去皮 阿胶 二两 炙 麦门冬 半斤 去心 麻人 半斤 大束 擘

右九味，以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，内胶，烊消尽，温服一升，日三服，一名复脉汤。

四逆散 同 少阴病，四逆，其人或咳或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利，下重者，主之方。

甘草 炙 枳实 破 芍药 炙 柴胡 炙 芍药

右四味，各十分，搗筛，白饮和服，方寸匕，日三服，按者加五味子、乾姜各五分，并主下利。悸者，加桂枝五分。小便不利者，加茯苓五分。腹中痛者，加附子，一枚，炮，折。泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，煮取三升，去滓，以散三方寸匕，内汤中煮，取一升半，温再服。

麻黄连翘赤小豆汤 同 伤寒，瘀热在裏，身必发黄，主之方。

麻黄 二两 去节 连翘 二两 连翘根是 杏仁 十四枚 去皮尖 赤小豆 一升 大枣 十二枚 擘 生梓白皮 一斤 切 生姜 二两 切 甘草 二两 炙

右八味，以潦水一斗，先煮麻黄，再沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温三服，半日服尽。

梔子葉皮湯同傷寒身黃發熱主之方

肥梔子主箇 甘艸二兩 黃柏二兩
右三味以水四升取一升半去滓分溫再服

茵陳蒿湯同陽明病發熱汗出者此

為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘀熱在裏身必發黃主之
●傷寒七八日身黃如橘子色小便不利少腹微滿屬此湯證方

茵陳蒿六兩 梔子十四枚 大黃二兩

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分三服小便當利尿如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去

白虎湯同傷寒脈浮滑此表有熱裡

有寒主之
●三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢又作枯一 讞語遺尿發汗則讞語下之則額

上生汗手足逆冷若自汗出者主之
●傷寒脈滑而厥者裏有熱主之方

知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛方千金

柴胡 梔子仁 芍藥 知母
各四兩 升麻 黃芩 大青 杏仁
各三兩 石膏八兩 香豉一升

右十味以水九升煮取二升七合分溫三服若熱盛加大黃四兩

滾師石羔湯 療傷寒病已八九日

三焦熱其脈滑數昏憤身體壯熱沉重拘攣或時呼呻而已攻內體猶沉重拘攣由表未解今直用解毒湯則毒急不差直用汗藥則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黃湯以救其內有所增加以解

其外故名石羔湯方外

石羔 黃連 黃蘗十枚 黃芩

香豉一升 綿裹 梔子十枚 麻黃三

節去

右七味切以水一斗煮取三升分
為三服一日併服出汗初服一劑
少汗其後更合一劑分而日服常
令微汗出拘挛煩憤即差得數行
利心開令語毒折也忌豬肉冷水
崔氏前軍督護劉車者得時疾三日
已汗解因飲酒復劇若煩悶乾嘔
口燥呻吟錯語不得臥余思作此
黃連解毒湯方同

黃連三 黃芩 黃蘗各二 梔子

十枚

右四味切以水六升煮取二升分
二服一服目明再服進粥於此漸
差余以療凡大熱盛煩呶呻吟錯語
不得眠皆佳傳語諸人用之亦效
此直解熱毒除酷熱不必飲酒剽

者此湯療五日中午神效忌豬肉冷
水

張文仲療傷寒八九日不差名為敗

傷寒諸藥不能消者方同

鼈甲炙 蜀升麻 前胡 烏梅

枳實炙 犀角屑 黃芩色 甘艸兩

生地黃八分

右九味切以水七升煮取二升半

分五服日三服夜二服忌海藻菘

菜苜菜蕪荑備急方

瀉心導赤飲壽世 傷寒漸變神昏不

語或睡中獨語一二旬目赤唇焦

將水與則嚙名曰越經

黃連 黃芩 甘艸 犀角

滑石 麥門冬 山梔子 白

茯苓 知母 人參

姜東燈心煎服臨臥服入生地黃

汁三匙傷寒六書名導赤各半湯

咽喉痛及口瘡

甘草湯傷少陰病二三日咽痛者可

傷寒 咽喉痛 六九

與此湯不差與桔梗湯友

甘草二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日二服

桔梗湯同主治見甘草湯下

桔梗一兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓溫分再服

苦酒湯同少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者主之方

半夏洗破如棗核十四枚雞子一枚去黃內苦酒着雞子殼中

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓少々含嚥之不差更作三劑

半夏散及湯同少陰病咽中痛主之

半夏洗桂枝去皮甘草炙

右三味等分各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煮三沸下火令小冷少

々嚥之半夏有毒不當散服

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通方千金

生烏扇一斤猪脂一斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄綿裹之內喉中稍咽之取差

又方同

升麻 芍藥 羚羊角各三兩 通

草四兩射干二兩生蘆根一斤

右六味以水七升煮取二升半分作三服

文仲療傷寒毒攻喉咽腫痛方兼天行外

切商陸炙令熟以布藉喉以慰布上於復易之肘後同

又療傷寒口瘡煉者升麻湯方同

升麻一兩甘草一兩竹葉切麥門冬三分牡丹一分乾麥三枚去心

右六味切以水四升煮取一升半去滓分五服會稍々咽之為度忌海

傷寒 煩渴及小便不利 七十

薄菘菜、胡荽等。

●煩渴及小便不利

白虎加人參湯傷服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者主之。●傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者主之。●傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者主之。●傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表症者主之。●陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤々反譫語若加溫針必怵惕煩燥不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者主之方。

知母^六石羔^{一斤}碎
甘草^炙一
粳米^六人參^三
合^六西^三

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服。●此方立夏後立秋前乃可服立秋後不可服正月二月三月尚凜冷亦不可與服之與之則嘔利而腹痛諸亡血虛家亦不可與得之則腹痛利者但可溫之當愈。

五苓散^同大陽病發汗後大汗出胃

中乾煩躁不得眠欲得飲水者少々與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者主之。●發汗已脈浮數煩渴者主之。●傷寒汗出而渴者主之不渴者茯苓甘草湯主之。●中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水々入則吐者名曰水逆主之。●病在陽應以汗解之反以冷水瀝之若灌之其熱被劫不得去弥更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與此湯。●本以下

傷寒 煩渴及小便不利

之故，心下痞，其瀉心湯，痞不解，其人渴，而口煩躁，小便不利者，主之一方云，忍之一日乃愈。●太陽病，寸緩關浮，尺弱，其人發熱，汗出，復惡寒，不嘔，但心下痞者，此以醫下之也。如其不下者，病人不惡寒，而渴者，此轉屬陽明也。小便數者，大便必艱，不更衣十日，無所苦也。渴欲飲水，少少與之，但以法救之。渴者，宜此方。

猪苓六銖 澤瀉一兩 白朮六銖

茯苓六銖 桂枝半兩

右五味，搗為散，以白飲和服，方寸匕，日三服，多飲煖水，汗出愈。如法將息。

茯苓甘草湯 傷寒汗出而渴者，五

苓散，主之不渴者，此湯主之方。

茯苓二兩 桂枝二兩 甘草一兩

生姜三兩

右四味，以水四升，煮取二升，去滓

分溫三服。●傷寒厥而心下悸，宜先治水，當服此湯，却治其厥，不尔水漬入胃，必作利也。

文蛤散 同病在陽，應以汗解之，反以冷水溼之，若灌之，其熱被劫不得去，弥更益煩，肉上粟起，意欲飲水，反不渴者，服此散。若不差者，與五苓散方。

文蛤五兩

右一味，為散，以沸湯和一方寸匕，服湯用五合。

猪苓湯 陽明病脈浮而緊，咽燥，口

苦，腹滿而喘，發熱，汗出，不惡寒，反惡熱，身重，若發汗則躁，心憤々，反譫語，若加溫針，必怵惕煩躁，不得眠，若下之，則胃中空虛，客氣動膈，心中懊惱，舌上胎者，梔子豉湯主之。若渴欲飲水，口乾，舌燥者，白虎加入參湯主之。若脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利者，主之。●陽明病

傷寒

煩渴小便不利

汗出多而渴者不可與此湯以汗多胃中燥此湯復利其小便故也
●少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者主之

猪苓去皮 茯苓 澤瀉 阿膠
滑石碎各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烱消溫服七合日三服

●汗不止及盜汗

桂枝加附子湯傷太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者主之方

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草三兩 生姜三兩
去皮 附子一枚炮裂
切大棗十二枚 附子一枚炮裂
皮破八片

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升本云桂枝湯今加附子將息如前法

●嘔吐噦

黃連湯同傷寒胸中有熱胃中有邪

氣腹中痛欲嘔吐者主之方

黃連三兩 甘草三兩 乾姜三兩 桂枝三兩
去皮 人參二兩 半夏半升 洗大棗十五枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服晝三夜二

黃連阿膠湯同少陰病得之二三日以上心中煩不得臥主之方

黃連四兩 黃芩二兩 芍藥二兩 雞子黃二枚 阿膠三兩

右五味以水六升先煮三物取二升去滓內膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

乾姜黃芩黃連人參湯同傷寒四五

日腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自利也●傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐主之方

乾姜 黃芩 黃連 人參

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

烏梅丸同傷寒脈微而厥至七八日
層冷其人躁無暫安時者此為藏
厥非虵厥也虵厥者其人當吐虵
令病者靜而復時煩者此為藏寒
虵上入其膈故煩須臾復止得食
而嘔又煩者虵聞食臭出其人當
自吐虵々厥者主之方

烏梅三百 細辛六兩 乾姜十兩 黃連十六兩

當歸四兩 附子六兩 蜀椒四兩

桂枝六兩 人參六兩 黃蘗六兩

右十味異掬篩合治之以苦酒漬
烏梅一宿去核蒸之五斗米下飯
熟搗成泥和棗令相得內臼中與
蜜杵二千下丸如梧桐子大先食
飲服十九日三服稍加至二十九
禁生冷滑物臭食等

吳茱萸湯同少陰病吐利手足逆冷
煩躁欲死者主之●食穀欲嘔屬
陽明也主之得湯反劇者屬上焦
也主之●乾嘔吐涎沫頭痛者主

之方

吳茱萸一升 人參二兩 生姜六兩

大棗十二枚

右四味以水七升煮取二升去滓

溫服七合日三服

仲景傷寒論療嘔噦心下悸痞鞭不
能食小半夏湯方外

半夏一升 生姜八兩

右二味切以水七升煮取一升半

去滓分再服忌羊肉鰾

又療嘔吐噦心下痞鞭者以膈間有
水頭眩悸半夏加茯苓湯方同

半夏一升 生姜八兩 茯苓三兩

右三味切以水七升煮取一升半
去滓溫分再服忌羊肉鰾酢等物
又療胸內似喘不喘似嘔不嘔似噦
不噦心中憤々然微無聊賴者生
姜汁半夏湯兼主天行方同

生姜汁一升 半夏半升

右二味以水三升煮半夏取一升

傷寒 嘔吐噦

內姜汁取一升半，綿漉小冷分二服，一日一夜，服令盡，嘔噦一服得止者，停後服，忌羊肉、錫。

漢師療傷寒，病宛不止，甘草湯方，兼生天行，同。

甘艸高橘皮三

右二味切，以水五升，煮取一升，去滓，頓服之，日三四服，取差，忌海藻、菘菜。

又療傷寒，噦，甘竹茹湯方，同。

甘竹茹四生白米一

右二味，以水八升，煮之，取米熟湯成，去滓，分服，徐々服，療風熱氣噦，甚神驗，諸噦亦佳。

●下利及膿血

白通湯，傷少陰病，下利，主之方，傷

葱白四乾姜一附子一枚生薑一皮破八片

右三味，以水三升，煮取一升，去滓，分溫再服。

白虎加猪胆汁湯，同少陰病，下利，脈

微者，與白通湯，利不止，厥逆無脈，乾嘔，煩者，主之，服湯脈暴出者，死。

微續者，生方。

葱白四乾姜一附子一枚生薑一皮破八片

人尿五猪膽汁合

右五味，以水三升，煮取一升，去滓，內胆汁入尿，和令相得，分溫再服，若無胆亦可用。

真武湯，同少陰病，二三日不已，至四

五日，腹痛，小便不利，四肢沉重，疼痛，自下利者，此為有水氣，其人或欬，或小便利，或下利，或嘔者，主之方，方見發汗吐下後篇

桃花湯，同少陰病，下利，便膿血者，主

之。●少陰病，二三日，至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便膿血者，主之方。

赤石脂一斤一半全粳米一

乾姜一

右三味，以水七升，煮米令熟，去滓

傷寒 下利及膿血

温服七合，内赤石末方寸匕，日三服，若一服愈，勿服。

赤石脂禹餘糧湯同 傷寒，服湯藥下利不止，心下痞鞅，服瀉心湯已復，以他藥下之，利不止，医以理中與之，利益甚，理中者，理中焦，此利在下焦，此湯主之，復不止者，當利其小便方。

赤石脂一斤 太一禹餘糧一斤

右二味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

黄芩湯同 太陽與少陽合病，自下利者，與此湯。若嘔者，與黄芩加半夏生姜湯主之。●傷寒脈遲，六七日，而反與黄芩湯，微其熱，脈遲為寒，今與此湯，復除其熱，腹中應冷，當不能食，今反能食，此名除中，必死方。

黄芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩 大棗二十枚

右四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。

黄芩加半夏生姜湯同 主治，見黄芩湯下。

黄芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩 大棗二十枚 半夏半升 生姜一兩半

右六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。

白頭翁湯同 熱利，下重者主之。●下利欲飲水者，以有熱故也，主之方。

白頭翁二兩 黄蘗三兩 黄連三兩 秦皮三兩

右四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升，不愈更服一升。

●鼻衄吐唾血及下血
小品芍藥地黄湯，療傷寒及温病，應發汗而不發之，內瘀有畜血者，及鼻衄吐血不盡，內餘瘀血面黃，大便黑者，此主消化瘀血。外臺聖洩，如升麻代之。

傷寒 鼻衄吐唾血及下血

芍藥三分 地黃一分 丹皮一分 犀角屑一分

右四味切以水一斗煮取四升去滓温服一升日二三服有熱如狂者加黃芩二兩其人脈大未遲腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩按千金用芍藥三兩牡丹皮二兩若如狂者加大黃二兩黃芩三兩

茅花湯同

右以水八升煮取三升分三服即差無茅花取茅根代之亦可

仲景傷寒論吐血不止者柏葉湯主之方同

青柏葉三分 乾姜一分 艾一把

右三味以水五升煮取一升去滓別絞取新出馬通汁一升相和合前取一升綿濾之温分再服馬通是馬尿汁也一方有阿膠無艾

吐血下血黃土湯主之同

釜竈下黃焦土半升 甘草三分

乾地黄三分 白朮三分 附子三分 炮破

阿膠三分 黃芩三分

右七味切以水八升煮六味取二升去滓內膠令烱分三服忌海藻菘菜蕪荑猪肉桃李雀肉等物

古今錄驗蒲黃湯療傷寒温病天行疫毒及酒客熱傷中吐血不止面黃乾呕心煩方同

蒲黃 來寄生 桔梗一作栝蒌

犀角屑 甘草各二兩 芎藭三兩

右六味切以水七升煮取三升去滓分三服徐々服之忌海藻菘菜猪肉

●差後病 虛腫 虛羸 氣逆 不食 發熱 不得

眠 目生瘡 兼目昏

牡蛎澤瀉散傷大病差後從腰以下有水氣者主之方

牡蛎熬 澤瀉 蜀漆煨水洗 葶

藶子熬 商陸根熬 海藻洗去 栝

藁根各等分

傷寒 差後病

右七味異拊篩為散更於臼中治之白飲和服方寸匕日三服小便利止後服

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之方同

竹葉二把石羔一升半夏半升麥門冬一升人参二升甘草二兩粳米半升

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米米熟湯成去米溫服一升日三服

蘆根飲子 治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不可食方

生蘆根切青竹茹各一升粳米三合生姜三兩

右四味以水七升先煮千里鞋底一隻取五升澄清下藥煮取二升半隨便飲不差重作取差

大病瘥後喜唾久不了了胸上有寒當以丸藥溫之宜理中丸方傷

人参 白朮 甘草 乾姜

右四味拊篩蜜和為丸如雞子黃許大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三服

傷寒差已後更發熱小柴胡湯方見雜治主之脈浮者以汗解之脈沉實一作緊者以下解之傷

治傷寒後不了了朝夕有熱如瘧狀方

知母二兩麻黃 甘草 芍藥 黃芩 桂心各一兩

右六味以水七升煮取二升半服五合日三溫覆令微汗苦心煩不得眠其人欲飲水當稍々飲之令胃中和則愈

活人書傷寒差後或十數日或半月二十日終不惺々常昏沉似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼

崇或作風疾多般治不差或朝夕潮熱頰赤或有寒熱似瘧都是發傷寒 瘧後病

汗不盡餘毒在心胞絡之間所致
溫膽湯治大病後虛煩不得眠此
胆寒故也宜此方

半夏 竹茹 枳實各二兩 橘皮三兩
生姜四兩 甘草一兩

右六味以水八升煮取二升
分三服

肘後半夏茯苓湯方外

半夏高 秫米一升 茯苓四兩

右三味切以千里流水一石搗之
萬遍澄取二升合煮諸藥得五升
去滓溫分五服忌羊肉鰾醋等物

古今錄驗調中湯外 療夏月及初秋

忽有暴寒折於盛熱夕結四肢則
壯熱頭痛寒傷於胃則下利或血
或水或赤帶下壯熱且悶脈微且
數宜下之方

大黃 葛根 黃芩 芍藥 白朮
桔梗 茯苓 藁本 甘中灸各二兩

右九味以水九升煮取三升分三

服々別相去二食久勿以食隔須
取快下壯熱便歇其下亦止也凡
秋夏早熱積日忽有暴寒折之熱
無可散喜搏着肌中作壯熱氣也
胃為六腑之長最易得傷非忽暴
寒傷之而下也虛冷人則不在壯
熱但下利或霍亂也少實人有五
石人喜壯熱其適與藥斷下則
加熱喜悶而死矣亦有不止便作
壅熱毒壯熱甚不歇則劇是以宜
此調中湯下之和其胃氣其表熱
者宜前胡大黃下之也忌海藻菘菜
豬肉醋物桃李雀肉按治人書云調中湯
去大黃即治風溫證兼治陽病因
下遂收熱利不止及傷寒不因下
自利表不解而脈浮數者
皆可去大黃煎之殊驗也

知母湯聖濟 治傷寒後勞氣四肢煩
痛日漸虛羸唇紅頰赤方

知母焙半兩 犀角屑 地骨皮
前胡去 白鮮皮 柴胡去 赤茯苓去

傷寒 差後病 七十九

右九味麻痺篩每服三盞匕水一盞生薑三片煎至七分去滓食後溫服

人參散 本事方 治邪熱客於經絡肌

熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜多盜汗此藥補和真氣解勞倦婦人血熱虛勞骨蒸並皆治宜服此方

人參去 白朮去 白茯苓去 柴胡去

去苗 半夏麴 當歸洗去片薄切焙乾秤

赤芍藥 乾葛 甘艸各一兩 子

芩半兩

右為細末每服三錢水盞生薑四片東二箇煎至八分不拘時候帶熱服但是有勞熱証皆可服熱退即止大抵透肌解熱乾葛第一柴胡次之所以升麻葛根湯為解肌之冠也

豉薤湯 外陶氏傷寒下利主之方

豉一升 薤白握 梔子十四枚

右三味以水五升煮取二升半去

滓溫分三分小品云此方主溫毒及傷寒內虛外熱攻腸胃下黃赤汁及如爛肉汁并去赤滯下伏氣腹痛諸熱毒悉主之水四升先煮梔子薤白令熟內豉煮取二升分三服

大青湯 聖治傷寒熱病不解下痢因

篤主之方

大青 阿膠剉炒燥 赤石脂

山巵人 甘艸各一兩 各

右五味麴搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒薤白五寸切同煎至八分去滓溫服不拘時候

黃連橘皮湯 外療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛隱癢如錦文而效悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡已自得下痢宜服此方

黃連四兩 橘皮二兩 杏人二兩 去

傷寒 差後病

八十

枳實一兩 麻黃二兩 去節 葛根二兩 厚朴一兩 甘中一兩

右八味切以水八升煮取三升分三服令盡且消息下當先止

● 匿瘡

治濕匿方 千金

黃連四兩 生姜各十兩 艾葉八兩 苦參

右四味以水一斗煮取三升

分三服久者服三劑

治匿蟲蝕下部癢穀道中生瘡方 同

阿膠 當歸 青柏子各一兩 艾

葉一把

右四味以水八升煮取二升

半去滓分三服

桃皮湯同 治蟻蟲蛔蟲及痔匿蟲食

下部生瘡方

艾葉一兩 槐子一兩 大棗三十枚 桃皮

一兩

右四味以水三升煮取半升

頓服之良

黃連犀角湯外 療傷寒及諸病之後

內有瘡出下部煩者方

黃連一兩 烏梅十四枚 犀角三兩 青

木香兩半

右四味切以水五升煮取一升半

分再服忌豬肉冷水等

● 陰陽易

丈夫病以易婦人名為陽易速當療

之可差滿四日不可療也宜令服

此藥方外

乾姜四兩

右一味搗末湯和頓服溫覆汗出

得解止手足伸遂愈

范汪假鼠糞湯同 療傷寒病后男子

陰易方

薤一大把 假鼠糞十四枚

右二味以水五升煮取二升盡飲

之溫臥汗出便愈亦理勞復

● 勞復食復

傷寒 匿瘡

枳實梔子湯傷大病差後勞復者方

枳實三枚 梔子十四箇 豉一升

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗若有宿食者內大黃如博碁子五六枚服之愈

治傷寒溫病後勞復或食或飲或動作方

梔子仁三七枚 石羔五兩 香豉一升 鼠屎尖頭大者

右四味以水七升煮取三升分三服

麥門冬湯同治勞復氣欲絕起死人方

麥門冬一斤 甘艸二兩 京東廿枚 竹葉切一升

右四味以水七升煮粳米一升令熟去米內諸藥煎取三升分三服不能服者綿滴湯內口中用

之有效

治傷寒差後一年心下停水不能食

方同

生地黄五斤 白朮一斤 好麴二斤

右三味合搗令相得曝乾下篩酒服方寸匕日三加至二匕

大青湯外療勞復方

大青四兩 甘草二兩 阿膠二兩 香豉二兩

右四味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日五六欲盡復作常使有渴夕便飲無毒除熱止吐下傷寒一二日上至十數日困篤發汗熱不解吐下後熱不除止下痢甚良先煮大青甘草取四升去滓內膠豉膠消盡便灑去勿令毀壞當預漬膠令釋也忌菘菜海藻

●百合病

百合知母湯十治百合病已經發汗之後更發者之方

百合七枚 知母三兩

傷寒 陰陽易勞復食瘦 八十二

右二味以泉水先洗漬百合一宿當沫出水中明且去水取百合更以泉水二升煮取一升汁置之復取知母切以泉水二升煮取一升汁合和百合汁中復煮取一升汁分再服不差更依法合用服

百合滑石代赭湯同治百合病已經下之後更發者方

百合七枚 滑石三兩 代赭一兩

右三味先以泉水漬百合一宿明且去水更以泉水二升煮百合取一升去滓又以水二升煮餘二味取一升復煎取一升內百合汁如前法復煎取一升半分再服

百合地黃湯干治百合病始不經發汗吐下其病如初者方

以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升半內生地黃汁一升復煎取一升半分再

服大便當去惡沫為驗也

治百合病經月不解變成渴者方同

百合根一升以水一斗漬一宿以汁先洗病人身後食白湯餅勿與鹽豉也渴不瘥可用括蕒根并牡蛎等分為散飲服方寸匕日三

治百合病變而發熱方同

百合根一兩 滑石三兩

右二味治下篩飲服方寸匕日三當微利々者止勿復服熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

治百合病變腹中滿痛者方同

但取百合根隨多少熬令黃色搗篩為散飲服方寸匕日三滿消痛止

● 狐惑

赤小豆當歸散其人脈數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日

傷寒

百合 狐惑

眼赤如鳩眼得之七八日其四皆皆黃能食者膿已成也治之方十

以赤小豆三升漬之令生芽足乃復乾之加當歸三兩為末漿水服方寸匕日三即愈

瀉心湯其病形不可攻不可灸因火為邪血散脈中傷脈尚可傷臟則并輸益腫黃汁出經合外爛肉腐為瘡膿此為火疽醫所傷也夫脈數者不可灸因火為邪即為煩因虛逐實血走脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也應在瀉心瀉心湯兼治下痢不止腹中愠堅而嘔噦腸鳴者方仲景名半夏名甘草海心湯方見卷吐下後篇

天行病

●喉咽痛

古今錄驗青木香湯療春夏忽喉咽

痛而腫兼下痢方外

青木香二兩黃連一兩白頭翁二兩右三味切以水五升煮取一升半分溫三服小兒若服之一服一合忌猪肉冷水

●咳嗽

廣濟療天行壯熱咳嗽頭痛心悶前

胡湯方外

前胡 升麻各八分 貝母 紫苑各六分 石羔土分碎 麥門冬八分 杏仁三枚去 竹葉切一升 甘草五分 右九味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服相去如人行六七里進一服不吐利差忌海藻菘菜油膩猪魚毒等

又療天行後乍寒乍熱昏々不省覺

脇下痛百節骨痛欬不能下食兼

口舌乾生瘡柴胡湯友外

柴胡八分升麻六分芍藥六分黃芩六分
甘草五分石羔十二分碎綿裹生麥門冬
葱白六分香豉六分生薑六分
竹葉切一升洗

右十一味切以水九升煮取二升
五合絞去滓分溫三服々別相去
如人行六七里進一服不吐不利
差忌海藻菘菜麩油膩

黃連湯外天行病諸下悉主之方

黃連三兩黃蘗二兩當歸二兩

右三味以水六升煮取三升去滓
內蜜一合微火煎取二升半分三

服良驗忌猪肉冷水一方有龍骨一兩

消風百解散治四時傷寒頭疼項
強壯熱惡寒身體煩疼四肢倦怠
行步喘乏及寒癰咳嗽鼻塞聲重
涕唾稠粘痰涎壅盛氣急滿悶並
宜服之

荊芥 陳皮洗去白 白芷 蒼朮

麻黃去節各肆兩甘草炙二兩

右為細末每服二大匙水一大盞

姜三片烏梅一個同煎茶分不拘

時溫服或用茶酒調下仍欲發散

風邪入連鬚葱白參寸同煎

萎蕤湯醫通治風溫欬嗽及冬溫發

熱頭眩咽乾舌強

萎蕤一錢石羔三錢白微一錢麻

黃芩五分川芎一分蒼根一分羌活一分

甘草炙杏仁去皮尖碎青木香各一分

右水煎日三服牽繩無白微有白芷風溫者

脈尺寸俱浮頭痛身熱常自汗出

體重其身心喘四肢不收嘿々但

欲眠治在少陰厥陰不可發汗發

即謔語獨語內煩燥不得臥若驚

癩目乱無精如此死者醫殺之耳

●發班

犀角黑參湯醫通治發班毒盛咽痛

犀角各一分黑參各一分升麻一分射干一分

黃芩各一分人參各一分甘草一分

天行病 發班 八十五

右水煎温服、

犀角大青湯同治班出大盛、大熱、心煩、狂言、悶亂、

犀角二錢五分 大青一錢五分 黑參 升麻

黃連 黃芩 黃蘗 山梔各一錢

甘草八分

右水煎、熱服無時、

香頭湯外療肺腑臟熱、暴氣、斑點、方

香豉一升 葱鬚切四兩 石羔八兩

施子人三兩 生姜八兩 大青二兩

升麻三兩 芒硝三兩

右八味、切、以水六升、煮七味、取二

升五合、去滓、然後下芒硝、分三服、

黃連橘皮湯同療冬温、未即病、至春

被積寒所折、不得發、至夏得熱、其

春寒解、冬温毒、始發出肌中、斑爛

隱、瘳如錦文、而效、心悶、嘔吐、清汁

眼赤、口瘡、下部亦生瘡、已自得下

痢、宜服此方

黃連四兩 橘皮一兩 杏仁二兩 枳去毛

實二兩 麻黃二兩 葛根二兩 厚朴二兩

甘草二兩

右八味、切、以水八升、煮取三升、分

三服、令盡且消息、下當先止、

五積散局調中順氣、除風、冷、化痰、飲

治脾胃宿冷、腹脇脹痛、胸膈停痰、

嘔逆、惡心、或外感風寒、內傷生冷、

心腹痞悶、頭目昏痛、肩背拘急、肢

体怠惰、寒熱往來、飲食不進、及婦

人血氣不調、心腹撮痛、經候不勻、

或閉不通、并宜服之、

橘皮去白 白芷三分 枳殼 麻黃

白芍藥 川芎 當歸 甘草

炙茯苓 半夏 肉桂 厚朴

乾姜炮各四兩 桔梗 蒼朮各三十一兩

右除肉桂、枳殼、外、為麈末、外一十

三味、同為麈末、慢火炒、令色轉攤

冷、次入肉桂、枳殼末、令勻、每服三

錢、水一饒半、入生姜三片、煎至一

中饒、去滓、稍熱服、如冷氣奔衝、心

天行病

癘班

八十六

脇臍腹脹滿刺痛、反胃嘔吐、泄痢、清穀、及痲癩癩癥、膀胱小腸氣痛、即入煨生姜三片、鹽少許、同煎如傷寒時疫、頭痛、體疼、惡風、發熱、項背強痛、入葱白三寸、豉七粒、同煎。若但覺惡寒、或身不甚熱、肢體拘急、或手足厥冷、即入炒茱萸、米粒、鹽少許、同煎如寒熱不調、欬嗽、喘滿、入棗煎服。婦人產後、入醋一合、同煎服之、並不拘時候。

● 溫疫

達原飲 溫疫初起、先憎寒、而後發熱、日後但熱、而無憎寒也、初得之二三日、其脈不浮、不沉、而數、晝夜發熱、日晡益甚、頭疼身痛、其時邪在挾挾伏脊之前、腸胃之後、雖有頭疼身痛、此邪熱浮越於經、不可認為傷寒表証、輒用麻黃桂枝之類、強發其汗、此邪不在經、汗之徒傷表氣、熱亦不減、又不可下、此邪不在裏、下之徒傷胃氣、其渴愈甚、宜此方。

枳櫛二 草果仁五 厚朴一 知母一
芍藥一 黃芩一 甘草五
右用水二鍾、煎八分、午後溫服。

按枳櫛能消能磨、除伏邪、為疎利之藥、又除嶺南瘴氣、厚朴破戾氣所結、草菓辛烈、氣雄伏邪、蟾踞三味協力、直達其巢穴、使邪氣潰敗、速離募原、是以為達原也、熱傷津

溫疫

液加知母以滋陰熱傷營氣加白芍藥以和血黃芩清燥熱之餘甘草為和中之用以後四味不過調和之劑如渴共飲非拔病之藥也
●凡疫邪游溢諸經當隨經引用以助升泄如脇痛耳聾寒熱嘔而口苦此邪熱溢于少陽經也本方加柴胡一錢●如腰背項痛此邪熱溢于太陽經也本方加羌活一錢●如目痛眉稜骨痛眼眶痛鼻乾不眠此邪熱溢于陽明經也本方加乾葛一錢證有遲速輕重不等藥有多寡緩急之分務在臨時斟酌所定分兩大畧而已不可執滯間有感之輕者舌上白胎亦薄熱亦不甚而無數脈其不傳裏者一二劑自解稍重者必從汗解如不能汗乃邪氣盤踞於膜原內外隔絕表氣不能通於內裏氣不能達於外不可強汗或者見加發散

之藥便欲求汗誤用衣被壅遏或將湯火扇蒸甚非法也然表裏隔絕此時無遊溢之邪在經三陽加法不必用宜照本方可也

三消飲同 溫疫舌上白胎者邪在膜原也舌根漸黃至中央乃邪漸入胃設有三陽現證用達原飲三陽加法因有裏證復加大黃也名三消飲三消者消內消外消不內外也此治疫之全劑以毒邪表裏分傳膜原尚有餘結者宜之方

- 板榔 草菓 厚朴 白芍
- 甘艸 知母 黃芩 大黃
- 葛根 羌活 柴胡
- 姜棗煎服

白虎湯同 溫疫脈長洪而數大渴復大汗通身發熱宜此方

石羔一而知母五甘艸五炒米撮
加姜煎服●按白虎湯辛涼發散之劑清肅肌表氣分藥也蓋毒邪

已潰中結漸開，邪氣分離原，尚未出表。然內外之氣已通，故多汗，脈長洪而數。白虎辛涼解散服之，或戰汗，或自汗而解。若溫疫初起，脈難數未至洪大，其時邪氣盤踞於膜原，宜達原飲，誤用白虎，既無破結之能，但求清熱，是猶揚湯止沸也。若邪已入胃，非承氣不愈，誤用白虎，既無逐邪之能，徒以剛悍而代胃氣，反抑邪毒，致脈不行，因而細小。又認陽証得陰脈，妄言不治，醫見脈微欲絕，益不敢議下，日惟雜進寒涼，以為穩當，愈投愈危，至死無悔。此當急投承氣，緩々下之，六脈自復。●應下失下，口燥舌乾而渴，身反熱減，四肢時厥，欲得近火壅被，此陽氣伏也。既下厥回，去爐減被，脈大而加數，舌上生津，不思水飲，此裏邪去，辟陽正伸也。宜柴胡清燥湯，去花粉，知母，加葛根。

隨其性而升泄之，此證類近白虎，但熱渴既除，又非白虎所宜也。

大承氣湯

同按三承氣湯功用彷彿，熱邪傳裏，但上焦痞滿者，宜小承氣湯，中有堅結者，加芒硝，鞅堅而潤燥，病久失下，雖有結糞，然多粘膩極臭惡物，得芒硝助，大黃有蕩滌之能，設無痞滿，惟存痞結，而有痰熱者，調胃承氣宜之。三承氣攻効俱在大黃，餘皆治標之品也。不耐湯藥者，或嘔或畏，當為細末蜜丸湯下。

大黃五錢 厚朴一錢 枳實一錢 芒硝三錢

水姜煎服，弱人減半，邪微者各復減半。

小承氣湯

同按大黃五錢 厚朴一錢 枳實一錢

水姜煎服

調胃承氣湯

同按大黃五錢 芒硝二錢 甘草一錢

溫疫

水姜煎服。

桃仁承氣湯同發黃一證胃實失下

表裏壅閉，鬱而為黃，熱更不泄，搏血為瘀，凡熱經氣不鬱，不致發黃，熱不干血分，不致畜血，同受其邪，故發黃而兼畜血也，非畜血而致發黃，但畜血一行，熱隨血泄，黃因隨減，嘗見發熱者，原無瘀血，有瘀血者，原不發黃，所以發黃當咎在經瘀熱，若專治瘀血誤也，胃移熱於下焦氣分，小便不利，熱結膀胱也，移熱於下焦血分，膀胱畜血也，小腹硬滿，疑其小便不利，今小便自利者，責之畜血也，小便不利，亦有畜血者，非小便自利，便為畜血也，胃實失下，至夜發熱者，熱留血分，更加失下，至必致瘀血，初則晝夜發熱，日晡益甚，既投承氣，晝日熱減，至夜獨熱者，瘀血未行也，宜桃仁承氣湯，服湯後熱除為愈，或

熱時前後縮短再服再短，畜血盡而熱亦盡，大勢已去，亡血過多，餘焰尚存者，宜犀角地黄湯調之，至夜發熱亦有瘡癰，有熱入血室，皆非畜血，並未可下，宜審。

大黃 芒硝 桃人 當歸

芍藥 丹皮

照常煎服

犀角地黄湯

地黃一 白芍三 丹皮二 犀角二
研碎

右先將地黃溫水潤透，銅刀切作片，石臼內搗爛，再加水如糊，絞汁聽用，其滓入藥同煎，藥成去滓，入前汁合用，一本用作服

抵當湯同傷寒太陽病不解，從經傳

府，熱結膀胱，其人如狂，血自下者愈，血結不行者，宜此湯，今溫疫起，無表証而惟胃實，故腸胃畜血多，膀胱畜血少，然抵當湯行瘀逐畜

溫疫

之最者無分前後二便並可取用然畜血甚者桃仁力所不及宜此湯蓋非大毒猛厲之劑不足以抵當故名之然抵當証所遇亦少此以備萬一之用

大黃五錢 蜜蟲二十枚 桃人五錢 研末 水蛭末五分

照常煎服

茵陳湯同發黃疸是府病非經病也疫邪傳裏遺熱下焦小便不利邪無輸泄經氣鬱滯其傳為疸身目如金者宜此湯

茵陳一錢 山梔二錢 大黃五錢

水姜煎服●按茵陳為治疸退黃之專藥今以病証較之黃因小便不利故用山梔除小腸屈曲之火熱既除小便自利當以發黃為標小便不利為本及論小便不利病原不在膀胱乃係胃家移熱又當以小便不利為標胃實為本是

以大黃為專攻山梔次之茵陳又其次也設去大黃而服山梔子茵陳是忘本治標鮮有效矣或用茵陳五苓不惟不退黃小便間亦難利

瓜蒂散同溫疫胸滿悶心煩喜嘔欲吐不吐雖吐而不得大吐腹不滿欲飲不能飲欲食不能食此疫邪留於胸膈宜此湯吐之方

甜瓜蒂一錢 赤小豆二錢 研碎 生山梔二錢

右用水二鐘煎一鐘後入赤豆煎至八分先服四分一時後不吐再服盡吐之未盡煩滿尚存者再煎服如無瓜蒂以淡豆豉二錢代之芍藥湯同疫邪先傳表後傳裏忽得戰汗經氣輸泄當即脈靜身涼煩渴頓除三五日後陽氣漸積不待飲食勞碌或有反復者益表邪已解裏邪未去終覺發熱下之即解

溫疫

疫邪表裏分傳，裏氣壅閉，非汗下不可。汗下之，未盡，日後復熱，當復下。復汗，溫疫下後，煩渴減，腹滿去，或思飲食而知味，裏氣和也。身熱未除，脈近浮，此邪氣拂鬱於經，表未解也。當得汗解，如未得汗，以柴胡清燥湯和之，復不得汗者，從漸解也。不可苟求其汗，應下失下，氣消血耗，既下欲作戰汗，但戰而不汗者，先以中氣虧微，但能降陷，不能升發也。次日當期，復戰厥回，汗出者生，厥不回，汗不出者死。以正氣脫，不勝其邪也。戰而厥回，無汗者，真陽尚在，表氣枯涸也。可使漸愈。凡戰而不復，忽瘕者，必死。瘕者，身如尺牙關緊，目上視，凡戰不可擾動，但可溫覆，擾動則戰而中止。次日當期復戰，夕汗後復下後，越二三日，反腹痛不止者，欲作滯下也。無論已見積未見積，宜此方。

白芍一當歸一枳實二厚朴一
甘草七

水姜煎服，裏急後重，加大黃三錢。

紅積倍芍藥，白積倍枳實煎服。

柴胡湯同裏証下後，續得盜汗者，表

有微邪也。若邪甚，竟作自汗，伏邪中瀆，則作戰汗矣。凡人目張則衛氣行於陽，目瞑則衛氣行於陰。行陽謂升發於表，行陰謂斂降於內。今內有伏熱，而又遇衛氣兩陽相搏，熱蒸于外，則腠理開而盜汗出矣。若內伏之邪一盡，則盜汗自止。設不止者，宜此湯以佐之。

柴胡三黃芩一陳皮一甘草一
生薑一生薑一大棗二

古方用人參半夏，今表裏實，故不用人參，無嘔吐，不加半夏。

黃耆湯同時疫愈後，脈靜身涼，數日後，及得盜汗，及自汗者，此屬表虛，宜此湯。

溫疫

黃芪三錢 五味子五分 當歸一錢 白朮一錢

照常煎服如汗未止加麻黃淨根一錢五分無有不止者然屬實常多屬虛常少邪氣盛為實正氣奪為虛々實之分在乎有熱無熱有熱為實無熱為虛若顛倒誤用未免實々虛々之誤臨症當慎

托裏舉班湯同邪留血分裏氣壅閉則伏邪不得外透而為斑若下之內壅一通則衛氣亦從而疏暢或出表為斑則毒邪亦從而外解矣若下後斑漸出不可更大下設有下証少與承氣緩々下之若復大下中氣不振斑毒內陷則危宜此湯方

白芍各一錢 當歸各一錢 升麻五分 白芷五分 柴胡各七分 川山甲二錢 象黃

水姜煎服下後斑漸出復大下斑毒復隱反加循衣摸床撮空理線

脈漸微者危本方加人參一錢補不及者灸若未下而先發斑者設有下証少與承氣須從緩下

清燥養榮湯同夫疫乃熱病也邪氣內蘊陽氣不得宣布積陽為火陰血每為熱搏暴解之後餘燄尚在陰血未復大忌參芪白朮得之反助其壅餘邪留伏不惟目下淹纏日後必變生異証或周身痛痺或四肢掣急或流火結痰或遍身瘡瘍或兩腿攢痛或勞嗽湧痰或氣毒流注或痰核穿漏皆驟補之為害也凡有陰枯血燥者宜此湯若素多痰及少年平時肥盛者投之恐有膩膈之弊亦宜斟酌大抵時疫愈後調理之劑投之不當莫如靜養節飲食為第一

知母 天花粉 當歸身 白芍 地黃汁 陳皮 甘艸 加燈心煎服表有餘熱用後方

溫疫

柴胡養榮湯 同表有餘熱宜此方

柴胡 黃芩 陳皮 甘艸

當歸 白芍 生地 天花粉

知母

姜枣煎服

承氣養榮湯 同裏証未盡宜之

知母 當歸 芍藥 生地

大黃 枳實 厚朴

水姜煎服

藁貝養榮湯 同痰涎湧甚胸膈不清

者宜此湯

知母 天花粉 貝母 瓜蒌

實 橘紅 白芍 當歸 紫

燕子

水姜煎服

柴胡清燥湯 同下後或數下募原尚

有餘邪未盡傳胃邪熱與衛氣相

併故熱不能頓除當寬緩兩日俟

餘邪聚胃再下之以此湯緩劑調

理方

柴胡 黃芩 陳皮 甘艸

花粉 知母

姜枣煎服

參附養榮湯 同疫邪留於心胸令人

痞滿下之痞應去今反痞者虛也

以其入或因他病先虧或因新產

後氣血兩虛或稟賦嬌怯因下益

虛失其健運邪氣留止故令痞滿

今愈下而痞愈甚若更用行氣破

氣之劑轉成壞症宜此湯

當歸 白芍 生地 人參

附子 乾姜 炒

照常煎服果如前証一服痞當如

失倘有下証下後脈實痞未除者

再下之此有虛實之分一者有下

症下後痞即減者為實一者表雖

微熱脈不甚數口不渴下後痞反

甚者為虛若潮熱口渴脈數而痞

者投之稠不旋踵

半夏藿香湯 同疫邪留於心胸胃口

熱甚皆令嘔不止下之嘔當去今
反嘔者此屬胃虛寒少進粥飲便
欲吞酸者宜此湯一服嘔立止穀
食漸加方

半夏一分 真藿香一分 乾姜炒
白茯苓一分 廣陳皮一分 白朮炒
甘艸五分

水姜煎服有前後一証首尾內變
者有患時疫心下脹滿口渴發熱
而嘔此應下之証也下之諸症減
去六七嘔亦減半再下之脹除熱
退渴止向則數日不眠今則少寐
嘔獨轉甚此疫毒去而諸症除胃
續寒而嘔甚與此湯一劑嘔即止
黃竜湯同 證本應下就閣失治或為
緩藥羈遲火邪壅閉耗氣搏血精
神殆盡邪火獨存以致循衣摸床
撮空理線筋惕肉瞤肢體振戰目
中不了了皆緣應下失下之咎邪
熱一毫未除元神將脫補之則邪

毒愈甚攻之則幾微之氣不勝其
攻々不可補不可補源不及兩無
生理不得已勉用陶氏黃竜湯此
症下亦灰不下亦灰與其坐以待
斃莫如含藥而亡或有回生於萬
一宜此湯方

大黃 厚朴 枳實 芒硝
人參 地黃 當歸

照常煎服

人參養榮湯同 按前証實為庸醫就
閣及今投劑補源不及然大虛不
補虛何由以回大實不瀉邪何由
以去勉用參地以回虛承氣以逐
實此補源兼施之法也或遇此症
純用承氣下証稍減神思稍甦續
得肢體振戰怔忡驚悸心內如人
將捕之狀四肢反厥眩暈銜項
背強直併前循衣摸床撮空等証
此皆大虛之候將危之証也急用
此湯虛候少退速可屏去蓋傷寒

溫疫

温疫俱係客邪為火熱燥症人參固為益元氣之神品偏於益陽有助火固邪之弊當此又非良品也不得已而用之也

人參八分 麥門冬七分 遼五味一分 地黃一分 歸身八分 白芍藥五分 知母七分 甘艸五分

照常煎服

六成湯同 疫愈後大便數日不行別無他証此是三陰不足以致大腸虛燥此不可攻飲食漸加津液流通自能潤下也覺穀道空悶宜作蜜煎導甚則宜此湯

當歸一分 白芍藥一分 地黃五分 門冬一分 肉蓯蓉三分 麥門冬一分

照常煎服日後更燥者宜六味丸少減澤瀉

七成湯同 病愈後脈遲細而弱每至黎明或夜半後便作泄瀉此命門真陽不足宜此方或亦有雜症屬

實者宜大黃丸下之立愈

破故紙炒鎚碎 熟附子一分 遼五

味八分 白茯苓一分 人參一分 甘草五分

照常煎服愈後更發者宜八味加附子

猪苓湯同 邪于氣分者宜此方

●熱到膀胱小便赤色邪到膀胱于於氣分小便膠濁于於血分溺血畜血留邪欲出小便數急膀胱不約小便自遺膀胱熱結小便閉塞●熱到膀胱者其邪在胃々熱灼於下焦在膀胱但有熱而無邪惟令小便赤色而已其治在胃●邪到膀胱者乃疫邪分布下焦膀胱實有之邪不止於熱也從胃家來治在胃兼治膀胱若純治膀胱胃氣乘勢擁入膀胱非其治矣若腸胃無邪獨小便急數或白膏如馬遺其治在膀胱宜此湯

温疫

猪苓二錢 澤瀉二錢 滑石五分 甘艸八分

九十六

木通一車前二
燈心煎服

桃仁湯同邪于血分者宜此方

桃人三錢研丹皮一錢當歸一錢赤芍一錢阿膠二錢滑石一錢

照常煎服小腹痛按之硬痛小便自調有畜血也加大黃三錢甚則抵當湯藥分三等隨其病之輕重而旋治

四苓湯同煩渴思飲酌量與之若引

飲過多自覺水停心下名停飲宜此散最妙如大渴思飲水水及冷飲無論四時皆可量與蓋內熱之極得冷飲相救甚宜能飲一升止與半升寧使少頃再飲至于梨汁藕汁蔗漿西瓜皆可備不時之需如不欲飲冷當易百滾湯與之乃至不思飲則知胃和矣

茯苓二錢澤瀉一錢猪苓一錢陳皮一錢

取長流水煎服古方有五苓散用桂枝者以太陽中風表証未罷併入膀胱用四苓以利小便加桂枝以解表邪為雙解散即如少陽併于胃以大柴胡通表裏而治之今人但見小便不利便用桂枝何異蠶者之聽官商胃無病故用白朮以健中今不用白朮者疫邪傳胃而渴白朮性壅恐以實填實也加陳皮者和中利氣也

安神養血湯同若誤用承氣及寒涼剝削之劑變症蜂起卒至殞命宜服此湯

茯苓 杏仁 當歸 遠志
桔梗 芍藥 地黃 陳皮
甘艸

加竜眼肉水煎服●疫邪伏而未發因感冒風寒觸動疫邪相繼而發也既有感冒之因由復有風寒之脈証先投發散一汗而解一二

溫疫

日續得頭疼身痛潮熱煩渴不惡寒此風寒去疫邪發也以疫法治之

枳芍順氣湯 同下痢膿血更加發熱而渴心腹痞滿嘔而不食此疫痢兼証最為危急夫疫者胃家事也蓋疫邪傳胃下常八九既傳入胃必從下解疫邪不能自出必藉大腸之氣傳送而下而疫方愈夫痢者大腸內事也大腸既病失其傳送之職故正糞不行純乎下痢膿血而已所以向來穀食停積在胃直須大腸邪氣將退胃氣通行正糞自此而下今大腸失職正糞尚自不行又何能與胃載毒而出毒既不前羈留在胃最能敗壞真氣在胃一日有一日之害一時有一時之害耗氣搏血神脫氣盡而死凡遇疫痢兼症者在痢尤為喫緊疫痢俱急者宜此方誠為一舉兩

得此方專治下痢頻數裏急後重兼舌胎黃得疫之裏症者

枳柳 芍藥 枳實 厚朴 大黃

生姜煎服

升陽散火湯

傷寒六書傷寒又手抹鼻尋

衣摸床謔語昏沉不醒人事俗醫不識見病便呼為風証用風藥誤人死者多矣殊不知肝熱乘於肺金元氣虛不持自主持名曰撮空証小便利者可治小便不利者不可治

人參 當歸 柴胡 芍藥 黃芩 甘草 白朮 麥門冬 陳皮 茯神

水二鍾姜三片枣一枚槌法入金銀首飾煎之熟服●有痰者加姜汁半夏大便燥實謔語發渴加大黃泄漏者加升麻炒白朮

逍遙湯 同治有患傷寒差後血氣未溫疫

平勞動助熱復還於經絡因與婦人交接淫慾而復發謂之勞復因交接淫慾而無病人反得病者謂之陰陽易余曾見十數人舌出數寸而死多矣此証難治必宜此湯

人參 知母 竹青 甘州
滑石 生地黃 葦根 柴胡
犀角

卵縮腹痛倍加黃連右水二鍾取二枚姜三片煎之臨服入燒裊襠末一錢半調服有粘汗出為效不粘汗出再服以小水利陰頭痛即愈

霍亂

●吐利

竹葉湯 外療霍亂吐利已服理中及

四順湯不解者宜此湯

竹葉一虎 小麥一升 生姜十兩 甘草

人參一兩 附子一兩 肉桂二兩 當歸

芍藥一兩 白朮三兩 橘皮二兩

右十一味以水一斗半先煮小麥

竹葉取八升汁去滓內諸藥煮取

二升半分三服吐痢後腹滿加厚

朴二兩炙上氣加吳茱萸半升差

理中四順則大熱夕毒霍亂宜此

湯忌生蔥海藻菘菜猪肉桃李雀

肉等千金方古今錄驗並同

茯苓理中湯同 療霍亂臍上築而悸

者方

乾姜兩 茯苓二兩 甘草三兩 人參三兩

木瓜三兩

右五味以水六升煮取三升

去滓適寒溫分為四服忌海藻菜

霍亂吐利

酢物

高良姜等三味飲子同療濕霍亂吐

痢無限宜服之方

高良姜二兩 豆蔻子十二枚 桂心二兩

右藥切以水四升煮取一升去滓

細々毀之亦有於此方加乾姜人

參二物忌生蔥

千金人參湯外療毒冷霍亂吐痢煩

嘔轉筋虛冷汗出手足指浮腫氣

息垂死絕語音聲不出百方不效

脈不通者服此湯取差乃止隨吐

者續更服勿住方

人參 附子炮 厚朴炙 茯苓

甘草炙 橘皮 當歸 葛根

各二兩 桂心 乾姜 三兩

右十味以水七升煮取二升半分

溫三服忌海藻菘菜生蔥大酢

扁豆湯同療霍亂吐痢方

扁豆葉 香薷葉各一升 木瓜一枚

乾姜一兩

右四味以水六升煮取二升五合絞去滓分溫三服々別相去如人行六七里並無所忌

●腹痛吐利及心腹痛

理中加二味湯外療霍亂胸滿腹痛吐下方

人參三兩 乾姜三兩 甘草三兩 白

朮三兩 當歸二兩 芍藥二兩

右六味以水七升煮取三升

絞去滓溫服一升日三甚良禁忌

前法

治中湯 治霍亂吐下脹滿食不消化心腹痛方

人參 乾姜 白朮 甘草各三兩

右四味以水八升煮取三升

分三服不瘥頻服三劑遠行防霍

亂依前作丸如梧子大服三十丸

如作散服方寸匕服亦得苦轉筋

者加石羔三兩 仲景云若膈上築

加桂心四兩 吐多者去朮 加生薑

三兩下多者復用朮悸者加茯苓

霍亂 腹痛吐利及心腹痛 百

三兩渴欲得水者加米合前為四兩半腹中痛者加人參前成四兩半若寒者加乾姜合前成四兩腹滿者去米加附子一枚服湯後一食頃服熱粥一升微自溫勿發揭衣被也○按外臺云仲景論霍亂湯上築者腎氣動也先療氣理中湯去米加桂凡方加米者以內虛也加桂者恐作賁豚也

厚朴人參湯外療霍亂心腹痛煩嘔不止方

厚朴四兩 橘皮二兩 人參二兩 高良

姜一兩 當歸二兩 藿香一兩

右六味以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服夕別相去如人行六七里忌生冷粘膩

●霍亂不止及洞下洩痢

人參湯外療中焦虛寒洞泄補虛泄方

人參三兩 甘草二兩 黃芩二兩 當歸三兩

茯苓四兩 乾姜同厚朴 芍藥四兩 芎藭三兩 粟米二升

右九味切以水一斗五升煮米取熟去米澄取七升下諸藥煮取三升分三服忌海藻菘菜大酢等物

烏梅黃連散同療霍亂水痢腹中雷鳴不瘥方

烏梅肉三兩 黃連三兩 熟艾葉三兩 赤

石脂二兩 當歸三兩 甘草三兩 附子三兩 阿膠三兩 炒

右八味搗篩為散有患者每服二方寸匕疑熱則飲下疑冷則酒下忌如法

●脈絕手足冷

四逆湯外既吐且痢而大汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱脈微欲絕或發熱惡寒四肢拘急手足厥逆者主之方

甘草二兩 附子一枚 乾姜半兩

右三味切以水三升煮取一升二合去滓溫分二服加減依後法忌如法千金同

通脈四逆湯同吐已下斷汗出厥冷

四肢拘急不解脈微欲絕者主之

甘草二兩 大附子一枚 乾姜三兩 炮

霍亂 脈絕手足冷 百一

右三味以水三升煮取一升二合去滓温分二服其脈即出愈若面色赤者加葱九莖若腹中痛者去葱加芍藥二兩若嘔者加生姜二兩若咽痛者去芍藥加桔梗一兩若利止脈不出者去桔梗加入參二兩病皆與方相應乃合服之若吐利止身疼痛不止者消息和其外傷寒論中又有療諸發熱霍亂者審取之忌如法仲景傷寒論上証合用通脈四逆加猪胆湯又吐利止身痛不休者消息和解其外宜桂枝湯心利之四逆加猪胆湯同霍亂吐利而汗出小便復利或下利清穀裏外無熱脈微欲絕或惡寒四肢拘急手足厥逆主之

甘艸兩乾姜半兩附子一枚猪膽汁半合

右四味切以水二升煮取一升四合温分再服無猪膽以羊膽代之強人可共大附子一枚乾姜加至

三兩若吐之後吸々小氣者及下而腹滿者加人參一兩諸藥皆減為一兩如証者亦宜典理厥人參湯佳忌如法

附子粳米湯同霍亂四逆吐少嘔多者主之方

附子一枚半夏半升甘艸兩大棗十枚粳米半升

右五味切以水八升煮米熟去滓温服一升日三忌如法一方有乾姜一兩小

品千金同

煩渴

五苓散傷霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者主之方見傷寒煩渴小便不利門厚朴桂心湯外療霍亂後渴口乾腹痛不止者主之

厚朴四兩桂心二兩

右二味切以水四升煮取一升二合絞去滓內分六分細々飲之服了如其渴欲得冷水盡意飲之

●乾嘔

乾姜茱萸湯外療若嘔不息

乾姜切 茱萸各二兩

右二味以水二升煮取一升頓服之，下不止手足逆冷者加椒百粒，附子一枚炮水三升煮取一升頓服。

厚朴湯同療霍亂後不欲食胃弱嘔吐不止主之方

厚朴四兩 乾扁豆葉二兩 茯苓二兩

白朮五兩 人參三兩

右五味切以水七升煮取二升分三服忌如法。

厚朴湯同療霍亂後煩嘔者方

厚朴二兩 生姜三兩 枳實三兩

右三味切以水六升煮取二升分三服。

豉湯同療霍亂嘔哕氣蹶不得喘息

豉一升 半夏二兩 洗 生姜二兩 人參一兩 柴

胡一兩 甘艸二兩

右六味切以水五升煮取二升半溫服七合忌如法千金有桂心一兩

●轉筋

高良姜湯外霍亂吐痢轉筋欲入腹主之方

高良姜四兩 桂心四兩

右二味切以水七升煮取二升去渣分三服如人行四五里一服忌生冷生葱。

茱萸湯同療霍亂轉筋不止

吳茱萸一升 甘艸二兩 乾姜二兩 炮

藜子一把 亂髮二兩 燒 桂心二兩

右六味切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服，夕別相去如人行六七里忌生葱海藻菘菜生冷粘膩等。

肘後療兩臂脚及胸脇轉筋者方同

取鹽一升半水一斗煮令熱灼灼尔漬手足在胸脇者湯洗之轉

霍亂 乾嘔 轉筋

筋入腹中，到擔病人令頭在下腹
中平乃止。若劇者，引陰，夕縮必死。
猶在到擔之可冀活耳。

●上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣

澤瀉湯 同療上熱實，飲食入胃，其氣
未定，汗出，面背身中皆熱，名曰漏
氣通脈瀉熱。

澤瀉 二兩 生地骨皮 五兩 甘草 二兩 半

夏 三兩 石羔 八兩 柴胡 三兩 茯苓 三兩 生

姜 三兩 竹葉 切 五兩 人參 二兩 桂心 一

兩 尊心 一兩

右十二味，切，以水一斗，煮取三升，

分三服，忌海藻、菘菜、羊肉、鰾、醋、生

葱、千金同。

麥門冬理中湯 同療上焦熱，腹滿，而
不欲食，或食先吐，而后下，肘脇牽
痛方。

生麥門冬 一升 生姜 四兩 白朮 五兩 甘

枳 三兩 人參 三兩 茯苓 二兩 橘皮 三兩 竹

茹 一升 生蘆根 一升 尊心 五兩 葶藶 三兩

廩米 一升

右十二味，切，以水一斗五升，煮取

三升，分三服，忌海藻、菘菜、大酢、桃

李、雀肉等，千金同。

半夏理中續膈破寒湯 同療上焦氣
不續，胸膈間厭悶，所以飲食先吐
而后下方。

半夏 半升 生姜 四兩 麻黃 三兩 前

胡 三兩 澤瀉 三兩 竹葉 一升 細辛 三兩 枳

實 三兩 杏仁 三兩 皮去

右九味，切，以水九升，煮取三升，去

渣分三服，忌羊肉、鰾、生菜、葶物。

茯苓安神湯 同療上焦虛寒，精神不

守，泄下便利，語聲不出方。

茯苓 三兩 人參 三兩 乾姜 三兩 桂心 一

兩 遠志 皮 三兩 甘艸 二兩

右六味，切，以水九升，煮取三升，去

滓分三服，忌生葱、酢物、海藻、菘菜

等物。

半夏瀉心湯 同療上焦虛寒，腸鳴下

霍亂 上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣 百四

利心下痞堅方

半夏洗黃芩三兩甘草三兩人參三兩

乾姜三兩黃連一兩桂心三兩

右七味以水九升煮取三升去渣

分三服忌海藻菘菜羊肉生葱猪

肉冷此仲景半夏海心湯方本無桂心有大棗十二枚

黃耆理中湯外療上焦虛寒短氣語

聲不出方

黃耆二兩桂心二兩丹參四兩桔

梗三兩乾姜三兩五味子三兩茯苓二兩

甘草三兩杏仁四兩芎藭二兩

右十味切以水九升煮取三升絞

去滓溫分三服忌海藻菘菜猪肉

生葱大酢

●中焦熱及寒洩痢

通隔絕湯外療中焦實熱閉塞上下

不通隔絕關格不吐不下腹滿彭

夕喘急大黃源熱開關格方

大黃三兩切黃芩三兩澤瀉三兩升麻

三兩羚羊角四兩厄子人兩生地黄

汁一升玄參八兩芒硝三兩

右九味切以水七升先煮七味取

二升三合下大黃更煎數沸絞去

渣下消分三服忌燕莢千金同

藍青丸外療中焦熱水穀下痢方

藍青汁三升黃連八兩黃蘗四兩白朮

三兩地榆二兩地膚子二兩阿膠五兩烏

梅肉三兩

右八味下篩用藍汁和微火上煎

為丸杏人大飲服三九日再七月

七日合之良當併手丸之忌猪肉

冷水桃李雀肉等

黃連煎干治中焦寒洞泄下痢或因

霍亂後瀉黃白無度腹中虛痛方

黃連 酸石榴皮 地榆 阿

膠各三兩黃蘗 當歸 厚朴 乾

姜各三兩

右八味咬咀以水九升煮取二升

去滓下阿膠更煎取烱分三服

●下焦熱及虛寒

霍亂 下焦熱及虛寒

柴胡通塞湯外療下焦熱大小便俱不通方

柴胡^三 黃芩^三 橘皮^三 澤瀉^三

梔子^四 石羔^六 羚羊角^三 生

地黃^一 芒硝^三 香豉^一

右十味切以水一斗煮九味取三

升去渣下芒消分三服忌蕪荑

人參湯 療下焦熱氣逆不續嘔吐

不禁名曰走哺止嘔方同

人參 生蘆根 梔子 人參 萎

薤 黃芩 知母 茯苓^三 白

木^四 石羔^八 橘皮^四

右十味切以水九升煮取三升去

滓分三服忌桃李雀肉醋等

香豉湯 同療走哺不止或嘔噎熱氣

衝心滿悶方

香豉^一 生地黃^一 白朮^三 甘草

竹葉^一 石羔^八 茯苓^三 葱白

右八味切以水七升煮取二升五

合去滓分三服須利下加芒硝三

兩忌蕪荑海藻菘菜桃李雀肉酢

物等

赤石脂湯 同下焦熱或痢下膿血煩

悶恍惚方

赤石脂^八 烏梅肉^三 梔子^一 人

白朮^三 乾姜^二 廩米^一 升麻^三

右七味切以水一斗煮米取熟去

米取七升下諸藥煮取二升五合

去滓分三服忌桃李雀肉等

香豉湯 同療下焦熱毒痢魚腦雜痢

鮮血脐下少腹絞痛不可忍欲痢

不出方

香豉^一 梔子^四 薤白^一 黃連^三

黃蘗^三 黃芩^四 地榆^三 白朮^三

茜根^三

右九味切以水一斗煮取三升分

三服忌猪肉冷水桃李雀肉等

伏龍肝湯 治下焦虛寒損或先見

血後便轉此為近血或利不利方

霍亂 下焦熱及虛寒

伏竜肝五合 乾地黄五兩一方 阿膠
牛膝一作牛 甘草 乾姜 黄芩
地榆各三 髮灰二合

右九味，咀，以水九升，煮取三升，去滓，下膠，煮消，下髮灰，分為三服。治下焦虛寒，損或先傳轉，後見血，此為遠血，或利或不利，好困勞，冷即發，宜續斷止血方同。

續斷 當歸 桂心 蒲黃
阿膠各二兩 甘草二兩 乾姜 乾地黄

右八味，咀，以水九升，煮取三升，半去滓，下膠，取烱，下蒲黃，分三分。當歸湯，治三焦虛損，或上下發泄，吐唾血，皆從三焦起，或熱損發，或因酒發，宜此方。

當歸 乾姜 小薊 阿膠
羚羊角 乾地黄 柏枝皮各三
芍藥 白朮各五兩 蒲黃五兩 青竹茹
升 伏竜肝一升 髮灰一雞子大 黄芩

甘草各二兩
右十五味，咀，以水一斗二升，煮取三升半，去渣，下膠，取烱，次下髮灰及蒲黃，分為三服。

陳橘皮湯，治乾霍亂，腹脇脹滿，不吐利，心胸悶亂，不可忍方。

陳橘皮湯浸去白 蜀椒去目并閉口
右二味，煎，每服五錢匕，水一盞半，生姜三片，煎至一盞，去滓，溫服，不拘時。

活命飲，治脾元虛損，霍亂不吐瀉，腹脹如鼓，心胸痰壅方。

鹽一分 生姜半兩 甘草一分 葛根半兩 丁香
香粒
右五味，細剉，如麻豆，用童子小便一盞半，煎至一盞，去滓，分溫二服。二勝散，治霍亂不吐不利，令人昏冒，煩亂，氣短，上下膈塞，冷汗自出方。

訶梨勒皮 乾姜成塊者
霍亂 下焦熱及虛寒 各二兩 百七

右二味，不持碎，同用水二升於銚子內煎水盡為度，取出重物細切焙乾，持羅為散，每服二錢匕，陳米飲調下。

錢氏白朮散名醫方考脾虛肌熱泄瀉者此方主之。

人參 白朮 茯苓 甘草
木香 藿香 乾葛

右水煎溫服。●脾虛者補之以甘，故用人參、白朮、茯苓、甘草，肌熱者療之以清，故解以葛根。脾困者醒之以香，故佐以藿香。

人參湯 聖治厥逆三焦不調及脾胃氣攻頭面虛腫氣喘心急方。

人參 赤茯苓去皮 厚朴去皮
姜汁 紫蘘子炒 大腹皮 桑根
白皮 劉椶柳各 陳橘皮去白 防已各

右九味，鹿持節，每服五錢匕，水一盞，生姜一塊，拍破葱白三莖，切煎

至八分，去滓空心溫服。

●灸法

肘後療霍亂先洞下法，外灸臍邊二寸，男左女右，十四壯，甚者至三十四壯，名大腸募也。

又療轉筋者法，同灸脚心下，名涌泉，又灸當足大指聚筋上，六七壯，神驗，又灸足大指下，約中一壯。

又療轉筋入腹痛者法，令四人捉手足，灸臍左二寸，十四壯，又灸股中大筋上，去陰一寸。

又療苦嘔方法，灸手腕第一約理中，七壯，名心主，當中指。

又療下痢不止者法，灸足大指本節內側一寸，白肉際左右，七壯，名大都，按銅人經大都二穴在足大指本節後陷中。

又療吐且下痢者法，灸兩乳邊連黑外，近腋白肉際各七壯，可至二十七壯。

又療苦煩悶急滿法，灸心厭下三

霍亂 灸法

寸七壯名胃管

又療苦繞臍痛急者法灸臍下三

寸三七壯名關元良

又療先吐者法灸心下一寸十四

壯又并療下痢不止上氣灸五十

壯名巨闕正心厭尖頭下一寸是也

又療霍亂神秘起死灸法

以物橫度病人口中屈之從心鳩

尾度以更下灸度下頭五壯橫度

左右復灸五壯此三處併當先灸

中央畢更橫度左右也又灸脊上

以物圍令正當心厭又夾脊左右

一寸各七壯是腹背各灸三處崔氏

文仲同

痢

●水穀痢

通脈四逆湯金下利清穀裏寒外熱

汗出而厥者主之方見傷寒

黃連阿膠湯外療熱水穀下痢方

黃連炙阿膠炙梔子炙烏梅炙

各三兩

右五味切以水七升煮取二升半

分為再服神良

文仲療因仲夏熱多令人發水穀痢

腸中鳴轉一源五六升水方外

黃連去毛厚朴去三

右二味切以水三升煮取一升頓

服之

●水痢

備急療水下積久不瘥腸垢已出者

友外

赤石脂 桂心 乾姜 附子炮

右四味等分搗篩蜜丸如小豆每

服三丸日三服飲下肘後同

痢 水穀痢 水痢 百九

●冷痢

温脾湯千論曰舊治痢於貴勝用建脾丸多效今治積久冷痢先以此湯下訖後以建脾丸補之未有不効者貧家難以克辦亦無可將息也此湯治積久冷熱白赤痢者主之

大黃 桂心各二兩 附子 乾姜 人參各二兩

右五味以水七升煮取二升半分三服

建脾圓千治虛勞羸瘦身體重脾胃

冷飲食不消雷鳴腹脹泄痢不止方

鍾乳粉三兩 赤石脂 好麴 大麥蘖 當歸 黃連 人參

細辛 竜骨 乾姜 茯苓 石斛 桂心各二兩 附子一兩 蜀椒六兩

右十五味為末白蜜丸如梧子酒服十九日三加至三十九丸弱者飲

服此方通治男女集驗無細

白頭翁湯外療寒急下及滯下方

白頭翁 乾姜各二兩 甘草炙二兩 當歸一兩 黃連 秦皮各二兩 石榴皮二兩

右七味切以水八升煮取三升分為四服

●白痢

廣濟療白濃痢方外

甘草六分 厚朴一分 乾姜 枳實 茯苓各八分

右五味切以水五升煮取一升六合絞去滓分為二服日再服

又療心腹脹滿不能食及痢白膿方同

厚朴五兩 豆蔻五枚 甘州二兩 乾姜一兩

右四味切以水五升煮取一升五合絞去滓分為二服日再

大桃花湯同 主冷白帶痢腸痛方

赤石脂八兩 乾姜 當歸 竜骨 各三兩 附子炮 牡蛎各二兩 芍藥 甘

痢 冷痢 白痢 百十

艸各一兩 人参半兩 白朮一升
右十味切以水一斗二升煮白朮
取九升內藥煮取三升分為三服
膿者加厚朴三兩、嘔者加橘皮二
兩、

延年烏梅肉丸 同主冷白膿痢食不
消方、

烏梅肉 熟艾 黃蘗 甘艸
炙各八分

右四味搗篩蜜丸如梧子以飲服
十五丸日三服忌同前、

龍骨湯 同療白滯下、昼夜無復數者、
主之、

龍骨 牡蛎各三兩 烏梅肉 熟
艾 白頭翁 乾姜各兩 女萎

黃連 當歸各二兩 甘草六兩
右十味切以水七升煮取三升二
合分服日三夜一、斷便止、忌同前、

●熱毒痢

千金療熱毒下黑血、五內攪切痛、日

夜百行、氣絕欲死方、外

黃連 升一 龍骨 白朮各二兩 阿膠
乾姜 當歸 赤石脂各三兩 附
子二兩

右八味切以水一斗煮取五升分
為五服、余以正觀三年七月十二
日、忽患此痢、至于五日、將絕處、此
藥入口即定、

犀角煎 同療熱毒下血及豆汁者、主之、
人参 當歸各三兩 黃連四兩 犀角

右五味切以水五升煮取一升去滓
內蜜煎三沸分為三服、日三、忌同、

小承氣湯 金下利、謔語者有燥屎也、
此湯主之、方見傷寒

大承氣湯 同下利三部脈皆平、按之
心下堅者、急下之、宜此湯、●下利

脈遲而滑者實也、利未欲止、急下
之、宜此湯、●下利脈反滑者、當有
所去、下乃愈、宜此湯、●下利已瘥、

痢 熱毒痢

至其年月日時復發者以病不盡故當下之宜此湯方見傷寒

桃花湯同下利便膿血者主之方見傷寒

白頭翁湯金熱利下重者主之同上

●赤痢

白頭翁湯千治赤滯下血連日不瘥方

白頭翁 厚朴 阿膠 黃連

秦皮 附子 黃蘗 茯苓

芍藥各二兩 乾姜 當歸 赤石脂

甘草 竜骨各三兩 大朮手 粳米一升

右十六味咬咀以水一斗二分先煮米令熟出米内藥煮取三升分四服

●赤白痢

黃連湯外療赤白下者方

黃連 黃蘗 乾姜 石榴皮

阿膠三兩 甘草二兩

右六味切以水七升煮取二升為三服日再按千金有當歸一兩

●血痢及膿血痢

廣濟療痢鮮血方外

茜根 黃連 地榆各一分 梔子十枚

薤白切 香豉各一分 犀角六分

右七味切以水八升煮取二升分為三服日再

小品療下血連歲不愈同

黃連半斤

右一味搗末以雞子白和為餅子微火灸令黃黑復持篩服方寸匕日三有效下清血痿黃失色医不能療者皆瘥肘后同

●久痢

厚朴湯外治三十年久痢不止方

厚朴炙 乾姜 阿膠各二兩 黃連

五兩 石榴皮 艾葉各三兩

右六味切以水七升煮取二升分再服

附子湯千治暴下積日不佳及久痢方

痢 赤白痢血痢及膿血痢久痢 百十二

附子一枚 石榴皮一具 阿膠二兩 童骨
甘艸 芍藥 乾姜 黃連各一兩
黃芩半兩 粳米三合

右十味，哎咀，以水八升，煮取三升，分三服。

安石榴湯 外廩丘公吾患痢三十餘年，諸療無效，唯服此方得愈也。療大痊痢，及白滯困篤，欲死，腸已滑，醫所不能療方。

乾姜二兩生 黃蘗一兩 石榴一枚小
阿膠二兩別 研漬之

右四味，切，以水三升，煮取一升二合，去滓，內膠，令烺頓服，不差，復作。療老小亦良。人羸者，稍々服之，不必頓盡，須臾復服。石榴須預取之，肘后同一方黃連藥用。

范汪溫中湯 外療寒下食完出方。

甘草炙 乾姜各三兩 蜀椒八十枚 附子一枚

右四味，切，以水二升，煮取一升，分

為再服，若嘔，內橘皮半兩，小兒老皆取服之良。

●洩痢不禁及腸滑

范汪療得病羸劣服藥不愈，因作腸滑下痢膿血，日數十行，腹中絞痛，身熱如火，頭痛如破，其脈如瀉，友外

黃連四兩 苦參二兩 阿膠一兩

右三味，哎咀，以水一斗，煮取二升，去滓，適寒溫，夕服二合，日三，少々益至半升，服湯盡者，復合以愈為度。

●許仁則方

黃芩等五味散 外許仁則云，水痢之候，心腹甚痛，食無妨，但食後即痢，食皆化盡，唯變作水，穀無期度，多食多下，少食少下，有此狀者，服之。

黃芩 黃連 黃蘗各五分 黃耆四兩 童骨六兩

右藥持篩為散，以飲下之，初服一方寸匕，日二服，稍々加至二三匕。

痢 洩痢不禁及腸滑許仁則方百十三

服差乃止

附子等五味散同穀痢之候痢無期
度食不消化腹痛每遇冷便發有
此疾候者宜主之方

附子炮 細辛 白朮各五兩 乾姜

右藥搗篩為散以飲下之初服一
方寸匕日再服稍々加至二三匕
良

犀角五味散同血痢之候小腹絞痛
無期度食不住如水但兼血而下
有此患者宜主之方

生犀角末五兩 阿膠炙四兩 黃蘗四兩
艾葉 乾姜各三兩 作乾藍

右藥搗篩為散以飲下之初服一
方寸匕日服稍々加至二三匕良
神麴等五味散同膿痢之候腹亦刺
痛食亦不大稀但大便兼膿遇冷
而劇有此候者宜服之良

麴末升 乾姜六兩 丁香 豆蔻各五兩

高良姜五兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一
方寸匕日再服稍々加至二二七
良

黃耆等五味散同膿血相和痢候食
不甚稀每出膿血共食相兼腹亦
小痛有此候者宜服之

黃耆六兩 赤石脂八兩 厚朴五兩 乾姜
艾葉各三兩

右藥搗篩為散以飲下之初服
一方寸匕日再服稍々加至二三
匕良

豆蔻子等八味散同腸澼痢候食稀
或稠便但似膿每便極滑利有常
期有如此者宜此方

豆蔻子 丁香各三兩 細辛 附子
炮乾姜各五分 人參 黃耆各五兩 赤石
脂六兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一
方寸匕日再服々々加至二三匕良

痢 許仁則方

附子等六味湯同前件諸痢患無新
旧如燕療之慙差還發此即縱以
新藥止之終存其根本由腸胃中
冷熱不調病根固結必須湯藥滌
之以洩病勢痢後更以藥物補助
之有此候者宜此方

附子炮細辛 甘艸各二 人参各三

乾姜三兩 大黃五兩

石莖切以水七升煮取二升四合
去滓分溫三服夕如人行十里久
一服此湯當得快利夕中有惡物
如魚腦狀或如桃李但異於常利
勿怪之將息經三四日宜服後方
高良姜等十味散同利後宜服之以
補之友

高良姜 細辛 黃耆 白朮

苦參各二兩 丁香二兩 人参 乾姜各五兩

豆蔻子三兩 赤石脂六兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一
方寸匕日再服之稍々加至二三匕

●雜療

治大下後腹中空竭胸中虛不下食
方十

芍藥 甘草 半夏各二兩 厚朴

當歸 桂心各二兩 生姜五兩

右七味以水八升煮取三升分三
服々三劑最佳

治下痢心胸滿不快腹中雷鳴或嘔

吐方十

黃連五兩 橘皮 甘艸各二兩 竜骨

生薑 半夏各二兩 人参一兩 大棗十五枚

右八味以水一斗先煮一大
沸乃內藥煮取三升分四服并姪
娠

斷痢湯 治心胸下伏水方

半夏一升 生薑五兩 茯苓 甘艸

竜骨各二兩 附子一兩 人参 黃連各二兩

大棗十五枚

右九味以水八升煮取三升
分服

痢 雜療

香蘇湯同 治下後煩氣暴上方

生蘇一把各角 香豉五兩

右二味以水五升煮取二升頓服

瀉心湯同 治卒大下利熱唇乾口燥

嘔逆引飲方

人參 甘草 黃芩 枳實根

橘皮各兩 黃連二兩 半夏三兩 乾姜半兩

右八味以水六升煮取二升

分三服胡洽云治老小利水穀不

嘔不安無橘皮枳實若寒加附子

一枚湯加枳實一兩嘔加橘皮一

兩痛加當歸一兩仲

必效療痢兼渴方同

麥門冬三兩 烏梅二大

右二味以水一大升煮取強半絞

去滓待冷細々咽之即定仍含之

古今錄驗療熱渴痢方外

冬瓜一枚

右一味以黃土厚一尺火炮穩約

以水爛去土淨洗絞取服之

治夏日暴冷忽壯熱泄痢引飲熱湯

斷變通身浮腫或冷下結脈沈細

小數方十

澤瀉兩 吳茱萸 茯苓 白朮

當歸 桔梗 犀角 青木香

海藻 芍藥 大黃各三

右十一味以水九升煮取三

升分三服下後消息五六日許可

與女鞠散

女鞠散同 治痢後虛腫水腫者服此

藥小便利得止腫亦消方見

溫脾湯同 治下久赤白連年不止及

霍亂脾胃冷實不消方

大黃四兩 人參 甘草 乾姜各

附子一枚

右五味以水八升煮取二升

分半三服臨熱下大黃與前溫脾

湯小異須大轉瀉者當此方神效

雲林參苓白朮散回 治氣虛泄瀉凡

虛瀉者飲食入胃即瀉水穀不化

脈微弱是也

人參 白朮去芦 茯苓去皮 砂人炒

山藥炒 藿香 陳皮 乾姜炒

訶子煨 肉豆蔻煨去油 甘州炒各

右剉一劑，生姜三片，燈心一團，水煎服。

● 嘔噦惡心，加半夏、烏梅。

● 元氣虛脫，昏倦，加黃耆、升麻少許。

去砂人、藿香。● 飽悶，加厚朴，去肉。

● 虛訶子。● 小水短流，加水通車前。

炒去乾姜。● 源甚不止，加炒蒼朮。

烏梅熟附子少許。

鐵刷湯司 治男子脾積，心氣痛，婦人

血氣刺痛，及治中酒惡心，一切癰

痢氣疾，腸風下血，臟毒滑腸泄瀉。

蒼朮剉兩米泔 良姜陸兩 茴香

右為細末，每服二錢，生姜三片，鹽

一捻，水一盞，煎至七分，溫服，或用

熱酒調下，亦得。如脾寒，用酒一盞，

煎臨發時，連進三服，兼治四方之

人，不伏水土，小兒臟寒脫肛，並用

姜三片，枣子一枚，煎服如冒狀，暑

熱，擦生姜，冷水調下。若行路早起，

枣子一箇，去核，包棗少許，同生姜

三片，嚼下，能辟四時非節疫疠，痧

瘡等疾。

純陽真人養臟湯司 治大人小兒，腸

胃虛弱，冷熱不調，藏府受寒，下痢

赤白，或便膿血，有如魚腦，裏急後

重，脐腹疼痛，日夜無度，胃膈痞悶，

脇助脹滿，全不思食，及治脫肛，墜

下酒毒，便血，諸藥不效者，並皆治

之。

白芍藥一兩 當歸去芦 人參去

白朮焙各 肉豆蔻剉 木香不見火

肉桂去皮 甘草剉 蜜去

右件剉，為麩末，每服二大盞，水一

盞半，煎至捌分，去滓，食前溫服。老

人孕婦，小兒暴瀉，宜急服之，立愈。

忌酒麪、生冷、魚腥、油膩、如腸腑滑泄、夜起久不寤者可加炮了附子參肆竹煎服此藥的有神效不可具述

參苓白朮散局 治脾胃虛弱、飲食不進、多困少力、中滿痞噎、心忪、氣喘、嘔吐、泄瀉、及傷寒咳嗽、一本作噎此藥中和不熱、久服養氣、育神、醒脾、悅色、順正、辟邪

白扁豆一斤半、姜汁浸去皮、微炒 人參去芦 白朮
苓 白朮 甘草炒 山藥各二斤
蓮子肉去 桔梗炒、令深黃色 薏苡仁
縮砂取仁、各一斤

右為細末、每服二錢、棗湯調下、小兒量歲數、加減服之

瘰

●療瘰及許仁則方

常山湯外廣濟療瘰

常山三兩

右一味、切、以漿水三升、浸經一宿、煎取一升、欲發前、頓服之、後微吐、差止、忌生葱、生菜、近効療瘰、間日、或夜發者、張文仲備急同

小柴胡去半夏加枳椇湯外張仲景

傷寒論治瘰發渴者

柴胡八兩 黃芩三兩 人參三兩 大棗十二枚
枳椇三兩 炙甘草三兩 生姜三兩 枳椇根四兩

右七味、切、以水一斗二升、煮取六升、去滓、更煎、取三升、溫服一升、日三、忌海藻、菘菜、經心錄、瘰勞瘰

肘后療諸瘰方同

青蒿一把

右一味、以水一升、漬絞取汁、盡服之

又方同

瘰瘰及許仁則方

驚甲三兩

右一味，搗末，酒服方寸匕，至發時服三服，兼用火炙無不斷者，忌葷菜。

又方同

牛膝莖葉一把，切以酒三升漬一宿，分三服，令微有酒氣，不即斷更作，不過三服止。

常山烏梅湯方 同 療瘧隔痰不得吐，宜吐之。

烏梅半兩 桂心半兩 芫花半兩 豉五合 綿裹半兩 常山半兩

右六味，切以酒三升，水四升，合煮取二升，分三服，必得吐，一方取三升，忌生葱、羊肉、錫、生菜。一方無半

常山大黃湯 同 瘧結實積熱，煩擾迷冒，寒熱但多，綿悞困篤方。

常山三兩 甘州三兩 前胡二兩 大黃三兩

右四味，切以水一斗，煮取三升，去下大黃，煎取三升，分澄令冷，初服。

七合，中服八合，比欲發服九合，王文勇大子因瘧危困，服此皆愈，忌

海藻、菘菜、生菜等。

千金麻黃湯 同 療瘧須發汗方

麻黃四兩 去節 大黃四兩 枳實四兩 甘州二兩

右四味，切以水七升，煮取二升半，分三服，未發前食頃服，臨發更服，服後皆覆取汗，忌海藻、菘菜。

朱砂丸 同 療一切瘧，大有驗方。

朱砂一兩 蜀常山三兩

右二味，各搗下篩，別取朱砂，瓷器中細研，可一日，研如麪，白蜜和竟，兒搗一万七千杵，訖作丸，如梧子大，一服三丸，用清酒下行五十餘步，隨意坐臥，無酒湯下亦得，唯須暖將息，病人氣力強，仍不癢行動者，即須於當發日服之，如似日西發者，臨發之日勿食，平旦服三丸，已時服三丸，午後更服三丸，則瘧瘧及許仁則方。

差如不差，必定輕微，更服則差，餘時發者，準此，日西一時，任意消息，其病人氣力微弱者，不得臨發日，服應預前一日服之，如似明日發者，今日平旦，空服三丸，至昏時，食一椀粥，至日西，更服三丸，至日暮，復食一椀淡粥，並不得飽食，至一更盡，更服三丸，至平明，食粥一椀，至昏前，更進三丸，不得食，至午時，更進三丸，必差，夕後三日以來，唯得食甜粥飲漿，忌生冷，酢滑膩麪，及飽食，七日以來，特忌生血物，生菜，若後七日餘者，漸食生冷二種，須復日禁，若如百日來，患差後，還須百日，禁生冷，乃至七日，患者，差還復，禁七日，生冷，患雖經年，但待百日以來，禁生冷，過百日後，得食無妨，若不禁者，必還重發，患來日久，極重者，不過十服，差近者，三五服，則差，病人十五以上者，一服三

九十五以下七歲以上者，一服兩丸，七歲以下一服一丸，如小者，分此一九九作二小丸服之。

常山丸 同療一切瘧，無不効，比用不

過再服，入口如神，萬不一失方。

桃人 二兩不熬亦不
去及人尖皮 常山 每
兩 豆豉

三

右三味，各別搗五六百許，又和更搗六七百許，然後點好酒，如黑泥自成丸，不飲酒，事須酒下三十九丸，如梧子，未發前服，臨發更服三十丸，以捧之於鼻下，嗅取氣，便定，如不得平復，更服三十九丸，或吐，或微利，勿怪，亦有吐利差者，吐了仍不得漱口，亦不得喫生葱，生菜，果子，甜物，油膩等，却發則難差，此來者，不過再三服便差，一服差者多，其常山須蜀者，始堪使用，桃人須是毛桃人，餘者即無効，豉須新蒸，不用陳者，渴者取烏梅三枚作漿，稍

瘧

瘧瘧許仁則方

百二十

稍咽三五咽其藥唯一人患則少合不堪預合無力不効今方有常山一兩桃人五七枚豉一合恰多者佳持常山作散訖次研桃人作泥別搗豉點酒搗三五百杵次一處和持又六百杵以來如法服之
醫人夏候極錄之

古今秘苑治瘡第一方續錄

陳皮 半夏姜汁 茯苓 威靈仙
仙 蒼朮米泔浸 厚朴姜汁 柴
胡 黃芩以上各 青皮 枳柳
以上各 甘草一分

姜三片水酒各一碗煎八分飢時服頭痛加白芷一錢無汗加麻黃一錢只用一劑後俱去之此方平胃消痰理氣除濕有疏通開先之巧受病輕者二劑愈勿再藥可也若三劑後病勢減而不全愈必用第二方少則三劑多則五劑而已
第二方同

何首烏生用 陳皮 茯苓 柴
胡 黃芩以上各 白朮 當歸
威靈仙

姜三片井水河水各一碗煎八分加酒五分再煎一滾空心服二三煎并服久瘡加蓬朮一錢此方妙補瀉互用虛實皆宜不用參芪并去常山草果平々無奇劫有神效即極弱之人纏極重之病十劑之後立有起色功奏萬全所云加減一二即不靈應者正此一方也切勿早用人參如閉賊於重門之內必搏擊害人所傷者大矣直至瘡止之後補瀉扶元用第三方專為有力者設也若貧家安所得參而用之只服第二方多益善

第三方同

白朮 炒人參 各錢 黃芪 蜜 當歸 各錢
二陳皮 柴胡 各八分 升麻 四分 甘
草 三分

瘡 瘰癧

姜一片、枣一枚、水二碗、煎至八分半、飢時服三五劑、後元氣充寔、永不發矣、或加何首烏二錢、知母一錢、或加青蒿子八分、麥芽一錢、

●五臟及胃瘧

常山湯外療心瘧、令人煩心甚、欲得清水、多寒少熱者方、

常山四兩、淡竹葉四兩、梔子七枚、

石羔五兩、烏梅七枚、

甘州二兩、香豉二升、蜀漆二升、

右九味、以水九升、煮取三升、分溫三服、忌生菜、菘菜、人苧、海藻、

●溫瘧

白虎加桂心湯外瘧瘧者、陰氣孤絕、陽氣獨發、其候也、少氣煩滿、手足熱、欲嘔、熱而不寒、氣藏在心、又曰有溫瘧者、其脈如平人、無寒時熱、其候、骨節疼煩、時朝發暮解、暮發朝解、皆宜此方、

知母六兩、甘草四兩、石羔一斤、粳米一合、

右四味、切、以水一斗二升、煮取米爛、去滓、加桂心三兩、煎取三升、分溫三服、覆令汗、先寒發熱、汗出者愈、忌海藻、菘菜、生葱、傷寒論云、用粳米、不熟、稻米是也、

竹葉常山湯同、療溫瘧壯熱、微寒、溫瘧之候也、壯熱後、如覺微寒、或瘧瘧、依時手足冷、少時便壯熱、亦有手足煩熱、乾嘔者、瘧瘧先大寒、後大熱者、並主之、神效、尤宜乳下小兒亦差方、

常山三兩、淡竹葉握、小麥一升、

右三味、以水五升、漬一宿、明日煮取二升、溫分三服、忌生菜、生葱、

知母、鼈甲湯同、療溫瘧、壯熱不能食、宜此湯、

知母、鼈甲、地骨皮、常山、竹葉、石羔、

右六味切以水七升煮取二升五合去滓分三服忌蒜猪肉菹菜生葱生菜

●山瘡瘡

大黃湯外若患瘡熱實兼吐利者宜此方

大黃 常山 升麻 甘草 各

而三

右四味切以水七升煮取二升半分三服發前盡服別取吐利此蔣家傳忌海藻菘菜生葱生菜

●久瘡勞瘡

常山湯同療三十年瘡方

常山 三兩黃連三兩

右二味切以酒一斗宿漬之向晚以瓦釜煮取六升一服八合此發時令得三服有熱當吐有冷當下服之者千百無一不愈亦可半合无服全劑者忌猪肉冷水生葱生菜

千金施子湯同主瘡經數年不差者

兩劑差一月以來一劑差方

梔子 十四枚 常山 一兩 車前葉 二十枚炙乾

秫米 十四粒

右四味切以水九升煮取三升分三服未發一服發時一服發後一服以吐利四五行為差不止冷飲止之忌生葱生菜

●牝瘡

牡蛎湯外仲景傷寒論牝瘡多寒者主之

牡蛎 四兩 麻黃 各四兩去節 甘草 三兩炙

蜀漆 三兩若無用常山代之

右四味切以水先洗蜀漆三遍去腥以水八升煮蜀漆及麻黃去沫取六升內二味更煎取二升去滓温服一升即吐勿更服則愈忌海藻菘菜

柴胡桂姜湯外治瘧寒多微有熱或

但寒不熱服一劑如神方見傷寒

瘡 山瘡瘡久瘡勞瘡牝瘡 百二十三

●灸瘡

凡灸瘡者必先問其病所發者先灸之從頭項發者於未發前預灸大椎大頭漸灸過時止從腰脊發者灸腎腧百壯從手臂發者灸三間百壯灸艾炷如黍米粒俗人不解取穴務大炷也●覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈者不過三灸●以足踏地以線圍足一匝中折從大推向百會灸線線頭三七壯如小豆狀●又灸風池二穴三壯●凡一切瘡無問遠近正仰臥以線量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右●五藏一切諸瘡灸尺澤七壯穴在肘中約上動脈是也●諸瘡血脈不見者刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之●瘡瘡上星主之穴在鼻中央直

髮際一寸陷容豆是也灸七壯●瘡日西而發者臨泣主之穴在目內眥上入髮際五分陷者灸七壯●瘡實則腰背痛虛則軌軋飛揚主之穴在外踝上七寸灸七壯●瘡多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之穴在足外踝後跟骨上陷中灸三壯以上法並千金

嘔吐噦

●乾嘔

吳茱萸湯 金 食穀欲嘔，屬陽明也。主

之，傷寒乾嘔，吐涎沫，頭痛者，主之。同上

嘔吐胃滿者，用此湯。全醫方見噫噦

黃芩加半夏生姜湯 同 乾嘔而利者，

主之，同上

橘皮湯 治乾嘔噦，若手足厥冷者，

橘皮四兩，生姜半斤

右二味，以水七升，煮取三升，

分三服，不止更合服之。

治乾嘔吐逆，涎沫出者，方同。

半夏 乾姜 各等分

右二味，以漿水一升半，煮取

七合，頓服，日二。

又方 乾嘔不止，粥食湯藥，皆吐不

停，灸手間使，三十壯，若四肢厥脈

沉絕不至者，灸之，便通，此起死人

法。

生姜湯 外療吐逆，乾嘔方。

生姜四兩澤瀉三兩桂心二兩橘皮三兩
甘草二兩茯苓四兩人參一兩大黃四兩
右八味切以水七升煮取三升服
五合日三忌海藻菘菜酢物生葱

人參湯同療嘔方

人參一兩胡麻八兩橘皮二兩

枇杷葉半斤

右四味切以水一斗煮枇杷葉取

五升汁內人參等三種煎取三升

稍々飲之千金作

小柴胡湯金嘔而發熱者主之方見傷寒

四逆湯同嘔而脈弱小便復利身有

微熱見厥者難治同上

●嘔噦

小半夏加茯苓湯千治諸嘔噦心下

堅痞隔間有水痰眩悸者方見傷寒

治嘔噦方同

蘆根切三升以水一斗煮取四

升分作四服

治氣厥嘔噦不得息方同

豉半升半夏八兩姜二兩人參前胡

桂心各一兩甘草各一兩

右柒味咬咀以水九升煮取三升

分三服

又方同

大棗十五枚附子一枚橘皮二兩豉一升

姜各一兩甘草各一兩

右六味咬咀以水九升煎取二升

分三服日三

橘皮湯外療嘔噦不止方

橘皮一升生姜八兩甘草二兩枇杷葉四兩

拭毛

右四味切以水五升煮取二升五

合絞去滓分溫三服每服相去如

人行六七里忌海藻菘菜

肘后療嘔噦方同

生薑莫藤斷之當汁出器承取

飲一升生葛藤尤佳

又方同

枇杷葉一斤拭毛蜜炙水一斗

嘔吐噦 嘔噦

煮取三升分再服備急同

必効療嘔噦方同

取蘆根五兩

以水五升者取三升頓服兼以童子小便一兩合不過三服則差

●噦

橘皮竹茹湯噦逆者主之

橘皮二升竹茹二升大棗三十枚生姜半斤

甘草五兩人參一兩

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

治傷寒後噦乾嘔不下食方同

生蘆根切一升青竹茹一升梗米三升

生姜二兩

右四味以水五升煮取二升分三服不止服三劑

又方同

通草橘皮各一升梗米三升

生蘆根一升

右四味以水四升煮取一升

半分三服

又方同 治噦方 空腹飲姜汁一升

●嘔吐逆

諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之

金方見傷寒門

猪苓散嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者主此方

茯苓 猪苓 白朮各等分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服按千金治嘔而膈上寒

半夏湯治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上方一名小

半夏一升生姜一升茯苓 桂心各五分

右四味以水八升煮取二升

半分三服若少氣加甘草二兩

前胡湯同治寒熱嘔逆少氣心下堅

聚彭亨滿不得食寒熱補不足方

前胡 生姜各二兩 甘艸 朴消

湯成 下 大黃別浸芍藥 茯苓

麥門冬 當歸 半夏 滑石

嘔吐噦 噦嘔吐逆

石羔 括蕞根 黄芩 附子 人参

右十六味，咬咀，以水一斗二升，煮取六升，分四服。

治呕吐，四肢痺冷，短气，腹热，三焦不调方，同。

前胡 芍药 甘州 当归

石羔 人参 桂心 橘皮

芍药 半夏 生姜 大枣

右十二味，咬咀，以水一斗二升，下黄芩三两，合煮取三升，分三服，一方不用黄芩。

犀角人参散子 同 治呕逆，胃气虚，邪风热，不下食方，並治之。

犀角 人参 薤白 粟米 合

右四味，咬咀，以水四升半，煮取一升七合，下米煮令米熟，分四服，相去七里久，进一服。

小麥湯 外主呕吐不止方。

小麥 人参 青竹茹 茯苓

厚朴 炙甘草 生姜 合

右七味，以水八升，煮取三升，分三服，忌海藻、菘菜、酢，千金。

又凡服湯，呕逆不入腹者方，外。

先單煮炙甘草三小两，以水三升，煮取二升，服之，得吐，但更服，不利，益好消息定，然后服餘湯，則流利，更不吐也，忌海藻、菘菜，千金。

延年人参散 同 主吐方。

人参 橘皮 生姜

右三味，切，以水四升，煮取一升五合，分温三服。

麥門冬飲 同 主風邪，熱氣衝心，心悶，短气，吐不下食方。

麥門冬 人参 橘皮 生姜 羚羊角

右五味，切，以水五升，煮取一升五合，去渣，分温三服。

甘草飲 同 主脾腎冷，氣乘心痛，悶吐，利四肢逆冷，或煩疼方。

百二十八 呕吐 逆

甘草二兩 人參二兩 乾姜四兩 厚朴二兩

白朮二兩

右五味切，以水五升，煮取一升五合，去滓，分溫三四服，如人行八九里，忌海藻、菘菜、桃李、雀肉等。

新附近効療嘔吐方同

麻人三合，熬搗，以水研取汁，著

少鹽，喫立効。李諫議用有効

廣濟療嘔逆不能多食方同

訶黎勒三兩去核煨

右一味搗為散，蜜和丸，空心二十丸，日二服，以知為度，多減服，無所忌。

豆蔻子湯同 療嘔逆不下食，腹中氣逆方。

豆蔻子七枚碎 生姜五兩 人參一兩

甘草一兩

右四味切，以水四升，煮取一升五合，去渣，分溫二服，相去如人行五六里，忌海藻、菘菜。

柴胡湯同 療兩脇下妨，嘔逆不下食。

柴胡八分 茯苓 橘皮六分 厚朴

枳椇六分 紫蘓五分 生姜一分 訶黎勒七枚去核炙 甘草五分

右十味切，以水八升，煮取二升五合，絞去滓，分溫三服，夕別相去如人行六七里，進一服，不吐利，忌海藻、菘菜、酢物、猪肉等。

柴胡湯同 療患身體煩疼，頭痛，喫食

嘔逆，不得食方。

柴胡十分 茯苓八分 枳實八分 白朮八分 生姜八分 麥門冬八分 甘草六分

右七味切，以水六升，煮取二升，三合，絞去滓，分溫三服，每服相去如人行六七里，忌海藻、菘菜、酢物、桃李、雀肉、熱麪、炙肉、油膩。

地黃飲子同 療虛熱嘔逆，不下食，則煩悶方。

生地黄汁六合 蘆根一握 生麥門冬

嘔吐噦 嘔吐逆

一升 人參八分 白蜜三分 橘皮六分 生薑一分 云生薑汁一合

右七味切以水六升煮取二升去滓下地黃汁分溫三服如人行四五里進一服不利忌蕪荑生冷麪炙肉蒼麪猪肉蒜粘食

麥門冬湯同療煩熱 嘔逆不下食方則吐出方

生麥門冬三兩 青竹茹三兩 茅根五兩 甘草五兩 生薑五兩 人參一兩

右六味切以水七升煮取二升五合去滓分溫三服如人行六七里進一服不吐利忌海藻菘菜

乾姜甘草湯同療吐逆 水米不下方乾姜二分 甘草一分

右二味切以水二合煎取一合去滓頓服即定少間與粥則不嘔神驗忌海藻菘菜

人參飲同主嘔不能食方 人參八分 厚朴一分 枳實一分 橘皮六分 白朮八分

生薑分

右五味切以水四大升煮取一升五合分溫三服忌桃李雀肉等

生薑根五味飲同許仁則療嘔病有兩種 一者積熱在胃嘔逆不下食

一者積冷在胃亦嘔逆不可食二事正反須細察之必其食飲寢處將息傷熱又素無冷病年壯力強

膚肉充滿此則是積熱在胃致此嘔逆如將息食飲寢處不熟亦素有冷病年衰力弱膚肉瘦悴此則積冷在胃生此嘔逆若是積冷嘔逆經久急須救之不然甚成反胃

病積熱在胃嘔逆不可食宜此方 生薑根切 生麥門冬二分 青竹茹一分 生薑汁五分 茯苓五分

右藥切以水八升煮取二升半去滓加竹瀝六大合攪調分三服相去人行十里行十里久始服一劑忌酢物

噫醋

茯苓湯外療常吐酸水脾胃中冷方

茯苓_{分五} 橘皮_{分五} 白朮_{分八} 人参_{分六}

桂心_{分六} 甘艸_{分八} 紫蘇_{分十} 生姜_{分三}

枳實_{分七}

右九味切以水九升煮取二升半

絞去滓分温三服如人行七八里

未好差三兩日更服一劑老小取

微利忌生葱酢物桃李雀肉海藻

慈菜

茯苓湯同療心頭結氣連胸背痛及

吐酸水日夜不止方

茯苓_{分四} 厚朴_{分四} 橘皮_{分二} 白朮_{分二}

生姜_{分十}

右五味切以水九升煮取二升七

合絞去滓分温三服每服相去如

人行七八里須利加枳實末一兩

半湯欲熟時內之甚安穩三日服

一劑頻服五六劑可則停忌酢物

桃李雀肉等一方有吳茱萸

人参各二兩

吳茱萸湯同療食訖酢物咽多噫方

吳茱萸_{分五} 生姜_{分三} 人参_{分二} 大棗

十二枚

右四味切以水六升煮取二升絞

去滓分為三服每服相去十里久

反胃

治胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此

由久冷方

橘皮_{分三} 甘草 厚朴 茯苓

桂心 細辛 杏仁 竹皮_{分二}

枳實_{分十} 前胡_{分八} 生姜_{分五} 人参_{分一}

右十二味咀咀以水一斗三升煮

取三升分三服一方有甘

大半夏湯外療胃反不受食夕已嘔

吐方

人参_{分一} 茯苓_{分四} 青竹茹_{分五} 大黃

六橘皮 乾姜_{分三} 澤瀉 甘

枳實_{分三} 桂心_{分二}

右九味切以水八升煮取三升服

七合日三夜一已利去大黃用泉

嘔吐藏反胃

水東流水尤佳忌海藻菘菜生葱
大酢

小澤瀉湯同療胃反吐而渴者方

茯苓澤瀉半夏各桂心各

甘草各

右五味以水一斗煮取二升半去
滓服八合日三忌同前

又療胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛

此由久冷者方同

橘皮一白朮人參蜀椒各

粒桂心薤白一去青

右六味切以水二升漬一宿內猪
肚中縫合三升水煮水盡出之決

破去滓分三服忌同前

又療胃反大噦方同

前胡生薑阿膠各大麻子各

人熬吳茱萸各桂心三甘草五

大棗十

右八物切以酒二升水三升煮取
一升七合分再服忌生葱海藻菘

菜酢物等一方用橘皮三兩

半夏飲聖治反胃不食夕即吐逆羸

瘦少方

半夏湯洗米編去厚朴去麩皮生

兩糯米合陳橘皮湯洗去白生

姜切焙

右五味鹿藟篩每服三錢匕束二

枚擘破水一盞去滓空服溫服如

人行五里再服

安中散局治遠年日近脾疼反胃口

吐酸水寒邪之氣留滯於內停積

不消胸膈脹滿攻刺腹脇惡心嘔

逆面黃肌瘦四肢倦怠又治婦人

血氣刺痛小腹連腰攻疰重痛並

能之

甘草一十玄胡索去良姜炒乾

姜炮茴香炒肉桂各牡蠣煅

右為細末每服二錢熱酒調下婦

人淡醋湯調服如不飲酒者用鹽

湯點下並不拘時

二氣散

揚氏家藏方

治陰陽痞結咽膈噎

塞狀如梅核防礙飲食久不愈成
翻胃

山梔子

乾姜炮二味各一兩

右件為鹿末每服二錢水一盞同煎至五分去滓食後熱服

膈氣

●五膈

五膈圓千治憂膈氣膈食膈飲膈勞

膈五病同藥服以憂患思慮飲食
得之若冷食及生菜便發其病若
心滿不得氣息引脊痛如刺之狀
食即下心堅大如粉絮大痛欲吐
吐即瘞飲食不得下甚者及手足
冷上氣欬逆喘息短氣方

麥門冬

甘艸各五兩蜀椒

遠

志

桂心

細辛各三兩附子半兩

人參

乾姜二兩

右九味為末蜜丸微使淖先食含

如彈丸一枚細々咽之喉中胸中

當熱藥力稍盡復含一丸日三夜

二服藥十日愈延年方云若不能

作十小田冬甘入參胡洽云亦可梧子大

冬甘入參胡洽云亦可梧子大

冬甘入參胡洽云亦可梧子大

冬甘入參胡洽云亦可梧子大

膈氣 五膈

百三十三

熱

人參 麥門冬 乾姜 當歸

茯苓 甘艸 五味子 黃耆

芍藥 枳實各三兩 桂心三兩 半夏一升

大棗五枚

右十三味，以水九升，煮取三升，去滓，每服九合，從且至晡，令盡，皆熱服，慎勿冷。

●七氣

七氣湯 治寒氣、熱氣、憂氣、勞氣、怒氣，或飲食為隔氣，或勞氣內傷，五臟不調，氣衰少力方。

乾姜 黃芩 厚朴源師作桂心 半

夏 甘艸 乾地黄 芍藥

枳實各五兩 蜀椒源師作桔梗

右十二味，以水一斗，煮取三升，分三服，日三。

又方 同治虛冷上氣、勞氣等方。半夏一升 人參 生姜 桂心

甘草各一兩

右五味，以水一斗，煮取三升，分三服，日三。

攢柳湯 治氣實若積聚，不得食息方。

扶柳各三兩 附子一枚 半夏一升 細辛一兩

生姜八兩 大黃 紫苑 柴胡各三兩

橘皮 甘艸 紫蘇各兩 茯苓各三兩

右十二味，以水一斗，煮取三升，分三服，相去如人行十里久，若有癥結堅實如石，加釐甲三兩，防葵二兩，氣上加桑白皮，切二升，枳實厚朴各二兩，消息氣力強弱，進二劑，後隔十日，更服，前桔梗破氣圓。

●五噎

通氣湯 外療壹胸脇氣滿，每食氣噎方。

半夏 生姜各六兩 桂心 橘皮各三兩

右四味，以水八升，煮取二升五

隔氣 七氣 五噎 百三十四

合絞去滓分溫三服，夕別相去，如人行六七里服，忌羊肉、生葱、錫等。

通氣湯同療胸滿氣噎方

半夏洗 生姜六兩 桂心三兩 大棗三枚

通氣噎湯同

半夏洗 桂心三兩 生姜八兩 羚羊角三兩

右四味切，以水八升，煮取三升，分服八升，日再服，忌羊肉、生葱、錫。

救急療喉中氣噎方同

半夏洗 柴胡 生姜各三兩 羚羊角

犀角屑 甘艸炙 桔梗 昆布

通草各兩

右九味切，以水八升，煮取三升，分三服，忌羊肉、錫、猪肉、海藻、菘菜等。

治氣噎不通，不得食干

杏仁 桂心各三兩

右二味為末，蜜丸如棗大，稍々咽之，臨食先含彌佳。

● 諸噎

竹皮湯干治噎聲不出方

竹皮一用竹葉 細辛各三兩 甘艸 生姜

通草 人參 茯苓 麻黃

五味子 桂心各一兩

右十味，以水一斗，煮竹皮減二升，去竹皮下藥，煮取三升，分三服。

乾姜湯干治飲食輒噎方集驗名

乾姜 石羔各兩 人參 桂心

枳實根集驗 桔梗 半夏 小麥

升各一兩 甘艸一兩 吳茱萸二升 赤小豆三升

右十味，以酒五升，水一斗，煮取二十枚，去滓合煮，取三升，分三服。

治諸噎方同

常食乾粳米飯，即不噎。

深師療噎方外

羚羊角屑 前胡 甘艸各一兩

人參 橘皮各三兩

右五味切，以水六升，煮取二升，分

兩氣 諸噎

四服忌海藻菘菜

又方同

羚羊角

右一物多少自在末之飲服亦可
以角摩噎上良

集驗療氣噎不下食兼嘔吐方同

半夏洗 薑切

右二味以東流水二大升煎取一
升去滓溫服三合日三服忌羊肉
錫

●骨哽

深師療哽及刺不出方外

服薔薇灰末方寸匕日三亦療

折箭刺入膿囊不出堅燒及鼠撲
服之十日哽刺皆穿皮出効

又療鐵棘竹木諸刺有肉中折不出
及哽不下方同

半夏洗 白斂二

右二物搗篩酒服半錢匕日三寧
從少々起者半夏戟人喉中故也

忌羊肉錫等加乾姜一兩九佳

張文仲療魚骨哽在喉中衆法不能
去者方同

取飴糖凡如雞子黃大吞之不
去又吞此用得効也

治骨鯁在喉衆治不出方干

吞猪膏如雞子不瘥更吞瘥止

●誤吞物

治食中吞髮咽不去繞喉方干

取亂髮燒末酒服一錢匕

治吞錢方外

艾蒿五

以水五升煮取一升頓服之即下
肘後療誤吞鈎方同

若繩猶在手中者莫引之但益
以珠璫若薏子輩就貫之著繩稍
々令推至鈎處小々引之則出

深師療誤吞鈎方同

琥珀珠

右一物貫著鈎繩推令前入至鈎

鬲氣 骨哽誤吞物

所又復推以牽引出矣若水精珠
無珠堅物摩令滑用之也

飲癖

●痰飲

大茯苓湯干主胸中結痰飲澀結臍
下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

茯苓 白朮各三兩 當歸 橘皮

附子各三兩 生姜 半夏 桂心各兩

細辛四兩一作人參

右九味咀以水一斗煮取三升
去滓分三服々々三劑良

治胸膈心腹中痰水冷氣心下汪洋
嘈煩或水鳴多唾口中清水自出
脇肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱
受冷故也其脈喜沉弦細遲悉主
之方干

半夏 生姜各五兩 芍藥二兩 茯苓四兩

旋復花 細辛 橘皮 桂心

人參 甘草 桔梗各三兩

右十一味咀以水一斗煮取三
升分三服病先有時喜水下者用
白朮三兩去旋復花若欲得利者

飲癖 痰飲

加大黃二兩、須微調者、用乾地黃廣濟療心胸中痰積、氣噎、嘔逆、食不下、方外

柴胡 橘皮分 茯苓分 人参分 麥門冬心 雞蘘分 生姜分 干栝榔人湯

右八味、切、以水八升、煮取二升五合、絞去滓、分溫三服、夕別相去、如人行七八里、進一服、未差三日更服一劑、以利為度、忌酢物、生冷、油膩、粘食

乾嘔湯外療痰飲、食不消方

澤瀉 杏仁去皮 枳實炙 白朮查 茯苓查 柴胡查 生姜查 芍藥查 旋復花查 人参查 橘皮查 細辛查 半夏查

右十三味、切、以水九升、煮取二升七合、分為三服、忌桃李、雀肉、大酢、生菜、羊肉、錫等物、又療胸中痰飲、腹中水鳴、食不消、嘔

吐水湯方

大腹栝榔切 生姜八 半夏半升 杏仁四兩 橘皮三 茯苓五 白朮五

右七味、切、以水一斗、煮取三升、去滓、分三服、忌羊肉、錫、大酢、桃李、雀肉等、古今錄驗同

姜椒湯同主胸中積聚、痰飲、食減、少胃氣不足、效逆吐、方

半夏洗 生姜汁 桂心 附子 炮甘艸炙 茯苓 桔梗各 蜀椒而 橘皮切

右九味、切、以水七升、煮取二升半、去滓、內姜汁、煎取四升半、分三服、服三劑、佳、若欲服大散、并五石丸、必先服此方、及進黃耆丸、輩必佳、忌海藻、菘菜、羊肉、錫、生葱、猪肉、冷水、酢物

旋覆花湯同主胸膈痰結、唾如膠、不食者方

飲癖 痰飲

烏頭五枚去皮熬 旋復花 細辛 前胡 甘草炙 茯苓炙 半夏洗 生姜八兩 桂心四兩

右九味切以水九升煮取三升分為三服忌羊肉錫海藻菘菜生葱酢物猪肉冷水等

延年茯苓飲外主心胸中有停痰宿水自吐水出後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食方

茯苓三兩 人參二兩 白朮三兩 生姜四兩 枳實三兩 橘皮一兩

右六味切以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如人行九里進之忌酢物桃李雀肉等

瓜蒂散同 療宿食結實及癰瘰實方

瓜蒂一分 赤小豆一分 右二味搗篩溫湯三合以散一錢匕投湯中和服之須臾當吐不吐更服半錢湯三合令吐如不吐不止飲冷水

療癰散同 療心上結痰寒冷心悶方

瓜蒂一分 赤小豆一分 人參 甘草

右四味搗為散酒服方寸匕日二亦療諸黃忌海藻菘菜

肘后療胸中多痰頭痛不欲食及飲酒則痰瘀阻方同

礬石二兩

右一味以水二升煮取一升內蜜半合頓服之須臾未吐飲小熱湯蜜煎干 主寒熱方

蜜五合 恒山 甘草各一兩

右三味取二味咬咀以水一斗煮取二升去滓內蜜五合溫服七合吐即止不吐更服七合與冷水方 用甘草半兩

集驗療痰癖心腹痛兼冷方

蠶甲炙 柴胡 赤芍藥炙 甘艸 枳實炙 生姜 白朮炙 枳榔

飲癖 痰飲

右八味切以水六升煮七味取二升半去滓內枳榔末分服八合當利忌海藻菘菜苽菜桃李雀肉等

半夏湯同病痰飲者當以溫藥和之療心腹虛冷遊痰氣上膈脇滿不下食嘔逆胸中冷方

半夏洗升三 生姜一 橘皮三

右三味切以水一斗煮取三升分三服若心中急及心痛內桂枝四兩若腹痛內當歸四兩羸瘦老小者服之佳忌羊肉錫

又方同

半夏一 湯洗 升三 生姜一 桂心三 甘艸三

右四味切以水七升煮取二升半分三服忌海藻菘菜羊肉錫生葱

千金茯苓湯同主胸膈痰滿方

茯苓四 半夏洗 升一 桂心八

右四味切以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩氣

滿者加枳柳三七枚忌酢物羊肉

生葱饒

赤石脂散同凡痰飲盛吐水無時節

其源為冷飲過度遂令痼冷脾胃氣羸不能消於食飲食飲入胃皆變成冷水反吐不停者宜此方

赤石脂三

右一味持下篩服方寸匕日三酒飲並可消稍加至三匕服盡三升則終身不吐水又不下利補五藏令肥健有人久患痰飲諸藥不差惟服此一升則愈

廣濟療飲氣痰膈食則嘔吐方同

茯苓八 橘皮六 甘艸四 生姜八

雞蘇六 人參四

右六味切以水五升煮取一升五合去滓分溫二服分別相去如人行六七里進一服不利忌海藻菘菜酢物

延年前胡湯同主胸脊氣滿膈上熱飲癖痰飲

口乾痰飲氣頭風旋方

前胡而二枳實炙細辛 杏人皮去

研犬芎藭 防風 澤瀉 麻黃

去乾姜 芍藥已上各茯苓一作

生薑各桂心 甘艸各

右十四味切以水九升煮取二升

六合分三服微汗忌生冷油滑猪

牛肉麪海藻菘菜生葱生菜酢物

姜附湯同療冷胸滿短氣吐沫頭痛

飲食不消化方

附子六分生薑三分

右二味切以水八升煎取三升二

合分為三服忌猪肉冷水等

清濕化痰湯壽治遍身四肢骨節走

注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳

煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢

麻痺不仁或背心一點如水冷脈

來沉滑乃是濕痰流注經絡關節

不利故也

南星炮半夏製陳皮去茯苓皮

蒼朮米泔卷括 酒苓 白芷

各等 甘艸半

右剉水煎入竹瀝姜汁磨木香温

服●骨體痛甚及有腫塊作痛者

名曰痰塊加乳香沒藥海石朴消

●頭痛加川芎威靈仙●手臂膊

痛加薄桂引南星等藥至痛處

赤茯苓聖治膈間留飲嘔逆頭眩短

氣多渴

赤茯苓 柴胡 白朮 枳殼

枳實一 杏仁 半夏三 人參

旋復花五

姜水煎服三錢空心服

瓜蒌枳實湯回治痰結咯吐不出胸

膈作痛不能轉側或痰結胸膈滿

悶作寒熱氣急并痰迷心竅不能

言語者並皆治之

當歸六分 砂仁 木香各 甘艸三

山梔子 黃芩 陳皮 瓜蒌

去枳實 桔梗 茯苓 貝母

飲癖 痰飲

百四十一

各

右劉一劑，生姜煎入竹瀝姜汁少許同服。痰迷心竅，不能言語，加石菖蒲、去木香、氣喘，加桑白皮、燕子，外用姜查搽痛處。

●痰厥頭痛及風痰

半夏、白朮、天麻湯，治痰厥頭痛、眼黑、頭旋、惡心、煩悶、氣短、促上喘、無力、與言、心神顛倒、目不敢開、如在風雲中、頭若痛如烈、身重如山、四肢厥冷、不得安臥，此乃胃氣虛損、停痰而致也。

半夏製、陳皮去、麥芽分、茯苓分、皮黃耆炒、人參、澤瀉、蒼朮、天麻各三分、神麴炒、白朮米泔浸、黃蘗酒炒、乾姜炒。

右劉一劑，生姜三片，水煎，食前熱服。

備急葛氏，主卒頭痛如破，非中冷，又非中風，是胸膈中痰厥氣上衝所

致，名厥頭痛，吐即差，療方，外

一釜下墨四分、附子三分、炮。

右二味，搗散，以冷水服方寸匕，當吐愈，一方有桂心一分，忌猪肉、冷水。

又方，同

苦參、桂心、半夏洗

右三等，等分為末，苦酒和，以塗痛上，則差，忌生葱、羊肉、鰓肘後。

延年茯苓湯，外主風痰氣發即嘔吐，欠咄煩悶不安，或吐痰水者。

茯苓三、人參、生姜、橘皮、白朮各二。

右五味，切，以水五升，煮取一升五合，去滓，溫分三服，中間任食，忌大蒜、桃李、雀肉等。

又療風痰飲氣逆滿，惡心不能食方。

人參二、枳實炙、白朮各三、生姜四、桂心半。

右五味，切，以水五升，煮取一升五合，飲，瘰癧痛及風痰溢飲，百四十一。

合分温三服忌桃李雀肉生葱
●溢飲

大青龍湯同 溢飲者主之方見傷寒門

青龍湯同 溢飲者當發其汗宜此方

方見傷寒門 即小青龍湯

●支飲

澤瀉湯外 療心下有支飲其人喜方

白朮二澤瀉五

右五味切以水二升煮取一升又

以水一升煮取五合此二汁分為

再服忌桃李雀肉等

葶藶大棗瀉肺湯同 療支飲不得息

葶藶子 慈令紫色指為 大棗 丸如彈丸大 大棗 右二味

先以水三升煮大棗得汁

二升內葶藶煎取一升頓服三日

一劑可服三四劑

小半夏加茯苓湯同 嘔家不渴者為

欲解本渴今反不渴心下有支飲

故也宜此湯加茯苓者是也先渴

却嘔此為水停心下此湯主之卒

嘔吐心下痞膈間有水目眩悸者

宜之方方見傷寒

五苓散同 假令瘦人脐下有悸者吐

涎沫而癩眩水也方見傷寒

甘草湯同 心下有痰飲胸脇支滿目

眩主之是傷寒論茯苓桂枝白

厚朴大黃湯同 夫酒客飲者必致吐

血此坐以極飲過多所致也其脈

虛者必胃其人本有支飲在胸中

也支飲胸滿者主之方

厚朴六 大黃六 枳實六

右三味細切以水五升煮取二升

去滓分温再服之

木防已湯同 膈間支飲其人喘滿心

下痞堅百脈黑其脈沉緊得之數

十日医吐下之不愈

木防已三 石羔三 桂心二

人參 切

右四味以水四升煮取二升去滓

再服虛者即愈實者三日復發則

飲癖 支飲

復與不愈者宜去石羔加茯苓芒硝湯

木防已三 桂心二 人參 茯苓
各二 芒硝一

右五味以水六升煮四味取二升去滓內芒硝分溫再服取微下利則愈忘生葱

旋覆花湯聖治支飲胸膈實痞呼吸短氣方

旋覆花 栝柳 柴胡去 桔梗
炒各 桑根白皮 鱉甲 大黃
剉炒各 甘草炙
一兩半

右八味剉如麻豆大每服五錢匕水一錢半煎至八分去滓溫服不拘時候

導痰湯清治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏湯洗 天南星炮 枳實去
次四兩 炒赤茯苓去 甘草炙
皮 右咬咀每服四錢水一盞姜十片

煎八分食後溫服

痰飲流入四肢令人肩背痠疼兩手

軟痺醫誤以風則非其治宜導痰傷加木香姜黃半錢如未効者輕者指迷茯苓丸重者控涎丹控涎丹加去油木鱉子一兩桂五錢治臂痛每服二十九加至卅丸準四右四味以蜜半升內藥汁及蜜合一升煎取八大合頓服之忌海藻菘菜羊肉餛

當歸湯同療留飲宿食不消腹中積聚轉下宜此方

當歸 人參 桂心 甘草
芒硝 芍藥各 大黃各 生姜
黃芩 澤瀉各

右十味切以水一斗煮取三升分三服空心食後服忌生葱海藻菘菜

千金順流紫丸同療心腹積聚兩脇脹滿留飲痰癖大小便不利小腹切痛膈上寒方

飲癖 支飲

代赭三分烏賊魚骨炙三分半夏三分

巴豆七分去心桂心四分石羔五分

右六味，搗篩蜜和丸，平旦服一丸，如胡豆，至二丸，忌羊肉、鰕、猪肉、蘆筍、生葱。

已椒瀝黃丸 金 腹滿，口舌乾燥，此腸間有水氣，主之。

防己 椒目 葶藶熬 大黃各二分

右四味，末之，蜜丸如梧子大，先食飲服一丸，日三服，稍增，口中有津液，渴者加苾硝半兩。

●酒癖飲及癖飲

漢師朱雀湯 外 療久病癖飲停痰不消，在胸膈上，液々時頭眩痛，苦拳眼睛身體手足十指甲盡黃，亦療脇下支滿飲，輒引脇下痛方。

甘遂 芫花各三分 大戟三分

右三味為散，以大棗十二枚擘破水六升，先煎棗取二升，內藥三方寸匕，更煎取一升一合，分再服，以

吐下為知，未知重服，甚良無比。千金翼前胡湯 同 主胸中寒癖實，病

痰膈塞，胸痛不通利，三焦冷熱不調，飲食損少無味，或寒熱，體重卧不欲起方。

前胡三分 生姜四分 黃芩一分 人參二分

吳茱萸一分 大黃二分 防風一分 杏仁三十枚 當歸各二分 半夏三分 去皮炙 甘州各二分 半夏三分 洗

麥門冬一分 去心

右十二味，切以水一斗，煮取二升，去滓分溫三服，日三服，三劑良，深師云，若脇下滿，下大棗二枚，利水亦佳，忌海藻、菘菜、羊肉、鰕等。

半夏湯 同 主痰飲癖氣吞酸方。

半夏三分 洗 生姜四分 切 附子一枚 吳茱萸三分 粒炒

右四味，切以水五升，煮取二升半，去滓分溫三服，老小服半合，日三，忌猪、羊肉、鰕。

姜附湯 外 主痰癖氣方

飲癖 留飲酒癖及癖飲

生姜八兩切 附子四枚

右二味水五升煮取二升分再服亦主卒風大良忌猪肉冷水

●飲癖

附子湯外療氣分心下堅如盤邊如旋杯水飲所作此湯主之方

桂心 生姜各三兩 麻黃去節三兩 甘草二兩

草各二兩 細辛三兩 大附子一枚 大棗十二枚

右七味切以水七升先煮麻黃再沸掠去沫乃下諸藥煮取二升去滓分服七合當汗出如蟲行皮中即愈神驗忌海藻菘菜生葱猪肉冷水生菜等仲景傷寒論名桂枝湯附子

枳實白朮湯同療心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作方

枳實七枚 白朮三兩

右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中輒即散此出姚大夫方

忌桃李雀肉等物

●癖結

千金翼江寧衍法師破癖方外

白朮三兩 枳實三兩 柴胡三兩

右三味切以水五升煮取二升分溫三服夕三十劑永差忌桃李雀肉

集驗療冷熱久癖實不能飲食虛滿如水狀方同

前胡四兩 生姜四兩 枳實三兩 半夏半斤

白朮三兩 茯苓四兩 甘艸二兩 桂心二兩

右八味切以水八升煮取三升分三服同

●痞癖

延年療兩肋脹急痞滿不能食兼頭痛壯熱身體痛方外

枳實三兩 桔梗二兩 鼈甲三兩 人參二兩

前胡二兩 生姜四兩 枳實七枚 桂心二兩

右八味切以水九升煮取二升五分飲癖 癖結痞癖

合去滓分温三服如人行七八里
久禁生葱、莧菜

救急療腹中痞氣連心以來相引痛
緊急方同

白朮一兩 枳實三兩 柴胡四分
驚甲三兩

右四味切以水七升煮取二升五
合去滓空肚分三服相去七八里
能連服三四劑始知驗禁生冷猪
肉并毒魚大須慎之瀕服有效忌
莧菜生葱

延年半夏湯同主腹內主腹內左肋
痞癥硬急滿不能食胸脊痛者方

半夏洗 生薑四兩 桔梗二兩 吳茱萸
前胡三兩 驚甲三兩 枳實三兩 人參
一兩 枳實十四枚

右九味切以水九升煮取二升七
合去滓分温三服如人行八九里
久忌猪肉、錫莧菜等

三稜草煎同 主癥瘕方

三稜草切一石

右一味水五石煮取一石去滓更
煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠
糖出內密器中且以酒一盞服一
匕日二服每服常令酒氣相續

飲癖

癖結痞癖

百四七

積聚癥瘕奔馳

●積聚

陷胸湯千治胸中心下結積飲食不

消方

栝蒌實 大黃 黃連各三

甘草一分

右四味以咀以水五升煮取三升
五合分三服

淡師烏頭丸外療心腹積聚脹滿少

食多厥繞脐痛按之排手寒中有
水上氣女人產後餘疾大人風癩
少小風驚癇百病者元嘉中用療
數人皆良有一人服五服藥即出
蟲長一尺餘三枚復出如牛膽黑
堅四枚中皆有飯食病即愈方

烏頭表乾姜五分皂莢五分菖蒲

桂心四分柴胡三分附子三分人參

厚朴三分黃連三分茯苓三分蜀椒

汁吳茱萸四分桔梗三分

右十四味搗篩蜜和為丸服如梧
積聚 癥瘕

子二九日三稍加至十五九忌猪
肉冷水酢物生葱羊肉饒

●癥瘕

甘遂湯千治暴堅久痞腹有堅方

甘遂 黃芩 砒硝 桂心

細辛各兩 大黃三兩

右六味以咀以八升煮取二升半
分三服

大七氣湯準

治積聚癥瘕隨氣上下
心腹疝痛上氣窒塞小腹脹滿大
小便不利

京三稜 蓬莪朮 青皮各去白

藿香葉 桔梗去芦 肉桂不見火

益智人各一兩半 甘艸炙 香附炙

毛一兩半

右以咀每服伍錢水二盞煎至一
盞食前溫服

●奔豚氣

奔豚湯金奔豚氣上衝胸腹痛往來
寒熱主之

甘草 芎藭 當歸二兩半 夏黃

芩 生葛五兩 芍藥二兩 生姜四兩

甘李根白皮一升

右九味以水二斗煮取一升日三
夜一服

桂枝加桂湯同發汗後燒針令其汗

針處被寒核起而赤者必發貴脈

氣從小腹上至心灸其核上各一

壯此湯主之方見傷寒

茯苓桂枝甘草大棗湯同發汗後臍

下悸者欲作貴腫此湯主之同上

師曰療卒傷損食下則覺胸中痛

慄々然水漿下亦尔問病與相應

急作此方外

生李根一斤細切 麥門冬一升 人參

二兩 甘草二兩

右五味以咀以水一斗煮取三升
分三服

肘後療卒厥逆上氣々支兩脇心下

痛滿淹々欲絕此謂奔豚病從卒

積聚 奔豚氣

驚怖憂迫得之氣從下上衝心
胸臍間築々發動有時不療殺人
方同

甘草二兩 人參二兩 吳茱萸一分 生姜一分
半夏一分 桂心三分

右六味切以水一斗煮取三升分
三服此藥須預畜病便急合服之
千金方桂五兩甘草三兩張文仲
同○按千金云奔氣湯主大氣上
奔胸膈中諸病每發時迫滿短氣
不得臥劇者便情欲死腹中冷濕
氣腸鳴相逐
成結氣方

廣濟貴肺氣在心吸夕短氣不欲聞

人語聲心下煩亂不安發作有時
四肢煩疼手足逆冷方同

李根白皮八兩 半夏五兩 乾姜四兩 茯苓四兩
人參二兩 甘草二兩 附子二兩 桂心四兩

右八味切以水一斗煮取三升絞
去滓分三服別相去如人行六七
里忌生冷羊肉餵海藻菘菜油膩
醋物生葱粘食

七氣湯同 療憂勞寒熱愁思及飲食

隔塞虛勞內傷五藏絕傷奔氣不
能還下心中悸動不安方

桔梗二兩 人參三兩 芍藥二兩 黃芩二兩
甘草二兩 橘皮三兩 半夏三兩
吳茱萸七合 乾地黄三兩 枳實三兩
桂心二兩 乾姜三兩

右十二味切以水一斗煮取三升
去滓分三服忌海藻菘菜羊肉錫
生葱猪肉蕪荑等千金無桂心橘
皮桔梗有厚朴
蜀椒

小品牡蛎貴肺湯同 療貴豚氣從少

腹起撞胸手足逆冷方
牡蛎三兩 桂心八兩 李根白皮一斤
右四味切以一斗七升煮取李根
皮得七升去滓內餘藥再煎取三
升分服五合日三夜再忌生葱海
藻菘菜范注

奔胞湯同 療手足逆冷胸滿氣促從
臍左右起鬱冒者方

積聚 癥瘕 百五十

甘草炙 李根白皮切 葛根一黃
芩三兩 桂心二兩 括蕒二兩 人參二兩 芍

藟一兩

右八味切以水一斗五升煮取五升去滓温服一升日三夜再忌海藻菘菜生葱

枳殼散 本治五種積、膈氣、三焦痞塞

胸膈滿悶、背脊引疼、心腹膨脹、脇肋刺痛、食飲不下、噎塞不通、嘔吐痰逆、口苦舌酸、瘦々少力、短氣煩悶、常服順氣寬中、消痞瘕、積聚散驚憂恚氣、宜服之、和劑局方曰膈氣散

枳殼去穢剉 荆三稜 橘皮去

益智人 蓬菪術 枳椇 肉桂不見火各二兩 干姜炮 厚朴去

皮姜或六兩 甘艸炙 青皮去 肉豆蔻

汁炙 木香各半兩或各三兩

右為細末每服二錢重水一盞生

姜五片束一個同煎七分熱服監

點亦得不拘時候

分心氣飲局 治男女婦人一切氣不

和、多因憂愁思慮怒氣傷心、或臨

食憂感、或事不隨意、使鬱抑之氣

留滯不散、停於膈々之間、不能流

暢、致心胸痞悶、脇肋虛脹、噎塞不

通、噫氣吞酸、嘔噦惡心、頭目昏眩

四肢倦怠、面色萎黃、口苦舌乾、飲

食減少、日漸羸瘦、或大腸虛秘、或

因病之後、胸膈虛痞、不思飲食、並

皆治之

木香不見火 丁香皮 人參去 厚

朴去 大腹子炮 大腹皮炙

桑白皮炒 草葉人 桔梗 麥

門冬子去 白朮各半 香附子炒去

紫蘇去 藿香去 陳皮各一兩 甘艸二

○一本丁香皮大腹皮各一兩

菓人桔梗麥門各一兩

右以咀每服二錢水一盞生薑三

片燈心拾莖、棗子一箇、擘破去核、

煎至米分去滓温服不拘時候

三和散局 治七情氣結、五臟脾胃不

積聚 癥瘕

百五十一

和心脹急大小便秘寢食俱廢

沉香 紫蘇 大腹皮 羌活

各分 木香 白朮 枳殼 陳皮

甘草 各分 川芎 一分 木瓜 二分

生姜水煎溫服。●不渴者乃氣秘

耳未可施以硝黃秘甚再加枳殼

蘿蔔子皂角子●心積胸下鳩尾

邊硬痞黃連香附子枳殼●肝積

左脇硬痛青皮莪朮川芎一分柴胡

青皮川芎莪朮●肺積右脇硬痛

陳皮香附子枳殼一分沉香附子枳

榔●脾積臍邊硬食則痛飽食則

瀉時或不食吞酸陳皮厚朴香附

子莪朮神麴一分白朮陳皮莪朮●

腎積臍下硬痛時如脈動上衝胸

莪朮三稜枳榔川棟肉桂門入

正氣天香湯門入治婦人一切諸氣作

痛或上凌心胸或攻築脇肋腹中

結塊發渴刺痛月水因之而不調

或眩暈嘔吐往來寒熱無問胎前

產後一切氣候並皆治之

香附六分烏藥五分陳皮 紫蘇

乾姜 各六分

右水煎稍熱服

芍藥湯 聖治積聚心腹脹滿甚則泄

利及氣不升降方

赤芍藥 赤石脂 大腹皮

京三稜 煨 桑根白皮 焙各 肉豆

蔻 去壳 桃仁 製如前 桂 半 附子 製如

白朮 木香 枳殼 製如 當歸

焙切 麻黃 去根 黃連 去須

右一十五味剉如麻豆每服五錢

匕水一盞半入生姜三片同煎至

八分去滓溫服

當歸四逆湯 醫宗 治十年患痢形容

枯槁左脇有形其大如臂以熱手

握之漚漚有聲甚至上攻于心悶

絕者久之熱醋熏灸方懸

當歸分 附子分 官桂 茴香炒

柴胡分 芍藥分 玄胡索 川棟

積聚

癥瘕

百五十二

子 茯苓分 澤瀉分

右研為鹿末都作一服水煎空心服宜明無苗香

七氣消聚散準 有因積聚相攻或疼或脹者初用此湯日久元氣虛脾胃弱而脹者參朮健脾湯少佐消道藥

香附米一 青皮 蓬朮 三稜

枳殼炒 木香 砂仁色 厚朴製

陳皮各一錢 甘艸二分

水二鍾姜參片煎捌分食前服

秘傳降氣湯準 治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損脾胃腎元水火交攻陰陽隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾爆飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澀重急後重脘腹冷疼若治似涼則脾氣怯腸鳴下利治以過則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻

與久利不差先服此蒸劫以所主藥治之氣壅耳龍泛熱咽疼亦效

桑白皮兩 炒枳殼湯浸去 柴胡去

芦陳皮炒黃 甘草炒各 五加皮

酒浸半日炒黃 骨碎補 去毛

浸去瓢炒 地骨皮炒 梔梗炒 草菓去皮膜

黃訶子炮取 半夏生 自然汁和成餅再碎

炒以上各半兩

右剉散和勻以椀盛飯甑上蒸一伏時傾出攤令收之每服二錢紫蘇三葉生薑三片水一盞同蓋七分食後通口服痰欬加半夏翹 心肺虛每料加人參茯苓各一兩上膈熱加北黃芩五錢下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸一兩

胸心腹病

●胸痺

理中湯外療胸痺

人參三兩甘草二兩白朮三兩乾姜三兩

右四味切以水八升煮取三升去

滓溫服一升日三夜一頓服三劑

愈張仲景云胸痺心中痞堅留氣

結於胸夕滿脇下逆搶心理中

湯亦主之

枳實湯同療胸痺之病喘息欬唾胸

背痛短氣其脈沉而遲關上緊數

者方

枳實二兩芍藥一兩薤白一斤半夏半升生姜

右五味切以白豈漿一斗煮取四

升服一升日三肘后仲景傷寒論

無生姜枳實半夏等三味同小品

云用水一斗忌羊肉錫

茯苓湯同胸中氣塞短氣主之

茯苓三兩甘草二兩杏仁五十枚

右三味以水一斗煮取五升

胸心腹病 胸痺

百五十四

温服一升日三服不差更合仲景
傷寒論同

枳實湯同療胸痺心中痞堅留氣結

於胸中胸滿脇下逆氣搶心方

桂枝一枚 陳枳實四枚 厚朴四兩

枳實一枚

右五味先以水五升煮枳實厚朴

取二升半去滓內餘藥又煎三兩

漉去滓分温三服除心氣良

薏苡人散同療胸痺偏緩急方

薏苡人五升 附子大者 甘草三兩

右三味搗下篩服方寸匕日三忌

海藻菘菜猪肉冷水

橘皮枳實湯同胸痺之病胸中幅々

如滿噎塞習々如覆喉中澀唾燥

沫是也此湯主之

橘皮半斤 枳實四枚 生姜半斤

右三味切以水五升煮取二升分

再服

通氣湯 療胸滿短氣噎塞方

半夏洗 生姜六兩 桂心三兩

吳茱萸四十枚

右四味切以水八升煮取三升去

滓分温三服忌羊肉錫生葱一方無桂

橘皮心用

肘后或已差復更發方同

取薤根五斤

右一味搗絞取汁飲之立愈

● 胸痛

前胡湯干治胸中逆氣心痛徹背少

氣不食方

前胡 甘草 半夏 芍藥各三兩

黃芩 當歸 人參 桂心各二兩

生姜三兩 大棗三十枚 竹葉一升

右十一味以水九升煮取三

升分為四服

又方同

前胡 人參 生姜 甘艸

麥門冬 芍藥 茯苓 錫各三兩

桂心 黃芩 當歸各二兩 大棗三十枚

胸心腹痛 胸痛 百五十五

右十三味，哎咀，以水一斗四分，煮取三升，去滓，分三服。

下氣湯 同 治胸腹閉滿，上氣喘息方。

杏仁四枚 大腹栝榔一枚

右二味，哎咀，以童子小便三升煎取一升半，分再服。曾患氣發，輒合服之。

栝榔湯 同 主破胸脊惡氣音聲塞閉方。

栝榔極大者四枚 小者八枚

右一味，二品，哎咀，以小兒尿二升半，煮減一升，去滓，分三服，頻與五劑，永定。

當歸竜薈丸 同 瀉肝火之盛，要藥，因內有濕熱，兩脇痛甚，伐肝木之氣方。

當歸 黃連 竜胆草 山梔

子 大黃酒浸 火製 蘆薈 青黛各五分

木香五分 射香五分 加柴胡五分 青

皮一兩 去穢

右為細末，神麴糊為丸，梧桐子大，每服二十九丸，姜湯送下。

柴胡芎歸湯 同 治肝火盛，木氣實，脇

下痛方。

香附子 當歸 竜胆草各五分

香附研砂 人 甘草 柴胡 川

芎 白芍 青皮去穢 炒各一分 枳殼一分

右剉，一劑，姜一片，水煎，不拘時服。

通氣防風湯 準 治肩背痛。

柴胡 升麻 黃芪各一分 防風

羌活 人參 甘草各一分 藁木

青皮各三分 黃蘗一分 白豆蔻人二分

右水煎溫服，食後氣盛者，宜服，面白，脫色，氣短者勿服。

●心痛

黃連湯 外 療心痛。

黃連八兩

右一味，哎咀，以水七升，煮取一升五合，絞去滓，適寒溫飲五合，日三，忌猪肉冷水。

胸心腹病 心痛

烏頭赤石丸 同心痛徹背々痛徹心

主之方

烏頭二分炮去皮 附子一分炮去皮 赤石脂二分

乾姜二分 蜀椒汗

右五味搗篩蜜和丸先食服如麻子大一服三九少々加之忌猪肉冷水

芫花湯 同主卒心痛如鬼所刺絞急欲死

芫花十分 大黃十分

右二味搗下篩取四方寸匕著二升半苦酒中合煎得一升二合頓服盡須臾當吐々便愈老少從少起此療強人良若虛冷心痛恐未必可服

苦參湯 同療得心痛如刺

苦參二兩 龍胆二兩 升麻二兩 梔子人三兩

右四味切苦酒五升煮取一升分

二服當大吐乃差

人參湯 同療心痛方

人參 桂心 梔子 黃芩

甘州各二兩

右各五味切以水六升煮取二升

分三服則愈奇効忌海藻菘菜生葱

葱

集驗療卒暴心痛或中惡氣毒痛不

可忍方 同

大黃四兩 芍藥四兩 升麻三兩 黃芩三兩

鬼箭三兩 鬼臼二兩 桂心二兩 桔梗三兩

柴胡四兩 朱砂別研二兩 朴消二兩

右十一味切以水九升煮取七合

分三服先分朱砂作三分一服內

一分攪朱砂調服之此湯快利若

痛不止宜服後方忌猪肉生葱生

血物千金方云寒氣卒客於五藏

六腑中則發心痛方 千金同

防風茯苓湯 同療滿胸短氣心痛吐

涎虛冷方

防風二兩 茯苓二兩 桂心六兩 甘草二兩

半夏四兩 乾姜四兩 人參三兩

胸心腹病 心痛

右七味切以水一升煮取三升絞去滓分三服良忌酢物生葱海藻菘菜羊肉錫

當歸湯同療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲蠶心痛方

當歸_{三兩} 桔梗_{二兩} 吳茱萸_{三兩} 桂心_{三兩} 芍藥_{二兩} 大黃_{二兩}

右六味切以水六升煮取三合去滓內鶴蛋一兩攪溫一沸分三服空服之微利為度忌猪肉生葱

當歸湯同療惡症撮肋連心痛方

當歸_{八分} 青木香_{六分} 檳榔_{十顆} 射香_{一銖}

右四味切以小便一大升半煮取六大合去滓下射香末分溫三服服別如人行四五里進一服微々利忌生菜熟麩猪犬肉粘食蒜陳臭物

高良姜湯同療久心刺肋冷氣結痛不能食方

高良姜_{十分} 當歸_{十分} 橘皮_{八分} 厚朴_{十分} 桔梗_{八分} 桃人_{五分} 吳茱萸_{八分} 生姜_{八分} 訶梨勒_{五分}

右九味切以水八升煮取二升八合絞去滓分溫三服々別相去如人行六七里再服忌猪肉生冷油膩粘食小豆等

桂心生姜枳實湯同心下懸痛諸逆大虛者主之方

桂心_{三兩} 生姜_{三兩} 枳實_{五枚}

右三味切以水六升煮取三升去滓溫服忌生葱

桂心三物湯同心下痞諸逆懸痛方

桂心_{三兩} 膠飴_{半斤} 生姜_{二兩} 右藥切以水四升煮二味取三升去滓內飴分三服忌生葱按千金用枳實五枚不用膠飴肝後用枳實五枚白朮二兩為五味

當歸湯同療心痛癥塊硬築心氣欲絕方

當歸 桔梗 芍藥_{各八分} 厚朴

十橘皮八分 人參六分 高良姜十分 挑
人五十枚 生姜八分
去皮尖

右九味切以水八升煮取二升五
合去滓分溫三服夕別相去如人
行六七里進一服不利忌猪肉生
冷油膩雞魚粘食小豆大蒜

張文仲療心下堅痛大如椀邊如旋
拌音盤名為氣分水飲所結方同方見
飲癖

●諸蟲心痛

當歸湯外主心腹攪結痛不止仍似
有蛔蟲者方

當歸 橘皮 細辛 甘艸炙

生姜各四分 大黃各八分 鶴虱二分

右七味切以水六升煮取二升分
溫三服如人行四五里進一服不
利未差三日更作服之忌海藻菘
菜生菜

小品溫中當歸湯同療暴冷心腹刺
痛面目青肉冷汗出欲霍亂吐下
脈沉細者及傷寒毒冷下清水變

作青白滯下及白滯後還復下清
水者悉主之此方可調諸冷痛也

當歸 人參 乾姜 茯苓

厚朴炙 青木香 桂心 桔梗

芍藥 甘艸各二兩

右十味切以水八升煮取三升分
溫三服不耐青木香者以犀角一
兩代之忌海藻菘菜猪肉醋物生
菜生葱等

增損湯同療心腹中痛發作腫聚往

來上下痛有休止多熱喜涎出是
蚘蟲蛟也宜溫中當歸湯服兩三
劑後若不効有異宜改此方其溫
中當歸湯在前小品方中

芍藥六兩 黃芩四兩 厚朴四兩 桔梗四兩

柴胡四兩 當歸三兩 升麻三兩

右七味切以水八升煮取二升半
分三服忌猪肉

●腹痛

張文仲當歸大黃療冷氣牽引腰背
胸心腹痛 諸虫心痛腹痛 百五十九

肋下腹內痛方外

當歸_三芍藥_八桂心_三乾姜_六

芫花_五人參_一大黃_一甘草_三

右八味切以水六升煮取三升去

滓溫服一升日三忌海藻菘菜生

葱

四味當歸湯同主寒腹痛方

當歸 桂心 乾姜_各甘草_各

右切以水八升煮取三升一服一

升日三服虛冷激痛甚者加黃耆

芍藥各二兩忌海藻菘菜生葱_各

無甘草有

芫花湯同療寒冷腹痛方

吳茱萸_二甘艸_各人參 桂心

而生姜_五半夏_一小麥_一當歸

右八味切以水一斗五升煮取三

升分溫服一升日三服忌海藻菘

菜羊肉餒生葱_各干金桂_一

芫花湯同療卒寒腹中拘急痛方

芫花 當歸 桂心 芍藥

甘草_各黃芩_半乾姜_半杏仁

三十枚

右八味切以水五升煮取二升分

再服忌海藻菘菜生葱

治久寒宿疾胸腹中痛短氣時滯下

痢方

當歸 桂心_各乾姜_四附子_一

右四味咬咀以水八升煮取二升

分三服日三范汪無附子用甘草

者加黃耆芍藥各二兩

溫脾湯同治腹痛臍下絞結繞臍不

止方

甘草 附子 人參 芫花_各

當歸 乾姜_各大黃_五

右七味咬咀以水七升煮取三升

分服日三

●心腹痛及脹滿痛

五苓湯千治心腹疼痛

細辛 蜀椒 桂心 乾姜

胸心腹痛 心腹痛及脹滿痛 百六十

吳茱萸 芍藥 防風 苦參
甘草 乾地黄 當歸各一兩 梔子
烏梅 大棗各十枚

右十四味，㕮咀，以水九升，煮取三升，分四服。

高良姜湯同 治心腹絞痛如刺，兩胸支滿，煩悶不忍方。

高良姜五兩 厚朴二兩 當歸 桂心各一兩

右四味，㕮咀，以水八升，煮取一升八合，分二服，日二。若一服痛止，使停，不須更服，強者為二服，劣者分三服。

大建中湯同 治心脇中大寒，大痛，嘔不能飲食，飲食下咽，自知偏從一面下流，有聲決然，若腹中寒氣上衝，皮起，出見有頭足，上下而痛，其頭不可觸近方。

蜀椒二合 乾姜四兩 人參二兩 飴糖一升
右四味，㕮咀，以水四升，煮取二升。

去滓，內糖，微火者，令得一升半，分三服，夕湯如炊三升米，入可飲粥，二升許，更服當一日食糜溫之。

治積年患氣，發作有時，心腹絞痛，忽然氣絕，腹中堅實，醫不治，復謂是蠱方同

楨柳大者四枚 附子一枚 半夏一升 柴胡三兩 生姜八兩 橘皮 甘草 桂心 當歸 枳實各二兩

右十味，㕮咀，以水一升，煮取三升，分三服，五日一劑，服三劑，永除根本。

半夏湯同 治逆氣，心腹滿氣，上胸膈寒冷，心腹痛，嘔逆及吐，不下食，憂氣結聚方。

半夏一升 生姜 桂心各五兩 橘皮四兩
右四味，㕮咀，以水七升，煮取三升，分四服，日三夜一，強者作三服，亦治霍亂後吐逆腹痛。

桔梗散外 療心腹中氣，時々痛，食冷胸心腹痛，心腹痛及脹滿痛。百六十一

物則不安穩及惡水友

桔梗 茯苓 枳實 炙 人參

厚朴 炙 芍藥 橘皮 炙 桂心 五分

枳實 八分 麥門冬 去心 八分

右十味，搗篩為散，空肚煮姜枣，飲服方寸匕，日三服，漸加至一匕半，熱以茶飲下，不利，忌猪肉、酢物、生葱、生冷、油膩、小豆、粘食、熟麩、炙肉等物。

當歸湯 同療卒心腹痛氣脹滿不下食，欲得瀉，三兩行友。

當歸 茯苓 橘皮 桔梗

高良姜 枳實 炙 生姜 八分

右七味，細切，以水七升，煮取二升，三合，絞去滓，分溫三服，令別相去，如人行六七里，服訖，利三兩行，宜停後服，忌猪肉、醋物、生冷、油膩、魚、蒜、粘食、小豆。

肘後療心脹痛煩滿短氣欲死，或已絕友，同。

梔子 十四枚 豉 七合

右二味，以水二升，先煮豉取一升，二合，去滓，內梔子，更煎取八合，絞去滓，服半升，不愈者，盡服之。

小品當歸湯 同療心腹絞痛諸虛冷氣滿友。

當歸 三兩 乾姜 四兩 甘草 三兩 芍藥 二兩

厚朴 三兩 黃芩 二兩 蜀椒 二兩 半夏 三兩

肉桂 三兩 人參 三兩

右十味，切，以水一斗，煮取三升，二合，強人可一升，羸人服八合，大冷者，加附子一枚，炮，忌海藻、菘菜、羊肉、錫、生葱。

烏沉湯 治一切氣除一切冷，調中

補五藏益精壯陽道，暖腰膝，去邪氣，治吐瀉，轉筋，癱瘓，疼痛，風水，毒腫，冷風，麻痺，又主中惡，心腹痛，蠱毒，疰忤，鬼氣，宿食不消，天行瘡疫，膀胱腎間冷氣，攻衝背脊，俛仰不利，及婦人血氣攻擊，心腹刺痛，並

宜服之

天台烏藥二百兩 人參壹斤頭

沉香兩半 甘州兩半

右為末每服半錢入生姜三片塩少許沸湯點服空心食前

四柱散同 治丈夫元藏氣虛真陽耗

散兩耳常鳴脐腹冷痛頭旋目暈

四肢怠倦小便滑數泄瀉不止

人參 附子炮去皮 木香濕紙煨

茯苓各一兩

右為細末每服二盞水一大盞生姜三片枣子一箇塩少許煎柒分

空心食前食凡藏氣虛弱者悉宜服之

小烏沉湯同 調中快氣治心腹刺痛

烏藥一兩 香附子炒盆內折去

甘草一分一本烏藥十兩附子二十兩甘草炒一兩

右為末每服一盞入塩少許或不著塩沸湯點服不拘時

雞舌香散同 治男子女人陰陽不和

藏府虛弱中脘氣滯宿寒留飲停積不消胸膈脹滿心脾引痛攻刺

腹脇有妨飲食又治中酒吐酒停飲浸漬嘔吐惡心噫氣吞酸並皆

治之

天台烏去粗皮 肉桂去粗皮 香附子炒去

赤芍藥不見火 高良姜去芦頭

右為細末每服二錢入塩少許用沸湯點不拘時候

人參煮散同 治脾胃不和中脘氣滯

心腹脹痛不思飲食宿寒留飲停積不消或飲冷過度內傷脾氣吐

嘔痰逆寒熱往來或時汗出又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹

中雷鳴脇肋虛滿兼療傷寒陰盛四肢逆冷友

茯苓去皮 蒼朮去皮各半斤 人參四兩

甘州兩半 三稜煨 青皮去白各十二兩

芍藥一斤 乾姜炮 丁皮六兩

胸心腹痛 心腹脹滿及鼓脹 百六十三

右為末，每服二錢，水一盞，生姜五片，
粳米三枚，同煎至米分，食前空心溫
服。

●心腹脹滿及鼓脹

茯苓湯外療鼓脹上下腫，心腹堅強，
喘息氣急，連陰腫坐不得，仍下赤
黑血，汴日夜不停，方。

茯苓二兩 防己二兩 橘皮一兩 玄參一兩
黃芩二兩 澤瀉半兩 杏仁二兩 白朮一兩
大豆一升 郁李人半兩 桑白皮半兩
澤漆葉半兩 猪苓半兩

右十三味，切以水一斗，先煮桑白
皮、大豆、澤漆葉，取五升，去滓，澄去
下淀，內諸藥，煎取二升，絞去滓，分
三服，效者加五味子二兩，停二日
服一劑，忌醋物、桃李、雀肉、熟麩、蒜
炙肉、粘食、油膩等。

厚朴湯同療心腹脹滿方

柴胡各八分 厚朴各十分 茯苓各五分 橘皮各五分
紫蘊各八分 生姜各五分 枳實各五分

右七味，切以水七升，煮取二升五
合，絞去滓，分溫三服，夕別掃去如
人行六七里，進一服，微利，忌酢物
生冷、油膩、粘食。

紫蘊湯同療急氣發心腹脹滿，兩肋
氣急方

紫蘊一握 訶梨勒皮一分 當歸一分 生
姜各八分 人參六分 枳實十分 生地黃一分
汁半升

右七味，切以水六升，煮六味，取二
升，絞去滓，下地黃汁，分溫三服，夕
別如人行四五里，進一服，利三兩
行，忌蕪荑、生菜、熟蕪、炙魚肉、魚、蒜
粘食、陳臭等。

千金厚朴七味湯同主腹滿氣脹方

厚朴半斤 甘草炙 大黃炙 大
棗十枚 枳實五枚 桂心二兩 乾姜五兩

右切以水一斗，煮取五升，去滓，內
大黃四升，服八合，日三，嘔者如半
夏五合，利者去大黃，寒者加生姜
胸心腹病，心腹脹滿及鼓脹。 百十四。

至半尔忌同前。

半夏湯同療胸滿有氣心腹脹中冷方。

半夏一升桂心四兩生姜一兩
右三味切以水七升煮取二升絞去滓適寒溫飲七合忌羊肉餛生葱等。

救急療卒患心腹脹滿刺痛方同

生姜大有功能遠行宜將自隨煮汁服良患久痢虛損嘔逆不下食見食則吐取三兩細切持絞取汁微煖點少多蜜頓一服則下食大效。

附子粳米湯同療腹中寒氣脹雷鳴切痛胸脇逆滿方。

附子一枚炮半夏半升洗甘草一百
大棗十枚粳米半升
右五味切以水八升煮米取熟去米內藥煮取三升絞去滓適寒溫飲一升日三忌海藻菘菜猪羊肉。

錫集驗加乾姜二兩

延年療患腹內氣脹雷鳴胸背痛方

丹參三兩枳實炙各三兩桔梗白朮

芍藥各二兩生姜四兩枳殼七枚

右七味切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌猪肉桃李雀肉生冷油膩魚蒜等。

丹參湯同療腸鳴發則覺作聲方

丹參四兩茯苓各三兩桔梗二兩生姜各二兩

厚朴各二兩食茱萸各二兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服每服如人行七八里忌生菜猪肉酢物。

溫胃湯干治胃氣不平時脹飲不能食方。

附子當歸厚朴人參

橘皮芍藥甘艸各一兩乾姜各三分

右九味切咀以水九升煮取三升分三服。

胸心腹病心腹脹滿及鼓脹百六十五

大半夏湯 同治胃中虛冷腹滿塞下
氣友

半夏升大棗二十枚 甘艸 附子
當歸 人參 厚朴 茯苓
枳實 各二兩 桂心 五兩 生姜 八兩 蜀椒
二百粒

右十二味 以水一斗 煮取三升 分二服

厚朴三物湯 治腹滿發熱數十日 脈浮而數 飲食如故方

厚朴 半斤 大黃 四兩 枳實 五枚

右三味 以水一斗 煮取五升 內大黃 煎取三升 去滓 一升 腹中轉動者 勿服 不動者 更服 一方加而閉者 主之

大柴胡湯 按之心下滿痛者 此為實也 當下之 主之 方傷

沉香降氣湯 治陰陽壅滯氣不升降 胸膈痞塞 心腹脹滿 喘促短氣 乾噦煩滿 咳嗽痰涎 口中無味 嗜

臥減食 又治胃痺留飲 噎醋聞酸

脇下支結 常覺妨悶 及中寒 咳逆 脾濕洞泄 而脇虛鳴 胛下撮痛 皆

能治之 患脚氣人 毒氣上衝 心腸 堅滿 肢體浮腫者 尤宜服之 常服 開胃消痰 散壅 思食

香附子 二十五斤 炒 沈香 一斤 二兩 半斤 作 十四 縮砂仁 三斤 甘艸 一斤 半 煎

右為細末 每服一錢 入塩少許 沸湯點服 凌旦霧露 空心服之

快氣湯 同治一切氣疾 心腹脹滿 胸膈壅塞 噎氣吞酸 胃中痰逆 嘔吐 及病酒不解 不思飲食

縮砂人 去皮殼 甘艸 四兩 香附子 炒去毛 三十二兩

右為細末 每服一錢 用塩湯點下 或剉為麩末 入生姜同煎 各小降氣湯

活血湯 同治死血痛 併治血結痛方 漏尾 赤芍 桃人皮 牡丹皮 胸心腹痛 心腹脹滿及鼓脹 百六十六

玄胡索 烏藥 香附 枳殼
去穢各一錢 紅花 官桂 木香 別
各五分 川芎 七分 甘艸 二分

右剉一劑，姜一片，水煎服。

厚朴煮散 聖 治冒風冷氣，攻心腹滿

疼痛，飲食不消，四肢羸瘦，宜此湯。

厚朴 去穢浸星姜汁 訶黎勒 煨去核各兩半 木

香 蒼朮 米泔漬一兩切 枳殼 去殼炒 當

歸 焙切 陳橘皮 湯浸去白焙各二兩

右八味，搗羅為散，每服三錢匕，水

一盞，棗一枚，去核煎，至七分溫服，

不拘時。

枳殼煮散 本 治裴衰煩惱，傷肝氣，至

兩脇骨痛，筋脈緊急，腰脚重滯，兩

股筋急，兩脇牽痛，四肢不能舉，漸

至脊脊掣急，此藥大治脇痛方。

枳殼 去穢 蘇 去穢 細辛 去葉 桔梗 炒 防

風 去殼 川芎 各兩 葛根 半兩 甘艸 半兩 炙

右鹿末，每服四錢，水一盞半，姜三

片，煎至七分，去滓，空心食前溫服。

● 腹內諸氣及脹不可食

昆布散 外 療腹內諸氣脹滿方。

昆布 海藻 人參 玄參

橘皮 升麻 各一兩 芎藭 桂心

乾姜 各一兩 小麥 一升半 酢 一升半 漬

右十味，搗篩為散，別搗小麥作散，

合藥散一處，更搗千杵，酒服方寸

匕，日三服，漸加至二匕，不利，忌熱

麪、炙肉、生葱、蒜、粘食等物。

又療冷氣，薏苡人飯粥方 同

細伐薏苡仁，炊為飲，氣味欲勻，

如麥飯煮粥亦好，豉漿粥並任意，

無所忌。

又療氣蘓子粥方 同

蘓子不限多少，研如麻子，作粥，

依食法，著葱豉姜並得無所忌。

換椰湯 同 療心頭冷結痛，下氣方。

換椰 十 生薑 青木香 各 橘皮

枳實 炙 甘草 炙 大黃 各

右七味，切，以水六升，煮取二升半，

胸心腹病，腹內諸氣及脹不下食 百六十七

去滓分溫三服，各別如人行四五里，進一服，取微利，忌生菜、熱麪、炙肉、海藻、菘菜等。

生姜湯十溫中下氣方

生姜一甘草三桂心四

右三味，咬咀，以水六升，煮取一升，半一服，五合，日三服。

甘草湯同治虛羸慳氣，欲絕方

甘草 五味子 生姜各人參

一吳茱萸一

右五味，咬咀，以水四升，煮，茱萸令小沸，去滓，內藥，煮取一升六合，分

二服，各數劑佳。

下氣治氣滿腹脹方同

半夏一生姜一人參一橘皮三

右四味，咬咀，以水七升，煮取三升，去滓，分三服，日三，一方無人參，止

三味。

治讀誦勞極，疲乏困頓方同

人參 甘草 茯苓 當歸各

地骨皮 芎藭 芍藥 乾地

黃黃耆大棗三十

右十味，咬咀，以水一斗，煮取三升，

分三服，一方用桂心三兩。

治乏氣方同

生姜 枸杞葉各

右二味，咬咀，以水三升，煮取一升，頓服。

●胸脇肋痛及滿悶

半夏湯外療胸脇不利，腹中脹氣妨

悶，主之方。

半夏一生姜一桂心六枳實一

右四味，細切，以水八升，煮取二升

四合，絞去滓，分溫五服，各別相去

如人行六七里，進一服，快利為度。

忌羊肉、鰻、生葱、油膩。小品有吳茱萸三十顆，無

枳實

半夏湯十治胸滿有氣，心腹中冷方

半夏一桂心四生姜八

右三味，咬咀，以水七升，煮取二升。

胸心腹病 胸脇肋痛及滿悶

一服七合，日三服。

當歸湯同療冷氣脇下往來，胸膈痛

引脇悶方。

當歸 芍藥 吳茱萸 桂心

人參 大黃 甘艸各三分 茯苓

枳實各三分 乾姜三分

右十味，細切，以水八升，煮取二升

半，一服八合，日三服，治尸疰亦佳。

忌海藻、菘菜、生葱、酢物等。

枳實湯下氣，治胸中滿悶方。

枳實三枚 附子二枚 大棗五枚 半夏五

人參 甘草 白朮 乾姜

厚朴各一分

右九味，咬咀，以水七升，煮取二升

半，每服八合，日三

人參湯同安食下氣，理胸膈，并治客

熱。

人參 麥門冬 乾姜 當歸

茯苓 甘草 五味子 黃耆

芍藥 枳實各三分 桂心三分 半夏一分

大棗五枚

右十三味，咬咀，以水九升，煮取三

升，去滓，每服九合，從旦至晡，令盡，

皆熱服，慎勿冷。

大黃附子湯外療脇下偏痛發熱，其

脈緊急，此寒也，當以溫藥下之方。

大黃三兩 附子三枚 細辛二

右三味，切，以水五升，煮取二升，分

三服，若強盛人，煮取三升半，分為

三服，勿別如人行四五里久，進一

服，忌猪肉、冷水、生菜等。

柴胡湯同療胸膈塞，心背撮痛，走注

氣悶，宜此方。

柴胡六分 當歸六分 青木香六分 犀角

屑 枳實十分 甘艸三分

右六味，切，以水七升，煮取二升半

絞去滓，內射香末，分溫三服，如人

行四五里，微利為度，忌海藻、菘菜、

熟麩、蒼麥、猪肉、魚、蒜。

柴胡湯同療胸膈間，伏氣不可食，疴

胸心腹病，胸脇助痛及滿悶。

下滿方

柴胡^三枳實^三生姜^三白朮^三
甘草^炙栝榔^七

右六味切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服夕別如人行六七里進一服小弱人微利禁生冷蒜腥海藻菘菜桃李雀肉等

竹葉湯^干治五心熱手足煩疼口乾唇燥胸中熱方

竹葉 小麥^{各一}知母 石羔^{各二}
茯苓 黃芩 麥門冬^{各二}人參^三
半生薑^五栝蕒根 半夏 甘草^{各一}

右十二味以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮取三升分三服老少分五服

半夏湯^同治胸中客熱心中煩滿氣上大小便難方

半夏^一生薑^八前胡^四茯苓^{各二}
白朮^壹甘草^一黃芩 人參^{各三}

杏仁 枳實^{各三}

右十味以水九升煮取三升分三服胸中大熱者沉冷服之大小便澀加大黃二兩^{一方用梔子仁二兩為十一味}
承氣湯^同治氣結胸中熱在胃脘飲食嘔逆渴方

前胡 枳實 桂心 大黃
知母 寒水石 甘草^{各一}硝石
栝蕒根 石羔^{各二}

右十味以水一斗取三升分三服

寒疝

二物大烏頭煎外寒疝遠臍苦痛若發則自汗出手足厥寒若脈沉弦者主之方

大烏頭^五白蜜^二

右藥以水三升煮烏頭取二升去烏頭內蜜煎令水氣盡得二升強人服七合弱人五合一服不差明日更服日止一服不可再也忌猪

胸心腹痛 寒疝

肉冷水千金

烏頭桂枝湯同 寒疝腹滿逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥所不能治者抵當主之方

秋烏頭實大者十枚 白蜜二斤 桂心四兩

右三味先以蜜微火煎烏頭減半去烏頭別一處以水二升半煮桂取一升去滓以桂汁和煎蜜合煎之得一升許初服二合不知更服至三合又不復知更加至五合其知如醉狀得吐者為中病也忌猪肉冷水生葱等桂枝湯方見傷寒取頭蜜令得一升 餘並同前法服

柴胡桂枝湯同 療寒疝腹中痛者方

柴胡四兩 大棗六枚 黃芩半兩 人參半兩 甘草二兩 半夏半升 桂心 生姜各二兩 芍藥半兩

右九味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服又云人參湯作如桂枝法加半夏柴胡黃芩如柴

胡法今著人參作半劑忌海藻菘菜羊肉錫生葱

桂心湯同 療寒疝氣來往衝心腹痛主之方

桂心四兩 生姜三兩 吳茱萸二兩

右三味切以酒一大升煎至三合去滓分溫如人行六七里一服忌生葱

解急蜀椒湯同 療寒疝氣心痛如刺

繞臍腹中盡痛自汗出欲絕方
蜀椒二百枚 附子一枚 粳米半升 乾姜半兩 半夏半升 大棗二十枚 甘草二兩

右七味切以水七升煮取三升澄清熱服一升不差更服一升數用療心腹痛因急欲死解結逐寒上

下痛良忌猪羊肉錫海藻菘菜肘 古今錄驗范汪方無甘草餘同經心錄同

桃人湯同 療疝氣方

桃人尖 吳茱萸 橘皮 海藻
三 生姜 茯苓 羌活 蒺藜
胸心腹病 寒疝 百七十二

子去角
各三兩
右八味切以水三大升煮取九合
分為三服空心服忌醋物
神効湯回治一切疝氣

木香研另 吳茱萸分七 砂仁分七 甘草
三 茴香炒酒 玄胡索 益智仁
蒼朮浸 香附子 當歸 山
梔炒各 川烏炮去皮

右剉一劑姜三片燈心一團水煎
磨木香調和如脹悶痛者加乳香
枳實○有瘀血脹痛加桃人川芎
去益智山梔○腎氣注上心痛悶
欲絕者加沉香枳實去益智山梔
人

咳嗽

●咳嗽

紫苑七味湯外療欬嗽

紫苑半 五味子一 桂心二 麻黃
四兩 杏仁七 乾姜四 甘草
去節尖而人碎 炙二兩

右藥切以水九升煎取二升半去
滓溫服七合日三服忌海菜菘菜
生葱蒜麪腥膩經心錄古
紫苑飲同 主咳嗽方

紫苑 貝母 茯苓 杏仁尖而
人 生姜各三 人參二 橘皮一兩
者生 右七味切以水五升煮取一升五

合去滓分溫三服如人行七里更
進一服忌蔥蒜麪酢
生姜五味子湯同 療欬方

五味子五 生姜八 紫苑一 半夏
高 吳茱萸一 欬冬花 細辛一
洗高 附子一枚 茯苓四 甘草二 桂心一

右十一味切以水一斗煮取五升
咳嗽 咳散 百七十二

分温三服，老人可服五合，忌海菜、菘菜、猪肉、冷水、羊肉、饑生菜、酢物、生葱。

紫苑飲 同主效方

紫苑兩 貝母二兩 人參一兩 橘皮半兩
生薑一兩 杏仁二兩 西人者碎

右六味切以二升五合，煮取八合，分三服，欲再服亦得，慎鹹醋蒜芡。古今錄驗百部湯同療，效昼夜不得眠，兩眼突出方。

百部半兩 生薑半兩 細辛三兩 貝母三兩

甘草兩 杏仁四兩 紫苑三兩 桂兩

心二兩 白朮二兩 麻黃六兩 五味子二兩

右十一味切以水一斗二升，煮取三升，分三服，忌桃李、雀肉、海藻、菘菜、生菜。

五味子湯 同療咳方

麻黃四兩 五味子五兩 甘草兩 半

夏兩 乾姜五兩 細辛二兩 桂心六兩 杏兩 人三兩 西人者

右八味以水一斗，煮取四升，去滓分温五服，日三夜二。

十枣湯 同效。家其人脈弦，為有水，可與此湯下之，不能臥坐者，陰不受邪故也。●又夫有支飲家，欬煩胸中痛者，不卒死，至一百日一歲，與此湯。●又效而引脇下痛者，亦此湯主之。方見傷寒

九寶湯 同效。經年喘嗽通用，常服屢効方。

麻黃去節 橘紅 腦荷各一兩 紫蘆

桑白皮炒 杏仁去皮 大腹子連皮

甘草炙

右細剉，每服三錢，姜五片，烏梅一箇，水煎，食後臨臥服，或入童子小便，半盞同煎尤妙。

小青龍湯 外又軟逆倚息，不得臥主之方。方見傷寒

茯苓 桂心 甘草 五味子 等湯 外青竜下已多唾口燥寸脈沉而尺脈微

咳嗽 咳嗽

手足厥逆氣從少腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者可與此湯治其氣衝方

茯苓四兩桂心一兩甘草三兩五味子半升

右四味切以水八升煮取三升去滓溫服以千金按之亦脫此友今於仲景方後附

衝氣則抵而反更效胸滿者與茯苓

甘草五味子去桂心加乾姜細辛以治其效滿

●軟滿即止而復更渴衝氣復發者以細辛乾姜為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲法當冒冒者必嘔

者復半夏以去其水方

茯苓四兩甘草三兩乾姜三兩細辛三兩五味子半升

右六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜羊肉鰾酢等物

水去嘔則止其人形腫可內麻黃以

其人遂瘕故不內麻黃乃內杏仁也若逆而內麻黃者其人必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽

故也方同

茯苓四兩乾姜三兩細辛三兩五味子半升杏仁半升去皮

右七味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜生菜羊肉鰾酢等

若面熱如醉狀者此為胃中熱上衝

薰其面令熱大黃下利之方

細辛 甘草炙 乾姜三兩 茯苓四兩 五味子 半夏洗 杏仁去皮 大黃三兩

右八味切以水一斗煮取二升去滓溫服一升日三服忌海藻菘菜

生菜錫醋羊肉

●卒咳嗽

麥藁 卒咳嗽

麻黃湯外療卒咳逆上氣肩息晝夜不止欲絕方

麻黃去節 細辛各三分 甘草半兩 桃人二十枚去皮尖及兩仁者研一本作杏仁

杏人飲外療暴熱效方

杏人四十枚去皮 柴胡四兩 紫蘓一斤 橘皮一斤

右四味切以水一斗煮取三升分三服常服飲之不妨本方無蘓子有乾姜

乾姜湯同療冷欬逆氣方

乾姜四兩 紫苑一斤 杏人七十枚去皮尖及人切 麻黃去節 桂心 甘草各二兩 五味子一斤

右七味切以水八升煮取二升七分三服平体人如射干一兩代乾姜忌海藻菘菜生葱等

芫花煎同療冷飲咳方

芫花二兩 乾姜二兩 白蜜二升

右三味搗篩二味內蜜中攪令相和微火煎令如糜服如棗核一枚日三夜一欲痢者多服千金新

千金療冷欬方同

乾姜三兩 膠飴一斤

右二味攪令和調蒸五升米下令熟以東大含化稍夕嚥之日五夜三

久欬

麻黃湯外療人三十年寒冷效逆上氣方

麻黃去節 蜀椒四分 細辛三分 藁本二分 杏仁五十枚去皮尖兩入者碎

右五味切以水七升煮取三升分為三服日三忌生菜

集驗療久患氣嗽發時奔喘坐臥不得無喉裏呀聲氣欲絕方

麻黃去節 杏仁去皮尖兩入者碎 紫苑各三兩 柴胡 橘皮各兩

咳欬暴熱效及冷欬久欬

右五味切，以水六升，煮取二升半，去滓，分三服，一劑不差，頓兩三劑，從來用甚驗。

●效嗽短氣

肉蓯蓉湯，外療傷中，效嗽短氣，腸中痛，流飲厥逆，宿食不消化，寒熱邪癖，五內不調，方。

大棗三枚 烏頭一兩 桂心 甘草炙 肉蓯蓉五兩 乾地黄四兩 紫苑各二兩 五味子各二兩 生姜 石羔裹 麥門冬去心

右十一味，切，以水一斗五升，煮取七升，去滓，分為七服，日四夜三，一方用大棗五十枚，水一斗二升，煮取九升，忌海藻、生葱、菘菜、蕪荑、豬肉、冷水。

貝母飲，同療上氣，咽喉窒塞，短氣，不得臥，倚壁而息，腰背苦痛，支脇滿，不能食，面色痿黃，方。

貝母 石羔綿裹 桂心 麻黃

去甘草各二兩 杏仁三十枚去尖 生薑五兩半夏五兩

右八味，切，以水一斗，煮取三升，去滓，分三服，忌海藻、菘菜、羊肉、生葱、錫等。

海藻湯，同療欬而下利，胸中痞而短氣，心中時悸，四肢不欲動，手足煩，不欲食，肩背痛，時惡寒，方。

海藻四兩 茯苓六兩 半夏五合 五味子五合 細辛二兩 杏仁五十枚去尖

右六味，切，以水一斗，煮取三升，分三服，忌羊肉、錫、生葱、醋物。

五味子湯，同療逆氣，欬嗽，胸膈中寒，熱短氣，不足，方。

五味子一兩 前胡三兩 紫苑 甘州炙 桂心 生姜各二兩 大棗三枚 山茱萸三兩

右八味，切，以水一斗，煮取七升，絞去滓，服一升，日三夜二，忌生葱、海藻、菘菜。

效嗽 咳逆及飲逆

瀉肺湯同療欬逆方。

人參三分 生姜四分 半夏五分 甘草五分
橘皮十二分 竹葉二分

右六味切以水六升煮取二升分
三服此方亦療霍亂忌羊肉餒海
藻菘菜

姜椒湯同療欬嗽及短氣脇痛方

生姜 椒去目汗

右二味切以水五升煮取三升每
服一合

● 啞逆及厥逆飲逆

五味子湯外療欬嗽短氣不得息發
熱胸苦滿不得飲食方

五味子二兩 桂心 甘草炙 細辛
乾姜三兩 紫苑二兩 大棗二十枚
麻黃二兩 去節

右八味切以水八升煮取三升分
三服無乾姜生姜亦得忌海藻菘

菜生菜生葱
千金竹皮湯同主欬逆下血不息方

生竹皮三兩 紫苑二兩 飴糖斤 生地
黃升

右四味切以水六升煮取三升分
三服忌蕪荑

麥門冬湯同療大逆上氣喉咽不利
止逆下氣方

麥門冬二升 半夏一升 人參
甘草各二兩 粳米三合 大棗十四枚

右六味切以水一斗二升煮取六
升服半升日三夜一忌羊肉餒海
藻菘菜

遊氣湯方同療厥逆藏氣有餘寒氣

虛勞憂氣驚氣其人喜悸胸中或
寒上下無常多悲傷流四肢臍四
逆常有枳遊腫大便不利

厚朴四兩 人參 甘草炙 牡蠣各二兩
茯苓四兩 桂心 半夏各兩 梔子
黃芩三兩 生姜八兩

右十味切以水九升煮取三升半
去滓分服七合日三夜二服若腹
欬嗽 啞逆及厥逆飲逆

痛去黃芩加芍藥三兩良驗忌海藻菘菜生葱羊肉錫醋物等

燕窩湯同療氣上迫滿或氣不通煩悶喘咳方

燕窩升一乾姜三半夏三桂心三

人參各橘皮各茯苓各甘草各

右八味切以水八升煮取三升半

分為三服若虛熱去乾姜用生姜

六兩加黃芩二兩忌海藻菘菜羊肉錫生葱醋物等

● 咳嗽膿血

雞子湯外療欬逆唾膿血方

雞子一枚甘草二分甘遂一分大黃一分

黃芩二分

右五味切以水六升煮取二升去

滓內雞子攪令調令飲之良忌海藻菘菜

瀉肺湯同療肺中膿欬唾血氣急不安臥方

川芎 麻黃去細辛 椒去口汁

當歸各一兩

右五味切以水七升煮取三升分為三服日三微汗或吐膿血忌生菜一方生姜有一兩

五味子湯干治唾中有膿血牽胸脇痛方

五味子 桔梗 紫苑 甘草

續斷各竹茹三赤小豆升一萊白

皮 地黃各

右九味以水九升煮取一升

七合分為三

● 欬嗽唾粘

甘草飲子外療肺熱欬嗽涕唾多粘

主之方

甘草各欬冬花七豉心一生麥

門冬八分葱白一握栝榔十顆合

桔梗六分地黃汁半升

右八味切以水六升煮取二升絞

去滓下地黃汁分溫三服如人行

四五里進一服不利忌生菜熟麩

咳嗽 咳嗽膿血咳嗽唾粘 百七十八

炙肉、海藻、菘菜、魚蒜、粘食、猪肉、蕪荳。

清肺湯 同治一切咳嗽、上焦疼盛或久嗽不止、或勞怯、或久嗽聲啞、或喉生瘡者、是火傷肺金、並宜此湯。

黃芩去朽心 桔梗去蘆 茯苓去皮 陳皮去白 貝母去心 桑白皮各 當歸

天門冬去心 山梔 杏仁去皮 麥

門冬去心 五味子各 甘草七分

右剉、生姜、枣子、水煎、食後服。

治十六般哮喘方、本事方

黃明膠二兩 馬兜鈴 甘草炙

半夏姜汁浸 杏仁去皮 人參各

右為末、每服一大盞、水一盞、隨病

有湯使、煎至七分、臨睡食後服、湯

使于後、**●**心嗽、面赤、或汗流、加干

葛煎服、**●**肝嗽、眼中泪出、入

烏梅一个、糯米三四粒、煎服、**●**脾

嗽、不思飲食、或一兩時惡心、入生

姜三片煎、**●**胃嗽、吐逆、吐酸水、入

蚌粉煎、**●**膽嗽、令人臨睡、用藥半

錢、茶清調下、**●**肺嗽、上喘氣急、入

桑白皮煎、**●**膈嗽、咳出痰、如口槐

生、姜自然汁、調藥嚥下、**●**勞嗽、入

秦朮末同煎、**●**冷嗽、天曉嗽甚、葱

白三寸同煎、**●**血嗽、連頓不往、當

歸末、枣子同煎、**●**暴嗽、淨唾稠、入

烏梅、生姜煎、**●**產嗽、背甲疼痛、甘

艸三寸同煎、**●**氣嗽、吐痛脹滿、入

青皮、去白同煎、**●**熱嗽、夜甚、蜜、二

匕、葱白同煎、**●**哮喘、聲如拽鋸、入

半夏二个、同煎、**●**腎嗽、時復三兩

聲、入黃芪、白飴、糖煎、**●**上件十六

般嗽疾、依法煎服、無不效驗、此方

乃都下一家、專貨此藥、治十餘口、

余日中官、厚賂錢物、方始傳得、屢

試、有驗。

人參飲子 得効方 治寒熱上壅咳嗽

痰涎方

咳嗽 咳嗽唾粘

人參 苦梗去 五味子 赤茯

苓去 白朮炒 枳殼炒 甘草各半

右劉散每服四錢水盞半姜五片煎至七分去滓溫服嗽多者加柴白皮一兩痰多者加半夏一兩寒暑之交氣盛人衣厚作壅忽痰盛微熱此藥最宜若作感冒發其汗攻其邪必成大病此方佳處在志茯苓能導心熱枳殼能疎肺壅故一方有半夏一兩又云寒壅者加杏人不去皮尖紫蘆各半兩

當歸散同 治男子因打損負重女子

目勞苦用力而傷肺經既損遇風寒則為咳嗽或咳血或至紫宜此藥去心肺間瘀血仍灸肺腧病即甦肺腧穴在三椎下

蘇木 生地黄 當歸 大黃

赤芍藥

右為末酒調服得利去瘀血即止服養榮湯調理

上氣

● 上氣

廣濟療上氣方外

葶藶子五合熬紫色 桑根白皮別搗如泥

右三味以水四升煮取一升絞去

滓內葶藶子泥如枣大煮之三分減一頓服以快利為度忌如藥方

必効療上氣方同

半夏洗 茯苓各 橘皮 白朮各二

右六味切以水一斗漬一宿煮取二升七合分三服更加甘草三人

參二 前胡二 紫蘆一 忌羊肉鰾桃李雀肉醋物

溫中湯同 療上氣方

甘草三 桂心四 生姜一

右三味切以水七升半煮取三升分五服忌生葱海藻菘菜

半夏蘧子湯同 療卒上氣胸心滿塞上氣

友

半夏五高 蕪子一升 生姜五兩 大棗四枚
橘皮 桂心各三兩 甘草二兩
右七味切以水七升煮取二升七分三服氣即下忌海藻菘菜羊肉錫生葱

竹篠下氣湯同療卒急上氣胸心滿
友

生甘竹篠一虎口 石羔一兩 生姜
橘皮各三兩 甘草三兩

右五味切以水七升煮竹篠取四升半去滓內諸藥煮取二升分二服此方療忽上氣不止者服兩劑差忌海藻菘菜

備急葛氏療卒上氣喘息便欲絕方同

桑根白皮切二升 生姜切半升 吳茱萸半升

右三味切以酒五升煮三沸去滓盡令服之入口則愈

又療卒上氣兮不復報肩息方同

乾姜三兩 咳阻

右一味以酒一斗漬服一升日三服又方同

麻黃三兩 桂心 甘草各一兩 杏仁如法

右四味切以水六升煮取二升分三服此二方名小投杯湯有氣疾者亦可為散將服之冷多加乾姜三兩淡唾者加半夏三兩忌海藻菘菜生葱

近効療久上氣兮急臥不得方同

紫菀葉二兩 生姜 麻黃去節 杏仁各三兩 赤茯苓 桑根白皮 葶藶子各二兩 橘皮一兩

右八味切以水八升先煮麻黃去沫下諸藥和煮取二升七分合絞去滓分三服每服如人行七八里久溫服之畢服後丸

●上氣欬身面腫滿方

崔氏療肺熱而欬上氣喘急不得坐上氣 欬身面腫滿

臥身面腫不下食消腫下氣止咳
立驗方外

葶藶子二分 貝母六分 杏仁一分
紫苑六分 茯苓 五味子各六分 人
參 桑白皮各八兩

右八味持篩蜜和丸如梧子一服
十九日二服其著夜一服漸々加
至二三十丸煮棗汁送之忌醋物

定喘湯名醫方考 ○肺金感寒氣逆膈熱
作喘喘者此方主之

白菓二十一枚 黃芩炒 杏仁去皮尖
桑白皮炒黃色 蘇子炒 甘草各一錢
黃去 半夏蜜炙 欬冬花各三錢 麻

右剉一劑水煎服○聲粗者為哮
外感有餘之疾也宜用表氣促者
為喘者肺虛不足之証也宜用裏
藥寒束於表陽氣不得泄越故上
逆氣併于膈為陽中之陽故令熱
是方也麻黃杏仁甘草辛甘散
之物也可以疏表而定喘自莫疑

冬花桑白皮清金保肺之物也可
以安裏而定於喘蘇子能降氣半
夏能散逆黃芩能去熱

●上氣喉中水雞鳴

厚朴麻黃湯千治欬而大逆上氣胸
滿喉中不利如水雞聲其脈浮者
方

厚朴五兩 麻黃四兩 石羔 細辛
乾姜各三兩 小麥一升 杏仁 半夏
五味子各半兩

右九味以水一斗二升先煮小麥
熟去滓內諸藥煮取三升溫服一
升日三服

投杯湯外療久逆上氣胸滿喉中如
水雞鳴方

小麥一升 麻黃四兩 厚朴五兩 石羔
如雞杏人合五

右五味以水一斗煮取小麥熟去
麥內蒸煮取三升分三服欬嗽甚
者加五味半夏洗各半升 乾姜三累 經
上氣 因食飲水上氣 百八十一

用甚良

又方同 欬逆上氣胸中塞不得息臥不安席牽繩而起咽中如水雞聲方

款冬花二十分 杏仁四十顆 甘草二兩

大棗二十顆 桂心二兩 麻黃四兩 生

姜半斤 半夏三兩 紫苑三兩 細辛各二兩

右十味切以水八升煮取二升頓服之一方分再服卧令汗出食粥

數口勿飽食神良忌海藻菘菜羊

肉錫生葱菜

麻黃湯同療上氣欬嗽喉中水雞鳴

唾膿血腥臭方

麻黃六兩 桂心一兩 甘草炙 杏仁各二兩 生薑八兩 一方

去皮尖 用乾姜

右五味切以水七升煮取三升半

分五服已用療欬唾膿血喉中腥

臭得力後長將丸服忌海藻菘菜

生葱

貝母湯同療欬逆喉中如水雞聲方

貝母各 甘草二兩 麻黃去節 桂心各 半夏洗 乾姜各 杏仁七十枚

右七味切以水二斗三升先煮麻

黃得十沸內藥煮取三升溫服七

合日三忌海藻菘菜生葱羊肉餒

射干麻黃湯同療欬而上氣咽中如

水雞聲方

射干五枚 麻黃去節 生薑各 紫苑三兩

款冬花三兩 細辛三兩 五味子半斤

夏八枚 大棗七枚

右九味切以東流水一斗二升煮

取三升分三服忌羊肉錫生菜

沃雪湯同療上氣不得息臥喉中如

水雞聲氣欲絕方

麻黃四兩 細辛二兩 五味子半斤 桂

心各 乾姜各 半夏各 一方四兩

右六味切以水一斗煮取三升絞

去滓通寒溫服一升投杯則臥一

名投杯麻黃湯令人汗出不得臥

勿怪亦可從五合不知稍增日再

上氣 喉中水雞鳴

百八十三

凡煮麻黃先煎二沸上沫又內餘藥忌生葱生菜羊肉鰓

麻黃湯同療上氣脈浮欬逆咽喉中水雞鳴喘息不通呼吸欲絕方

麻黃八兩射干二兩甘草四兩大棗三十顆

右四味切以水一斗先煮麻黃三沸去上沫內諸藥煮取三升分三服已用甚良忌海藻菘菜等

●因食飲水上氣

三味備急散外本療卒死感忤宮泰以療人卒上氣呼吸氣不得下喘逆差已為常用方

巴豆 大黃 乾姜

右藥等分巴豆小熬去心皮合搗下篩服半錢匕得吐下則愈忌野猪肉蘆筍

療大走馬奔走喘乏便飲冷水冷飲

因得上氣發熱方

竹葉三兩橘皮三兩

右二味以水一斗半煮取三升去滓分為三服三日服一劑良集驗

用竹葉三兩

●短氣

千金療卒短氣方外

生姜五兩小麥一升

右二味以水三升煮取一升頓服之

治讀誦勞極疲乏困頓方十

人參 甘草 茯苓 當歸各三兩

地骨皮 芎藭 芍藥 乾地

黃耆各三兩大棗三十枚

右十味咬咀以水九升煮取一升

七合分為三

●上氣及氣逆不得臥

補肺溢湯外療肺氣不足欬嗽上氣牽繩而坐吐沫唾血不能食飲方

蕪子一升白皮五兩半夏六兩紫

苑 人參 甘草炙麻黃去節五

味子 乾姜 杏仁去皮尖細辛

桂心三兩欬冬花射干一兩

上氣 因食飲水上氣短氣 百公四

右十四味切以水一斗二升煮取三升分日三夜再忌海藻菘菜羊肉鰾生葱生菜

●效嗽上氣
蕪子湯外療上氣兼效方

蕪子升一 五味子合五 麻黃節去 細辛
紫苑 黃芩 甘草炙各 人参
桂心 當歸各 半夏三兩 生姜五
右十二味切以水九升煮取三升分二服上氣病亦特單煮蕪子及生蕪葉冬天煮乾枝莖葉亦佳忌海藻菘菜羊肉鰾生葱生菜

厚朴湯同療上氣煩悶煩逆不得飲食

厚朴炙 人参一 半夏洗 生姜八
茯苓 甘草炙 橘皮 桂心各
枳實二

右九味切以水八升煮取三升分為三服忌海藻菘菜羊肉鰾生葱醋物

療上氣咳嗽逆不下食上氣方

橘皮 紫苑各三 人参 茯苓
柴胡 杏仁去皮

右六味切以水六升煮取二升分為三服患冷加生姜二兩患熱麥門冬三兩去心不能食加白朮二兩厚朴二兩炙忌醋物桃李雀肉等

●肺痿

甘草乾姜湯外療肺痿吐涎唾不效者其人不可過心遺溺小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺冷必眩主之以溫其臟方

甘草四兩 乾姜二
右二味切以水三升煮取一升半分溫二服夕湯已小溫覆之若渴者屬消渴忌海藻菘菜

炙甘草湯同療肺痿涎唾多心中溫方見 液々者主之傷寒

療肺痿欬嗽吐涎沫心中溫々咽燥上氣 咳嗽上氣肺痿

而渴者友一云不渴

生天門冬一升 搗取汁 酒升 飴糖一

紫苑末四

右四味合銅器中於湯上煎可丸服如杏人一丸日三忌鯉魚

又療肺痿欬嗽涎沫心中温々咽燥

而渴友一云不渴

生姜五 甘草五 大棗五枚

右四味切以水五升煮取一升半

分再服忌海藻菘菜

又療肺痿時々寒熱兩頰赤氣急友同

童子小便每日晚取之去初末

少許小便可有五合取上好甘草

量病人中指節男左女右長短截

之灸令熟破作四片內小便中置

於開淨處露一宿器上橫一小刀

明日平旦去甘草頓服之每日一

劑其童子勿令喫五辛忌海藻菘

菜熟麩

半夏肺痿湯同療虛寒喘鳴多飲逆

氣嘔吐方

半夏一升 易洗 母姜一 橘皮一 白朮一

桂心四

右五味切以水九升煮取三升去

滓分温三服忌羊肉鰻桃李雀肉

生葱

乾地黄煎同 凡虛寒肺痿喘氣主之方

乾地黄五 桑根白皮切二 芎藭五

桂心五 人參各二 大麻人一升

右六味切以水九升先煮五味取

三升去滓內大麻人煎數沸分三

服忌生葱蕪荑

甘草湯同療痿涎唾多出心中温々

液々方

甘草二

右一味切以水三升煮取一升半

分温三服忌海藻菘菜

桂枝去芍藥加皂莢湯方同療肺痿

吐涎沫方

桂枝三 甘草二 大皂莢一

上氣 肺痿

生姜三 大東十二枚

右五味切以水七升微火煮取三升分三服忌生葱海藻菘菜

黃昏湯同療效有微熱煩滿胸心甲錯是為肺癰

黃昏手掌大一枚即合歡木皮

右一味切以水三升煮得一升分再服

葶塵大東瀉肺湯同肺癰喘不得臥

兼療胸脇脹滿一身面目浮腫鼻塞清淨出不開香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞方

葶塵三枚令色紫

右一味搗令可丸以水三升煮擘大東二十枚得汁二升內藥如彈丸一枚煎取一升頓服

療肺癰方同

薏苡仁一升醇苦酒

右二味煮取一升溫令頓服有膿血當吐

人參養榮湯聖治咳嗽有痰午後熱

并聲嘶者方

人參去芦阿膠蛤粉炒貝母 杏仁

桔梗 茯苓 桑根白皮 枳實

甘草各一分柴胡二分五味子一分

右十一味水二升生薑三片棗二枚煎至一鍾食遠服

秦朮扶羸湯同治肺痿骨蒸已成勞

咳或寒或熱聲嘶不出體虛汗四肢怠惰方

軟柴胡二分人參 鼈甲醋炙秦朮

當歸 紫苑 半夏各一分地骨皮

甘草五分

右九味用水二鐘姜三片烏梅大東各一枚煎七分食後如熱甚者加青蒿汗多者加黃耆去半夏生薑二味

知母茯苓湯同治肺痿欬喘往行寒

熱自汗方

知母 白朮各八分茯苓去皮五味

上氣 肺痿

子 人參 阿膠各五分 欵冬 花
桔梗 麥門冬 黃芩各七分 半
夏 柴胡 甘草各五分 薄荷
川芎各五分

右十五味水二鍾姜五片煎至一
鍾食後服

●肺癰

桔梗白散外效胸中滿而振寒脈數
咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐
膿如粳米粥者肺癰也主之

桔梗三分 貝母三分 巴豆一分去皮心
熬研作脂

右三味搗篩強人飲服半錢匕羸
人減之若病在膈上者必吐膈下
者必利若利不止者飲冷水一杯
則定忌猪肉蘆笋等

桔梗湯同療胸中滿而振寒脈數咽
燥而不渴時々出濁唾腥臭久久
吐膿如米粥是為肺癰方

桔梗二兩千金古 甘草二
今用一兩

右二味切以水三升煮取一升分

再服朝暮吐膿血則差

葦莖湯同療肺癰

劉葦一升 薏苡人半升 桃人五十枚去
者瓜瓣半

右四味以水一斗先煮葦令
得五升去滓悉內諸藥煮取二升
分再服當吐如膿仲景傷寒云葦
莖切二升千金
范汪同千金云葦莖二
升先以水二斗煮五升

瀉白散準治肺癰

桑白皮炒二 地骨皮 甘草炙
貝母去心 紫苑 桔梗炒 當歸酒
各半 瓜蒌仁一

作一劑水壹鍾姜三片煎八分食

遠服

人參五味湯正宗 治氣血勞傷咳膿
或咯血寒熱往來夜出盜汗羸瘦
困乏一切虛損之症並効

人參 五味子 前胡 白朮

桔梗 當歸 茯苓 熟地

甘州各一 黃芪 地骨皮 桑白

上氣 肺癰

皮 枳殼 柴胡各二分

水二鍾，葶三片煎八分，食後服。

白扁豆散 本事方 治久咳咯血成肺

痿多吐白沫胸膈滿悶不食主之。

白扁豆飯上蒸 生姜各半 枇杷葉

去毛半 夏湯浸七次 人參去芦 白朮一分 白

茅根三分

右細剉水三升煎至一升去滓下

枳殼末一錢和勻分四服不拘時

候。

五臟勞

肝

前胡湯千 治肝實熱目痛胸滿氣急

塞瀉肝方

前胡 芒硝 秦皮 梔子仁

決明子 黃芩 升麻 糞仁

細辛各三分 苦竹葉 車前葉各切

右十一味，以咀，以水九升，煮取三

升，去滓下芒硝，分三服，又一方有

柴胡三兩，共十二味。

防風散同 治肝實熱憂怒虛驚方。

防風 茯苓 姜蕤 白朮

橘皮 丹參各二 細辛二 甘草

射干各 升麻 黃芩各一 大棗

右十三味，治下篩，為粗散，以兩方

寸匕，帛裹，以井花水二升，煮時々

動上褰子，煎取一升，分服日二。

遠志散同 治肝邪熱出言反常乍寬

乍急主之方。

五藏勞 肝

遠志 射干 杏仁 大青 各二兩
茯神 麥門冬 葛根 甘草
各二兩 芍藥 兩 桂心 三分 知母 升麻 各二兩
石羔 二兩

右十三味治下篩為散以水二升五合煮竹葉一升取汁內藥一匕半煎取八合為一服日一以綿裹散煮之

瀉肝湯 同 療肝氣實目赤若黃脇下急小便難方

人參 甘草 各三兩 生姜 五兩 黃芩 二兩
半夏 半升 大棗 十四枚

右六味切以水五升煮半夏三四沸內藥最後內姜煎取二升去滓分為二服羸人三服忌海藻菘菜羊肉錫

前胡瀉肝除熱湯 同 療肝勞虛熱兩目為赤閉塞不開煩悶宛轉熱氣胸裏炎々主之方
前胡 乾姜 大青 細辛

秦皮 決明子 梔子人 黃芩 各二兩 淡竹葉 切 車前子 切 石羔 八兩碎
綿裹

右十一味切以水一斗煮取三升去滓平旦分為三服須利加芫硝三兩忌生菜

柴胡下熱湯 同 療肝勞熱悶關格不通精神不守氣逆上胸熱炎々不止主之
柴胡 黃芩 澤瀉 升麻

芫硝 各三兩 玄參 六兩 淡竹葉 切 生地 黃 乾姜 二兩

右九味切以水九升煮取三升去滓下芫硝平旦分三服忌葷黃補肝湯 千 治肝氣不足兩脇下滿筋

急不息大息四肢厥冷痰搶心腹痛目不明了及婦人心痛乳癰膝熱消渴爪甲枯口面青者方

山茱萸 翼作 烏頭 甘草 桂心 各三兩 人 參 翼作 柏子仁 細辛 茯苓 五藏勞 肝 百九十

防風 全二十 大棗 四枚

右九味，咬咀，以水九升，煮取五升，去滓，分三服。

栝柳湯 干 治肝虛寒，脇下痛，脹滿，氣急，目昏濁，視物不明方。

栝柳 二十枚 附子 七枚 母姜 七兩 茯苓

橘皮 四枚 桂心 各三兩 桔梗 三兩 白木 各四兩

吳茱萸 五兩

右九味，咬咀，以水九升，煮取三升，去滓，溫服，每服一升，若氣喘者，加

芎藭三兩，半夏四兩，甘草二兩。

釣藤散 準 治肝厥，頭暈，清頭目方。

釣藤 陳皮 半夏 麥門冬

茯苓 茯神 各半兩 石羔 人參

甘菊花 防風 各一分 甘草 一分

右為庵末，每服四錢，水一鐘半，姜七片，煎八分，溫服。

抑肝散 直 治肝經虛熱，痰搐，或發熱

咬牙，或驚悸寒熱，成嘔吐，痰涎腹脹，少食，睡臥不安者。

當歸 白朮 茯苓 釣藤 各

川芎 八分 甘草 五分

水煎，母子俱服。

筋極

黃耆湯 外 療筋實極，則好怒，口乾燥

好嘔，身躁不定，調筋止怒，定氣方。

芎藭 白朮 無刺者 通草

芍藥 各 甘草 炙 桂心 各 大棗 擘

石羔 八兩 碎 竹葉 切

右十味，切，以水九升，煮取三升，去

滓，分為三服，忌海藻、菘菜、生葱、桃

李、雀肉。

橘皮通氣湯 同 療筋實極，則效，方則

兩脇下縮痛，方甚，則不可動轉方。

橘皮 四兩 白朮 石羔 碎綿裹 桂

心 細辛 當歸 茯苓 各 香

豉 一升 熬 別裹

右八味，切，以水九升，煮取三升，去

滓，分為三服，忌桃李、雀肉、生葱、生

菜、醋物，千金同。

五藏勞 筋極

地黄煎同療筋實極則手足爪甲或青或黃或黑烏點四肢筋急煩滿友

生地黄汁三升生葛汁一升生玄參一升汁一升大黃二升梔子人麻黃去犀角屑各三兩石羔五兩芍藥四兩

右十一味切以水七升煮取二升去滓下地黄汁一兩沸次下葛汁等煎取三分分為三服日再忌蕪黃刪繁用右同

牛膝湯同療筋虛極傷風為風所傷入筋縮棗腰背不伸強直苦痛或為脚氣友

牛膝 防風 甘李根皮 丹參 前胡各五兩石斛五兩杜仲 秦艽 續斷 蠶甲各三兩陳橘皮二兩大麻人二升熬汗

右十二味切以水一斗四升煮取五升去滓下麻人更煎取二升分三服忌苜蓿菜

人參湯同療筋虛實暴損絕極或因霍亂轉筋腹滿痛或因服藥吐利過度脚手虛轉胞轉痛友

人參 厚朴各二兩葱白一虎口白朮四兩蓼一把長三升

右五味切以水五升煮取二升去滓分再服忌桃李雀肉等

又療胞轉筋急方同
白朮 通草各二兩梔子人 子芩 茯苓各四兩榆白皮三兩香豉一升熬

右七味切以水七升煮取三升去滓分三服忌酢物桃李雀肉等一方無香豉

● 膽腑虛實
半夏湯治胆腑實熱精神不守瀉熱友
半夏 宿姜各二兩黃芩一兩生地黄五兩遠志 茯苓各二兩秫米一斗酸棗仁五合

右八味咬咀以千里長流水五斗

煮秫米令蟹目漚揚一千餘遍澄
清取九升煮藥取三升半分三服
集驗方治虛煩悶不得眠無地黃
遠志有麥門冬桂心各三兩甘中
人參各二兩

梔子煎同療胆腑實熱精神不守瀉
熱方

梔子廿一枚 甘竹箇 香豉六合 熬
大青 橘皮去膜 赤蜜各三合

右六味細切以水六升煮取一升
七合去滓下蜜更微火上煎兩三
沸分再服

溫膽湯十治大病後虛煩不得眠此
胆寒故也宜服此方

半夏 竹筴 枳實各二兩 橘皮三兩
生姜四兩 甘草一兩

右六味以水八升煮取二升
分三服

柴胡散泄湯同治隨實勇悍驚熱主
之方

柴胡 升麻 黃芩 細辛

枳實 梔子仁 芒硝三兩 淡竹
葉 生地黃升澤瀉

右十味以水九升煮取三升
去滓下硝分三服

半夏湯聖治胆熱精神不守昏困多
睡主之方

半夏湯浸七遍去 生地黃五兩 遠志
赤茯苓去黑皮 黃芩去黑心 酸棗
仁生用一兩半

右六味剉如麻豆每服先以長流
水三盞入秫米半合煎取一盞半
去米揚之千遍入棗五錢匕煎取
八分去滓溫服

麥門冬湯同治榮衛氣波精神不爽
胆熱多睡頭目昏塞方

麥門冬去心 天門冬去心 羚羊
角鎊各三兩 木通剉 前胡去芦 大黃
別炒各四錢 半夏湯洗七遍 甘草炙
防風去叉各半兩

右九味鹿持節每服三錢匕以水
五藏勞 胆府髓虛實

蓋入生姜五片煎至六分去滓溫服食後

黃連湯同治胆熱口苦神昏多睡方

黃連去心 黃芩去黑心 赤茯苓去黑皮 麥門冬去心 升麻各一分

右五味鹿搏篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓放溫食後服

枸杞湯同治肝氣攻注偏身筋脈抽掣疼痛四肢無力方

枸杞子 海桐皮 剉苦參 白芷 防風去 甘草炙 麻黃去節 沐牛膝切酒浸一宿 桂皮去麩 酸棗焙各二兩 人各半

右一十味鹿搏篩每服三錢匕水一盞入生姜二片同煎七分去滓溫服不拘時候

石膏湯治心熱實或欲吐々而不 出煩悶喘急頭痛方

石羔一升 淡竹葉 香豉各一升 小麥三升 地骨皮五兩 茯苓三兩 梔子仁三升

右七味以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清次下諸藥煮取二升去滓分三服外臺名

瀉心湯同治老小下利水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安方見

傷寒并治霍亂若寒加附子一枚渴加括樓根二兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一兩客熱以生姜代乾姜

竹瀝湯同治心實熱驚夢喜笑恐畏怖懼不安方

淡竹瀝 生地黄汁各八升 石羔八兩 芍藥 白朮 人參 梔子仁 赤石脂 紫苑 知母 茯苓

右十一味以水九升煮十味取二升七合去滓下竹瀝更煎取

三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

茯神散同 治心實熱口乾煩渴眠臥不安方

茯神 麥門冬各三十 通草六銖 升麻各三 紫苑十銖 桂心各十 知母八銖 赤石脂四銖 大棗三枚 淡竹筴雞子大一枚

右十味治下節為粗散以帛裹方寸匕井花水二升半煮取七合時動褰子為一服日再

瀉心湯同 治心氣不定吐血衄血友

大黃二兩 黃連 黃芩各二兩 右三味咬咀以水三升煮取一升頓服亦治霍亂

安心散同 治心熱滿煩悶驚恐方

白芍藥 遠志 宿姜二枚 茯苓 赤石脂 麥門冬 知母 紫苑 石羔各四 人參二十 桂心 麻黃 黃芩各三 葶藶三十 甘草十銖 草二銖

右十五味治下節為粗散先以水

五升淡竹葉一升煮取三升去滓煮散一方寸匕半以絹裹煮時動之煎取八合為一服日再

下氣湯同 療心勞實熱好笑無度自喜四肢煩熱麻黃止煩方

麻黃去節 梔子仁 茯苓 子芩 白朮各三 石羔八兩 桂心二兩 芒硝三兩 生地黃切一升 大棗三枚 雞子二枚 甘草二兩 赤小豆二合

右十三味切以水一斗煎和下雞子白攪調去沫下諸藥煮取二升五合去滓下竹瀝芒硝煎一沸分為三服忌生葱醋物桃李雀肉海藻菘菜前無竹瀝復下竹瀝恐有失

大黃泄熱湯同 療心勞熱口為生瘡

大黃 澤瀉 黃芩 梔子人 芒硝 桂心各三 大棗三枚 石羔八兩 甘草二兩

右九味切以水九升先取一升水五藏勞心

別漬大黃一病，以餘八升煮諸藥，取二升五合，去滓下大黃，更煮兩沸，去大黃滓，下芒硝，分為三服，忌海藻、菘菜、生葱。按千金方有通草二兩。

磁石湯同療心勞熱，心主竅，主耳，耳枯焦而鳴不能聽，遠方。

磁石五兩碎 茯苓 大青 人參
白朮 菖蒲 芍藥各 竹葉切
赤石脂二兩綿裹

右九味切，以水九升，煮取二升五合，去滓，分為三服，忌羊肉、鰾、醋物、桃李、雀肉等。

茯苓補心湯十治心氣不足，善悲愁，恚怒，衄血，面黃，煩悶，五心熱，或獨語不覺，咽喉痛，舌本強冷，涎出，善忘，恐走不定，婦人胸中，面色赤友。
茯苓四 桂心 甘艸各 紫石英
人參各 大棗干 麥門冬二 赤小豆干

右八味，哎咀，以水七升，煮取二升，分三服。

半夏補心湯同治心虛寒，心中脹滿，悲憂，或夢山丘，平澤者友。

半夏六 病姜五 茯苓 桂心
枳實 橘皮各 白朮四 防風
遠志各

右九味，哎咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

大補心湯同治虛損不足，心氣弱，悸，或時妄語，四肢損，變氣力，顏色不榮友。

黃芩 附子各 甘草 茯苓
麥門冬 乾地黄 桂心 阿膠各 遠志 石羔各 生姜六 粘糖一 大棗干

右十四味，取十三味，哎咀，以水一斗五升，煮取五升，湯成下糖，分四服。

● 脈虛實

理中茯苓湯外療脈實熱極，血氣傷，五藏勞，脈虛實。

心使心好生赫怒口為色變赤言
語不快消熱止血氣調脈方

茯苓 黃芩 梔子人 芒硝

分生麥門冬去心 赤石脂 升麻

紫苑各 竹葉切 香豉升 石羔合

綿 生地黃升

右十二味切以水九升煮取二升
去滓下芒硝分為三服忌醋物蕪

黃

麻黃湯同 療脈極熱傷風損脈為心

風心風狀多汗無滋潤消虛熱極

止汗方

麻黃去 杏仁各 枳實去火 梔子

黃芩 防風 紫苑各 升麻

桂心 茯苓 人參各 大棗甘

石羔綿 棗根白皮

右十三味切以水一斗先煮麻黃
三沸去沫下諸藥煮取三升去滓

分為三服忌生葱醋物

止熱極湯同 療脈熱極遇風為痺々

感心顏脫面色白不澤脈空虛口
唇色赤乾燥升麻潤色消痺方

升麻 射干 芎藭 人參各

赤小豆合 生姜合 麥門冬去心 葳

蕤而 生地黃升 甘艸而 竹葉切

右十一味切以水一斗煮取二升
去滓分為三服忌海藻菘菜蕪蕪

升麻湯升 治脈實洪滿主心熱病方

升麻 子芩 澤瀉 梔子仁

淡竹葉 砒硝各 生地黃切

右七味以水九升煮取三升
去滓下芒硝分三服

麻黃湯同 調心洩熱治心脈厥大寸

口小腸熱齒齲嗌痛方

麻黃 生姜各 細辛 子芩

茯苓 芍藥各 白朮而 桂心而

生地黃切

右九味以水九升煮取三升
去滓分三服須利加芒硝三兩其

善

半夏消痛止極益氣湯外療脈極虛寒則欬々則心痛喉中介々如硬甚則咽腫喉痺方

半夏一升洗 宿姜八兩 芎藭 細辛 附子炮 玄參 當歸各三兩 桂心 甘草炙 茯苓各三兩 杏仁六十枚去皮尖

右十一味切以水一斗煮取三升去滓分溫三服忌羊肉餒生葱猪肉冷水菘菜海藻醋物等

●小腸虛實

柴胡澤瀉湯治小腸熱脹口瘡方

柴胡 澤瀉 橘皮一用枳椇 黃芩 旋覆花 枳實 升麻 芒硝 生地黄切

右九味以水一斗煮取三升去滓下芒硝分二服

治小腸虛寒痛下赤白腸滑腸中懊

●脾

乾姜三兩 當歸 黃蘗 地榆各四兩

黃連 阿膠各三兩 石榴皮三枚

右七味以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取膠烱盡分三服

●脾

瀉熱湯治舌本強直或夢歌樂而體重不能行方

前胡 茯苓 竜胆 細辛 芒硝各三兩 杏仁四兩 玄參 大青各三兩 苦竹葉切

右九味以水九升煮取三升分三服食後服

射干煎方同主治同前

射干八兩 大青三兩 石羔十兩一作一升 蜜一升

右四味以水五升煮取一升五合去滓下蜜煎取二升分三服

治脾熱面黃目赤季脇痛滿方同

半夏 母姜炙 枳實 梔子 茯苓 芒硝各五兩 細辛 白朮 五藏勞脾

杏仁各 生地黄 淡竹葉切
右十一味，咀咀，以水九升，煮取三升，去滓，下芒硝，分三服。
瀉熱方千

大黃 麻黃 黃芩各 杏仁各
赤茯苓 甘草 橘皮 芒硝
澤瀉各

右九味，咀咀，以水九升，煮取三升，絞去滓，內大黃，煮兩沸，去滓，下芒硝，分三服。

大黃瀉熱湯千 治脾脈厥逆，大腹中熱，切痛，舌強，腹脹，身重，食不下，心注脾，急痛方。

大黃細切水一升 甘草各三 澤瀉半別漬一宿
茯苓 黃芩 細辛 芒硝各
橘皮二

右八味，咀咀，以水七升，煮取三升，三合，去滓，下大黃，更煎兩沸，去滓，下芒硝，分二服。

治脾熱脇痛，熱滿不歇，目赤不止，口

唇乾裂方同

石羔斤 生地黄汁 赤蜜各一
淡竹葉切五

右四味，先以水一斗二升，煮竹葉，取七升，去滓，澄清，煮石羔，取一升，五合，去滓，下地黄汁兩沸，次下蜜，煎取三升，細々服之。

枳榔散同 治脾寒，飲食不消，勞倦氣脹，噫滿，憂志不樂方。

枳榔八枚皮 人參 茯苓 陳
麴 厚朴 麥蘖 吳茱萸
白朮各

右八味，治下篩，食後酒服方寸匕，日再，一方用橘皮一兩半。
滾師厚朴湯外 療冷實，服溫脾湯不差，乃服此湯方。

厚朴四 桂心二 枳實三
生姜五

右四味，切，以水五升，煮取二升，分為三服，相去五里久，不連五劑，忌五藏勞脾。

生葱

温脾湯 同療脾胃中冷結實頭痛壯熱但苦下利或冷滯赤白如魚腦方

人參^{二兩} 乾姜 附子^{炮各二兩} 大黃^{三兩}

右四味切以水六升煮取一升半分為三服忌猪肉冷水

大温脾湯 同療脾胃中冷不得食又穀不消嚮々脹滿時苦下痢方

黃芩 人參 芍藥 附子^{炮各二兩} 甘草^炙 乾姜 大黃 厚朴^{炙各三兩}

右八味切以水八升煮取二升八合分為三服亦可為四服得下佳不可須臾復服甚良忌猪肉海藻菘菜

千金翼温脾湯 同主脾氣不足虛弱下痢上入下出方

乾姜 大黃^{各一兩} 人參 附子^{炮各三兩} 甘草^炙

右五味切以水八升煮取二升半去滓分為三服忌海藻菘菜

建脾湯 同主脾氣不調使人身重如石飲食即嘔四肢酸削不收方

芍藥 甘草^炙 黃耆^{一兩} 生薑^{二兩} 生地黄^{一兩} 白蜜^{一升}

右六味切以水九升煮取三升去滓內蜜攪令調煎令微沸服八合日三夜一忌海藻菘菜蕪荑延年厚朴湯 同療不能食腹內冷氣方

厚朴^{三兩} 白朮 人參^{各一兩} 茯苓^{三兩} 生薑^{五兩} 橘皮^{二兩}

右六味切以水四升煮取一升二合分為三服忌桃李雀肉醋物^方有麥門冬二兩甘草一兩各延年^方人參飲主虛客熱不能食惡心^方治腹脹善噫食則欲嘔泄澀澹下口乾四肢重好怒不欲聞人聲忘誤喉痺補之方

黃連^{一兩} 禹餘糧^{一兩} 白朮 乾姜 五藏勞 脾 二百

各三 大麻子兩五 棗白皮兩八 大棗二十枚
右七味咬咀，以水一斗二升，煮取三升，分四服。

治脾胃俱虛，苦饑寒痛方同

人參 當歸 桂心 茯苓

桔梗 芎藭各三兩 厚朴 甘草

橘皮 吳茱萸各五兩 麥蘖一升

右十二味，咬咀，以水一斗二升，煮取三升，分三服。

半夏湯同治脾勞實，四肢不用，五臟垂反，脹滿，肩息，氣急不安，承氣泄實，熱友。

半夏 宿姜各八兩 茯苓 白朮

杏仁各三兩 大棗二十枚 竹葉一升 橘皮

芍藥各兩

右九味，咬咀，以水一斗，煮取三升，分四服。

前胡吐熱湯外療脾勞熱，有白眵，長一寸，在脾為病，令人好嘔，胸中塞

前胡 白朮 赤茯苓 枳實

細辛 旋覆花 竜胆 杏

人去皮尖 常山 松蘿各三兩 竹葉一升

右十一味，切，以水一斗，煮取三升，去滓，分為三服，若腹中熱滿，加芒消，山梔子，黃芩各三兩，苦參二兩，加水二升，忌醋物，桃李雀肉，生葱生菜。

麥門冬湯 聖治脾瘕發口甘煩渴方

麥門冬 石羔三兩 白芍藥 片

芩 烏犀角一兩 厄子五枚

水煎五錢，去滓，入朴硝五分，再三沸，溫服，日二。

進食散 治脾胃虛冷，不思飲食，及久病人，脾虛全不食者，只一二服，便頓能食。

草蓂肉 川烏炮各三兩 青皮去穢 陳

皮去白 高良姜薄切 肉桂去外 甘

五藏勞 脾

草各一分一訶子五箇煨

本作各二兩 去核

右為細末每服二錢水一大盞生姜伍片煎至米分食前服

補脾湯千金翼主不欲食留腹中

或上或煩悶得食輒嘔欲吐已即脹滿不消噫腥臭發熱四肢腫而不隨苦身重不能自勝方

麻子仁二兩餘糧二兩赤根白皮

一兩大棗百枚黃連二兩乾姜二兩白

朮二兩甘草二兩

右八味咬咀以水一斗煮取半去滓得二升九合日一服三日令盡

老小任意加減

●肉極

通肉解風痺湯外療肉極熱肌痺溢

々如鼠走身上津液脫腠理開汗

大泄為脾風々氣藏於皮膚肉色

則敗鼻見黃色麻黃止汗方

麻黃去節枳實二兩防風二兩白朮

細辛各三兩石羔八兩生薑二兩附子

炮各甘草二兩桂心各三兩

右十味切以水九升先煮麻黃去

沫下諸藥煮取三升分三服忌猪

肉海藻菘菜生菜桃李雀肉等

越脾湯同療肉極熱則身體津液脫

腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱

方

麻黃六兩石羔八兩綿裹二兩生薑二兩

甘草二兩附子二兩大棗十五枚

右六味切以水七升煮取二升五

合去滓分為三服一名起脾湯忌

猪肉海藻菘菜本方無附子

西州續命湯同療肉極虛熱肌搖々

如鼠走津液脫腠理開汗大泄或

痺不仁四肢急痛方

麻黃去節生薑各三兩當歸二兩石羔綿碎

芎藭二兩桂心二兩甘草炙黃

防風二兩芍藥各二兩杏仁四十枚熬去

皮尖兩人

右十一味切以水九升先煮麻黃

去上沫，下諸藥，煮取二升，去滓，分為四服，日再。忌海藻、菘菜、生葱。

大半夏湯 同 療肉極虛寒，脾效其狀。右脇下痛，陰々引肩背痛，不可以動，々則欬，腹脹滿，留飲痰癖，大小便不利，小腹切痛，膈上寒主之。

半夏洗并 白朮 茯苓 人參
甘草炙 附子炮 橘皮各二 生姜
桂心三

右九味，切以水一斗，煮取三升，去滓，分為四服。忌羊肉、鰾、桃李、淮肉、生葱、海藻、菘菜、猪肉、冷水。

大風引湯 同 療肉極虛寒，則皮膚不通，外不得泄，名曰厲風，內虛外實，腰脚痛弱方。

獨活四 當歸 茯苓各二 乾姜
甘草炙 人參 黃耆 防風各二
桂心 附子炮各 大豆二升熬
去皮

右十一味，切以水一斗，酒三升，煮取四升，去滓，分為四服，登三夜一。

忌海藻、菘菜、猪肉、生葱、醋物等物。
小風引湯 同 療肉極寒，肌肉瘦，舌癢，名曰惡風，腰脚疼弱方。

獨活 防風 茯苓 甘草炙
人參各三 當歸 乾姜各二 附子一枚
炮 大豆二升熬
去皮

右九味，切以水一斗，酒三升，煮取二升，去滓，分為四服，日三夜一。忌猪肉、冷水、海藻、菘菜、酢物等物。

半夏湯 同 治肉實坐安席，不能動，作喘氣，主脾病熱氣所加，關格除喘方。

半夏 病姜各八 杏仁五 細辛
橘皮各四 麻黃一 石羔七 射干二
右八味，咬咀，以水九升，煮取三升，分三服，須下利，加芫硝三兩。

● 胃
瀉胃熱湯 同

梔子人 射干 升麻 茯苓
芍藥各三 白朮四 赤蜜 生
五藏勞 胃
二百三

地黄汁各一升

右八味，哎咀，以水七升，煮取一升半，去滓，下地黄汁，煮兩沸，次下蜜，煮取三升，分三服，老少以意加減。

補胃湯同 治少氣，口苦，身體無澤，方

栝子仁 防風 細辛 桂心

橘皮各一升 芎藭 吳茱萸 人參

各三升 甘草一升

右九味，哎咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

調中湯同 療胃氣虛，不欲食，四肢重，

短氣，調和五臟，并療諸病，方

薤白切一升 枳實六枚 橘皮三升 大棗

士 梗米三升 香豉六枚

右六味，切，枳實、橘皮、大棗，以水六升，

煮薤得四升，內諸藥，煮取一升半，

適寒溫服，中分服之，良。一方生

延年補胃飲同 主胃氣虛熱，不能食，

兼渴引飲，方

茯苓四兩 人參三兩 橘皮二兩 生姜三兩

薤白切一升 豉五合 糯米二合

右七味，切，以水七升，煮取三升，去

滓，分溫六服，中間任食，一日令盡，

忌酢物。

厚朴湯聖 治脾胃不和，癖氣，調中藏

及下急，方

厚朴去麁皮四兩 生姜二兩 白朮

肆陳橘皮湯浸去白 烏藥湯浸

甘草各二兩

右五味，鹿角、藟，每服二錢匕，水一

盞，入生姜三片，大棗二枚，擘破，同

煎至七分，去滓，溫服。

●肺

治肺熱，言音喘，息短氣，好唾膿血，方

生地黄切二升 石羔八兩 麻黃五兩 杏

人四升 升麻 羚羊角 苾硝各三

赤蜜一升 淡竹筍雞子大

右九味，哎咀，以水七升，煮取二升，

去滓，下蜜，煮兩沸，分三服。

治肺熱，悶不止，胸中喘急，驚悸，客熱

五藏勞 肺

来去欲死，不堪服藥，泄胸中喘氣
方十

桃皮 芫花各一升

右二味，㕮咀，以水四斗，煮取一斗
五升，去滓，以故布巾内汁中，薄
胸温四股，不盈數日，即歇。

橘皮湯同 治肺熱，氣上欬息奔喘方

橘皮 麻黃各三兩 紫胡 乾紫蘇

刪繁作乾 鹽各三兩 宿姜 杏仁各四兩 石

羔八兩

右七味，㕮咀，以水九升，煮麻黃兩
沸，去沫，下諸藥，煮取三升，去滓，分

三服，不差，與兩劑。

治肺熱，喘息，鼻衄，血方同

羚羊角 玄參 射干 雞蘓

芍藥 升麻 拍皮各三兩 生地黃

切卮子人 淡竹筴雞子大一枚

右十味，㕮咀，以水九升，煮取三升，
分三服，須利者，下芒硝三兩，更煮
三沸。

治肺熱，欬酒當風，入肺，膽氣妄泄

目青，氣喘方十

麻黃四兩 甘草 五味子各三兩 杏仁

辛母姜 淡竹葉切

右六味，㕮咀，以水七升，先煮麻黃
去沫，下諸藥，煮取三升，去滓，分三
服。

人參湯 外療肺客熱，并肝心家氣方

桂心 甘草各三兩 人參 乾姜

防風各三兩 白朮一兩半

右六味，切，以水八升，煮取三升，分
三服，日三宜温，忌桃李、雀肉、生葱、
海藻、生菜。

羚羊角飲同 主肺熱，胸背痛，時々乾
欬，不能食方。

羚羊角屑二兩 貝母 生姜 茯苓

苓各三兩 橘皮 人參 芍藥各三兩

右七味，切，以水五升，煮取一升八
合，去滓，分温三服，每服，如人行八
九里久，更服，禁生冷、蒜、麪醋。

紫苑湯同療患肺脹氣急欬嗽喘瘳

眠臥不得極重惡氣欲絕方

紫苑六分甘草八分栝柳七枚茯苓

八分葶藶子三合炒末

右五味切以水六升煮取二升半

絞去滓分溫三服每服如人行四

五里久進之以快利為度忌生葱

生菜麩海藻菘菜大醋蒜粘食

小青竜加石羔湯同肺脹者欬而上

氣煩躁而喘脈浮者以心下有水

宜服之

麻黃三兩五味子半斤石羔綿乾

姜芍藥各三兩細辛二兩桂心二兩甘

草各三兩半夏半升

右九味切以水一斗先煮麻黃減

二升去上沫內諸藥煮二升半去

滓溫服強人一升羸人及老少以

意減之日三夜一忌生葱生菜海

藻菘菜羊肉錫等

越婢加半夏湯同肺脹者病人喘目

如脫狀脈浮大也肺脹而欬者主

之

大棗十五枚半夏半升生姜三兩麻

黃六兩甘草二兩石羔半斤

右六味切以水六升先煮麻黃二

三沸去沫內諸藥煮取二升去滓

溫服八合日三不知更作之忌海

藻菘菜羊肉錫

麻黃湯外療肺脹欬嗽上氣咽燥脈

浮心下水方

麻黃去節芍藥五兩生姜細辛

桂心各三兩半夏半升石羔四兩五味

子半升

右八味切以水一斗煮取三升分

三服忌生葱羊肉錫生菜

救急療肺氣積聚心肋下滿急發即

欬逆上氣方同

麻黃三兩杏仁去尖柴胡

生姜半斤半夏洗葶藶子熬

各十枚乾姜十枚栝柳子十枚

右八味切以水一斗煮取二升八合去滓分温三服每服相去如人行八九里久忌食生冷猪魚羊肉此方服一劑訖將息滿七日則服後方忌羊肉錫

又方同

茯苓 乾蕪莖葉 橘皮 麻

黃芩 杏仁去皮尖 柴胡 生

姜各四兩

右七味切以水一斗煮取二升七合去滓分温三服每服如人行八九里久禁醋物蒜熟麪猪肉五日服一劑

補肺湯千 治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜雪言語聲甚者吐血方

五味子三兩 乾姜 桂心 欬冬

花各二兩 麥門冬升一 大棗一百枚 粳米

合二兩 棗根白皮升一

右八味以水一斗先煮棗白

皮五沸下藥煮取三升分三服
又方同

黃耆五兩 甘草 鍾乳 人參各二兩

乾地黄 桂心 茯苓 白石

英 桑白皮 厚朴 乾姜

紫苑 橘皮 當歸 五味子

遠志 麥門冬各三兩 大棗三十枚

右十八味以水一斗四升煮取四升分五服日三夜二

又方專治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能飲食方同

蕪子升一 桑白皮五兩 半夏六兩 紫苑

人參 甘草 五味子 杏仁

各二兩 欬冬花 射干各半兩 麻黃

乾姜 桂心各三兩 細辛一兩

右十四味以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜二

又方同 治肺氣不足欬逆短氣寒從

背起口中如含霜雪語無音聲而

渴舌本乾燥方

五藏勞 肺

二百七

五味子 蕪子升各 白石英 鍾乳升各 欵冬花 竹葉 橘皮

桂心 素白皮 茯苓 紫苑升各 粳米二升 麥門冬四升 生姜五兩 杏仁五十枚 大棗十枚

右十六味，咬咀，以水一斗三升，先煮棗白皮、粳米、大棗，米熟去滓，內諸藥，煮取五升，分六服，日三。

又方同 治肺氣不足，心腹支滿，欬嗽，喘逆，上氣，唾膿血，胸背痛，手足煩熱，惕然自驚，皮毛起，或哭或歌，或怒，乾嘔，心煩，耳中聞風雨聲，面色白方。

欵冬花 桂心升各 素白皮一升 姜 五味子 鍾乳升各 粳米一升

大棗十枚 麥門冬四兩 右九味，咬咀，以水一斗二升，先煮

粳米，令熟去之，內藥煎取二升，分三服，溫服之。一方用白石英二兩，廣濟用紫苑、人參各二兩，名紫苑湯。

麻子湯同 治肺氣不足，欬膿血，氣短，不得臥方。

麻子升一 素白皮 錫各一 桂心 人參各三 阿膠 紫苑各一 生姜三兩 乾地黄四兩

右九味，咬咀，以水一斗五升，合煮取四升，分五服。

五味子湯外 療肺氣不足，寒從背起，口如含霜雪，語無聲音，劇者吐血，苦寒方。

五味子三兩 大棗擘 素根白皮一升 葶藶二升 鍾乳三兩 欵冬花二升 雞蘓二兩

右七味，切，以水九升，煮取三升，分溫三服，每服如人行七八里，進一服，忌猪魚豕肉、熱麪、陳臭等物，此方良。

紫苑湯同 療肺氣不足，逆氣，胸滿，上迫咽，喉閉塞，短氣，連唾，相屬，寒從背起，口如霜雪，語無音聲，劇者唾五藏勞 肺

血腥臭或歌或哭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面白方

紫苑 五味子 生姜合皮 白

石英碎綿 桂心 欵冬花 人

參冬 麥門冬去心 鍾乳研綿 萊根

白皮冬 大棗干枚 粳米合

右十二味切以水一斗五升先煮

萊根白皮粳米取九升去滓內諸

葉煎取三升去滓分溫三服每服

相去如人行七八里久忌生葱熱

麪炙肉深師千金無

沐頭湯

同療肺熱不問冬夏老少頭

生白屑搔之痒起者然肺為五臟

之蓋其勞損傷肺氣衝頭頂致使

頭皮白屑搔之而起人參患此皆

從肺來世呼為頭風也主之方

大麻人三升 秦椒二兩 皂莢屑五兩

右三味熟研內米泔汁中一宿漬

去滓米泔攪之三五百遍取漿乃

用沐髮燥訖別用皂夾湯洗之通

理然后傳膏

小建中湯傷寒 治肺與大腸俱不足

虛寒之氣小腹拘急腰痛羸瘠百

病方見傷寒

半夏湯十 治肺勞虛寒心腹冷氣逆

遊氣胸脇氣滿從胸達脊痛憂氣

往來嘔逆飲食即吐虛之不足方

半夏升一 生姜介一 桂心兩四 甘草

厚朴各三兩 人參 橘皮 麥門冬

右八味以水一斗煮取四升

分四服腹痛加當歸二兩

厚朴湯同 治肺勞風虛冷痰澀水氣

晝夜不得臥頭不得近枕上氣胸

滿喘息氣絕此痰水盛溢方

厚朴 麻黃 桂心 黃芩

石羔 大戟 橘皮各三兩 枳實

甘草 秦艽 杏仁 茯苓各

細辛一兩 半夏升一 生姜十兩 大棗十五枚

右十六味以水一斗三升煮

五藏勞 肺

取四分，分五服。

厚朴湯外療肺虛勞寒，腹脹彭久，氣急，小便數少，主之方。

厚朴炙枳實炙桂心 橘皮

大黃炙甘草炙五加皮 生姜

各五兩 大棗擘

右九味，切，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分溫三服，忌海藻、菘菜、生菜。

溫中下氣湯同療肺虛勞寒，損則腰背苦痛，難以俛仰，短氣唾如膿，主之方。

生姜一斤 大棗三枚 杜仲皮五兩 草薺

桂心各五兩 白朮五兩 甘草炙 附子炮

右八味，切，以水九升，煮取三升，去滓，分溫三服，忌豬肉、海藻、菘菜、生葱、桃李、雀肉等。

附子湯同療肺虛勞損，腹中寒鳴，切痛，胸脇逆滿，氣喘，主之方。

附子炮 甘草炙 宿姜 半夏洗

各五兩 大棗二十枚 白朮三兩 倉米半升

右七味，切，以水一斗，煮取三升，去滓，分為三服，忌羊肉、餒海藻、菘菜、桃李、雀肉等。

建中湯同療肺虛損不足，補氣方。

黃耆 芍藥各三兩 甘草炙 生姜六兩

半夏洗 大棗十二枚 飴糖四斤

右八味，切，以水八升，煮取三升，分為三服，忌羊肉、餒海藻、菘菜、生葱。

●氣極

大前胡湯外療氣極傷熱，氣喘息衝，胸常欲自恚，心腹滿痛，內外有熱，煩嘔不安方。

前胡八兩 半夏洗 麻黃去節 芍藥各五兩

枳實炙 生姜五兩 黃芩三兩 乾姜十三枚

右八味，切，以水九升，煮取三升，去滓，分溫分三服，如人行四五里久，進一服，忌羊肉、餒。

竹葉湯同療氣極傷熱，氣喘甚，則唾五散勞肺。

二百十

血氣短乏，不欲食，口燥咽乾方。

竹葉切，麥門冬心去，小麥，生地。

黃切各，升一升，生薑六，乾枣十枚，麻黃去核。

甘草三兩，石羔六兩，綿裹去節。

右九味，切以水一斗，煮取三升，去滓，分為三服，忌海藻、菘菜、蕪荑。

麻黃湯同，療氣極傷熱，肺虛多汗，欬唾上氣，喘急方。

麻黃四兩，甘草二兩，杏仁四十枚，去皮尖，兩人。

桂心二兩，生薑二兩，半夏五枚，洗，石羔六兩，破。

紫苑一兩，而六兩。

右八味，切以水九升，煮麻黃兩沸，去上沫，下藥，煮取三升，去滓，分為三服，忌海藻、生葱、菘菜、羊肉、饅。

五味子湯同，療氣極寒，傷風肺虛，欬氣短，不得息，胸中迫急方。

甘艸炙，五味子，紫苑，桂心。

附子炮，麻黃去節，乾姜，芎藭各三兩。

細辛一兩，乾枣三枚。

右十一味，切以水九升，煮取三升，去滓，分為三服，忌海藻、菘菜、豬肉。

生葱、生菜。

黃耆湯十，療氣極虛寒，皮毛焦，津液不通，虛勞百病，氣力損乏方。

黃耆四兩，人參，白朮，桂心各三兩。

生薑八兩，乾枣十枚，附子五枚，去核。

右七味，切以水八升，煮取二升，去滓，分為四服，忌桃李、雀肉、生葱。

本方無附子，刪繁同。

●大腸及虛實

生姜泄腸湯十，治大腸實熱，腹脹不通，口為生瘡者方。

生姜，橘皮，青竹茹，黃芩。

枳實各一兩，白朮各一兩，桂心一兩，茯苓。

芒硝各一兩，地黃十兩，大棗十枚。

右十一味，以水七升，煮取三升，去滓，下芒硝，分二服。

黃連補湯同，治大腸虛冷，痢下青白，腸中雷鳴，相逐方。

黃連四兩，茯苓，芎藭各三兩，酸石榴。

五藏勞，大腸及虛實，二百十一。

皮^五伏竜肝^{雞子大} 地榆^五
右六味以水七升煮取二升半去滓下伏竜肝末分三服

梔子煎^同治皮實主肺熱氣方

梔子仁 枳實 大青 杏仁

柴胡 芒硝^各 生地黄 淡竹

葉^各 生玄參^五 石羔^八

右十味以水九升煮取三升去滓下芒硝分為三服

●腎

瀉腎湯^千治腎實熱小便脹滿四肢

正黑耳聾夢腰脊離解及伏水等氣急方

芒硝 茯苓 黃芩^各 生地黄

汁 菖蒲^各 磁石^八 大黃

切一升用水 玄參 細辛^各 甘

草^二

右十味咬咀以水九升煮七味取二升半去滓下大黃內藥汁中更煮減二升三合去大黃內地黃汁

微煎一兩沸下芒硝分為三服

治腎熱好怒好忘耳聽無聞四肢滿

急腰脊轉動強直方同

柴胡 茯神^{外臺作} 黃芩 澤

瀉 升麻 杏仁 大青 芒

硝^各 淡竹葉 地黄^各 磁石

而^四 羚羊角^一

右十二味咬咀以水一斗煮取三

升去滓下芒硝分三服

治腎熱小便黃赤不出如梔子汁或

如黃蘗汁每欲小便莖頭即痛方

榆白皮^切 冬葵子^各 車前子^各

滑石^各 碎子芩 通草 瞿麥^各

石葦^各

右八味咬咀以水二斗先煮車前草取一斗澄清取九升下諸藥煮取三升五合去滓分四服

治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱

言音混濁陽氣頓絕方同

茯苓 白朮 巴戟天 麥門

五藏勞 腎

冬 茯苓 甘草 牛膝 五味子 杜仲各八兩 車前子 乾姜各五兩 生乾地黄五兩

右十二味治下篩食後酒服方寸匕日三

梔子湯同 治腎勞實熱小腹脹滿小便黃赤後有餘瀝數而少莖中痛陰囊生瘡方

梔子仁 芍藥 通艸 石葶各五兩 滑石八兩 子芩四兩 生地黃 榆白皮 淡竹葉各一升

右十味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服

驚甲湯外 療勞熱四肢腫急小腹滿痛顏色黑黃關格不通方

驚甲炙 麻黃去節 升麻 前胡 羚羊角屑各三兩 桑根白皮五兩 薤白切香豉各一升 熬黃芩三兩

右九味切以水一斗煮取三升去滓分為三服忌葷菜

●骨極

三黃湯外 療骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞面頰枯黑耳鳴虛熱方

大黃切別漬水一斗 黃芩 芒硝各三兩 子各 甘草二兩

右五味切以水四升先煮三物取一升五合去滓下大黃更煎兩沸下芒硝分三服忌海藻菘菜

●精極附失精 尿精 夢失精

竹葉黃芩湯干 治精極實熱眼視無明齒焦髮落形衰體痛通身虛熱方

竹葉切三升 黃芩 茯苓各三兩 甘草 麥門冬 大黃各三兩 生薑六兩 芍藥四兩 生地黃一升

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

治精極五臟俱損傷虛熱遍身煩疼骨中痞痛煩悶方同

五藏勞 骨極 精極 二百十三

生地黄汁二升 麥門冬汁 赤蜜
升竹瀝各一合 石羔八兩 人參 芎藭
桂心 甘草 黃芩 麻黃各三兩
當歸四兩

右十二味，哎咀，以水七升，先煮八味，取二升，去滓，下地黄等汁，煮取四升，分四服，日三夜一。

治五勞六極，虛羸心驚，厄弱多魘，心陽友同。

茯苓四兩 甘草 芍藥 桂心

乾姜各三兩 大棗五枚 遠志 人參各三兩

右八味，哎咀，以水八升，煮取三升，分三服。

黃耆湯外 療虛損失精方

黃耆 當歸 甘草各二兩 桂心

六菴容 石解各三兩 乾姜百三 白

蜜二升

右八味，切，以水一斗，煮取四升，內蜜煎取三升，分為四服，日三夜一，以食相間，忌海藻、菘菜、生葱。

禁精湯同 治失精羸瘦，則少氣，目

視不明，惡聞人聲方

韭子二升 粳米一升

右二味，於銅器中，合熬米黃黑，及熟，以好酒一斗投之，絞取汁七升，每服一升，日三盡一劑。

小建中湯金 虛勞，裏急，悸，腹中痛，

夢失精，四肢痠痛，手足煩熱，咽乾

口燥，主之。方見傷寒

鹿角湯外 療夢泄精方

鹿角一具 韭白半升 生薑一斤 芎藭

茯苓各三兩 當歸 鹿茸各二兩 白米

合五

右八味，切，先以水五升，煮鹿角，取一斗二升，去滓，內諸藥，煮取四升，分服一升，日三夜一，鹿角唯取肥而解者，打令碎也，忌酢物。

龍骨湯同 療夢失精，諸脈浮動，心悸

少腹急陰虛寒，目眶疼痛，髮脫者，

常七日許，一劑至良方。

五藏勞 膀胱虛實

竜骨 甘草各二分 牡蠣三分 桂心 芍藥各四分 大枣四枚 生姜五分
右七味切以水四升煮取一升半分再服虚羸浮熱汗出者除桂加白微三分附子三分炮故曰二加竜骨湯忌海藻松菜生葱猪肉冷水

東仁湯干 治大虚勞夢洩精莖核微弱血氣枯竭或醉飽傷於房室驚惕忪悸小腹裏急方

枣核仁二兩 澤瀉 人參 芍藥 桂心各兩 黄芩 甘草 茯苓 白竜骨 牡蠣各三兩 生姜二兩 半夏一升

右十二味以水九升煮取四升一服七合日三若不能食小腹急加桂心六兩

●膀胱虚實

治膀胱實熱方干

石羔八兩 梔子仁一作瓜 茯苓

知母各三兩 蜜合五 淡竹葉 生地黃各切一升

右七味以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分三服須利加芒硝三兩

治膀胱熱病不已舌乾咽腫方同

蜜合七 升麻 大青各三兩 射干 生玄參 黄蘗 薔薇根白皮各五兩
右七味以水七升煮取一升去滓下蜜煮三沸細々合之

治膀胱虚冷饑不欲飲食面黑如炭腰脇疼痛方同

磁石六兩 黄芩 茯苓各三兩 五味子 杜仲各五兩 白朮 白石英各五兩
右七味以水九升煮取三升分服

●腰痛

備急痔腰膝連脚疼酸者方外

杜仲八兩 獨活四兩 乾地黄四兩 當歸四兩 芍藥四兩 丹参四兩 五藏勞 腰痛

右六味切以絹袋盛以清酒二斗
漬五宿初服二合再服以知為度
忌蕪荑

古今錄驗寄生湯同療腰痛方

赤寄生四兩 附子三兩 獨活四兩 狗脊五兩 桂心四兩 杜仲五兩 芎藭一兩 甘草二兩 芍藥三兩 石斛三兩 牛膝三兩 白朮三兩 人參三兩

右十三味切以水一斗煮取三升
分三服忌海藻菘菜生葱猪肉冷
水桃李雀肉

玄參湯同療腰痛方

玄參三兩 人參四兩 杜仲四兩 芍藥四兩 桂心一兩 生薑二兩 乾地黄三兩 白朮二兩 通草一兩 當歸一兩 寄生一兩 芎藭四兩 防風二兩 丹皮二兩 獨活上

右十五味以水一斗二升煮
取三升日三夜一服忌生葱桃李
雀肉胡荽蕪荑等

杜仲獨活湯同療腰痛方

獨活四兩 生薑六分 麻黃二兩 桂心三兩 芍藥一兩 甘草一分 葛根三兩 括樓子二兩 防風一兩 杜仲四兩 附子二兩 炮杏仁二兩 乾地黄二兩

右十三味切以水八升清酒二升
煮取三升分三服忌生葱菘菜海
藻猪肉冷水

獨活湯同療風濕客於腰令人腰痛
方

獨活三兩 生薑六兩 乾地黄五兩 芍藥四兩 防風三兩 桂心一兩 括樓三兩 甘草二兩 麻黃二兩 乾葛三兩

右十味切以水八升酒二升煎取
三升分三服不差重作忌海藻生
葱菘菜蕪荑

獨活寄生湯千腰背痛者皆是腎氣

虛弱臥冷濕當風得之不時速治
喜流入脚膝或為偏枯冷痺緩弱
疼痛若有腰痛牽脚重痺急宜服
之方見
風病

甘草湯外 腎着之為病其人身體重
從腰以下冷如坐水中形狀如水
不渴小便自利飲食如故是其證
也徒作勞汗出衣裏冷濕久之故
得也腰以下冷痛腹重如帶五千
錢方

甘草高 乾姜炮 白朮西 茯苓四
右四味切以水五升煮取三升分
服一升日三腰中即溫忌海藻菘
菜桃李雀肉酢物經心錄方甘中
范汪療腎腰有血痛不可忍者方同

桂心

右一味搗末以苦酒和塗痛處此
令人喜臥可勤用之再為必差
必效療腰腎病膿水方同

牛膝六 枳柳人七 防風六 牽牛
子八 熬

右四味搗篩為散空服以酒下三
錢匕以宜源即差如利三五行即
以醋飲止之慎生冷油膩蒜等物

後以補腎氣湯凡也

馮腎大黃湯通 治腎元實熱小腹脹

脹腰重不利足下熱痛耳聾腰解

夢伏水中方

大黃鹽水 懷生地 磁石酢淬七

玄參 片芩 澤瀉 五加皮

羚羊角 石菖蒲 炙甘草

赤茯苓各

水煎三錢入竹葉二七片溫服日

二

地竜湯醫通 治癆積太陽經中腰脊

痛不可忍方

地竜焙 肉桂各 桃人十 卷活

二獨活 甘草炙 黃蘗各 酒炒

麻黃六 蘓木八 當歸稍 半

水煎食遠服

虛勞

●四季補益

建中湯十 治五勞七傷，小腹急痛，膀胱虛滿，手足逆冷，食飲吐酸，痰涎逆，泄下，少氣，目眩，耳聾，口焦，小便不利方。

膠飴斤半 黃耆 乾姜 當歸各三兩

人參 半夏 橘皮 芍藥

甘草各二兩 附子一枚 大棗十五枚

右十一味，以水一斗，煮取三升半，湯成下膠飴，烱沸分四服。液有桂心六兩，生姜一斤，無橘皮，乾姜。

又方 同治五勞七傷，虛羸不足，面黧黑，手足疼痛，久立腰疼，起則目眩，腹中懸急而有絕傷，外四肢方。

生姜 芍藥 乾地黄 甘艸

芎藭各五兩 大棗三十枚

右六味，以水六升，漬一宿，明旦復以水五升，合煮取三升，分三服，藥入四肢百脈，似醉狀是效，無

生姜酒漬乾姜二兩一病用之常行如方神妙

大建中湯同治五勞七傷小腹急膈下彭亨兩脇脹滿腰脊相引鼻口乾燥目暗眩々懶々不寐胃中氣急逆不下食飲莖中策々痛小便黃赤尿有餘瀝夢與鬼神交通去精驚恐虛乏方

飴糖半斤黃耆 遠志 當歸十金
無澤瀉芍藥 人參 竜骨
甘草八兩生姜十枚大枣十枚

右十一味以水一斗煮取二升半湯成內糖令烱一服八合消息又一服深師無飴糖遠志沃澤一升附竜骨有桂心六兩半夏子一枚

人參湯同治男子五勞七傷胸中逆滿害食乏氣嘔逆兩脇下脹小腹急痛宛轉欲死調中平臈理絕傷方
人參 當歸 芍藥 甘艸

生姜 麥門冬 白糖 桂心
查前胡 茯苓 五味子 蜀椒

右十五味以水一斗半右十五味以水一斗半取東流水一斗半日用三年陳芦稍煎取四升內糖復上火煎令十數沸年二十以上六十以下一服一升二十以下六十以上一服七八合雖年盛而久羸者亦服七八合日三夜一不尔藥力不接則不能救病要用勞水陳芩不則水强火盛猛即藥力不出也貞觀初有人久患羸瘦殆死余處此方一劑則瘥如湯沃雪所以錄記之餘方皆尔不能一一具記

●補益

濼師黃耆湯外療丈夫虛勞風冷少損或大病後未平復而早榮勞腰背强直脚中疼弱利諸不足方

黃耆二兩遠志三兩麥門冬三兩茯苓去心

虛勞 補益

二 生姜 三 人参 三 甘草 三 半夏
一 當歸 一 前胡 橘皮 三 蜀椒
二 芍藥 二 烏頭 三 炮 大棗 三 桂
心 二

右十六味切以水一斗二升煮取
三升分三服增減量性服之忌羊
肉錫海藻菘菜生葱生菜猪肉冷
水酢物等千金無遠志橘皮蜀椒
烏頭有細辛五味子白
芷上

古今錄驗調中湯同療虛勞補益氣
力方

麥門冬 兩 乾枣 一 茯苓 甘草
各 桂心 當歸 芍藥 各半

右七味切以水八升煮取三升去
滓分服一升日三忌生葱海藻菘
菜酢物

補湯方

車前子 三 防風 桂心 各 巴戟
天 丹參 乾地黄 鹿茸
枸杞皮 五加皮 各

右九味以水八升煮取三升
去滓分三服

五補湯同治五臟內虛竭短氣效逆
傷損鬱悒不足下氣通津液方

五味子 桂心 甘草 人参
各 麥門冬 小麥 各 升 生姜 八兩 升
無 粳米 三 薤白 枸杞根 白皮
各 升

右十味以水一斗二升煮取
三升每服一升日二口燥者先煮
竹葉一把水減一升去葉內諸藥
煮之

人參養榮湯同治積勞虛損四肢沈

滯骨肉酸疼吸々少氣行動喘噎
小腹拘急腰背強痛心虛驚悸咽
乾唇燥飲食無味陽陰衰弱悲憂
慘感多臥少起久者積年急者百
日漸至瘦削五臟氣竭難可振復
治與肺大腸俱虛咳嗽下利喘乏
少氣嘔吐痰涎方

虛勞

補益

白芍藥三兩 當歸 桂心去麩 甘

艸炙 陳橘皮 人參 白朮煨

黃耆各兩 熟地黃製 五味子 茯苓

各半 遠志炒去心

右剉散每服四錢水一盞半生薑

三片棗子一枚煎至半分去滓溫

服便精遺泄加竜骨一兩效嗽加

阿膠甚良

補中益氣湯薛 治中氣不足或誤服

尅伐四肢倦怠口乾發熱飲食無

味或飲食失節勞倦身熱脈洪大

而無力或頭痛惡寒自汗或氣高

而喘身熱而煩脈微細軟弱自汗

體倦或中氣虛弱而不能攝血或

飲食勞倦而患瘧痢等症

當歸一錢 陳皮五分 升麻 柴胡各

黃耆 白朮 人參 甘草各

姜棗水煎

歸脾湯濟生 治脾經失血少寐發熱

盜汗或思慮傷脾不能攝血以致
妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心
脾傷痛嗜臥少食或憂思傷脾血
虛發熱或肢體作痛大便不調或
婦人經候不準哺熱或瘰癧流注
不能消散潰斂

黃芪 人參 白朮 茯苓

酸棗人炒竜眼 各三錢 當歸 遠志

各錢 甘草 木香各

姜棗水煎○加柴胡梔子仁名加

味歸脾湯前証兼熱者用之濟生

薛立有加之

清暑益氣湯辨 治長夏濕熱蒸人

感之四肢困倦精神短少懶於動

作胸滿氣促肢節疼痛或氣高而

喘身熱而煩心下膨悶小便黃而

數大便澇而頻或利或渴不思飲

食自汗體虛友

人參 白朮 陳皮各 黃柏酒

分三 神曲 澤瀉各 當歸 青皮

虛勞 補益 二百五十一

麥門冬 乾葛分 五味子九 茵陳粒 蒼朮各一 升麻一 甘草三

水煎溫服

十珍散續易方 治大病之後氣不復常

乏力短氣神情不樂口舌無味友

人參 白朮 白茯苓 黃耆

炙白扁豆製 山藥各 宿砂人

桔梗 五味子 甘草各

右細末每服三錢水一盞姜三片

東一枚煎至七分食前服

● 羸瘦

古今錄驗療體虛少氣羸瘦不堪榮

衛不足善驚胸膈痰冷而容熱欲

冷水飲食則心腹弦滿脾胃氣少

不能消食或時衄血方外

黃耆二 附子二 大棗五 甘草兩

蜀椒兩 生姜六 芍藥二 茯苓二

當歸二 人參三 黃芩二 桂心二

右十二味切以水一斗煮取三升

半去滓分五服日三夜二適寒溫

忌海藻菘菜猪肉冷水大酢

小品黃耆湯同 療虛勞胸中客熱冷

癖痞滿宿食不消吐噫脇間水氣

或流飲腸鳴不生肌肉頭痛上重

下輕目視蕪々惚々志損常躁熱

臥不得安少腹急小便赤餘瀝臨

事不起陰下濕或小便白濁傷多

左

黃耆三 人參一 芍藥二 生姜半

桂肉三 大棗十 當歸一 甘草兩

右八味切以水一斗煮取四升分

四服有寒加厚朴二兩忌生葱海

藻菘菜

● 少氣不足及裏急

建中湯十 治虛損少氣腹脹內急拘

引小腹至令不得屈伸不能飲食

寒熱頭疼手足逆冷大小便難或

復下痢口乾夢中泄精或時吐逆

恍惚面色枯瘁又復微腫百節疼

酸方

附子 厚朴各二兩 人参 甘草

桂心 當歸 茯苓各三兩 麥門冬

黃耆 竜骨各四兩 芍藥四兩 生薑五兩

飴糖八兩 生地黄一斤 大棗三十枚

右十五味，㕮咀，以水一斗二升，煮

取四升，去滓，內飴糖，每服八合，日

三夜，一效者，加生薑一倍。

大建中湯 同 治虛勞寒，痺飲在脇下，

決々有聲，飲已如從一辺下，決々

然也，有頭並衝皮起，引兩乳內痛，

裏急善夢，失精氣短，目眩々惚々

多忘方。

蜀椒二合 半夏一分 生薑一分 甘艸二分

人参三兩 飴糖八兩

右六味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，

去滓，內糖，溫服七合，裏急拘引，加

芍藥，桂心各三兩，手足厥，腰背冷，

加附子一枚，勞者加黃耆一兩。

小建中湯 同 凡男女，因積勞虛損，或

大病後不復，常苦四體沉滯，骨肉

疼酸，吸々少氣，行動喘脇，或小腹

拘急，腰背強痛，心中虛悸，咽乾，唇

燥，面體少色，或飲食無味，陰陽廢

弱，悲憂慘感，多臥少起，久者積年，

輕者百日，漸致瘦削，五臟氣竭，則

難可復振，治之方。方見傷寒。○仲

景云：嘔家不可

服，肘后云：加黃芪、人参各二兩，為

佳。若患痰滿，及唐洩，可除膠飴。胡

洽方有半夏八兩，黃耆二

兩，古今錄驗名芍藥湯。

前胡建中湯 同 治大勞虛勞，寒熱嘔

逆，下焦虛熱，小便赤痛，客熱上熏，

頭目及骨肉疼痛，口乾方。

前胡三兩 黃耆 芍藥 當歸

茯苓 桂心各二兩 甘艸一斤 生薑八兩

白糖六兩 人参半斤 半夏各六兩

右十一味，㕮咀，以水一斗二升，煮

取四升，去滓，內糖，分四服。

黃耆建中湯 同 治虛勞裏急，諸不足

方。

黃耆 生薑 桂心各二兩 甘艸二兩

芍藥六兩 大棗十二枚 飴糖一斤

右七味，以水一斗，煮取三升，去滓，內飴，令消，溫服一升，日三間，日可作嘔者，倍加生薑，腹滿者，去，加茯苓四兩，佳。仲景集驗，古今錄驗，並同。深師治虛勞，腹滿，食少，小便多者，無飴，糖有人，參二兩，半夏一升，又治大虛，不足，小腹裏急，勞寒，拘引，脘氣，上衝，胸短，氣言，語謬，誤不能食，吸氣，衝胸，短氣，必効，方治虛勞，下焦虛冷，不甚，渴，小便數，多有人，參，當歸，各二兩，若失精，加童骨，白飲，各一兩，古今錄驗，治虛勞，裏急，痛氣，引胸脇痛，或心痛，短氣者，以乾姜，代生薑，加當歸四兩。

黃耆湯 同 治虛勞不足，四肢煩疼，不欲食，即脹，汗出方。

黃耆 麥門冬 芍藥 桂心

甘草 當歸 五味子 細

辛 人參 大棗 前胡 茯苓

苓 生薑 半夏

右十四味，以水一斗，煮取三升，每服八合，日二服。

取三升，每服八合，日二服。深師方，四肢沉重，或口乾，吸少氣，小便利，諸不足者，無麥門冬，五味子，細辛，前胡，有素，螺蛸，三十枚，治丈夫虛勞，風冷，少損，或大病後，未平復，而早牽，發，腰背強，直，脚中疼，弱，補諸不足者，無五味子，細辛，有遠志。

橘皮 各二兩 蜀椒 一兩 烏頭 三枚
小品方 治虛勞 少氣 小便過多 者
無五味子 細辛 人參 前胡 茯苓 半
夏 有黃芩 一兩 地黃 二兩 以水 九
外 煮取 三升 治虛勞 胸中 氣塞
冷 痺 取 三升 治虛勞 胸中 氣塞
或 流 飲 腸 鳴 食 不 消 吐 意 胸 間 水 氣
下 輕 目 眩 急 忽 去 來 踴 熱 臥 不
得 安 小 腹 急 小 便 赤 澀 臨 事 不
起 陰 下 濕 或 小 便 白 濁 傷 多 者 無
麥門冬 五味子 細辛 當歸 前胡 茯
苓 半 夏 有 厚 朴 三 兩 治 方 治 五
藏 內 傷 者 無 麥門冬 五味子 當歸
細辛 前胡 茯苓 名 大 黃 耆 湯 延 年
秘 錄 方 主 補 虛 損 強 腎 氣 者 無 麥
門冬 五味子 細辛 前胡 有 防 風 芍
藥 各 三 兩

滋師黃耆湯 同 療大虛不足，少腹裏

急，勞寒物引，臍氣上衝，胸短氣言

語謬，誤不能食，吸氣乏悶，亂者

方。

黃耆 三 半夏 開 大棗 子 枚 生薑

西 桂心 四 芍藥 四 人參 二 甘草

右八味，以水一斗，煮取四

升，分四服，日夜再，若手足冷，加附

子一兩，忌生葱，海藻，菘菜，羊肉，錫

大建中湯 同 療內虛絕，裏急，少氣，手

虛勞 少氣不足及裏急 二百二十四

足厥逆少腹挛急或腹滿弦急不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口舌乾精自出或手足在寒乍熱而煩苦酸疼不能久立多夢寤補中益氣方

黃耆四兩 人參二兩 大棗三枚 當歸二兩

桂心六兩 生薑一斤 半夏一升 芍藥四兩

附子四兩 甘草二兩

右十味切以水一斗二升煮取四升分四服先服後食忌海藻菘菜生葱猪羊肉錫冷水等

樂令黃耆湯同 療虛勞少氣胸心痰

冷時驚惕心中悸動手足逆冷體常自汗補諸不足五臟六腑虛損腸鳴風濕榮衛不調百病又治風裏急方

黃耆二兩 當歸三兩 烏頭三兩炮去皮

炙之金 桂心三兩 生薑四兩 蜀椒汗

人參二兩 芍藥二兩 大棗十枚 茯苓二兩

遠志二兩 半夏四兩 洗

右十二味切以水一斗五升煮取

四升分服八合日三夜再忌生葱

羊肉鴈猪肉冷水大酢千金有橘

胡椒遠志為十四味

千金翼炙甘草湯脈湯 治虛勞不

足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死方見傷寒雜治門

古今錄驗黃耆湯外療虛勞裏急少

腹痛氣引胸脇痛或心痛短氣方

芍藥六兩 黃耆四兩 甘草二兩 桂心二兩

乾姜四兩 當歸四兩 大棗十枚 飴糖六兩

右八味切以水一斗煮取三升去

滓下飴糖令消分三服忌海藻菘菜

集驗枸杞湯同 療虛勞口中苦渴骨

節煩熱或寒方

枸杞根白皮五升 麥門冬一升

小麥三升

右三味以水二斗煮麥熟藥成去

虛勞 少氣不足及裏急 二百二十五

滓分服一升差止

古今錄驗枸杞湯同療虛勞少氣骨

節中微熱諸疼痛主之方

枸杞葉十斤 乾姜二斤 桂心一斤 甘草

炙大 麻人斤二

右五味切碎以河水三斗煮取九

升去滓每服一升日三忌海藻菘

菜生葱

凝唾湯千 治虛損短氣咽喉凝唾不

出如膠塞喉方一名茯苓湯

麥門冬五斤 人參二斤 前胡三斤 甘草

乾地黄 桂心 芍藥各一斤 大棗

枚茯苓二斤

右九味咬咀以水九升煮取三升

分溫三服

●陰痿

治男子陰氣衰腰背痛苦寒莖消少

精小便餘瀝出失精囊下濕癢虛

乏服此令人克實肌膚肥悅方千

五味子 蛇床子各二斤 續斷 牛

膝三斤 車前子 菴菴各五斤

右六味治下篩酒服方寸匕日二

●小便利

漢師黃耆湯外療虛乏四肢沉重或

口乾吸々少氣小便利諸不足方

黃耆三斤 茯苓二斤 桂心二斤 芍藥二斤

甘草一斤 半夏三斤 生姜五斤 當歸一斤

大棗三斤 人參二斤 素蠃蛸一斤 葛

右十一味切以水一斗煮取四升

分服一升忌海藻菘菜羊肉錫生

葱大酥

又黃耆建中湯同療虛勞腹滿食少

小便多方

黃耆三斤 甘草三斤 大棗三斤 桂心二斤

芍藥四斤 生姜四斤 人參二斤 半夏一斤

右八味切以水一斗煮取三升去

滓分三服忌海藻菘菜羊肉錫生

又阿膠湯同療虛勞小便利而多有

人虛勞服散又虛熱盛當風取冷

虛勞 陰痿小便利 二百三十六

患脚氣喜發動兼小便利脈細弱服此方利即減

阿膠二兩 乾姜二兩 麻子一升 遠志四兩 人参一兩 甘草二兩

右七味切以水七升煮六味取三升去滓內膠烱銷分三服一方云小便利多日夜數十行一石五斗者良忌猪肉冷水海藻菘菜

小品黃耆湯同 療虛勞少氣小便過多方

黃耆二兩 麥門冬二兩 大棗三枚

芍藥二兩 乾地黄二兩 黃芩一兩 桂心二兩

而生姜二兩 當歸二兩 甘草二兩

右十味切以水九升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜生葱蕪荑猪肉冷水一友有黃連一兩

黃耆建中湯同 療虛勞下焦虛冷不甚渴小便數方方見虛勞少氣不足及裏急門

●不得眠

濇師小酸東湯外 療虛勞不得眠煩

不可寧者方

酸棗人升二 知母二兩 生姜二兩 甘草二兩

茯苓二兩 芎藭二兩

右六味切以水一斗煮酸棗人減三升內藥煮取三升分三服一方加桂二兩忌海藻菘菜酢物

小品流水湯同 主虛煩不得眠方

半夏二兩 粳米一升 茯苓四兩

右三味切以東流水二斗揚之三升令勞煮藥取五升分服一升日三夜再忌羊肉錫醋物有半夏必須著生姜四兩不令乾人咽不審古方何以如此今改正之

千里流水湯同 療虛煩悶不得眠方

半夏三兩 生姜四兩 麥門冬三兩 酸棗人二兩 甘草二兩 桂心三兩 黃芩二兩

草薢二兩 人参二兩 茯苓四兩 秫米一升

右十一味切以千里流水一斛煮米令蟹目沸湯之万遍澄清一斗煮諸藥取三升分三服忌海藻菘

虛勞 不得眠

菜、羊肉、錫、酢物、生葱。

煩悶不得眠方同

生地黃五兩 香豉五合 人參二兩 粟

米三合 茯苓四兩 知母四兩 麥門冬三兩

前胡三兩 甘草三兩 枸杞根皮五兩

右十味切以水八升煮取二升七

合分四服忌海藻、菘菜、蕪荑、酢物

酸枣飲同 主虛煩不得眠并下氣方

酸枣二升 茯苓二兩 人參三兩 生姜二兩

麥門冬二兩 橘皮三兩 陳杏人皮二兩 去

碎紫菀

右八味切以水七升煮取一升半

分再服忌大酢

酸枣飲同 療虛煩不得眠助下氣衝

心方

酸枣一升 人參二兩 白朮二兩 橘皮

五味子半兩 桂心一兩 茯苓二兩 生

姜四兩

右八味切以水六升煮取二升半

去滓分三服忌桃李、雀肉、生葱、酢

物

酸枣飲同 虛煩不得眠方

酸枣一升 茯苓二兩 人參二兩 生姜

右四味切以水五升煮取一升二

合去滓分再服忌酸物

茯神飲同 療心虛不得睡多不食用

此方

茯神四兩 人參三兩 橘皮二兩 甘草一兩

生姜二兩 酸枣一升

右六味切以水一斗煮取二升去

滓分三服忌海藻、菘菜、酸物

酸枣湯斗 治虛勞煩擾奔氣在胸中

不得眠

酸枣仁 升五 人參 桂心 生姜

石羔四兩 知母各 甘草二兩

右八味咬咀以水一斗先煮酸枣

仁七升去滓下藥煮取三升分三

服日三

又方同

虛勞 不得眠

乾姜四兩為末，湯和頓服，覆取汗病愈。

梔子湯同治大下後虛勞不得眠，劇者顛倒懊懷欲死方。方見傷寒

集驗溫膽湯外療大病後虛煩不得眠，此膽寒故也，宜服此湯方。

生姜兩四半夏兩橘皮兩三竹茹兩二枳實兩甘草兩

右六味切，以水八升，煮取二升，去滓，分三服，忌羊肉、海藻、菘菜、餛飩。

古今錄驗大竹葉湯同療虛勞客熱

百病之後，虛勞煩擾，不得眠臥，骨間勞熱，面目青黃，口乾燥，僂僂不自安，短氣乏少，食不得味，縱食不生肌，膚胸中痰熱，煩滿憤悶方。

甘草兩小麥五合黃耆兩二人參兩知母兩二大棗擘半夏兩三括

蕁兩一粳米升一黃芩兩一當歸兩二生

姜兩四前胡兩二芍藥兩二麥門冬兩二龍骨兩三桂心兩三竹葉兩二

右十八味切，用東流水二升，煮取五升，去滓，分服一升，日三夜二，不過兩劑，如湯沃雪，效。忌海藻、菘菜、羊肉、餛飩、生葱。

●盜汗

崔氏療盜汗夜睡中即汗，夕不休，必得風方外

麻黃根細切小麥升

右二味以水一斗二升，煮小麥得九升，內麻黃根，煮之得三升，去滓，分為三服，常夜服之，不過兩劑即止。

●汗出不止

集驗療止汗粉藥方外

牡蛎兩附子兩麻黃根兩二

右三味，搗篩，以白粉一升，和合粉汗，夕止，忌豬肉。

澤瀉湯同療大虛煩躁，止汗，治氣方

澤瀉兩茯苓兩牡蛎兩白朮兩生姜兩

虛勞 盜汗汗出不止

右五味切以水八升煮取二升分服一升日再服

又大病之後虛汗不可止方同

杜仲 牡蛎等分

右二味持下篩向暮臥以水服一錢以午前汗止者不再服夕之令人乾燥若汗不止者復服一錢不過再必愈有驗天行及百病後虛吸漏汗遂溫之無不止者

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

骨蒸尸疰

●骨蒸

古今錄驗解五蒸湯外

甘草兩 茯苓兩 人參兩 葛根兩

乾地黄兩 知母兩 黃芩兩 石膏兩

碎粳米一竹葉把

右十味切以水九升煮取二升半分為三服亦可以水三升煮小麥

一升乃煮藥忌海藻菘菜蕪荑

大酢范汪同一方無甘酢菘

竹葉飲同療骨蒸唇乾口燥欲得水

止渴方

竹葉一握 麥門冬一升 大棗三顆 甘草三兩

草高 半夏一升湯洗 粳米五合 生姜三兩

右七味切以水五升煮取二升半分溫三服忌羊肉錫海藻菘菜

又方同

麥門冬一升 小麥二升 枸杞根切三升

右三味以水一斗煮取三升煮小

骨蒸尸疰 骨蒸

麥熟去滓分溫日三服
又療骨蒸悟導士方同

紫苑 桔梗 續斷 青竹茹

五味子 各兩 桑白皮 五兩 甘草 三兩

乾地黄 五兩 赤小豆 一升

右九味切以水九升煮取三升五合分溫三服五六劑十年者亦差每隔五日一劑初發即服大驗勿輕之可頻服立驗蘇遊去感論云主肺氣效者相當餘同忌海藻菘菜猪肉蕪荳

備急療瘧瘵鬼氣狂忤骨蒸秘驗方同

大黃 別漬湯飲成 鈞藤

升麻 甘草 各二兩 丁香 三枚 湯

右六味切以水七升煮取二升八合去滓分作三服又用牛黃犀角剉末朱砂射香各一分細研分為三分每服以一分內湯中服經用多效時忌猪肉粘食生冷芻菜海藻生菜蘇遊同一方有黃芩二兩

必效療瘧瘵氣壯熱兼效又為骨蒸

驗方同

柴胡 四兩 茯苓 白朮 枳實 各二兩

右四味切以水七升煮取二升半分為三服積熱不歇即加芩硝六分取利除熱之後每三日服一劑差後每日一劑肥白終身永除忌桃李雀肉大酢

張文仲療虛損慘頓不食四體勞強

時翁夕熱無氣力作骨蒸候方同

童子小便 一大升 淡葱白 一合

右四味合煎取三分中分之二服使盡日別一劑服之至十劑愈若經服三四劑覺四體益熱即服後方

又方同

小便 一大升 淡葱白 一合 豉 一合 生

姜 一大 生地黃 一握

右五味合煎六七沸絞取汁半升

骨蒸尸注 骨蒸

許分為兩服或三服每服空服，夕至二七日必差，夕後停三四日將息更服，二七日神驗，每服五六劑，覺內小冷，即服前方二方，以意斟酌，間服常夜合浸頃久，便即煎服，至五合半令服了，至欲明更服後，丸服訖，至日出時不妨食，至晚間未食更一服，忌蕪羹。

蘆根飲 同療骨蒸肺痿煩燥不能食方

蘆根切訖 麥門冬去心 地骨皮各半
生薑去皮切 橘皮 茯苓各五

右六味切以水二斗，煮取八升，絞去滓，分溫服，夕別相去八九里，昼三服，夜二服，覆取汗，忌酢物，未好差更作若兼服，其人或胸中寒，或直惡寒及虛脹并痛者，加吳茱萸八兩。

廣濟療腹脹瘦病不可食方 同
柴胡 茯苓各半 枳實炙 白朮

人參 麥門冬去心 生薑各六分

右七味切以水六升，煮取一升八合，絞去滓，分溫三服，夕別相去七八里，喫一服，不利，忌生冷油膩小豆粘食桃李酢物雀肉等。

醫局生犀散 局治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱盜汗五心煩燥四肢困倦食不生肥及大病後餘毒不解或傷寒後食羊肉體熱不除方

羚羊角 地骨皮 秦艽 麥門冬 枳殼炒 大黃蒸 柴胡 茯苓 赤芍藥 桑白皮 黃芪 人參 鼈甲醋炙

右等分粗末二盞水一盞青蒿少許前六分食後溫服兒分減
國老散 同聚宝治骨蒸熱久去三焦壅肺虛熱不思飲食大小并宜此方

甘草少 銀柴胡 秦艽 大烏

梅肉焙乾

未食後熱湯服忌炙博

●尸注附 鬼氣精魅

走馬湯同備急張仲景療飛尸方

巴豆二枚去心皮 杏仁二枚去皮尖

右二物綿纏槌令極碎投熱湯二

合指捻取白汁便飲之食頃當下

老少量服之通療鬼擊病忌野豬

肉蘆筍

治卒中惡風角弓反張或飛尸遁尸

心腹絞痛者方十

乾地黄 茯苓 川芎 當歸

甘草各 吳茱萸 桂心 乾姜

芍藥各 梔子仁各

右十味以水八升煮取三升

分三服痛甚者加羊脂二兩當歸

人參為藥各一兩心腹堅急加大

黃三兩

廣濟初得遁尸鬼症心腹中刺痛不

可方外

青木香分六 丁香分六 鬼箭羽 桔

梗 紫蘊 橘皮 當歸各 生

姜各 枳殼十四分 桃梟十四枚

右十味切以水九升煮取三升絞

去滓分為三服日晚再服以快利為

度忌如藥法一方無橘皮桃梟

●諸症

小品五疰湯外主卒中賊風遁尸鬼

邪心腹刺痛大脹急方

大黃二兩別 甘草二兩 烏頭十枚剉生

姜半 桂心四 芍藥 當歸各 蜜

方八味切以水九升煮取三升烏

頭別內蜜中煎令得一升投著湯

中去滓分服三合如人行三十里

又一服日三不知可至四合王尹

咸數用之忌海藻菘菜猪肉生葱

千金

秦芫覽甲飲寶鑑 治骨蒸壯熱肌肉

消瘦唇紅頰赤氣虛四肢倦夜有

骨蒸尸注 附鬼氣精魅諸症 二百三十三

盜汗方

柴胡 鼈甲去裙醋炙 地骨皮

各一兩 秦艽 當歸 知母各半

右六味為粗末，每服五錢，水一戥，青蒿五葉，烏梅一箇，煎至七分，去粗溫服，空心臨臥各一服。

水病

●水腫

崔氏療水病方外

烏豆粒一大升 桑根白皮五升

右二味以水五斗和煮可一斗汁，瀝去滓，於銅器中重湯煎如錫，可作丸，即成所患人，每服利小便為度，其小便復舊色，身上腫除，候體中熱，夕煩即服之，禁房及死牛馬肉、油膩、麴酒等，經數日得食羊頭肉、兎肉，水病忌食羊頭蹄，此云得食恐誤也。 又療水病洪腫氣脹，不消食方同

乾香薷平

右一味細剉，內釜中，以水淹之，出香薷上數寸，煮使氣兩盡，去滓，清澄之，漸火煎，令可丸，服五丸，如梧子，日三，稍加之，以小便利為也，無所忌，經心錄同

又療水病身腫方同

鯉魚一頭，極大者，去頭尾及骨，唯取肉

水病 水腫

右一味以水二斗赤小豆一升和
魚肉煮可取二升以上汁生布絞
去滓頓服盡如不能盡分為二服
後服令煖服訖下利盡即差慎牛
肉白酒生冷熱猪魚油酪藥滓埋
之勿令人食

苦瓠圓干治大水頭面偏身腫脹方

苦瓠白穰實捻如大豆以麪裹
煮一沸空腹吞七枚至午當出
一升三四日水自出不止大瘦

乃瘥三年內慎口味苦瓠須好

無厭翳細理研淨者不尔有毒

不堪用崔氏用子作薄鈍服二

之如此隔日作服漸加至三七

枚以小便利為度小便若太多

即一二日停止

麻子湯同治偏身流腫方

麻子五升赤小豆三升當陸一升防風

右五味咬咀先搗麻子令熟以水

三斗煮麻子取一斗三升去滓內

藥及豆煮取四升去滓食豆飲汁

千金翼澤漆根湯外主水通身洪腫

四肢無堪或從消渴或從黃疸支

飲內虛不足營衛不通血氣不化

氣實皮膚中喘息不安腹中響々

脹滿眼不得視方

澤漆根十兩赤小豆二升甘草五兩

魚一枚重五斤麥門冬二兩茯苓三兩

淨去腸人參生薑八兩

右八味切以水一斗七升先煮鯉

魚豆減七升去之內藥取四升半

去滓一服三合日三弱人二合日

再服氣下喘止可至四合時時小

便利腫氣減或小溲下若小便大

利還從一合始大利止若無鯉魚

鯽魚等亦可用若水甚不得臥々

不得轉側加澤漆一片渴加栝樓

三兩欬加紫苑二兩細辛一兩欬

冬花一兩桂心三兩增魚汁二升

忌海藻菘菜醋物深師

●風水

越婢湯金 風水惡風一身悉腫脈浮

不渴續自汗出無大熱主之

麻黃六兩 石膏半斤 生姜三兩 大棗五枚

甘草二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上

沫內諸藥煮取三升分溫三服惡

風者加附子一枚炮○風水加木

四兩古今錄驗外豈云效肺脹加

增之忌猪肉羊

肉餘忌同前

木防已湯外 療大風水脈浮為在

表其人或頭汗出表無他病但下

重故知從腰以上為和腰以下當

腫及陰難屈伸

生姜三兩 大棗十三枚 白朮四兩 木防

已四兩 甘草二兩 黃耆五兩

右六味切以水六升煮取二升分

三服喘者加麻黃身重胃中不和

者加芍藥氣上衝者加桂心下久

寒者加細辛防已黃耆為本服藥

欲解當如與行皮中狀從腰以下

冷如冰服湯後坐被上又以一被

繞腰溫下令得汗乃出則愈也忌

海藻松菜桃李雀肉等

香薷朮丸同 療暴水風水氣水腫或

瘡中水通身皆腫主之

乾香薷一斤 白朮七兩

右二味搗末下篩末濃煮香薷取

汁和朮為丸飲服如梧子十九日

夜四五服利小便極良夏取花葉

合用亦佳忌青魚餘忌同前

崔氏療風水腫毒氣通身方同

楮白皮三兩 桑根白皮三兩 橘皮一斤

紫蘇四兩 生姜同 大豆三升

右六味切以水九升煮取一升絞

去滓分溫為四服與三劑佳百日

內忌鹹醋

古今錄驗麻黃湯同 療風水身體面

目盡浮腫腰背牽引髀股不能食

水病 風水

麻黃五雲 桂心四 生姜三 甘草三
附子二枚 炮

右五味切以水一斗先煎麻黃減二升內藥煎取三升一服一升日三忌野猪肉蘆笋

●皮水

木防已湯外療皮水如腫水氣在皮層中四肢集々動宜此方

木防已三 黃耆三 桂心三 茯苓六 甘草二
炙

右五味切以水六升煮取二升分再服忌海藻菘菜生葱醋物

甘草麻黃湯同皮水一身面目悉腫主之

甘草二 麻黃四
炙

右二味以水五升先煮麻黃再沸去上沫乃內甘草煮得一升絞去滓適寒溫內服一升重覆之日移二丈所當汗出汗出勿復服不汗乃復服當慎護風寒數日乃出入

忌海藻菘菜

越婢加朮湯同皮水主之方

麻黃六 大棗十枚 白朮四 生姜四
切 甘草二 石膏半

右六味以水七升煮取麻黃一二沸去上沫乃內餘藥煮取二升絞去滓適寒溫服七合日三忌同前范注同○按三方並出金匱其甘草麻黃湯及越婢加朮湯並治裏水不浴獨皮水也

蒲灰散同厥而皮水者主之

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

●卒暴腫滿

范注療卒腫滿身面皆洪大方外

用大鯉魚一頭以淳苦酒三升煮之令苦酒盡訖乃食魚勿用醋及鹽豉他雜也不過再作愈備急時後用淳酒

集驗療暴患遍身腫滿方同

水病皮水卒暴腫滿 二百三十七

大豆

右一味，持篩為散，粥清服三方寸，七日再甚良驗。

●水氣

麻黃附子湯 金水之為病，其脈沉小，

屬少陰，浮者為風，無水虛脹者為

氣水，發其汗即已，脈沉者宜此湯。

浮者宜杏子湯。杏子湯未見，恐是麻黃杏子甘草石

湯。

麻黃^{三兩} 甘草^{二兩} 附子^{一枚}

右三味，以水七升，先煮麻黃，去上沫，內諸藥，煮取二升半，溫服八合，日三服。

木防己湯 外療腫患下水氣，四肢腫，

聾夕動方。

木防己^{三兩} 甘草^兩 桂心^兩 茯苓^兩

黃耆^{三兩} 生姜^兩 白朮^{三兩} 芍藥^兩

右八味切，以水八升，煮取三升，二合分為四服，有人患下是胃寒，加

當歸三兩，人參二兩半，竜骨二兩，水一斗，煮取三升，二合分為四服，相去二十里，頓服，不下即不須，內此三物也，忌海藻、菘菜、桃李、雀肉、生葱、大酢。

張文仲周大候正大將軍平公于禮患氣兼水，身面腫垂死，長壽公姚僧垣處二方，應手即差，先服湯方同。

素白皮^{四兩} 橘皮^{二兩} 海藻^{三兩} 茯苓^兩 郁李人^{碎各四兩} 赤小豆^{一升}

右六味，以水八升，煮取二升半，分三服，甚效。古今錄驗療氣水，身腫脹滿，姚大夫治燕公應州錄事于志光送云：從來知不能服湯事，較急勿不努力服之，服此湯若微覺為益，頓服三兩劑，勿不服此藥，甚易，必無逆忤，如不能服，可服後丸，勿遲不應急耳。

又方同 水病 水氣 二百三十八

橘皮五分 郁李人十分 茯苓八分 葶藶六分 防己六分 桑根白皮五分 甘遂四分 燕子四分

右八味持下篩蜜和丸取殼白皮火炙焦黃煮飲服十丸如梧子日再服若不得宣通稍々加常以宜為度渴者飲此方老蔣公處與張大夫家効忌酢物

●水腫欬逆上氣及氣滿胸急澤漆根湯外夫水在五藏令人欬逆

喘上氣腹大嚮々兩脚腫目下有臥蚕微渴不得安臥氣奔短氣有頃及復小便難少而數肺病胸滿隱痛宜利小便水氣迫肺吸々寒熱方

生鯉魚一頭重五斤 麥門冬二兩 甘草八兩 炙人參二兩 茯苓二兩 沢漆根生者 右六味切以水一斗七升煮魚取一斗去魚以煮藥取四分服日三小便利為度不利增服之大便

如利而小便未利者增至四合服一日氣即下得安臥有寒可用生姜八兩深師同

古今錄驗療氣忽發滿胸急者方外 茯苓四兩 杏仁四兩 橘皮二兩

右三味切以水六升煮取二升分三服日三隨小便下愈飲盡更作忌醋物

又方 甘遂三兩 茯苓四兩 杏仁四兩 黃芩同 沢漆葉三兩 沢漆三兩 郁李人二兩 碎橘皮三兩 朴消四兩

右九味切以水九升煮取二升七合分三服忌醋物

又方 桑根白皮升 郁李人升 赤小豆二升 橘皮三兩 蘓葉三兩 茅根三升 右六味切以水一斗煮取三升適冷煖稍々飲之

又方 水病 水腫欬逆上氣 二百三十九

乘白皮四兩 橘皮三兩 茯苓四兩 甘遂三兩 黃芩三兩 赤小豆一升 杏仁一升 沃三兩 瀉三兩

右八味切以水九升煮取二升半分三服忌酢物一方甘草三兩

●石水 ●水盞

集驗膀胱石水四肢瘦腹腫方外

大豆五升 防已四兩 桑根白皮切三升 白木四兩 沃漆葉切三升 射干四兩 穀四兩 白皮四兩

右七味切以水一斗半煮取六升去滓內好酒三升更煎取五升分

五服日再夜一餘前明日服之

千金療膀胱石水四肢瘦腫方同

桑根白皮六兩 射干四兩 澤源五兩 澤漆切四升 茯苓四兩 防已一兩 黃芩四兩 白四兩 木同 大豆三升

右九味切以水五升煮大豆取三斗去滓澄清取汁一斗下藥煮取

三升空服温分三服

文仲療若唯腹大動搖水聲皮膚黑

名曰水盞第二方同

巴豆九十枚去心 杏仁六十枚去皮尖

右二味拊相和服如小豆一枚以水下為度勿飲酒佳忌猪肉芦筍

●水腫大小便澀

崔氏療水腫盛滿氣喘欬小便澀如

血者方外

桑根白皮六兩 澤漆葉切二升 白木二兩 生姜四兩 郁李人六兩 杏仁二兩 橘皮二兩 玄參三兩

右八味切以水九升急著火煮取

四升温分四服相去六七里久或利黃水三五升及小便利為候即

差者可頻服三四劑佳忌桃李雀肉青魚酢等

●雜療

有人患氣急積久不瘥遂成水腫如

此者最諸皮中浮水攻面目身體從腰以上腫皆以此湯發汗悉愈

水病水腫大小便澀雜療 二百四十

方_千

麻黃_{二兩} 甘草_{一兩}

右二味，咬咀，以水五升，煮麻黃，再去沫，內甘草，取三升，分三服，取汗愈，慎風冷等。

千金翼，鯉魚炙，主腫滿方_外

鯉魚長一尺五寸，以尿漬，令沒

一宿，平旦以水從口中灌至尾，

微火灸令熟，微熟，去皮，病勿食，

鹽頓服之，不能者，再服，令盡神

方_{肘後備急張文仲千金同}

又有人虛肥，積年氣上似水病，眼似腫而脚不腫方_同

穀猪葉_{八兩}

右一味，以水一斗，煮取六升，去滓

內米煮粥，亦當以水煮羹菜等，皆

用之，秋中多收，以擬經冬用，其水

多小濃淡，任人勿拘，此方慎蒜，麩

猪雞魚油膩重者，三年服之，永差

輕者一年。

崔氏療水腫已上少腹連臍硬氣上

悶方_同

苦瓠子_{一兩}

右一味，以麩如作餛飩法，其麩勿

著，鹽作二七枚，湯中煮待浮，漉出

及煖吞之，如不可以湯汁下之，能

禁生冷醋滑及肉油膩佳，若恐虛

煮牛乳服之，如不可以湯汁下之，

能加至三七枚，以小便利為候，小

便若太多即歇，一二日以腹腫消

即止。

古今錄驗，療脾胃水面目手足附腫

胃管墜大滿，短氣不能動搖方_外

赤根白皮_{切三升} 桂心_{一尺} 生姜_{三兩}

人參_{一兩}

右四味，切，以水三升，煮赤白皮得

一升，絞去滓，肉桂等，並飴十一兩，

煮竭得七合，消息，更服，須臾當下，

不盡服一升，忌生菜。

五靈湯_聖治膜外水氣

水病 雜療

木通劉訶勒皮 防己劉赤茯苓
去黑陳皮一兩

水煎五錢寬熱喫好茶
紫蘊煮散同膜外水氣

紫蘊 防風 白朮 桑皮等
其末水煎寬熱去白朮加甘草功
効如前方

塌氣散幼々新書 治腫

中庸 赤豆 橘皮紅 蘿蔔
枳榔 甘州各半 木香一分

末二錢水小盞姜末煎六分通口
服量共

實脾散 本事方 治四種水氣

大附子一箇炮 草薢子去乾姜
炮各 甘草二兩 大腹連皮 木瓜一箇
穰切

右用水於砂器內同煎一半以來
擘開乾姜心內不白為度不得全
令水乾恐近底焦取出剉焙為末
每服空心日午用沸湯點服○一

方厚朴白朮木香茯苓共十味治
偏身腫不煩渴大便自調或溏泄
小便難少而不赤澀此屬陪水此
湯主之

枳榔散準繩 治水腫

枳榔半兩 商陸 生姜各一兩 桑白皮
二兩 甘草炙二

右除枳榔外水二大盞煎至一大
盞去滓五更初分作二服每服調
枳榔末二錢半服至平明當利如
未利再服

除濕湯同 治寒濕所傷身體重腰

脚酸疼大便溏泄小便或澀或利
半夏炒 厚朴姜 蒼朮米泔
製 薤白各二兩 薤香葉 陳皮去 白茯苓去皮
甘草炙 白朮生

右咬咀每服四錢水一盞姜七片
煎一枚煎七分食前溫服

防己湯聖 治病後氣虛津液不通皮
膚虛滿

水病 雜療

防己 黃耆劉桂去鹿皮各一兩半 茯苓 去黑皮三兩 甘草 炙令赤劉一兩 赤

右五味鹿搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓溫服日再服人參湯同治厥逆三焦不調及脾胃

氣攻頭面虛腫氣喘心急脹滿友人參 赤茯苓 去黑皮 厚朴 去麋皮 姜炙 紫蘆子 炒 大腹皮 棗根 白皮 劉 栝柳 劉各一兩 陳橘皮 去白焙 防己 各一兩

右九味鹿搗篩每服五錢匕水一盞姜一塊相破葱白三莖切煎至八分去滓空心溫服

木通湯同治偏身腫

木通 劉 苦葫蘆子 各一兩半 澤源 防己 各三分 猪苓 去黑皮 海蛤 細研各兩 右六味鹿搗篩每服五錢匕水七分酒七分入葱白五寸切煎至八分去滓食前溫服當下小便數升腫消

牽牛湯同治水腫

牽牛子 栝柳 煨木香 赤茯苓 陳橘皮 各一兩

右五味鹿搗篩每服二錢匕水一盞煎三兩沸去滓溫服此藥不獨療水病凡肺氣實腫氣上禁心胸不可忍皆治之

正脾散 揚氏方 治大病之後脾氣虛弱中滿腹脹四肢虛浮狀如水氣此藥主之

蓬莪朮 炮 香附子 炒 陳橘皮 去白 甘草 炙

右各等分為細末每服二錢煎燈心木瓜湯調下 女麴散 十 治痢後虛腫水腫者服此藥小便利得止腫亦消

女麴 升 乾姜 細辛 椒目 附子 桂心 各一兩

右六味治下篩酒服方寸匕不知加至二三匕日三產後虛滿者太水病 雜療 二百四十三

良

黃病

●諸黃

桂枝加黃耆湯金諸病黃家但利其
小便假令脈浮當以汗解之宜此
湯方

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生姜三兩
大棗十五枚黃耆二兩

右六味以水八升煮取三升溫服
一升須臾飲熱稀粥一升餘以助
藥力溫覆取微汗若不汗更服

柴胡湯同諸黃腹痛而嘔者主之方
傷寒雜
病門

瓜蒂散外療天行毒熱通貫臟腑沉
鼓骨髓之間或為黃疸黑疸赤疸
白疸穀疸馬黃等疾喘息須臾而
絕主之

瓜蒂七枚赤小豆一升秫米一升

右三味搗篩為散取如大豆粒吹
於兩鼻之中甚良不差間日復服
之

黃病 諸黃

瓜蒂散同療諸黃、閻黃、眼閻及大角赤黑黃、先擲手足、內黃患渴疽黃、眼赤黃、腎黃、小便不通、氣急心悶、五色黃方。

丁香各十枚 瓜蒂各十枚 赤小豆各十枚
右三味、細搗篩、取煖水、一雞子許、和服、大神驗。

茵陳湯及凡同療一切黃、蔣九處得、其父遠使、得黃服此極効方。

茵陳四兩 大黃三兩 黃芩三兩 梔子三兩
右四味、切、以水五升、煮取三升、分為三服、空肚服之、不然搗篩、蜜和為丸、飲服廿丸、稍々加至二十五丸、量病與之、重者作湯、勝丸、日一服、忌羊肉、酒、麪、熱物等、以差為限、小便黃色、及身黃者、並主之。

●急黃證

瓜蒂散外急黃身如金色主之。
赤小豆三升 丁香三升 黍米三升 瓜蒂二升
麯香二升 薑一分 青布二方寸 燒灰二方寸

右七味、持篩為散、飲服一錢匕、則下黃水、其黃則定、忌生冷、熱麪、粘食、陳臭等、一方止三味。

●黃汗證

者芍桂酒湯金匱問曰黃汗之為病、身體腫、發熱、汗出而渴、狀如風水、汗沾衣、色正黃如藥汁、脈自沉、何從得之、師曰、以汗出入水中浴、從汗孔入得之、宜此方。

黃耆五兩 芍藥三兩 桂枝三兩

右三味、以苦酒一升、水七升、相和煮、取三升、溫服一升、當心煩、服至六七日、乃解、若心煩不止者、以苦酒阻故也。一方用美酒、醃代苦酒。

桂枝加黃耆湯同黃汗之病、兩脛自冷、假令發熱、此屬歷節、食已汗出、

又身常暮盜汗出者、此榮氣也、若汗出已、反發熱者、久久其身必甲錯、發熱不止者、必生惡瘡、若身重、汗出已、輒輕者、久久必身羸、即

黃病 急黃黃汗 二百四十五

胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰體弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩燥小便不利此為黃汗宜此湯

桂枝^{三兩}芍藥^{三兩}甘草^{二兩}生姜^{三兩}大枣^{十二枚}黃耆^{二兩}

右六味以水八升煮取三升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫服微汗若不汗更服

●黃疸

茵陳五苓散 金黃疸病主之一本云及五苓散並主之

茵陳蒿末^{十分}五苓散五分

方見傷寒煩渴門右二物和先食飲方寸匕日三服

大黃消石湯 同黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜此湯

大黃 黃蘗 消石^{各五兩}梔子^{十五枚}

右四味以水六升煮取三升去滓

內消石更煮取一升頓服

小半夏湯 傷黃疸病小便色不變欲

自利腹滿而喘不可除熱夕除必噦夕者主之^{方傷寒} 嘔吐門

治萎黃身面目悉黃如金色小便如濃者藥汁衆醫不能療者方千金

茵陳 梔子^{各五兩}黃芩 大黃

柴胡 升麻^{各二兩}龍胆^{二兩}

右七味咬咀以水八升煮取二升七合分三服若身體羸去大黃加

梔子人五六兩生黃汁一升^{延年秘錄}無茵陳有梔子四兩括蕪^{三兩}世消二兩近効方加枳實二兩

●夫黃瘖已久變作桃皮色心下有堅嘔逆不可飲食小便極赤色少四肢逆冷脈深沉極微細遲者不宜服此方得下必變碗也宜與大茵陳湯除大黃與生地黃五兩服湯盡消息看脈小浮出形小見不甚沉微便可治也脈不見者黃當明不復作桃皮色心下自寬也

茵陳蒿湯方次出後十一味者是
茵陳蒿湯外療黃疸身目皆黃皮膚
黧塵出者主之

茵陳蒿一把梔子三十石羔一斤
千金方加大黃三兩右三味以水
八升煮取二升半去滓以猛火燒
石羔令正赤投湯中沸定取清汁
適寒溫服一升自覆令汗出周身
遍以溫粉々之則愈若不汗更服
一升汗出乃愈也漢師古今錄驗
千金翼同

●女勞疸及黑疸

消石礬石散傷仲景傷寒論黃家日
晡發熱而惡寒此為女勞得之勝
脫急小腹滿身體盡黃額上反黑
足下熱因作黑疸大便必黑腹臌
脹滿如水狀大便黑澹者此女勞
之病非水也腹滿者難療

消石熬礬石燒令
右二味等分搗絹篩以大麥粥汁

和服方寸匕日三重夜覆取汗病
隨大小便去小便正黃大便正黑
也大麥則須是死皮麥者千金方
云消石二分熬令燥礬石一分熬
令燥故注之肘後小品崔氏文仲
千金范汪深師并同

千金翼療黃疸之為病日晡所發熱
惡寒小腹急體黃額黑大便黑澹
泄足下熱此為女勞也腹滿者難
療方外

消石五兩石羔同

右二味為散以大麥粥汁服方寸
匕日三小便極利則差小品千金
備急文冲同

●酒疸及穀疸

半夏湯干治酒癰陰胎心脹滿骨肉
沉重逆害飲食乃至小便赤黃此
根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃
內痰所致方

半夏一升生姜 黃芩 茵陳
當歸 前胡 枳實 甘草
黃病 女勞疸及黑疸酒疸及黑疸二百四十七

大戟全 白朮全

右十一味，哎咀，以水一斗，煮取三升，分作三服。

●許仁則療諸黃

麻黃等五味湯外，許仁則療急黃病。此病始得，與前天行病不多異。五六日，但加身體黃甚，者淚汗唾，小便如麩色，眼白睛正黃，其更重，狀與天行病候最重者無別如至。此困自須依前救天行最重，半身等分，十味湯救之。若未至此者，宜依後方。急黃狀始得，大類天行，經三兩日，宜合此方服之，發汗以洩黃勢也。

麻黃三兩 乾葛五兩 石羔八兩 生姜六兩 茵陳二兩

右藥切，以水八升，煮取二升七合，去滓，分溫三服，夕相去十里久，服訖，當欲汗，則覆被微取汗，以散之。梔子等五味湯，服前麻黃等五味

湯服之，取汗，夕出後未歇，經三五日，又合此湯，以取利方。

梔子三兩 柴胡三兩 黃芩三兩 茵陳三兩 芒硝六兩

右藥切，以水八升，煮四味，取二升六合，去滓，內芒硝，攪令消，分溫三服，如人行十里久，更服之，效。

茵陳湯，聖治黃疸，目黃，小便如血，心煩，躁悶，口苦，頭痛方。

茵陳蒿 山梔子各一分 甘草一分 木通一分 括萎根一分 柴胡一分 麥門冬一分

右七味，鹿持篩，每服五錢匕，水二錢，入竹葉三七片，同煎至一盞，去滓，食後服。

木通湯，同治黃疸，脾胃積熱，及肉皆黃，煩躁，口苦，小便赤澀方。

木通一分 瞿麥穗一分 赤茯苓一分 白茅根一分 大青一分 秦朮一分 生乾地黄一分

黃病 許仁則療諸黃 二百四十八

右七味鹿持節每服五錢匕水一
盞半煎至八分去滓食前溫服

秦朮湯同治陰黃不欲人言小便不
利方

秦朮去莖 旋復花半 赤茯苓去
皮半 甘草炙剉

右四味鹿持節每服四錢匕以牛
乳一盞煎取六分去滓溫服不拘
時候

半夏湯 治陰黃小便色不變欲自
利腹滿而喘者必噦方

半夏湯洗七遍 人參二 葛根二

右三味剉如麻豆每服四錢匕以
水一盞入生姜半分切煎取七分
去滓不計時候溫服

血病

●吐血唾血及衄血

凡吐血後體中但自掩々然心中不
悶者輒自愈假令煩躁心中悶亂
紛紛嘔吐顛倒不安醫工又與黃
土湯阿膠散益加悶亂卒至不洩
如此悶者當急吐之方千金

瓜蒂二分 杜蘅 人參各一分

右三味浴下篩服一錢匕或無水
漿但得下即可羸人小減之吐去
青黃或吐血一二升無苦

黃土湯同治吐血方

伏龍肝雞子大 桂心 乾姜

當歸 芍藥 白芷 甘州

阿膠 芎藭 生地黄八 細辛兩

半 吳茱萸二

右十二味咬咀以酒七升水三升
合煮三升半去滓內膠煮取三升
分三服亦治衄血

澤蘭湯同治傷中裏急胸脇疼痛欲
血病 吐血唾血及衄血 二百四十九

嘔吐時寒時熱小便赤黃此皆傷於房勞故也

澤蘭 糖升 桂心 素根白皮

人參 兩各 遠志 二兩 生姜 五兩 麻仁 一升

右八味咬咀以淳酒一斗五升煮取七升去滓內糖食前服一升日三夜一勿勞動

犀角地黄湯 同 治傷寒及溫病應發

汗而不汗之肉畜血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便黑面黃消

瘀血方 方見傷寒鼻衄吐血下血門小 芍藥地黃湯是也

治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止欲絕並主之方 同

艾葉 竹筴 各一兩 阿膠 如手掌大 乾姜

右四味咬咀以水三升煮取一升去滓內馬通汁半升煮取一升頓服

治虛勞崩中吐血下血上氣短氣欲絕面黑如漆方

黃耆 芍藥 芎藭 甘草 各一兩 生姜 一斤

右五味咬咀以酒五升浸一宿明且更以水五升煮取四升四服日三夜一陰中毒如湯沃雪凡夏月不得病浸藥酒客勞熱發痔下血其穀道熱者去生姜用生地黃代之凡進三兩劑

竹筴湯 同 治吐血汗血大小便下血方 同

竹茹 二升 甘草 芎藭 黃芩 當歸 各一分 芍藥 白朮 人參 桂心 各二兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

瀉心湯 金 心氣不足吐血衄血用此

方亦治霍亂 方見五藏經心門千金也千金不足作不定本經大黃主治云心氣

不足吐血衄血胸脇刺痛同黃連煎服

●下血

續斷止血湯千金翼主先便下血此為近血方

續斷 當歸 阿膠炙 桔梗

桂心各三兩 芍藥 乾姜 乾地黄

各蒲黃一升甘草兩

右十味、哎咀、以水一斗、煮取五升、去滓、下阿膠消盡、入蒲黃分為三服

麥門冬湯同治凡下血、虛極方

麥門冬 白朮各兩 甘草一兩 牡蠣

芍藥 阿膠各兩 大棗十枚

右七味、哎咀、以水八升、煮取二升、分再服

●尿血

桂芍湯聖治結陰便血、至三升者方

桂去麋皮 赤芍藥 芍藥 當歸

切 黃芩去黑心 甘草炙

右六味、鹿搏篩、每服二錢匕、水一盞、入竹茹作彈子大、一塊同煎至

七分、去滓、空心溫服、日二服

千金療房損傷中尿血方外

牡蠣熱 車前子 桂心 黃芩

右四味等分、搗篩為散

治小便血方同

生地黃八兩 柏葉一把 黃芩 阿膠

各兩

右四味、哎咀、以水八升、煮取三升、去滓、下膠、分三服、一方加甘草二兩

古今錄驗療尿血方外

酒服蒲黃二方寸匕、日二服、水服亦得

消渴

●消渴

千金論曰夫消渴者凡積久飲酒無
 有不成消渴者然則大寒凝海而
 酒不凍明其酒性酷熱物無以加
 睡炙鹽鹹此味酒客多嗜不離其
 口三觴之後制不由己飲噉無度
 咀嚼鮮醬不擇酸鹹積年長夜酣
 興不懈遂使三焦猛熱五臟乾燥
 木石猶且焦枯在人何能不渴瘵
 之愈否屬在病者若能如方節慎
 旬月而瘵不自愛惜死不旋踵方
 書醫藥寔多有效其如不慎者何
 其呀慎者有三一飲酒二房室三
 鹹食及麩能慎此者雖不服藥而
 自可無他病不知此者縱有金丹
 亦不可救淺思慎之凡消渴之人
 愈與未愈常須慮患大難向者消渴
 之人必於大骨節間忽發癰疽而
 卒所以戒在大癰也當預備瘡藥

消渴

以防之、宜服麥門冬丸、除腸胃熱、實兼消渴方、

麥門冬八分 茯苓八分 黃連八分

石羔分 萎蕤分 龍胆分 黃芩分

升麻分 枳實分 生薑分

地骨皮分 茅根分 粟米分

右十五味、以水六升、煮茅根及粟米令爛、餘十三味、搗末、蜜和丸、如梧子、以前茅根、粟米汁、作飲服十

丸、日二、若渴則共此飲、至足、大麻亦得、忌猪肉、酢物、按近効渴後、成瘧、瘧水、病亦用、友

括樓湯同上

括樓五 麥門冬升 生薑五 茅根升

右五味、以水一斗、煮取三升、分為三服、忌如常法、

茯苓湯外、胃腑實熱、引飲常湯、澹熱止湯方、

茯苓五 枳樓五 知母四 小

麥二 麥門冬五 大棗二十 生

地黃六 萎蕤四 淡竹葉三

右九味、切、以水三升、先煮小麥、竹葉、取九升、去滓、內諸藥、煮取四升、分四服、不問早晚、隨渴即進、非但正治、胃渴、通治、渴病、熱即服之、忌蕪荑、醋物、

黃耆湯同上

黃耆三 茯苓三 枳實二 甘草三

麥門冬三 乾地黄五

右六味、切、以水八升、煮取二升半、分三服、忌酢物、蕪荑、海藻、菘菜、日進一劑、服十劑、託服丸藥、後腎消、門中宜補丸是、

又消渴陰脈絕、胃反吐食方、同上

茯苓八 澤瀉四 白朮三 生薑三

桂心二 甘草二

右六味、切、以水一斗、煮小麥三升、取五升、去滓、內茯苓等、煮取二升、半、一服、八合、日再、

消渴

二百五十三

麥門冬丸 同療消渴方

麥門冬五兩 乾地黄三兩 蜀升麻五兩 枳椇七兩 苦參八兩 人參三兩 黃連五兩 黃蘗五兩

右九味末之，以牛乳和衆手捻作丸，子暴乾，以飲服二十九丸，日二加至五六十丸，忌如法。

千金療消渴麥門冬湯方 同

蘆根切 苧根切 石羔六分 生薑五兩 枳椇五兩 小麥二升 麥門冬二升

右七味切，以水二斗煮取六升，去滓，一服一升，渴即任意飲，未瘥更作。

廣濟療消渴口苦舌乾方 同

麥門冬五兩 茅根一升 枳椇三兩 烏梅十顆 小麥三升 苧一升

右六味，以水九升煮取三升，去滓，細々含咽，分為四五服，忌如法。

●渴利虛經脈溢成癰膿

千金療下焦虛熱注脾胃從脾注肺

好渴利方 外

小麥一升 竹葉三升 麥門冬四兩 茯苓四兩 甘草三兩 大棗三十枚 生薑五兩

枳椇五兩 地骨皮一升

右九味切，先以水三升分三服，忌海藻菘菜酢物。

茯神湯 同療渴利虛熱引飲不上消

熱止渴方

茯神四兩 石羔八兩 地骨皮一升 竹葉三升 枳椇五兩 萎蕤四兩 麥門冬二升 知母四兩 生地黄一升 宿姜四兩

右十味切，以水一斗二升下大棗三十枚擘，并藥煮取四升，分為四服，忌無蕘。

又消渴利方 同

葵根五升盤大兩束切

右一味，以水五升煮取三升，病不食，平且一服三升。

●消中消渴

千金論曰：夫內消之為病，當由熱中消渴。渴利虛經脈溢成癰膿，二百五十四

所作也。小便多於所欲，令人虛極短氣。又內消者，食物皆消，作小便而又不渴。正觀十年，梓州刺史李文博先服白石英，久忽然房道強盛，經月餘漸患渴，經數日小便大利，日夜百行，以來自方療之，漸以增劇，四體羸瘦，不能起，心精神恍惚，口舌焦乾而卒。此病雖稀，甚可畏也。利時脈沉細微弱，服鈴丹散立效。其間將服除熱宜補丸，枸杞湯方。

枸杞枝葉一 括樓根三 石羔三
黃連三 甘草三

右五味水煎溫服。

阿膠湯 同療。久虛熱，小便利而多，或服石散人虛熱，多由汗出，當風取冷，患脚氣喜變動，兼消渴腎脈細弱，服此即立減方。

阿膠三 乾姜二 麻子一 遠志四
附子二 人參一 甘草三

右七味切，以水七升，煮取二升半，去滓內膠令烊，分三服。說云：小便利多，白夜數十行，至一石，令五日服之，甚良。忌如法。

黃耆湯 同主消中虛勞，少氣小便數方。

黃耆二 芍藥二 生姜二 當歸二
桂心三 甘草二 大棗三十 麥門一

冬一 乾地黄一 黃芩一
右十味切，以水一斗，煮取三升，去滓空服，溫分三服，忌如常法。

枸杞湯 治虛勞口中若渴，骨節煩熱，或寒者方。

枸杞根白皮五 麥門冬三
小麥二

右三味以水二斗，煮麥熟，藥或去滓，每服一升，日再。

近效極要論：熱中雖能食多，小便多，漸消瘦方。

地骨皮升 麥門冬三 黃連二
消渴 消中消渴，渴後便熱，生諸瘡二百五十五

小麥八人參一
右五味切水煎

●渴後小便多恐生諸瘡

調中湯外恐腎虛熱渴小便多除風

濕理石毒止小便去皮膚瘡方

升麻分四玄參分五甘草分四知母分五

茯苓分三牡蛎分六漏芦分五枳實分五

菝葜分四黃連分六

右十味搗篩飲汁服方寸匕日再服以瘥為度忌如法

又方同

栝樓分八茯苓分八玄參分四枳實分六

炙苦參分三甘草分三橘皮分三

右七味搗篩每空服以漿水服方寸匕日再忌如法

●虛勞小便白濁如脂

崔氏飲水不知休小便中如脂舌乾

渴方

黃連分五栝樓分五

右二味持末以生地黄汁和丸併

手丸每食後牛乳下五十丸日再服之忌豬肉

治虛勞尿白濁方

右取榆白皮切二升水二斗煮取五升分五服

淋

●諸淋

小品地膚湯外療下焦諸結熱小便赤黃數起出少大痛或便血温病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及步行胃熱冷飲逐熱夕結下焦及乳石熱動關格少服堅胞脹如斗大諸淋服之則通方

地膚草_三知母 猪令_去瞿麥

黃芩 升麻 通艸 海藻_一

葵子_升枳實_高

右十味切以水九升煮取三升分為三服大小便皆閉者加大黃三兩婦人房勞腎中有熱小便難不利腹滿痛脈沉細者加猪腎一具千金

廣濟療患淋來積年比醫療不能得

愈或十日五日一發即有可時今年因病更頻數二十日來不定方同

淋 諸淋

滑石 冬葵子各八分 瞿麥 石葦各五分 蒲黃六分 陳橘皮四分 芍藥 茯苓 芫硝各六分 子芩六分

右十味，搗篩為散，空服，煮後飲子服方寸匕，日二服，漸加至一匕半，忌熱穀、炙肉、酢、蒜等。

集驗療淋方同

滑石四兩 貝子三枚 茯苓 白朮 通草 芍藥各二兩

右六味，搗篩為散，酒服方寸匕，日二服，大良。

崔氏療淋散方同

石葦洗剉去毛 大蟲髓研 滑石二兩 當歸 芍藥 黃芩 冬葵子

瞿麥各一兩 亂髮三團如雞子大燒灰 茯苓二兩 右十味，為散服方寸匕，日二服。

●石淋

范汪療石淋方外

取車前子二升，用絹囊盛之，以水八升，煮取三升，去滓頓服之。

移日又服石，當下也，宿勿食服之神良。

治石淋方十

取浮石，使滿一手許，治下篩，以水三升，醋一升，煮取二升，澄清服一升，不遇三服，石出。

石淋，臍下三十六種病，不得小便，灸關元三十壯，又灸氣門三十壯，又灸水泉三十壯，足大敦是也。

●血淋

千金療血淋方外

石葦去毛 當歸 芍藥 蒲黃各分

右四味，為散服方寸匕，日三服。清心蓮子飲赤水治上盛下虛，心火炎上，口舌咽乾，煩躁微熱，小便赤澁，成欲成淋，並治之。

黃耆蜜炙 石蓮肉 赤茯苓 人參各七 甘草炙 車前子 地骨皮 麥門冬 黃芩各分

每服七八錢，水溫服，發熱加薄芎
柴胡外科正宗去車前加沢泻
八正散回

大黃 瞿麥 木通 梔子
滑石 甘草 車前子 篇蓄

右各等分，為末，每服五錢，水一鍾煎，或竹葉燈心，葱頭食後服。

雞蘇飲子 同 療血淋不絕方

雞蘇 一握 竹葉 一握 石羔 八生地
黃 切分 蜀葵子 湯分 成下

右五味，以水六升，煮取二升，去滓和葵子末，分溫二服，如人行四五里，久進一服。

●熱淋

滑石散 外療淋小便數病膀胱中熱方

滑石 二兩 括樓 三石 韋 二分
右三味，搗篩為散，以大麥粥清服方寸匕，日三。

近効療熱淋，日夜數十度，服藥不差

方同

空腹服井華水一二升，必差，韋鷓鴣進，用如神效方，喫水了後行六七百步甚良。

●勞淋

千金，夫勞淋之為病，勞倦則發痛，引氣衝灸之方外

灸足大陰百壯，在內踝上三寸，三報之，療與氣淋同。

又療五勞七傷，八風十二痺，以為淋勞，結為血淋，熱結為肉淋，小便不通，莖中痛，及小腹急痛，不可忍者方。

滑石 三分 王不留行 冬葵子
車前子 桂心 甘遂 通州
各二 石葦 四分
去毛

右八味，搗篩為散，以麻子粥五合，和服方寸匕，日三服，尿清差。

●氣淋

臍中著鹽灸二壯，外葛氏云治小便淋，勞淋，氣淋，膏淋。
二百五十九

不通●灸關元五十壯●又灸俠
玉泉相去一寸半三十壯

●膏淋

千金療膏淋方

持葎草汁三升醋三合和空腹

頓服當如大豆汁下一名葛葎

也千金云又膿煮汁飲

治淋瀝蒸澄療尿血

●許仁則淋及五淋灸法

五淋不得小便灸懸泉十四壯穴在

內踝前一寸斜行小脈上是中封

之別名●五淋灸大敦三十壯●

卒淋外踝尖七壯●淋病九部諸

疾灸足太陽五十壯●淋病不得

小便陰上痛灸足大衝五十壯

千金翼云淋痛云灸中封穴三十

壯亦隨年壯外

參苓琥珀散醫通治小便淋瀝莖中

痛引脇下方

人參各五延胡索各五丹皮一作柴胡

茯苓各四川棟子煨去皮核琥珀各三

澤瀉 當歸稍 甘草梢生各三錢

右為散每服四錢長流水煎去滓

熱服日進二服

淋

許仁則淋及五淋灸法

三百六十一

小便病

●小便不通

雞蕪飲子外療下冷疼小便不通

雞蕪握一通草四石葦兩炭冬葵子兩杏仁兩皮尖兩滑石二生地黄兩

右七味切以水六升煮取二升半

絞去滓分溫三服如人行四五里

進一服

又方同

茯苓五分大黃六分芍藥 當歸

枳實炙白朮 人參冬大麻人

右八味切以水六升煮取二升去

滓分溫服

又方同

棗根白皮 猪苓去通草冬

右三味切以水六升煮取二升分

三服

救急主小便不通方同

取印成鹽七顆持篩作末用青

小便病 小便不通

葱葉尖盛鹽未開孔內葉小頭
於中吹之令鹽末入孔即通非
常效

必效療小便不通不得服滑藥急悶
欲絕方同

鹽二升大鑊中熬以布綿裹慰
臍下按之小便當漸通也

治婦人卒不得小便方同
郁李仁二十枚熬末服之立下

●小便不利
猪苓湯金脈淺熱渴欲飲水小便不利者主之傷寒

治小便不利膀胱脹水氣流腫方外
水上浮萍曝乾為末服方寸匕

備急療小便不利莖中痛劇亦療婦
人血結腹堅痛牛膝飲方同

生牛膝一名牛唇掘取根煮服
之立差肘后同

●小便赤色如紅

茅根飲子同療胞絡中虛熱時小便
如血色方

茅根升一茯苓兩三人參兩二乾地黄兩二
右四味切以水一升五合去滓分

溫五六服一日食盡
滑石湯千治膀胱急熱小便黃赤方

滑石兩八子芩兩三車前子兩三冬葵
子各一榆白皮兩四

右五味咀咀以水七升煮取三升
分三服

●胞轉

問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥
而反倚息者何也師曰此名轉胞
不得溺也以胞系了戾故致此病
但利小便則愈宜腎氣丸主之方見

療胞轉不得小便方外

雀矢半合車前子兩三滑石兩三通

草芍藥各二兩

右五味切水煎溫服

小便病 小便不利小便赤色如紅 二百六十二

又張苗說有客忍小便令胞轉大小便不得四五日困篤欲死者無脈服此差方同

滑石二兩 乱髮三兩 燒灰

右二味搗下篩取生桃白皮一斤熟春以水合絞得汁二升以汁服方寸匕日三服即愈其但淋者取乱髮三兩燒灰滑石五兩合搗為散服方寸匕日三服

治胞轉小便不得方十

葱白四把 阿膠一兩 琥珀二兩 車前子一升

右四味咬咀以水一斗煮取七合頓服

●小便不禁

千金翼小便不禁日便一二斗或如血色方外

麥門冬去心 各八兩 茯苓子
桂心 續斷各二兩 甘草一兩 乾姜四兩
右七味切以水一斗煮取二升五

合分三服

●小便數多及許仁則方

范汪療小便數而多方外

黃連二分 苦參二分 麥門冬去心 一兩 土瓜根 龍胆各一分

右五味搗篩以蜜丸如梧子每服十丸加至二十九丸一方無苦參有黃芩

又方同

瞿麥二兩 滑石一兩 葵子一升 黃芩一分 甘草一分

右五味切以水六升煮取三升去滓一服六合

腹中滿小便數起灸玉泉下一寸名尿胞一名屈骨端灸二七壯小兒以意減之

●遺尿々淋

集驗療遺尿方外

取雄雞腸燒灰為末用三指一撮服之朝暮服當愈

千金療遺尿小便法方同

小便病 胞轉小便不禁

牡蛎熬鹿茸各四分 栗耳三分 阿膠二分

右四味切以水七升煮取二升分
為二服作散以飲送之

又方同

木防己二分 葵子二分 防風三分

右三味切以水五升煎取二升半
分溫三服作散亦佳

牡蛎湯同療遺尿小便澀方

牡蛎四分 鹿茸四分 阿膠二分
栗螺蛸二分

右四味切以水五升煮取二升分
再服

又方同

栗耳三分 礬石二分 阿膠二分
龍骨三分

右四味為散空心服方寸匕日三
服

又方同

栗耳二分 牡蛎一分 礬石二分
汁盡

右三味搗篩為散酒服方寸匕日
三服

肘后療少小睡中遺尿不自覺方同

雄鷄肝 桂心

右二味等分搗丸服如小豆一枚
日三服

又方同

雄雞尿白熬桂心

右二味等分末酒服方寸匕日二
亦可除桂心

又方同

礬石燒令汁盡 牡蛎熬

右二味等分末之以粟米粥飲服
方寸匕日三

千金療尿淋方外

雞脬一具并腸暴乾末酒服之
男雌女雄也

遺尿失禁不自知灸陰陵泉隨年共

●遺溺灸遺道俠玉泉五寸 ●又
灸陽陵泉 ●又灸足陽明各隨年

小便病 遺尿各淋

壯●尿牀垂兩手，面髀上盡指頭
上有陷處灸七壯●又灸臍下橫
文七壯●千金翼尿黃法灸石門
五十壯

治腰痛小便不利，苦胞轉方外

灸玉泉七壯，穴在關元下一寸，大
人從心下度取八寸，是玉泉穴，小
兒斟酌以取之●又灸第十五推
五十壯，灸臍下一寸●又灸臍下
四寸，各隨年壯●千金翼小便不
利，及轉胞法，灸心下八寸七壯

大便病

●大便難及不通

肘後療脾胃不和，常患大便強難方外

大黃 芍藥 厚朴灸合 枳實
六枚 炙 麻子 別研

右五味，搗篩入麻子，蜜和為丸，如
梧桐子大，每服十九丸，日三服，稍
增之，以通利為度，可常將之。

麻子入圓千跌陽脈浮而洩，浮則胃
氣強，澁則小便數，浮澁相搏，大便
則堅，其脾為約，脾約者，其人大便
堅，小便利而不渴也。方見 傷寒

治大便閉塞不通神方

猪羊膽無擇，以筒灌三合許，令
滾入即出矣，出不盡須更灌一
方，加冬葵汁和之，亦好●又椒
豉湯五大深內穀道佳●又無
灰濃酒半升，鹽三錢，鍊成如
上法

三黃湯同治下焦熱結，不得大便方
大便病 大便難及不通 二百六十五

大黃^三 黃芩^二 梔子^二 甘草^一

右四味咬咀以水五升煮取一升

八合分三服若大閉加芒硝二兩

五柔丸^同 治閉澀及虛損不足飲食

不生肌膚三焦不調和榮衛利腑

臟補三焦方^同

大黃^{一升} 前胡^二 半夏^一 茯苓^一

芍藥^一 茯苓^一 當歸^一 葶

藶^一 細辛^一

右九味為末蜜和合搗万杵為丸

梧子大食後服十五丸後稍增之

日再服^{崔氏云令人喜飯消穀益氣}

兩服之緩中如意便^{有憂者如枳實半兩卷蘭半}

服之又有黃芩二兩

大五柔圓^同 治臟氣不調大便難通

和榮衛利九竅消穀益氣方

大黃 芍藥 枳實 茯苓

芫花 甘草 黃芩 牛膝^{各二}

桃人^百 杏仁^四

右十味為末蜜和丸如梧子一服

三九日三加至二十九酒下

崔氏療大便不通方^外

菖蒲末 石鹽末

右二味相和取半匕和烏麻脂少

許綿裹內下部中即通

備急療卒大便閉澀不通方^同

煎蜜令強加乾姜末和丸如脂

導下部中姚云欲死者蜜三升

微煎如飴投冷水中冷凝丸如

大指長三四寸導之良

芒硝丸^千 治脹滿不通方

芒硝 芍藥^{各一} 杏仁 大黃

各二 黃芩^{一兩}

右五味為末蜜丸如梧子飲服十

五九加至二十九取通利為度日

又方^同

通草 朴梢^{各四} 郁李仁 黃

芩 瞿麥^{各三} 車前子^五

右六味咬咀以水八升煮取二升

半分三服一方用絹袋盛者頓服

大便病 大便難及不通

二升
又方同

獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部
氣立通又削姜以鹽導之及乾
姜盪杏人搗丸導之並佳

走馬湯同一切卒中惡心痛腹脹大
便不通方

巴豆二枚去皮心熬杏仁二枚

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合
捻取白汁飲之當下老小量之通

治飛尸鬼擊病

大便難灸第七椎兩傍各一寸七壯

●又灸承筋二穴各三壯在膈中

夾陷內●大便不通灸俠玉泉相

去各二寸名曰腸遺隨年壯一寸半

●又灸大敦四壯在足大指聚

毛中●大便閉塞氣結心堅瀆灸

石門百壯●後閉不通灸足大都

隨年壯●治老人小兒大便失禁

灸兩脚大指去甲一寸三壯●又

灸大指奇間各三壯

●閉格大小便不通

范汪療下部不通方外

取葫蘆根一把搗末水和絞去

滓強人服一升數用有功兼療

腳氣

又療大小便不通三陽實大便不利

方同

榆白皮三兩桂心二兩滑石六兩甘草

右四味以水一斗煮取三升分三

服

集驗瘳閉格之病腸中轉痛不得大

小便一日一夜不差欲方同

世硝三兩

紙三重裹於炭火內燒令沸安一

升水中盡服之當先飲溫湯一二

升以來吐出乃飲世硝汁也

陶氏卒大小便不通方同

紙裹鹽燒投水中服之

大便病閉格大小便不通

姚氏療大小便不利方同

苦參 滑石 貝齒各等分

右三味持篩為散每服飲下一匕或煮葵根汁服之弥佳

古今錄驗大小便不通方同

通草四兩 郁李人三兩 車前子五兩

升黃芩三兩 朴梢四兩 瞿麥三兩

右六味切以水八升煮取二升去滓分三服

經心錄療闕格大小便不通方同

芒硝 烏梅 榆白皮螿芍藥

杏仁去皮尖 麻子仁三兩 大黃八兩

右七味切以水七升煮取三升分為三服一方無烏梅加枳實乾地黄各二兩

●灸法

大小便不利欲作腹痛灸榮衛四穴

百壯穴在背脊四面各一寸●服

熱閉時大小便難腰痛連胸灸團

圍百壯穴在小腸脬下二寸橫三

間寸灸之●大小便不通灸臍下

一寸三壯●又灸橫丈百壯大小

便不利灸八窠百壯穴在腰目下

三寸俠脊相去四寸兩邊各四穴

許八穴故名八窠●小兒大小便

不通灸口兩吻各一壯●小便不

利大便數注灸屈骨端五十壯●

小便不利大便注泄灸天樞百壯

穴在俠臍相去三寸魂魄之舍不

可鍼大法在臍傍一寸合臍相去

可三寸也

文化七年庚午七月

風月庄左衛門

勝村治右衛門

京師書肆

三木安兵衛

西村吉兵衛

吉田新兵衛

一十三
開七

