





門中武
第36卷

醫 方

千金要方

吳門周岐來先生享保年中外寓岐陽三年間治本邦之人且不寡也因五方土風而施治因剛柔強弱而處方見垣之察良相之材無所不盡也醫按數百治療之標準豈謂無一助乎攝坂吉野氏授周氏之傳製人參三藏圖施世經驗最多故都鄙舉踵購求余近來臥病殆將不起服此藥而得一生釋然不勝興起之至嘗梓千金要方藏家久今復校正刊行擴其傳云

攝隴書舖積玉圃主人



千金要方序



太史遷列叙倉公以醫案傳

之述而不作倉公傳因其實案

烏醫之為案於是乎權輿案



也者治病患狀良醫唯能道後
世名家案無遺教百篇昭乎
石河也貴人曰已吳門周君
岐來蹈海東矣次東館于嶠

三歷年所初官命視病周君
抑乎此弗謬也迨診候季脉
關係水土剛柔強弱所自來
以差以釋然死生由面而破

癰者廢疾者使三豎不得辟
之刃也之所當若此即劫
輒錄諸左右隨治隨成前所
謂狀者未始嘗不為之案

也案積年遷余其集曰其慎
猶之自號曰性家而贊一於性
也於此亦同題云城門陽秋
為攝之臨生雲人少英名欣

欣焉而西出入門下得受其衛
生之術業已卒周君言擬令陽
生觀光上國將利行以廣其傳
志尚可嘉焉卿老識伯生於卿


與有之謀且周君知己於我而不
私目擊吾不為必慊安敢舍諸
乃為論之曰病可療也乎曰不必
盡療藥可驗也乎曰不必也

驗然則醫藥之矣為也應機
察虛實辨虛實溫補
瀉熨理調養咸稱宜何藥之
不驗何病之不療此倉公之創猶

信諸名家有述哉周君乎有
所能攻也近古軍門附驥筆
人傾生焉也在今也雖本豈謂
無仰岐才民陽生問序

享保辛亥夏五月朔望

長崎平君舒仲緩撰



其性集序



醫有方書也然律呂數葉
與夫病之因三而此百法
之屬五而三千皆安以

未嘗有淺深難言之可
在乎於是乎可立活套法
起家例也有一方之圖
與柱石一案之拍則難久

可古人解醫為盡善至此
之意也者心之操為操為
純密分其源應亦自微漸
以焉難之為其於弗中矣

所謂機發之弛亦不可徒
存之必在謀之無自欺也
誠之之道云何傳之之極
物也致知也知也而醫

家之致格乃自方書始其
標本緩急承制攻補之理
判然於方寸然後機發之
漸乎復肯綮無枉錯足

垣一方其豈遠也邪慎齋
周先生若古吳來遊醫于
長清多起廢癰盡傾其青
囊以授諸一人之陽秋浮

海而歸春秋七潛究審驗
深獲活法益欲壽梓於海
內而請席乎君復令昌言
附厥後故云

事得辛亥孟冬庚子

京浚上源昌言子俞甫撰



引言
方法皆遵古權宜悉酌今普天
同理性率土異方音強弱由姿
稟風寒在外侵逸勞移氣體憂
喜感其心老幼不同例本標須

更斟病因新久變治辨實虛禁
望聞可知畧問切乃得深法中
參活法凡症莫輕臨寒熱多生
假虛陽防伏陰寒如投桂附熱
即進連苓得當如桴鼓失宜轉

禍祲須知真與似對症若鋒針
崎邑山川秀幅員人總林平生
皆好潔過半愛椒馨水土亦非
薄七情倍六淫所需之藥餌大
概用芪參無論症大小三因仔

細尋其難宜其慎以此名作箴
乙巳秋仲古瀛慎齋周南岐來

氏題於崎陽邸舍



周先生其慎集序

其慎集者吾周先生之所自名其案也

乙巳夏先生航海來因吾

國聘也始抵長崎次華館後出舍譯胥柳
氏之宅每投藥餌有驗凡崎人疲癯廢
疾無不應手而立愈先生之於醫也可

謂神矣其明年章遠聞之而心甚喜束
裝下崎往拜請受業其門初謁見先生
詳述所由來而章服勞館下祇受教妙
術秘方或折衷于往昔或指點于目前
所謂藥餌之當否實性命之所係余始
莫窮其際于寥廓已而了了有會于胸

中皆先生有以化我者也丁未歲仲夏
先生國籍限滿將還古瀛章悲不自禁
携酒肴奉餞與譯人陪席於滋德堂拜
請曰不肖自執贄門墻荷訓既深雲天
湛露感佩鏤骨惟冀先生以或折繼統
之意而函括二字間以爲齋號使不肖

永傳於後幸明示之先生曰善哉爾之
好醫也乃自揮毫題爲景岐齋而言曰
景者慕也岐者岐伯也將此二字爲齋
號使爾子孫能慕岐伯知究心于靈樞
素問而醫學粹精則杏林春永矣章廼
謝之曰軒轅所敬者岐伯天師吾所慕

者岐來夫子也先生大悅曰助我者其
陽秋乎復授章秘方一卷醫案一冊東
垣十書執手而屬曰古今醫籍之廣充
棟汗牛爾以叟所授書爲階梯則駸然
入域矣其情惓惓章再拜而受遂別去
其案乃在崎所療之病章雖愚魯深感

其指示造次顛沛弗能忘也讀之至再
至四則知吾師之學術明貫天人洞徹
微奧者也是年余來寓攝城欲壽諸梓
以布海內焉而訂考之先生家世易學
參究陰陽玩占爻象弱冠步襲其才卓
犖就張星豫宿學軒岐術不求仕進而

業醫張星長洲縣人豫宿其字今世所
行醫通者其從父石頑先生之編也傳
曰醫不三世不服其藥先生受業于豫
宿其統亦可謂源遠矣故遐邇企慕負
笈而至者絡繹道路云先生名南字岐
來別號慎齋係宋濂溪周子之裔江南

蘇州府崇明縣人余以其所承略識大
槩爰贅數言於卷首以誌不忘耳

享保十六年辛亥孟夏上浣日

山陰松江門人城門章陽秋頓首拜書



千金要方序



古云醫者意也故貴乎權其病變無窮
一病而治弗同儻不意以處焉則變豈
爲善應哉猶孫吳之行軍不拘成律奇
正應機變化從心昔人用兵喻用藥良
有以也而變之難應莫難於方宜故內

經論異法方宜也詳又備矣夫
皇和之地五域各自分境且水土美厚
產殖豐潔既與他邦異則民之稟質嗜
好亦何同邪若惟以東方之域槩視之
其誤太甚矣吳門周翁航海來崎起廢
愈痼隨手輒效請診者戶履恆滿翁素

不諳崎之地紀民習而其施治奏效有如
此焉於戲其非真通機變者烏能之乃
其臨病莫不據案以辨論如老吏結款
而罪狀無所逃然案積成編翁謂病變
難處宜其慎焉因作箴以冠之併命其
名松江城門生親炙有年遂受其業翁

及其還吳留是編付生生獲之不敢爲
枕中之秘以圖公諸四方利物濟人之
念何其至哉不佞熟玩其書立論確當
發竒見於常理之表辨證精審加新意
於古方之上學原軒岐識該古今一編
公案實可爲醫法之規矩焉若夫俾後

人則之以成方員乃城門生嘉惠也余
未與城門生相識而聞之仲緩平公之
言其與人爲善之意夫安可不感也哉
余不能嘿焉

享保癸丑歲季秋郡山藩侍醫橘正瞭
題于鹽梅堂

千金要方凡例



千金要方凡例

一風俗不同人情自異服食起居各適其宜當遵
內經所云必求合於人情士材所論不失人情
方可治病

一目不經見之貌耳不曾聞之聲望聞似難然神
之衰旺音之壯怯其理一也悉遵古法
一問病之新久起於何因言語不能悉達者不憚
再三必得其情而後止所謂治病必求其本也

其慎集凡例
一切脉之法同此經絡臟腑即同此脉理參合古今脉學全憑三指以運一心倘有脉症不合處尤必委曲以求之

一無論病之輕重功之成否皆詳載始末者凡以誌慎也況次第診視不費思索異日展卷成效可稽

一愚性正直不知忌諱不諳世法不務勢利筆舌疎顛悉期鑒諒

一自巳年夏末至嵗始概書方至仲秋乃用藥療病凡奇病久病難治之症苦心良思而獲全效者詳載方案其餘易治者皆略記無文不及概錄

一藥劑分量七方中原有輕重大小不同不可執一當以其人之強弱老少病之輕重久暫以及飲食多寡爲進退予詢嵗陽通例藥劑不過一二錢若有重症一晝夜服可二三劑予倣此意

以製方上焦之病以一二錢爲率而頻服之下
焦之病則併三服爲一而頓服之蓋以下焦道
遠若藥力少則不能達至病所故也腹脇之病
惟酌乎中勝病而止不然病重藥輕終見無功
故製方貴乎權變不必拘於俗情又不可好奇
而師心自用務期恰當斯合乎道案中藥劑四
五六錢居多甚至一兩外者亦有非敢有戾俗
情其必稟厚而病深也略記成驗一二以明此

非好奇也亦慎以處之者也

一忌冷藥冷藥者非常用之藥也人皆置而不用
非不易得之物卽辨之不能真此無論購求之
難倘不真而誤用貽害非淺故方不必好奇藥
不必求異惟辨症明用藥當針芥相投至奇卽
在至庸中也何用冷藥爲哉

一目次以本鎮爲主別地次之由近及遠也雜症
錯綜而列酒色病后後警不保身也外科有專

家亦附數條者越俎以代鉛刀一割也女科不難雜症調經胎前產後三大綱當知要也目有專科不同口耳祇紀異症幾節尋常易治者不錄僧乃方外證治無差不使混俗唐館繁華致病最易盍念他鄉此序次之意也

千金要方卷一目次

本鎮

林重兵衛多年積病正本清源奇驗

林彦四郎自幼之病

紙屋久次郎危病得痊

藤崎貞右衛門脾腎兩虛土火失職之症

吉岡木工左衛門陰氣爲病不同寒症治法

大坂屋十郎右衛門奇症獲愈

西川傳兵衛症脉疑難治分先後法
善七積勞成病變幻不常多方獲愈
本山治助虛症變幻屢奏捷效
絲屋四五右衛門疝挾痰飲審症立法
清兵衛痛脇將成法正效捷
田中新八寒熱並見虛實互形疑難久病
平兵衛久病收全功辨症議治大法
西村嘉右衛門廢疾得愈

千金要方卷一

大清 江南古瀛 處士周南岐來著
皇和 山陰松江 門人城章陽秋校

治_ス林重兵衛多年積病正本清源_ス即得奇驗

林重兵衛年僅四旬體亦不肥從幼痰多氣喘邇來
積病三年面色天白胸膈氣滯懶於言語小腹少力
多言氣升有似疝氣上升之狀痔瘡下血以致頭疼
耳鳴行動暈眩宗氣動且應衣飲食不下食則飽脹

或吐水苦酸夜不能寐痔痛氣升精自流出脉左寸
細瀦右關滑大此火不生土金不生水之症也左寸
細瀦君火虛也右關滑大痰氣盛也火虛而水反凌
之所以心君不寧金不生水則真水虧土不制水則
邪水溢所以爲痰爲飲土逆於肺則喘息溢於胃則
吐水聚於中則爲脹阻於經隧爲氣上升爲頭疼爲
眩暈爲耳鳴至於精滑不寐皆心腎不交之虛症錯
雜其間治當審其標本緩急而調治之火土之虛本

也痰飲爲患標也本不虧而治標當以急劑病去而
正不傷本已虛而治標當以緩劑扶正而邪自退擬
以苓桂朮甘湯加半夏陳皮十劑而病去其半又五
劑而愈十之七八再服人參養榮湯不及十劑而全
愈總之飲爲陰類挾下焦之陰氣而土逆爲患非助
上焦之陽不足以勝之故以桂枝赤色通心者爲君
以扶其陽茯苓白色入肺者爲臣以行治節以伐腎
邪蒼朮之苦溫以燥濕健脾甘艸之甘而先入脾加

二陳以消痰理氣藥味皆陽剛雄烈而陰類自消矣
若以心腎之虛而用滋陰反助痰飲爲患所以經幾
年而不愈也

治林彥四郎自幼之病

林彥四郎年十五歲稟質甚弱面黃體瘦脉虛胃火
土蒸疳蝕牙落口氣甚臭胃脘時痛素有腦漏鼻塞
不通氣從口出寢食之時氣悶甚苦經曰天氣通於
鼻地氣通於嗌口與鼻雖若有殊然陽明之脉絡腦

而鼻之濁涕壅滯莫非地氣之濕熱土騰以致天氣
之拂鬱不利也治宜以清胃火爲君開肺氣爲佐而
體弱脉虛之子又不可以苦寒者傷其胃氣惟辛甘
以清陽明之經不用濁陰以瀉陽明之腑先以葛根
湯加甘桔散其火鬱之火經所謂火鬱發之之義也
四劑而疳淡臭減繼以竹葉石膏湯加花粉甘桔以
消在腑之熱取其甘寒勝熱不致傷胃也二劑而口
臭消卽以瀉白散加細辛川芎薄荷甘菊五劑而鼻

氣通腦亦愈繼以六味地黄丸調養之以先天不足故也

治久次郎危病得痊

紙屋久次郎年三十餘歲二年前因生下疳多服土茯苓至去年耳漸無聞小水不利食減體瘦面白無神忽然暈倒磕傷頭面兩耳盡聾內作鐘磬聲今年小便不利小腹脹墜診之脉大而無力觀其形如槁木蕭索欲仆此正內經所謂目盲不可以視耳聾不

可以聽潰潰乎若壞都汨汨乎不可止之候也陽氣大敗所以形槁神澹肢寒氣微若不可終日之象予思陽氣虧於下則膀胱無氣以化所以胞脹小便難陽氣不土行於經則空竅閉塞所以耳聾無聞治宜升其下陷之陽鼓其流行之氣使之清升濁降陽氣可復而病可已先以補中益氣湯加官桂川附自八月初六日服至初十日一候而陽氣大復病勢大退至二十日坐皆適意惟行走尚難脉已和緩宜滋養

氣血以人參養榮湯服至二十九日行止自如九月
初一日入寺還願矣原其所以得效之捷有微意寓
焉補中所以升陽而陽又有不宜升之戒恐虛陽隨
升柴而飛越也故權加附子助其元陽以下行溫經
加薄桂扶其少火即以利膀胱下陷者升以舉之虛
微者溫而補之如寒谷層冰得東風而立解二三劑
而小便流長小腹脹消職是故也設此症拘於常例
即方藥合宜亦難捷效何也久病大虛陽氣甚微陰

靈深固仍以一錢幾分之輕劑自春徂秋病深藥淺
終見無功矣故立方治病不特症必辨陰陽而藥尤
當酌輕重也

治脾腎兩虛土火失職之症

藤崎貞右衛門年三十七歲稟弱久病勞心辨事面
色痿黃而浮青氣飲食少而無味大便常泄心神恍
惚坐卧不寧小腹疝氣脹痛胃中聚氣攻衝足脰筋
痛牽引肩臂脉沈遲尺尤無力此脾腎兩虛土火失

職之症藥餌罔效行將束手矣予思脾之腐熟水穀全賴腎中之真陽爲之蒸動少火一虧無以生氣所以面青神倦土失健運所以口中無味而大便常泄也下焦虛寒則疝氣作脹中焦陽衰則聚氣攻疼脾主四肢脾陽不布於四肢牽引絞痛所由生也陰寒迫處於心下心亦震動不寧所以恍惚如喪神守理宜溫中補火爲主以參附理中湯加茯苓桂枝以治火土之不足以治陰寒之上逆方中加茯苓桂枝者

以茯苓伐腎邪桂枝治奔豚其腹中攻衝作患爲痛爲脹而上凌心氣者皆腎邪也腎陽虛而腎陰用事故侮其所不勝而凌其所勝也製劑重四錢有零服二劑而腹中快然足溫脉起但口無味再以六君子湯加川附子桂枝連進五劑口亦知味飲食如常諸痛皆除但無力耳仍以六君子湯又十日而全愈自八月二十一日服藥至九月初七日而迎神觀戲竟無恙矣此症之得愈者在於不拘俗情之用參附故

也何也初劑理中湯加人參五分附子一錢傍人皆
沮之病者以所苦之久拚服一劑下咽卽效後不復
疑予思久虛痼冷之症若只一二分參附如重陰沍
寒以燭火燻之不見其溫而旦火之失溫也非火之
不溫勢不足以敵之也

治陰氣爲病不同寒症用藥憑脉立法

吉岡木工左衛門四旬有餘善酌不致於困去年偶
因病醒手冷如麻卽脾胃不快腹之兩傍有氣上逆

頭重吐酸四肢怠倦大便不快疝痛連腰脉滑數夫
四肢爲諸陽之本冷而如麻陽和不暢矣其餘諸症
皆陰氣爲患然脉旣滑數但可用陽藥不可用熱藥
方以桂枝茯苓蒼朮甘艸木香陳皮桂用枝者取其
達四肢也此皆陽剛之藥陽進而陰自退六劑大效
又六劑吐酸頭重皆已脉猶滑疾改二陳湯加山梔
六劑脉緩又六君子湯旬日繼以越鞠丸一月全愈
治大坂屋十郎右衛門奇症獲愈

大坂屋十郎右衛門年三十四歲形體黑瘦七八年來患左脇痞塊上攻則氣悶欲絕攻及右胸作脹肩如壓重石肩井肩顛肩胛痛不能勝因而缺盆骨腫胸骨高突堅硬但痛不紅不潰已有二三年矣診之脉滑而疾此肝木侮肺金肺氣鬱於經絡痰亦凝其部分故見此奇症也治之之法欲削木之繁蕪必先利金之鋒鏑是伐肝不如清肺也肺主一身之氣氣利痰亦隨之而運滑疾之脉痰之釀禍已久法當

先疏其流而後清其源方以瀉白散加減以桑白皮之甘辛而瀉肺中之邪氣地骨皮之甘淡而清肺中之伏火用以爲君去甘艸之甘緩加桔梗之苦辛以開肺氣以利胸膈以香附之辛平以解六鬱以理血中之氣用以爲臣以蘊子白芥子以清膜外之痰用以佐使日進一劑五日脹痛止十日肩重若失胸骨平復乃以開鬱加青皮赤芍藥靈仙三錢以治左脇之積聚不旬日而潛消無跡矣

治症脉疑難治分先後有條不紊方爲合法
西川傳兵衛四十五歲患頭疼兩肩重腰冷小便淋
瀝診之左脉滑大右脉沈滑而皆急疾此非外感之
頭疼腰冷者比頭疼者肝膽氣逆也肩重者脾胃有
痰也腰冷淋瀝者腎與膀胱虛也上中下三焦俱病
治之當分先後之不同頭痛爲急治先乎頭方以溫
膽湯加柴胡薄荷治頭痛卽兼以消痰三劑而痛頓
止次以二陳湯加蒼朮杜仲治脾胃卽以利腰脊亦

三劑而肩背輕復診其脉滑疾之狀皆除惟淋未愈
宜利小便以五淋散加兔絲子杜仲略用官桂以鼓
膀胱之氣重用茯苓澤瀉以伐腎邪之有餘又三劑
而全愈可見此症之腰冷淋瀝非虛寒亦非實火脉
滑而疾則非寒矣淋而不痛則非火矣惟肝木風動
脾濕生痰故以疎木者治上燥土者治中利水者治
下經曰在上者因而越之在下者因而竭之又曰標
本不得不能服邪此之謂也

治積勞成病變幻不常多方獲愈

善七三十八歲形體瘦小神槁皮黑曾生毒瘡既愈
又因勞苦致病去年夏初患胸脇刺痛至今更加寒
熱頭疼飲食減少無味脉小而急疾此內傷饑飽勞
役之症積久而神疲力倦飲食不爲肌膚榮衛不和
而生寒熱脾胃不健而生積聚左脇有塊連及於胃
或脹或痛其狀不一不足之人而有此有餘之症治
之難以有餘而攻伐之惟以補中益氣以止其寒熱

後以健脾消積以治其脹痛然其反覆不常有時熱
退痛止而暫安有時寒熱脹痛而陡作或今日發熱
而明日作痛或上午涼下午熱變幻不常而藥亦增
減無定或和榮衛或消積聚隨時進退而主方總不
離六君子扶正氣爲先調養兩月癖塊既軟飲食可
進精神略旺頗有生機然時令炎蒸或納涼或飲冷
爲痛爲脹作止無定時而怠倦則加益氣時而浮腫
則加滲濕又五旬日始不反覆服藥自四月至八月

而安如此之症而獲收功者十中難一此則僥倖成功耳

治虛症變幻屢奏捷效

本山治助年三十四歲去冬傷食致病後隨惡寒盜汗面色黃白而兼青滯宗氣大動額痛無氣以動動則氣高而喘脉弦而數此陰陽兩虛之症也陽虛則惡寒陰虛則盜汗陰虛於下陽浮於上所以陽明火升則額痛大氣積於胸中以司呼吸虛則宗氣泄而

動應衣動則氣高而喘也弦陰脉也數則爲虛若以脉之數爲熱誤矣合症與色參之陽虛之候十之七而陰虛之症十之三也宜以補陽爲主而佐以滋陰方用芪附爲君木甘爲臣而以歸芍地黃佐之六劑而脉緩汗止額痛止亦不惡寒宗氣亦定此效之最捷者也但以一身兼僕之人調養失宜勞動太過又氣喘而脉三五不調以補中益氣去升柴加附子二三日而平復又飲食失節忽作日瀉兩三次不思飲

食脾胃大虛以六君子湯加木香附子二劑而安惜其無力不能服參元氣難復每多反覆偶動肝氣而左乳下痛加香附醋炒青皮麩炒於六君子湯中一二劑而痛已偶觸寒氣而脚筋痛引兩脇則加木瓜附子於六君子湯二三劑而始安病多變幻而大綱總在陽虛何也秋當金旺而面見青黯恐木遇金刑不能過此秋令今多方保護而立冬節屈青氣旋消身體壯旺雖藥餌不可離亦可謂已愈之病也同此

之症而早愈多時者有人參之大力以助之貞右衛門可証也巧媳難為無米炊志良苦矣

治疝挾痰飲審症立法

絲屋四五右衛門年未四旬稟亦不弱自幼好飲少腹有疝去冬傷食受寒胃中有塊疑為肉積堅硬上支兩脇及咽右脉滑大此陰氣挾飲上乘非必肉食不消而成塊也若食積成塊上攻必作痛不食豈但脹硬支脇冲咽而已哉可知堅硬有形者乃痰飲無

形塞喉者乃逆氣也治宜理氣健脾去寒消積而自退方以木香桔梗以利上焦之氣陳皮厚樸以理中焦之氣白朮以健脾吳萸官桂以去寒山查枳實伸麴以消積半夏以滌飲三大劑而寬快不硬不脹但不知饑其脉常滑又三劑而知饑飲食有味乃減作小劑十日而脉緩積久之疝皆潛踪也

治痛膈將成法正效捷

清兵衛五十五歲六脉沈瀯而數氣脉多沈瀯爲血

少數爲有熱所以胸膈氣滯食道不利飲食皆痛乳膺肩背如刺此肺金受傷津液大耗將成痛膈之症也理宜清金順氣生津活血猶可圖治方以甘艸桔梗天花粉麥門冬以清金柴胡橘皮以疎肝順氣當歸丹皮以養血活血三劑而痛減六劑而膈寬膈中略有凝滯加杏仁貝母芥子半月而愈若依俗見以寬胸利氣爲先其症必不解矣

治寒熱並見虛實互形疑難久病憑症不憑脉

法

田中新八年已弱冠體不甚薄三年之間手足常冷腋下流汗夜寤不寐且多漩溺咽喉氣塞胸膈痞悶乳下期門穴刺痛頭面火氣上騰環口腫脹大便閉結生痔種種有餘之症脉宜弦急滑大矣而反見沈遲何也可見火鬱於內寒束於外肝木不舒則腋下汗乳下痛肺氣不利則咽塞胸悶脾火有餘則唇腫便閉也其肢冷不寐多溺者腎虛之本病也治宜先

疎之次利之後補之先以柴胡疎肝湯加桔梗蘇子三劑而咽喉氣寬乳下已不痛環口之腫脹不減卽以小承氣湯一劑與之行二三次火氣下泄諸症頓寬脉形略大而浮中皆見以清肺理脾之輕劑緩調七八日諸症皆已惟足冷多溺以八味丸空心服之二旬全愈

治久病收全功辨症議治大法

平兵衛中年之人稟不甚薄左脉沈細右脉沈遲沈

爲裏病遲爲有寒所以胃中作脹食入更甚滿腹板硬氣升胸膈腰痛耳鳴臂疼頭重不時作瀉見症虛實不齊作楚年月已久總之脾腎兩虛之症也脾不能爲胃行津液則脹脹之甚則上支膈下板硬矣脾胃多痰則頭重臂痛腰爲腎府耳乃腎竅虛則痛與鳴皆作也治之之法又不可因虛而用補法病實本虛惟宜去邪而無傷於正決非扶正可以却邪之謂矣方以理中湯以益土之卑監合平胃以治其敦阜

加桔梗以開上焦之氣枳櫛以破下焦之積神麴以腐熟水穀而推陳致新三劑而病去其半六劑而腹皆柔和寬快向之冰堅雪積者不知消歸何處矣腰痛亦減但耳鳴未除乃以溫補腎經之劑取益火以生土加利竅之品而純陰膩滯者在所禁也十劑大效經年難愈之病一月霍然亦快事也

治西村嘉右衛門廢疾得愈

西村嘉右衛門年四旬餘三年前患小便淋濁服土

茯苓甚多以致龙髀骨上腫硬筋急骨反外突膝腫
腿瘦筋攣骹響不能行立且不可坐診之脉兩手反
關余思淫邪之火鬱於少陰厥陰則爲淋爲濁諱生
毒瘡而服劫藥但圖皮外之光不知筋骨之害及多
服土茯苓無濟於病血氣既傷血不榮筋筋攣骨突
而現奇症也治宜養血溫經純以濁陰走臟之藥壯
足少陰之水封填骨髓生足厥陰之血濡潤諸經方
以熟地杞子萸肉補腎爲君當歸丹皮養肝爲臣附

子溫經爲佐木瓜牛膝獨活引經爲報使加蒼朮爲
陽明之要藥其所以必取陽明者以陽明爲五臟六
腑之海行氣於三陽所以筋骨肌肉皆受氣於陽明
也服至十劑腿膝筋舒屈伸覺利前不可坐者今可
正坐矣又五劑而行止自便不待扶杖矣自九月二
十一日服起至十月初五日止煎藥十五劑每劑重
一兩見其效速不必加減三年之病半月而收七八
分之功亦大快事也繼以八味地黃丸調養之

千金要方卷三

目錄

目錄

目錄

千金要方卷三 目次

本鎮

鹽屋彌右衛門陰陽不和上下不泰疑難之症
萬吉痢疾危症兼雜症疑難活法
津司武助痢疾重症
長谷川圓助風火頭痛甚於陰分散毒捷效
青木新次郎火升風動之症
太兵衛口眼歪斜

其真集目錄

印山官印

森田權左衛門上焦火鬱之症捷效

太次右衛門內外雜症握樞以運其效甚捷

中園金平久患滑精收攝腎氣固本之法

前田久次郎脾腎兩虛並補之法

德左衛門咳嗽變通古法良效

大町幸次郎頂痛便黑辨症治驗

中川兵三郎偏枯將發治當在未病之先

森田久兵衛年老病久命門火虛窮源治法

古閑平兵衛歷節痛風尋源而愈

齋藤作右衛門淋祕兼痛風

服部武右衛門治食鬱不同脾泄治法

其集卷二

山陰

（Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 門, 會, 不, 河, 散, 出, 出, 古, 國, 平, 其, 南, 登, 朝, 風, 氣, 而, 會, 古, 國, 平, 其, 南, 登, 朝, 風, 氣, 而, 會）

千金要方卷二

大清 江南古瀛 處士周南岐來著

皇和 山陰松江 門人城章陽秋校

治陰陽不和上下不泰疑難之症

鹽屋彌右衛門年逾五旬昔曾患毒瘡服土茯苓及五靈丹愈後即腹痛左有塊如梅子者五六枚右腹有積如竹根上攻心坎痛不可忍上及乳膺左乳且酸每日必發二次大便一二旬一度如羊屎小便短

少瀋疼曾坐溫泉略覺輕可今夏更甚探吐一回暫
寬一時所吐惟酸水及痰額汗頭微痛足冷胃痛下
引命門穴週迴及臍素有痔瘡行動則肛下脫此久
病正虛欲成關格之兆前因毒而過用寒涼則成積
聚又服昇煉之藥則燥腸胃所以塊如竹根便如羊
屎也陽虛不能下制夫陰而大腸之傳送膀胱之氣
化皆不利故上而吐酸胃痛下而小便短瀋足冷脫
肛之症作也陰逆而上僭夫陽故胸乳脹痛且酸額

汗頭痛之症作也治宜扶上中二焦之陽則陰自不
上逆方以桂苓朮甘湯合疎肝降肺之藥三劑而大
便通積痛減又三劑而硬處皆軟帶脉亦寬見效甚
捷竟不加減又十劑而愈 附方桂枝茯苓蒼朮甘
艸香附川芎丹皮麥冬杏仁柴胡 桂苓朮甘扶陽
以除飲香附川芎以解鬱丹皮以補肝血柴胡以疎
肝氣麥冬杏仁以潤肺即所以通大腸病之頭緒多
端而方不得不龐雜也

治痢疾危症兼雜症疑難活法

萬吉年僅弱冠久有瘡毒患重痢五六日裏急後重下瘀積稠黏紫黃雜色日四十餘度脉大有熱且不進食誤以艾火灸其腹痢痛益甚火升欲絕此熱毒內熾必須下之以救其如焚之勢也方以大黃黃芩爲君柴胡香薷爲臣使暑熱之毒在腸胃者下行而泄在經絡者表解而散也佐以枳榔而去積芍藥甘草以緩中加生姜茶葉爲引一大劑而澤枯潤槁奄

奄復甦也繼以黃芩湯二日痢減脉緩有可愈之機然而變症百出忽而胃脘痛及滿腹忽而咽痛連頰車忽而日晡寒熱忽而身痛不寐俱隨機制方雖效如桴鼓已費一月之周旋矣痢愈之後更有虛症之難復結毒之爲害或盜汗頻頻或半身若痿曲折多方幾及三月而行動如常

治痢疾重症

津司武助二十餘歲暑月病痢裏急後重日幾十行

小便莖中痛痢如魚腦兼黑色醫見其食少脉數至二旬餘皆謝手始延予診其脉雖數而身不大熱食雖少而穀氣未絕舌有胎小便痛者丹田之熱也其行數之多不必計也此初時失於推蕩其暑氣未清故纏綿不已也當清大小腸熱尚有可圖方以黃芩芍藥湯加薑茶調天水散一服而二便頓快脉乃細緩即易益氣湯加蓮子烏梅行次減半乃以芍藥甘草湯加蓮子平調兩日食增痢減一晝夜二三行可

無慮矣但足有腫意更加實脾補氣二旬日而全愈治風火頭疼甚於陰分散毒捷效

長谷川圓助三十歲三年前遊京師染毒病惡寒去冬頭疼至春大痛目眊耳中錐痛左頭角痛且腫牙宜齒疼申時則重至寅乃輕脉弦急此三陽毒聚於頭爲寒所鬱故獨甚於陰分也宜祛風清火以發之方以羌活藁本以治太陽柴胡以治少陽甘菊薄荷以佐之葛根以治陽明桑皮桔梗以清肺生地以滋

陰山扼引火屈曲下行半夏消痰治厥痛甘州以和中風散火降而痛或可已三劑即效改用逍遙散加滋陰降火二十劑而痛止但腫恐成結毒更以內托消毒繼之而腫亦平復

治火升風動之症

青木新次郎三十八歲四年前曾半身不遂以後勞心則火升胃中跳動乳頭動則戰慄汗出而止中脘皮肉有時板硬脉沈弦此心血不足則火升肝血不

足則風動故見此奇症乳頭屬厥陰肝經乳房屬陽明胃經木搖則土震所以乳與胃皆動也戰汗者暴風得雨而後息也治宜養血清火消風理氣方以當歸秦仁養血山梔清火柴胡天麻疎風苓朮陳半以治痰氣八劑前症減但任脉不和有時撐急頭不可俯用越鞠丸以解鬱理氣半月愈以六味丸調養服之甚宜

治口眼歪邪

太兵衛五十七歲新正忽口眼歪邪別無所苦延及三月其病日甚左腮且腫右目多淚六脉浮數浮爲風數爲熱風熱盛而襲於陽明少陽之經故腫在左腮頰車亦噤而不利也方用天麻羌活鈎藤薄荷以驅風白芷爲陽明之引經柴胡爲少陽之引經加二陳以消痰入殭蠶葱薑以宣通經絡四劑而經脉寬八劑而口眼稍正惟腫不消再加降火之山梔以升麻爲佐又四服而腫卽消歪亦正惟口開不利以地

龍三條去土同荆芥入前方中六劑大效又兩劑而愈始用白芷以入陽明必得升麻而腫退所謂奇之不去則偶之也殭蠶以治口噤不若地龍之奏捷者非殭蠶之力不及也以蠶窠風木之性祛風之功大風旣散無所用力矣陽明屬土非善攻土者不足以解其鬱也然非佐以荆芥之芬芳發散者其功亦不捷也古云醫者意也此之得心應手意而已矣
治上焦火鬱之症捷效

森田權左衛門年四十五歲十年以來患舌本脹硬
以及肩頸肩胛并前胸脹痛有時上行頭角板重牽
引而痛頭角痛久雖不傷身痛楚甚無可奈診其脉
兩寸關滑大兩尺弱此上盛下虛之脉痰火上逆於
經絡爲患治宜導內經火鬱發之之義而兼消痰之
藥使在經之鬱火有所開泄在絡之痰氣無所阻滯
庶脹痛可消方以柴胡鉤藤甘菊薄荷以散少陽之
風火以桔梗桑皮以清太陰之金氣以廣皮半夏芥

子以消痰山梔引諸經之火曲屈下行更加竹茹以
引藥入膽大其劑作湯而頻頻熱服三劑霍然又二
劑而脉亦和平竟停藥四五十日其病不復作矣十
年之鬱火而熄於五劑之間不亦快哉

治內外雜症握樞以運其效甚捷

太次右衛門年道四旬以前曾口眼歪邪又患下疳
症雖暫愈三五年來小便不時閉澀口眼瞶動無已
耳鳴如沸羹胸膈如烘火咽痛腮腫痰核大小不一

脉弦急此風痰鬱遏於上濕熱凝滯於下而其樞機皆在於肺肺清則一一之症皆可愈不然紛紛驅風利水無已時也咽喉胸膈肺之部分也肺金清肅之令行痰氣自不壅滯清肅之令行風木自難上僭清肅之令行水道自易通調則上下諸症一效而無不效矣方以甘桔湯加味黃芩玄參以降火蘇子杏仁以降氣貝母芥子以消痰麥冬花粉以生津荊芥天麻以定風間以柴前以升降其中逐日增減二十劑

而愈十分之八九

治久患滑精收攝腎氣固本之法

中園金平三十一歲稟弱質薄久患滑精勞倦則甚一夜連滑幾次至寐方知自成童以迄壯歲皆然幸無咳嗽內熱之症雖多飲少食猶可支持究其虛弱若此而不至大困者由其陽痿不舉天事不足而人事聽之故先天之病不若戕賊其生者之為害甚速也然人事雖絕而玉門不閉如漏卮之水不至於燬

竭者鮮矣壯年不壯其何以永年必宜固其元陽使
玉門有鎖鑰遺滑有禁止而斗柄或可復運也止澁
之劑治其末也一概不取惟用收攝腎氣者山萸枸
杞子兎絲子五味子益智仁附子之類連進十大劑
玉門有禁二十劑遺滑竟止脉亦有神以八味地黃
丸服之甚適自三月至六月八味之力無間陽事略
興前症變爲夢泄而慾念萌矣又煎服旬日續以六
味地黃丸減丹皮加枸杞子五味子服至八月愈先

天不足可以藥補聞之女媧氏煉石補天容有此事
乎

治脾腎兩虛並補之法

久次郎積弱之病已非一年去秋重病得痊今夏調
理失宜虛症又作診之脉緩右且沈細無神腿痛至
骨飲食無味左臍傍有積塊如桃此脾腎兩虛之症
治之惟宜溫補但脾藥宜燥腎藥宜潤利於此者不
利於彼並施之際必須補脾而不妨於腎滋腎而無

碍於脾庶可有濟故補腎者取甘平不膩之品枸杞
兎絲杜仲之類是也補脾者取甘淡辛溫之品茯苓
山藥半夏之類是也佐以舒筋下行之藥木瓜苡仁
之類是也進五劑而腿痛止但痞氣攻脇刺痛加以
平肝之劑青皮赤芍藥丹皮之類三劑而脇痛又止
陰虛而足心常熱以逍遙散加減調養一月而熱退
食進乃以地黃湯與六君子湯相間而服又二月而
收全功

治嗽變通古法良效

德左衛門五十三歲體瘦耐勞素有嗽病今冬因傷
風更甚夜分連咳痰稠難出脉沉而急凡咳嗽之脉
宜浮不宜沉宜緩不宜急浮緩之脉爲風在表散之
猶易以咳爲肺病肺主皮毛故也若沉而急病在裏
治之爲難此之久嗽病痰火蘊結固無止息新寒外
束則內外合邪而益甚不比尋常外感也肺竅窒塞
呼吸促迫脉之沉急也固宜治之必得內外兩解之

方庶可奏捷乃以仲景大小青龍湯參而行之麻桂杏仁以散表石膏以清裏半夏五味以逐飲而收陰乾姜細辛以散結而分邪投之輒效蓋無形之感從肌膚出有形之痰從水道出頃刻分解無餘耳

治巔頂痛大便黑潮流窮源辨症治驗

大町幸次郎三十餘歲脉數火升面赤巔頂痛大便黑此現在之症詢其始末自去年正月腹痛如割九月又發兩肩如縛背重如負石胸中怔忡多言至十

一月忽然目瞪不語手足顫掉不寐兼見今症也此肺氣不降肝氣上逆風火相煽痰凝蓄血之症肩背之重肺不利也頂痛面赤肝火升也手掉目瞪肝風作也多言便黑蓄血症也以其更相盛衰故作止迭見以爲奇病也足厥陰之氣橫決於中則腹痛循經而上則頂痛挾火則發熱怔忡挾痰則目瞪不語風木不受制於金而反侮金金氣不降而經絡壅滯重痛所由來也肝乃藏血之臟風火沸騰血亦不安其

室不歸經而爲蓄血血蓄則如狂故多言不寐大便黑也方用桃仁赤芍鼈甲以去瘀血鬱金香附川芎以達木鬱鈎藤天麻薄荷殭蠶以定風黃芩山梔以降火清金五劑而得睡半月乃愈

治病當在未病之先已病則難爲力

中川兵三郎年四十餘體偉善飲二年前曾患口眼偏邪兩窻間談偶診其脉洪滑勁疾似有風火挾痰並作之象詢之無所苦誠以預藥治將病彼雖口諾

又以公事因循越旬日忽然病發往診之見其言語艱滯舌赤色右脉勁疾而滑大火升痰阻當滋陰降火而兼豁痰卽以生地麥冬當歸白芍廣皮半夏黃柏黃芩竹瀝三大劑服之少可隨症加減至二十劑而經絡和平言語便利又以地黃丸調理月餘方可出外氣色雖明潤行動仍少力不能曲突徙薪而已爲焦頭爛額矣

治老年久病命門火虛窮源治法

森田久兵衛年已望六人瘦病久二三年患腹痛夏
愈冬發積困至今著牀二旬日矣飲食甚少咽下如
有物者然氣自腰或小腹從脇土攻作脹且痛惟右
爲更甚時吐清水或作酸或嘈雜六脉沈遲此火虛
無以生土肝腎之陰上僭故也何則後天之氣以先
天之氣爲之本難經曰臍下腎間動氣人之生命也
十二經之根本也故名曰原三焦者原氣之別使主
通行三氣經歷於五臟六腑內經曰宗榮衛三氣常

從足少陰之分間行於五臟六腑可見腎氣一逆則
三氣皆不順宗氣積於膻中者出於肺循咽喉呼出
吸入而如有物以窒礙也榮氣之出於中脘者不能
腐熟水穀故作酸嘈雜而吐清水也衛氣之出下焦
者不能濟泌別汁而滲入膀胱所以氣從小腹上攻
而爲脹爲痛也右更甚者脾肺之道路通於右陰氣
上逆不得下降故也治之之法欲水不上溢必先培
土欲土健運必先去寒濕是非煖水臟而伐陰邪不

可方以桂附以益火之原茯苓以伐腎之邪半夏以
滌飲之流白朮以助脾之正佐以桔梗橘紅利氣甘
草和中連進十五服腹乃不脹痛脉亦不遲作酸嘈
雜皆已清水間或稍吐減去附子仍以前方二十劑
而前症悉除飲食乃增續以資生丸補其後天總計
兩月而行動如常

治歷節痛風尋源而愈

古閑平兵衛三十四歲姿稟亦清多年患淋濁周身

遂致歷節疼痛四末猶可腰背爲甚逢夏濕熱之令
病則愈重脉沈數而潛沈數爲內熱潛爲血少亦爲
有濕風寒濕雜合而爲痺卽今之痛風間有風火亦
有血虛然皆不離乎濕也治當責之肺肺以行治節
通水道濁自清而痛自已方以桔梗甘州桑白皮地
骨皮半夏陳皮蒼朮秦艽桑枝半月而病去四五分
月餘而愈六七乃服一陳湯加當歸玉竹兩月脉亦
和平更以補氣血之藥少佐治風濕者百餘日全愈

治淋秘兼痛風

齊藤作右衛門四十七歲去春生小便毒多服土茯苓肌肉消瘦筋骨疼痛夏秋復久痢因而歷節走痛天陰更甚常患淋濁今且小便熱結此斷喪太過而召毒冷毒而傷氣血氣血虛而更爲痛風肢節之病其末小便之病其本也脉略急疾治宜清利水道兼活血祛風水道利而吸引之機自捷治節行而筋骨之痛自除方以四苓散加桔梗黃芩當歸秦艽羌活

十餘劑而便利痛止保養以復氣血存乎一已豈不得而主也

治食鬱不同脾泄治法

服部武右衛門六十一歲素有疝氣胃有積滯飲食或膩滯或作脹大便酸臭時時作泄蓋已有年此食鬱症也而非脾胃虛也若用止泄藥而鬱益甚矣脉弦滑宜用越鞠方倍神麴以治食鬱加水香川練以治疝氣服三劑當效彼初服一劑去大便甚多即駭

而不再服越數日腹中覺和猶疑是瀉藥而不敢服
復來詢其故明諭前所多去者乃積垢也終劑當愈
服之果然腹中大快疝亦平復十劑而飲食增不復
作泄矣

