




門 362 卷 2 止



千金要方卷三 目次

別地

論長州荻小倉尚齋治久病方法

肥後古間德左衛門致書求方治驗

薩摩樺山休大夫癖塊疝痛積病奇驗

薩摩丹宗清左衛門小便淋痛虛症

薩摩坂本吉左衛門治病必得其情方獲全功

薩摩川北千左衛門背脹高突手掉頭眩症

肥前諸熊小平次久病相因變病捷效

肥前新兵衛久病得情刻期奏效

薩州種子島右平次痞疝重症

酒病

草野德四郎衄血急症

草野德四郎偏枯虛症

吉田兵左衛門酒病爲痛爲衄隨症治法

笹山甚左衛門耽酒致虛幾同勞症治驗

千金要方卷三

大清 江南古瀛 處士周南岐來著

皇和 山陰松江 門人城章陽秋校

論治久病方法

小倉尚齋長州萩之仕官也年逾知非自孩提時右足膝患疽膿血去多始而不能伸繼而不能屈經曰伸而不屈其病在骨然肢節之屈伸全賴乎血血不榮筋則筋急急則肢節強直至今如此疤痕常陷去

年作痛雖愈時或猶疼幸足腓不消故行動如舊也
今脉見虛寒養血舒筋之藥雖所當然但自幼之疾
未必有補而服藥當無虛其虛也煎方 當歸 熟
地黃 牛膝 木瓜 秦艽 川續斷 獨活 附
子 蒼朮 足得血而能步故以熟地當歸養血爲
君肝主筋腎主骨以木瓜牛膝行肝補腎而強筋骨
爲臣秦艽續斷獨活且以理氣血且以祛風濕附子
溫經以入足少陰蒼朮燥濕以入足陽明爲佐使蓋

少陰爲三陰之樞而陽明爲經脉之長所以司開闔
束筋骨而利機關者也故不可不兼治之服此數劑
倘得稍稍寬舒卽宜加減附子亦不必多服也食物
忌生冷酸飲之物

肥後古間德左衛門致書求方治驗
肥後古間德左衛門人僅中年從來多病先致書求
方答云據所述病情乃足少陰虛寒症也少年腹痛
陰囊腫未幾而愈者寒暫襲於少陰也足少陰之經

起於湧泉並足太陽之經上循陰股結於陰器而足少陰之脉會於脊之長強穴還出於前循橫骨以至臍之左右屬腎絡膀胱其直者屬腎上貫肝膈其支者從肺出絡心注胸中故少陰受病腹痛囊腫也其後得酒痛止者酒乃水穀之悍氣先充絡脉衛氣以平營氣乃滿而經絡大盛則邪弗能容故痛即止後乃飲酒不能止者邪盛而酒不能勝也痛在鳩尾且易傷食者以其脉貫膈絡心寒邪直逼於上而脾亦

失健運也病久正虛所以外隨氣候寒水司令則連發不休內邪固結蟠踞中州則堅硬如石也囊汗脈汗濕流谿谷大便不利者腎主二陰之竅痛則不通也遺精者心腎不交肢冷者脾陽不布口臭者胃火上浮痛則諸事俱廢理當然也見症多端總不外乎少陰所過之處然其病自下而上由淺而深將來陰寒寢長陽和漸微則難爲矣治之唯以扶陽抑陰爲主雖未知其脉如何聊擬一方以備採擇而已 蒼

木 木香 香附 茯苓 官桂 靈仙 大茴香

加煨薑水煎 病久必生鬱故以開鬱者爲君且

以燥濕且以快氣茯苓伐腎邪官桂煖水臟靈仙以
攻積茴香以引經若脉遲宜加附子若臨痛時宜加
吳萸川練子又當隨時酌用也但貴處藥劑甚輕下
焦之病輕則不能達每劑五錢必不可少鄙見如此
不識有當否書去越兩月買舟來訪云服此方甘劑
夢遺囊濕效腹亦快前鳩尾痛者今移在右腹大便

既利多食卽溘診之其脉皆沉按之弦而畧濇此元
陽久虛寒沍未融之象故沉而弦內有瘀血故脉帶
濇方以附子理中湯加活血理氣之藥三服去大便
黑色者甚多更加桃仁五茄皮黑色之物盡繼以淡
青色又轉爲淡綠色脉亦不沉痛處皆去矣以六君
子湯加減調理一月全愈更製九令其歸家常服此
寒凝血積腹內幾成冰窟誰知陽和一轉大地生春
澗溪冰雪不得不溶而趨下矣客秋去後今春復來

致謝云身既無恙但此丸似不可久離願製常服正善後之道也

治癖塊疝痛夜不可卧積病奇驗

薩州仕官樺山休太夫二十七歲形長瘦弱面色青黃憔悴腹中有塊有疝痛引小腹陰囊夜不可卧卧則欲嘔時吐酸水原其致此之由因鼻生瘰肉誤多服寒劑且食冷物病成日甚也但寒症與數脉不合當論其數則爲虛非爲熱也自十三歲病至於今痰

飲壅塞脾肺之道而不可卧此症不解不可爲矣宜急治之方以桔梗開肺氣蒼朮開脾氣香附解諸鬱白芥子爲右脇之引經茯苓以伐腎邪茴香以溫腎氣烏藥以理下焦之氣甘州和中三劑而脉緩乃加水香附子六劑而安卧塊與疝皆寬改用香砂六君子湯去人參塊雖減而仍有痛加人參一錢鼈甲煨末一錢二劑大便去黑糞而塊痛止連服六劑而取去其穢物或青或綠或黑不一宿積既去而塊之形

跡潛消、面色亦稍轉也。

治小便淋痛虛症

薩摩丹宗清左衛門三十餘歲、本體清薄、十四五歲時、因病虛而周身懾懾震動、七八年來小便淋痛、痛有時雖和而頻數、則甚、白濁時淋、此皆虛而有火之症、而脉反遲重、按且滯、是陽氣下陷、當先升提、以補中益氣、加官桂連進六劑、頻數輒減、白濁竟停、而痛尚未盡除、間以導赤散、重用甘草梢、以治莖中痛、十

餘服痛止、仍以益氣湯加味、隨時變易服至五十日而愈。

治病必得其情、方獲全功

薩摩坂本吉左衛門五旬稟厚、據云去冬過嶺、嚼雪救渴、今春上腭腫潰、穿腦、語言鼻音、予思雪寒物也、瘡熱毒也、豈有感寒而發熱毒之理、必其前有毒蓄、因觸而發也、詢之果然、脉沉數、獨右寸關有力、沉數爲內熱、有力爲毒發、所以日晡火升、大便結、治宜降。

火消毒以清腦方用瀉白散加桔梗玄參苓翹薄荷
藁本三劑仍熱加大黃酒製六劑而熱退脉緩大便
利腦中膿亦少去大黃加黃芪又十劑而收全功

治久患背脹高突手掉頭眩奇症異效

薩摩川北千左衛門脉右滑疾十年以前右半身不
快手覺搖掉頭顛眩欲仆後又病傷寒即掉搖不止
右背胛脹痛高一塊如覆瓢筋脉動掣灸火無算血
液乾燥此痰氣內鬱肝風自動肺不能制故反有餘

於肺之部分也治宜消痰定風養血理氣方以橘半
消痰竹瀝佐之鈎藤天麻秦艽驅風定搐當歸芍藥
以養血桔梗以清肺道山梔以引火鬱三大劑而背
腫稍寬痛止搖掉亦輕連進十劑病去七八又二十
服而高者全愈至奇之病用至平之藥亦奏奇功針
芥相投耳

治久病相因變病尋源而治捷效

諸熊小平次肥前武弁也年近三旬三年左半身不

遂右頭面曾大腫遍身灸火多服大楓子以致肌肉麻木至今目不可瞬指臂及身或仁或不仁頭頂痛且嚮額上緊急此因病致病而治究必求其本也左不遂血分病也右腫大氣分病也不理氣養血惟務灸火更耗其血矣不用調榮養衛之方反服惡劣之藥更傷其正矣氣血不足且不和經脉緊急麻木不仁之不免也頭痛嚮者風火升也欲治風火必先養血以逍遙散加麥冬黃芩秦艽每劑重兩許十劑而

頭痛止額脉寬但目瞬不交睫病久而經脉已定必難復也又五劑而效越兩月兩大陽於陽分時作痛此前症欲發而未及於頭耳即以前方五劑效又取五劑而還因遠以備不時也

治久病得情刻期奏效

肥前新兵衛年雖四九形體瘦弱脉細無力四肢怠倦左腹有塊如拳按之甚堅動則築然而痛兩目時昏時明兩耳時聰時聾詢其致病之由少年緣樹墜

下觸傷陰囊去血甚多以成斯症此肝血大虧肝氣鬱積之候血虛則火易升故耳目或聾或昏氣鬱則積不散故堅硬攻痛况疤痕黑紫清水外溢則周身皆惡此其驗也治宜疎通肝氣調養肝血使肝經和餘症自退方用柴胡以升之吳萸以降之青皮以伐之陳皮以補之香附以開鬱靈僊以攻積赤芍官桂以行血白朮茯苓以培土進八劑而塊消大半但臍上有動氣任脉急也專以補中益氣湯五劑動氣大

減復用開鬱丸藥緩以治之塊漸無形又間以溫補調和元氣旬日之後脉亦有神痞既愈若覺有痞此肝經之餘氣未盡消也耳病愈但目有時花此肝經之血尚未充足也此時不必用肝經之藥惟培養脾土土厚而木自茂也以香砂六君子丸繼之二十年之病未及三月而獲全功亦意外之事也快哉

治痞疝重症

種子島右平次自幼及壯傷食有積今左小腹痛連

腰脇塊上攻則下虛心中痞塞下攻則作瀉四肢常
冷寒月尤甚此脾胃有宿積肝腎有寒疝相倚作患
故雖痛無定而總不離其部也脉左弦急足三陰皆
病而爲陰有餘之症必得純陽之藥始能勝之方以
吳萸赤芍青皮以治厥陰茯苓澤瀉桂附以治少陰
蒼朮厚樸木香以治太陰不必用破積消塊諸剋削
之藥惟陽和四達重陰自然消釋也三劑效六劑已
又求五劑而回薩州

治衄血急症

草野德四郎年四十九歲素嗜麪羹去春病醒狂言
不寐秋間鼻衄今冬忽發鼻紅不止右耳前後鳴心
怔忡宗氣動脉沉數總之酒氣猛烈飲入於胃胃大
絡通於膽膽氣滿則狂言不寐熱酪傷肺肺開竅於
鼻故鼻衄至於耳鳴心動皆酒之辛熱助火充斥於
經絡猶在所緩獨今之鼻紅不止甚而成流且泛溢
四出嚔噎幾絕其危甚矣權以急救之法以濕紙甘

層貼於顛頂火斗熨之令諸經之血下趨即以金底
抽薪之法下奪其勢一服血止再以涼血清肺之劑
連進三服繼以壯水滋陰匝月全愈

治偏枯虛症

草野德四郎五旬瘦薄右半身忽然不遂手足冷口
眼歪斜脉沉無力此氣血兩虛而爲偏枯之症與肥
而有痰者不同緣去年衄血幾絕治後未必復元况
又嗜麪蘖穀食常少故有此虛寒之症也宜溫補氣

血以附子理中湯溫中加黃芪廣皮以行氣當歸桂
枝以活血天麻以戢木寧風二三劑四肢即煖口稍
正十餘劑而大效減天麻桂枝惟氣血平補之藥五
十劑而行動如常五旬之人氣血始衰故雖如此重
症藥餌之力可奏全績自此而日漸就衰若不自愛
猶沉湎於酒倘此症復發雖有藥石恐難爲力矣故
爲之三復致誠云

治酒病爲痛爲衄隨症婉轉治法

吉田兵左衛門年已望五素耽麴蘖初秋病醒不能
進食頭痛自迎香穴及兩大陽頤門顛頂痠痛不可
名狀左耳鳴如搗杵聲右耳脹塞鼻多衄血脉滑大
此酒酷烈之氣充斥於上經絡受傷故也服藥罔效
兩月奄奄不食消瘦竟為不起夫酒入胃即通於膽
膽遺熱於腦腦絡諸陽酒氣灌滲於諸經鬱而不散
清陽之氣為其所亂是以其痛萬狀也濕熱傷胃所
以不食熏蒸於肺擾動經血所以鼻衄治之概用苦

寒徒傷中氣無益也必以甘涼純粹之品為脾胃所
悅者入胃以和中氣以行少陽陽明之經解鬱清火
自然相宜方以葛根為君入陽明解肌散火且消酒
毒麥冬白芍藥為臣入太陰清金補土即以瀉火柴
胡甘菊藁本為佐使入腦祛風熄火以定痛濕熱之
蒸鬱已久金氣乍動降令難行必得主秋冬之封蟄
者行乎其中以轉氣機其效自捷故以黃柏酒炒栢
假酒以上行火得栢而下降也連進三劑頭疼大減

胃開食進身亦爽快但鼻衄不止用犀角地黄湯四服即止乃易六味地黄湯調理愈

耽酒致虛幾同勞症治驗

筭山甚左衛門年僅三旬稟體清弱素嗜麪藥三載咳嗽今更聲嘶右脇痛連腰不可著席惟左一側臥飲食減少脉弦而數此脾肺傷於濕熱漸成陰虛之候也酒性辛烈上行熏燥肺金清肅不降則咳逆於經隧則痛充斥於脾胃則妨食津液久耗化源不清

而陰日虧則內熱脉數脾肺道路通於右故痛在右脇宜先清肺理脾使其痛止咳稀而音自清然後壯水而熱自退也方用甘桔蘇橘以通肺道白芥子以止痛苓朮山藥以健脾皆甘淡純粹之品補土以生金香燥非所宜也連進九劑脉緩前症皆退停藥旬日咳熱復作仍以前方加麥冬百合去芥子以右脇已不痛也又十劑咳止音清乃以六味地黄湯加麥冬百合一月而安再以地黄丸繼之

金要方卷四 目次

外科

山口清右衛門楊梅餘毒鼻破咽傷變症

權平瘡毒將發急用汗下以退之法

三元彌平次瘡毒廢疾攻補兼施之法

女科

溝口長左衛門妻衝任積病

草野七大夫室月事愆期作痛乘熱利導法

田口助右衛門室胎前疑難雜症

梅野儀右衛門妻腫脹急病

福島清七婦人血虛不起兼有積塊危症

蝶翁二夫人積塊乘通經攻散治法

田中助右衛門母瘡毒痼疾得痊

目科

草野與三太肝胃互乘目疾異驗

莊次郎目科重症

小原段平瞳神色淡幾成内障

僧人

伯珣師下血大虛非大補不可治驗

梵雲師疝癖相因挾飲重症

覺林師將病半身不遂預治卽效

唐館

谷子玉久病危症

五知齋集目錄

卷四

千金要方卷四

大清江南古瀛處士周南岐來著

皇和山陰松江門人城章陽秋校

治楊梅餘毒鼻破咽傷變症并多服土茯苓疑

案

山口清右衛門年二十六歲曾患毒瘡鼻破咽傷至
今左咽常痛咯嚥不利因服土茯苓甚多四肢常冷
大便難脉遲瀋寒在太陰少陰矣宜調養榮衛而兼

導火之藥方以歸地調榮芪甘養衛牛膝佐附子以導火下行少加桔梗銀花爲舟楫使由上而下六劑而咽利氣順肢煖脉和乃去附子而加麥冬玄參花扮又五劑而咽鼻大利又服六味地黄丸三十日而安按土茯苓本草謂其健脾胃祛風濕治筋骨拘攣楊梅瘡毒何以多服土茯苓反肢冷便難脉濇竟將成虛寒之症似書所載其功效大不相同更見有多服以至筋骨攣痛不能行動者諒甘淡平之藥必不

有損於氣血然服至百觔瘡毒未愈鮮不爲害疑信之際尚俟參究

治瘡毒將發急用汗下以退之法

權平壯年之人六脉洪滑而又非外感必有大毒將發之兆也曰曾患便毒既潰且愈今復筋骨不利視其遍身隱隱於皮膚中者大小斑痕如錦但未透出於外宜先下之以逐其在內之毒次汗之以散其在外之毒卽有瘡發勢必輕矣以三黃湯加朴硝二劑

利三四次體不覺倦癰痕已消一半乃以荆防敗毒散連進三劑取微汗表雖疎解脉尚帶洪再進通利之劑微下之脉既和平乃以清涼解毒和平之藥日盡一大劑二旬日而竟潛消忽而腮下腫起恐成結毒又下一次仍以和鮮一月全愈此全不用土茯苓以汗下驅其毒使無留餘不遺後患倘以苓連大黃爲苦寒而不敢服或以荆防爲發毒而不欲服甘心止遏其害可勝道哉世之患毒者慎毋因循而不攻

發之早也

治瘡毒廢疾攻補兼施之法

三元彌平次中年之人病久體弱楊梅毒瘡滿於頭面咽喉先延外科療治久之耳鳴目盲筋骨攣痛外症毒勢充斥內又虛症蜂起高氏致書屬治但余不長外科權爲代庖之計診其脉沉細無力此因治毒不顧其本元以致變症百出今當用且戰且守之法一日攻毒兩日調養氣血如此五日一大利三日一

小利五日一大汗三日一小汗半月後瘡痂漸脫月
餘耳目之力亦覺稍復診其脉亦和緩大毒已去筋
骨已利但左手不能舉高左耳常鳴目尚昏花此皆
虛候惟宜大補精血畧兼解毒連進數劑得效甚捷
即以四物與六味相間作湯作丸而成功

治女科衝任積疰

溝口長左衛門妻三十歲脉沉數而潘左側不可卧
卧則氣升右半頭痛鼻中涕結成硬條時時帶下臨

經兩乳脹痛小腹痛引腰月事不調且少色如爛魚
腸此肝氣有餘肝血不足衝任虛而有火也治法當
以去瘀爲先方用柴胡青皮以疎肝芎歸以養血丹
皮佐之玄胡烏藥桃仁大黃去瘀行滯官桂紅花佐
之三劑而左側可卧八劑而經水大行瘀積垢汚盡
去痛脹全除脉已大而不潘三日方止經血已多通
體鬆快經後以補中益氣調養之劑即繼調經丸藥
次月不用通經自順流而下矣

治月事愆期作痛用乘勢利導法

草野七太夫室少年生面瘡去冬蔓衍滿面今春沿
及胸頸服清火解毒藥外敷燥濕生肌半月全愈診
之六脉沉遲虛寒氣滯之候所以月事愆期臨經必
先作脹及胃小腹作痛先用開鬱行氣丸藥緩調旬
日候臨經期復脹且痛數噫氣不除乃以溫經行血
之劑乘勢利導二服而痛脹若失溫經用肉桂炮
姜行血用大黃酒拌九蒸九晒桃仁蘓木當歸川芎

而已先用開氣藥者以血隨氣行無形之氣先已鼓
動有形之血凝滯爲患者得溫利之藥力蕩掃無餘
不然氣機未動即用行血未有不相持而痛益甚者
若驟用破氣破血猶恐有奔潰之虞矣

治胎前疑難雜症

田口助右衛門室二十餘歲素有積聚胃中脹痛即
不可食今妊娠四月仍前作脹旬日不食面青眈白
六脉浮滑無力已諸藥不效矣此時若欲攻積恐動

其胎若欲安胎反增其脹固難措手愚以爲積之妨胃不食以胃陽之不足也胎氣上係於脾胎之不安以脾氣之不健也攻積安胎兩不可何不健脾助胃行津液而脹自已以開鬱散加蘓梗砂仁木香葱白二劑而脹寬脉即不浮又加廣皮白芍四劑胃氣皆和瘳消食進最爲大幸又忽生便毒下體硬腫兩足虛浮內服清和托毒之藥調和氣血以養其胎外用敷藥忌麝魏妨胎取清涼收瀉者以消其毒五日乃

退以後虛症百出時而足冷加以溫經而愈時而火升頭痛加以和解而痊飲食既進諸症之變幻匝月而始平復子母無恙予心始慰矣

治婦人腫脹急病

梅野儀右衛門妻年四十歲面黃而浮青氣今年四月患濕瘡以熱湯頻澆足上腫起至九月頭臉腫滿胸膈脹硬呼吸不利下體腰脇腫痛按之如板坐臥不能喘呼欲絕諸藥不效診之脉細無力此風水相

搏一身盡腫之症但腫病之危多延時月斷無一重而即若此之甚危者細察其由蓋因偶飲冷酒以致斯極此與陰氣填塞臍脹乃生大不相同經曰形寒飲冷主傷乎肺肺傷則不能通調水道下輸膀胱所以內外合邪上下迸迫而見此危候也治宜先散肺邪以救急後治脾腎以成功可也方以麻黃湯合四苓散製劑重一兩煎成與之徐徐飲下藥未服已氣即稍寬不及一夜脹退氣平腫減三分之一可坐可

卧其勢既退乃用緩治之法以五苓散加麥冬車前以清其化源五劑腫愈大半後以濟生腎氣湯以治其本又五劑而腫脹全退

治女人血虛不起兼有積塊危症

福島清七婦人三十六歲面黃神倦脉沉無力兩腿腫痛自居窳以至足踵筋骨掣痛夜間尤甚臥床有年原其所以致此者三年患黃疸左脇下有塊如竹筒硬堅腹中升則痛絕且血崩之後虛腫不退繼以

白帶誤灸三里穴竟出血不止血去既多虛而益虛
幸而不斃者以飲食可進也此肝腎大虛血不榮筋
雖有積聚理宜溫經養血消積其緩焉者也方用桂
附以溫經當歸以養血木瓜牛膝以引經獨活爲少
陰報使且動盪一身氣血服二劑而腰痛若失腿膝
溫和氣血流通月事忽至紫血一去四肢輕快可坐
可立更加二陳理氣靈僊破積五六服積聚右移而
散再加入參而腫退惟左足痛筋畧急然竟可以行

動矣飲食倍增顏色黃退久病將起孰意不善調攝
食海鮮太過以致傷脾作泄驟行數次亦不甚忤越
數日又傷食作泄雖不甚苦然病加於小愈矣再健
脾即止人參不可繼即以八味地黃丸服之閒以通
經止痛煎劑行乎其中自十月至臘月而平復

治積塊乘通經攻散先本後末治法

蝶翁二夫人年四十餘月事雖有從未生育患積聚
七八年左脇下橫攻及臍作痛作脹攻胃引背上逆

乳傍發止不時診之脉右關帶弦此正木乘土位之
象治宜土中升木則土自和平又手足歷節痛腫此
乃風寒濕雜合而成行痹健脾燥濕亦所必須然症
有緩急而治當分先後開鬱散結以治積塊理所當
先方以開鬱散加青皮以達左脇靈仙三稜以攻堅
烏藥以破下焦之氣玉桂以入血分即以伐肝所謂
木得桂而枯也適臨經作痛攻下瘀黑更乘勢利導
前方加桃仁赤芍玄胡五服之後塊已潛消至次月

臨經竟不痛矣仍以治行痹之藥而定痛此其未終
也

治瘡毒痼疾得痊

田中助右衛門之母四十五歲形體清弱脉小急疾
患毒瘡三年常服土茯苓時發時愈月事漸少今毒
聚於喉鼻咽中介介然如衣領緊扼之狀噤如梅核
左右鼻中常塞語音不清鼻梁腫高左頰腫硬兩肩
筋骨疼痛不思飲食藥餌無效此因傳染毒氣服寒

涼以傷正氣所以血虛經少內熱脉數也其毒之聚於上焦者皆在肺之部分肺主氣氣中之毒流連不解者以所服攻毒之藥多峻削徒傷脾氣肝血所以食減筋痛也治之當於健脾養血之中加輕清芬芳之品以解毒清火庶或有當方以逍遙散以治血虛內熱亦取其苓朮以健脾加甘桔以開肺道桑白皮金銀花以解毒服旬日痛減腫消又旬日脉亦和緩但沉細無力久病體虛脉固宜然咽喉時或不利仍

以甘桔湯加玄參麥冬花粉滋養肺金匝月而安

治肝胃互乘日疾異驗

草野與三太三十六歲氣體強壯望之若無病者然診其脉來盛去悠來陽也盛則有餘之象氣爲陽當病在氣分故脇下積塊有年日土攻心膈或及咽喉不可飲食日常見一圈黃色在若遠若近之間黃中夾土色也目肝之竅也青睛屬肝黑睛屬腎肝腎虛則目昏而此黃色者何也經曰食入於胃散精於脾

滯氣於肝是肝與胃原相屬也所以脇下積氣攻胃
則上及食道胃氣乘肝則目見黃色也治之當疎肝
平胃爲主經曰木不及曰委和太過曰發生土不
曰卑監太過曰敦阜發生者宜疎之敦阜者宜平之
方以香附蒼朮川芎以開肝鬱柴胡青皮以疎肝氣
厚樸廣皮以平胃氣十劑而積消不攻二十劑而黃
色小如棋子矣

治目科重症

莊次郎年未及冠右目紅腫多淚始疑爲時行赤眼
久而翳障遮睛高突純白五更眼眶作痛已經兩月
今更左脇下緊痛按之氣急不可著席此肝氣脹於
內而目睛突於外皆屬有餘治宜疎肝使內症平而
目翳自退先以疎肝散加利氣祛風之藥五劑而脇
痛平和左側可臥次以瀉白散加伐肝去翳之藥而
眵淚少翳亦淡薄後以養血清火而目不瀼不痛又
加補肝而光復如前總計四十劑方凡五易而收全

功因咏一聯以贈之曰雨散天還碧雲開月復明呵

治因瞳神色淡幾成内障

小原段平三十七歲患目疾不紅不腫不痛白日之下不能見人服藥灸火皆無效其瞳神色淡肝脉獨大此肝虛而無外邪所以不紅不痛且無障翳也治以壯水生木酸收之味以斂其神光甘溫之性以助其陽氣連服十六大劑目力始有望覺清爽脉亦有

神又十服瞳光從外眼角發出視物甚明正面仍有模糊又十餘劑左眼光多右尚不及然於漫天雲霧之中忽覩一方碧漢亦一快事也勉其靜養以俟之母多藥爲也得效之方六味地黃去茯苓澤瀉加兔絲枸杞五味黃芪甘艸而已眼科套劑一無所用也治下血大虛非大補不可治驗

伯珣師三十一歲少年曾有便血之症已四五年不發矣臘月忽下血六七日日夜十餘度兩脇作痛攻

在臍下裏急即行兩腿痠痛飲食無味脉弦大而滑
此肝不藏血瘀積乃下失血之脉宜沈細不宜滑大
元氣不歛反見有餘之脉雖有瘀血先宜平肝止血
爲主若歛之不及必大補氣可也服膠艾四物湯去
川芎倍白芍加荆艾穗灰二劑不止商用補中益氣
湯以去血由脇下刮痛而下非此不治也孰意又有
沮之者曰人參不可輕用用之無益徒費資財吾有
妙藥不必人參兩日可愈病者樂從其言二日之內

痛不可忍體更憊甚乃悔而服人參煎藥纔下胸腹
脇痛即寬方悟非參不救也連進五日而愈○次年
冬又傷寒愈後腹痛如捻坐臥不寧而痛必於丑寅
之時重按方可氣或上攻如有硬物者然移時乃止
已經一月食入不快病後之病憔悴不堪脉弦大而
動此中氣既虛陰氣上乘故也方以官桂茯苓白朮
甘艸干姜吳萸以扶陽抑陰三劑痛止九劑愈
治疝與痞相因挾飲而症更甚

梵雲師京上人也二十九歲六脉弦數幼而病疝長而患痞胸膈常塞自左脇攻至鳩尾其形如拳肝氣逆也寅刻則動木旺時也臍間按如弓弦任脉急也時而氣鬱如坐甕中如冒大帽其症甚怪皆痰飲伏於胸脇水勢漲天陰霾蔽日之象必平肝滌飲而病自已方用蒼朮香附川芎以開鬱加青皮以伐肝靈仙以消癰吳萸以降逆半夏以消飲脉既數則以黑山梔佐之十餘劑而諸症大退又因濕熱生癢瘡續

用清利濕熱等藥而內外皆安

治將病半身不遂預治即效

覺林師年已望六氣體肥盛左手足麻口角流涎舌強言蹇脉滑大而疾此濕生痰痰生熱熱生風醞釀既久將半身不遂恐一發而難起也宜燥濕消痰清火急治其標猶可圖也方以導痰湯加天麻鈎藤蒼朮山梔姜汁竹瀝十劑效脉之滑疾減十之七但舌略自覺強二十劑愈又地黃九十餘服安

治久病危症

唐館谷子玉脉數而細按之無神兼之咳血下血此真陰大虧之候也冬不固封蟄之本至春無以奉升生之令所以木鬱不達以致兩脇不可側卧危機已見於此矣木鬱之久不能上升者反下攻作響而盤旋於少腹今且木來尅土橫決中州胃脘亦爲之板結硬痛此時欲攻其結脉虛形削動則氣高而喘虛之極矣必不可攻若欲補之血因火上炎而咳血不

歸經而下泄卧即上氣喘咳此金不制木而木反侮金補之亦不可也將奈之何所賴飲食雖減猶尚可進按木鬱達之之義以疎肝解鬱之法圖僥倖於萬一倘兩脇和順可以轉側即爲生機方以生地丹皮赤芍以潤肝血柴胡青皮以疎肝氣鬱金貝母以解鬱桃仁以去瘀桔梗以開肺氣連服四劑左右略可側卧生機在是矣再加蘇子麥冬以清肺竟咳少氣平但胃中之硬塊未消再以調中之藥減去地黃之

滋膩胃中塊移下脘之傍食即不脹乃以補中益氣
去黃芪加麥冬貝母蘇子二服而塊俱散但心中之
熱未除所以宿有疥瘡經曰諸痛癢瘡皆屬心火即
加黃連於前方二三劑效胃氣纔復腸內之宿滯不
能停蓄瘀積黑物大去胃脘亦寬脉尚虛數仍以養
血清火為主調理至兩月而愈後遇恩准回唐得以
生歸故里誠僥倖中之僥倖也

千金要方卷五目次

附錄答問數條

答雪虬先生消暑丸論

答研覃居問幼科折衷緣由

答交感丸藥性

答中年人不能行動可服史國公藥酒之問

答藥中用生薑諸法

答婦人養胎之法

答痘瘡灌漿結痂後不必用酒湯洒拭
答問五十餘歲人患疝并疑難雜病狀
答肥前頭目病案
答札論症立方
答女人痺症治法
答病狀

千金要方卷五

大清 江南古瀛 處士周南岐來著

皇和 山陰松江 門人城章陽秋校

附錄答問數條

一答雪虬先生消暑丸論

且理以大中至正爲歸論以至當不易爲則古人
立方以教後學原欲學者神而明之斟酌可否權
宜變通務期於確當不至有過始不負其立法之

初心也。若執藥性之主治方治之效驗而刻舟求劍，則一藥可兼治數病也。何取乎？立方一病立一方足矣。何取乎？多方古今來方書克棟軒岐之道不能共白於天下者，大抵義理不撥，夫中正議論不求，夫至當也。卽如先生所示消暑丸一論，辯駁精詳，言論博雅，求之當世之業鑿者，固以爲巨擘。若以之垂示後學，不無有微疵焉。消暑丸本於和劑，曰治伏暑引飲，脾胃不利。此方之見於方書久矣。

爲此論者，當明暑爲何病，此方何以能治伏暑，而伏暑何以必引飲，脾胃何以不利，將立方之意隱而不發者，能暢然發其所未發，斯爲和劑之功。臣亦爲後知之先覺而論未之及也。方後并載治中暑傷暑之分中者，卒然昏暈傷者，不過發熱頭疼已也。病有輕重，效有淺深，其云卽甦言效之捷也。云尤妙者，其症旣輕而效尤易也。其云夏月常服止渴利小便，雖飲水太多亦不爲害，蓋謂夏月

人渴即飲水而飲水太多鮮不爲害者以伏暑引飲故也經云飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺肺乃通調水道下輸膀胱則飲多而脾胃不利非利小便不足以除其害非此丸不足以利小便可以常服不可以缺此者原教人用以治病非謂不渴不飲水而小便自利者強之使服也暑藥之奏奇功莫優於香薷扁豆彼豈不知其製香薷飲香薷湯香薷丸皆和劑之方各言治

暑症之功效而又云暑藥皆不及此非無謂而言之也蓋以夏月之傷暑猶冬月之傷寒傷暑之用香薷猶傷寒之用麻黃用之而當效如桴鼓用之不當禍乃旋踵半夏茯苓之誤必不若此所以暑藥皆不及也本草載半夏茯苓之主治不可枚舉不專爲中暑而論何得有藥下即甦之功半夏附方中明載消暑丸之功效而云反爲害則未之前聞內經所云毒藥治病各有差別無使過之凡藥

皆然不獨半夏無毒之藥不可妄服有毒之藥有病病當無病傷正凡藥皆如此亦不獨此丸若以半夏有毒爲不可服先王採毒藥以療民病且教人以制毒之法不因其有毒即棄而不用也其所宜於夏月者當靜悟其理也消暑而傍及於痰飲略示以變通之用也近代之明哲能辨症不離於經用方而會其意者惟嘉言喻氏所以醫門法律採輯治暑諸方而不遺消暑丸者與香薷飲並

列以聽用方者之採擇不特和劑以香薷立名者在所必錄卽百一選方之十味香薷飲亦錄而備覽焉語云醫不執方然而醫必有方也能用古方者卽不見方之害若云自立此消暑丸而爲醫家之害吾恐醫家不善用以貽害未必古人立此丸以害人也吾恐執此方以辨其害將用方以害人者不獨此方也其引商人病案以証消暑丸之誤與醫家設爲問答而反覆辨論無非明半夏茯苓

之不可過劑以重竭其津液也至明伐腎邪以長陰一節可謂看書明眼不惑服餌以致害深有得乎盡信書則不如無書之旨欲求有益先祈無害誠仁人君子之用心也惜其案中辨症用藥未見確切所以議論多而成功少也既以頭疼發熱怠倦不食用消暑丸微效始原不甚誤也迨久之反惡寒自汗盜汗咳嗽陽虛則惡寒自汗陰虛則盜汗咳嗽陰陽兩虛之症倍用柴胡以疎表雖曰補

中益氣浹旬而不得效者非補中益氣之誤而倍用柴胡之誤也若脉虛細而數陰虛脉也注夏陰虛病也明知注夏而寒熱汗嗽亦非不治之症春夏劇秋冬瘥尚可苟延歲月何夏月伏陰在內腠理甚疎之時而不審從標從本正治反治之法以救其敝乎陰虛則陽無所附所以自汗盜汗汗多必致亡陽反用柴胡以逼其虛陽可乎滋陰降火氣味純陰再加地骨皮之苦寒施於怠倦不食之

症其能堪乎所謂一逆尚引日再逆促命期矣經
曰獨陰不長又曰陽氣者若天之與日失其所則
夭折而不彰當取此義而深維之也吾願與同道
諸君子心解力行以深造乎道不必喜新立異以
致過中失正也幸甚

一答研覃居問幼科折衷緣由

研覃居問幼科折衷二冊廣野山人景明秦昌運
集此書有刻板否何以無序跋係何時人也據所

見以答云

醫學折衷乃元時徐彥純字用誠先生所著也其
書中風痿痰癰痢諸論皆大方之症而幼科不與
焉然坊板不久寢失至明初劉純字宗厚者取其
殘編復搜其遺墨彙集成書溯明其源流而改名
其書爲玉機微義至今業醫者咸知玉機本乎折
衷而後先不相掩反相得而益彰也若夫高明之
士有志於軒岐之術者復踵其跡而集幼科折衷

予東遊崎地得觀是編取而繙繹之其詞簡其理明其援引經言及古人之名論皆確當不易其採取方藥皆平正不尚奇僻此誠醫宗之王道而慈幼之嘉惠也惜其書未經坊刻中外未能流播所以前不著序後不加跋凡例中反囑善藏不可輕傳誠欲爲枕中之鴻寶肘後之良方也然私之一家不若公之一世念切蒼生者保民如保赤子保赤更有良方子惠元元更當何如耶宜加考訂賞

付梨棗集中大概皆王損菴先生幼科準繩薛奉政大夫保嬰撮要節取其旨刪繁就簡而折衷其要者也可知其人在王薛後矣而王與薛皆明之名公鉅卿名以醫著景明先生自稱爲山人殆講求醫理欲以醫隱不欲以醫著者歟所以其書秘不問世而人亦第知昔之折衷而不知今之折衷也

一答交感丸藥性

香附性平氣香味辛微苦利一切氣茯神甘溫淡
滲安心養神朱砂甘涼鎮心清肝必須水飛冰糖
甘能悅脾此方乃交感丸加味也按此四味皆無
毒有益之藥無病之人無不可服若氣升火上者
爲心經之病服之自效何也本草云香附得茯神
則交濟心腎故也倘水虧火勝氣逆上行或上胸
膈或升頭面者服雖無害亦未必效以此藥止可
治標不能治本故也

一答三十六七之人不能行動可服史國公藥酒否
并此方及平人常服藥酒何如
人生三十曰壯四十曰強三十六七正強壯之間
也手足竟數年不能行動但不知其形體之肥瘠
未知致病之何由其不能行動之症不一或筋骨
拘急不能行動者有之或經脈緩縱不能收攝者
有之或肌肉不仁不能舉步者有之或四肢無力
雖可行行動則氣高而喘者有之拘急者當責之

肝宜養肝血經曰手得血而能握足得血而能步也緩縱者痿病也五臟皆有痿當責之肺與胃蓋以肺者臟之長也諸痿喘嘔皆屬於肺又曰治痿獨取陽明以萬物皆稟氣於胃也不仁者痺也痺亦分五臟六腑以及榮衛而不仁則主於脾以脾主肌肉也四肢無力亦責之脾以脾主四肢也當辨症察脉以前方處治庶不致誤若徒用藥酒未必確當藥酒方雖有史國公方云可治癰瘡諸症

然亦不可盡信也不過爲通套可服而已史國公酒浸方治左癱右瘓四肢頑麻骨節酸疼諸般寒濕風氣當歸虎脰骨酒浸一日焙乾酥炙羌活鼈甲炙萆薢防風去蘆頭秦艽牛膝松節晚蠶砂各二兩枸杞子五兩乾茄根八兩飯上蒸熟用無灰酒一斗絹帛盛藥入酒內封十日取飲時不可面向罈口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡取藥滓晒乾爲末米糊丸梧子大空心酒下五十丸

忌發風動氣之物○平常人所服藥酒止宜養血生精揀氣味芬芳和平之性可以常服有益於周身之氣血不專治手足冷使陽氣達於四肢而手足自溫和矣參苓白朮酒浸方加味人參一兩茯苓二兩白朮三兩甘草三錢枸杞子二兩歸身二兩廣皮一兩黃芪二兩八味以陳酒十觔加龍眼肉二兩浸一宿煮一炷香爲度置冷水中去火氣每日隨意服二三次

一答藥中用生薑諸法

凡藥方用生薑一片或三片原無一定分量當隨藥劑定輕重卽如發表藥用薑蘇散截瘧方用薑參飲重用生薑不以片計也他如補中益氣之用薑棗取生薑之辛溫大棗之甘溫以助升發之氣薑片不過大如拇指厚如兩文錢而已二陳湯但取生薑以製半夏生薑又不必多也餘皆類此一答婦人養胎之法

婦人妊娠五箇月按女科逐月養胎之法五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣服以避寒殃其食稻麥調和五味以養其氣以定五臟五月之時兒四肢皆成無大饑無甚飽無大勞倦法甚詳悉貴者可依此法賤者勢必不能腹帶之設書所不載唐山亦無用此者但七八月之後身粗腹大恐其胎肥難產則以幅帛重束其腹常行動作之勞使氣血流行則易產也書

問及此者諒乃方俗相沿卽以方俗言之則曉然矣唐山婦女內着小衣曰褲褲外着裙其腰邊皆寬半尺許層層束腹外着衣服衣外束腰者名曰汗巾故可不用帶至七八月之間方以幅帛束其腹也貴處婦人內不束裙惟外有腰邊故早用帶亦俗所宜爾然五月之時胎氣未足卽善調養恐其不長不可緊束也卽有所束當用潤帛若人肥胎壯更有瘦胎散可服不必專以帶束爲也

一答痘瘡灌漿結痂後不必用酒湯洒拭
痘瘡古書不載漢朝以前原無此症自漢武征虜
始染此症故名虜瘡又名天花以其一發則沿村
闔巷也其灌漿成熟結瓣有似乎痘故曰痘近代
以來痘瘡爲幼科之害甚大所以後賢論調治之
法愈詳酒湯洒拭之法在於初見點之時痘出不
快者或用以潤肌鬆表使其易於起發也若灌漿
之後腠理惟恐其不密豈有結痂之後必須酒湯

潤之哉日本用之或風土所宜唐山未之見也
一答問五十餘歲人患痘并疑難雜病狀

問男年五十有餘自少年患痘氣或陰囊偏墜或
腰痛或小便淋瀝時便膿如淋症或胸膈痞滿或
腹鳴時結時瀉種種難名狀之症時作遇不正之
氣候則氣鬱鬱而不樂矣今乙巳春正月之間右
股痛二月中旬卒倒右腳與手急如攣轉筋疼痛
不可忍而後自股至膝腫痛手近皮膚其痛轉甚

至四月痛稍減大半食如常二便亦如故脉弦大而數帶緊右甚左兩倍痛和而脉亦和今至九月初腫痛雖減屈伸起卧未自在矣

答云經曰厥陰有餘病陰痺滑則病狐疝風又曰太陰不足病脾痺滑則病脾風疝可見痺與疝固異病而同源者也今據所述少年病疝偏墜腰痛經所謂狐疝腰尻痛是也小便淋澀有膿如淋經所謂小腹寬熱而痛出白是也厥陰爲風木風屬

肝肝主筋疝氣在筋皆挾肝邪故也太陰不足者太陰爲濕土脾喜燥而惡濕濕勝則不能健運所以痞滿腹鳴大便不調理所必然也病皆屬陰所以遇不正之氣候天氣不精明於上而人氣亦鬱鬱於中也此雖爲舊病而實爲今病之源二月之卒倒正值厥陰風木旺時手足筋攣疼痛風氣勝也股膝腫痛濕氣勝也皮膚手不可近邪氣客於皮膚之間故不欲按卽經所謂痛痺也經云痺在

於筋則屈伸不利而起卧自不便也脉之弦大風
木有餘數而且緊寒濕交盛治法始終宜平木舒
筋燥濕行氣為主但不知病者之稟質厚薄形體
之肥瘠素嗜麴蘖否俱於方後立加減法方用蠲
痺湯加減 獨活 牛膝 蒼朮 附子 香附
當歸 黃芪 白芍 甘草 加薑水煎 方
中當歸以養血黃芪以補氣白芍以平肝木甘州
以和中土原方用羌活利周身之痛也此易獨活

者專爲股膝痛也原方用片薑黃者臂痛之引經
此易牛膝者足膝之引經也加蒼朮以燥濕附子
以溫經香附以理血中之氣且以治疝氣此大略
也若體肥多痰宜加半夏稟質寡弱宜倍參芪善
酒者宜清濕熱附子與黃柏並用再加葛根足冷
多加附子轉筋必用木瓜此又當變通餘不多贅
一答肥前頭目病案

據述女科之症稟質虛弱氣常不快又因小產失

血昏而復甦以後發熱偏頭痛忽又口噤昏憤繼復左半身不仁此氣血兩虛有風火乘乎其間故變症百出也質弱者中氣多不足故不爽快此人常不以爲異至於墮七月之胎此必有因而傷所以去血之多幸而不脫參附之功亦云大矣旬日之後反食減偏頭痛者何也經云心主血肝藏血脾統血血去既多三臟皆虛所以脾虛而食少肝虛而風動心虛而火熾風火內熾上乘筋脉所

以頭偏痛目眵疼甚而至於口噤昏憤也左半身不仁者左主血血虛而氣亦虛所以不仁且冷也調補氣血固其所宜綿延十三年而復發癰症者病雖不與前相因經絡仍不外乎風木故脉沉弦弦木象也經曰暴癰癰眩足不任身取天柱又云癰癰瘕瘕不知所苦兩蹠之下男陽女陰陰蹠交貫衝脉皆厥陰風木所關雖有五癰之說總不外乎痰之潮作也古人以癰癰併言大約異病而同

源好靜處獨居夜不安卧即癲症之漸也治以化痰安神為至當不易之法但痰既屬陰而不安又陰分必扶陽可以抑陰當以豁痰者為九扶陽者作湯緩緩調攝使陽日長而陰日消視其神氣旺和服本沉弦過三四月不發發亦輕可即為欲愈之機方附於後○白金丸治癰鬱金三兩明礬一兩錢五為末米糊丸每服一二錢白湯下○人參養榮湯加減人參五分焦白朮六分茯苓五分甘艸二

分黃芪五分陳皮五分當歸五分白芍五分官桂五分遠志五分半夏五分天麻五分煨五分加生薑三片水煎食前服

一答札論症立方

男子三十餘歲素有痰症胸高氣脹腹鳴有塊左右有如竹竿撐者此肺脾肝三臟之病也肺乃至高之臟稟乾金之象司下降之令順則胸中曠然逆則胸高而脹矣肝居於左脅屬木喜條達而惡

鬱遏受金之制則金伐木榮金不能制則木反侮金所以如竿撐於左也脾居於中屬土而道路通於右能健運則食物變化不能健運則食入難消土虛而木來尅之所以如竿撐於右也五臟之腧皆在於背臟氣不和攻及於腧故或痛或麻也心爲君火又主血血不虛則火不升虛則火自升所以用心則如饑而且悶也腎主二陰之竅大便不利腎亦必不足也總而言之多痰之人腎水上泛

氣不歸原故有氣塞咳喘之症外若有餘內實不足治之無不欲以利氣之藥暫快一時愈久則愈虛愈虛則愈脹也於最難治之中而論其治之之理莫如健脾爲主脾健則中氣運濁氣不土干清氣得下降而肺可順所謂土生金也健則土不受木尅且可土中升木而肝鬱可達也健則爲胃行津液灌溉於五臟而心血有以養腎水有以藏如此則前症或可漸次而效也但不知其體之厚薄

脉之遲數，惟以年尚壯時擬方，製劑以圖僥倖而已。
已 蒼朮一錢炒焦 廣皮五分 茯苓七分 甘草一分
半夏八分 柴胡五分 青皮三分 白芥子五分炒 威靈
僊一錢 脾喜燥而惡濕，故以蒼朮祛濕為君，脾
濕動而生痰，半夏之治痰，茯苓之滲濕，廣皮之理
氣，甘艸之甘緩，皆所以健脾也。柴胡、青皮一升一
降，以治左脇，白芥靈僊消痰攻積，以治右脇，投之
若當旬日之間，自有微效。然後隨症隨脉，加減可

也

一答女人痺症治法

內經曰：風寒濕三氣雜至，合而成痺。其寒氣勝者，
為痛痺；濕氣勝者，為著痺；著痺者，肢體重著，濕氣
留於經絡，皮膚不營，故為不仁。即如下問婦人之
症，是也。其痛自腰至足，指者腰為腎之府，腎脉下
抵於湧泉，故也。又腎主骨，經曰：骨重不可以舉，骨
髓痠痛，寒氣至，名曰骨痺。其痠痛麻痺，不知履脫

其爲不仁可知其寒在骨也腰重如帶五千錢濕腰痛也微弱之脉濕症脉也况其所遭之流離顛沛其志不樂其形可知大約氣血不足而寒濕之邪襲於肌肉筋骨愈久愈深也治之當以除濕爲主通經絡者佐之方以三妙散合蠲痺湯加減

茅山蒼朮

米泔水浸一宿切片炒焦色一錢二分

淮牛膝

一錢 川黃

栢鹽酒炒茯苓

一錢 川附子

炮六分 獨活

八分 加煨

薑三片水三茶碗煎八分空心服渣再煎六分晚

服

方以蒼朮燥濕爲君以茯苓淡滲者佐之以

牛膝下行爲臣以附子之溫經者佐之以獨活之

辛苦溫者入腎搜風以黃栢之苦能堅腎凡濕鬱

之久而成熱者非此不除故與附子並用也藥之

分數不必拘定當以飲食多寡爲進退愚請教在

崎醫師大概用藥輕重之例云劑不過一錢幾分

若有重症一晝夜服可二三劑愚仿此意以製方

凡治上中焦病仍以一二錢爲率而頻服之治下

焦之病則併三服之藥而頓服之何也病在下焦者其道遠藥力少則不能通其經絡故用權變之法而有成驗矣若依此服之倘一候二候稍知卽以蠲痹湯之當歸赤芍之活血黃芪甘草之補氣為主佐以蒼朮羌獨以祛風濕可也若腰重不輕再加官桂杜仲倘或不應一氣之外卽當用外治之法矣一以針刺一以藥熨內經曰久痹不去身者視其血絡以出其血而痹可已又曰刺寒痹納

熱以藥熨之用淳酒二十升蜀椒一升乾薑一觔桂心一觔凡四種皆吹咀漬酒中用綿絮一觔細白布四丈并納酒中置酒馬矢煨中蓋封塗勿使泄五日五夜出布絮曝乾之乾復漬以盡其汁每漬必晬其日乃出乾乾并用滓與綿絮複布爲複巾長六七尺爲六七巾則用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙複巾以熨之三十遍而止汗出以巾拭身亦三十遍而止

無見風每刺必熨如此病已矣此內經治痺且刺
且熨之法也今苦無善針刺者但用熨法亦無不
可愚見如此不知有當否

一答病狀

病有本於先天者有本於後天者先天者資始之
氣血後天者資生之乳食氣血不足常有乳食得
宜可以補者及其少長亦有情慾失節以致傷者
故外因之病易以藥治內因之病不全係以藥也

況稟受由乎先天豈可以藥石爲力乎弱冠之年
正氣血長旺之際卽患頭面四肢麻木腰痛足癢
之症頭面爲諸陽之會四肢爲諸陽之本陽虛則
氣不周於身故爲麻木不可以痺論矣腎爲作強
之官腎虛則腰痛足膝無力不可專以濕論矣當
此之時能絕酒色服藥餌調護得宜猶望煉石可
以補天由此而壯而強或有全愈之期今年逾強
仕桑榆之計亦已晚矣眩暈耳鳴此虛症之常八

味地黄丸正的对之藥無庸再議地黄宜砂仁末
酒拌蒸晒九次爲妙冬月桂附宜倍用但小續命
湯不必再服此治標之方非治本之藥也左足筋
攣今天氣漸寒可以杞圓酒加木瓜獨活焦白朮
當歸黃芪廣皮之類煮酒日日隨量飲二三次以
和其氣血以養其筋脉悉心調養卽爲良治既承
下問敢不直言以對

明丘瓊山先生著
故事雕龍

產家達生編

本事詩

出來

傷寒方矩

片力ナ書初学ニ便ス

石光彫弘世行

痘疹秘要

安永八年己亥五月改版

心齊橋南久太郎町
浪華書林 柳原喜兵衛

