



續易簡方論

三四

十武
984
2



明中武
號 984
卷

續易簡方論卷第三

平胃散乃常服之劑多是修製未工則為效亦淺余

守光遠方製治極精但費工力耳而增加他藥治病甚衆陳總卿華父錄經驗方以此藥入姜棗煮透使滋味相和與衆不同兼厚朴經煮油去又易料理名為天下受拜平胃散倉卒入鹽點服免再煎煮如泄瀉每服三錢生姜五片烏梅二箇鹽少許水一盞半煎八分服其效如神或依本方甘草減半名調脾散凡脾胃少有不和便可服之
余知府平胃散夫欲一身之安在於調氣進食而已氣不調則百脈俱滯食不進則榮衛日衰以致肢

體倦怠。心腹膨脹。精神不佳。藏腑滑淺。惡聞食味。病皆由此二者。古法中平胃散。真妙劑。有治百病之功。世人特見其藥材。易得名。稱陳熟。多不服餌。間有服者。又不得其修製之法。而藥肆所合。尤為鹵莽。所以食之。鮮效。今具別法。如後。好事者。請詳試之。自見其功。日能進數服。一月之間。能盡藥末一料。兼忌生冷。則諸病自愈。不可輕忽。益和合與常有異。

川厚朴去麤皮淨盡。用絞刀剪作小塊。如豆大。每朴壹兩。用生姜貳兩。研去滓。取自然汁。用浸厚朴密蓋。至次日。開看攪轉。如是姜汁已乾。再

三日下易簡
方糾纏有第
四日三三號
作漉猛作慢

取姜不拘多少。研汁拌。又次日開見攪如前。凡浸三日。攪起入鍋內。先以猛火炒一飯久。乘熱投入所餘姜汁內。令滲乾了。再用猛火炒一飯時。不住手攪。不可焦。然後取一塊。擘開看。心中油盡。蘇脆透心乾。嚼之不粘齒。即取出。用疎眼竹篩子篩去焦碎者不用。

右秤伍兩。係修事了者。下同。

陳皮一裹。先揀去柑皮柚皮及青皮。只用一色黃者。簸去塵土。旋取二三兩。用溫水逐片搗洗淨了。換水浸。將薄刀起去內白。只留外紅薄皮一重。其餘旋入水洗去白。不可久浸。恐爛。即用

餘下糾纏有
皮字

焙下糾纏有
乾字

篩子盛日曬乾慢火焙亦得

右秤五兩溫州見成者名橘紅

蒼朮先用溫水洗淨灰土用米泔水浸三日候
軟未軟更浸用刀刮去烏皮洗了薄切片子焙
乾用慢火炒兩飯時候油出盡方取出不佳攪
不要焦用削木尤妙

右秤捌兩

粉草擘破濕紙裹煨令香熟不要焦取出細剉
右秤一兩玖錢今用一兩半

已上藥材炒了乘燥便秤入研並不得停放
如未研亦未可炒仍將厚朴下研次下木二

糾纏湯入
蓋服亦得

藥取細末將及一半覺潤又入鍋微炒再入
研方下甘草羅末一次了覺潤又微炒方下
橘皮同研取末此後更不可再炒取末盡了
方將藥袞同和合令勻再用羅隔過一次了
攤開出火氣一時辰即入新罐內密蓋收取
每服二大盞生姜三片棗二枚去核水一盞
半煎八分熱服湯點亦得

如寒氣壅塞入草荳蔻五粒擘碎如前法煎
傷寒不快即用消風散二錢葱白兩頭同煎
婦人覺血氣不快用當歸芍藥各二錢薄切
同煎

出壽親養老書及丹溪心法附錄神珍方酸水瀉察作痰水

類聚引澹寮無川字皮下有劉字穰作白

諸書作生姜三兩甘中條劉下丹心有炙字

煎下澹寮有至字下入字作多

頭風發作。入川芎荆芥白姜蚕各一錢。同煎。臟腑滑洩。入炮乾姜二錢。炮附子官桂各半錢。同煎。

引飲過多。痰飲留膈間。入切赤茯苓澤瀉各一錢。同煎。

咳嗽。入欵冬花五味子各一錢。同煎。

壅熱。入切大黃一錢煎。微熱服。

痢未止。以熱茶服之。

天下受拜平胃散。治脾胃不和。膈氣噎塞。嘔吐酸水。氣刺氣悶。脇助虛脹。腹痛腸鳴。胸膈痞滯。不美飲食。常服。溫養脾元。平和胃氣。寬中進食。

川厚朴去麁皮。秤三兩。陳皮湯洗。不去穰。三兩。

茅山蒼朮五兩。去皮。米泔浸一宿。剉。

生姜四兩。和皮。薄切。甘草三兩。剉。

南京小棗二陌枚。去核切。

右用水五升。慢火煮。乾搗作餅子。日乾再焙。研為細末。每二錢。入鹽少許。點如泄瀉。每三錢。生姜五片。烏梅二箇。鹽少許。水一盞半。煎八分服。此藥人人常服。獨此方煮透。滋味相和而美。與衆不同。所以為佳也。

調脾散。治脾胃少有不和。可常服。

厚朴去皮。五兩。姜汁製炒。陳橘紅五兩。焙乾。

蒼朮 米泔浸一宿。冬二病。到焙乾。炒赤色。秤八兩。乃省。秤半斤。或秤一拾兩。乃足。秤

半斤。完八兩。是。

甘草 炙。一兩半。

右為細末。每服二錢。用燒鹽湯點七分。盞服。或用水一盞。姜三片。棗一枚。煎七分。食前服。或作剉散。

易如加神藥。如半夏之數。元戎引作一兩半。易簡如妊婦。惡阻古方用茯苓丸。茯苓湯。非快脾之劑。服者病反增。刺不若用此藥極驗。元戎引茯苓丸三字作半夏。

二陳湯。治憂愁思慮。氣鬱生痰。頭痛心悸。中皖不快。極為神驗。王氏謂其可治痞疾。加草菓。下紅圓子。此治食瘧則可。餘則不知也。又謂可治妊婦阻病。而古方茯苓半夏湯。服之病反增劇。以其有熟地黃滯脾氣。故及之。而不知此方茯苓當用赤者。蓋

與此合。但茯苓山見千金。惡阻篇。

赤者性利。而白者性補也。欲去痰飲。赤者用之為宜。非惟服之穩當。苟胃熱而嘔。亦可以此利之。雖然熱嘔。又不若竹茹湯之要切也。

意同。若因思慮過度。陰陽不分。清濁相干。小便白濁。用此藥。下青州白。四子。最為切當。

四七湯。即三因大七氣湯。金匱要略。半夏厚朴湯。其治七氣。最為有準。王氏云。以此下白圓子。可治小便白濁。似覺有理。然二藥。乃治氣理痰之劑。未聞有療便濁之功。及觀古方云。心腎不交。而成此疾。則知王氏之言為可用。大抵便濁有二證。皆腎氣寒之所致。有因憂思過度。氣鬱生涎。涎閉心經。火不下達。故腎水寒而便濁也。有因飲食減少。脾氣虛弱。脾土不能制腎水。故腎水盛而愈寒。則便濁

標本也作

也。巢元方作病源止云。胞冷腎損而致此。不能發明其病之標本。使後學無所考據。方書家多用寧心藥。如茯苓朱砂補腎藥。如破故紙山茱萸。滋精藥。如龍骨牡蠣之類。是雖暫效於一時。而其疾終不可去。四七湯白圓子。能利其痰涎。痰利則心火下降。腎水不至於寒。便濁當自止。不然則服分清散。彼方有益智。以主遺精虛漏。小便餘瀝。有萆薢。以療陰痿失溺。補水藏益精。有菖蒲。以通心氣。止小便。治白濁。心氣既通。自然便濁可去。況有餘藥佐之。若夫○脾虛而便濁者。當服厚朴煎圓。瑩泉散。因思遺精與便濁不同。而方書兼治者多。未敢

信其必效。○有下元虛憊。精不禁者。宜服秘精圓。○有飲酒多。心經熱。及年壯氣盛。久節淫慾。經絡壅滯者。宜服清心圓。○有情欲動中。經所謂所願不得。名曰白淫。宜服金鎖丹。○有腎氣閉而不通。一身之精。無所管攝。而致妄行者。宜服鎖精丹。猪苓圓。不可一槩論也。

益智仁

川草薢

石菖蒲

右等分為末。入鹽煎服。

厚朴煎圓。孫兆嘗云。補腎不若補脾。脾胃既壯。則能飲食。飲食既進。能生榮衛。榮衛既壯。滋養骨髓。補

類聚引經驗
良方
楊氏方有烏
茶云各等分
每三錢水一
匙同煎七分
食前溫服袖
珍遺尿門引
補易方有扶
苓甘州

益精血。是以素問云。精不足補之以氣。形不足補之以味。宜服此。溫中下氣。去痰進食。

厚朴

極厚者。去鹿皮。剉。如指面大。秤一斤。

生姜

一斤。不洗皮。洗切。作片。用水五升。同煮。水盡。去姜。焙。用。乾。

乾姜

四兩。剉。大。如。附子。二兩。炮。去皮。臍。

甘草

二兩。剉。半寸長。同乾姜。厚朴。用水五升。煮。水盡。去甘草。不用。

舶上茴香

炒。四兩。

右細末。生姜煮棗肉為圓。如梧桐子大。每服三十圓。空心米飲或酒吞下。

瑩泉散。治心脾不調。腎氣獨盛。便溺白濁。

川厚朴

一斤。生用。

白茯苓

一錢。

秤元作斤。今從百一。洗上一百一。淨字。字下有子。味三。字。

不用下。百一。有只將乾姜。厚朴。焙。乾。八。字。

經良方。川厚朴。一斤。生。姜汁。製。微。炒。

右剉散。作一服。用酒二椀。如不能飲。入水酒各一椀。慢火煎至一小椀。分為二服。去滓。食前溫服。立效。

秘精圓。治元氣不固。遺精夢泄。

大附子

炮。去。皮。臍。

龍骨

煨。通。赤。

肉蓯蓉

牛膝

並酒。浸。一。病。焙。

巴戟

去。心。各。一。兩。

右為末。煉蜜為圓。如梧桐子大。空心鹽酒鹽湯任下五十圓。甚者日午再服。

清心圓。治經絡熱。或年壯氣盛。久節淫慾。而致夢泄者。宜服此。

類聚引。得。效。及。善。察。

五。得。效。作。三。

聖。濟。方。名。貴。甘。丸。

厚黃蘗皮

甘草

各等分

右生為末。入腦子。煉蜜為圓。如梧桐子大。空心臨卧。溫熟水吞下三十圓。濃煎麥門冬湯下尤佳。一方無甘草。每黃蘗一兩。入腦子一盞。

金鎖丹。治男子婦人遺精鬼交。

堅白茯苓

茯神

各二錢

五色龍骨

煨紅

遠志

去心各半錢

牡蠣

四錢。左顧者。炒赤黃色。

右細末。酒糊為圓。如梧子大。鹽湯溫酒下三十

圓。或四十圓。空心食前服。

鎖精丹。治腎氣閉遺泄。

龍骨

一兩

蓮心

貳箇

半夏

一兩

木猪苓

各二兩

右將龍骨蓮心為末。半夏用湯浸。以竹刀分四

方界之。不可令斷開。木猪苓如半夏切了。搥匾

同半夏炒黃色。揀半夏研為末。入龍骨蓮心內。

將粟米糊為圓。如梧子大。外別研木猪苓為末。

養此圓子。每服三十圓。空心食前鹽湯下。

猪苓圓。治同前。

半夏

一兩

木猪苓

四兩

右將半夏破如豆大。於猪苓內秤二兩。切片炒。

半夏黃色。不含焦。地上出火毒半日。取半夏為

一方見本方又經用良方無甘用聖方少清心丸

本方。四兩。方作二兩。

泄瀉方作油

冷醫學綱目

逸元我引易

瘧瘧伏熱之
似大共其已
以春秋重已
瘧瘧助使南
瘧瘧助使南
瘧瘧助使南
瘧瘧助使南

補遺卷之三

末糊圓如梧子大，候乾，更用前猪苓末二兩，炒微裂，同用，不泄沙瓶，養之，空心溫酒鹽湯下三四十圓，常服於申未間，冷酒下。

四獸飲 王氏云，治五藏氣虛，喜怒不節，勞逸兼并，致陰陽相勝，結聚涎飲，與衛氣相搏，發為瘧疾，悉能主之，兼治瘧瘧，最有神效。常服溫中快膈，意以為無痰不成瘧，此一偏之論。按內經瘧論止云：傷於風寒暑濕，邪氣與衛氣相薄，故成瘧疾。至刺瘧篇雖分十二經之瘧，今方論所載，不出一十四條，未嘗一一言其有痰也。有寒瘧、溫瘧、痺瘧。瘧，丁佐切。勞也。又徒丹也。濕瘧、風瘧、牝瘧、疫瘧、鬼瘧、瘴瘧、食瘧、痰瘧、勞

瘧、老瘧、脾寒等證，治之各有方。○先寒後熱，名曰寒瘧，吳茱萸散主之。○先熱後寒，名曰溫瘧，白虎加桂湯、麻黃薤苳活散主之。○但熱不寒，少氣煩寃，熱而欲嘔，名曰瘧瘧，小柴胡湯主之。如大便秘澀，可服大柴胡湯。○寒熱身重，骨節煩疼，脹滿善嘔，澀澀自汗，名曰濕瘧，朮附湯主之。○寒多微熱，或但寒不熱，名曰牝瘧，桂姜湯主之。○熱多微寒，或但熱不寒，名曰風瘧，白虎加桂湯、十棗散主之。○身發寒熱，一歲之間，長幼相若，或染時行，變成寒熱，名曰疫瘧，五積交加散主之。○寒熱時作，夢寐不祥，多生恐怖，名曰鬼瘧，辟邪丹主之。○乍寒乍

熱乍有乍無名曰瘴瘧南方多此大效人參散大
正氣散主之如汗多煩渴小便赤澁及不服水土
嘔吐甚者可服五苓散下消暑圓○寒熱善飢反
不能食食而支滿腹大名曰食瘧一名胃瘧清脾
湯主之仍服紅圓子○熱多寒少頭痛難忍額角
胸前肌肉跳起纔食即吐名曰痰瘧半夏湯主之
○經年不差差後復作名曰勞瘧立效散大柴胡
鼈甲散主之○數年不差結成癥瘕在腹脇下名
曰老瘧一名母瘧老瘧飲主之○脾寒
可服草菓飲○凡瘧初欲發時但服五積交加散
自能痊除○寒熱等者可與局方常山飲○久發

下一作中

不愈而寒者二姜散主之○寒而虛甚者當服朴
附湯服藥可於未發前連進數服正發時不可與
之恐傷胃氣常見庸醫每以瘧疾為難治非難也
由其不識證故以為難也病家每以瘧疾為易治
非易也或見厭勝而愈因以為易也一難一易之
心生其不至於危殆者鮮矣

吳茱萸散治寒瘧臨發時先寒戰動相次發熱便頭
痛不可勝忍熱極則汗出煩渴相次便醒宜服此

吳茱萸 一兩

甘草

半夏

乾姜

川芎

細辛

麻黃

良姜

藁本

官桂下一有
各一分

官桂

羌活

牽牛

炒各半兩

右細末每服三錢以水一盞煎至七分臨發寒時和滓空心熱服若寒了及熱更不請喫須只用初發寒時服也寒未定更進一盞喫藥後不請卧須臾病減八分若是太歲過六壬巳亥之年當瘧未發常服暖脾藥

白虎加桂湯治溫瘧先熱後寒惡風自汗

石膏

四兩半

知母

一兩半

甘草

半兩炙

桂心

一兩

粳米

一合切梗米也

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓未發前進三服

石膏下三因
有微字

吳任臣云類
力傷切音類
鮮白也

麻黃羌活散治溫瘧初發渾身大熱頭痛不可忍臨醒時即寒慄戰動逡巡便醒宜服此方須是先熱後寒方可喫此藥

麻黃

去根

羌活

牡丹皮

去心

獨活

山柰

茈胡

去毛

桔梗

去蘆

升麻

荊芥穗

大黃

知母

黃芩

各一分

半夏

四銖

牽牛

半兩

右細末每服三錢水一盞生姜二片同煎至七分臨發壯熱時和滓喫須是用初發熱時服仍是食後喫發了已寒即更不要喫待第二發熱

時契也。

小柴胡湯治痺瘧。但熱不寒。少氣煩冤欲嘔。

柴胡 二兩

半夏

黃芩

人參

甘草 各棗錢半

右剉散。每服五錢。水一盞半。姜三片。棗一枚。煎七分。去滓。食前服。

大柴胡湯治痺瘧。但熱不寒而嘔。大便秘澀。

柴胡 二兩

赤芍藥

黃芩 各三字

半夏 湯

枳實 各半錢 大黃 半錢

右剉散。每服五錢。姜四片。棗一枚。水一盞半。煎八分。去滓。食前溫服。以利為度。未利再服。

湯下當復洗

三因方

木附湯治濕瘧。寒熱身重。骨節煩疼。因冒雨濕著于肌膚。與胃氣相并。或腠開汗出。因浴得之。

附子 炮去皮

白朮 各一兩

甘草 炙

茯苓

桂心 各半兩

右剉散。每服四大錢。水一盞半。姜五片。棗二枚。煎七分。去滓。食前服。

桂姜湯治北瘧。寒多微熱。或但寒不熱。

柴胡 八兩

桂心

黃芩

牡蠣 煨

甘草 炙

乾姜 炮各三兩

栝樓根 四兩

右剉散。每服四錢。水二盞。煎至七分。去滓。空心

桂心下三因有一兩

煩下金匱方
有再服

湯氏友

服日三。初服微煩汁出愈。一法有半夏三兩。此方既言治寒多。及但寒不熱。却多用柴胡黃芩。枯樓根性寒之藥。恐非所宜。諸方既皆取此。如或用之。當隨證增損可也。

穿山甲 一兩

乾棗 十枚

右同燒灰留性。研為細末。每服二錢。當發日。日未出時。井花水調下。

五積交加散。治疫癘。身發寒熱。

生料五積散

人參敗毒散

各四錢

右和勻。每服四錢。水一盞半。生姜五片。棗子一

枚。同煎至八分。去滓溫服。不拘時候。

辟邪丹。治嵐瘴。鬼瘧。及疴疾等。

朱砂

兩粒。如黑豆大。

黃丹

一大錢。留少許為衣。

菴豆

四十粒。

黑豆

三十粒。

好砒霜

半錢。

右同入乳鉢內。滴冷水為丸。作十粒。每服一粒。以東南枝桃葉心七枚。取井花水。研令開。向日吞服之。醋水亦得。其驗不具言。經三五月患者。亦只一粒。服後。大段者只微寒。若小。可便絕去也。孕婦不可服。

大効人參散。治山嵐瘴癘。不以久近。或寒或熱相兼。

楊氏有雄黃
一錢半

山下百一有
劉字高下有
去根梗

或連日或間日或三四日一發並皆治之。

人參去頭蘆

常山

青蒿各等分

右細末每服二錢半如明日當發今日午時用酒一大盞調分作三服一更盡時一服三更一服五更一服此方二錢半藥末用酒一大盞調分作三服恐藥力太少只作一服可也。

三因方

大正氣散治山嵐瘴氣發作寒熱遂成瘧疾宜服此。

附子炮去皮臍

厚朴去麁皮薑汁製桂心

甘草炙

乾姜炮裂

橘紅各一兩

茱萸微炒半兩

右細末每服三錢水一盞半姜五片棗一枚同煎至七分熱服不拘時兼治霍亂吐瀉一切氣疾。

三錢三因作
二大錢

煎至七分熱服不拘時兼治霍亂吐瀉一切氣疾。

五苓散治瘴瘧煩渴小便赤澁。

澤瀉

猪苓去皮

赤茯苓

白朮各一兩半

官桂去麁皮一兩

右細末每服二錢熱湯調下不拘時候服訖多飲熱湯有汗出即愈。

清脾湯治胃瘧發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓振頤頷中外皆寒腰背俱痛寒戰既已內外皆熱頭疼如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔或先熱後寒先寒後熱寒多熱少寒少熱多或寒熱相半。

製下三因有
妙字

或但熱不寒。但寒不熱。或隔日一發。或三日五日一發者。悉主之。

厚朴四兩。姜汁製。

烏梅打去仁。

半夏洗去滑。

青皮

良姜各二兩。

草菓去皮。一兩。

甘草炙。半兩。

右劉散。每服四錢。水二盞。姜三片。棗一枚。同煎至七分。去滓。未發前併三服。忌生冷油膩時菓。此藥溫脾化痰。治胸膈痞悶。心腹脹滿。噫醋吞酸。自可常服。

半夏湯。治痰瘧頭痛。纔食即嘔。

半夏湯。

藿香洗。去梗。

菴活

湯下。恐洗字。

川芎各二錢半。

黑牽牛半兩。

右細末。每服二錢半。食後熟湯調下。和滓服。以吐涎為度。未吐更進一服。

立効散。治久患瘧疾不差。

礞黃

辰砂各等分。研細。

右拌勻。每服一錢。人參湯調下。

大柴胡鼈甲散。治勞瘧及五勞。

柴胡去蘆。

秦朮

常山

貝母

甘草

烏梅

山梔

豉心

鼈甲醋炙。

黃芩各一兩。

生姜

大黃各半兩。

桃枝

薤白

各一握

柳枝

糯米

半合

葱白

右剉散分作八貼每貼水一升酒一盞同煎至八分升分作三服早午晚各一

老瘡飲治久瘡結成癥瘕癖在腹脇□諸藥不去者

蒼朮

米泔浸

草蓰

去皮

桔梗

青皮

陳皮

良姜

各半兩

白芷

茯苓

半夏

湯洗去滑

枳殼

麩炒

甘草

炙

桂心

乾姜

炮各三錢

紫蘗

川芎

各二錢

右剉散每服五錢水二盞鹽少許煎七分去滓

屬下原空二
字破三四無
歐字疑是用

麩炒下三因
有去棧二字
紫蘇下有葉
字
五錢三因作
四大錢仍下
有吞字

空心服日三夜一仍下紅圓子

草蓰飲治脾寒等瘡

草蓰

川芎

白芷

紫蘇葉

良姜

甘草

青皮

去白炒各等分

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓熱服當

發日連進三服

常山飲治瘡疾九瘡疾蓋因外邪客於風府生冷之

物內傷脾胃或先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨

作連日併發或間日一發寒則肢體顫掉熱則舉

身如燒頭疼惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾

甘草下三因
有吞字

去白間一空
一字或說當
補內字
三錢三因作
二大錢

脊脊酸疼、腸鳴腹痛、諸藥不治、漸成勞瘵者、此藥主之。

知母

川常山

甘草

草蓰

各二兩

烏梅

良姜

右剉散、每服四錢、水一盞半、生姜五片、棗五枚

同煎至八分、去滓溫服、未發前連進三服。

二薑散、治寒瘧及久瘧不痊。

乾姜

良姜

各二兩、並半生半炒

右細末、每服二錢、以酒調之、積猪膽以針刺破、

將匕滴入酒中調勻、溫服、少頃以溫酒半盞投

之、於當發日早服、大凡寒發於膽、以猪膽引良

四局方作三、無半字、五枚、作一枚、八作

類聚引百一、方又注引港、方

豕去勢曰積

澹寮指七滴、百一無指字

於胆下、澹寮、有者字

入膽澹寮作、其間寒下、有仍字

虛瘧下、澹寮、有與瘧二字、附下有子字、川下有厚字、塊下有厚字

加之下、澹寮、有當發日早辰、併三服

姜乾姜入膽、去寒燥脾胃、乾姜熱、猪膽冷、陰陽相制、所以作効、仍治秋深寒瘧、孫氏秘寶祛瘧散、楊氏家藏猪膽膏、皆此藥、但修治少異耳。

朴附湯、治久發虛瘧。

大附

一雙、生去皮、用、剪作、散子、塊、生、姜、自然、汁、浸、炒、乾

川朴

去皮、與附子、等分、剪作、散子、塊、生、姜、自然、汁、三、浸、三、炒

右剉散、病輕者每服四錢、水二大盞、生姜七片、棗七枚、同煎至七分、重者加之。

續易簡方論卷第三

續易簡方論卷第四
斷下湯
王氏云治下痢赤白無問長幼並可服之此藥以罌粟殼為主年少脾胃強壯之人服之其效如神年高脾胃虛弱之人服之其禍立至緣此物性冷緊澁極能閉絕胃氣易令人嘔本草獨言粟而不及殼此近世用之王氏不察反指地榆黃蘗秦皮若木桐為性寒此輩性雖寒而各當於用未若罌粟殼之妨胃也王氏既言嘔吐人不可服又曰脾胃素弱者可兼豆蔻橘紅為圓服之意以為有豈蔻橘紅則不至為患益勞矣外此豈無他劑哉且譏今之治痢者多用駐車圓黃連阿膠圓之

易簡問人
迎長幼及治
林息痢疾湯
氏家前此即
四物湯加黃
連桃花罌粟
殼此方見三
國方

若或亂苦桐
下文作蒼古
音相述
易簡問人
人則不可服
又云若脾胃
素弱用罌粟
殼二兩製如
前法橘紅半
兩肉豆蔻半
兩為末用烏
梅肉二兩蒸
爛研別以
醋煮米糊為
丸如梧子
大每服五十
四米飲湯

續易簡方論卷第四

斷下湯 王氏云治下痢赤白無問長幼並可服之此

藥以罌粟殼為主年少脾胃強壯之人服之其效如神年高脾胃虛弱之人服之其禍立至緣此物性冷緊澁極能閉絕胃氣易令人嘔本草獨言粟而不及殼此近世用之王氏不察反指地榆黃蘗秦皮若木桐為性寒此輩性雖寒而各當於用未若罌粟殼之妨胃也王氏既言嘔吐人不可服又曰脾胃素弱者可兼豆蔻橘紅為圓服之意以為有豈蔻橘紅則不至為患益勞矣外此豈無他劑哉且譏今之治痢者多用駐車圓黃連阿膠圓之

任憑嚙下

易尚其中止
有黃連肥腸
甚性本冷若
近感稍耗及
餘則休息不
已則服之稍
效若病之稍
重非此可療
若謂其德當
而服之悠
乃自取困頓

類其性本冷病稍重者非此可療殊不知駐車圓雖有黃連性寒而阿膠當歸則性溫乾姜則大熱安可謂之本冷以之治赤白痢極驗不然則加以湯使下之無不效者至黃連阿膠圓乃是治熱痢之藥惟患其不冷耳王氏想於本草不甚精解故言及此况痢疾古方總謂之滯下然實非一端不可謬於施治有赤痢白痢赤白痢熱毒痢風痢濕痢膿血痢酒痢積痢禁口痢氣痢水痢水穀痢惡痢暑痢瘴痢瘧痢勞痢蠱痢疝痢休息痢之不同○赤痢者一名熱痢治之當以黃連圓○白痢者一名冷痢治之當以桃花圓如未效虛

羸者可服朴附圓○赤白痢者一名冷熱痢一名重下痢治之當服三和湯姜茶散久不差者可服麴藥圓○熱毒痢者治之當服斂紅圓地榆散黃連阿膠圓○風痢者治之當服宿露湯如手足冷而脈微小者可服附子當歸圓○濕痢者治之當服養臟湯○膿血痢者治之當服大香連圓○酒痢者治之當服揀斗子散苦散子○積痢者治之當服萬應圓油調散○禁口痢者治之當服倉廩湯石蓮散○氣痢者治之當服巴石圓○水痢者治之當服訶梨勒圓○水穀痢者治之當服朴連湯○惡痢者治之當服聖棗子○暑痢者治之當

服六和湯五苓散下酒連圓。○瘴痢者治之當服楮葉散。○瘧痢者治之當服朱粉丹。○勞痢者治之當服葶藶圓。○蠱痢者治之當服栝連散。○疳痢者治之當服薤白餅。○休息痢者治之當服姜茶圓。○各辨證以用藥若始治之初灼見有積須是先挨動其積然後止之。餘證不在此限。○變通圓可隨證加減極妙。如不識脈欲知冷熱當如百一選方之言無問赤白但看其手足和暖則為陽先須服五苓散粟米飲調下次服局方感應圓即愈。若覺手足厥冷則為陰當服大已寒圓附子之屬此亦一要法也。

元次同字从局方補

駐車圓治一切下痢無問新久及冷熱膿血腸滑裏

急日夜無度臍腹絞痛不可忍者。

乾姜下有地字

黃連

去鬚三兩

乾姜

一兩

當歸

去蘆一兩半

阿膠

剪碎炒如珠子一兩半為末以醋四合熬成膏

右細末以阿膠膏和併手丸如梧桐子大每服五十丸食前溫米飯下日三服小兒丸如麻子大量歲數加減與服。

馬作三

黃連圓治赤痢熱下久不止。

黃連

去鬚不拘多少

右為末雞子清為丸如梧桐子大每服五十丸食前烏梅湯下。

馬作三

脂下三四方
有破宗

五上三因有
三字

局方無橘紅
有神效

局方名方金
散三因同

白炙搗三因
當作不炙
三因甘中修
治如法局
方三味各等
分

桃花圓治冷痢腹痛下如魚腦白物

赤石脂 乾姜炮等分

右為末蒸餅糊丸米飲下五十九

朴附圓治冷滑下痢不禁虛羸者

厚朴去麋皮 附子炮去皮臍

乾姜炮裂 橘紅各等分

右為末麪糊丸如梧桐子大每服四十九食前

米飲下日二服

三和湯一名萬金散治赤白痢

陳皮一半白炙 陳罌粟殼同上

甘草半兩

帶一作當

右剉散每服四錢以百沸湯七分盞泡急用盞
蓋之候溫澄清者服如赤痢二味用蜜炙者多
白痢用蜜炙者少甘草常用壹錢血痢入烏梅
壹箇此藥脾胃壯者可服

姜茶散治赤白痢

生姜和皮切 好鴈茶末二錢

右用水二盞煎至一盞去滓食前熱服

麴蘖丸治赤白痢久不差者

神麴炒二兩半 麥蘖炒三兩半 烏梅肉焙

乾姜炮 黃連去鬚 肉桂各二兩

吳茱萸揀湯 當歸洗焙 附子炮各一兩

楊皮作天麥
肉桂下揚首
去粗皮三宗
揀湯作湯洗
揀或訛以木
今必華李

川椒

去目出汁

右為末。煮粟米糊圓如梧桐子大。每服五十圓。米飲下。不拘時候。

飲紅圓。治伏熱下血。裏急後重。

臘茶

不以多少

右為末。以上等醞醋和丸。每一兩分作十五丸。每服一丸。濃煎烏梅湯化下。空心食前服。

地榆散。治下痢純血。臍腹疔痛。裏急後重。日夜頻併。

地榆

一兩

枳殼

去穰炒

甘草

各三兩

白芍藥

赤芍藥

黃芩

各一分

訶子

染箇。煨去核。

罌粟殼

十四枚。蜜炒黃。

黃上揚氏有無字。經驗方無黃字。

同上揚有為字。

一無候字。華本同。

楊氏方

右件為細末。每服三錢。陳米飲調下。空心食前。脾胃稍弱者不可服。

黃連阿膠圓。治腸胃氣虛。冷熱不調。下痢赤白。狀如

魚腦。裏急後重。臍腹疼痛。口燥煩渴。小便不利。

黃連

去鬚。三兩

赤茯苓

二兩

阿膠

一兩。炒。

右黃連茯苓同為末。水調阿膠。和衆手丸。如梧桐子大。每服五十九。食前溫米飲下。

宿露湯。治風痢。純下清血。

杏仁

七粒。去皮尖。

苦木瘡

一掌大。

草蓴

一箇

酸石榴皮

半箇

烏梅

兩箇

青皮

兩箇

甘草

二寸

和上局有末。搜二字。五作二。

昔三因作若

神效煎至一
盞去滓

服上經驗有
溫字

右剉散作一劑水二椀生姜三片煎七分椀露
星一宿次早空心服

附子當歸圓治風冷在腸胃下血手足冷而脈微小

當歸 洗焙三兩

白芍藥 二兩

附子 去皮

白朮 各一兩

右為末醋麪糊圓如梧子大飲下五十丸食前

服

養臟湯治濕毒痢所下如豆羹汁心腹刺痛腰腿沉

重

厚朴 去皮姜製

肉豆蔻 麵裹

蒼朮 米泔浸炒

赤茯苓 各二錢半

木香

橘紅 各二錢

甘草 炙一錢

右剉散每服四錢水一盞半生姜五片棗一枚

煎八分去滓食前溫服

木香連圓治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄瀉煩

渴米穀不化腹痛腸鳴胸膈痞悶脇肋脹滿或下

痢膿血裏急後重夜起頻併不思飲食或小便不

利肢體怠惰漸即瘦弱並宜服之

木香 一兩不見火

黃連 去蘆淨四兩用吳茱萸二兩同炒去茱萸不用

右為末醋糊丸如梧子大每服三十九食前米

飲下日三服

藥局作服

三局作

橡斗子散治酒痢便血經年不差者。

橡斗子

槐花

各一兩同炒黃色。

白礬 一分。

右細末每服二錢溫酒調下。

苦散子治酒毒便血。

黃連

不拘多少去蘆焙乾。

右細末每服二錢溫酒調下。

萬應圓治久挾積滯因傷生冷遂作痢疾或赤或白。

經久不差。

白牽牛

肉豆蔻

麩裹煨。

檳榔 各等分。

右為末煉蜜丸如菉豆大每服五十九赤痢甘

草湯白痢乾姜湯赤白痢甘草乾姜湯空心食

前下。

油調散治積痢。

臘茶末 二錢。

右用熱湯七分盞調傾一蛤蜊殼生麻油在內

攪勻食空服之須臾腹疼大下即止。

倉廩湯治禁口痢晝夜無度疾勢甚者。

敗毒散 一貼。

右水一盞半藥四錢陳米百粒同姜三片棗一

枚煎至八分去滓食前溫服。

苦惡當作藥

楊氏方

本中綱目引
經驗方

多少下百一
有不炒去
設五字

石蓮散治禁口痢

石蓮肉 不以多少

右細末每服二錢陳米飲調服便覺思食此疾
蓋是毒氣上衝華蓋心氣不通所以不入食服
此藥之後心氣既通痢當頓下而愈未愈自服
痢藥

巴石圓治氣痢

本中綱目引
劉禹錫傳信
方而云云
白礬中青黑
者名巴石

白礬

不以多少炭火於淨地上燒令
汁盡變其色如雪名之巴石

右取一大兩細研以熟猪肝為圓空腹飲下丸
數隨意增減水牛肝更妙如食菜入蒸餅為圓

訶黎勒圓

未刺蜜其味甚苦大每服五十丸赤麻甘

訶黎勒

三隻麩
裹煨

右取訶黎勒皮為末飯和為圓米飲空心下三
四十圓

朴連湯治水穀痢久不差

厚朴

去麩皮
姜製炒

黃連

各三兩

右剉散每服四錢水一盞半煎八分去滓空心
食前服

聖棗子治一切惡痢

木香

一分

肉豆蔻

二箇麩
裹煨

乳香

沒藥

各一分

右細末每服一錢用大棗一枚去核先入半錢

乳香下楊氏
有別說
下同大棗
有乾字

王氏集驗名
厚朴湯聖濟
錄名黃連
湯治白帶痢
久不癒二味
各二兩
外臺秘要引
張文仲方大
明本中引梅
師方

藥末在棗內。次入水浸。巴豆半枚。又入藥末半錢。合定。油餅麩裏一指厚。火煨。麩熟為度。去麩。并巴豆不用。只細嚼棗藥。米飲下。空心。

六和湯。治心脾不調。氣不升降。霍亂轉筋。嘔吐泄瀉。寒熱交作。痰喘咳嗽。胸膈痞滿。頭目昏痛。肢體浮腫。嗜卧倦怠。小便赤澁。并傷寒陰陽不分。冒暑伏熱。煩悶成痢。及中酒煩渴。畏食。婦人胎前產後。並宜服之。

厚

成上局有或

湯下局有洗

人參

編砂仁

甘草

杏仁去皮

半夏湯七次

白菟豆姜汁

赤茯苓

藿香

木瓜各二

香薷去梗

厚朴姜汁製

右剉散。每服四錢。水一盞半。生姜三片。棗一枚。煎至八分。去滓。不拘時候服。

酒連圓。治伏暑成痢。及酒痔下血泄瀉。

黃連不以多少。燒去蘆。酒浸。銀器中。重湯煎。漉出。曬乾。添酒煮七次。

右為末。以餘酒為圓。如梧子大。每服五十九。米飲下。

飲一作湯

楮葉散。治瘴痢。不問老少。日夜百餘度者。

乾楮葉 三兩

右為末。每服二錢。烏梅湯調服。日再。兼取羊肉。裹末內。穀道痢出即止。

福華本作硃

朱粉丹治瘡痢及積痢

巴豆

去皮心膜出油

粉草

硃砂

朱砂

研各一錢

砒

研半錢

右研勻黃蠟二錢溶成汁下藥攪勻丸如棗豆大飲下一圓未知再進

葇蓉圓治久痢勞痢

葇蓉子

乾姜

并炒焦見煙

狗頭骨

燒灰

右等分為末麩糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心食前米飲下

栢連散治男子女人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀色所謂蠱痢者治之有殊效又能殺五臟

錠錠同

虫

側栢葉

焙乾

川黃連

去蘆各等分

右細末每服二錢食前熟水調下

薤白餅治疳痢

薤白餅

一握

右將薤白生搗如泥以粳米粉和之煉蜜調捏作餅炙熟與喫不過三兩度

姜茶圓止休息痢大驗

乾姜

炮

建茶

各一兩

右為末以烏梅取肉圓如梧桐子大每服三十圓食前溫米飲下

類聚引朱氏集驗方作

程正作攪乃結切搥搥也草本說根下同

百一方不著
方名類聚引
同方與此

變通圓治赤白痢

吳茱萸

揀淨

黃連

去鬚并蘆
剉散子塊

右等分一處以好酒浸透取出各自揀焙或曬
乾為細末麩糊丸梧桐子大赤痢用黃連圓三
十粒甘草湯下白痢用茱萸丸三十粒乾姜湯
下赤白痢各用十五粒相合併以甘草乾姜湯
下

梧上一百有
如字

易簡治血痢
當服胃風湯
月艾湯

胃風湯

治風痢下清血或下瘀血濕毒痢所下如豆

羹汁者服之皆驗王氏於斷下湯後言血痢當服
此豈知熱毒下血非此可治以其有官桂大熱故
也當服至冷之劑惟風濕痢用之為當又云於此

易簡無於字
一作本方二

等分下
有足為十味
四字

雜一作標

方加熟地黃黃耆甘草等分名十補湯大治虛勞
其隨證增味固然而不知虛勞變證極多非此能
盡既言虛寒當加姜附乃不能去地黃芍藥輩冷
熱雜糅安足為效徒知稍不喜食者不可用何益
哉又欲於十補湯中加柴胡以治骨蒸發熱此方
有地黃當歸以滯脾氣不若地仙散柴胡散之妙
也大凡虛人熱去則寒起要當留二三分熱以消
化飲食使胃氣常存然後藥乃可進苟服冷藥太
過熱固去矣胃寒不食坐待其斃可不謹之如勞
氣之證已形未至於深且久者可服稻根湯屢試
輒效尤利於貧賈之人

神珍諸虛及
丹心發熱引
經方

虛下帶字據
本方補

根者本事件
去心甘中下
有參

方上一字據
本方補

地仙散治骨蒸肌熱解一切虛勞煩躁生津液

地骨皮洗根者 防風各一兩 甘草一分

右細末每服二錢水一盞生姜三片竹葉七片煎至七分服信效一方加人參半兩鷄蘇一兩

甘草添一分

柴胡散治骨蒸勞肺痿咳嗽唾涎心神煩熱不欲飲食

柴胡 黃芩 人參各一兩

麥門冬二兩去心 白茯苓 橘紅各三分

甘草二分 半夏湯洗 桔梗各半兩

右細末每服三錢水一中盞生姜半分同煎六

百一友

分去滓不計時候溫服選奇方茯苓用赤者是
稻根湯治勞疾病證已見而未成者

稻草根洗淨細切

右濃煎不以時候加熟水飲之

易簡治一切
去血過多眩
暈向絕不省
人事

芎歸湯一名芎藭湯治一切去血眩暈固也然當歸

之用不可不審雷公云若要破血即使頭一節硬
實處如止痛止血則用尾或一時用不如不使服

食無效此湯貴於止血生血當取中間一節兼尾
用之王氏既不能分別又欲加芎藥以治產後眩

暈殊不知產後眩暈有三或去血過多血虛氣極
精神不守而暈悶者或下血過多血隨氣上掩心

易簡若產後
眩暈宜加芎
藭等分服之

三因友

滿急而暈悶者。或產時坐卧方位觸犯禁忌而暈悶者。此藥只可治血虛暈悶。而芍藥又有二種。白者補血。赤者通血。今既不明言其所當用。或投赤者於去血既多之後。其不至於困頓者鮮矣。况庸醫多謂當歸頭一節大而有力。如或用此。非徒無益。而又害之。若產後下血不多而暈者。當服清魂散。冒觸禁忌而暈者。則須禱禳可也。

澤蘭葉

人參 各一分

荆芥穗 一兩

川芎

半兩

甘草

式錢

右細末。每服一錢。熱湯溫酒各小半盞調勻。力

三因作力灌

易方名枳殼

滑胎散

易簡脚氣散

易簡婦人血

灌下過喉。即開眼氣定省人事。

枳殼湯

真產前妙劑。其縮胎易產之功為甚大。以之

治氣攻刺。亦當效。然此湯之性寒。不可治冷氣。如以酒調則性平。尤難必效。必當加乾姜良姜官桂丁香木香之類方可。王氏謂其能治脚氣。未為切當。夫脚氣有陰陽虛實乾濕之不同。當隨證以施治。未聞此藥可療。又云煎艾湯調服。可以治女人血暈。兩大陽疼。頭旋欲倒。此正芎藭湯之證。尤非此之所宜。煎木瓜湯調服。可以治小兒面黃胃冷吐食。殊不知枳殼之性本寒。安能治胃冷之疾。當服局方益黃散可也。或胃熱則以竹茹湯與之。

易方作概不醒

大上局有量字

益黃散治小兒脾胃虛弱腹痛泄痢不思乳食嘔吐

不止困乏神懶心腹膨脹顏色青黃厭厭不睡

橘紅式兩青皮去白訶子肉

甘草炙各壹兩丁香四錢不見火

右細末每服一大盞水七分盞煎至五六分食

前進大小加減服之

續易簡方論卷第四

