



續易簡方論

五六

+武9
384
34



續易簡方論卷第五

增損四物湯王氏雖本於三因而未察陳氏有隨病

加減之說遽即之以治氣血不足及產後下血過

多榮衛虛損之病果欲用之不可無熟地黄綠地

黃之熟者可以溫補也如欲治產後寒熱腹中刺

痛疑有敗血則依本方修製芍藥易以赤者足矣

不然當於局方四物湯中易熟地黄以乾者易白

芍藥以赤者二者俱能逐敗血故也所用當歸可

從芎歸湯方後所載

四物湯治婦人衝任虛損月水不調臍腹疔痛崩中

漏下血痕塊硬叢歇疼痛姪娠病冷將理失宜胎

易簡治婦人
氣血不足四
肢怠惰乏力
少氣兼治產
後下血過多
榮衛虛損陰
吹不和自寒
有熱並宜服



動不安。血下不止。及產後乘虛。風寒內搏。惡露不
下。結生痼聚。小腹堅痛。時作寒熱。

當歸去蘆。剉。微炒。 川芎

熟乾地黄 白芍藥 各一兩。

右剉散。每服四錢。水一盞半。煎至八分。去滓熱
服。空心食前。若妊娠胎動不安。下血不止者。加
艾拾葉。阿膠一片同煎。如前法。或血臟虛冷。崩
中去血過多。亦入膠艾煎。如產後寒熱。腹中刺
痛。疑有敗血。熟地黄易以乾者。白芍藥易以赤
者。水一盞半。煎至八分。去滓。入酸醋一呷。再煎
數沸。熱服。

劉微局方作
酒浸

地黃下局有
酒酒蒸三字

四局作三

逍遙散 治血虛發熱。最為要劑。若論治血熱相搏。月

水不調。臍腹脹痛。寒熱如瘧。則不及局方四物湯。
治室女血弱。榮衛不和。痰嗽潮熱。則不及加減十
寶湯。此藥局方云。當歸炒。甘草炙。又如薄荷煎服。
王氏不從之。為是。夫當歸性本溫。奚必炒治煩熱。
甘草不炙。無害也。薄荷本條。雖云大解勞乏。然此
物極能發汗。新病差人。切不可食之。王氏謂經血
節閉。而致發熱者。令服大聖散。紅圓子。二藥皆不
若通經圓之效捷也。緣大聖散用藥雜且衆。紅圓
子全藉阿魏。三稜。莪朮。以通血。阿魏既難得真。而
今之三稜。類皆紅蒲根代之。未敢必其集事。若久

易簡但婦人
熱亦有因經
血節閉者又
云宜以局方
大聖散用紅
花煎酒調服
不能飲者以
醋湯代之仍
以紅圓子醋
湯煎下此二
藥大治經事
不調或腹有
血塊或久無
子息服之數
月其效特異

無子息。又豈二藥所能治療。必常服秦桂圓可也。
加減十寶湯。治丈夫婦人真氣虛損。四肢勞倦。腰膝
疼痛。顏色枯槁。

黃耆 四兩 熟乾地黄 當歸 並酒浸

白茯苓 人參 白朮

半夏 湯 白芍藥 五味子

桂 去鹿皮 各一兩 甘草 炙 半兩

右剉散。每服四錢。水一盞半。生姜五片。烏梅一
箇。煎至八分。去滓。食前溫服。

通經圓。治婦人室女。月候不通。腹中疼痛。或成血瘕。

桂心 青皮 去白 大黃 炮

湯下百一有
泡七遍

四百一作三
五作三八作
七。滓下有生
心二字

煨良方作煨

烏一作葛。炒
一作搗。良方
乾漆。碎
炒。令烟。各
桃仁。去皮。尖
雙入。炒。各
等分

良方。每服二
十口。淡醋湯
下。至三十口。
溫酒。亦得。空
心。食前服。

三兩一作三
分。良方百一
同

右細末。將四分末。用米醋熬成膏。和餘六分末。
成劑。白中杵。治圓如梧桐子大。曝乾。每服五十
圓。醋湯下。溫酒亦得。空心食前。

秦桂圓。治婦人無子。 秦朮 去蘆 桂心 不見 防風

厚朴 去皮 姜製 杜仲 去皮 姜製 炒 絲斷

附子 生皮 去臍 茯苓 各一兩 半 白薇

乾姜 炮 牛膝 酒浸 沙參

百一湯洗七
遍一兩下有
去芦

五良方作三
百一湯洗七
遍一兩下有
去芦

不著本訛
正小兒方試

易簡錢氏方
謂小兒壯熱
昏睡傷寒風
熱者相以未
病皆相以未
法辨認同服
惺飲小柴
胡湯升麻湯
此數藥均能
治瘧然下若
參蘇飲治諸
般發熱

半夏

湯各半兩

人參 一兩

細辛

去苗二兩一分

右細末煉蜜丸如赤豆大每服五十九食前温酒醋湯任下如未效更加丸數已覺有孕則止神效並如彼說

惺惺飲

本作惺惺散閻氏附此於錢仲陽方後止云

治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣不和至於論傷寒風熱瘡疹傷食之相類未能辨認欲與升麻湯小柴胡湯間服意謂此三藥俱可退熱而不知亦有未切於用者惺惺散治感冒痰嗽發熱口渴則宜升麻湯善解肌及瘡疹已發未發如風熱瘡疹頭疼身熱足冷脉數疑似之間皆可服之若夫傷

寒一作食

食則有大便酸臭之可驗當先磨之以消積圓或未效則以白餅子下之又須量其虛實而後可次以益黃散補其脾小柴胡湯治少陽經傷寒身熱而嘔者則為當也非治傷寒之藥凡瘡疹有水疱膿疱斑子疹子之不同已出未出者並可與化毒湯出大盛者則用犀角地黄湯解之若出不快宜與活血散或黑陷則發之以人齒散次服紫草湯無不驗也錢氏云有小熱宜解毒大熱當利小便紫黑乾陷者白祥丸下之後復有不可妄下之戒要知此患首尾俱不可下如下之則內虛毒氣乘虛入腎則難治乳母或不思口及兒失飢而受風

冷亦必至此。瘡後有餘毒，可服消毒飲，或土攻咽
喉閉塞，語聲不出，可服龍蛻餅。如瘡疹入目，宜與
決明散。紫貝散，瘡欲著，加用酥，或面油，時潤之，可
揭則揭去。若失潤，揭遲，痂纔硬，則隱成癩痕，切不可
以鷄鴨卵與食，食則即時目盲，瞳子如卵白色，
其應如神，不可不戒也。

消積圓，治小兒傷食，大便酸臭。

丁香 玖粒 宿砂仁 十二箇

巴豆 二箇，去皮、心、膜 烏梅肉 參箇，焙

右細末，麪糊丸黍米大。三歲已上三五丸，已下
二三丸。溫水下，無時。

臘下方訣有
油字

白餅子，一名玉餅子，治小兒腹中有癖，但飲乳者及
嗽而吐痰涎乳食。

滑石 輕粉 半夏 湯七

南星 各一分 巴豆 二十四箇，去皮、膜、水

右研勻巴豆，後入衆藥，以糯米飯為丸。小菘豆
大，捏作餅子。三歲已上三五餅，已下一二餅。臨
卧煎葱白湯下。

化毒湯，治小兒豆瘡已出未出，並可服之。

紫草茸 升麻 甘草 各半兩

右剉散，水二盞，糯米五十粒，煎至一盞，去滓，溫
分服。

方訣各一錢

水上活人有
以字

出下活人有得字

犀角地黄湯治瘡疹出太盛以此解之

犀角屑

牡丹皮

各去心一兩

生地黄

半斤

芍藥

三分

右剉散每服五錢水一盞半煎取一盞有熱如狂者加黃芩式兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱更不用黃芩也

活血散治瘡出不快

白芍藥

右一味為細末每用一錢以酒調服如欲止痛用溫熟水調下

人齒散治瘡子出不快倒撒黑色

撒一作壓

瘡下活人有子或二字楊氏有疹已二字
白芍藥下揚氏有不以多少四字
以酒調服楊氏作並蒲桃酒調下
撒一作壓下同

人齒

燒存性

右細末酒調下或麝香酒紫草湯皆可小兒齒尤佳

紫草湯治瘡疹熱盛而發不透者

紫草茸

紫蘇葉

升麻

甘草

炙各半兩

右剉散水二盞糯米五十粒同煎一盞溫分兩服

消毒飲治小兒瘡疹已出未能勻透及毒氣壅遏雖出不快壯熱狂躁咽膈壅塞睡卧不安大便秘澀及治大人小兒上膈壅熱咽喉腫痛胸膈不利

陳文中瘡疹論名入牙散酒調入積滯血三五滴溫服
關孝忠方訣附方名退酒散入麝香少許每服半錢溫酒少許調下
關氏附方有黃芩無升麻

牛蒡子

炒三兩

甘草

炙一兩

荆芥穗

半兩

右剉散每服一錢水一盞煎七分去滓溫服食後量力多少與之如瘡疹大便利者不宜服

龍蛻餅子一名消毒餅子治小兒痘瘡餘毒上攻咽

喉語聲不出

蛇退

一條用麻油點燈燒存性

右細末以砂糖拌為餅子嚼下

决明散治疹痘瘡入眼

决明子

赤芍藥

甘草

炙各一分

栝樓根

半兩

右細末每服半錢蜜水調下日進三服

多少局方作少

本中綱目引心鏡以乳汁服

半兩活人作半分

紫貝散治斑瘡丁子入眼

紫貝

一箇即研螺也

右生為末用羊子肝批開摻末一錢線纏米泔

煮香熟入小口瓶器盛乘熱燻候冷於星月下

露一宿來早空心喫不過一螺可愈

白朮散乃和胃之劑錢氏於傷風胃熱吐瀉後以此

生津液止渴耳其功在於乾葛而餘藥佐之次用

大青膏以發散風邪初不言總治冷熱洩瀉王氏

因此方有白朮木香止瀉遂言小兒洩瀉胃熱煩

渴不問陰陽虛實並宜服之不思洩瀉有冷熱不

同欲以一藥而兼治之可乎况白朮木香藿香之

研或訛研嬰童百問與此同

虛實二字據古寫本易簡方補類聚引

易前若吐瀉
之後已覺虛
損若因虛發
熱必作慢脾
風急用金液
丹雜以青芎
白朮子等分
為末米飲調
服

性溫。安能以治熱瀉。以之治冷瀉。則宜。又當去藿
香。乾葛。加乾姜。肉豆蔻。輩可也。或未效。可以此藥
下。桂香圓。吐瀉。則服益黃散。病篤者。來復丹主之。
如熱瀉。宜與觀音救命散。入燈草。棗子煎。間服。戊
已圓。吐瀉。則人參湯。或參蘘飲。子主之。更有疳瀉
枯瘠。宜服史君子圓。水瀉不止。宜服六神湯。王氏
又援錢氏方。治驚風。用金液丹。青州白圓末。此治
慢脾風。則可。不知驚風有二證。有急驚風。有慢驚
風。慢驚一名虛風。一名慢脾風。急驚因聞大聲。驚
而發搐。或心經溢熱。熱極生風。其證則面赤身熱。
氣急唇紅。喉膈多痰。大小便赤。可於搐勢漸減之

時與鎮心治熱藥一二服。如鎮心圓。辰砂圓。抱龍
圓之類。候驚熱已定。須更以利驚圓。下其痰熱。即
愈。慢驚則因病後。或吐瀉。脾胃虛損。而成此疾。其
證則身冷昏睡。或露睛。手足痰瘕。口鼻氣冷。目
碧多啼。喉中痰響。嘔吐。可先與人參散。未效。則服
南附湯。如吐瀉未止。可與丁附湯。下二神丹。大抵
急驚未足憂。而慢驚為難治。每見庸醫不量虛實。
但用蜈蚣。蝎梢。至毒之劑。以攻之。且曰。吾欲搜風
耳。不知小兒易虛。既虛之後。愈搜則愈虛。不救者
比比皆是。可不痛哉。若急驚反張。宜服芎活湯。慢
驚反張。可與蝎附散。皆為要藥。或難之曰。既云慢

取作取

活訛治

姓華本訛魁
易簡作魁亦
誤音音奇與
繼古音相近
淮南錄稱訓
繼子得食肥
而不潔精不
相往來也本
中綱目有孕
之乳謂之忌
此病俗謂之
痲痲坡義話
記病俗謂之
記忌皆繼
之音轉又名
丁亥說文美
大腹也疑亦
繼之音也

三因載小兒
初生四法施
法以毒藥矣

一脫子字小
兒方訣以此

風不當以全蠍輩搜之。而南附湯中亦用全蠍。慢驚反張。又取蠍附散。何也。不然。予豈舍全蠍而不用。當視兒之虛實如何耳。始用之不驗。覺其日虛。便當峻補。不可因其未效。而愈攻之。自非胸中有活法者。非易語。此大凡小兒用下藥。須是審其實。則可。緣近世小兒怯弱。與古之嬰孩不同。謹之。謹之。而藥之。圓數錢重。當增而服之。方應及觀王氏論大人小兒之病。以回氣。臍風夜啼。重舌。變蒸。客忤。驚癇。解顛。魁病。疝氣。不行。數證。謂大人無之。然小兒之病。與大人異者。亦多有之。固不止此。而以客忤。驚癇。為大人無之。何不審也。若夫回氣一證。

前此則未聞也。

大青膏治小兒傷風吐瀉身溫涼熱。

天麻

青黛

白附子

蠍尾

烏梢蛇肉

朱砂

天竺黃

麝香

右細末。生蜜和成膏。每服半皂子。大至一皂子。大月中兒。粳米大。同牛黃膏。溫薄荷水化。一處服之。五歲以上。同甘露散服。

觀音救命散治小兒熱瀉。

木香

川連

右以水三椀。煮乾。去連。只以木香焙乾為末。分

三服或兩服量兒大小與之加燈草數莖各長四寸棗子一枚煎湯調下乳食前服

戊巳圓治小兒脾受濕氣泄利不止臍腹刺痛或挾熱而瀉或疳氣下利並宜服之

白芍藥 黃連去鬚各一兩 吳茱萸半兩

右為末麩糊為圓如黍米大量兒大小隨意加減溫米飲下乳食前服

人參湯治小兒吐利躁渴不解昏困多睡乳食減少

白茯苓 人參去蘆各一兩 乾葛二兩

大青膏 木香 藿香葉 甘草炙各一分

右剉散每服一錢水一中盞煎減半去滓溫服

琴下局方有去皮二字

局作煎七公

不拘時候

參蘇飲子治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂引飲不止

人參去蘆 白朮 白茯苓

甘草炙 紫蘇葉 乾木瓜

香薷葉 厚朴去麋皮姜製炒 半夏麩

白扁豆微炒 陳橘紅各等分

右剉散每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

不拘時候

史君子圓治小兒疳瀉枯瘦

史君子去殼一兩 厚朴去麋皮姜製炒 訶子炮取肉

橘紅 青黛各半兩

右為末煉蜜丸如雞頭大一歲兒服一丸粥飲化下只作散子每服一錢粥飲調下亦得此方

六神散治小兒胃氣不和水瀉不止

揀參

白朮

白茯苓

白藟豆炒

山藥炒

甘草炙

右細末每服半錢水六分盞姜二片棗一枚煎

四分溫服不拘時

鎮心圓治小兒驚熱痰盛

甜消白者

人參

朱砂各一兩

甘草炙

寒水石燒

各一兩半

方訣無三味併研細五字

二錢下方訣分注即茶脂是

乾山藥

白茯苓各二兩

龍腦

麝香

各一錢

三味併研細

右為末熟蜜丸雞頭大如要紅入坯子胭脂二

錢溫水化下半丸至一二丸食後服

辰砂圓治小兒驚風涎盛潮作及胃熱吐逆不止

辰砂研別

水銀砂子

生犀末

天麻

白殭蠶酒炒

蟬殼去土足

麻黃去節

天南星湯浸七次切焙乾

乾蠍去毒

牛黃

龍腦

麝香各半錢

右為末再研勻熟蜜丸菴豆大朱砂為衣每服

方訣無服之
二字、藥上
作薄荷

方名小抱
龍口
風批局作喘

騰月上方訣
有焙為未騰
或作騰、本
與此同

局方有天竺
黃一兩方訣
同

四一作兩方
訣無四字

一二九或五七九食後服之煎婆蘭湯送下

抱龍圓治驚風潮搐及傷風溫疫身熱昏睡氣鹿風
熱痰實壅嗽蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒
宜時與服之

天南星

騰月生者去皮臍中陰乾百日如無只將

秤肆

辰砂別研

麝香別研

各半兩

雄黃水飛一分

右細末煮甘草水和九皂子大溫水化下服之
百日小兒每九分作三四服五歲一二九大人
三五九亦治室女白帶伏暑用鹽少許細嚼一
二九新水送下騰月中雪水煮甘草和藥尤佳

方訣而字作
刪則二字

一法用漿水或新水浸天南星三日候透軟煮三
五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒
黃色取末捌兩以甘草二兩半拍破用水二碗浸
一宿慢火煮至半碗去滓旋添入天南星末慢研
之令甘草水盡入餘藥

利驚圓治小兒急驚身熱面赤引飲口中氣熱大小
便黃赤而設搐者

輕粉

青黛各一錢

天竺黃二錢

黑牽牛子末

半兩生用

右同研勻蜜為丸如豌豆大一歲一九溫薄荷
水下食後服

水上市事方
有對案

本方冬瓜
仁半兩

人參散治小兒慢脾風神昏此藥醒風去痰極妙

天南星一兩切用姜汁水各用一半盞煮存性

人參半兩

右細末水一盞煎一盞生姜二片冬瓜子仁搗細一匙頭同煎去半分作三兩服

南附湯治小兒泄瀉虛脫致虛風生名慢脾風及服冷藥過多者

天南星

生附子各一錢

全蠍三箇或一隻不剪

右剉散作一劑水一大盞生姜七片煎至半盞去滓逐旋溫服不拘時

丁附湯治小兒吐瀉作慢驚風

附子炮去皮臍半箇

右剉散每服一錢水一大盞生姜五片丁香五粒煎至五分灌之令睡醒來安樂神妙急功無丁香亦得

二神丹一名青金丹治小兒瀉後作慢驚風

青州白圓子 金液丹各等分

右泡蒸餅糊為圓如菉豆大溫熟水下未能嚥者清米飲調服凡痰多者加白圓子末瀉多者加金液丹末證候退即以六神散調補小兒胸膈痰喘吐逆欲生風者及作泄瀉並皆治之

芎活湯治小兒急驚風角弓反張

人參 黃芩 杏仁去皮

石膏各半錢 麻黃 甘草

桂心 芎藭 乾葛

升麻 當歸 獨活各二錢

右剉散每服二錢水一盞生姜二片煎至八分去滓溫服不拘時

蝎附散治小兒吐瀉日久或大病後生風時發搐搦目睛斜視手足痠癢冒悶昏塞身體強硬角弓反張

南星一枚重二兩者打碎

打一作匙

生去皮臍剉楊氏作匙碎

附子一枚重七錢者生去皮臍剉

已上二味用生姜四兩取汁入好酒二盞

於銀石器中同煮令汁盡焙乾為末

白附子柒枚炮裂 全蠍七枚去毒微炒

代赭石二兩火煨為末 辰砂半兩

右為細末入腦子麝香各一錢研勻每服一字

用酸漿水半盞入麻油兩滴冬瓜子三粒同煎

三五沸放冷約一茶脚許調服候少時再一服

如無漿水并冬瓜子只用薄荷湯調服亦得不拘時候

續易簡方論卷第五

再下楊氏有服字

一作微炒去毒楊氏同華本作去毒用炒為末楊氏作研細辰砂下有別研

施氏續卷之五

易簡方論卷第六
養正丹所用之藥若水銀黑鉛則性寒朱砂則性微
寒獨硫黃性大熱以一熱而制二寒人遂疑其有
利性要知此藥不可以治虛冷其功在於墜痰升
降二氣而已然又非伏火則可冷可熱如病之危
篤欲倚此以回陽未見其可也王氏論脚氣入腹
衝心而見嘔逆者欲即此丹與黑錫來復輩利之
且譏千金用大黃寒藥為非殊不知三丹之性不
同而皆非疎利之劑使養正硫黃不曾走失又烏
可謂有利性信如其言用之則風熱補住大便愈
不能通其禍可立而俟况脚氣有冷熱不同如陽

續易簡方論卷第六

養正丹

所用之藥若水銀黑鉛則性寒朱砂則性微
寒獨硫黃性大熱以一熱而制二寒人遂疑其有
利性要知此藥不可以治虛冷其功在於墜痰升
降二氣而已然又非伏火則可冷可熱如病之危
篤欲倚此以回陽未見其可也王氏論脚氣入腹
衝心而見嘔逆者欲即此丹與黑錫來復輩利之
且譏千金用大黃寒藥為非殊不知三丹之性不
同而皆非疎利之劑使養正硫黃不曾走失又烏
可謂有利性信如其言用之則風熱補住大便愈
不能通其禍可立而俟况脚氣有冷熱不同如陽

易簡市肆四
茶治法
易方云出室
林真人谷伯
陽傷寒論中
一名交泰丹
易簡此藥用
硫黃黑鉛本
有利性或例
作丹茶用以
補虛治泄瀉
之妙大非所
宜
易簡若脚氣
之患入腹衝
心或見嘔逆
之証無法可
治千金以大
黃利之其大
性寒病既深
入必推道遠
是速其吐也
若不若用此
茶或黑錫丹
來復丹之類
煎降氣湯燕
屎便須多服
以大便流利

毒度脚氣無
補法與有利
性即非補藥
服之無疑

實風毒之證皆熱也。安得不用大黃。陰虛濕毒之
證皆冷也。而大黃却非其宜。王氏不明。夫冷熱之
用。而一律言之。豈不誤。天下邪。又云。凡治嘔吐。先
以加味。感應圓微利之。次用此藥。及半疏圓。不知
嘔吐有寒熱二証。養正性平。而非利劑。感應半疏
性皆熱。止可治胃寒而吐者。若胃熱服之。則愈增
劇矣。若夫尊年之人。大腑寒秘。却宜服半疏圓。而
養正黑錫。非其治也。

局方云。欬逆
一丹。一各玉

來復丹。亦升降心腎之劑。其用藥。則稍溫於養正丹。
疏黃性大熱。玄精靈脂性皆溫。而陳皮青皮則性
平。獨消石之性寒耳。本方治上實下虛。氣閉痰厥。

易簡此藥可
冷可熱治法
當與養正丹
黑錫丹相配
但性輕不能
鎮壓耳。然消
石既寒。佐以
補皮其性疎
快疏黃且能
利久若作暖
藥用以止瀉
若誤矣。

心腹冷痛。藏腑虛滑等疾。王氏乃謂消石既寒。佐
以橘皮。其性疎快。疏黃且能利人。若作暖藥。用以
止瀉。誤矣。殊不知消石之性雖寒。而餘藥多溫熱。
一寒豈能勝衆熱哉。兼橘皮本條云。止泄。金液丹
乃獨體疏黃。其治虛滑下利。最為有準。而本條亦
未嘗有通利大腸之說。獨海藥記云。疏黃主老人
風秘。夫老人府藏虛寒。血氣滯滯。所以大便多秘。
疏黃大熱。服此。可使府藏溫和。氣血流行。糟粕亦
自然而通。非謂疏黃本性能利也。王氏乃欲即此
為通大便之藥。反指他人為誤。而不知自己之實
誤。良可哂哉。如黑錫丹。又非養正來復之比。此丹

易簡若男子
婦人心腹作
痛。服疎利之
劑。得效者。未
必能補。當以
此藥徐服。以
之令大便常
通利。則病不
復作矣。

本事方無湯
起石肉桂有
巴戟附子

有陽起石肉豆蔻胡蘆芭金鈴子茴香破故紙以
補下有沈香木香以理氣有附子肉桂以去風寒
此正補暖之藥謂其有利性可乎間有服之而利
者必其丹頭硫黃走失黑鉛獨存不然則食肉所
致也本事方減陽起石肉桂加巴戟而附子與補
下藥則頭高此方亦佳若楊氏方則去胡蘆芭陽
起石沈香肉桂功力稍輕要知無出局方者盡善
又全在煅鍊丹頭之得法也

震靈丹用藥八味冷熱相半四味經煨四味生用此
乃平補之劑與他丹僭燥者不同王氏以局方湯
使簡略乃分條治之然所撰湯使有數項未愜人

一作語

一作痛

意如帶下赤白當煎艾葉湯下不當加醋煎男子
遺精白濁不同詳載四七湯論中遺精者熱水調
白茯苓末下亦可如治白濁腎虛寒者以鹽酒下
脾虛弱者以米飲下可也老人血痢當以烏梅湯
及鹽白梅湯下不當用淡曬白梅本草所云白梅
乃淡曬者能點誌蝕惡肉耳未嘗治痢王氏何因
而用此若欲用須是用鹽者局方云婦人醋湯下
未曉其義而王氏乃推廣之云婦人應是虛損或
失血之後常服當用醋湯不知醋之為物功在行
血豈虛損與失血之後所宜哉亦當用艾湯下艾
性溫而止血故也若中風癱緩手足不遂骨節疼

痛者乳香沒藥酒下。衝惡心腹痛或吐瀉並可以炒艾湯下。

蘇合香圓辟邪氣通經血治衝惡吐瀉心腹絞痛凡氣暈卒中_下之疾悉能療之。如因怒氣中暑者可以數圓煎六和湯磨服立效。或痰飲凝節不可入藥則煎二陳湯磨服。胃次隨卽開快。但平日虛羸之人或有倉卒之患未免用此。服之中病則已不可太過恐耗元氣。王氏乃云市肆所賣多用腦子當於火上焙去益見其謬。龍腦腦子初非二物在本草謂之龍腦俗稱謂之腦子兼一切香藥忌於見火恐香氣走脫。王氏乃欲以火焙去果何所見又

焙或訛碎易商及元我類下同

欲以此治用心過度夜睡不安夫用心過度則人虛此藥耗氣卽非平補之劑安可服之當服局方妙香散足矣。

感應圓無出於局方者蓋以其巴豆去油雖老耄幼稚皆可服之古方不去油者必熬令黃黑或換水煮六七度或用麻油并酒煮之皆所以制其油之毒然後方用王氏既不去油又加用之少壯者猶可服虛弱者豈所宜今人好奇不守本方或加胡椒澄茄或加訶子青皮或加三稜莪茂俱不及局方之善局方以油蠟和之成劑而用油之法視四季增損欲其易於剋化近有用全蠟匱者其說在

補或訛光

方服溫脾之劑元戎引易簡與此同今本作却於二陳湯中求之

易簡先以此茶微利次方斷下可於斷下湯方中求之

於不汚手。不知蠟入腸胃。卒難消化。而况加他藥。功力豈若局方者之專哉。王氏謂可治惡心嘔吐。全不納食。用此藥。微微利動。方服溫脾之劑。不思嘔吐。有冷熱二証。胃冷者可用此。胃熱者服之。反劇。當與竹茹湯可也。又云。治赤白痢疾。臍腹疔痛。先以加巴豆感應圓微利之。次方斷下。不知痢有種種。而積痢可用此法。若夫赤痢而服此。豈不敗乃事哉。

消暑圓。治心經受暑。生痰。痰盛上攻。頭疼發熱。服他藥不效者。可煎六和湯下之。立愈。局方中本無此方。乃百一選方黃龍圓也。三因於此方。加茯苓。而

王氏因之。俱不言茯苓。當用何者。然白者補。而赤者利。當用赤者為是。如此。則可以佐半夏利熱痰於小腸中。如今市肆所賣者。多以烏梅肉代半夏。是雖足以止一時之渴。而其痰未易以除。須依方親製服之。不然。則擇其無烏梅氣味者。斯可矣。若治冒暑伏熱。心膈燥悶。飲水過度者。龍鬚散實為要劑。

黃龍圓。治中暑頭疼嘔逆。

半夏半斤。用醋一斗。浸三日。入銀器中。慢火熬。令醋盡。取出。以新汲水一洗。曬乾。
甘草一兩。

右為末。生姜自然汁和丸。如梧桐子大。食後新

五上，百一有
三十九至四
字。

汲水下五十九。

龍鬚散治冒暑伏熱，心膈燥悶，飲水過度。

白礬一兩 甘草一兩半 五倍子

飛羅麩 烏梅去仁，不去核，各二兩

右細末，每服三錢，新汲水調下。此方即呂顯謨家濯熱散。

紅圓子理脾開胃，下氣逐血，破癥瘕積聚，為效甚速。

舊方有礬紅阿魏，今去之矣。三稜又難得真，所以功不逮前，而消酒進食可以常服。但土朱性寒，欲為衣，須炒過可也。王氏乃云脾寒瘡疾，生姜橘皮湯下，然瘡亦多種，而脾寒食瘡用之則當。若熱瘡

三錢，百一作
二大錢。

易簡礬紅為
衣。

酒疸三句，亦
王氏言。

勿簡妊婦惡
阻嘔吐全不
納食百藥不
療惟此最妙
仍佐以二陳
湯五膈寬中
散服之。

忠或作急今
以華本。

易簡服之
有則宗。

則不宜服。酒疸穀疸，遍身皆黃，大麥煎飲下，如穀疸則可。酒疸非涼劑不可也。又謂妊婦惡阻不食，欲以此同二陳湯服之，開後世嘗試之門，為害不淺。妨胎之藥，古人禁之甚嚴，間用一二輕者，猶自不穩。况欲兼而用之，半夏墮胎，今人治產前病常用之，此猶庶幾。三稜落胎，消惡血，通月經，莪茂亦通月經，消瘀血，如數藥並進，烏保其無患。兼胃熱者，尤不可服。王氏於增損四物湯後云：古方治惡阻，以茯苓圓茯苓湯，內有地黃、竹茹、川芎輩，安能定嘔。服之愈見增極，其意以三者性皆寒也。豈知地黃之熟者性則溫，然滯脾氣，去之為是。川芎性

亦溫能治一切氣補一切勞用之何害獨竹茹性寒可以治熱嘔又何為不可王氏不審輕於立言每每若此曾無一人以拯其失豈後之學者皆若人邪胃熱而阻可服八味竹茹湯無熱證者人參散主之

八味竹茹湯治婦人初妊擇食嘔逆頭痛顛倒寒熱間作四肢不和煩悶

人參 白朮 麥門冬去心

橘紅各一兩 厚朴去皮姜汁製 赤茯苓各半兩

甘草炙一分 淡竹茹一塊如彈子大

右剉散每服四錢水一盞半入生姜五片同煎

至八分去滓溫服不時頻服

人參散治初娠惡食嘔逆

人參一兩 枳殼去穢炒

甘草炙 厚朴去皮姜汁浸炙

右剉散每服四錢水一盞半生姜彈子大一塊拍破同煎至七分去滓溫服不拘時

青州白圓子局方治風痰及洗頭風婦人血風小兒

驚風悉皆主之百一選方復加天麻乾蠶僵蠶川薑名加減青州白圓子兼治喘嗽咯血胸膈滿悶為效尤捷王氏乃云咳嗽痰實咽喉作聲老人小兒皆宜服之不知上焦有熱者服此則愈甚有孕

婦人尤不當服。以川烏南星半夏皆妨胎之藥故也。如痰熱當以玉液圓金珠化痰圓與之。玉液圓治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱。

半夏 湯七次

白礬 各一兩

寒水石 燒通赤出火毒研

右合研以白麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫生姜湯下食後臨卧服。

金珠化痰圓治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚胸膈煩悶涕唾稠粘痰實咳嗽咽噎不利。

金箔 二十片

辰砂 二兩

鉛白霜 細研

皂莢子仁 炒

白礬 光明者於石鐵器內熬令汁盡別研

天竺黃 研各一兩

生白龍腦 細研半兩

半夏 湯七次用生薑二兩洗刮去皮同搗細捏作餅子炙微黃色秤四兩

右以半夏皂莢子仁為末與諸藥同拌研令勻。生姜汁煮以麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸。生薑湯下食後臨卧服。

如聖餅子局方治氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽

經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目瞑耳聾常服清頭目消風化痰暖胃每服伍餅同荆芥細嚼茶酒任下乃不言餅之大小王氏易以姜湯下二十餅亦不言其大小如何市肆所賣者欲見片數之

勿簡和口捻作餅子晒乾每服二十餅下今本和口

下有知雞頭
大四字蓋後
人因局方補
入者類聚引
易簡要治中
脫此欲停積
及療脾胃云

蛙一作蚰下
同後類聚作及

食上類有飲
字

多而為餅甚小使服者無准若自修製可圓如櫻
桃大然後捺餅每用十餅服之方應王氏因局方
有暖胃之說遂云療脾胃飲食所傷温中快膈尤
得其宜殊不知局方所謂暖胃者正恐寒痰在於
胃脘服此則可以去之初不為飲食所傷設也不
然則天麻防風輩豈消積化食之藥邪飲食所傷
者則木香橘皮圓主之傷寒汗後頭疼者宜服白
龍圓此藥尤治風蛀牙疼研為細末乾搯痛處後
用鹽湯漱灌更以葱茶嚼下即愈
木香橘皮圓治脾胃虛弱飲食所傷久不消化或成
泄瀉及氣不升降常服温脾胃快氣進食

荆三稜

炮切

蓬莪茂

炮切

黑牽牛

微炒

烏梅

連核用

青皮

去白

橘紅

各一兩

縮砂仁

肉桂

去麤皮各半兩

木香

丁香

各一分

右細末醋糊為圓如梧桐子大每服三十圓食
後臨卧熟水米飲任下

白龍圓治男子婦人一切風遍身瘡癬手足頑麻偏
正頭疼鼻塞腦悶大解傷寒及頭風

川芎

藁本

細辛

白芷

甘草

各等分

右為末用藥一兩入煨了石膏末四兩水搜為

性類作云

研下類有細

易簡此若熱燥能治藏府虛寒滑而下利及泄瀉腸鳴水穀不化又云若心腹疼痛中脘停寒大便滯泄者尤宜服此又云傷寒陰盛神思昏沉肢體怠惰時服下利並可其類作之

圓每兩作八圓每服一圓食後薄荷湯嚼下風蛀牙疼一圓分為三服研為末乾揩疼處後用鹽湯漱灌更用葱茶嚼下

大已寒圓乃二姜圓加官桂草撥局方云治藏府虛弱心腹疼痛泄瀉腸鳴傷寒陰証四肢怠惰王氏取之既言治滑而下利又言治泄瀉腸鳴既言治泄瀉腸鳴復言治大便溏泄時復下利言之數四不憚其煩而不知其大能治心脾疼霍亂等疾如其攻治冷瀉則此藥太燥曾不若附子理中圓用藥之妙也

附子理中圓治脾胃虛弱寒濕乘之腹痛腸鳴泄瀉

不止或胸膈逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下並宜服之

附子生去皮 乾姜炮 人參

白朮各一兩 甘草炙半兩

右為末煉蜜為圓每兩作十圓每服一圓食前沸湯任下嚼破服亦得或圓如梧桐子大服並得

續編易簡方論卷第六

世之賣卷之六

理一作律

易一作為

醫家著書立言以貽世而脉理精微難以遽解要
 當明示其虛實冷熱之證使人易於適從可也王
 氏此方名曰易簡士大夫往往以便於觀覽故多
 取之然其於虛實冷熱之證無所區別謂之易簡
 無乃大簡乎此予續論之作所以不能自已也區
 區管見若此烏知後人之不我是耶淳祐癸卯夏
 五踰旬敬書于寓室桂堂

不
 止
 是
 此
 也
 予
 續
 論
 之
 作
 所
 以
 不
 能
 自
 已
 也
 區
 區
 管
 見
 若
 此
 烏
 知
 後
 人
 之
 不
 我
 是
 耶
 淳
 祐
 癸
 卯
 夏
 五
 踰
 旬
 敬
 書
 于
 寓
 室
 桂
 堂

