傷寒論纂解

六

392
6

武田文庫藏書
明治 392 巻 6

傷寒論繹解卷第五

平安　柳田濟子和　著

辨陽明病脈證幷治第八

合四十四法方一十首一方附幷見陽明

少陽合病法字彙云明光也顯也濟按陽明者左右兩陽合明之謂素問至眞要大論云帝曰陽明何謂也岐伯曰兩陽合明也靈樞陰陽繫日月篇云辰者三月主左足之陽明巳者四月主右足之陽明此兩陽合于前故曰陽明卽是也

陽明病者陽氣極盛也陽氣極盛者陰氣亦隨盛乃熱氣延漫於表裏寒化爲熱故指見胃家實腹滿譫語惡熱潮熱滅然汗出等證

又按此篇所論以熱氣延漫於表裏直煎熬

胃液。故專主胃家實。因舉邪熱既實。未實。表未解。及變證數章焉。乃自陽明病。不吐不下心煩章以下。至於傷寒四五日。脈沉而喘滿。辨既實未實焉。中間乃自三陽合病以下。至於陽明病。脈浮無汗而喘者。是皆論表未解焉。末段乃自陽明病。瘀熱在裏。身必發黃以下。至於傷寒。瘀熱在裏。身必黃。是皆極諸變證焉。以總結此篇。

問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰。太陽陽明者。脾約（一云絡）是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗利小便已。胃中燥煩實大便難是也。（玉函・脾約・一作脾結・發汗・利小便・作發其汗・若利其小便・無煩實二字・是）

成無己曰。陽明胃也。邪自太陽經傳之入府者。謂之太陽陽明。經曰。太陽病。若吐。若下。若發汗後。微煩。小便數。大便因鞕者。與小承氣湯。即是太陽陽明。脾約病也。邪自陽明經傳入府者。謂之正陽陽明。經曰。陽明病。脈遲。雖汗出。不惡寒。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。外欲解。可攻裏也。手足濈濈然汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。即是正陽陽明。胃家實也。邪自少陽經傳之入府者。謂

之少陽陽明。經曰。傷寒脈弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發汗則譫語。此屬胃。卽是少陽陽明病也。濟按此章所說。不合本論之旨趣。意此王叔和。依胃府爲陽明。設三陽明之名。以明自經傳之入府之病狀也。又凡篇首置太陽之爲病。少陽之爲病云云等之章。今獨此章在篇首者。錯簡也。玉函。以次章爲篇首者是也。

陽明之爲病。胃家實一作寒是也。家猶云內

陽明者。陽氣極盛之謂也。陽明受寒邪。則熱氣延漫於表裏。煎熬胃液。因其爲病。邪氣直實於胃。此爲之主意。故曰胃家實是也。此章論陽明正受病之主證也。此陽明病之總綱。以下凡曰陽明病者。皆由此證立言以及或未實或表未解之諸證。

問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病若發汗。若下。若利小便。此亡津液。胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣。內實大便難者。此名陽明也。玉函無此字。作下爲陽明病也。

成無己曰。本太陽病不解。因汗利小便。亡津液。胃中乾燥。太陽之邪入府轉屬陽明。古人登廁。必更衣。不更衣者。通爲不大便。不更衣。則胃中物不得泄。故爲內實。胃無津液。加之畜熱。大便則難。爲陽

明裏實也。

問曰。陽明病。外證云何。答曰。身熱汗自出。不惡寒反惡熱也。玉函無自字。反上有但字。

成無己曰。陽明病。爲邪入府也。邪在表。則身熱汗出。而惡寒。邪既入府。則表證已罷。故不惡寒。但身熱汗出而惡熱也。柯琴曰。四證是陽明外證之提綱。故胃中虛冷。亦得稱陽明病者。因其外證如此也。

問曰。病有得之一日。不發熱而惡寒者何也。答曰。雖得之一日惡寒。將自罷。即自汗出而惡熱也。

成無己曰。邪客在陽明。當發熱而不惡寒。今得之一日。猶不發熱而惡寒者。即邪未全入府。尚帶表邪。若表邪全入。則更無惡寒。必自汗出而惡熱也。

問曰。惡寒何故自罷。答曰。陽明居中主土也。萬物所歸。無所復傳。始雖惡寒二日自止。此爲陽明病也。太陰陽明論云。脾者土也。治中央。常以四時。長四藏。各十八日寄治。不得獨主於時也。脾藏者。常著胃土之精也。土者生萬物。而法天地。故上下至頭足。不得主時也。五藏別論云。胃者水穀之海。六府之大源也。五味入口。藏於胃。以養五藏氣。濟按胃足陽明之脈。居中央。象土。故曰陽明居中主土也。

柯琴曰。太陽病八九日。尚有惡寒證。若少陽寒熱往來。三陰惡寒轉甚。非發汗溫中。何能自罷。惟陽

明惡寒未經表散即能自止與他經不同始雖惡寒二句語意在陽明居中句上夫知陽明之惡寒易止便知陽明爲病之本矣胃爲戊土位處中州表裏寒熱之邪無所不歸無所不化皆從燥化而爲實實則無所復傳此胃家實所以爲陽明之病根也濟按右四章論陽明病之所因及外證然有與本論所不愜此亦王叔和之補語

本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也先先于邪氣也言不邪氣與汗并出故不徹也徹除也轉轉移也屬附屬也

此章言本太陽頭項强痛而惡寒初得之時發汗不得宜乃汗先出邪氣不除徒津液亡熱氣益加而延漫於表裏然此非全致陽明正證又非併病轉移陽明也

傷寒發熱無汗發熱者當有汗而無汗者邪氣滨鬱閉甚也爲下文反汗出言之也嘔不能食而反汗出濈濈然者是轉屬陽明也程應旄曰濈濈連綿之意方有執曰熱而汗出貌

傷寒即太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者也其證而已發熱無汗嘔不能食是邪氣從表既犯於胸脇而今反汗出濈濈然者熱氣益熾蒸發胃液而惡寒罷故爲轉屬陽

明也。前章及此章。俱承首章陽明正受邪。而明太陽病因誤治。轉屬陽明矣。傷寒不因誤治。轉屬陽明矣。蓋太陽病者。邪氣專在於表。乃經若發汗。若吐。若下。而爲陽明。小陽。太陰病。故別其本末。曰本太陽也。傷寒者。邪氣漢劇。而自能爲轉變。乃有不汗吐下。亦轉屬陽明。少陽。太陰者。故雖既見陽明。少陽。太陰證。單稱傷寒。而不別本末也。於少陽太陰。亦例皆同。宜併考以知其義矣。

傷寒三日。陽明脈大。玉函。此章置干上篇傷寒二三日陽明少陽章後。

按此非指寸口脈。卽陽明脈也。不爾則文義不順。

決死生論云。上部地。兩頰之動脈。吳注云。兩頰。足陽明胃經脈氣所行。巨繆分也。卽是。又按脈大下。有脫文。玉函有者爲欲傳四字。是也。熱論云。傷寒一日巨陽受之。二日陽明受之。三日少陽受之。今三日。陽明脈大者。病進爲欲傳也。少陽篇云。傷寒三日。少陽脈小者。欲已也。宜併見以知其意矣。

傷寒脈浮而緩。手足自溫者。是爲繫在太陰。太陰者。身當發黃。太陰不必發發黃者。一證也。若小便自利者。不能發黃。發黃者。小便不利。可得知矣。至七八日。大便鞕者。爲陽明病也。小便自利。大便鞕。則胃中燥實。故爲陽明病也。

前章先舉傷寒發熱無汗。因以反汗出濈濈然。明轉屬陽明矣。此章先舉脈浮緩手足溫繫在太陰。因以七八日大便鞕。令知爲陽明病矣。蓋太陰病者。陰氣盛。寒邪深進。熱氣不盛。乃邪熱伏於肌肉。而不能表發。故脈浮而緩。手足自溫者。是爲繫在太陰。而小便不利者。伏熱瘀鬱。與畜水相熏蒸。身當發黃也。若小便自利者。水熱不瘀畜。故不能發黃。至七八日邪氣入裏之時。小便自利。大便鞕者。當見熱氣熾。手足濈然汗出。不惡寒。反惡熱。脈實大。故是爲陽明病也。因次章論濈然微汗出者。曰

轉繫陽明。又於太陰篇。論之曰。至七八日。雖暴煩下利日十餘行。必自止。以脾家實。腐穢當去故也。是七八日。雖邪氣入裏。下利腐穢去。不實於胃。故不爲陽明。宜併考。

傷寒轉繫陽明者。按繫係也。轉繫與轉屬異。轉繫謂始轉繫陽明。未具其證。轉屬謂既附屬陽明病證。又其證具。則爲陽明病。其人濈然微汗出也。玉函作濈濈然。

此接前章。而更明傷寒轉繫陽明者。其人濈然微汗出之外證先見也。陽明病者。熱氣延漫。乃濈然汗出也。而此未至胃家實大便鞕。故汗出微也。若既實胃。大便鞕者。則至手足濈然汗出。故論曰。手

足濈然汗出者。此大便已鞕也。

陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。發熱則當惡風。而惡寒者。蓋陽明病者。邪氣已深。鬱閉於肌肉。故雖中風發熱。仍惡寒也。若邪熱既實。則直變惡熱。是故陽明篇中。絕無言惡風者。脈浮而緊。邪氣在於表。而及胸腹。然此中風。熱氣尚能達於表。正邪相搏甚也。故脈浮而緊。今最後舉脈者見邪氣尚專在表。而深示下之之誤也。若下之。則腹滿小便難也。下後更言腹滿者。下之腹滿當減。而反至甚故也。

此於陽明病中。別邪氣進緩。鬱熱直發於表者。以名爲陽明中風。蓋中風者。邪氣感淺。直熱發。而其毒進緩。故於陽明病。致口苦咽乾腹滿微喘。發熱惡寒。脈浮緊。而徑不實於胃家。因若惟據腹滿。下之則徒傷損胃氣。表邪乘其虛。盡內陷。腹氣爲之結滯。乃致腹滿甚。小便難通之變矣。此陽明中風之總綱。後凡稱陽明中風者。皆由此脈證立言。以及其變。又按陽明病者。以胃家實爲主。故今於中風亦先裏證。後表證。是所以與太陽中風。邪氣專在於表異也。仲景全書。婁氏云。陽明宜下。先列在經。與裏虛不宜下者於前。仲景愼重之意可見。

陽明病。若能食。名中風。不能食。名中寒。能食者。非眞欲食之謂。對不能食言也。不曰傷寒。名中寒者。意在寒直中胃矣。

此揭陽明病。寒邪直中胃者。以更設中寒之名也。

言陽明病。若邪氣進緩。鬱熱表發。但外氣熱而不至胃實者。能食。故名中風。寒邪直中胃。則胃中虛冷。食穀不化輸。因不能食。故名中寒。但以能食不能食。建中風中寒名者。是其言大概也。柯琴曰。此不特以能食不能食別風寒。更以能食不能食。審胃家虛實也。要知風寒本一體。隨人胃氣而別。

陽明病。若中寒者。此暗對中風。故曰若中寒。非對陽明。以前章文意可見。不能食。小便不利。手足濈然汗出。此欲作固瘕。字彙云。瘕。腹中病也。按固瘕。謂熱與水穀相結固也。故曰手足濈然汗出。此欲作固瘕。即與手足濈然汗出者。此大便已鞕。同但以小便不利。胃中冷。水穀不別。故大便初鞕後溏之異耳。或爲寒氣結積。或爲大瘕瀉者。義不通。必大便初鞕後溏。所以然者。以胃中冷。水穀不別。故也。

此接前章。而申明陽明病。中寒證也。言陽明病。若寒邪直中胃者。表裏氣忽阻隔。而熱氣延漫。但胃中爲寒冷。水穀不別。因不能食。小便不利。手足濈然汗出者。是熱與水穀相結。欲作固瘕。必大便初鞕後溏。故更明其病因曰。所以然者。以胃中冷。水穀不別。故也。今胃中寒。而猶稱陽明病者。即指身熱汗自出。不惡寒。反惡熱等之外證。而言也。又按此似後章脈浮而遲。表熱裏寒。及陽明病發潮熱。大便溏證。然而細究其病理。則亦有所異矣。且中

寒名。始見於茲。而論中無及其義者。因意此王叔和。爲辨別陽明病。胃中虛冷者。對中風。設之名也。

陽明病。初欲食。小便反不利。大便自調。其人骨節疼。翕翕如有熱狀。奄然發狂。濈然汗出而解者。字彙云。奄覆也。忽也。按發狂而汗出者。溫疫論名之狂汗。爲伏邪中潰。霍然而愈之候。蓋本于此也。此水不勝穀氣。與汗共并。脈緊則愈。

此章曰初欲食者。就前章陽明中風能食者而言。乃與中寒不能食反對。曰小便反不利。大便自調者。與小便不利。大便初鞕後溏。相照以明胃中無病矣。濈然汗出。與手足濈然汗出應。而彼胃中冷。水穀不別。因欲作固瘕。此水不勝穀氣。與汗共并。言陽明病。初欲食。大便自調者。邪氣尚在表也。邪氣在表者。小便亦當快利。而反不利。小便不利者。大便應溏泄。而自調者。此邪氣及下焦。但膀胱氣不和。水道不通。水停故也。其人骨節疼。翕翕如有熱狀。是熱氣爲停水。難表發。伏結於肌肉骨節也。穀氣者。初欲食之穀氣。卽精氣也。評熱病論云。邪氣交爭於骨肉。而得汗者。是邪卻而精勝也。今奄然發狂。濈然汗出而解者。此水不勝穀氣。與汗共并。乃伏熱暴動之勢。逆迫心家。心神忽憒亂也。緊

脈者。因熱發與邪氣相搏劇。故脈緊。則邪盡解散而愈。此以陽明熱氣盛故爾矣。

陽明病。欲解時。從申至戌上。

按酉乃四陰生。陽明者。陽氣極盛。而熱深損陰甚於太陽。故得申酉戌。陰長之時。則陰復與陽相協和。而欲解也。

陽明病。不能食。攻其熱。必嘔。其熱。斥陽明裏熱言也。張思聰曰。高子云。遍閱諸經。止有嘔而無呃。則嘔之爲呃也。確乎不易。詩曰。鑾聲嘔嘔。謂呃之發聲有序。如車鑾聲之有節奏也。凡經論之言嘔者。俱作呃解無疑。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。攻其熱。必嘔。

此章曰不能食者。就前章陽明中寒。不能食者而言。乃與中風能食反對。以明胃中有病矣。言陽明病。胃實不能食者。可攻下之。其人本胃氣虛弱。食穀不化輸。不能食者。攻其熱。必嘔。所以然者。胃中虛冷氣逆故也。如斯宜審按察腹裏虛實。以施治矣。又總承上文云。不啻因攻下而虛冷。以其人本虛。故攻其熱。必嘔。是重言病源也。古人叮嚀告戒。勿忽諸。即胃中虛冷。不能食者。飲水則嘔之類也。

陽明病。脈遲。食難用飽。飽則微煩頭眩。必小便難。此欲作穀癉。字彙云。飽。食充滿也。癉。黃病也。濟按玉函。作瘖。此因食鬱發癉。故名穀癉。錢潰曰。謂

之欲作蓋將作未作之時也。雖下之腹滿如故。不下前既腹滿故曰如故所以然者。脈遲故也。

此承前章而論之。言陽明病邪熱未盛實。雖能食。其脈遲者。胃氣爲邪壅。不健運。乃脈行不速也。因食難用飽。飽則食穀停滯。抑胃氣。而精氣不充於上。發微煩頭眩。胃氣閉塞。則水道亦不通暢。必致小便難。此熱氣與瘀滯熏蒸。欲作穀癉。雖下之。胃氣虛而益難行。故腹滿如故。此章之主意在脈遲。故曰所以然者。脈遲故也。

陽明病。法多汗。反無汗。其身如蟲行皮中狀者。此以久虛故也。字彙云。有足曰蟲。無足曰豸。李陽水曰。蟲者。裸毛羽鱗介之總稱。族各三百六十。

此章論因他病久虛。致中無汗之變也。言陽明病熱氣延漫。而升蒸津液。故法當多汗。而反無汗。其身如蟲行皮中狀者。此以久虛血液枯涸。不得爲汗。而鬱於皮中。氣難行故也。所謂以其不能得小汗出。身必癢之類也。

陽明病。反無汗。而小便利。略法多汗三字。二三日嘔而咳。手足厥者。必苦頭痛。若不咳不嘔。手足不厥者。頭不痛。一云。冬陽明。按千金翼作冬陽明。王函作各陽明。

此更論反無汗。而小便利。二三日邪熱伏於裏之

變。言陽明病。反無汗。而小便利者。不能熱氣引津以出於外。因水偏湊於下焦。而滲入膀胱故也。此二三日熱氣忽伏於裏。而胃氣衝逆。便嘔而咳。手足厥者。必苦頭痛。頭痛者。是從嘔咳厥。故若不咳不嘔。手足不厥者。頭不痛也。此別太陽之頭痛也。

陽明病。但頭眩。外無餘證。故曰但。不惡寒。外已解也。故能食而咳。胃無病。故能食。其人咽必痛。若不咳者。咽不痛。一云。冬陽明

此承前章飽則微煩頭眩。而論陽明病。邪熱伏於胸間。而氣不充上。但頭眩不惡寒。能食而咳。因咳咽痛者。故若不咳者。咽不痛。此別少陰之咽痛也。

陽明病。無汗小便不利。心中懊憹者。身必發黃。

此與前章小便利反對。言陽明病。雖無汗。小便利者。不發黃。今此無汗小便不利。心中懊憹者。瘀熱與畜水。相熏蒸毒氣逆鬱滯於心胸之所致。因身必發黃也。

陽明病。被火。額上微汗出。而小便不利者。必發黃。

此更論因火逆。發黃者也。陽明病。熱氣盛而被火攻。邪熱與火氣相搏。熏蒸津液。因氣壹上逆。但額上微汗出。而小便不利者。必發黃。所謂被火者。微發黃色之類也。

陽明病。脈浮而緊者。必潮熱發作有時。但浮者。必盜汗出。玉函以此章出于陽明病無汗章前

此章以脈診。分邪氣之淺深。而明其變態也。言陽明病。脈浮而緊者。熱氣延漫於表裏。而深專裏也。因遂實胃。必潮熱發作有時。但浮者。尚淺專表也。因遂鬱肌肉。必盜汗出。

陽明病。口燥但欲漱水。不欲嚥者。此必衄。玉函漱作嗽漱漱口也嚥吞也魏氏云漱水非渴也口中黏也

此章言陽明病。口燥但欲漱水。不欲嚥者。邪熱逆盛於上。鬱結肌肉。而難表發。遂迫血脈。而未深裏也。因此爲必衄之兆。惟忠曰。金匱要略亦爲瘀血之候也。例又曰脈浮發熱。口乾鼻燥者則衄。亦類之也。大抵裏有熱者。必口乾咽燥。於是其渴者。與白虎湯。其不渴者。與承氣湯。若於鼻衄也。在表則宜麻黃湯。於裏則宜瀉心湯。雖口燥之如一乎。或渴或不渴。雖衄之如同乎。或在表。或於裏。此之爲其別也。夫既有其別也如此。豈可同一其治法哉

陽明病。本自汗出。醫更重發汗。本自汗出者邪氣在表則宜發汗也已發汗而復汗故曰醫更重是咎發汗過多也病已差。尚微煩不了了者。此必大便鞕故也。以亡津液。胃中乾燥。故令大

便鞕當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少字典云幾顏會居希切音機廣韻何也數集韻爽主切音數說文計也羣經音辨計之有多少日數以津液當還入胃中故知不久必大便也

此章明陽明病本自汗出更重發汗病已差但以津液乾燥故大便鞕者勿攻下之宜待津液復欲大便也即與蜜煎導證類方有執曰蓋水穀入胃其清者爲津液粗者成糟滓津液之滲而外出者則爲汗豬而下行者爲小便故汗與小便出多皆能令人亡津液所以糟滓之爲大便者乾燥結鞕而難出也然二便者水穀分行之道路此通則彼塞此塞則彼通小便出少則津液還停胃中胃中津液足則大便輭滑此其所以必出可知也

傷寒嘔多雖有陽明證該陽明病諸證言也不可攻之

此承傷寒發熱無汗嘔不能食而言嘔之太多者也今嘔多者表邪入裏熱氣益加而犯胃雖有陽明證邪氣尚壅於上焦水熱相幷而未成燥結也若誤攻下之則徒使胃氣虛而病不全除必生變證當須邪氣盡入胃而攻之也論曰但初頭鞕後必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕乃可

攻之。是嘔大便雖異於其未成燥結則一也。故曰不可攻之。又云陽明病。脇下鞕滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。此之類也

陽明病。心下鞕滿者。不可攻之。攻之。利遂不止者死。利止者愈。

此就前章不可攻論之也。言陽明病。腹鞕滿。應攻下之。心下鞕滿者。邪氣尚結於心下。而未全入胃也。故不可攻之。若誤攻之。則胃氣脫。邪乘虛盡內陷。利遂不止者。精氣竭而死。此不可攻也必矣。然此本陽明熱實。乃邪氣幸因下除。精氣復。利速止者。猶可愈也。惟忠曰。心下鞕滿而痛者。大陷胸湯也。腹中滿痛者。大承氣湯也。此二者之於別。在心下與腹中也。又不但在腹中。雖至于少腹。仍以大陷胸湯。惟在心下鞕滿。則其痛與否。皆不以承氣湯。此之爲法也。故曰不可攻之。是故若心下滿痛。則以大柴胡湯。若心下鞕按之痛。則以小陷胸湯。若心下鞕滿而不痛。則以半夏瀉心湯。所謂隨證治之者也。

陽明病。面合色赤。不可攻之。必發熱。合猶云都也。言面色緣緣都赤色黃者。小便不利也。

此章視面色而察知其病機更示不可攻者也言陽明病面合色赤者邪熱伏於肌肉佛鬱于上而未全入胃故不可攻之此必熱動遂發越之兆也所謂面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表之意色黃者因瘀熱熏蒸津液小便不利也即前章云無汗小便不利心中懊憹者身必發黃之類也蓋陽明病專論攻下故諄諄諭不可攻者以深戒之也又按以上十七章說陽明病諸變證也詳且盡矣然亦有其旨趣所不相愜疑非仲景氏之舊論

陽明病不吐不下言有欲自吐下之態而不吐下甲也是邪熱徑入胃乃胃氣不和水穀渣滓觸動迫上逼下之所致也或以爲下未經吐下一之義者非也若未經吐下則當曰未吐下少陽篇本太陽病章下云尚未吐下一即是不爾則意不通也心煩者毒氣急迫心胸故也可與調胃承氣湯方

甘草二兩炙　芒消半升　大黃四兩清酒洗

右三味切以水三升煮二物至一升去滓內芒消更上微火一二沸溫頓服之以調胃氣上篇無切字是

按此篇先論調胃承氣湯者此承首章而且照之于太陽病過經十餘日章云自極吐下者與調胃承氣湯欲以明陽明病不吐不下心煩未至腹鞕滿潮熱大便鞕手足濈然汗出者宜與調胃承氣

湯。頓服以調胃氣。救其急之義也。而彼章言自極吐下後。邪熱入胃。而腹微滿。鬱鬱微煩。此論邪熱徑入胃。不吐不下心煩。蓋雖自極吐下。不吐不下。相矛楯。至其邪熱實。胃氣不和。則一也。故俱爲此湯之所治也。又觀太陽篇中。唯論調胃承氣湯。而不舉大小承氣。可以知矣。是猶太陽中篇。先論葛根湯。下篇先舉大陷胸丸。此皆依有所承接也。

陽明病脈遲。此熱氣未盛。實胃氣爲邪壅。不健運。因脈行不速也。卽遲而有力者也。非遲爲寒之虛遲。論曰。脈遲尚未可攻。是也。蓋雖脈遲未可攻。然既至胃實。則必加實大。乃可攻也。是故先提揭脈遲。而辨別其證。言外欲解與未解者也。雖汗出。不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。以上證邪氣入裏之所致。故曰外欲解。可攻裏也。然此未定爲大承氣湯證。程應旄曰。身重者經脈有所阻也。表裏邪盛。皆能令經脈阻。邪氣在表而喘者。滿或在胸而不在腹。此則腹滿而喘。知外欲解可攻裏也。手足濈然汗出者。此大便已鞕也。大承氣湯主之。此以手足濈然汗出。知大便鞕也。至此爲大承氣湯證定然。故曰主之。錢潢曰。熱邪歸胃。胃邪氣依附于宿食粕滓而鬱蒸煎迫。致胃中之津液枯竭。故發潮熱。而大便硬也。若不下以大承氣湯下之。必至熱邪敗胃。譫語狂亂。循衣摸牀等變。而至不救。正珍曰。手足濈然汗出者。言下自腹背。至手足末。濈濈然而汗出也。蓋承上文汗出二字。言之。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。一法。與桂枝湯。濟按此對上文外欲解而言。外未解也。此一節。直接脈遲下。以立一義。故用若字。卽後所謂陽明病脈遲。汗出多。微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯之意。而不詳舉之。於茲後論之者。蓋陽明病者。以胃家實爲主。故先

舉下藥若其邪氣尚在表及外未解宜發汗者則必後之也其熱不潮未可與承氣湯與上有潮熱反對此即大承氣湯之略言潮熱者實也今其熱不潮者雖邪氣入裏未至胃實也因更斷之于潮熱曰未可與承氣湯此承上文而言之乃暗含外未解之意若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下接上節故曰若腹大滿即上腹滿之甚也不通大便不通也言雖其熱不潮若腹大滿不通者裏氣鬱閉甚因可與小承氣湯微和胃氣通大便以解裏鬱然而若過大泄下之則裏虛邪熱陷而必至危篤矣故重戒之曰勿令至大泄下也

大承氣湯方此方下除腹中熱實燥屎堅滿而承順上下之氣故名大對小承氣湯而示其藥力之强大也

大黃四兩酒洗 厚朴半斤去皮炙 枳實五枚炙 芒消三兩

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取二升去滓內芒消更上微火一兩沸分溫再服後內之也芒消內熱湯即消解故最後內之一兩沸也得下謂得燥屎宿食瘀濁下也餘勿服不欲過當也金鑑云諸積熱結於裏而成滿痞燥實者均以大承氣湯下之也滿者腹脇滿急脹脹故用厚朴以消氣壅痞者心下痞塞硬堅故用枳實以破氣結燥者腸中燥屎乾結故用芒消潤燥軟堅實者腹痛大便不通故用大黃攻積瀉熱然必審四證之輕重四藥之多少適其宜始可與也若邪重劑輕則正氣轉傷不可慎也

小承氣湯方

大黃四兩 厚朴二兩炙去皮 枳實三枚大者炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初

服湯。當更衣。不爾者盡飲之。若更衣者。勿服之。此但腹大滿不通者。而未至結實。乃以胃氣和更衣爲度。故一服。若更衣者。勿服之也。惟忠曰。如大承氣湯。則煑取二升。分溫再服。如小承氣湯。則煑取一升二合。分溫再服。如調胃承氣湯。則煑取一升。少少溫服。因此考之。不唯作劑之有差。而服之亦有多少之差也。豈可不復爲法乎。

此承前章。而論陽明病脈遲。雖汗出。不惡寒者。熱氣延漫也。乃其身必重。短氣。腹滿而喘。裏熱益加而實。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。其汗及手足濈然者。此邪熱既入胃。裏液爲熱蒸出也。因胃中乾糟粕燥結。大便已鞕也。乃主大承氣湯。以下燥屎矣。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。此屬桂枝湯證。其熱不潮者。未結實。未可與承氣湯。然若腹大滿不通者。裏氣鬱閉甚也。乃可與小承氣湯。微和胃氣。通大便。解裏熱。以明三承氣之所主治。且示陽明病者。以胃實爲主。然外未解。其熱不潮者。不可下之義。爲後論桂枝麻黃之基焉。按三承氣湯。功用彷彿。極難辨別矣。因今就本論所舉之諸證詳之焉。大承氣湯證曰。手足濈然汗出者。大便已鞕也。曰陽明病。潮熱大便微鞕者。曰傷寒若吐。若下後不解。不大便五六日。上至十餘日。但發熱譫語者。曰陽明病。譫語有潮熱。反不能食者。胃中

必有燥屎五六枚也。曰汗出譫語者。以有燥屎在胃中。曰二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足漐漐汗出。大便難而譫語者。曰陽明病。下之心中懊憹而煩。胃中有燥屎。曰病人煩熱汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脈實者。曰大下後。六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎也。曰病人小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。喘冒不能臥者。有燥屎也。曰須小便利。屎定鞕。乃可攻之。曰傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱者。此爲實也。曰陽明病。發熱汗多者。曰發汗不解。腹滿痛者。曰腹滿不減。減不足言。曰陽明少陽合病。必下利。脈滑而數者。有宿食也。曰少陰病二三日。口燥咽乾者。曰少陰病。自利清水。心下痛。口乾燥者。曰少陰病六七日。腹滿不大便者。以上諸證。皆邪熱實於胃。而成燥屎。或有宿食。或鬱閉甚之所致也。因用大黃芒消枳實厚朴。以下除實熱燥屎矣。故服法曰。取二升。分溫再服。曰下之。曰下之愈。曰當下之。曰急下之。曰得下餘勿服。曰得利止後服。小承氣湯證曰。腹大滿不通者。曰若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。曰其後發

熱者。必大便復鞕。而少也。曰陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞕。鞕則譫語。曰陽明病。譫語發潮熱。脈滑而疾者。曰太陽病。若吐。若下。若發汗後。微煩小便數。大便因鞕者。曰得病二三日。脈弱。無太陽柴胡證。煩躁心下鞕。至四五日。雖能食。曰下利譫語者。有燥屎也。此雖有燥屎。專下利。因屬小承氣湯證也。是皆邪熱在於裏。而犯胃。腹滿無燥屎。但大便鞕。大便不通之所致也。因用大黃枳實厚朴。以和胃氣。通大便。專解裏熱矣。故服法曰。取一升二合。分溫二服。曰服一升。曰少與。曰微和胃氣。勿令至大

泄下。曰和之。曰和之愈。曰少少與微和之。曰若更衣者。勿服之。曰一服譫語止者。更莫復服。調胃承氣湯證曰。胃氣不和。譫語者。曰不惡寒。但熱者實也。曰傷寒十三日。過經譫語者。以有熱也。當以湯下之。若小便利者。大便當鞕。而反下利。脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此爲內實也。曰太陽病。過經十餘日。心下溫溫欲吐。而胸中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時。自極吐下者。曰陽明病。不吐不下。心煩者。曰太陽病。三日發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃

也。曰傷寒吐後腹脹滿者。此雖腹脹滿吐後邪熱徑入胃胃氣不和之所致而非滿痛因屬調胃承氣湯證是皆邪熱徑入於胃胃氣不和。水穀觸動毒氣急迫之所致而不至腹滿潮熱大便鞕手足濈然汗出也。因用大黃芒消甘草以和胃氣專除胃熱救其急矣故服法曰少少溫服之曰取一升頓服曰頓服之調胃氣蓋於大小承氣湯證則俱邪熱在於腹裏而所其異在胃熱盛實成燥屎與未至盛實成燥屎故相對以辨明其所宜用矣即與大小柴胡相對論其證同唯於調胃承氣湯則其方雖類此邪熱專在於胃乃其用大

異于大小承氣故不與論之矣而其攻效俱在大黃餘皆治其標之品也可見雖三承氣功用彷彿其證多端詳校之則各所主用彰彰乎明也古人製劑增減去加煎煮服法悉極精意宜審識之而對證運用矣若邪熱結實於胃而以小承氣攻之則邪氣不服邪熱在於裏而與調胃承氣未至胃實燥結而投大承氣則過傷正氣且不及還可再攻過則不能復救不可不慎矣

陽明病潮熱大便微鞕者可與大承氣湯不鞕者不可與之鞕不鞕者就大便通言之也此先斷大承氣湯之可否于大便鞕不鞕以爲不大便者之

一案若不大便六七日恐有燥屎。淇園曰恐有疑之意濟按此前章大便不通之甚也乃對上大便微鞕言之今不大便則知其鞕不鞕無由然既六七日則生燥屎故曰恐有燥屎也欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之可攻之係大承氣湯言之若不轉失氣者此但初頭鞕後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也。按攻之後不能食則不攻之前仍能食可得知矣論曰反不能食者胃中必有燥屎也可見能食者固非胃中有燥屎乃雖下不大便六七日上但腸間燥結之所致而亦難辨知既成燥屎與中未成因小與小承氣湯以候之也轉失氣謂腹中燥結之鬱氣轉放失乎肛門失氣故屁也此係腹氣轉言故曰轉失氣也今以轉失氣明燥屎與初鞕者爲腸間之燥結也益必矣欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞕而少也更言發熱者下後身熱等之表證一旦罷故也此亦以發熱察大便鞕其曰少者以下後不能食故也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也小承氣湯不可攻也下諸本皆無小承氣湯四字爲是意此林億等之傍注舛混本文也

此章言陽明病發潮熱大便微鞕者邪熱既實於裏而致燥結也雖微鞕非初頭鞕後溏之比仍可與大承氣湯下之若不鞕者雖潮熱未至燥結不可與之若不大便六七日胃液爲熱乾燥恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此少之湯藥不能除燥屎但鬱氣轉下失此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者但腸中少燥結因

此但初頭鞕後必溏。不可攻之。若誤攻之。則邪熱乘虛盡入伏於裏。致脹滿不能食之逆變。今胃氣暴虛。而有伏熱。因渴欲飲水。而與水則水停。胃氣逆發噦。其後發熱者。鬱熱加。而發於表。胃氣乾成燥結。必大便復鞕而少也。乃再與小承氣湯。以和之。此大便鞕。故重曰不轉失氣者。慎不可攻也。是慎重之意。蓋陽明病者。邪熱附近於胃。因最恐誤下正虛。邪忽內陷。故言及此也。此亦燥屎之一候法。不可不知矣。

夫實則譫語。虛則鄭聲。王宇泰曰。譫語者。謂亂言無次。數數更端也。鄭聲者。謂鄭重頻頻也。只將一句舊言。重疊頻言之。終日殷勤。不換他聲也。蓋神有餘。則能機變。而亂語數數更端。神不足。則無機變。而只守一聲也。成氏謂鄭衛之聲。非是。劉棟曰。邪熱實於胃中。而有燥屎者。發譫語也。身體虛憊。而邪熱不退者。致鄭聲也。鄭聲者。重語也。此二句自注之文。脈要精微論云。言而微。終日乃復言者。此奪氣。是鄭聲者。重語之意。

此章單曰夫實則譫語者。承首章胃家實也。今雖係虛實。以辨別譫語鄭聲。然論中但言譫語。而無及鄭聲之義者。因意鄭聲者。從論譫語。而欲明爲精虛甚之所致。設之名耳。此雖爲察虛實之一候法。若惟以語聲。定虛實。則反有失其眞者矣。宜審其脈證。以施治也。此爲下論譫語。先發之也。

直視譫語。喘滿者死。下利者亦死。玉函下利上有若字是此直視譫語下分喘滿與下利故相對曰亦死

此接前章。而申明直視譫語。喘滿之實。下利之虛。俱爲必死之候也。蓋直視譫語。毒氣急迫於心胸之劇也。而喘滿者。熱氣塡滿。正不勝邪故主死矣。若下利者。精氣爲毒遏格絶。而不守下。胃氣已脫之所致。故亦死矣。

發汗多。若重發汗者。亡其陽。發汗多謂下可發汗而發汗過多也重發汗謂已發汗而復發汗也此對發汗多曰若譫語。脈短者死。脈自和者不死。脈自和者謂短脈自然和也故曰自曰不死

前章毒氣劇烈。故以見證。決其死矣。此章以發汗亡陽。故依脈斷死生矣。此亦單曰發汗多。若重發汗者。承前陽明病。脈遲章下云。若汗多。微發熱惡寒者。外未解也。言陽明病外邪未解。因發汗。但以過多。若重發汗。故徒津脫陽亡。而邪熱不徹。遂實於裏。乃譫語。脈短者。正虛不勝邪。是死之候。而此本非邪氣之劇。故氣液漸復。脈自和者。正能勝邪。乃不死矣。例曰。脈陰陽俱虛。熱不止者死。此之謂也。或問。審前章及此章。譫語亦有虛脫。然則夫實譫語。虛鄭聲者。以何別之。答曰。邪熱盛實者。必譫

語而虛脫者死故二章俱曰死矣雖邪熱不盛實日久不除精虛甚者發鄭聲此極難治多死矣以此意辨別之則虛實自明矣是所以三章並論也又問此篇未論發汗治法突然言發汗亡陽者何也曰此即與太陽上篇先論太陽病下後之變同義蓋太陽病者邪氣專在於表而有可下之急證則宜下之陽明病者邪熱徑實於裏而表證未解則宜汗之然而於太陽之下也於陽明之發汗也最關治術之機變故特明汗下逆變以戒其過也

傷寒若吐若下後不解寒邪不解也不大便五六日上至十餘日論曰傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯今不大便五六日則雖若吐若下後當議下而不議遂上至十餘日此示下之遲也日晡所發潮熱不惡寒初不解之寒既化熱乃不惡寒也獨語如見鬼狀惟忠曰獨語讝語大同而少異蓋不對人而似有對者此之爲獨語故如見鬼狀也不必對人而妄語喃喃此之爲讝語亦將混鄭聲也若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安一云順衣妄撮怵惕不安循摩也中篇作捻金鑑云循衣摸牀危惡之候也大抵此證多生於汗吐下後陽氣大虛精神失守經曰四肢諸陽之本也陽虛故四肢擾亂失所倚也春暉曰循衣摸牀者神將去故循摸自護也陽而不安如見鬼狀益甚也微喘直視前章云喘滿之稍輕也脈弦者生濇者死前章云脈短者死脈自和者不死之類而此分死生兩道故曰生曰死對上劇者也劉棟以微者爲脈狀又曰讝語者之者字當作也字此說非也此微者但發熱讝語但發熱

譫語者之略言而直令連續大承氣湯主之句也

則止後服

此承太陽下篇云傷寒若吐若下後七八日不解及前章而論若吐若下後不解精虛邪實之劇易死生辨治方也彼熱結在裏而未實於胃表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升因白虎加人參湯主之此邪氣既入胃不大便五六日上至十餘日因循失下乃至熱氣盛實氣液虛耗而日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若邪氣劇者潮熱發則正虛不勝邪虛陽無所依神明擾亂不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視是危惡之候當此之際惟診其脈弦者雖病勢劇氣液未全竭得其治之適宜則猶可生矣脣者精氣將竭拔邪無由必死矣若邪氣微者不至潮熱獨語又不加循衣摸牀等證但發熱譫語者雖病勢不甚不大便十餘日則必成燥屎因大承氣湯主之然而此固精虛邪實最恐過劑故一服利則止後服也是峻劑微用之要法不可不慎如法矣今雖不曰屬陽明以上證因胃家熱實乃爲陽明屬證明矣故不言也又按以上三章並辨死生者猶

太陽下篇先論結胸之死證蓋結胸胃實俱毒氣劇烈之所致乃可速下除之也不爾則忽敗壞眞氣若邪氣不除而眞氣脫則雖盧扁亦無所施矣故先論死生以諭可急緊也

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則讝語（以多汗察大便鞕故極向曰必小承氣湯主之若一服讝語止者更莫復服（成無己曰亡津液胃燥大便鞕而讝語和中其胃氣得一服讝語止則胃燥以潤更莫復與承氣湯以本無實熱故也）

此承前若汗多微發熱惡寒者外未解也及發汗多重發汗而論多汗之變也言陽明病外未解者可發汗也然不發汗因汗續出邪熱入裏以本多汗胃中燥故大便鞕而讝語仍主小承氣湯唯陽明熱氣熾煎熬胃液故發汗多過則死多汗亦致大便鞕讝語是所以於陽明之發汗也最爲緊要矣乃與太陽自有表裏緩急之別也若前陽明病本自汗出醫更重發汗病已差則與此殊又按發汗多及此章俱承若汗多微發熱惡寒而特此章冒陽明病三字者何也夫發汗多章直接彼章故單曰之此隔數章而論故冒首以符乎彼章不然則篇章混亂義難通也

陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之按脈滑而疾者熱氣盛於裏血氣弱乃脈氣迫促而失其常度也因若一裏虛則血氣忽澀滯而變見微濇矣

因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之即小承氣湯也按轉下並脫失字成明本作轉失氣是玉函作轉矢氣非

日又不大便脈反微濇者裏虛也爲難治脈微濇者滑疾之反不可更與承氣湯也

此接前章而更明小承氣湯證且係脈以辨虛實也言陽明病譫語發潮熱者恐有燥屎也然今脈滑而疾者爲邪熱未全入胃府因先與小承氣湯一升腹中轉失氣者有燥屎也此雖有燥屎尚未

可與大承氣湯可更服小承氣湯一升以除之若不轉失氣者無燥屎勿更與之明日又不大便則脈仍當滑疾而反見微濇者是本血氣弱且因下裏虛故也邪氣未全除而裏氣既虛者正不耐邪故爲難治若誤認不大便以爲裏實更攻之則必死矣故重戒曰不可更與承氣湯也

陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也正珍曰燥屎五六枚者以腹診言之此證診其腹則必有糞塊五六枚應於手也若能食者但鞕耳此對上不能食者胃中必有燥屎言此二句斜挿宜大承氣湯下之

按前章論燥屎在腸間故候之于轉失氣此章論胃中燥屎故察之于食不食也陽明病潮熱章云攻之必脹滿不能食則其不攻之前能食也可得知矣據之則陽明病讟語有潮熱者亦應能食而不能食故曰反其不能食胃中有燥屎不受食也五六枚其言大概也若能食者胃中無燥屎但腸間燥結大便鞕耳有燥屎者非下除之則病不解故曰宜大承氣湯下之也或問曰吾嘗聞飲食入胃蒸熟消化而生津液其糟粕傳送至於腸間而始成屎然此云胃中必有燥屎者何也余曰蓋腸

胃者唯一條膜囊胃之上口從胃管通咽胃之下口即腸之上口腸之下口即肛門也其受入飲食之所名胃傳送其糟粕之所名腸耳故本論中但言胃言腸者稀也是曰胃則腸隨之故也乃此云胃中者必該腸言也不爾則胃中有燥屎五六枚者大戾理矣然而單曰有燥屎者多曰胃中有燥屎者少因知特旌之曰胃中者是暗對腸中而示燥屎上及胃中之變也且夫腸間成屎是平常之事蓋病者變也非常矣況陽明病者熱氣延漫於表裏其熱劇者徑煎熬胃液乃食穀糟粕之在胃

者。亦忽燥結。而不能下腸。因腸間固。胃中亦生燥屎也。世有吐糞病者。亦可以知矣。單曰有燥屎者。謂在腸中也。而不言腸者。腸間成燥屎。亦事之常。故不必言也。是故醫者。貴乎通變。能通變。方爲盡善焉。若惟知常。不知變。則何以異於刻舟求劍也。

陽明病。下血譫語者。此爲熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其實而寫之。濈然汗出則愈。諸本皆寫作瀉。

此章論陽明病。下血譫語之一證也。下血譫語者。此裏熱入血室。血爲之不得順行。頹敗而流腸中。血熱鬱氣逆。乘心之所致。而但頭汗出者。熱隨血除。餘邪鬱結於胸脇下。而上氣也。因刺期門。隨其實而寫之。鬱結解散。氣液宣通。遍身濈然汗出。則餘邪亦去愈。此與太陽下篇云。婦人中風。經水適來同義。但陽明本熱氣延漫於表裏。故刺後濈然汗出爲異矣。若血下。而邪熱不除。譫語者。則非刺法之所及也。又下血大多者危。宜測虛實。以救療。

汗一作臥。出譫語者。以有燥屎在胃中。此爲風也。按胃中下。

折略也字也。不爾則義不通。是釋汗出譫語之因。曰以下有燥屎。在胃中上也。此其源出陽明病。邪氣尚在表。發熱惡寒。脈浮而緊。汗出胃中燥。故又斷曰此爲風也。若以下有燥屎。在胃中上。此爲風也。則與陽明中風口苦章義大左矣。須下者。過經乃可下之。須下。言待必定當下而可下也。下之

若早語言必亂以表虛裏實故也錢潢曰若下早則胃氣一虛外邪內陷必至熱盛神昏語言必亂蓋以表閒之邪氣皆陷入於裏表空無邪邪皆在裏故謂之表虛裏實也下之愈宜大承氣湯一云大柴胡湯按脈經作屬大柴胡湯承氣湯證

此章申明汗出譫語也不冒首陽明中風而曰此爲風者是直對前章下血譫語論之故先揭證後命名也蓋汗出譫語者熱氣延漫外脫津內乾液胃中忽燥結之所致故曰以有燥屎在胃中也燥屎在胃中胃中燥之甚也風即陽明中風也謂陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊今汗出乃至譫語燥屎故曰此爲風也須下者過

經乃可下之言雖有燥屎邪氣尚在表未解發熱惡寒脈浮而緊者待邪過經盡入裏惡寒罷乃可下之也表解不惡寒者雖發熱汗出當下也論曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已鞕也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也陽明病發熱汗多者急下之可以知矣下之若早謂未過經而下也譫語者言語無倫更曰語言亂者無倫之甚也言邪氣尚在表而汗出者表陽虛裏陰乾因下之若早則表

邪盡陷而實於裏。正虛不勝邪。乃心憒憒語言亂。故曰以表虛裏實故也。下後嫌再下。然本燥屎在胃中。今又裏實。非下不愈。故曰下之愈。宜大承氣湯。此雖燥屎在胃中。其證劇。本是由中風邪氣進緩鬱熱直發於表。汗出胃中燥致之。故曰須下。曰過經乃可下。曰下之若早。曰下之愈。或問曰。以汗出譫語。爲中風。則陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞕。鞕則譫語。小承氣湯主之。是亦爲中風歟。答曰夫所以爲風者。非止汗出譫語。必有發熱惡寒也。而不言之者。依陽明中風章略也。

不爾則若夫發熱汗多者。急下之。以何辨別之乎。是以無惡寒。故急下之也。彼章則欲明胃中燥。大便鞕之因。而曰其人多汗。津液外出也。非現有多汗及表未解之證。故方後曰。若一服譫語止者。更莫復服。此曰汗出譫語者。是就現在而主言之也。宜玩味文意以知彼則不爲中風矣。

傷寒四五日。脈沉而喘滿。沉爲在裏。而反發其汗。津液越出。大便爲難。表虛裏實。久則譫語。方有執曰。越出謂枉道而出也。濟按沉爲在裏句。是斜挿傷寒比陽明病。則熱勢自緩。故曰久則譫語。

此章更論傷寒誤汗。表虛裏實譫語也。言傷寒四

五日。邪氣將入裏時。其脈沉。而喘滿者。邪既入在裏也。而反發其汗。津液越出。而表陽虛。裏液乾。而熱實。大便爲難。若裏實久不除。則熱氣益加。遂至發譫語。此與傷寒。若吐若下後不解。不大便五六日。上至十餘日章。病機相類。宜併考。

三陽合病。蓋太陽病者。陽氣盛。寒熱相搏於表。乃頭項強痛。而惡寒。陽明病者。陽氣極盛。熱氣延漫於表裏。乃胃家實。少陽病者。陽氣衰少。熱氣難表發。而鬱於胸脇。乃口苦咽乾。目眩。三陽合病者。謂三陽病證合發。如鼎足也。然而非一時致之。又非其證悉具。但一二兼見也。今夫若斯則陽氣之盛衰。其體容微細。而至難辨別矣。便診視病者。就其見證。以勘合定之可也。爾則陽氣之盛衰。亦從之得分明焉。

腹滿身重難以轉側。口不仁面垢。又作枯。一云向經難轉側。因腹滿身重。故加以字。垢者。脂液爲熱浮著於皮表故也。正珍曰。不仁。寒熱痛癢。并不知覺之名。或口不能言語。或口不覺寒熱痛癢。或口不能辨五味。皆謂之口不仁。豈唯不知味一事爲然乎。譫語遺尿。發汗則譫語。玉函有下之則額上生汗。手足逆冷。方有執曰。甚字是下之生汗。汗生不流也。濟按此亦脂液越出也。若自汗出者。此對上文下後之逆變而言。自汗出者。故曰若。白虎湯主之。方

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合

右四味。以水一斗。煮米熟。湯成。去滓。溫服一升。日三服。

此承前下之若早。反發汗之二章。而論三陽合病。誤汗下之變。而明下後之治方也。蓋三陽合病者。

邪氣在表裏內外鬱閉精氣不通因見腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿證此皆陽明證也如太陽少陽證則今略之所以然者以主陽明而舉此篇故也若欲解其表發汗則津液虛耗裏熱益加譫語甚若欲攻其裏下之則陽氣內陷毒氣上攻額上生汗手足逆冷若其逆變不甚陽氣復逆冷愈而自汗出者內結因下除內外氣通鬱熱將發而不能發也故白虎湯主之以解熱結在裏潤燥則邪熱表散而治矣傷寒脈滑而厥者裏有熱白虎湯主之之類也三陽合病禁汗下者何

蓋太陽與陽明合病者主太陽以發汗太陽與小陽合病者主少陽以和解之陽明少陽合病脈滑而數有宿食者主陽明以下之唯太陽戒下陽明戒汗少陽嚴禁汗吐下而專事和解是少陽者陽氣衰少邪熱鬱於胸脇口苦咽乾目眩故也此所以三陽合病禁汗下也或曰三陽合病禁汗下則以何治之乎曰下後自汗出者主白虎湯據之則初見腹滿以下證者亦屬白虎湯證矣雖然本論舉諸證雜出及逆變而不處方者必有待證定之意是故後出其治方者多矣乃妄不可議之精究

通卷脈證治法則自然得證治協適焉。

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而譫語者。柯琴曰太陽證罷是全屬陽明矣先揭二陽併病者見未罷時便有可下之證今太陽一罷則種種皆下證下之則愈宜大承氣湯。

此就三陽合病不可汗下而論二陽併病太陽證罷者宜下之義也言二陽併病若太陽證不罷者不可下下之爲逆如此可少發汗今太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而譫語者陽明胃實之證具乃宜大承氣湯二陽併病於太陽篇則專云可發汗因今雖太陽證罷尚嫌未可下故曰下之則愈宜大承氣湯蓋太陽證罷則此但陽明故舉之於此篇太陽之發汗陽明之攻下相照以互明其義也。

陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重惡熱者惡寒之反言惡被覆熱物也脈浮而緊發熱汗出者雖不惡寒猶當未至惡熱而惡熱故曰反若發汗則躁心憒憒公對切反譫語憒憒心亂也發汗不徒無益反使之增譫語故曰反若加溫鍼必怵惕煩躁不得眠怵惕恐懼之貌若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者千金翼胎上有白字是也錢潢曰舌上胎當是邪初入裏胃邪未實其色猶未至於黃黑焦紫必是白中微黃耳梔子豉湯主之方

肥梔子十四枚擘　香豉四合綿裹

右二味。以水四升。煮梔子。取二升半。去滓。內豉。更煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得快吐者。止後服。

此與中篇所舉文少異也。今作快吐者非

若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。方此對上梔子豉湯證。更論下後之一證。故曰若

知母六兩　石膏一斤碎　甘草二兩炙　粳米六合　人參三兩

右五味。以水一斗。煮米熟湯成。去滓。溫服一升。日三服

若脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。方

此復舉下後一證。故曰若。玉函陽明病以下至猪苓湯主之。乃爲一章。今此以記方。故分爲三章也。

猪苓去皮　茯苓　澤瀉　阿膠　滑石碎各一兩

右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內阿膠烊消。溫服七合。日三服。千金翼作猪苓去黑皮

此章論陽明病。汗下溫鍼逆變。明治方也。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒反惡熱身重。是似三陽合病。然不惡寒反惡熱者。不外于陽明。故標曰陽明病。又與陽明中風脈證同。而不惡寒惡熱身重。則非中風證。今雖惡熱。未至潮熱譫語。可以知其未胃實也。因若發汗。則徒亡陽津

耗邪熱進實於胃正不勝邪乃致躁心憒憒譫語若加溫鍼亡陽殊甚邪氣暴動氣血爲火熱錯行必怵惕煩躁不得眠若下之則雖大邪除胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上白胎者餘邪逆鬱於胸中也乃梔子豉湯主之得微吐以去之矣若渴欲飲水口乾舌燥者徒裏液損耗而邪熱不除鬱結於心下而逼于胃之所致乃白虎加人參湯主之以解熱結潤燥渴矣若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者邪熱下及膀胱氣液不化水道爲之不得通暢水停故也乃猪苓湯主之以和氣液利小便矣此誤治變證分配于三焦而辨之所謂觀其脈證知犯何逆隨證治之之義也然而三陽合病及此章俱於下後之變證則悉論其治方於發汗溫鍼之變不言治法者何蓋以陽明病者主胃家實而專論下藥故也又按白虎加人參湯猪苓湯俱云渴欲飲水不可不詳辨焉蓋白虎加人參湯證者熱結在裏表裏俱熱口乾舌燥欲飲水數升猪苓湯證者脈浮發熱小便不利而不至口舌乾燥煩熱大渴此其所異也又猪苓湯大類似五苓散證而最難分別矣五苓散云脈浮小便不利微

熱消渴及煩渴是寒邪尚在表而微熱微惡寒者也故方後曰多飲煖水汗出愈猪苓湯者邪熱滾滾雖脈浮發熱不惡寒小便不利更甚故次章建以汗多胃中燥猪苓湯利其小便之戒矣是故五苓散於太陽篇專論之猪苓湯始舉於此也

陽明病汗出多而渴者自前陽明病其人多汗來言胃中燥而渴者也不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

此就前章猪苓湯證之渴欲飲水申明雖渴不可與猪苓湯者也靈樞五癃津液別云水穀入于口輸于腸胃其液別爲五矣天寒衣薄則爲溺與氣天熱衣厚則爲汗悲哀氣并則爲泣中熱胃緩則爲唾邪氣內逆則氣爲之閉塞而不行不行則爲水脹是汗溺一液也今陽明病熱氣延漫津液越出汗多胃中燥而渴者或小便不利猶屬白虎加人參湯證矣猪苓湯者治渴欲飲水小便不利有停水者以利水爲之功因復與猪苓湯利其小便則更損耗津液而增燥渴故不可與也

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之方

甘草二兩炙 乾薑一兩半 附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫二服强

人可大附子一枚乾薑三兩

此對前章陽明病脈浮緊而舉脈浮而遲者蓋脈浮緊者邪熱在於表裏也今脈浮而遲者浮熱在於表遲寒在於裏也表熱者猶屬陽明而裏寒者非陽明證故單曰脈浮而遲即與前所謂陽明病脈遲亦自有所異焉脈浮表熱者按可知之裏寒者難得見以脈遲可知也故依脈法曰表熱裏寒今雖表熱下利清穀者裏寒既甚也仍四逆湯主之以專溫散裏寒矣裏寒下利清穀者固非陽明證然而揭出於此篇者脈浮表熱者所謂陽明中風發熱惡寒脈浮緊之類而似陽明邪熱尚盛於表宜發汗論曰陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈此脈遲裏寒下利清穀者不可發汗也論曰下利清穀不可攻表汗出必脹滿故特揭之於此以辨寒熱疑途且與脈浮緊邪熱盛於表裏者發汗則躁心憒憒反譫語相照示表裏俱熱者宜清解表熱裏寒者宜溫散也又此似少陰病下利清穀裏寒外熱通脈四逆湯證然脈浮者表熱乃非少陰裏寒專者故不曰外熱而曰表熱也方有執曰此疑三陰篇錯簡非是

若胃中虛冷。不能食者。飲水則噦。

此卽前章脈遲裏寒。而更明若胃中虛冷。不能食者。飲水則發噦。且對燥屎在胃中。不能食者。辨虛實也。夫胃氣壯。則穀消而水化。胃中虛冷。則穀不消而不能食。旣不能食者。飲水則水亦不化。水寒相得。胃氣阻隔。逆乃噦也。

脈浮發熱。口乾鼻燥。能食者則衄。能食與前章不能食反對。而示胃中無虛冷。及燥屎之患。非言因能食而致衄也。

此亦卽前章脈浮表熱。而更明脈浮發熱。口乾鼻燥。能食者。則發衄也。邪氣盛鬱於肌肉及裏。而經氣熱。口乾鼻燥。能食者。則血爲熱沸逆乃衄也。二章。言唯裏寒之變。則至噦。唯表熱之變。則至衄。故亦單曰若胃中虛冷。曰脈浮發熱。卽表熱裏寒之餘論。

陽明病下之。其外有熱。手足溫。不結胸。心中懊憹。飢不能食。但頭汗出者。梔子豉湯主之。

此承陽明病。脈浮而緊章下云。梔子豉湯證。且對胃中燥屎。胃中虛冷。不能食。更明飢不能食者。而起下邪熱鬱於胸脇。小柴胡湯證。故舉之於玆也。言陽明病。邪熱在表裏者。下之。表熱乘虛盡內陷。

心下因鞕則爲結胸大陷胸湯主之今其外有熱手足溫者熱氣伏不表發而又不內陷乃不結胸心中懊憹飢不能食但頭汗出者是因下大邪去胃中空虛客氣動膈餘邪鬱於胸中之所致仍梔子豉湯主之

陽明病發潮熱大便溏小便自可王宇泰曰陽明爲病胃家實也今大便溏而言陽明病者謂有陽明外證身熱汗出不惡寒反惡熱也胸脇滿不去者與小柴胡湯方

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 半夏半升洗 甘草三兩炙 生薑三兩切 大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煑取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

此承前章陽明病潮熱大便微鞕者可與天承氣湯不鞕者不可與之而論之也陽明病發潮熱爲胃實大便鞕而小便數今大便溏小便自可者是其人以腹中有瘀水乃爲邪熱被壓下故使不爲燥結也即大便初頭鞕後必溏不可攻之甚也邪熱不結實漸從大小便除者則胸脇滿亦應去而不去者邪熱鬱於胸脇之甚也因知潮熱者胸脇鬱熱之所致仍與小柴胡湯以治之矣即傷寒十

三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱。此本柴胡證之類也。

陽明病。脇下鞕滿。不大便而嘔。（不大便。對前大便溏。而言也。邪氣在於脇下鞕滿。不大便者。毒氣逆而嘔。故曰不大便而嘔上）舌上白胎者。可與小柴胡湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濈然汗出而解。（可見梔子豉湯舌上白胎同。然其病毒所在之證異。則治方亦隨異矣）

此承前章。而更論此一證也。言陽明病。脇下鞕滿。不大便而嘔。此亦似應攻下。而舌上白胎者。非邪熱實胃。尚在於胸脇。而氣液蒸騰。不降之所致。仍與小柴胡湯。胸脇鬱結開散。則上焦精微之氣得通。津液得下。胃氣因和。邪熱忽發於外。身濈然汗出而解也。所謂與柴胡湯。必蒸蒸振。卻發熱汗出而解。與此粗同。而此陽明。故解以濈然汗矣。

陽明中風。脈弦浮大。而短氣。腹都滿。（謂通腹滿也。此腹滿至甚也）脇下及心痛。（邪氣結於脇下。痛及心也）久按之氣不通。（久按之。腹氣不通也）鼻乾不得汗。（陽明中風。法當汗出。而不得汗也。論曰。汗出譫語者。以有燥屎在胃中。此爲風也。可以證）嗜臥。一身及目悉黃。小便難。（玉函。目上有面字。是嗜臥者。外已解也。）有潮熱。（發熱變潮熱。至此外解而不惡寒。可推知矣）時時噦。（腹氣不通故也）耳前後腫。刺之少差。（是由鼻乾不得汗發也。少差。言腫減也。刺法爲救其急。兼施也。即太陽病。初服桂枝湯。反煩不解者。先刺風池風府之類。

按以上證治方屬茵蔯蒿湯此爲後論發黃之地

外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯

外者謂邪氣在外乃往來寒熱等證不解也續浮言雖過十日脈不變仍弦浮大也而今略但舉浮者欲專示外不解也以下文云但浮可見矣

脈但浮無餘證者與麻黃湯

脈但浮者病專在於外乃發熱惡寒也無餘證謂無上文所舉之裏證也是以陽明中風其脈證不變者言也

若不尿腹滿加噦者不治

不尿小便極不通之謂即小便難之甚也加噦時時噦之增劇也若以下是此餘波成無已曰若不尿腹滿加噦者關格之疾也故云不治難經曰關格者不得盡其命而死

麻黃三兩去節　桂枝二兩去皮　甘草一兩炙　杏仁七十箇去皮尖　麻黃湯方

右四味以水九升煑麻黃減二升去白沫內諸藥煑取二升半去滓溫服八合覆取微似汗

此承前章陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮緊而辨其邪氣既犯於裏者外不解者邪專在於外者之變脈證論治方也脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫者邪氣既犯於裏三焦閉塞而氣不通熱瘀鬱而不能發越逆流注於經脈其所過血液凝結之所致乃刺之氣瀉則腫少差也此亦雖潮熱不至胃家實也外不解病過十日脈續弦浮大者邪氣半在裏半在外也故與小柴胡湯以解胸脇鬱結則上焦

得通。津液得下。胃氣因和。中下二焦之氣。亦隨通。身濈然汗出。小便利而愈。又雖過十日。脈不弦大。但浮。無餘證者。邪氣仍專在外也。故與麻黃湯。以發汗則愈。是以中風者。邪氣淺緩。鬱熱速表達。故於陽明亦然矣。若經日之間。不得其治之宜。精氣衰。邪氣益進。三焦遏絕。而胃氣逆。不尿腹滿。加噦者。邪勝正。故爲不治也。此舉小柴胡湯。以總結自三陽合病以下。邪氣在於裏。未至胃實。及尚兼表之數章焉。舉麻黃湯。以爲後論可發汗者之根基也。又按此與太陽病十日以去章粗同意。宜併考。