



明中武
第 399
卷 1

文茂

瘍科 疔毒 卷之上 目次

瘡疽本原一

脉之所主症三

陰症陽症三

五善七惡四

瘡疽癰腫証候七

瘡逆頰五

形色五

瘡腫虛寒六

辨膿八

生死形色七

內消之法七

瘡疔灸法八

止痛法十

用針法九

漏潰法九

貼藥法九

藥方十一

潰瘍雜症十三

太府肉十

竹筒吸毒十一

疔瘡十二

脫疽二十六

腦疽十九

鬚疽二十一

時毒三十八

癰疽三十九

癰癰二十八

咽喉三十二

乳疔四十五

附骨疽四十九

肺癰四十一

流注四十三

卷之中 目次

腸癰 五十四

臟毒 五十六

諸痔 五十八

下疳 六十八



卷之下 目次

魚口便毒 七十一
楊梅瘡 七十六
傷寒發頤 八十四
鶴口瘡 八十六
翻花瘡 八十八
鼻痔 九十一
腦漏 九十七
跌撲 百一
甲疽 百五
頭痛 百七
鵝掌風 百九
血風瘡 百十三
豐癩 七十二
結毒 七十九
痼癩 八十四
龍泉痘虎鬚毒 七十七
大麻風 八十九
骨槽風 九十一
破傷風 九十八
懸癩 七十四
多骨疽 八十二
瘰癧 八十五
紫白癩風 九十二
疥癬 百四
疥癬 百六
虱血 頁
疥瘡 百十
膿窠瘡 百十五
杖瘡 百四
疥癬 百六
虱血 頁
疥瘡 百十
膿窠瘡 百十五
湯灑火傷 百四
天蛇毒 百七
血箭血痣 頁
癩瘡腎臟風 百十二
凍風 百十五

火丹 百十六
雀班 百十九
漆瘡 百二十一
疥泡 百二十三
鈕口風 百二十六
眼丹 百二十七
體元 百二十八
小兒遺毒 百三十
走馬疔 百三十三
痘癩 百三十七
臭田螺 百三十八
腹痛 百三十九
銅鉄骨癩 百四十一
天泡 百十六
油風 百十九
竹木刺 百二十一
癩風 百二十三
蛀丸搖 百二十六
手足破裂 百二十七
白禿 百二十九
蜂蝎串 百三十一
重舌木 百三十五
痘疔 百三十七
牛程躩 百三十九
陰虱 百三十九
落下頭 百四十一
肺風粉刺酒查鼻 頁
白屑風 百十九
瘰癧 百二十二
咬傷 百二十四
枯筋筋前 百二十六
黑子 百二十七
奶癬 百二十九
痘風瘡 百三十一
胎癩 百三十三
黃水瘡 百三十八
僵螂蛀 百三十九
葡萄疫 百四十一
自刎斷喉 百四十三
耳病 百三十四
疥癩 百三十三
女人面生黑班 百三十六
婦人脚了 百三十七
眼胞菌毒 百三十七
小兒軟癩 百三十九
赤遊丹 百三十三
鵝口 百三十三
大人破 百三十八
田螺泡 百三十九
百虫入耳 百四十一
陰毒 百四十二

易キノ症ナリ

痕沮ナリ陰トス五臟ニ屬ス毒内ニ攻ム其毒花受後ニ患ル所モ亦深沉ナリ病源陰
分ノ中ニ稟ルニ因ル蓋シ陰興重濁ニノ性質多ク沉ム故ニ筋ヲ傷リ骨ヲ蝕ス治シ難キニ症
ナリ凡人年壯ニテ元氣毒勝ツトキ煩ニ年老ニテ毒血元氣勝ツトキ險ナリ

憂愁思怒悲心敬馬喜此七情ト云耳眼鼻口心身ノ欲所此ラニ慾ト云七情ニ慾
皆人ノ元氣ヲ盜ラ賊ナリ人能ク此陳ナルモノ多ク安ク多ク寿ナラト云ナシ人若シ此ニ親キ
者損有リ傷アラト云ナシ但人能ク之ヲ味フテ鮮ナシ蓋シ情慾ノ動作好メト云ナ
ク為スト云ナシ故ニ喜テハ心ヲ傷リ怒テハ肝ヲ傷リ憂テハ肺ヲ傷リ思テハ脾ヲ傷リ悲テハ魂
魄ヲ傷リ恐テハ腎ヲ傷リ敬馬テ胆ヲ傷リ類皆人ノ身ノ元氣ヲ耗ス此崩壞ナリ耳ノ声
音ヲ聞キ眼ノ物色ヲ觀鼻ニ香氣ヲ聞キ舌ニ滋味ヲ食リ心大地ヲ惟シ意萬方ヲ懼スノ
類皆人ノ三世鍾靈ノ真性ヲ損ナリ所以ニ苦ヲ為シ疾ヲ為シ夭ヲ為シ疾ヲ為シ以テ休廢
衰敗ノ諸病諸瘡及ニ尺ノ皆此等ノ情慾ヨリ出ルナリ醫者モ亦宜ク慎テ
之ヲ察スヘシ

風寒暑湿燥火此六淫ト云凡ハ四時不正浩蕩肅殺ノ氣タリ最モ能ク人中

ノ寒ニ乃チ節候調マ疾凡暴雨氷雪ノ嚴寒ニ傷テ暑ニ凡陽酷日燥火流金
湿熱薰蒸ニ因テ中ニ濕久陰魚湿地ニ坐臥ニ因リ或身臨汎雨潮氣侵ラレ
燥陰虛内熱津液ヲ消燦ノ臟腑ヲ滋潤セテ能ク以テ皮膚枯槁便燥ク燥
ト云火心緒煩擾ニ醇酒膏粱房慾禁セメ動在所ヨリ生ス此六淫皆外ヨリシテ
入ル体実ハ過テ中ニ生ラレ者アリ体弱ハ人感メ隨テ發ル者多シ又感スルノ有テ邪
氣臟腑ニ客トシ經絡關節内ニ留リ積聚日久或内傷ヲ待テ或外邪ニ感スルニ
因テ解テ發ス又醇酒肥鮮炙博膏粱燥熱ノ物ヲ食テ其爽口快心ヲ取テ其陰
ヲ消シ臟ヲ燥スヲ顧ス又寢妄前滿テ精神飛騰シ温狀厚被爐火ヲ圍西シ毎
ホク饑ニナル先ツ食シ未ダ冷ナル先ツ暖衣シ意ヲ快シ心ニ從テ色力大過シ積及テ有レハ
便手陽興スノ葉ヲ服シ唯一時ノ快意ヲ取リ陰平ヨリ消スルヲ覺ス況ヤ此病膏粱
起リテ於藜藿起ラレテ知ヤ故ニ五臟年衰ニハ腑調ヲ云謂テ五臟和セテ六腑
通テハ腑通セテ九竅疲癯テ九竅疲癯テハ留結ノ瘕ト云蓋シ瘕瘕臟腑ノ

西
論

無憂之出閑竅宣通不引ヲ得スシテ發也治寒邪當痛者温瘧ヲ以テ故シ温腫
ヲ強痛不者滲ヲ導テ探擣掌痛スル者之ヲ滋潤ス虚ノ痛者之ヲ補テ實ノ痛モ
之ヲ浮ス泄シテ痛者之ヲ温メ塞テ痛者之ヲ通シ膿脹ヲ痛者之ヲ開テ惡肉侵蝕
スル者之ヲ去ル此ヲ活法トス

凡瘰癧心上ニ發ス多ク險ナリ心已下ニ發ス煩多シ蓋心肝脾肺四臟皆背係ル惟
腎臟ノ下ニ居テ子居テ孫居テ其精華津液元神尽ク灌既ニ行ツテ上ニ榮注
故四臟ノ火皆臟ノ水ヲ頼テ以テ之ヲ濟フ故五臟ノ根本皆背ニ係ル瘰癧瘰癧
ル者未タ先ツ五臟ヲ傷テ後ニ發ス者有テ况ヤ背太陽經ナリ太陽六經ノ首
領ナリ督脈十二經絡ノ統脈ナリ所以ニ瘰癧背ニ發ス者險ナリ心已下ニ居テ
若シ對ノ發ス時ハ多ク危險難治ノ症ト心已下ハ腎ノ俞ヲ除テ外皆後シトス腑
下ニ有リ經モ亦多ク下ニ屬ス且氣表ヲ主故六腑ニ發スモノヲ輕トス

凡瘰癧慢腫治シ難シ焮腫治シ易シ慢腫肉腫治シ難シ瘰癧焮腫瘰癧腫
肉腫此二者瘰癧陰陽大體逆順末節ナリ瘰癧ノ初起ハ理當ニ升發ス

ハ潰膿ノ後内消ヲ用可シ托茶ヲ用ヘシ如シ不應者毒氣血勝ツ危シ已發出
ノ腐潰臭根脚堅硬或軟ノ故ナルモノ急ニ托茶ヲ投テ大脾胃ヲ補フシ不應
者ハ死ス已ニ潰テ色蒼赤紅活テ肌ヲ生ス收斂シ瘡口ノ暈大腫痛減ス胃氣
回ラス急ニ須ク峻補ス應ニ得ルモノハ脾崩ル乃チ外ス

脉之所主病証

凡諸浮數ノ脉當ニ發熱スヘシ其發熱セシテ及テ洒淅惡寒シ若痛處有ハ必瘰
瘰ヲ發ス脉浮ヲ數ノ數身體熱ナリ形嘿々ト胸中微燥テ痛ノ在所ヲ知テ其
人必ス瘰癧瘰ヲ發シ●脉洪大者瘰癧ノ病進ナリ如シ瘰癧結膿未タテ者
ハ宜ク之ヲ下ス●膿潰ノ後脉洪大ヲ見テハ治シ難シ若自利テ者救テ可ス●滑
虛トス●脉數不時見ル寸口無シ瘰癧ヲ生テ諸瘰癧脉洪數者裏膿結有シ●
散脉膿潰ノ後煩痛ノ尚未タ全ク瘰癧退ス底故ナル正氣虚シ邪氣實治
シ難シ肢體沉重テハ散死ス●乳脉ハ血虚失血トス膿潰ノ後ハ治シ易シ脉病相應

入以テ也 ● 牢脉療癰結腫内消スヘカラス ● 以系脉痛ヲ主 ● 弦亦痛ヲ主
 トル ● 実脉久病虚人ハ最モ心ム ● 長脉百病愈易シ ● 濇脉潰後ハ妨ケシ
 ● 短脉ハ胃ノ氣ナシトス百病治シ難シ ● 微脉ハ毒甚痛甚者危シ潰後順
 ナリ ● 遲脉ハ正氣備ル潰後順ナリ ● 脉細沈者裏虚ス変症ヲ生シトス ● 脉
 緩潰後愈易シ脉病相應 ● 伏脉ハ邪氣益深シ ● 虚脉ハ血虚陽氣不足也
 托裏シ氣ヲ和シ養血スヘシ ● 軟脉ハ胃氣弱シ虚ヲ補ヒ膿ヲ排テ裏ヲ托スシ ● 弱脉
 益氣虚形精不足ト托裏スシ ● 促脉ハ血補ヘシ寒ヲ下スヘシ ● 結脉ハ温ムシ虚甚ナリ
 ハ治シ難シ ● 代脉ハ不治

癰疽陰疔陽症

癰疽ハ上中下ヲ論セス陰陽ヲ察スヘシ發背モ正偏アリト虫疔高低ヲ看ヘシ此陽ノ初
 起ハ身熱惡風瘡項高ク突起シ焮赤根脚アリ七日ノ後焮痛多ク二七日ノ後
 膿漸ク成リ動息自ラ寧マテ食味ヲ知リ二便調ヒ腫消膿潰テ精神爽カ
 膚肉脱シ新肌生シ痛膿隨テ減ス此陽症トス治シ易シ ● 初起テ瘡ヲ知マ粟

粒ヲ生ノ紅チラス痛マ熱少ク焮少ク腫起ハ隄防ナリ七日ノ後身体倦シ瘡根平大ナ
 頂高カラス色光カラス腐テ穢カラス陷軟メ膿ナク脉浮故大細飲食進マ振寒戰慄
 精神昏憤瘡上ニ衣ヲ生メ甲ヲ脱ク如ク孔中ニ子ヲ結ヒシ方ヲ合ヒ似テ膿多ク
 臭微アリ舉動懶ク嚙睡多ク音奄瀉リ言語弱ク面色青黃瘡形紫黒
 痰喘口乾燥ス是ヲ陰症トス多ク死ス

五善七惡

精神爽カニ言清ノ舌潤チ鮮カニ瘡痛チ腫リ醒メ安ク口渴スヘシ善ナリ ● 身輕
 坐起平康ナルニ善ナリ ● 膿潰テ腫消シ水鮮シノ臭カラス飲食味ヲ知ルニ善
 ナリ ● 声音清ク二便調フ四善ナリ ● 瘡勢高ク起リテ根脚アリ寒熱膿隨
 テ減ス五ノ善ナリ ● 一本ニ動息自ラ寧マテ食味ヲ知ルニ善ナリ ● 便利調勻ニ
 ノ善ナリ ● 膿潰腫消シ水鮮シノ臭カラスニ善ナリ ● 神彩精明語声清亮四善ニ
 ● 体氣平和ル五ノ善ニ是簡ニメ尽スト謂ヒシ
 一本ニテ飲食常ノ如クノ善ナリ ● 實熱ニテ大便濇ニ善ニ ● 内外病相應ニ善

ナリ ● 肌肉好悪分明四善ナリ ● 用藥料所如キ五善ナリ

煩躁シ時嗽シ腹痛ノ渴甚ク或泄利度ナク或小便淋ノ如ク一悪ナリ ● 膿血既洩

シ腫嫩尤甚ク膿色敗臭シ痛近ク可ク二悪ニ ● 目不正視黒睛緊小白睛青赤

腫子トク看ルニ三悪ニ ● 喘震短気恍惚嗜臥四悪ナリ ● 肩背便ナラズ四肢沈重

ナ五悪ナリ ● 食ラ下ク能ワズ茶ヲ服シテ吐シ食味ヲ知ラズ六悪ナリ ● 声嘶シ

色敗レ唇鼻青赤面目四肢浮腫五七悪ナリ

一ホ云ク渴ヲ吞シ喘シ眼角鼻向巨大小便反テ滑九ノ悪ナリ ● 元綿々トシ脉濡病

ト相反スニ悪ニ ● 明内ニ陷ルニ三悪ナリ ● ホク潰内黒ノ陷ル四悪ナリ ● 乙潰青

黒ニ腐レ筋骨黒キ五悪ナリ ● 疥癩六悪ナリ ● 吐吐七ノ悪ナリ

存徳之云ク夫レ瘡疽ノ証候善悪逆從辨ズル可ク從未瘡ヲ医ル既チ五善七悪

ヲ考ク殊ニ知ラス此特ニ謂テ腸胃内藏府瘡疽ヲ論テ所ノ証ナリ疥背腦疽別ニ

善悪ノ証ナリ痲疹証ニ七悪ヲ合テ皮急緊ニ善ノ如ク九者アリ痲疹証五善ヲ合テ皮

緩虚ニ悪ノ如ク十者アリ夫レ是ノ如キ者宜淺識ノ知ル所ナラヤ口五善併ニ至テヲ知

守ハ善以テ加フナシ七悪併ニ至テハ極ナリ愚意ニ之ヲ裁ル凡瘡疽ヲ患シ

時五善内ナク一二見六瘡モ亦同ス七悪中忽チ一二見六深懼ル宜シ大抵証候

瘡疽ノ発虚中ニ悪症ヲ見テ救フ可ク實証悪候者自ラ愈シ天凡膿潰後ヲ煩

疼ノ尚ホ々疼ル者其脉ヲ診スニ洪滑麤故ル者瘡難シ微瀼遲緩ナル者瘡イ

易シ此ハ善悪ノ証診候中於テ亦知シ疥背腦疽及諸悪瘡別ニ五逆ノ症アル者ハ白

睛青黒ノ眼小ハ茶ヲ服メ吐シ傷痛ノ渴甚ク膊頰中便ナラズ音嘶シ色敗皆五

五逆ト具録ス熱渴痢吐蓋シ毒元重裏ニ六藏府ノ傷ナリ

瘡疽深淺

大凡瘡疽生テ右此皆黍粟粒許大ナリ如シ其形至微ナリ人多ク以テ急トセ此大患

ヲ急速ニ辨ス宜シ若シ能ク之ヲ未形ニ防キ未成理ハ必シモ危困無シ若シ稍慢ノ忽チ痛

医詢膿血ヲ結聚セシムルヲ未テ斃待テ而シ瘡腫多端ナリト云ハ淺深ヲ辨セテヲ

欲ス既チ瘡テ三種アリ高ノ軟ル者血脈ヲ壅下クノ堅者ハ筋骨ヲ壅ス肉皮色相辨ル

此者ハ骨隨ヲ壅ス又云ク手ヲ以テ按揺スル根深而大者ハ根小ニ浮ル者ハ淺シ又其人ヲ

驗之 初ノ瘡ヲ生スル時壯熱惡寒拘急頭痛スルヲ覺テ精神安カズ煩躁ノ冷ヲ
飲者必深シ若シ起居平和飲食故ノ如ク其瘡必淺シ
或云ク大ニ按ノ痛ハ深シ小ニ按テ痛ハ淺シ

瘡疽逆順

初起頂高根活色赤赤熱焮腫疼痛白漸高腫者順ナリ已成焮痛皮薄光
亮ノ飲食如常ニ便調和ノ身温ナル者順ナリ己潰テ膿稠ニ色鮮ニ自ク腐肉自脱
ハ嫩腫ハ消シ易シ身輕者順ナリ潰テ後膿厚ク稠黃ハ新肉生シ易シ瘡口斂リ易
シ飲食漸ク進者順ナリ初起頂平根散ノ色暗ク微腫ノ瘡ハ瘡身休倦息ス
ル者逆ナリ已成腫ニ堅ク色紫ニ膿ヲ作カス腐潰ニ惟口乾ヲ煩躁多者ハ逆ナリ
己潰テ皮爛ハ肉堅ノ腐ハ腫レ仍消ス痛仍減ス心煩ス者逆ナリ潰後膿水清稀
ヲ腐肉脱テ血ニ新肉生セズ色敗テ臭穢ナル者逆ス

形色逆順

凡人ノ瘡ヲ看テ兼テ其形色ヲ視テ後脈ト病ト相多クテ始テ知テ以テ終テ決テ一失
ナシ陰病陽色ヲ見ニ腮頰ニ紅ヲ猷ニ陽病陰色ヲ見テ指甲ニ青ヲ呈ス此者俱ニ危シ又身
熱脈細唇吻反青目珠直視者死ニ面脂ニ赤カ如ク色ヲ黃ナル者油膩黒氣ハ
ツテ塗抹カカ如ク者ハ死ニ唇舌乾焦テ鼻ニ烟煤ヲ生シ眼神透露者ハ死ニ形容憔悴
精神昏短身形縮小者ハ死ニ端鹿角短鼻樑睛露者ハ死ニ語言謔者ハ死ニ循
衣摸床遺尿失禁撮空者死ニ頭低ニ項軟者眼視神無ク吸々ト短氣者死ニ
皮破血無肉綻ヲ爛斑ニ麻木ノ痛痒ヲ知ラズル者ハ死ニ色黃豆ア如ク唇白ツ反
テ理紋ナク耳黒ク枯焦ヲ聽ク人ニ中縮ツ坦平口張リ氣出テ回閉テ臭ハ鼻爛相隨
呼吸汗出テ珠ノ如ク散ス痰膠ノ如ク堅凝シ指甲青帯ニ神昏ニ神浮ニ神乱ニ神離ニ
留衣滿面ニ生シ黒氣天庭ニ慘々リ此皆死ス

瘡腫虛實

丈瘡疽膿潰腫毒浸展証候危惡者ハ虛實ヲ辨ヘク虚スル者補ニ難ク實スル者ハ
泻ニ易ク補泻ノ法輕々シテ用テ可ク若クシテ差カテハ利害甚大ナリ而シテ虚實ノ証多
端辨ズル可ク瘡ハ虚實有リ藏府氣血上下有リ真邪各虚實有リ分ツテ之ヲ

言子腫起ツテ望硬膿稠ナル者瘡疽実ナリ腫下キク軟慢膿稀ナル者瘡疽ノ虚ニ
深刺腸鳴ノ飲食入マズ吐時ナリキ足並冷ニ脉弱ニ皮寒ニ小便自利ニ或小便時
難ク大便滑利ニ声音出ス精神爽カラス此藏府ノ虚ナリ大便硬ク小便渋リ飲食
故ノ如ク腸滿膨脹シ胃膈痞悶股ノ誤字股節疼痛ノ口苦咽乾ニ煩躁ノ多ク渴シ身
熱脉大精神昏塞者藏府ノ実ナリ凡諸瘡疽膿水清稀ニ瘡口唇聚々腫赤
クニ肌寒ニ肉冷ニ自汗ニ色脱スル者元氣虚ナリ腫起テ色赤ク寒熱疼痛皮膚腫壯
熱膿水稠粘シ頭目昏重ナル者元氣実ナリ頭痛鼻塞リ目赤心驚ニ咽喉不利
口舌瘡ヲ生ス煩渴ノ冷ヲ飲ニ睡語ヲ咬ハ上実ナリ精滑ノ滯マズ大便自利ニ腰脚沉重
ニ睡臥ノ寧カラル者下虚ナリ肩項便ナラズ四肢沉重ニ目不正ヲ視テ睛了了タズ食味
シ知ス音嘶ニ色敗シ四肢浮腫スル者眞氣ノ虚ナリ腫焮尤甚シク痛ニ逆カラス積日潰
ハ又寒熱往来ニ大便秘澁ニ小便淋ノ如ク心神煩悶恍惚心忪カキル者邪氣ノ実ナリ眞
氣集マシテ虚ニ邪克勝マシテ実ス諸痛ヲ實トシ痒キト虚トス其脉ヲ診テ無大ニ數
ナル者実ナリ微細ニ軟ル者虚ナリ虚ニ補ハ其元氣ヲ和シ托裏ス実ニ寸之ヲ浮シ疎
利ノ自具其元氣ヲ導ヒク

瘡疽癰腫証候

夫瘡疽癰腫其名甚多トト虫凡其要ヲ知シ熱皮膚ノ間ニ發シ是ヲ以テ浮腫ニ根小ナリ大
ニ至リ二三寸過ナル瘡ナリ六府熱ヲ積シ外肌肉ノ間騰リ出ス其發スニ暴且腫ニ皮
光軟ニ侵シ展ルテ廣大ナル者瘡ナリ五藏風積ニ熱肌骨ヲ攻焮ニ凡毒猛ニ暴ニ初テ
顔ヲ生ス瘡癰ノ如ク白ノ焦枯ス之觸テ心應ス者瘡ナリ瘡六府熱ヲ燦原ノ次若
シ外膏肉ヲ潰ス瘡五藏ヨリ生シ沈澁ノ瘡ニ難シ陶室ノ燧ノ如シ内骨髓ヲ消ス瘡療
シ易ク瘡難シ遲ク瘡ニ瘡療シ難ク瘡復スナラ得易シ瘡癰初テ生ハ並ニ灸スニ
其元本浮ニ違ハ其熱ヲ導キ速暢シテ瘡始シタル宜ク其元本深沈ハ其原ニ
違ハ須ク凡瘡瘡外ニ生スル者皆熱毒内ニ蘊ニ由ル腫毒丹癰ノ類ヲ以テ推テ奇ニ蓋シ
皮膚微シ高ク起テ肌厚ク或痛ニ或痒ク移リ走テ常ナキ者之ヲ腫ト謂フ凡因テ得
生者腫硬ク色白シ熱因テ得ル者腫焮色赤シ熱相搏因テ之ヲ得ル者久クテ消セラハ
熱風ニ勝テ若シ即治シテハ血流通セズ元氣ト之ニ乗ノ以テ膿ト成ル又丹毒ト謂フ者有リ

人身忽然トノ憂シ赤ノ丹ヲ塗方如シ世俗赤瘡ト云ラ瘡有ル因テ誤リ相觸ク四畔嫩赤
ス之ヲ瘡瘤ト云丹瘤ノ証皆遊走ノ定ヌ状ヲ云亮ノ如シ小兒之ヲ得ハ最モ百日内ヲ心ム
之ヲ胎瘤ト謂フ其氣血嫩弱藏府柔脆尤ヲ以テ錦針ニ倍難シ又頸脈ノ間ヲ結核ヲ
生シ初テ豆粒ノ如ク或梅李子核ノ如ク與系々相連リ歷々トシ三五枚久々ノ消ス以テ漸
ク長大或ハ寒熱ヲ發シ之ヲ瘰癧ト云凡毒ハ得熱毒ハ熱得氣毒ハ氣得比白
凡瘡ノ邪氣経ニ盛ム由テ成ル

生成形症

肉腫レテ瘡腫ケルハ必ス危症ヲ生ス膿穢ニノ食ヲ進メテ泄泻スル或ハ瘡色猪肝ノ此赤カ
如ク膿ナキ或ハ綿ノ如ク潰レ腐爛具仰キ臥ノ疼ヲ知テ危シ根故瘡平塌シ笑裏ニ淚ヲ
生スル或ハ脊潰レ内膿ニ透ル者ハ或ハ肝前已上ホク潰ス内ニ陷リ面青ク唇黒ク便汚ルモ
ノ藏壞ノ疾血ヲ便スルハ必ス喉ヲ潰ス者ハ或ハ陰患腹ニ者治メ囊ニ石モ治メ腎深キ數
寸ニ者治メ腫後寸三分ニ者ハ銳毒ト名ク亦治ニス

内消之法

瘡瘡ノ生スル内者外有リ内ハ藏府胃腹中ニ生シ外ハ膚肉筋骨表ニ生ス其本ハ氣血
滯滯メ流レハ蒸氣外達スレテ能ク内熱ト九若初テ氣血滯滯シ皮肉結聚腫テ未
潰者等内者セハ凡瘡ヲ疎滌シ藏府ヲ通利ス牛一二行九ノ内ニ穿ス守温極テ劑ニ血ヲ
和ス次々湯ヲ漏漬シ内ヲ消スルヲ得如シ其氣已結聚セハ内消ヲ論スカニ桃膿托
裏ノ藥ヲ用宜シ

瘡疽灸法

凡瘡ノ初メ起ル惟頂以上ヲ除テ餘皆艾火ヲ用テ瘡勢ノ大小ニ隨テ灸ヌ初メ已結シ未ダ結セ
ズ赤ク熱シ腫痛セハ先濕紙ヲ以テ其上ニ覆テ立トヨシ其紙ヲ視候先乾ク處即是レ瘡
頭ヲ結テ處ナリ大蒜ヲ切テ片ヲ成シ三々錢ノ厚サノ如ク頭上ニ置テ艾炷ヲ着ク灸三壯蒜
片ヲ換ヘ初メ灸シテ痛ヲ覺ハ痛大ノ痒ニ似タ度トス初メ灸シテ痛カハ痛ヲ知ル度トス
初メ灸シテ全然トノ痛痒ヲ覺ヌハ蒜ヲ去リテ明カニ灸ヌ可シ大瘡日數多者或ハ數頭
ニ處ニル者ハ大蒜ヲ搗テ膏トシ餅子トナシ瘡頭ニ鋪テ艾ヲ聚メテ之ヲ燒ク必痛ヲ知ル
ヲ度トス若ハ背ノ上初テ赤腫ヲ灸内ニ粒有テ黃ナルハ西藥ノ如ク若ハ即蒜片ヲ用テ前

灸法ノ如クス次日ニ施ラ去テ自潰ニ此火先重ニ入ラテ痛ヲ知ラ深キ處ニ是好肉リ蓋ニ
艾火ノ爵毒ヲ拔引ノ瘡處ヲ透通ニ再^丹毒ヲノ路有テ外ニ発セシム誠ニ瘡科首飾第
一ノ法ナリ貴キトハ早ク灸セ有リ又禁灸ノ數症有リ考ヘ詳ニ頭ニ諸陽ノ首メ純陽無
陰ノ處凡瘡腫ヲ生シ元陽極ノ致ス所ナリ如シ再ニ艾灸ヲ加毒元ヲ燬甚ナラシメ
テ隨ニ大腫ヲ加ハ内癢ヲ引動テ發セ必外ニ面ニ生ル疔毒ニ示然リ又腎俞ノ穴有リ内
腎係リ命ノ係所此穴ノ瘡瘡多ク房勞因テ腎水ヲ虧キ枯竭ニ成ル再ニ艾灸ヲ加
其源ヲ燥ノ内外乾涸ノ多ク黑陷ヲ成シ昏悶ノ成ス又元氣素ヨリ虛シ瘡瘡多ク高
腫多ク体倦息シ精神必短シ昏眩必浮散虛數ヲ鼓子ハ直氣無シ如シ灸火元
氣^二抵當^一昏憤ノ死ニ宜ク詳ニ可シ

辨膿法

夫瘡腫毒先已^二結^一者内消ヲ論スカス膿ノ生熟淺深ヲ辨スニ要ニ開クハ可ク否ヲ
視テ危殆ニ至ラレ凡ハ大^二按^一乃痛膿深シキ^二按^一ノ便痛膿淺シク^二按^一ノ甚痛凡者未ク
膿ニ成カス手ニ^二按^一上下^二按^一ナル者膿無シ^二按^一處陷テ復^二凡^一者膿無シ^二按^一處

即チ復スル者膿有リ復^二凡^一者消ス^二若^一按^二都^一テ牽強^二在^一者膿未ク^二按^一ノ半^二軟^一カレ
膿有リ若上下^二按^一ス^二甚^一者膿有リ其上^二薄皮^一剥起^二在^一者膿淺シ若^二腫^一ヲ^二發^一都^二テ^一輕^二ノ
痛^一凡者血^二溜^一テ^二腫^一テ^二日^一漸ク增長^二大^一按^二時^一牽痛^二在^一者氣^二壅^一ナリ久^二不^一消^二後^一亦膿^二凡^一

用針法

瘡瘍^二症毒^一先已^二成^一者托裏^二用^一テ其膿^二速^一ニ^二膿^一成者其生^二熟^一深淺ヲ驗^二針^一スヘ
シ膿^二生^一ノ^二針^一用^二ハ^一氣血既^二泄^一膿^二及^一テ成^二難^一若^二膿^一孰^二針^一セカレ^二腐潰^一益^二深^一瘡口
歛^二難^一シ若^二瘡^一深^二針^一淺^二ハ^一内膿出^二外^一血^二及^一テ泄^二若^一瘡淺^二針^一深^二カレ^一内膿出^二ト^一虫
ト良肉傷^二受^一若^二元氣^一虛弱^二先^一補^二後^一針^二其^一膿^二一^一出^二諸^一症自^二退^一若^二若^一
膿出^二及^一テ痛^二或^一煩躁^二吐^一逆^二皆^一胃^二元^一虧損^二急^一補^二ス^一若^二背^一瘡^二托^一毒^二燉^一
盛^二中央^一肉^二點^一ハ^二内^一托裏^二用^一脾胃^二壯^一シ^二外^一烏金膏^二用^一テ點^二瘡^一處^二注^一其^二赤^一處
漸ク高ク點^二處^一漸ク低ク^二七^一日^二至^一赤點^二界^一自^二裂^一紋^二有^一テ刀^二割^一カ^二如^一然^二肉^一
漸ク潰^二矢^一鉞^二針^一利^二用^一テ徐々^二之^一剪^二去^一其^二疼痛^一ヲ知^二鮮^一血^二見^一テ^二妙^一ト^二列^一裂^二紋^一
有^二ト^一余^二膿^一未^二流^一利^二及^一膿水^二出^一ト^二余^一膿^二仍^一痛^二此^一皆^二未^一内^二通^一也^二並^一針^二用^一テ^二中^一入^二之^一

引背脾間患肉腐膿出腫痛仍作此內毒筋有間膿膿未通也
元引引宜若元氣虛弱誤冠伐服患處痛或肉死急脾胃溫補
生先者有後純補藥用候久收斂之若方針用肉者血出守元氣附
元所無元氣愈虛元氣愈傷何以力肌生收斂也

漏漬法

瘡腫漏漬法表通行邪毒發散瘡之內消也宜蓋湯水為湯滌切有古人
謂右有瘡腫初生二三日經退去即湯水用淋射之須其膿在者漏漬
之腰腹在者淋射下部委曲在者浴漬此腫理之疎道之血脉通調凝滯
無之茶湯水中淨帛或紙綿以蘸之稍拭之漏之漸之稍冷守急
換冷用牛分血氣寒得守凝澁之熱得守淨澤之日五七次用之極甚者
日夜任數十數次腫消痛止身驗之瘡腫治之神良法也

貼茶法

若瘡腫初頭有者溫熱茶貼其熱毒引出火燥之就義ナリ四畔赤嫩
スル處寒茶貼其熱勢折伏邪惡驅逐火之撲ノ義ナリ膿潰後即肌ヲ
温肉生之膏茶其真腐逐之惡汁排之双肌之取之良肉生之ヲ要トス全ク温熱
膏劑力ヲ精ルナリ切寒涼ノ茶ヲ貼スル無之血脉ハ温ヲ喜テ寒ヲ惡ム冷氣
ヲ著テ治ラ過テ血滯ヲ痊難シ

止痛法

夫瘡瘻証候同方寒熱虛實皆能痛之為痛之止之法一端有之世人皆謂乳
沒珍貴之藥疼痛任之シト殊知之疾臨之宜制之自之方法有之熱毒內在之便
秘之痛内疎黃連湯之道之熱毒熾盛燉腫之痛ヲ為之黃連解毒散應之ハ
仙方活命飲之解之瘀血凝滯之痛乳香定痛散之和解之痛托裏消
毒散之排膿之痛ハ之針之膿潰之痛者之補之元氣因之痛ハ四君子湯之歸
芪之加血虛之痛ハ四物湯之芪之加氣寒之痛者ハ温散之皆止痛之法ナリ

生肌法

夫肌肉脾胃之所收斂元氣使之所但當脾胃月補之可之生肌之藥ヲ數ク

胃カス瘡肌ヲ生タセ色赤キ甚キ者血熱ナリ四物湯ニ山梔運亮加ラセ白ノ神農ハ
氣虛ナリ四君子湯ニ故茂ヲ加テ晡熱内熱陰血虛ナリ四物湯ニ參朮ヲ加テ膿水清稀
ナル者氣血虛ナリ十全大補湯食少體倦脾胃ノ虚ナリ補中益氣湯煩熱ノ渴ヲ
作シ食常ノ如ク田胃少ナリ竹葉黃芪湯應ニハ竹葉石羔湯熱渴ノ不便頻數
ハ胃水ノ虚ナリ加減ハ味丸肉去テ後ヲ新肉微赤ニ四物ノ白膜胃中ノ生ナリ但暑
子湯ヲ用テ培補スルニ不日ニ斂ニ若シ妄リ生肌ノ藥ヲ用ハ餘毒尽クニテ反ラ甚シ
クニ殊ニ知ラズ瘡瘡ノ作ルニ胃ノ氣ノ調ラレヨリ潰ルニ胃ノ氣ノ腐化ニ由リ斂ルハ
胃ノ氣ノ榮養スルニ由ルヲ●丹溪云ク瘡瘍ヲ治只當田胃ヲ助ケ氣ヲ壯テ根本ヲ
ニテ堅固ナラシムベシ

去腐肉

凡瘡瘍元氣壯ニテ守ハ成テ自ラ潰自ラ斂ル何ノ故肉ノ有シ若シ大痛ニ或ハ木痛ニ
或赤カラズ或内膿潰ス或外肉腐チタル乃チ元氣虛弱ナリ蒜艾ヲ用十全大補湯ヲ
服テ守陽氣壯ニ西畔即チ消シ瘡頭即チ腐毒自ラ解ス何ノ針割ヲ待テ若飲食

思テ少ク六六君子湯ヲ用テ榮氣壯ニ六肌肉毒ヲ受者自ラ活シ己ニ死ス者自カラ
潰己ニ潰ル者自ラ斂ル若初起尅伐ニ因リ或房室ヲ犯タセ黯ニ痛チテ致ス者
陽氣脫陷ノ變ノ陰在トナル急ニ參附ヲ用テ温補ノ陽ヲ向ヘズニ亦生ク可キナリ

竹筒吸毒

瘡背己ニ成テ潰トタル膿毒外ニ乾テテ得必ニ内攻ヲ致シ煩燥ノ重キト石ヲ負ルカ如ク
此法ニ毒氣ヲ拔提スルニ非ス出シガタ●預カシメ瘡口一寸三分ノ新鮮嫩竹一段長ク七
寸分リタルヲ用ヘ頭ニ節ヲ留メカヲ以テ外ノ青皮ヲ剝リ去リ内白ニ半ヲ留メテ約
厚ク一分ガリ節ニ瘡ノ小孔ヲ鑽リ木條ヲ以テ緊ク塞キ茶味ヲ筒内ニ入筒白ヲ以テ
以テ塞キ筒ヲ將ツ横ニ鍋内ニ放テ物ヲ以テ厭ツテ浮起スルヲ得テ勿レ清水十碗ヲ用
テ筒ヲ沸テ煮ルヲ數滾約ニ内茶濃熟スル度トス再ニ瘡ノ頂上ヲ破針ヲ品字ノ如
クニ孔ヲ開キ膿處ニテ筒ノ圍内ヲ約ニ茶筒ヲ以テ湯ヲ連テ大磁鉢ヲ用テ患者ノ
榻前ニ盛貯ハ筒茶ヲ以テ倒シ出シ急ニ筒口ヲ以テ摺ニ棄テ瘡口ニ對シ上ニ合ノキヲ以
テ擦緊メ其筒自然ニ吸住ス約ニ十時ヲ待テ茶筒己ニ塞リ孔ヲ塞キ木條ヲ拔キ去ル

瘡

其筒自ら脱シ置テ以テ倒シ出シ筒中ノ物色何様ナル者ト如シ膿血相粘シ鮮明ニ黄
ノ色有テ二杯ガリ有リ其病是活瘡ナリ治メ必愈ニ如シ抜出スル物色敗血元穢紫
黒稀水ニ膿意相粘スル無キ者元血内敗レ肌肉活メ必死瘡ナリ強テ治メトモ効
ナシ此法屢々驗シ有リ陽瘡潰レ易ク膿易ク生ケ症ノ如キ必是ヲ用テ元血ヲ敗
此陰瘡用ナリ要ハ十五日前後堅硬ニ潰レ膿ヲ生ケ者有リ此法的確ト云テ効有リ
入竹筒方

- 羌活 獨活 紫蘇 藜蘆 葛蒲 甘枙 白芷
- 名五錢 連翹 葱 二兩 右別テ筒中ニ容ル

藥方

其勢ノ腫漫ト色ノ赤白ト痛ノ微甚ト毒ノ表裏ニ有ルトヲ審カス當シ若高腫焮痛便
利調和元邪表ニ有リ表散ニ宜シ
荆防敗毒散 癰疽疔腫脊背乳癰初發憎寒壯熱甚者頭痛拘急シ狀ヲ傷
寒ニ似ル者二日ヨリ四五日ニ至リ一ニ劑シ其毒ヲ衰テ輕者内自ラ消散ス

- 防風 荆芥 羌活 獨活 柴胡 前胡 薄荷

- 連翹 桔梗 枳壳 川芎 茯苓 金銀花

- 甘枙 水煎服

清熱解毒湯 瘡瘍焮腫赤痛形候俱實者

- 黃連 酒炒 山梔 炒黑 連翹 當歸 各一錢 羊芍藥 生芍 各一錢
- 金銀花 二錢 甘草 六分 水煎熱服

内疎黃連湯 腫焮痛深ク口乾便秘者邪裏ニ有リ下ス宜シ

- 木香 黃連 山梔 當歸 白芍 薄荷 枳椇
- 桔梗 甘草 各五錢 大黃 二錢 水煎食前服之蜜二匙ヲ加シモ可ナリ

五香連翹湯 前症表裏ヲ兼シ者

- 沉香 木香 麝香 丁香 各二兩 乳香 二兩 連翹 射干
- 升麻 獨活 桑寄生 甘草 各二兩 大黃 二兩半 木通 二兩

水煎大黃一味處實隨ラ増減ス

托裏榮衛湯 外拘急無久内便利調和者邪經絡者

桂支 人參 黃芪 紅花 蒼朮 柴胡 連翹

當歸 羌活 黃芩 防風 甘草 各五分 酒水各半煎服

●腫嫩大痛或麻木ノ痛ニハ邪氣凝滯ナリ外隔蒜灸ヲ用ニ活命飲ヲ服シ
歸芪飲ニ亦効有リ

活命飲 一切癰瘍毒赤腫未ダ成ル者消之已成者潰疽漫腫色白ト或起及

膿出テ痛ス元氣衰ナル者用ルテ禁ス

穿山甲 炮 白芷 防風 乳香 沒藥 甘草

赤芍 括萎根 敗身 貝母 心研 陳皮 皂角刺 各一分

金銀花 三錢 水酒各半煎 一方加天花粉二錢括萎根三錢

敗花飲 腦疽背癰毒盛焮腫及空人肛門瘡毒

當歸 八錢 黃芪 金銀花 各五錢 甘草 三錢 水酒各半碗煎シテ三次ニ

煎服ス日ニ三回上ニ在ル者升麻三錢ヲ加下ニ在ル者牛膝三錢ヲ加フ

四順清涼飲 煩躁飲冷赤痛瘡熱二便通火勢内熾ニ在ル者或活命飲

ト大黃ヲ加スモ尤善シ

當歸 赤芍 甘草 大黃 酒蒸者ニ五分 水煎生蜜二匙又レ服ス

●微腫微痛或痛スハ陽炎ナリ夫多ク内托散 ●微黒ク或ハ黯ク微赤或赤ク或

赤黒ノ膿ヲ作ス或膿熟ノ潰ル者虛寒ナリ煎ニ千金托裏散

千金托裏散 保元湯 川芎 當歸 肉桂 白芷 防風 桔梗 白芍 天門冬 連翹

又冬ニ生姜ヲ加フ

潰瘍

潰瘍膿ニ潰シテ腫レ消シ痛止ム頃トス若シ膿腫痛或寒熱ヲ發ス元氣血虛ナリ

十全大補湯膿潰ニ吧ト致シ少食ナル脾胃ノ虛弱ナリ六君子湯ニ炮姜ヲ加フ手

足並ニ冷ル者ハ脾氣虛寒ナリ六君子湯ニ姜桂ヲ加フ應ニ心ニ附子ヲ加フ膿潰

仍痛ニ便秘者毒未ダ解テ清熱解毒湯熱退テ渴退テ津液不足ナリ

八珍湯ニ黃芪 麥門冬 山茱萸ヲ加フ熱止テ小便頻數ハ腎虛ナリ加減八味丸

痰止腫痛及之甚キ者虚痰ナリ保元湯清心涼血薬ヲ加テ痰退テ肌肉ヲ生セ
其気血俱ニ虚ナリ十全大補湯瘡色赤白或陥下ノ斂ニ此寒ニ先ノ膿ヲ所ナリ
殊異功故膿血過多煩躁安ク其亡陽ナリ急ニ独參湯ヲ用テ尤其腫ノ軟硬飲食
冷寒下膿ノ稠稀多少肉ノ赤色青黯又瘡口ノ收斂遲速ヲ審テ托裏消毒
調神ノ劑ヲ投ス當ニ庶ク憂証無シ

●潰瘍ノ十宣散十全大補湯ヲ主テ其氣滯ニ香附ヲ加己膿ヲ見ド其根脚赤暈
及展開閉或痛ス或大ニ痛ニ此毒氣未タ退クナリ十宣散ニ朴桂ヲナリ人多ク當散黃
芪ヲ倍シ忍冬ニ建克犀角括萎根ヲ加フ

千金内托散

一名十宣散 一名多芪内托散

黃芪

蜜炙

人參

當散

酒各ニ炙

川芎

防風

桔梗

白芷

厚朴

姜

肉桂

甘草

各一錢

水煎金銀花ヲ加モ亦好シ

竹葉黃芪湯

瘡疽發背諸般ノ疔腫表裏熱甚ク口乾中大渴者

黃芪

寸許

黃芩

川芎

當散

白芍

人多

半夏

石羔

麥門冬各一錢

淡竹葉一錢

生地一錢

水二鍾姜三片燈心子根八分煎シ食遠メ服ス

托裏清中湯

瘡疽脾胃虛弱軟嗽痰氣清カテ飲食思フテ少シ

六君子湯加桔梗麥門冬五味子

托裏和中湯

瘡疽中氣虛弱飲食思フテ少ク腫消セズ潰テ斂ス

六君子加乾姜木香

托裏建中湯

元氣素ヨリ虚ニ或寒涼因テ脾胃ヲ傷リ飲食思フテ少ク凡

食味ナク或ハ吐シ泄瀉ホノ危急ニ之ヲ服ス

托裏定痛散

潰テ後テ血瘡疼痛忍テ可ラズ者

當散

熟艾

乳香

沒藥

川芎

白芍

肉桂

粟索 蜜炒各二錢

水煎

經驗方

刺後二三日間之ヲ用

十宣散易椒皮 椒皮忍冬 槭杷根即地骨皮 味ヲ加フ 一切瘡腫ノ穢膿ニ甚ク効有リ此加味
名症ノ主方ニ可ナリ

癰疽秘方 稻若水子之方 身粟子之傳 此藥小癰ハ用ニス治シ難キ癰疽用テ外治ヲ用テ魚トモ

愈シテ炒リ若元氣極虛者湯參湯兼用

沉香霜 即反葉里院 五八炒霜 津蟹霜各中鹿角霜大 大黃生中 川芎大

右細末ノ和シ白ヒニ敷テ以テ三ニ分チ三度ニ用エ

癰疽敷藥方 凡癰疽一切ノ瘡腫刺後痛甚ク忍ビ難キニ

乳香 沒藥 各小分 細末ノ水ニ和シ瘡外ニ敷ク是也ナリ

● 嘔ヲ作メ止ス 腫瘍時ニ嘔スル毒氣ハ心ヲ攻ルトス潰瘍時ニ嘔スハ陰虛也

腫赤嫩痛ノ嘔スハ熱毒甚シ活命飲宜シ 膿ヲ作メ嘔スハ血氣ノ虚ナリ六君子湯ニ

飯芪ヲ加フ宜シ ● 便秘ノ嘔スハ熱藏ニ有リ清熱解毒湯ニ地黃金銀花ヨリ枳榔木香

ヲ加フ ● 寒ニ藥ヲ服スナク多シテ嘔スハ六君子湯ニ桔更地胡ヲ加フ

● 出血止マヌ 瘡口血ヲ出スモノ肝火内動ニテ四物湯ニ山梔牡丹ヲ加フ ● 氣血

ノ虚ハ十全大補湯 ● 凡失血過多ノ煩熱發渴ハノ症ヲ見具其脈ヲ論ス其症問フ

多心ニ獨多湯ヲ以テ其氣ヲ補フ ● 經ニ多ク與氣ニ失苟モ參芪飯木寸温ニ非

決テ愈シ能ハス若發熱ハ脈大者多ク治セ

● 發熱止マヌ 初メ患ル毒氣ノ嫩ス所ナリ已成ス内ニ微膿ヲ作スナリ已潰ニ

天血氣ノ虧損ナリ緊メ敗毒ヲ行フ可マヌ ● 痛作メ發熱ニ活命飲 ● 膿ヲ作メ

發熱スハ托裏消毒散 ● 午前ニ發熱スハ陽氣ノ虚ナリ補中益元湯 ● 午後發熱シテ

渴ヲ作シ小便頻數ス者ハ腎氣ノ虚ナリ加減八味丸 ● 膿血多ク熱者ハ陽附ノ所無キ

故ナリ十全大補湯 ● 日晡所發熱ス者ハ氣血虚ナリ八珍湯 ● 無寐ノ熱者ハ内補

黃芪湯 ● 煩躁ノ熱スハ血脫ナリ當飯補血湯 ● 自汗ノ熱スハ胃氣ノ虚ナリ

四君子湯 ● 惡心寒發熱ス者補中益元湯或四君子ニ芪飯ヲ加フ

● 大便不通 發毒深固ニ嘔心逆ニ發熱ノ煩シ脈沉ニ實腫レ硬ク木悶シ

大便秘結ス此毒重ニ有リ疎通スシ凡大便通ナル者ハ真腸ノ乾涸スハ猪胆汁

ヲ用テ導ク宜シ ● 若腸胃ノ氣虚血涸ト通セハ者ハ十全大補ヲ用テ培養スシ若シ

潰瘍此有六氣血虧損腸胃乾涸大補元氣若虛寒者審其寒之疎利三九寸
八誤ヲルヲ鮮ナリ

●小便不通 瘡瘍小便通ヒルハ一ツテ虚寒ヲカテ茶スシク通劑ヲ
專用奇テ元氣ヲ損ク危キ至シ

●潰瘍惡寒者桂枝湯六氣血虚ナリ八珍湯●手足並
ニ冷ハ陽氣虚ナリ四君子湯炮姜升麻ヲ加フ

●寒熱往來者十全大補湯元氣ヲ
補フ●小便了ラズ脾氣下陷ナリ補中益氣湯

●作渴不止 瘡痛至熱大便小便調和スル者表ニ有リ清熱解毒湯●腫
痛至熱大便秘澁者八寶散邪有リ凉膈散

●瘡痛熾盛邪絡有リ活命飲
脈洪數力有リ胃熱津液消燦ス竹葉石膏湯●脈數力無ク胃虚津液短少ナリ

●補中益氣湯●飲食失度胃氣内傷津液ヲ亡ク參苓白朮散●膿血出ル
多ク氣血虚弱ハ八珍湯五味子ヲ加フ

●自汗不止 潰後多汗ハ衛虚元氣外ニ泄ル大宜キ所ニ非ス其稟質肥盛
者濕熱外ニ泄ル猶大患無シ若シ形稿色枯胸中氣多血液衰少者火熱元極下

ス腎弱甚シ肥盛ノ人潰瘍多汗ニ托裏消毒散宜シ●氣虚形盛者六君子湯ヲ主
トス●形瘦人潰瘍多汗ニ保元湯散為ヲ加ヘ又ハ六味丸酸枣仁ヲ加ヘ其津液ヲ救フ厚ク

火氣内燔ヲ免レン

●下痢不止 瘡疽潰久クシク瘡口收ラズ膿水清稀ニ泄利救急瀉元氣
衰弱ノ候リ理中補中四柱六柱ニ神四神選ニ用可シ●白沫下利其脾氣下陷ナリ

●補中益氣湯●姜桂吳茱木香ヲ加フ●膿血下滯ヲ見ハ血色鮮晦ヲ詳ニ可シ鮮カ者ノハ
連理湯ノ姜連並ニ進メテ以テ其中ヲ和晦者ハ理中湯宜シ稍桂附ヲ加テ以テ且下ヲ温ム

赤白兼下リ瑪瑙ノ色ノ如キ者亦上法宜シ仍敷服ノ應ニル者ハ又當ニ補中ニ辛温ノ品ヲ加
テ以テ兼テ其陽ヲ升テス●下利清血ヲハ茜根烏賊骨烏梅白芍ヲ加フ若シ夏秋濕

熱下注ニ非ラズ黃連厚朴枳實檉榔沢泻ホノ藥ハ皆宜トス

内固清心散 瘡疽至背對口疔瘡熱甚シ熾痛煩躁シ冷ヲ飲ニ此症有者預ニ
毒氣内攻ヲ防ク可シ

茯苓 辰砂 人多 玄明粉 白芷 甘草

十六

乳香

雄黃 各二錢

水圪 一錢

真藍粉 二兩

右細末 每服一匙五分蜜

湯 調下

護心散

瘡毒內攻口乾煩躁 惡心吐逆者

真藍粉 二兩

乳香 三錢

硃砂 一錢

寸中 一錢

為末 每服一匙白滾湯 調下

回陽三建湯

陰疽發背初起 疼甚腫大 紅赤硬者 牛皮如少堅者 頑石如少十

日外脉細 身涼肢體倦怠 皮微紫甲如少色 五硃似粟頂多 孔生孔 孔如血

流根脚平 故軟陷膿無 又皮膚腐作臭 手熱足冷者

附子

人多

黃芪

當歸

川芎

茯苓

枸杞

陳皮

山茱萸 各二錢

木香

寸中

紫艸

厚朴

蒼朮

紅花

獨活 各五錢

煨姜 皂角樹根 上白皮 二錢 水酒煎服

如意金黃散

瘡疽發背 諸般疔腫 跌撲損傷 濕疥流毒 大頭時腫 漆瘡火丹

凡發天泡肌層赤腫 乾濕脚氣 婦女乳癰 小兒丹毒 凡外科一切諸般頑惡腫毒

手隨瘡 瘡下云云

天花粉 十斤

黃柏

大黃

姜黃 各五斤

蒼朮

紫厚朴

陳皮

天南星

寸中 各二斤

白芷 五斤

右細末 凡紅赤腫痛 發熱赤

膿成 凡遇及夏月 火令時 茶湯用蜜 同調敷之 微熱微腫 及大瘡已成

膿作 凡欲乾者 為湯用蜜 調敷之 漫腫頭無皮 色變臭 濕疥流毒 附骨

癰疽 鶴膝 凡小瘡 為酒之煎 調敷之 凡瘡惡毒 生所患 必皮膚元熱 紅色光

亮 有疔狀 游走不定 多蜜水 調敷之 天泡火丹 赤遊丹 黃水漆瘡 惡血攻注 小

瘡 大藍根 常搗汁 蜜調和 敷之 湯洗火燒 皮膚破爛 麻油調敷之

回陽玉龍膏

瘡疽背疽 陰疽腫高 嫩痛 甚發臭 膿作及寒濕流注 鼓凡久

損冷痛 痺風諸濕 脚氣手足頑麻 筋骨疼痛 及一切皮色變臭 漫腫頭無 鶴膝凡小

瘡 治但皮紅肌熱 無干者

草烏 炒二兩

軍姜 炒三兩

赤芍

白芷

南星 煨 各二兩 肉桂 五錢

為末 燒酒調敷

鐵桶膏

凡背潰下 已潰者 寸根脚走 散之 凡者

銅礞 五錢 明礬 四錢 胆礬 三錢 五倍 二錢 白芨 五錢 輕粉 對金

各二錢 麝香 三錢 梨木ノ陳米醋二碗ヲ用ヒ杓内ニ漫火ニテ熬シテ小杯ニテ金也

泡起ル候ニ度トス温ヲ待テ上葉一錢ヲ用ヒ攪勻膏内ニテ毎用温テ新筆ヲ用テ膏根上ニ塗ル

綿紙ヲ以テ其膏根上ヲ蓋自ラ綿紙ヲ生漸ク收リ漸ク緊ク再ニ開大ナラセテ效トス

洗菜方 當飯 獨活 白芷 寸艸 各二錢 煎頭 五箇

水三碗ヲ用ヒ煎ノ葉ノ爛ニ至リ濾シ清ノ絹帛ヲ以テ湯ニ蘸シ膏上ヲ搥淨ス

升麻 濕腫湯 内消 五神ノ如シ 升麻 黃芪 防風 川芎 生苧 細辛 各一錢

茶二兩水二升ヲ用テ煎ノ十沸シ稍焚ノ淋瀝ス

太乙膏 脊背癰疽及一切ノ惡瘡跌撲傷損濕痰流毒筋骨走注ノ痛ヲ作シ湯滌

火傷刀傷棒毒内癰八九ノ服奇シ諸般ノ瘡并癰血風癩瘡并効有リ

肉桂 白芷 當飯 云々 赤芍 生地 大黃

木鱉 各二兩 阿魏 三錢 輕粉 四錢 槐枝 柳枝 各一兩 段 血餘 二兩 東丹

四十兩 沒藥 三錢 乳香 五錢 右十味保ト槐柳枝真麻油ヲ用テ五斤ニ稱テクニ

リ第ヲ將テ油内ニ浸ス春五夏三秋七冬二十日數日ニ畢ツテ大鍋内ニテ慢火ニテ

葉枯レ浮ニ起ルニ至テ度トス火ヲ住スルノ時布袋ヲ用テ濾シ淨シ葉渣ヲ去リ油ヲ將テ

秤准テテ數ニ足ス鍋ヲ將テ展々淨メ復細舊絹ヲ用テ油ヲ將テ又濾シ鍋内ニテ血餘ヲ以テ

投シ下シ慢火ニテ熬シ血餘浮ニ起ルニ至テ柳棒ヲ以テ挑ケ膏ヲ溶化ノ象ニ似タル者ル方ニテ熬熟

シタル淨油一升ヲ竹葉ヲ飛過シ昔丹六兩五錢ヲ將テ徐々ニ投シテ火加テ大些夏秋元焚ニ油

一斤每丹五錢ヲ加テ手ヲ住メ攪勻テ鍋内先ツ青烟ヲ棄テ候テ後白烟疊々トノ起リ氣

味ニ變シテ至リ其膏已成ル便チ火ヲ住メ膏ヲ將テ水中ニ滴シ軟硬ヲ試シ如シ硬ハ熱油

ヲ加若稀ナク炒丹ヲ加テ每ニ各少許リ漸々火加テ夏硬軟中ヲ得ルヲ住メス烟尽ル候ニテ

鍋ヲ下シ向魏ヲ切シ薄片ヲ為シ下シテ膏面上ニ散シ化シ尽シテ次ニ乳沒輕粉ヲ下シ攪勻テ

水中ニ傾入レ柳棍ヲ以テ搥テ一塊ヲ成シ再ニ冷水ヲ換イテ浸テ下シ時温ニ乘メ每膏半斤搥板

百轉シ塊ヲ成シ又冷水ヲ換イテ浸シテ用ル時隨テ每塊ヲ取テ銅杓内ニ復化シ便隨テ搥ケ貼ス

又太乙膏 一切瘡瘍又治

玄多 白芷 當飯 肉桂 大黃 赤芍 生芥

右麻油二斤用銅鍋內入煎之黑至半渣濾黃丹十二兩又煎

水中檢り軟硬中得六即膏也

萬應膏 瘡瘍初生腫微甚者

黃栢 芍藥 白芷 黃芪 木鱉 杏仁 當飯

白芨 生芥 官桂 玄多 沒藥 乳香 各五錢

白欵 黃蠟 各一兩 黃芩 大黃 各二兩 黃丹 一兩 芝麻油 二斤八兩

右十四味油內入浸一宿絕早沙鍋內慢火熬生柳條用攪申時至夕

焦褐色入以火出之廣相^{作楮}去之又重綿以濾過黃丹又再熬水中滴珠子

已成之散口者火出之烟^{作楮}絶之乳沒黃蠟入攪勻內埋七日取出攤用

化腐紫霞膏 瘡背已成之瘡肉腐及膿作赤者治之及諸瘡內膿有之穿潰者

俱此膏用之腐爛者自腐之穿潰者自破其効烏金膏碧霞錠子

毛是

輕粉 苧麻仁 各三錢 血奴 二錢 朝腦 一錢 金頂砒 五分 芭莖 研白仁 五錢

螺螄肉 晒乾 右末上共一處碾磁確貯之用時時以麻油用之調之頑硬

因上搽之膏以上上蓋之至頑者二次過之即于腐爛之膿上又諸瘡之助

頂破

烏金膏 中央肉成之之冷者即于腐之若肉腐之塗之即潰若惡瘡頑瘡元氣

虧者無之久收斂者內毒根有之攪之以其內下^注之

巴豆 去毒炒黑 研于膏如多思處點之

血竭膏 瘡疽潰後毒未去盡收斂之毒去其肌生之

當飯 酒洗 白芷 大黃 黃連 黃栢 木鱉 去毒 皂角

露蜂房 杏仁 各一兩 乳香 沒藥 血竭 各三兩 亂髮 眉子者 一兩

麻油 黃丹 右十二味油入煎之焦去其髮之不熔化之丹下之柳

枝以手住攪之軟硬中得半候乳沒血竭入攪勻之即膏也成

清涼膏 去毒生肌

當飯二兩 白芷 白芨 木鱉去索 黃柏 白欬去皮 乳香

白膠 各半兩 黃丹 五兩 麻油 十二兩 右油三煎 黑之渣去 黃丹入レ

槐柳枝 以テ手ヲ住メ攪ヒ再煎シ膏トシ乳香小ノ葉ヲ下メ

碧油膏 痛ヲ止ル

桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 乳香 血竭 各五錢 黃丹 四兩

當飯膏 右麻油十兩ヲ用テ煎シ焦シ去リ丹ヲ入レ再煎シ膏トシ乳香血竭又入レ

毒有リ去リテ遲ク新ヲ傷ル 右先ツ當飯膏ヲ用テ油入レ

當飯 一兩 麻油 四兩 生芥 一兩 黃蠟 一兩 煎シ黑シ查ヲ去リ蠟ヲ入レ鑄化シ温ク候テ攪勻シ膏ト為ス

腦疽

腦疽其源二有リ濕熱ニ又蒸ニ得テ外感ヨリ受ル者輕シ五臟ニ温結内ヨリ外感ニ受ル者重

シ俗ニ對口ト稱ス者是ナリ初起頭有リ或頭下大痛ニ或頭痛ニ俱隔蒜灸ヲ多シテ解毒

服多ク己成リ堅硬ヲ發燉口乾便秘者邪内ニ有リ内疎黃連湯發燉頭痛患寒

頭痛四肢拘急者堅腫木痛ニ黃連消毒散腫硬ク白深ノ形色紫黑ニ外皮腐ス内

膿潰スニ竹筒拔法ヲ行フ宜シ漫腫微痛昌ニ冷テ飲ス脈洪數ニカテテ乃陰虛火熾テ

リ六味丸及補中益氣湯口舌乾燥小便頻數或淋瀝ノ痛ヲ作ス腎水虧損テ急ニ加

減八味丸膠ヲ成リス腐潰ニ九陽氣衰テ四君子湯ニ飯後ヲ加スニ肌ヲ生ス收斂テ臍氣ヲ

虛テ十全大補宜シ色黯ノ潰ハ潰テ斂テ腦燥ト名ク不治トス若攻補宜テ得ル愈ル者

托裏消毒散

癰疽已成ニ内消テ得ル者之ヲ吸スニ己成テ潰レ日勿ク腐肉去リ

易ク膿肉生シ易クシ猶癰疽中ト考テ不可シ 人多ク 黃芪 當飯 川芎 芍藥 白朮 茯苓

各一錢 金銀花 白芷 各七方 白朮 五方 連翹 五方 水煎服

黄連消毒飲（作散）

腦疽背疽腫爛疼痛或麻木不仁治之

黄連

羌活 各一分

黄芩

黄柏 各五分

生苳

知母

独活

防風

當歸

連壳 各四分

藁本

防己

桔更 各三分

黄芩

蘇木

陳皮

沢泻 各二分

人參

甘草 各三分

右水煎服

加減八味丸

癰疽已愈未愈或口乾渴作舌乾黃硬者

六味丸方中 肉桂五味子ヲ加フ

茯苓

山茱

牡丹 各四兩

山萸 肉五兩

沢泻 蒸三兩

五味子 炒三兩

肉桂 六錢

熟苳 八兩

右二味ト煉蜜ニ丸ニテ梧子ノ大ヲ如ク毎服ニ棗心ニ

服ニ監湯ニ送下ス常ニ酒ヲ服ス可ク此又溼潤燥ノ苳ナリ

内托千金散

腦疽脊背諸毒惡瘡已成ヲ消ス凡者之ヲ服ノ瀉ニ易シ

白芍

黄芩

川芎

當歸

防風

桔更

花粉

銀朮

人參 各一分 肉桂

白芷

甘草 各五分

乳香

没朮（二味痛甚）

右酒小杯ヲ水煎服

鬢疽

鬢疽凡熱血毒致ス所ナリ初ニ頭痛惡寒腫痛腮頰ニ及ニ脈浮実ニ力有者荆防敗

毒散ヲ熱湯ヲ作スモノ柴胡清肝湯腫爛痛甚者活命飲若ニ大勢已ニ退キ餘毒未マ

散者托裏消毒飲ヲ以テ其膿ヲ速ニニテリ針灸ス可ク実ニ九者ニ各ニ毒者針灸ス可

クス只膏ヲ貼ス可シ餘ニ癰疽治法中ト參考ス可シ

柴胡清肝湯

鬢疽初起未マニナル者陰陽表裏ヲ論テナリ服ス

川芎

當歸

白芍

生苳

柴胡

黄芩

山梔

防風

花粉

梔子

連壳

甘草 各五分

水煎服ス

鼠粘子湯

初起熱多寒少頭眩痛ヲ為シ燥キ咽乾渴ヲ冷ラ飲ニ便秘淡ニ脈

沉実力有リ煩悶疼痛者

鼠粘子

桔更

當歸

甘草

赤芍藥

連壳

云々

防風

地骨皮

花粉

木通 各一分

大黃 二錢

右水煎服

參苓內托散

瘡癤已成り望ノ潰ハ潰テ斂ラス氣血俱虛ニ身涼脉細飲食思フ少ク口淡ク味チ及形休消瘦ス者

當歸

黃芪

川芎

白芍

陳皮

白朮

山藥

熟地

茯苓

人參 各二錢

甘草

肉桂

附子

牡丹

地骨皮 各五分

姜枣水煎

疔瘡之論

夫疔瘡其瘡ノ形チ丁蓋狀ノ如クハ者是ナリ古方ニ論ズ凡十種有リ華元化五色疔ヲ戴ス千金方ニ疔瘡十三種有リ外臺秘要ニ至テ神巧萬全ナリ其論頗尙シ而ノ皆先經絡五藏之内ニ客メ毒瘡ヲ温テ離ス矣●疔瘡外科迅速ノ病ナリ朝ニ瘡メ夕ニ成シ隨テ瘡ニ隨テ成シ三五日ノ死ニ一月半月ノ死ニ有リ毒中ノ深淺藏府ノ乖逆筋候ノ寒温肅殺ノ瞬息ニ在リ人ノ氣血虛者各藏府ニ隨テ中ル如シ毒氣心經ニ客ス者火焰疔ト多ク唇口手掌指筋間ニ生シ其初テ生シ點ノ紅黃小泡

ス生シ抓動シ痒痛常ニ非ス左右肢体麻木重キ寸ハ寒熱又ク作り頭暈眼花心煩舌燥

言語昏憤是ナリ肝經ニ客ス者紫熱疔ト多ク手足腰肢筋骨ノ間ニ生シ初テ紫泡ヲ

作シ次ニ白破キ血水ヲ流シ三日ノ後筋ヲ牽キ骨ヲ爛メ疼痛甚甚是重キ寸眼紅目昧指

甲純青舌強リ神昏ニ睡語驚惕是ナリ脾經ニ客ス者黃鼓疔ト多ク其初メ黃泡ヲ

生シ光亮明潤四邊紅色纏繞ス初テ口角腮頰眼胞ノ上下及太陽正面ノ處ニ生シ麻痺ヲ作

シ細急硬強ス重キ寸惡心吐肢体木痛寒熱ニ又ク作り煩渴乾噦ス是ナリ肺經ニ客ス者

白又疔ト多ク其初メ白泡ヲ生シ頂硬根突ニ破テ脂水流ス痒痛驟然トノ腐レ易ク

陷リ易ク重キ寸腮損咽焦ト毛從耳ハ肌熱シ咳ノ膿痰ヲ吐シ濕熱シ氣急是ナリ腎經ニ客ス

者思慮疔ト多ク耳竅肉腹腰腎偏僻軟肉ノ間ニ生シ其初メ魚斑紫泡ヲ生シ毒皮膚

ヲ串テ漸ク肌肉ヲ攻メ頑硬ニ痛骨隨ニ徹シ重キ寸手足青紫瘡毒悖沉困軟陷テ孔深ク

目睛透露ス是ナリ●其外十三種有リ●一曰ク唇子疔其状肉起テ頭赤米ノ如ク色

稍黒ク而辺微シ赤多ク痒シ●二曰ク石疔其形皮肉相連リ色黒キト豆ノ如クテ甚硬シ刺ノ

肉ニ定微シモ痛ス●三曰ク雄疔其状如頭黒ク膿血ヲ四畔仰キ飽將水ヲ起テ水ノ出テ有リ

色黄ノ大ヲ鉄孔ノ如ク高シ●四白ノ疔其状瘡稍黄ナリ裏チニ面テ膿出ル也亦瘡
 似テリ四面蛇瘡起テ心凹ニ色赤ク鉄孔ノ如シ●五ニク火疔其状湯火燒灼ノ如ク瘡頭黒
 靨重四面煙瘡有リ赤粟米ノ如シ●六ニ爛疔其状稍黒ク白斑有リ瘡中膿水水流
 出ルナリ有リ瘡形大小匙面ノ如シ●七ニク三六疔其形頭黒ク浮起シテ黒豆ノ如ク四畔起テ
 赤ク今日一ヲ生明日ニ生白ク生三ニ六滿ルハ第治ス能ハズ未ダ三ニ六滿ルハ治ス●八ニ
 多ク蛇眼疔其形瘡頭黒ク皮浮小豆ノ如ク蛇眼ノ大ニ似テ体硬シ●九ニク監瘡疔其ノ
 大ク匙面ノ如ク四辺皆赤ク黒粟粒ノ起ルナリ有リ●十ニク水洗疔其大ク錢ノ如ク鉄孔ノ如
 シ瘡頭白ク裏チ黒シ膿出テ汁出テ中硬シ●十一ニク刀鎌疔其形闊狭菲世ホク大ク如ク
 長ク一寸左ノ側ノ肉黒ク燒烙ノ如シ●十二ニク浮沔疔其瘡体曲圓少許ヲ合ヒ長ク狭ク
 菲世ホク大ク如ク肉黄ニ外黒シ黒處刺キモ痛ク黄處刺キ痛ム●十三ニク牛狗疔肉色
 飽起シ極トモ破トス●又紅絲疔有リ多ク手掌筋間ニ起リ初メ小瘡ニ似テ漸ク紅絲手
 將ニ上攻メ寒熱ヲ作シ甚キ寸ハ患心吐逆シ六紅絲心至テ常ニ能ク人ヲ壞針ヲ紅絲ノ
 尺ニル處ニ用テ挑斷ノ血ヲ出ス陸トス尋子ヲ初起瘡上ニ至テ挑破テ膏ヲ能ク治早キ佳

通

シトス稍違テ人ヲ傷ル

疔瘡看法

初起瘡ノ如ク形ヲ粉刺ノ如ク或小泡或疔瘡結腫散ヒ者煩ナリ瘡出テ寒熱ヲ作ス患
 心ニ飲食味有リ手足温者煩ナリ形チ己成テ瘡腫テ肉腫テ四圍白色痛多ク痒少
 ク膿ヲ作ス者煩ナリ己潰テ膿ヲ出シ瘡仍高ク腫肉色鮮明根肉紅活漸ク平者煩ナリ初
 起疔ニ似テ疔ニ非ス軟慢灰色四辺瘡根平塌漫腫在者凶シ未ダ前寒熱ヲ作ス
 瘡ノ如ク患心食後瘡ヲ出シ蚊跡蚤班ノ如ク或青紫黒泡軟陷根無ク腐爛深孔氣
 瘡ラ足冷者逆ナリ瘡形魚脍ニ似テ頂凹ニ灰白軟慢相兼子脉細ニ身冷者ハ多ク逆ナ
 リ己成テ肉腫キ瘡腫ト根脚走散ノ瘡頂空腐血水氣穢ハ死毒氣走散ノ頭面
 耳頂俱腫レ煩燥脉細疾動喘急ニ在者ハ死日久ノ原瘡跡ヲ走散處仍復膿ヲ作シ
 脉教唇焦ニ死ニ死ニ針ノ痛ス眼黒火光ヲ見心神昏昧或煩悶恍惚解方如キ者ハ死ス

治法

凡疔腫ヲ療ス項ヨリ以上ハ瘡心ヲ刺シ痛處ニ至リ又四邊十餘下刺ノ惡血去リ項ヨリ以下艾

灸ノ具勢ヲ殺シ居ル良肉ヲ浸サテ灸熱惡寒身体拘急六脉緊數表ニ有リ加減敗毒
 散灸熱口燥咽乾脉實ヲ力有リニ便秘者疔毒復生湯針刺後瘡腐多作マ
 辺腫消スル仍稀葉ヲ加テ内ニ補托ス初起誤リ灸ノ毒走黃任ラズニ夜ノ惡血ヲ流
 瘡熱乾心煩渴ヲ作シ悶乱神昏ニ毒ヲ解シ心ヲ清シ膿ヲ護ス潰後氣血傷ヲ受テ神
 怯食少ヲ睡臥寧カラシ脾胃ヲ助テ神氣ヲ斂ム將ニ愈シトス後氣血漸復シ飲食當ニ進シ仍
 渴ヲ作ス者多ク腎水ヲ滋養ス若シ毒甚シク人支ヲ省ス或丹関緊急ニ有者奪命丹ヲ用
 足ニ生ハ多ハ紅絲有テ瘡ニ至リ手ニ生ハ多ハ紅絲心至リ唇面口内ニ生ハ紅絲喉ニ生皆急ニ
 針ヲ以テ其絲ヲ挑テ破リ惡血ヲ出其毒氣ヲ泄ス若シ偏僻ノ處患ハ葉ヲ導キ難所ノ者ハ
 灸法大ニ回生功有リ疔ノ名状多シト云レ但元氣ノ虛實即ノ表裏ヲ詳ク治ス若シ
 疎利表散ニ泥ハ必害有テ有レ凡人暴外スル者多ク是疔毒ナリ急ニ燈ヲ取テ遍ク其身ヲ
 照ス若シ小瘡多ク即是其毒ナリ急ニ之ヲ灸スハシ并ニ奪命丹ヲ服ス亦復甦ニ有者有リ
 加減敗毒散 疔瘡癰疽諸瘡ノ初之ヲ用テ毒ヲ殺散スベシ
 防風 羌活 荊芥 銀花 連翹 牛蒡子

黃連 黃芩 蒼朮 貝母 乳香 沒藥 甘草

名不方 善疔為心根煎服

疔毒復生湯 疔毒走黃頭面腫ヲ殺シ毒氣内攻ノ爛肉死セト欲ス者

牡蛎 山梔 銀花 木通 連翹 房子 乳香

沒藥 皂刺 花粉 大黃 骨皮 各八分

水瀉若羊煎食遠腹ス

奪命丹 疔瘡癰疽背脊ノ症麻木或ハ吐重者昏憤スル者ヲ治ス疔毒牙関緊急心大

三五丸ヲ末シ水ニ調服ノ奪命ノ功有リ

蟾酥 乾者酒化 輕粉 各五分 枯礬 寒水石 硃砂 各一分 蝸牛 二十箇另研 銅綠 乳香

沒藥 麝香 各一分 硃砂 三分 蝸牛 二十箇另研 右末シ蝸牛或ハ酒ノ糊ヲ用

テ菜豆ノ大日丸ニ每服二三丸温酒為心湯ニ送下ス

千金托裏散 疔瘡癰疽背一切惡腫

官桂 人多 甘草 川芎 白芷 芍藥 各二兩 木香

沒藥各三錢 乳香二錢 當歸 羊兩 連壳 二兩二錢 黃芪 一兩半 防風 桔更

厚朴各二兩 右細末ノ每服三錢酒一盞煎スルニ沸メ渣ヲ和メ温服ス

人參清神湯 疔瘡潰膿ノ後餘毒未ク及ニス五心煩按精神恍惚寧カズ言語聒

臥清々々之ヲ服ノ火ヲ降シ心ヲ清シ元氣ヲ保扶ス 人參 黃芪 當歸 白朮 麥門 陳皮 茯苓

遠志 骨皮各二錢 寸杪 紫胡 黃連各五方 糯米一撮

水煎食遠服ス

內托安神散 疔瘡針後己膿ヲ出ス時ニ元氣虛弱睡臥驚悸心志不安或毒イ

不及ス流シ心竅入り健忘ヲ生スルヲ致ス 人多 茯神 黃芪 白朮 夾門 玄參 陳皮

各二錢 酸棗 遠志 寸杪 菖蒲 五味子各五分

水煎臨テ硃砂スルニ三分和勻服ス

神效丹 諸般ノ惡毒疔瘡瘡背一切腫毒遍身痒痛并虫益毒

硃砂 雄黃 凡腦各五分 乳香 沒藥 輕粉各三分 血竭

三錢 蟾酥一錢 麝香二分 右末トシ蟾酥或乳汁ニ丸ス扁豆大ワリ如ク每服一丸好酒

多用以嚥下ス

秘方奪命散 疔瘡瘰癧無名ノ惡瘡ヲ治ス

當歸 乳香各一錢 山甲炒六錢 皂針燒 陳皮 金銀花各三錢

貝母一錢 赤芍 寸杪各六錢 沒藥二錢 花粉八錢 防風 白芷

右水酒煎 類聖散 一切ノ疔瘡惡毒腫痛

川烏 草烏 蒼朮 細辛 白芷 薄荷 防風

寸杪各五錢 右末トシ雞子清調ヘ患處ニ塗リ頂ヲ留ム

束毒金瓶散 疔瘡針後餘毒未ク走散ノ腫ヲ作ス者

爵金 白芨 白薇 白芷 大黃各四兩 黃柏二兩 輕粉

五錢 蒙豆一兩 右末トシ酥調ヘ塗置月甚キト夫蜜調水ニ和シ塗之

青金九竜膏 疔瘡癰疽毒去腐去毒去用下無

白芷 巴豆去殼 草麻子去毒 木賊去毒 白槐條 柳條各百二十

乳香 沒藥各三錢 白芥子五錢 黃丹二十兩 香油三斤 右前藥將香

油同煎槐柳條以手攪攪水中滴珠成寸渣濾去再煎却黃丹

下攪白芥子將逐時內入後乳香波菜下攪勻務氣熱法得步要

綠膏藥 疔瘡及諸般惡瘡腫毒針用自白開亦毒去

銅青 草麻去毒 松香四兩 木鱉去毒 杏仁五錢 巴豆五箇 乳香

輕粉五十貼 右末上搗勻石上斧用子餘極膏上成水浸旋用

紫金錠子 疔瘡諸惡腫毒

續隨子五兩 川烏頭 甘州各二兩 蟾酥 雄黃 白芥各一兩

麝香二錢半 辰砂一兩五錢 凡腦二錢 人言不調 輕粉各五錢 桔梗一兩五錢 黃連

一兩三錢 白丁香三錢 巴豆四十九粒 右末上鉢內入蟾酥巴豆投同研勻麪糊

丸九錠子指彈大如疔口入諸惡瘡磨丹花水調塗乾力再搽

脫疽之論

脫疽外腐內壞此平昔厚味膏粱藏府薰蒸丹石補藥腎水消燻房

勞過度元氣竭精傷或房術洪精霸道藥噲七下丹田至利脛中納執徑

內腎投丸托ノ掌握香作ノ鼻顛陰鼎塗リ陽密捺リ圖テ堅鋼ナラシテ常

シテ希ヒ求ム多ク陽精燭或シ淫火猖狂藏府益益終燥焚火疔成具毒骨髓

積毒終疽毒陰瘡上証巧成拙行誰禍蕭牆起知智者多思自

ラ謂フ喜天ヨリ降ト後ヨリ顧ス骨枯髓涸藏敗レ府壞レ方今日歿ニ惟ハ解脫方無

此患ル者多ク手足生不初粟米ヲ生シ頭便テ一點黃泡其皮猶煮熱紅赤如黑氣侵

漫相傳テ五脂傳テ遍ク上脚面至元其痛湯滌火燃ノ如骨枯筋練其穢臭香解

難具命仙方モ活シ難シ故謂血死心敗筋死肝敗肉死脾敗皮死肺敗骨死

腎敗此五敗八靈丹有ト命ヲ喪フニ孫真人云肉在ハ割キ指在ハ切ト云即此疾

之ヲ治ス早キハ其未タ延敷及ガレ時乘ノ頭髮十餘根ヲ用ハ患指ノ本節ヲ纏ミ尺

處ヲ透扎ス十餘轉シ斷々緊ク毒氣ヲ延テ良肉ヲ攻シ年無レ隨テ蒜ヲ隔テ原起ノ

粟米頭上艾炙ヲ加肉枯レ瘡死スニ至ラ度トス次日本指尽ク黒ク力ニ利クヲ用テ尋テ本筋
縫中ニ至テ患指ヲ以テ徐順ニ取流血住マシメ薄血ヲ用テ之ヲ止ム餘腫ハ如意金黃散束毒
金花散合散ヲ以テ之ヲ敷ク次日白倘黒ク有テ尽ク此紫霞膏ヲ搽シ膏ヲ以テ蓋テ黒氣自
ラ退キ患上膿ヲ生血竭膏ヲ用テ肉生シ骨ヲ以テ護シ口ヲ完ラズ内服ヲ滋テ氣血ヲ養ハ脾ヲ健
シ心ヲ安スル劑ヲ服ス内服症無ク外混雜無クナラハ三四ヲ保ツ可シ割キ取テ後黒色仍漫ノ
腫痛最甚シ敷患膿無ク口乾キ舌硬ク精神爽テ食味ヲ知テ是終トス

脱疽者法

瘡ヲ起ノ渴口潤舌和性心尋常ニ至リ暴急ニ至リ無レ初メ出テ麻子ノ如ク嫩熱痛ヲ作
シ指皆腫レ根脚收束者古クテ己ニ頭ヲ為シ便チ腐ヲ作シ此黒疼痛ニ時有リ膿出腫消
ス者古クテ己ニ潰テ先膿後腐肉色紅活毒走散ス氣腥穢ニカル者古クテ未タ瘡ヲ至レハ
湯シ冷ヲ喜ビ度ナク昏睡舌乾小便頻數者凶ナリ初起粟米ノ如ク肉紫色腫大刺痛黒氣延散
者凶ナリ己成リ瘡形枯槁肉黒ク皮焦レ痛ニ刀ヲ割ク如ク好指傳ル者凶ナリ己潰テ肉枯筋
腐レ血水臭汚疼苦心慮シ伶仃骨ニ徹ス者凶ナリ

治法

脱疽多足指生マ手指ニ生レテ少ナリ初テ水蜜黃泡ヲ起ス者即之ニ灸ス初生ノ粟米ノ如ク
重裏谷容可シ皮ノ色紫赤嫩腫ヲ作テ髪ヲ以テ扎テ仍灸ス己ニ灸スレ後瘡火氣ヲ受テ泡ヲ
谷ノ膿ヲ作テ外ハ若クテ以テ之ヲ絶シ内ニ補托ヲ報テ毒勢己成リ瘡形稍陷ニ但紫色未タ脚
面ヲ攻テ者割取テ既ニ割取後血水淋漓疼痛減テ氣血ヲ和シ脾胃ヲ補テ己成テ飲食減少身
体倦怠便數口乾キ津液ヲ滋シ腎水ヲ壯テ破後氣血傷ヲ受テ脾胃虛弱自汗盜汗惡心
乾吐眩臥寧カテ日晡至焚疼痛苦楚煩悶譫妄俱ニ大ニ氣血ヲ補宜シ富貴膏又赤素ヲ
色慾ヲ饗リ毎ニ房術ニ於テ縱恣日久ハ割法ヲ行フテ餘ノ毒表攻裏補淨解毒貼膏ホ
ノ法瘡ヲ治法ノ中ヲ参考ス可シ

解毒濟生湯

脱疽初起惡寒体倦發熱湯ヲ作シ或腫レ或紫或麻或痛ニ四肢倦怠心
志恍惚不寐者

- 川弓 當歸 黃柏 知母 花粉 金銀花
- 麥門 遠志 柴胡 黃芩 犀角 茯神

甘草 红花 升麻手指加 牛膝足指加 右水煎服至曉童便ヲ入

陰陽二氣丹 脫疽久丹石補毒丸服腎水虧キ多ク白燥咽乾ニ成ス冰雪ヲ飲テ冷ヲ知ス

此孤陽獨旺又

天門搗膏 麥門搗膏 五味炒 黃柏 人中白生 玄多搗膏 各二兩

青黛 甘草 枯茗 沢浮各三錢 水元一錢 辰砂衣トス

右細末トシ玄多ニ冬ニ膏子ト同ク煉蜜少許加テ再搗テ千餘下軟硬中ヲ得テ丸桐子ノ大ナ

如ク毎服六十九童便乳汁各一鍾空心ニ送下ス

雌雄霹靂火 脫疽及一切癰背初起疼痛口見者並ニ之灸ス宜シ

艾草二錢 丁香 雌黃 雄黃各二錢 麝香一方 右四味ヲ細末艾

中ニ搗入大豆ノ大ナ丸患上ニ灸ス痛痒ヲ論テ母レ肉焦ルヲ以テ度トス如シ毒已ニ走散ヲ

經天紅暈及處就テ炷ヲ排テ灸ス痛ハ痒キニ至リ痒キ痛ニ至リ妙トス後仍綠膏茶ヲ

上ニ貼シ膏ヲ以テ蓋次奪命丹及解毒濟生湯服轉回メ活色膿有妙トス

癰癤止之論

癰癤ノ疔ニ三焦肝胆二經ノ怒火風熱血燥屬或或逆怒氣逆憂思過甚鬱氣積リ生ス

又筋癢リ疔癰有リ項ヲ遠リ核ヲ起ス蟻蛇癩ト名ク延テ胸前腋下及ス者名ツテ瓜藤

癰ト多ク左耳根ニ生ス患ハ癰癤ト名ク右耳根生ス患ハ癰癤ト名ク核ヲ結テ連續スルヲ癰

癰ト形ヲ長ク輪ノ如キ者馬刀トス獨リ形トス小丸者ヲ結核トス多ク肝鬱ノ氣鬱ニ成テ結テ因テ

生初起十六味流氣飲ヲ用テ之散ス當ニ女リ針灸ス可ス素ヨリ虛勞氣鬱者多形氣ヲ

補テ經脈ヲ調ラシ佳トス其癰自消ス若實ム者公疔ニ隨テ針灸ヲ浮第ヲ用可シ初起憎寒惡熱

咽項強痛嫩痛者肝火風熱ナリ小柴胡湯ヲ用テ肝火ヲ清シ并ニ加味四物湯ヲ服ノ肝血

養テ寒熱既止核消シテ者肝經火燥ニテ血脈ハ加味逍遙散ヲ肝火ヲ清シ六味丸ヲ以

テ腎水ヲ生ス若腫高ク稍軟カニ面色萎黃皮膚壯熱者膿已成針ヲ用テ決ス可シ及ヒ

托裏ノ劑ヲ服ス若シク經ヲ愈ス或ハ愈ヘテ復発リ膿水淋瀉肌体羸瘦者純補ノ劑

服ス底ノ收斂ス可シ不可シハ憂ノ丸癰ト成ル經回脈隔リ接トス因腫留連スト即此癰

十六味流氣飲 癰癤及魚名腫癰疽之ヲ服ノ初起散ス可シ

人多 當歸 黃芪 桔梗 防風 木香 枳壳

芍藥 川芎 肉桂 一椀郎 白芷 厚朴

紫蘇 烏茶 寸艸 各五分 右水煎服

柴胡清肝散 肝胆二經火熱怒火頭項腫痛結核消或寒熱往來吐痰水或婦人

暴怒肝火內動之經水妄行スルヲ治ス 柴胡 黃芩 各一錢 黃連 山梔 各七分 當歸 一錢 川芎 六分 牡丹

一錢 升麻 八分 寸艸 三分 右水煎脾胃虛弱者芩連去之茯苓多加

芩連二陳湯 痰癰少陽ノ部分生ノ頸項結核漫腫色紅或ハ缺血ノ高骨上下腫

シテ形長ク堅硬痛ヲ作シ馬刀ト名リ初起未タ成レル者

黃芩 黃連 陳皮 茯苓 半夏 寸艸 桔梗

連壳 芒硝 花粉 各一錢 夏枯草 二錢 右水煎

防風解毒湯 凡毒癰癤先ツ寒シ後熱シ少陽ノ分耳項結腫シ腫浮スル

防風 荆芥 桔梗 芒硝 連壳 寸艸 石膏

薄荷 枳壳 川芎 蒼朮 知母 各五分 燈心 水煎

加味藿香散 凡毒癰癤外凡寒傷ノ内凡熱傷ノ頸項腫ヲ作シ肩背強痛

肢舒々寒熱瘧ノ如ク及胸膈不利

藿香 甘草 桔梗 橘皮 陳橘皮 柴胡

紫蘇 半夏 白朮 茯苓 白芷 厚朴 川芎

香附子 夏枯草 各五分 姜棗水煎

連壳消毒飲 熱毒癰癤益熱ヲ致シ腮項核ヲ為シ或天行元熱濕痰腫ヲ為シ轉側スル

能ワズ 連壳 陳皮 桔梗 玄參 黃芩 赤芍 當歸

梔子 葛根 射干 花粉 紅朮 各一錢 寸艸 五分

大黃 初起便燥者加 水煎服痰有者竹茹加

滋榮散堅湯 一切癰癤憂鬱傷之氣血不足形體瘦弱潮熱咳嗽堅硬腫痛新久分

以魚肝油未タ穿潰セル者

川芎 當歸 白芍 熟地 陳皮 茯苓 桔梗

白朮 香附 甘草 海蛤粉 貝母 人多

昆布 各五分 升麻 紅花 各三分 右姜棗煎身禁六柴胡黃芩加自汗盜汗

六升麻 人多倍黃芪加飲食味無去藿香砂仁加食化是山椒子麥冬加胸

膈痞悶六沃浮木香加咳嗽痰氣清是杏仁麥門冬加口乾渴作是知母五味子加

睡臥不安是黃柏遠志酸棗仁加驚悸健忘是茯苓神石菖蒲加汗有是惡寒是薄荷

半夏加汗無是惡寒是藜蘆香加女人經受調是延胡索牡丹皮加腹脹寬

益氣養榮湯 初發或氣血勞傷或四肢頭項筋縮結成疔系之毋貝母知母者

筋癱下多此患皆思慮太過餘神氣傷受勞中得止所者予或軟或硬或赤

或赤多或痛或痛或日晡發熱或瀉或飲

人多 茯苓 陳皮 貝母 香附 當歸 川芎

黃芪 熟地 白芍 甘草 桔梗 各五分 白朮 二錢

姜棗水煎會膈痞悶六枳實木香加飲食甘苦之厚朴蒼朮加徃來寒熱六柴胡
地骨皮加膿潰湯作人多黃芪黃白朮倍膿多或清是當歸川芎倍腹下痛或
痞是青皮木香加肌肉生是暹羅白飲因主加痰多是半夏橘紅加口乾是麥門冬五味子
加發熱六柴胡黃芩加渴是知母赤小豆加瀉後及痛六熟附子沉香加膿止
人多黃芪當歸倍是虛煩不睡人多熟地遠志酸棗仁倍

初氣內消散 瘰癧并諸瘡結核

當歸 川芎 白芍 白朮 青皮 陳皮 半夏

桔梗 羌活 白芷 厚朴 獨活 各八錢 防風

黃芩 烏茶 香附 枳殼 各一兩 蘇葉 一兩半 沉香 三錢 木香

柴胡通經湯 馬刀脊項側脊脊堅瀉八

柴胡 連翹 飯尾 黃芩 葶藶 三稜 桔梗

甘草 紅芪 水煎服

紫霞膏

瘰癧初起未成者自消潰之者自潰之諸瘡之主藥也

松脂 一斤

銅綠 二兩

右麻油四兩用銅鍋內熬數滾水一滴散之松脂

下之熬化次銅綠下之白烟尽止時膏已成

琥珀膏

瘰癧及腋下初起梅子如之結腫硬強漸連珠若消去潰之或潰之濃

水絶之久久經之瘰癧漸漏疔成

琥珀 一兩

木通

桂心

當歸

白芷

防風

松脂

硃砂

木鱉肉

草麻肉

丁香

木香

三林油 二斤 二兩

黃丹 十四兩

先以虎白丁香桂心朱砂木香用細末其製法之潤內浸之七日鍋內

不慢火熬之厚葉焦黃九至十度下銅油瀝之徐以黃丹下之柳枝以攪之

成至候滴水中不軟硬中得之鍋下撥下之盆中以攪之穩攪之烟尽至方

厚葉葉下攪之勻之磁器以盛貯之

大紅膏

瘰癧疔核結塊新久分多穿破者

南星 二兩

銀硃

血飀

硝石

朝腦

輕粉

乳香

右二藥 貓頭骨 一具 煨

石灰 二兩 大黃 三錢 用切之

右細末之陳米醋之熬之

調之極數之三日之極後及微損者別以此紫霞膏之換之其後核自消之

火針法

瘰癧疔核項間生初起堅硬或極李之如結聚之散之此法之用針之

針之消之縫衣之大針二條用竹筋頭將之磨之開之針以雙之縫內夾之相離

一分半之線用針扎之定之先桐油之盞燈炒六七根用油內排勻之點着針將之

燒之紅之手指用板之捏起之針以當頭刺之四五分板大者再針之數孔之開

亦妙之板內或痰或血隨之流出之候之膏以蓋之次白針孔必漸之膿之乾之者

黃線葉之用之之插之板堅硬者水蠟散之用之糊之條上成之曬之乾之插之針孔內

外糊紙之以二重之封固之次日其板腫之至之痛之極之此藥氣內攻入之三四日之

自然之核外大縫之裂開之七日之其核自落之湯之用之孔內之洗之淨之換之玉紅膏之

搽入之外膏之以蓋之內之益氣之養榮湯或十全大補湯之服之

生肌玉紅膏

瘰癧瘡背諸般潰爛毒毒之瘡之治之用之己潰之膿之流之時之有

先以湯之用之患上之洗之軟絹之濕之拭之此膏之遍之新腐肉上之搽之外太乙膏之以

蓋内ニ大脾胃ヲ補フ暖茶ヲ服ノ其腐肉脱易ク新肉即生テ唇口自斂ル此乃外科救斂
茶中ノ神膏ナリ

白芷 五錢 甘草 一两二錢 飯身 二兩 血脈 輕粉 各四錢 白占 二兩 紫艸

二錢 麻油 一升 先ツ當飯日艸紫艸白芷四味ヲ用テ油内ニ浸テ三日大杓ノ

内慢火熬又茶微ク枯色ナラハ細絹濾シ清ノ油ヲ得テ復杓内ニ入レ煎ノ血脈下ニ敷テ化シ尽シ

次ニ白占ヲ下シ微火ニ化シ先ツ茶鍾四枚ヲ用預メ水中ニ頓キ膏ヲ以テ分テ四處トシ鍾内ニ傾テ入レ

元時ヲ候テ方ニ輕粉ヲ下シ攪ヒ膏トス

氷蠶散 瘰癧日久ク堅硬消ス消茶ヲ服テ効有ル者用テ瘰癧核馬力ノ如根大テ面小及失

榮ホノ症ハ用ルベシ

大田螺 五枚 壳ヲ去リ 白砒 一錢二分 麩 氷元 一升 礶砂 二分 右曬乾螺肉ヲ用切

シ白砒同ク礶末トシ礶元加再ハ小礶碾リ密收ス凡用時先艾炷ヲ用板上ニ灸テ七壯次ニ

灸瘰癧起テ候テ針ヲ以テ挑破リ前茶二層ヲ將津唾ニ調テ餅トシ灸項上ニ貼テ綿紙ヲ用

厚糊ヲ以テ板上ニ封貼シ動カセテ七日後四辺衣縫ヲ生シ再七日板自落換テ玉紅膏

ヲ搽ス内補茶ヲ服ノコト完ラス

三品一條鏡 瘰癧瘰癧疔瘡諸毒五漏翻花瘰癧瘰癧核

明礬 三兩 白砒 二兩五錢 雄黃 二錢四分 乳香 一錢二分 砒毒 二味共ニ細末トシ礶内ニ入レ

炭火ヲ加煨シ紅青烟己之尽テ白烟旋起ル時約シテ上下紅微ノ火ヲ住ム礶ヨリ取り地上ニ頓キ

一宿ヲ取リ出シ約シテ砒毒淨末一兩有リ前茶ヲ加テ共細末トシ厚糊ニ調稠シ線條如ク成シ陰

乾ノ凡前症ニ遇ヘ孔有ル者孔内ニ紙入テ孔ヲ塞メ針ヲ用テ孔ヲ開キ早晚茶ヲ搽テ二次搽テ

三日ノ後至リ孔大ニ者十餘條ヲ搽ム七日至テ患孔茶條滿足セシ方ニ住ム以後患所四辺自然ニ大縫ヲ

裂開ス共十四日ノ前後ニ至リ疔核瘰癧瘰癧毒自然ニ落下シ隨テ湯ヲ用テ洗ハ玉紅膏ヲ搽ス

瘰癧ノ健脾ノ茶ヲ常服ス

咽喉

夫咽喉呼吸ノ門飲食ノ道トス此ニ一身ノ關係ノ人害ヲナシテ迅速ナリ故是馬トテ咽喉

ヲ看ルニ少頃ヲ待テ假如ク虛火ハ色然微腫脈亦細微小便清白大便自利ス此思慮過多ニ因テ申

中氣不足脾氣中護テ了餘ヲ去テ火トシ易シ此恙先ツ咽喉乾燥飲食妨礙咳痰逆在

呼吸利是言ノ若蘇ヲ班生ニ空蝦皮知シ毛草ノ常ニ喉中ヲ刺カ如又硬物ノ咽中ニ噎カカ
 酸水吐吐甜涎ヲ嗽出ス甚キハ舌上白胎唇若色ヲ生者音唯啞喘急疼多亦皆虛火元氣
 不足中ヨリ出ハ喉ヲ涼モテ投ス可マ上午痛者ハ元氣ヲ補中益氣麥門五味玄多加フ午後痛
 者陰虛ニ屬ス四物湯ニ黃柏知母桔梗更ニ加フ如シ効メスハ姜附ヲ加テ引道ヲ用テ為ニ亦佐治
 法ト云實火ハ熱内ニ積テ久キ時ハ火動メ疾ヲ生テ喉腫ヲ為ス甚キ者ハ熱痰上リ癭ヲ咽門
 閉塞ノ少頃ヲ湯水入テ戸音出テ此ヲ喉閉ト云緊喉ハ是ナリ葉ヲ用テ更ニ及先ニ針ヲ用テ喉間ヲ
 刺ス毒ヲ穿世ニ隨テ桐油餞雞翎角ヲ稠痰ヲ探リ吐シ務テ痰ヲ出シ尽シ咽門鬆テ得テ湯
 茶ヲ少語声出内清咽利膈湯ヲ服ニ餘毒ヲ疎利ス如シ牙關緊閉ノ難メ必少高ヲ刺メ血ヲ出
 其開自開ク如シ針刺シ探吐メ痰無多者鋸ヲ搜カ如キヲ鼻撤シ痰喘ニ湯水入テ語声出テ真死
 候ナリ又喉癭喉痺乳蛾上膈癭ホノ症有リ其患腫レ魚尾咽門半開半塞出リト魚尾喉道又寬
 又緊ナリ此皆標ノ疾ナリ重テ魚尾筋ヲ金鎖匙ヲ用テ延テ吐出シ利膈湯積熱ヲ推湯ニ膿膿
 痛者之ヲ開ク損ノ痛ハ益シ其患自安シ凡喉閉血刺メ喉ハ痰ヲ倒メ喉癭膿ヲ放メ喉痺
 乳蛾針メ此法非ス又痰火有リ勞瘦喉傷咽痛者法ノ治ス可キ無シ

治法

初起腫痛寒熱交作リ頭眩拘急スル者表有リ發散スシ腫痛發熱脈力有テ便秘者内
 有リ下スシ咽喉腫痛痰涎壅甚面紅口乾邪上者探吐ス可シ喉閉痰涎壅塞氣急
 口禁閉難ハ先少高ヲ刺シ血出シ後吐法ヲ行フ己脹痛ヲ成シ咽喉塗塞湯水入テ膿已ニ成ル
 急ニ針メ膈痛微紅脈虛力無テ午後痛者陰虛ニ屬ス滋シ火ヲ降ス可シ腫痛色白ク咯吐
 涎多テ上午痛者陽虛ニ屬中ヲ補ヒ脾ヲ健ス宜シ

六味丸

腎元素ヨリ虛シ心ニ火ヲ津液不降致渴疼ト為ル救逆ヲ生スナラ致メ

熟苜 八兩 山茱 山茱萸 各四兩 沢瀉 牡丹皮 茯苓 各三兩
 右市上地黄煮爛ノ杵テ膏トシ蜜丸シ桐子ノ大ヲ如シ每服七八丸空心滾湯塩湯温酒ヲ
 送下ス ●堅水虧損相火劇スナク無テ口渴舌乾咽喉腫上氣或痛内熱面赤痰涎湧上尺
 脈必數シ力ヲ無テ麥門五味ヲ加大劑ニ用テ又色欲過度元陽虧損無根ノ火遊行ノ制ス
 此無テ咽喉ニ客ス者八味丸ヲ冷服ス

●乳蛾喉ノ兩傍ニ腫者雙蛾トシ一邊腫レ者單蛾トシ鹽米醋蝦翎ヲ用テ喉中ヲ攪シ痰

涎ヲ去リ尺シ後鷲翎ヲ以テ探吐ス略ヒテ喉中紫血ヲ略破スバ即チ潰ニ毒甚ノ故ヒスハ小刀ヲ以テ
刺シテ紫血ヲ出テ愈ヌ又少高ヲ刺シ血ヲ出スモ好シ刀針血ヲ刺ハ急ニ寸用ニ但腫キ痛キ者切
針ヲ可マ形有テ痛キ者其陰ヲ峻補シ可シ若血刺ハ必陰血ヲ破リト死ス

鷲翎

●**纏喉風** 先ツ兩日頭眩暈胸膈緊塞氣息促短驚然トノ咽喉腫痛手足厥冷氣閉ニテ
通ニ飲食下ラズ疼毒壅盛ラ纏喉風トス其症最ニ急ナリ又兩塊有テ喉傍ニ結ス見テハ雞卵ノ
如ク氣塞テ通ヒズ疼鳴止ス此ヲ鎖喉風トス其症更ニ劇シ慎テ破破ルテ勿レ急ニ生牛膝粗者ヲ撰ニ兩
許ヲ用ヘ水ヲ經及針ヲ犯テ勿レ折斷ノ汁ヲ搗キ米醋半盞和シ雞翎毛ヲ蘸シ喉中ヲ攪ス升開緊
閉ニ者蘸攪スニ兩腮自開ク開後喉中ヲ頻攪ス以テ其氣ヲ通ス若兩傍塊有者涎出自消後
人中白燉過シ水凡少許ヲ入レ喉中ニ吹テ日ニ次三四日過テ愈ス或礪砂丹ヲ用頑疾ヲ湧去ス可シ
倘腫塞ノ下ルテ得ルモノ鼻ニ灌テ吐テ取リ其勢ヲ奪テ若兩塊湊合テ喉中疼鳴懸ニ壅上編ノ
見ハス氣壅テ通ス神丹モ救テ可ス醋攪テ用テ後拇指ヲ以テ其脊上七節ノ兩傍ヲ擦シ痛ヲ知者
愈ハ易シ是者膝ヲ以テ其脊上ニ當テ手ヲ以テ兩腮下ヲ抄シ兩缺盆向テ胸前ヲ凸ニ起ラシムルハ氣
上テ上ニ泄テテ得若涎出テ後涕淚稠粘ニ音ハ焚テ涕無キ者ハ寒テハ胸中結塊有者宿食

ナリ証隨テ治ス此症時毒ノ邪氣ニ係ルニ多ク跌撲飲食停滯ノ起者有リ前防日枯亮
其勞薄去查ヲ用テ内其毒ヲ解ス

●**喉痛** 勿心々愈テ有リ 毒胸脹及ノ痛忍テ可ス氣促身熱臥テテ能クハ貝母牛蒡 醋炒
升麻黃芩子。乾浮萍。黑多日炒蜜丸ノ嚙化ノ服ス七日以後毒深ク喘甚テ手足指甲

紫ニ者治シ難シ

●**喉痺** 喉浮 惡寒發熱多ク是暴寒挾テ折ク表邪熱盛此寒涼藥食毒氣ヲ凝
閉ニ礪砂白荖白梅ノ酸收及膽若點喉亦宜方ニ輕ク揚テ其表ヲ開テ可シ以テ火毒ヲ泄急
患處ニ後ノ血ヲ刺シテ少高ヲ刺ノ血ヲ出テ要訣トス

●**走馬喉風** 若頭痛發熱有者先ツ香散ノ濃煎ヲ加テ探吐ス後ニ荆防羌活
羌薄犀角類ヲ用テ升開カニ者牙皂ノ末ヲ鼻ニ吹テ嚏ヲ取テ其下ニ可シ ●**鎖喉風** 証牙
皂煎湯ヲ用テ頑疾ヲ涌吐ス者有リ每皮毛脫落ニ大ニ胃氣ヲ傷リ甚ハ其疾ヲ數動ノ鎖任ニテ
吐出シ下ニ能クテ頃刻ニ救死ニ者有リ ●**走馬喉痺** 証豆ヲ綿裹シ鼻ヲ塞キ毎其毒ヲ燉
發ニ至慎ニ有ハカス ●**乳蛾** 礪砂梅ヲ用テ切テ得テ魚鱗性最辛烈酸收ヲ假ルテ魚尾終ニ火ヲ

以火之海ノ毎時舉發ヲ云々人皆其故ヲ知ス

●時久咽腫表ヲ散ラ先トス 喉痺傳深是疫癘ノ荆防散毒散ニ悉ク從テ加減ス

●陰虛嗽久ノ喉中痛者必肺花蒼有リ治シ難シ桔更湯ニ六味加五味子丸ヲ送下ス切ニ元

吹點ノ用牛魚レ証劇ク湯茶ニ勝ス者雞子清ヲ米飲ニ調服シ稍其寒ヲ緩スニ終ニ亦亡シ

●咽腫涼茶ヲ服シ反テ甚者姜汁ヲ用ユ 咽中炙膏有ク如ク或梗状如シ者半夏厚朴湯

ニ宜シ●懸壘腫痛飲食ノ可ク者黒多升麻大黃射干日炒煎服ス●咽喉諸若知百者

此咽痛ニ有テ乃鼻中紅絲ヲ生シ懸壘方如黒泡櫻珠如多垂掛テ咽門有リ飲食ノ杜

膝根ヲ洗淨ノ好醋三五滴入同ク汁ヲ研キ鼻孔ニテ滴令云絲斷ニ珠破レ即安シ●懸壘

紅腫消或痛食又レテ即會厭垂長ノ懸壘塞飲食ヲ妨碍ス者燒塩ニ著テ煎シ之ヲ

點ス●乳蛾紅腫消長杜牛膝根ヲ研爛シ乳ヲ用點ノ鼻中ニ之●刺ノ血ヲ出テ後針孔甚キ者

生姜汁時々少許ヲ熱湯ニ調ヒ下スニ●瘡ノ餘毒咽喉痛ヲ為ス者芥連消毒飲熱多ク

能テ或ハ芥ヲ連テ去ル或ハ當取川ヲ紅花ヲ加或ハ土荻若ク加テ大便結ルニ大黃ヲ加●咽喉痛

塞ス者脊中黒氣有テ或リ穿テ血ヲ出シ

●諸哽喉ニ有リ 芋麻根ヲ杵キ爛ノ丸ス彈丸ノ如ク哽レ所ノ物ヲ煎シ吞下ス針刺ヲ覺

吞テ咽ニ硬キ疼者亂麻筋團ヲ用竜眼ノ大ヲ搥シ象ヲ以テ穿テ繫キ象頭ヲ留テ外ニ在

シ湯瀉ノ急ニ吞テ咽ニ下シ頃刻ニ扯出ス其針頭必刺ノ喉中ニ入ル同ク出ス如節ニ中ニ入ハ再吞テ

再扯ク銅物ヲ吞者多ク芋荻ヲ食ノ堅ヲ化シ軟トス●鉄骨ノ物ヲ吞ニ腸中轉送スレテ能ク墜

片ヲ覺ハ多ク青菜猪脂ヲ食ハ自然ニ大腸ニ送入ノ糞ヲ出シ●骨哽玉簪花根ヲ以テ犯所ノ

肉ト煎服シ引クヲ為ス●又咽下ニ哽リ外ニ出テ能ク者烏竜針ヲ推下スハ自安シ●諸哽

薤白煮テ半熟ニ用綿糸ヲ以テ縛リ定ノ糸頭ヲ執リ少嚼シ嚥ム哽處ニ至テ大便扯出ス哽隨ッ

テ出ツ

利膈湯 脾胃熱積ニ咽喉瘡ヲ生

薄荷 人參 荆芥 防風 桔更 薑子 甘柳

名ハ分 水煎服シ瘡甚ニ疼多ク者蠶蚕ヲ加テ杜熱脈実ル者人多ク黒ク犀角山

豆根ヲ加フ 清凉散 一切実火咽喉腫痛

山梔 連壳 黄芩 防風 枳壳 黄連 當歸

生芩 日炒各半分 桔更 薄荷 白芷減半 灯心團細茶

一撮水煎山豆根磨之調服咽喉乾燥白芷去り人多麥門冬粉ヲ加テ乾熱白芷胡ヲ
腫痛ニ逆ラ去リ玄蔘ヲ加テ痰火盛ニ逆ラ去リ射干瓜蒌竹瀝ヲ加テ極熱大便秘ヲ去リ大黃加
テ虛火炎上咽痛瘡ヲ生スニ逆ラ去リ知母ヲ加テ

加味四物湯 虛火上升喉痛并咽喉瘡喉痺最能ク火ヲ降ス

當歸 黄栢蜜 知母 花粉 川芎各二分 桔梗 日炒

各三匙 熟芩 白芍各二分 水煎服竹瀝スル

滋陰清火湯 喉痺腫痛声啞出テ飲食下テ虛火上炎潮熱喘咳

熟芩 山茱 黄栢蜜 知母 天門冬 玄参
山須臾 茯苓 丹皮 沢瀉 麥門冬 日炒各二分

桔更二分 水煎服

清上養中湯 咽喉腫痛素虛弱者

甘柳 桔更各二分 玄参 當歸 黄芩各一分 陳皮 白朮

茯苓 麥門 連壳各半分 人參 防風 金銀花各五分

水煎服六日母ヲ加テ

通關散 喉痺腫痛言語不能或吐或泄或不食或四肢冷痺

桔更二分 日炒各一分 人參 白朮 茯苓各二分 荆芥 薄荷

各五分 防風七分 干姜或附子加水煎頻々服ス

牛蒡子湯 瓜熱上壅初發牙關緊急已急咽喉腫痛或瘡癘ヲ生シ及愈後復

咽喉ヲ攻メ先促身熱言臥正テ能ク言者
牛蒡二分 玄参 犀角 升麻 黄芩 木通 桔梗

荆芥湯 咽喉腫痛語声出テス

荆芥羊兩 桔更二兩 日炒一兩 姜水煎

●咽痛午後甚者四物湯黄栢知母荆芥防風脈數無六荆芥多玄参多日炒桔梗

加午前痛不通閉故多用之。但咽痛餘症無者桔更日炒之煎服虛陽上攻疾飲

壅塞咽中毛炒之常刺之痒者為之如吐上毛出噤下之如蘇子降氣湯之用之

蘇子降氣湯 虛陽上攻之氣升降之結患咽噤痰涎壅塞之致者

蘇子一兩五分 厚朴 陳皮 半夏 前胡 官桂各一錢 甘草

五分 姜水煎

桐油餞 喉凡喉閉

先以溫湯桐油入之攪調雞翎之浸之喉中探之連探四五次其痰壅出再探再

吐之入甕之度下之

金鎖匙 喉閉纏喉凡痰涎壅塞口噤之開之湯水下之難之

焰硝二兩五分 硼砂五錢 比腦一兩 姜蚕一錢 雄黃二錢 右末之竹筒以

之患處吹之痰涎即出若痰出之難之出下魚尾腫痛仍消之患處針之患處

神効吹喉散 纏喉凡閉塞及乳蛾喉痺重舌木舌

薄荷 姜蚕 青黛 朴硝 白卷 火硝 黃連

硼砂 各五錢

右細末之脫月始日雄猪胆之取胆汁之出之菜末和之為復胆

壳之線之以之頭之孔胆外之青紅紙之用之裹之地之掘之孔之開之尺許之潤深上之竹竿

又橫上之板之以之鋪之泥用之蜜之立者之日之取出之氣處之掛之陰乾之胆皮及青依

之者之磁罐內之收之每用一兩水元三方之加患上之吹之

烏龜針 骨咽之哽之治之細鉄線之燒之雙頭之軟之黃蠟之以之丸之之龜眼之

鉄線頭上之裹之外線線之以之包之咽內哽骨之推之其骨自然之順下之

清音噲化丸 肺氣傷之受之咽痛音啞或久嗽声啞

訶子 阿膠 天門 知母 茯苓 黃柏

蜜炙 當歸 生苜 熟苜 各一兩 人乳 牛乳

烏梅 十五箇 梨汁 各一碗 共熬稠膏 右末之膏和之入煉蜜加丸之每用一錢之

訶子湯或薤菴湯之送下之

解毒雄黃丸 纏喉凡腫閉或平之倒之牙關緊急

雄黃一錢 爵金一分 巴豆去油皮十四箇 罌粟之醋糊之丸之菜豆大之熱茶之

用送下スル七九頑痰ヲ吐スルニ匙スハ再ニ服ス若クハ心頭猶熱シテ瀉下只更ニ步
 龍鹿射聚聖丹 心脾客熱咽喉腫痛或ハ癆ヲ成メ消食或古本腫脹口舌蒼星
 五ツ治ス

川芎 一兩 生苜 犀角 羚羊 琥珀 黑石 連壳
 各五錢 人參 茯苓 馬牙硝 元腦 麝香 各三錢 桔更
 升麻 各五方 鉛白霜 五錢 硃砂 牛黃 各二錢 礞砂 一兩 金箔 五片
 右藥ノ蜜丸龍眼ノ大薄苛湯化シ下ス或ハ噲テ嚥ム
 水梅丸 喉痺十八種ヲ治ス

皂角 白朮 白鹽 防風 朴硝 各四兩 桔更 二兩 甘州
 一兩 南星 半夏 各三十五箇 揀テ七分熟シ大梅子二百箇先ツ硝ヲ以テ塩水ニ
 浸テ一周時シ後各葉ヲ以テ碾碎シ水入テ 拌勻ハ梅子ヲ以テ水中ニ置具水梅子ヲ淹テ
 三指ヲ度トス浸テ七日取り出シ晒シ乾シ又水中ニ浸シ透シ晒シ乾シ茶水ノ乾ク後テ度トテ
 ニ梅子ヲ磁罐内ニ密封シ霜衣ノ白ノ如キヲ佳トス用シトス時薄綿ニ裹シ口中ニ在リ津

液ヲ徐々ニ嚥下ス痰出テ即愈毎梅子一人ヲ治可シ輕シテ棄可ス

喉痺吹茶方

火硝 五錢 元腦 一分半 礞砂 二錢半 蒲黃 一錢 猴兒茶 一錢三分 右末ト筆管
 ヲ用撥開シ蘆管ニ吹入シ痰ヲ吐シ愈

乳蛾吹茶方

蚕蛾 末三錢 兒茶 一錢 明礬 三分 辰砂 一錢 右末トス

喉痺針方

少商ヲ刺ノ血ヲ出スニ愈其元大指内側爪甲ノ角ヲ去テ韭菜許リ三稜針ヲ刺
 ●合谷ニ針元又佳虎口ニ有リ針ヲ五分又尺沢ニ元針ノ臂中横紋ヲ有リ血ヲ出サ

冰硼散

咽喉口齒新久腫痛及久嗽症火咽腫痛ヲナ
 冰元 五分 硃砂 六分 玄明粉 礞砂 各五錢 細末ノ患上ニ吹捺ス甚者
 白三五六次

時毒之論

夫時毒四時邪毒ノ氣ノ為ニ其候鼻面耳項咽喉赤腫頭テリ或結核根有リ寒
 熱頭痛恍惚寧カス状傷寒ノ如ク五七日ノ間示能ク入ヲ殺ス治精ノ辨ス可シ若浮散
 者荆防敗毒散脈沉実ナル者四順清涼飲表裏俱ニ病者犀角升麻湯甚者散
 血ヲ出ス通氣ヲ用テ嘔ヲ取テ毒氣ヲ泄ス十日ノ外ハ自消ス茶ヲ播メ嘔止者之ヲ治可ク如シ
 嘔ニ膿血出ス者之ヲ治スハ必ス愈セ七日間ニ至テ大便通利シ頭面腫起シ高ク赤キ者ハ
 托裏消毒散ヲ服スヘシ若五日己前精神昏乱咽喉秘塞語声出テ頭面赤腫食味ヲ知
 ラズ者必ス反ノ候ナリ此荒勞役之ヲ思フ重ク安スルヲ主トス普濟消毒飲宜シ腫熱甚キ者
 如意金黃散ヲ敷ク微熱紅チラス堅硬在者膏ヲ選テ用テ自後仍消セ凡者必膿ヲ作セテ飲
 托裏消毒飲宜シ己ニ潰テ体倦食少キ者補中益氣湯不斂者十全大補湯宜シ若項
 リ以上俱腫テ赤光リ水色ノ如ク雙目合縫唇猪形ニ似テ口角涎ヲ流シ腫消テ声出テ
 入テ咽喉腫閉牙關閉テ難ク破レテ臭水ヲ流シ穢氣連綿トシ絶テ者此ヲ犯ス俱ニ不治トス

連壳消毒飲 時毒表裏危俱ニ蟲ニ餘腫消テ疼痛退カレ者

連壳 川芎 當歸 赤芍 葶藶子 薄荷 黃芩

花粉 甘草 枳壳 桔梗 升麻 五分
 水煎便燥ニ酒大黃ヲ加フ

普濟消毒飲 時毒疫癘初メ増寒發熱肢体沉重次テ頭面傳ヘ腫ヲ作シ或咽
 喉不利舌乾口燥煩渴窓ノカラキ者

黃芩 黃連 各二錢 人參 一錢 陳皮 云々 甘草 柴胡

桔梗 各一錢五分 連壳 葶藶子 馬勃 板藍根

升麻 姜蚕 各五分 水煎若シ大便燥者酒煨大黃ヲ加フ

通氣散 時斂腫疼痛咽喉不利語言爽カナラス

延胡 各五分 川芎 牙皂角 各五分 熟蘆 三分 羊躑躅花 各五分

細末トシ紙捲テ用テ茶ヲ煎テ少許鼻内ニ挿メ嘔ヲ取リ効トス

犀角升麻湯 時毒或ハ熱頭面腫痛或咽喉不利或鼻疽疔瘰

犀角 升麻 防風 羌活 各一錢 白芷 黃芩 各五分

白附子 五分 甘草 六分 水煎服

癭瘤之論

凡癭瘤五藏之疾血濁氣凝結而成癭陽者色紅之高突或蒂小而下垂之瘤
 陰者色白之漫腫痛痒無之堅者色紫血至多之青筋有之盤曲甚者結之蚯
 蚓如之者筋瘤也 ○ 微紫微紅軟硬間雜皮膚隱々之纏疔紅絲如之擦破
 之血流林林之住者名之血瘤 ○ 軟之綿如之腫之饅似之皮色變白又紫者
 寬者終年只覆胖似之者名之肉瘤 ○ 軟之堅者皮色故如之或消或長之寒
 熱者名之氣瘤 ○ 形色紫黑望硬石如之疙瘩高起之推之不移者骨
 貼之堅者名之骨瘤 ○ 又之筋骨呈露者筋瘤也 ○ 赤脉之結者血瘤也
 ● 皮色變白者肉癭也 ○ 憂喜隨之消長者氣癭也 ○ 堅硬之不移者石癭
 也 ○ 通之癭瘤初起元氣實者海藻玉壺湯六軍丸宜之元氣虛者琥珀
 黑龍丹十全流氣飲之此藥之撰服之自然縮小消磨之切輕之針刀用之掘
 破不可之血出之止之レハ二トコロニ危キヲ致ス久キ寸ハ膿血崩潰滲漏已ニ終入ヲ傷ル ○ 又
 一種粉瘤有之紅粉之色ナリ多ハ耳項前後ニ生ス亦下体ニ生ルナリ全ク是レ癭之氣凝血成

此披針ヲ脂粉ヲ去ル可シ二品一條鎗ヲ瘡孔ニ挿入シテ數次以テ内膜ヲ淨ク自愈ス ○ 又一種黑
 砂瘤有之多ハ股腿ニ生ス腫突ノ大小ナラス手ヲ以テ掘起シ内ニ黑色有リ亦針ヲ用テ刺シ黑砂ヲ
 出ス声有リ軟硬ニテス ○ 又一種髮瘤アリ多ハ耳後髮下ニ寸許ノ處ニ生ス軟小高突按之痛マ
 亦針ノ粉髮ヲ存ク出ツ ○ 又一種蛔虫瘤アリ腹下ニ生ス後ヲ潰テ虫ヲ出ス ○ 又一種瘰癧アリ連テ
 肩膊ニ生ス潰テ五六寸ノ虫ヲ出ス其形狀異ナリト金昆皆五藏濕熱邪火濁氣凝血ノ為ス所也
 瘰癧非ス初起但結ノ形ヲナラハ宜ク氣血ヲ行散スニ已成テ痛ナク痒ナク或軟或硬色白者瘰癧
 瘰癧ヲ行ラシム氣ヲ順スニ已成リ色紅緊硬漸ク大ニ微痒微痛者腎氣ヲ補ヒ血ヲ活シ堅ク散
 茄蒂ノ如ク瘤大ニ下垂ス者茶ヲ用其蒂ニ點ス茄蒂落チ肌ヲ生ノ收斂スニ已破テ流膿
 止マシ瘤仍消ス日者脾胃ヲ健シ佐クニ化堅ヲ以テスニ已潰テ血ヲ出メ常ナラシ瘤口開
 スル者血ヲ養ヘ血ヲ涼ス佐クニ清肝ヲ以テス潰後瘤腫漸消ノ脾胃ノ收斂スルヲ能ル者
 腎氣ヲ補ヒ兼テ脾胃ヲ助ク凡テ女子ニ決破ス可シ決破スレハ醫シ難シ肉瘤尤治ス
 可シ治スレハ人ヲ殺ス

海藻玉壺湯

癭瘤初起未々破レル者

海藻 貝母 陳皮 昆布 青皮 川芎 當歸

半夏 連壳 甘炒 独活 海帶 水煎服

活血散癭湯 癭瘤已成日久漸大痛痒無氣血虛弱者

白芍 當歸 陳皮 川芎 半夏 熟芋 人多

茯苓 牡丹 紅花 昆布 木香 日炒 各五分

青皮 肉桂 酒水煎服

六軍丸 癭瘤已成者年月新久論

蜈蚣 頭足 蟬脫 蛭蝎 姜蚕 夜明砂 穿山甲 各小方

右末神麩糊丸西米米矢砂砂衣上每服三方酒下

枯癭方 癭瘤根帶小丸者用

白砒 礞砂 黃丹 輕粉 雄黃 乳香 沒藥

礞砂 斑狗 田螺 右極末糯米粥調和少根子

樣作曝干先以癭頂灸下三壯茶餅以貼上黃柏末用水調敷

茶餅蓋十日外至癭留自然枯落次飲口茶用

飲癭膏 癭瘤枯落後捺貼自然肌生口完

血飀 輕粉 龜骨 海螵蛸 象皮 乳香 各三錢

雞蛋 油 以上各等細末雞蛋白內攪調早晚瘡孔洗

淨雞翎 雞翎 淨雞翎

琥珀黑龍丹 癭瘤新久論只但未及穿破口者

琥珀 血飀 京墨 靈脂 海帶 海藻

南星 姜汁打炒 木香 麝香 右末神麩糊丸西米米矢砂砂衣上每用

一匙熱酒送下

十全流氣飲 氣癭肉癭皮癭日久漸大者

陳皮 茯苓 烏朮 川芎 當歸 白芍 香附

八分 青皮 六分 甘炒 五分 木香 三分 姜枣水煎

消癭五海散 癭瘤治之神效有

- 海帶
- 海藻
- 海布
- 海螵蛸
- 海蛤粉 各兩三 羊木香二兩
- 三稜
- 菝葜
- 桔梗
- 細辛
- 香附子
- 猪鬃 七箇 陳壁土 炒 去油 焙
- 乾
- 右玉上 每服七分 羊木湯下

肺癆之論

肺癆之邪毒肺裏聚り瘡ヲ生シ腐爛ス其候初至惡ハ咳嗽痰涎鼻塞リ項強リ胸膈
 脹滿呼吸利シ咽乾ヲ渴ヲ作シ甚キ寸四股微腫噴嚏膿血有リ或吐痰ニ臭濁膿血腥
 穢胸中隱々トシ微痛寸口脈數ニ實ナル者肺癆ト云フ若シ涎沫ヲ吐ク膿ヲク脈數ニ虛ナル者
 肺痿ト云フ若シ咳嗽喘急ナル者小青龍湯宜シ咳嗽胸脹者^{方金匱要略見之}葶藶大棗湯肺癆咳嗽膿
 ヲ出シ腥濁ナル者桔梗湯咳嗽短氣或小便短少者依^之之補肺湯口乾咽燥者加減
 八味丸始テ萌ス寸口脈數ニ成テ多ク死ス脈微緊テ數ナル者膿ホク有テ緊見テ
 數ナル者膿成ル咳吐膿血久々ラ米粥ノ如キ者治シ難シ膿ヲ吐ク止マレ者亦治ス可ラズ膿ヲ
 吐ク自止ム者治テ其脈短シテ濇ナル者自痊浮大ナル者治シ難シ苟モ能ク肺癆ヲ補テ腎水
 ヲ滋カハ痰不生カレ者有テ專ラ瘡ヲ攻メ脾胃益虛シ誤ラレテ鮮ナシ

麥冬平肺飲 肺癆初起咳嗽急心中隱痛膿痰ヲ吐吐者

- 人參
- 麥冬
- 赤芍
- 茯苓
- 陳皮
- 桔梗
- 各一錢 寸艸五分
- 水煎服

玄多清肺飲 肺癆噴嚏膿痰ヲ出シ胃膈脹滿上気喘急痰壅スル者

- 玄多
- 柴胡
- 陳皮
- 桔梗
- 茯苓
- 骨皮
- 麥門
- 各一錢 薑以二錢 人參
- 寸艸 各五分
- 茯苓 三分
- 姜童便水煎服

紫苑散 咳嗽噴嚏膿血有リ虛勞証肺痿癆瘵ニ要スラ治ス

- 紫苑
- 知母
- 貝母
- 桔梗
- 寸艸
- 五味
- 人參一錢
- 紫苑 半錢
- 知母一錢 羊貝母一錢 羊
- 桔梗一錢
- 寸艸 半錢
- 十五箇
- 茯苓一錢
- 阿膠 五分 炒
- 姜水煎

桔梗湯 肺癆噴嚏膿血ヲ出シ咽喉多ク渴シ大小便赤澁スルヲ治ス

- 桔梗
- 貝母
- 當歸
- 杏仁
- 枳殼
- 薑
- 芍
- 各二兩
- 黃芪 一兩 羊
- 寸艸
- 杏仁 炒
- 百合 蒸 各一兩

姜水煎大便秘ス大黃ヲ加テ小便赤澁ニ木通ヲ加テ

消痰飲 肺癆膿腥多食上衝之咳嗽之吐舌者

南星一兩 知母 貝母 白芷 生苈 阿膠 川芎

桑白 白芨各半兩 甘艸各 防風 射干 桔更

紫蘇 天門 薄荷 杏仁 半夏各七錢半 烏梅一箇 生姜

七元 水並服之

桔梗湯 肺癆咳嗽胸膈兩脹痛之作咽乾口燥煩悶渴之時身瀉者治

桔更炒 貝母 當歸酒 杏仁 枳壳炒 薏苡炒 桑皮

炒 甘艸各一錢 防己一錢 黃芪鹽水炒 五味炒 百合蒸各五錢 葶藶

炒 骨皮 知母炒 杏仁各五錢 姜水煎咳甚者 百合倍加 身熱者

紫胡黃芩加 大便不利者蜜炒 大黃加 小便澀者燈心 木通加 煩躁者白朮 根加 痛甚者人多 白芷加

人多補肺湯 肺癆咳嗽短氣或腎水不足虛火上炎痰涎湧盛或膿血之吐

參熱湯為 小便短澀

人多 黃芪 白朮 茯苓 陳皮 當歸各一錢

山茱萸 山藥各二錢 五味子五分 麥門冬七分 寸艸各五分 熟地一錢五分

牡丹八分 姜枣煎

葶藶散 煎過食或飲酒過度肺癆致喘之安臥者得及肺癆咽

燥之渴者渴唾腥臭

甜葶藶炒 桔更 薏苡 升麻 桑白皮各

葛根各一兩 甘艸各五錢 姜水煎

紫苑茸湯 膏梁厚味飲食過度肺氣傷之咳嗽咽乾痰之唾血喘急服

痛安臥者得及

紫苑茸 犀角 甘艸各 人多各五錢 桑葉糊 經霜 款冬

百合 杏仁 阿膠 貝母 半夏 蒲黃生各七分

姜水煎

葶藶薤白散海肺湯 肺癆潰後唾膿血止之

結腫者橘葉散宜夢驚肝傷思慮脾傷積想心在願所志得ス
 经络痞澁より致ス聚結ノ梗成初巨大ク如漸ク棋子ノ如ク半年一年ニ載ニ載ニノ
 疼スス痒クス漸ク大ニ始テ疼痛ヲ生ノ痛キ則ハ解テ無ク日後腫ト堆粟ノ如ク或覆碗
 ノ如ク紫色気穢漸ク潰爛シ深キ者岩穴ノ如ク凸在者淡蓮ノ若ク疼痛心連テ血ヲ出シ
 自ヲ作シ具時五臟俱ニ衰テ四大救ロス名テ乳岩ト曰ワ凡ソ此ヲ犯ス者百人必百死是ノ
 如ク症ハ知覺若早キト夫只清肝解鬱湯或益氣養榮湯可テ患者再清心ヲ加靜
 養望無ク得無ク服茶調理ノ只為モ歲月ヲ延ク可シ若中年已後夫無キ婦人此ヲ
 得テ死更ニ尤速ナリ惟レ初生スル時急ニ艾ヲ用テ板頂ニ灸テ次日泡ヲ起テ待テ挑テ破リ
 披針ヲ用テ針入レテ四方氷蠅散ヲ條ヲ用テ板内ニ插シ糊紙ヲ以テ封シ蓋ニ十三日ニ至ッテ
 其板自ラ落ッ玉紅膏ヲ用テ肌ヲ生シ口ヲ飲ム再ニ保養ノ要アリ又男子乳疾婦人ト
 微シ異ナリ又肝胃ヲ損シ男ハ肝腎ヲ損ス蓋ハ心火房欲過度ニ肝虛血燥腎虛精
 怯血脈上行テ平ヲ得テ肝筋以テ榮養テ無シ遂ニ結腫ノ痛ハ珍湯ニ山柀牡丹用テ
 口乾渴ヲ作ス者加減ハ味丸腎氣素ヲ用テ腎氣丸ニ潰テ膿ヲ作ス者十全太

補湯懷子ノ婦乳疾有テ内吹ト曰胎氣旺ノ上冲ニ因テ陽明乳房腫ヲ作ステ致
 冥石膏故之ヲ清テ可シ亦消散ス可シ遲キト遷延日久ノ産後ト膿ヲ出シ乳汁亦膿
 竅より流シ出ス其口完ニ難シ此有テ純テ補托生肌用テ其口亦完テ易シ

乳癰乳岩者法

初起紅赤腫痛身微寒熱頭眩無ク口乾ナリ微疼者煩ナリ已成テ焮腫焮熱疼
 痛時有リ囊結腫ノ別囊裏ヲ侵シ者輕シク潰テ膿黃ヲ稠ク腫消テ疼痛漸止
 四邊痒ヲ作シ肌ヲ生レ者煩ナリ潰後膿水自止腫痛自消新肉生シ易ク膿口合テ易
 者煩ナリ初起一乳通テ腫レ木痛紅ナリ寒熱心煩吐食セ凡者逆ナリ已成テ焮熱
 紅ナリ堅硬石如ク口乾眼ヲ腫テ胸痞食少者逆ナリ潰膿ナリ正頭腐爛腫レ愈高
 ク疼ニ愈ク盛テ流血スル者死テ潰核肉色紫黑痛苦心連テ流気自深ク形体日削テ死
 牛蒡子湯 乳癰乳岩結腫疼痛新久論テ無ク但赤々膿ヲ成ル者

- 陳皮
- 山柀
- 銀花
- 日草
- 瓜蒞仁
- 黃芩
- 花粉
- 連壳
- 角針 各一錢
- 柴胡
- 青皮 各五分

酒水並食遠服ス

橘葉散

婦人孕ノ胎熱有リ内吹ヲ為シ兒乳ヲ吃スニ有リ外吹ト名ク乳結ノ腫痛ニ成ス
一ヲ致ス寒熱交作シ是ヲ者ハ惡心嘔吐ス並服ス

柴胡

陳皮

川芎

山梔

青皮

石羔

黃芩

連壳 各二錢

甘草 五方

橘葉 二十個

水煎ノ渣ヲ去リ再煎ス

清肝解鬱湯

一切ノ憂鬱氣滯乳結腫硬疼ニ至ク久漸疼ヲ為シ或胸膈利
ス肢體倦怠面色蒼黃飲食減少

陳皮

白芍

川芎

當歸

生芩

半夏

香附

台八方 青皮

遠志

茯神

貝母

藜蘆

桔梗 各三分

甘草

山梔

木通 各四分

姜水煎

鹿角散

乳癰新起テ結腫疼痛増寒熱但未タ成ラズ者効有リ

鹿角尖 三寸

山炭火ヲ用内燉リ稍紅ノ性ヲ存シ碾ノ末シ毎服三錢食後煖
酒ヲ茶鍾ニ合調服ス

回乳四物湯

當歸 白芍

熟苧 各二錢 麥芽 二兩炒

灸乳腫妙方

氣喘勞傷或寒熱調ラズ乳内忽チ腫痛ヲ生スルハ
碗一隻ヲ用ハ内ニ麩燈炒四根ヲ用十字ニ碗内ニ排勻ノ燈炒頭各露ロメ一吋許リ再ニ
麩紙ヲ用ハ一寸五分ノ瀾リ紙條ニ裁シ成シ水ヲ用紙ヲ湿シ碗内ノ燈炒上ニ貼シ麥芽紙
ト碗口ト相齊ク碗ヲ將テ腫乳ノ上ニ覆ヒ灯炒頭ヲ留メテ外ニ在ラシメ艾大圓ヲ將テ碗足
底内ニ放テ火ヲ點ノ灸ス艾尽テ再ニ添ヒ灸ノ碗口水氣ヲ流出スルニ至ル内痛止テ覺ハニ
任ハ患ニ辛者次日再灸スル一二次心消ス

瓜萎散

婦人乳癰乳癰奶勞

黃瓜萎

乳香

沒藥 各二錢

當歸

日草 各五錢

右好酒三碗ヲ用銅器中ニ於テ慢火ニ熬テ碗半ニ至リ分テ三次トシ服ス如シ乳勞有ラハ
便服ノ病根ヲ絶ツ如シ毒氣已ニ成六能ク膿ヲ化シ黃水ト毒未タナク者即内消ス

十六味流気飲 乳岩初起極腫有り故鯨棋子ノ大ク如ク痛クニ存カラス五七年ノ
 瘡ヲ成ス初便チ多ク先ラ疎シ血ヲ行チ葉ヲ服ス厚シ成テ後岩死ノ凹ル如ク人口唇
 有方如ク赤汁膿水浸淫胸腹気攻ノ疼痛ハ總^{カク}由ラ去テ新肉ヲ生シテ後漸ク收斂
 ス此病多ク憂鬱急積ヨリ生中年ノ婦人未ク破ケル者尚治ス可シ瘡ト成ル者治ス可
 ラス此方ヲ服スル宜シ

一方 乳汁通気痛ヲ作者

花粉 寸艸 王不留行 各三錢 當故 山甲 醋炒各五錢 水煎

加味神効瓜萎散 乳腫痛ヲ作シ癰毒ト成シト斂スル者

瓜萎 一箇 白芷 花粉 一錢半 玄胡 飯尾 玄胡 連壳

各三錢 桔梗 柴胡 青皮 知母 木通 山甲 各一錢

木鱉 二箇 川芎 八分 升麻 五分 水煎服

一方 吹乳腫痛忍可シ者
 升麻 甘草 白芷 青皮 飯尾 連壳 貝母

金銀卷 瓜萎 信用 橘葉 七斤 酒水煎服

一方 乳痛凡神方

細辛 飯尾 防風 烏朮 各二錢 麻黃 二錢 白芷 赤芍

菽木 桔梗 各六分 甘草 三分 酒水煎服渣ヲ以テ患處ヲ搗ス

● 妬乳 新産ノ婦未ク乳ヲ吮テ能ハス乳汁蓄結ノ血元ト相搏壯熱大渴通乳脹

硬掣痛名ケテ妬乳ト云當手ヲ以テ宿乳ヲ搗去ル可シ或ハ吮去モ尤妙ナリ并ニ貝母瓜

萎實甘草節ヲ以テ之ヲ和ス
 ● 蒸乳 初産子育ルニ因テ蒸乳ノ寒熱ヲ察ス者断乳ニ方ヲ用ユ

断乳方

熟苳 大 當故 中 芍藥 中大 川芎 小 烏朮 小 甘草 小 葵芽

炒一兩 水煎助ヲ用テ止ム然チ六内結ノ癰ヲ成リテ恐ル

● 吹乳腫痛 速ニ瓜萎實一枚連種搗爛シ甘草節一寸乳香一錢煎成ツテ温酒

ヲ加シ服ス服後側臥ノ葉先ヲ行ラシメ外南日年未ク醋ニ調敷キ手ヲ以テ之ヲ搽ル自散ス

●乳凡腫痛 敗毒散宜乳子後方用上

瓜萎根 茯苓 桔梗各六 木通中 枳實 藿香

甘草各小 水煎服

連壳飲子 乳内結核

連壳 川芎 瓜萎仁 皂角刺 橘葉 青皮

甘草第 桃仁各一錢半 水煎如消七八第天八珍湯服之

八珍湯

川芎 白芍 當歸 熟地 人參 白朮 茯苓

各一錢 甘草各五分 姜枣水煎 ●鬱久之乳内結核消之六貝母遠志香附子

柴胡青皮桔梗更加

益氣養榮湯 鬱久之乳内結核年餘消之朝寒暮熱飲食甘苦之方原瘰癧

一應用方 十全大補湯 逍遙散 水蛭散 小柴胡湯

托裏消毒散

附骨疽論

夫附骨疽乃陰寒骨之病也但人之氣血生平壯實也トキハ寒冷之過下雖邪骨之入之凡之者皆體虛之人由之夏秋露臥之寒濕內襲之或房慾之後蓋覆單薄之寒氣虛之乘之遂斯疾之成也初起寒熱交作稍之爪邪似之隨之後之臀腿筋骨痛之作之熱之紅之痛之徹之甚之者曲伸能之轉側日久之陰變之陽ト为リ寒化之熱下为リ熱甚之腐肉膿ト为リ此疽也凡之此症ヲ治之初起寒熱痛ヲ作之時便五積散之牛膝紅花ヲ加之汗ヲ發之寒ヲ散之經絡ヲ通行ス或ハ萬靈丹之亦可ナリ次之天防風湯ヲ以テ經ヲ行シ血ヲ活シ濕ヲ滲シ虛ヲ補フ又ハ尻臀ノ部ニ生ル者リ漫疹ヲ作者内托老活湯腿内膝股之近之漫腫木痛之者内托老活湯腿外側内托酒煎湯初起通ノ人多敗毒散之木瓜牛膝續木紅花ヲ加之用之虛之者十全大補湯之老活防己牛膝ヲ加之用之已成之膿ト作之ト飲之者附子八珍湯膿成リテ脹痛之者即チ針之膿稠ノ黃ニ体實之者十全大補湯膿清ク色白ク体虛之者保元大成湯食少ク体倦之者香砂六君子湯脾虛寒熱之者補中益氣湯調理可ナリ又凡濕相乘

元之症有り初起寒熱交々作り次ニ腿傳テ腫レテ痛ヲ作ス其形光亮微紅赤熱腫痛
 之ヲ按シ泥ノ如ク使テ起ラス當散枯痛湯宜シ或ハ茯苓佐桂湯間テ萬靈丹ヲ服ス之ヲ和ス
 以上ノ症皆元氣不足中ヨリ来ル候テ損脾泄氣敗毒ヲ用可ク寒涼小ノ法ヲ禁テ如シ候
 テ用ハハ心氣血氷凝ヲ致シ内肉凝腐シ日久メ化メ汚水敗膿トナリ流シテ禁テ終ニ死ス又房
 慾勞傷寒熱互ニ交シ氣血乖違経脈橫解病ヲ及シテ日ニ深ク以テ斯疾ヲ為ス者其患大
 腿漸々腫レ冬瓜ノ如ク上脘腹ヲ過キ下ハ足底ニ連テ牽連シ漫腫皮色紅チテ日久メ潰膿也
 白ク腥穢腫仍消ス痛仍減ス元氣日ニ衰テ身体縮小唇舌乾焦ニ便枯秘諸症効ヲ
 ス飲食進マズ終ニ不治トス又鶴膝凡有リ乃足ノ三陰虧損之症初起寒熱交々作り
 時ニ亦五積散ニ牛膝紅花ヲ加用ス或ハ萬靈丹汗ヲ発シ可ク如シ汗後腫痛仍消減ス此
 陰寒深伏スナリ大防瓜湯ヲ経絡ヲ温ム重テ者ハ氣ヲ膝眼ニ元ヲ灸ス敷ニ琥珀膏ヲ用テ
 モ可ク漸々効ヲ取ル以上ノ法ヲ用テ俱ニ効有ラズ者ハ終ニ痼疾トシテ必強禁テ之ヲ消シ
 可ク漸々効ヲ取ル可シ終年又重テ轉メ輕キ就ク可シ移步行履尚圖ル可シ
 ●薛己云ク若膿已ニ成テ針メ毒ヲシテ内ニ侵ステ得テ生ヲ帶テ針ヲ用モ亦妨ナシ火針

ヲ用モ亦痛マズ且ツ斂合ヲ勿ラシム其隔蒜灸能ク毒ヲ解シ氣ヲ行シ葱熨テ法ハ陽氣ヲ
 助テ壅滯ヲ行ス此方書見ヘスト余氏余常用テ大効有リ其功尽ク还可ク惟氣血虛
 脱ノ者慮ヒス

五積散

凡寒濕毒經絡ニ客シ筋骨痛ヲ致シ或腰脚酸疼或遍身拘急或

發熱惡寒頭痛者

- | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|-----------------|--------|--------|
| 蒼朮 二錢 | 陳皮 | 桔梗 | 川芎 | 當散 | 白芍 各一錢 |
| 麻黃 | 枳壳 | 桂心 | 干姜 | 厚朴 各六分 | 白朮 |
| 半夏 | 甘草 | 茯苓 各四分 | 水煎姜ヲ心頭痛惡寒者連翹類為頭 | | |
| 三根ヲ加フ汗多ク効トス下部ハ木瓜牛膝ヲ加フ | | | | | |
| 内托羌活湯 | 尻臀癰疽附骨疽堅硬腫痛 | | | | |
| 羌活 | 黃柏 | 防瓜 | 飯尾 | 藜蘆 | 肉桂 各一錢 |
| 一錢五分 連壳 | 甘草 | 蒼朮 | 陳皮 各六分 | 紅花 五分 | 酒水煎 |
| 當散枯痛湯 | 濕熱下注腿脚着ヲ生シ赤腫痛ヲ作シ或腰脚酸痛或四肢遍身 | | | | |

重痛或下部頑麻痺手多作不或血汎

羌活 當歸 防風 茵陳 蒼朮各二錢 苦參 升麻

白朮各七方 葛根 甘草 黃芩 知母 沢浮

猪苓 人多各五分 黃柏各三分 水煎服

内托芪柴湯 濕熱腿内膝股近久癢患或附骨癢初起腫痛此大陰厥陰各之

黃芪 當歸 柴胡 木瓜 連朮各二錢 羌活 肉桂

生苻 黃柏各五分 姜酒水煎

内托酒煎湯 腿外側癢者

黃芪 當歸各二錢 柴胡一錢五分 連朮 肉桂 大力子各一錢

升麻 黃柏 甘草各五分 水酒各半煎

茯苓佐經湯 腰腿癢疼痛頭目昏眩吐不食物膈不利心煩吐悶亦

人疝 茯苓 陳皮 半夏 白朮 蒼朮各二錢 藿香

沢浮 甘草 葛根 柴胡 厚朴 木瓜各五分

姜水煎

附子八物湯 久愈不或房慾後寒身受少腫塊生遍身腿膝疼痛

當歸 芍藥 川芎 熟苻 人多 白朮 茯苓

甘草 附子 肉桂 木香各小方 姜水煎

附子六物湯 骨筋煩痛四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫者

附子 甘草各一錢 防己 白朮 茯苓各八分 桂枝五分

姜水煎

麻黃佐經湯 腰足掌痺關節重痛增寒寒熱無汗或自汗惡風頭痛

麻黃 葛根 羌活 防風 蒼朮 茯苓 防己

各一錢 桂心 細辛 甘草各五分 姜水煎

小續命湯 身熱患心所煩疼或脚轉筋或腫或腫或膝腿頑痛或時

緩從入隨或遍身百節掌痛或小腸疝氣攻冲

心

川芎 白朮 防己 人多 防己 附子 麻黃

桂心 黃芩 白芍 各一錢 甘州 五分 姜水煎

大防己湯 兩膝痛在久下膝愈大之腿愈因之鶴膝下之數症方

此方非多治之能只又附骨疽皮色變大之腿通腫疼痛奈之上下無及痢後脚

痛緩弱行多之能只腿膝腫痛

人多二錢 防己 白朮 附子 當歸 白芍 川芎

杜仲 黃芪 羌活 牛膝 日州 熟地 各一錢

姜水煎

檳榔散 凡濕流注之脚膝酸痛或之麻痺不仁吐不食

檳榔 紫蘗 木瓜 香附 陳皮 大腹皮 各一錢

木香 三錢 羌活 五分 姜三斤葱白三茎水煎

獨活寄生湯 肝腎虛弱凡濕內攻足膝緩縱或膝痺掌重

獨活 二錢 茯苓 川芎 當歸 防己 白芍 細辛

人多 桂心 杜仲 秦艽 牛膝 熟地

桑寄生 各一錢 甘州 五分 姜水煎

三因勝駿丸 元氣不足真氣虛弱及諸虛寒濕之氣侵髓之手足拳掌

脚指脚面連り拘急走注疼痛筋脉伸之行步隨之常服之真氣之益筋骨

之壯之髁髁類之累之皮膚之滑之一切足弱鶴膝凡症膝愈之大小腿愈之細並治之

附子 一枚 當歸 天麻 牛膝 酸棗仁 熟地黄

防己 各二兩 木瓜 四兩 蛤蜊 一兩 麝香 一錢 乳香 木香

沒藥 羌活 甘州 各五錢 棋脂 萹蓄 肉蓯蓉

破故紙 巴戟 蒼朮 各一兩 右末之蜜丸相子大十每服七十九

於鹽湯溫酒下之病近者七日年深者半月之効之見也

健步丸 生平好之飲之少食多酒多之脾肺之傷之膝中力與之伸之屈之能

之屈之伸之不能之膝脊腿脚沉重行步艱難

苦多酒洗 防己 酒浸微焙 羌活 柴胡 滑石 炒 姜根

甘草 各五分 防風 肉桂 各三分 沢瀉 二兩半 川烏頭 二錢

右末酒糊丸九桐子大日每服三十丸温酒送下

大腹子散 凡毒脚氣上攻寒熱交作脚筋煩疼心神壅悶

大腹子 紫葳 木瓜 羌活 荆芥 赤芍

木通 獨活 桑白 青皮 各五分 枳壳 一錢 甘草 三分

姜五片葱白三莖煎服

加味救毒散 湿熱毒氣流注脚踝微赤腫痛寒熱瘡癤如人自行惡風或汗

惡寒或飲食不聞下痢惡心

人多 羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 桔梗

茯苓 枳壳 甘草 木瓜 蒼朮 各八分

姜水煎便秘六分大黃加

千里健步散 遠行兩脚腫痛若之月用六千里行可輕便是妙

細辛 防風 白芷 草烏頭 各小分 右末酒糊丸九

如底乾只即水以微濕過茶搽脚着行走自力吃藥不再腫

雷火神鍼 凡寒濕毒經絡襲患為漫腫頭皮膚色黃吳筋骨疼痛起坐艱

難安臥

斷艾 三匙 丁香 五分 麝香 二分 茶葉 煎艾下供搽和先夾紙將筒存

指如尺展大艾葉用盞定收用用臨消山紙七層以平患上放針

將頭點着患對紙向捺定痛待方針起不病甚者再復一次

七日後火瘡大癢自取

追風逐濕膏 凡寒暑濕相傷以骨節疼痛筋骨痠痛步履艱難或麻木濕痺

羌活 川烏 草烏 瓜藤 半夏

南星 羌活 草麻子 桂枝 各三兩 獨活 細辛

當歸 白芷 蒼朮 大黃 各二兩 以上各切咀瓦上葱汁

姜汁各二碗用茶拌先浸一宿次日香油八分用茶同鍋內入慢火煎葱

姜汁乾下瓦上時報是油方茶下相煎渣枯步度細細瀉清每油

一斤飛過炒丹十兩下ノ准配トス用ニ再煎油ヲ將ハ鍋内ニ煎滾シ油以テ水ニ滴テ
 珠ト成シ散ヲ佳トス方ニ黃丹ヲ下シ徐々ニ攪入テ其膏已ニ成テ再碾淨松香淨末一斤四
 兩下シ再ニ同熬化シ鍋ヲ取リ下シ盆ヲ以テ頓キ穩メ再ニ乳香木香胡椒野粉末各二兩
 芥子末四兩下シ漸ク入テ攪勻シ鉢内ニ傾ケテ盛リ貯テ漸ク換湯ヲ用頓化後段ニ攤貼シ七
 日後諸瘰癧瘡ニ可シ百各百中

黃連消毒飲 附骨疽神方

- | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 黃連 | 各五分 | 生芎 | 各五分 | 知母 | 各五分 | 獨活 | 各五分 | 防風 | 各五分 | 連翹 | 各四分 |
| 黃芩 | 各五分 | 黃柏 | 各五分 | 薑朮 | 各五分 | 防己 | 各五分 | 桔梗 | 各五分 | 甘草 | 各五分 |
| 黃芪 | 各五分 | 人參 | 各五分 | 陳皮 | 各三分 | 檀木 | 各五分 | 沃渾 | 各二分 | | |

水煎服

瘍科階梯卷之上終

