



中武9  
399  
卷2止

茂文庫

瘡科階柳巻之中

信陽 隅東 佐野開芳子 献

撰

腸癌之論



夫腸癌、湿熱瘀血小腸流入テ成ル又由來三ツ有リ一ツ、男子暴急奔走  
腸胃傳送舒利平然ハス敗血汚氣壅遏メ成リ二ツ、婦人產後休虛ニ臥スアモ  
多起坐オジス又坐艸艸難カツ用ナ大過育後敗棄ヲ逐フテノ失シ敗血腸胃  
厚積スル丁ヲ致シ結滯メ成ル三ツ、饑飽勞傷重物ヲ擔負シテ腸胃ヲ傷ナフ致シ  
又醉飽房勞精カツ過傷シ或生冷並進テ以テ元血無違元ナフ致シ運動  
疾生シ多ハ腸胃痞塞ニ致シ運化通セズ乞血凝滯メ成ル總テ初起外症癰也  
要凡脈芤々數皮毛錯縱腹急シ漸ク脹レテ之ヲ按セ急痛ニ大便墜脹小便淋滯  
淋如是三事者ハ脹突ニ腹脹シ轉側モ水聲古リ此木並見ルトキ内癌已成ル  
初起未だ成ル時小腹微クトノ痛ヲ作シ嚴トノ奔豚似タリ小便淋漓互者大黃湯

テ下ス瘀血去尽、半自安體虛脉細散テ下元者活血散瘀湯ヲ和利ス己ニ成テ腹疼  
痛脹滿不食便淋刺痛者薏苡仁湯腹濡ノノ痛小腹急脹時々脹ヲ下ス者毒赤芍解  
セナリ牡丹皮湯ヲ用加シ膾脅コリ出テ腹脹除カズ飲食減少面白ク神勞スルハ  
此皆氣血俱ニ虛スハ珍湯、牡丹皮、黃芩、五味子ヲ加フ如シ積龍製日已久、因循トノ此忘フ  
議ニノ悞テ脹痛ト作ナ之ヲ治ス以テ毒内藏ヲ攻ルヲ致、陽胃傷ヲ受テ或陰寒覆  
爛致シ腐黽黑班色敗レテ膾ナク毎汚水ヲ流シ腹ヨリ陰連心痛煩躁止ム身  
勢口乾氣憊食多ク臥房進ミ難キ者俱ニ不治トス己ニ成リ小腹脹テ坚硬小便數  
々利セスニ脉洪數ナル者隙ナリ己貴テ時々脹ヲ下シ裏急後重日夜度ナリ疼痛減  
天サル者ハ重シ遺後膾脹臭穢或、敗水ヲ流シ渴疾、虚熱更不食者反ス孫真  
人云、腸癆ノ病タル小腹重強ニシ拘只痛ミ小便淋、加ク時々汙出テ復重寒シ身皮  
甲錯腹皮急ク癰ニ如ク甚キ者、腹脹大轉側ス、水声有リ或、篤脅脹ヲ生シ或  
膾脅引出テ或、大便ヨリ下ル蓋シ、情飲食、致ス所ナリ、脹満緊ナル者膾未タ有ラス  
大黃湯ヲ下ス脈洪數ナル者己ニ膾有リ薏苡仁湯ヲ排ス小腹疼痛少便利サル、膾

壅滿ナリ牡丹皮散之ヲ主ル若大便或、腑間膾ヲ出ス者治吳内鍾ニシテ腸癆ノ病タル散夢  
可、效馬糸ハ腸斷ソ死人故、是ヲ患ル者其坐臥轉側徐緩ナル、冥ク時ニ少ク薄粥ヲ飲ミ  
及ハ珍湯ヲ服メ其元氣ヲ固メ静養調理メ、厥久其生ヲ保全ス可シ

大黃湯 腸癆小腹堅硬掌ノ如テ熱シニシテ按セハ癰肉色故ノ如ク或燃赤微腫小  
便頻數汗出テ憎寒脉緊實ニシテ力有リ日淺ノ未タ膾トナラバ  
大黃炒 朴硝各一錢 牡丹皮 白芍子一本或要仁作 桃仁各二錢

水並溫服

活血散瘀湯 產後惡露尽、或、金後瘀血痛ヲ作、或、暴急奔走或、男子  
杖後瘀血腸留ニ流注シ痛ヲ作シ漸内癰ト成リ及腹痛大便燥ノ者  
川芎 白芍 赤芍 薏苡仁 牡丹 桃仁 各二錢

水並溫服

活血散瘀湯 產後惡露尽、或、金後瘀血痛ヲ作、或、暴急奔走或、男子  
杖後瘀血腸留ニ流注シ痛ヲ作シ漸内癰ト成リ及腹痛大便燥ノ者  
牡丹皮散 腹癆腹濡ニノ痛手ヲ以テ重ノ梅で止ミ或、時々膾ヲ下ス

人乞

牡丹

白芍

本草天麻有

茯苓

黃芩

薏苡

桃仁 白芷 當歸 川芎 各一錢 甘艸 官桂各五分

木香三分 水煎服

七賢散 腸瘻潰後疼痛淋瀝已止或ハ精神減少飲食味無色痿黃四股力ナリ自汗盜汗睡臥寧カズ

茯苓 黃芩 山茱 牡丹 山蕷萸 熟芍 人參各一錢

隈姜大車並失笑散 產後心腹绞痛或ト欲シ或ニ惡竅ニ迷ヒ人更ノ省ニ及尋常ノ

腹内ノ瘀血或積血痛作シ又婦人血氣病ヲ作ス聖藥ナリ男子ノ諸疝疼痛止モルヲ治ス

五靈脂 蒲黃(俱炒ホシ)右末トノ毎服三錢醋一合調稠ノ熬半數滾テ水一鍾ヘレセ分ニ並シ食前暮テ運子服ス醋ヲ用テ丸ト為シ毎服二錢管醋湯テ下スモ亦妙ナリ

排膿散 腸瘻小腹脹痛脉滑數ノ裏急後重時々膿ヲ下ス

黃芩 當歸 銀花 白芷 山甲 防風

川芎

芍仁各一錢

右末ノ

毎服三錢蜜湯ニ調下添水煎服モ奇

瓜萎子湯 產後惡露不尽或經後瘀血腸胃停滯ノ痛ヲ作シ縱ニ瘻ニ非不

モ之ヲ服ノ亦効アリ

薏苡仁四錢 桃仁 牡丹皮 瓜萎仁各二錢 水煎服

薏苡仁湯 腸瘻腹中疼痛或脹滿不食小便澀滯婦人產後多々此病有リ縱ニ瘻ニ非ストモ之ヲ服ノ尤効有リ

薏苡仁 瓜萎仁各三錢 白芍一錢 牡丹 桃子各二錢

水煎服

梅仁湯 腸瘻壅痛大便秘滯尤ヨ治ス

梅仁九錢 大黃炒 牡丹 芒硝各一錢

犀角鏗末一錢 冬瓜仁

三錢 水煎犀角末ヲ服ス

臓毒之論

夫臓毒ハ醇酒厚味勤勞辛苦蕪弊肛門流注シ結ノ腫塊ヲ成ス其病内外  
別虛實ノ殊タル古リ外ニ発生者多、实多ハ熱脉數ニノカ有リ肛門突腫大便秘  
肛門寬ナミ小水利セキ甚キ者肛門肉浸テ施ノ如ク孔頭緊閉ス此ヲ外発ト之陽ニ屬  
治シ易シ西煩清涼飲内消沃雪湯ニテ大小ニ便ヲ通利ス痛甚シ者珍珠散入中白散  
ヲ搽ス膿張痛忍者ハ之ヲ針ス内ニ発生者陰虛ニ屬ス湿弊肛門渗入内藏結腫  
ノ刺痛鉗ノ如ク小便淋瀝大便虛秘咬啜疾ヲ生シ脈數虛細寒、秘往來夜尤甚  
タシ内発ト之陰ニ屬ス治シ難シ西物湯ニ黄柏知母花粉甘草ヲ加テ六味地黃丸ヲ  
用ヒ内藏膿出ルラ候テ安シ又生平情性暴急縱膏梁ヲ食ヒ或ハ補術ニ兼子  
蘊毒藏府ニ結シ火焚肛門ニ流注ノ結ノ腫ヲ為ス其患病小腹ニ速リ肛門墜  
重ニ便毎違或泻シ或秘シ肛門内触シ経络ヲ串爛シ汚水流过大孔奈ントモス  
片無ク飲食不食渴ヲ作ス、甚シルソ此ヲ犯セ其生右半ヲ見ルト得ヌ又虛勞  
久嗽疾火結腫肛門栗ノ如キ者破ルレバ必漏ト成ル氣血ヲ瀝尽ノ必ス也此二症ハ乃  
内傷ノ故ナリ某ノ療スベキニ非ス治ス可ラズ

黄連除湿湯 蔓毒初起湿熱肛門ニ流注シ結腫疼痛水水利セ大便秘结  
身熱口乾脉數力有リ或裏急後重

黄連

黃芩

川芎

當歸

防風

蒼朮

厚朴

枳壳

連翹

各一錢

大黃

芒硝

水二鍾ヲ八分煎ス

水煎

水煎

水煎

水煎

水煎

涼血地黃湯 蔓毒已成未成ラス或腫ニ腫レス肛門疼痛大便墜重或泄  
或ハ秘シ時ニ常リ便血頭暈眼花腰膝力無ク

川芎

當歸

白芍

生芍

白朮

茯苓

黃連

地榆

人參

山梔

天荳粉

甘草

水煎服

內托黃芩散 蔓毒已成紅色光亮ニ膿ヲ作シト欲シ必内消セス此藥ヲ服  
メ潰膿ス可シ

川芎

當歸

陳皮

白朮

黃芩

白芍

山甲

角針 各一錢 實郎 三分 水煎服

黄連解毒湯 好シテ法酒ヲ飲ミ從ヒ膏粱ヲ食積熱流シテ大腸ニ入り肛門  
結ノ腫ニ成シ疼痛刺キ鉗如ク坚硬石ノ如ク

黃連 一錢 黃芩 黃柏 柏子各二錢 水煎服

金液戊土丹 腸毒、驕奢出ツ情性急暴、慣テ烈火猖狂思願、如ナラス水已  
枯竭シ火炎池々又蔚ス爵ス爵又旺ス以肛門結腫ヲ致シ毒内臓ヲ攻シ扁芝刺、如ク熾  
在火炕加ク臭水淋漓充者ヲ治ス 方、補遺見工

珍珠散 肛門腫泛テ施ノ如ク紅紫急脹坚硬痛極

本方ニ冰片ヲ加エ研細シ猪脊髓ニ調ヘ患上塗ル早晚日三次 方下府見工

內消沃雪湯 癰背并内癰尻臀諸腫大小腸癰取門藏毒初起但未ク膿出其  
堅硬疼痛忍可ナシ者

青皮 陳皮 乳香 檀香 貝母 連壳 黃芩

當歸

甘草

白芍

白芷

肉桂

羌活

甘草

連壳

黃芩

山甲 銀花 皂針各八分木香四分 大黃 三錢 水酒各半煎

四頤清涼飲 初起便結ノ肛門一本突ニ作ル 穿于疼痛  
連壳 茄菜 卷活 防風 當歸 山梔 甘草

各一錢 大黃二錢 次厚一錢半 右灯炒二十根水煎

人中白散 肛門甚痛白

人中白二兩 狹兒茶一兩 黃柏 薄荷 青黛各六錢 冰片五分

細末ノ蜜ニ調塗ル 一日敷之

### 序瘡之論

天瘡乃素ヨリ湿熱ヲ積ミ矣、燭ヲ過食シ或ク坐丙丁テ血脈行テ又七情因テ生冷ニ過傷  
及擔輕負重力ヲ竭ノ遠行シ先血脈横経絡交錯又或酒色過度腸胃傷ヲ受テ以  
泻氣瘀血肛門流注スルノ致モ俱ニ餘熱痔ヲ發ス此患心老幼男婦ヲ論セ皆然リ蓋シ肛  
門内ニ生長十石リ又肛外ニ寒熱ノ有リ治内外方ツ各自ニ堤防ス在者蓮老峰窠翻老  
雞冠菱角珊瑚ホウ状ノ如ク小ナル者櫻珠覓尾牛奶奶心梗桃覓肉ノ形如シ故ニ積毒深キ

者其形異ニテ頑悪ニ凌者、其形正ニメ平常久キハ崩潰ノ漏ト成ル新キ寸ハ墜腫刺  
疼毛辛者糞孔ヨリ出テ血瘀リ流生氣普ニ傷ニ所有リ形容漸ク削リ所有リ若早ノ治  
ササク終ニノノ傷ニ常治法因テ多針刀砒硝線墜ホノ法ヨ用ニ思者之ヲ受テ苦楚此  
ヲ聞キ因循トメ都ア医官ニ申此症ヲ療ルニ菜味数呂火ニ從テ煅煉ス性即死和百ヒ  
驗古リ此方法由来異矣凡内痔ヲ療ル者先通利ノ菜ヨ用臟府ヲ蕩滌シ然ニテ  
後喫痔散ヨ用塗ア肛門ニアル、トニ時内痔自然ニ泛出シ即葱湯ヨ用洗淨ノ菜  
ヲ搽ル輕干者七日重干者十日其痔自然枯黑乾硬ノ枯葉ヲ停坐其時痔邊  
裂縫アリ膿ヲ流シ起痔湯ヲ換用テ日ニ洗干一次痔落ル後待テ換テ生肌  
人散鳳雛膏木ノ菜ヲ搽テ肌ヨ生シロヨ歛ム虚者、補菜ヨ氣服ス其古半日ニノ自  
全丸可シ外痔ハ消毒散ヨ用並シ洗フ隨テ枯痔散ヲ用ヘ内痔搽法ヲ照シ之ヲ  
用ニ首尾終至リ異志ト無ニ完口百日房ニリ乃吉シ又穿腸久漏至リ此レ別三  
方有リ亦後俱フ以テ深患者ノ之ヲ服ルニ至ル又針カヨ用ヘ掛線ヨ用ヘニ効芥  
ヲ拾フカ如キ耳凡人九竅中ニ於テ小肉突起モ百リ皆痔トニ鼻痔眼痔牙  
痔上ニ

痔其形一ナズ又五痔者リ肛邊肉珠ヲ発露シ状鼠奶奶加ク時ニ膿血ヲ滴リ瀉  
名テ壯痔ト云ア肛邊瘡ニ生シ腫ニ突出シ一日數枚膿瀉テ即散ス名ニ壮痔ト  
ニテ腸口顆タトメ瘡ヲ完シ且痔ノ且痛ニ血出テ、淋漓ノ名ニ麻痔トニテ肛門内結膜  
血者リ寒熱往來シ溷ニ登リ脱肛ス名ニテ腸痔ト云ア忍忍遇則起リ肛門腫痛  
元散充則ヘ愈ル名ニ氣痔ト云ア此ニ五痔ト云ア又飲酒遇フ毎ニ發動シ瘡腫  
痛ノ血ヲ流ス此ヲ酒痔ト云ア便充毎ニ血出テ、止マヌ久ノ愈不穴ラ空穿ナ漏ト成ル名ニ孟  
痔上ニ

防風秦艽湯

痔瘡新久ニ論ヨリ肛門墜重便血瘀ヲ作シ

防風

秦艽

當歸

川芎

生芻

白芍

茯苓

槐角

白芷

蒼朮各六分

甘草

柏子

地榆

枳壳

提肛散

氣虛肛門下墜及脫肛便血脾胃虛弱木ノ症

川芎

白朮

白朮

人參

黃芩

陳皮

甘草各二錢

升麻

柴胡

條芩

黃連

白芷

水煎服

服入

加味四君子湯

痔瘡瘻漏下血止之面色痿黃心忪耳鳴脚弱氣乏一切脾虛

口淡ノ食味ヲ知ズ又中寒虛ノ血ヲ根スルノ能ワス便血禁セアルヲ治ス

人多

白朮

茯苓

扁豆

黃芩

甘艸

姜棗煎

當歸郁李湯

痔瘡大便結燥大腸下墜血ヲ出ノ苦痛忍テ能ワス

當歸

郁李

次浮

生芻

大黃

枳實

蒼朮

秦艽

麻子仁

五分包角一更

水煎服

芎藭飯湯

便血或失血過多兼ニ婦人產後血虛煩熱頭暉昏暈盜汗不危

川芎

三更當歸

酒杵五更

水煎服自汗牛足冷者人多二更ヲ加フ

三黃二地湯

腸風諸痔便血止及白色瘻黃四肢力無少

生芻

一錢半

蒼朮

厚朴

陳皮

黃連

防

黃柏

黃芩

白朮

人多

各一更

甘艸

每服

當歸

次浮

生芻

大黃

枳實

蒼朮

防

鳳

次浮

地榆

六分

烏梅

二個

水煎服

粟殼散

諸痔疼<sup>ノ</sup>作シ及腸風下血諸案皆用者

粟殼

蜜水拌炒一更

當歸

陳皮

秦艽

生芻

熟米

一升

黃柏

黃芩

人多

蒼朮

升麻

各六分

荷葉

七個

甘艸

五分

地骨皮

一升二分

水煎服

或末

トノ

每服

二升

酒

調服入

洗痔枳殼湯

痔瘡瘻漏下血止之洗テ痛自消ス

癩蝦蟆艸

二兩

枳壳

二兩

河水

二瓢

二味ヲ入レ並シ微滾先薰シ後洗フ良

久ノ湯ヲ留メ再ヒ焚薰シ洗フ甚者三次

即消ス洗淨ノ後茶ヲ搽ル當シ

五倍子散

諸痔疼痛堅硬疼痛忍テ難ク或臓毒肛門泛出腫硬收斂

示効有リ

五倍子

入一小孔ヲ敲キ陰乾ノ

癩蝦蟆艸

用揉碎シ

五倍子

内填塞シ

紙ヲ用孔ヲ塞シ湿紙ニテ包煨ノ元時許取出シ冷ヲ待テ紙ヲ張シ細末トシ毎

ニ毛輕粉三方氷元五厘ヲ加エ共ニ研極シ煎湯ヲ待洗清ノ後此ヲ用乾シ痔上  
搽ル即睡テ動キ勿レ其腫痛即除ク凡外痔三方ヲ用搽シ洗フ亦根ヲ除可シ永  
ク丹巒又極効極妙

田螺水 痔瘡坚硬痛作シ及脫肛腫泛ノ救ス

大田螺一枚 氷元五厘研末 尖刀ヲ用螺蓋ヲ挑ケ起シ氷元ヲ將テ内ニ入平ニ  
放テ元時許リ螺ノ漿水ヲ渗出テ待テ雞翎ヲ用卫黑上ニ蘸シ搽勤々ニ掃  
直腫自然ニ消散ス

喚痔散 凡内痔ヲ醫藥出スノ得スハ此菜ヲ用肛門ニ填入ス直痔即出

草烏頭一枝

蠍皮一枝燒告度

枯萎五支

食鹽炒三支

鹿麝香五分

氷元二分

右碾末シ先溫湯ヲ用洗淨ノ隨テ津唾ヲ用菜三枝ヲ調入肛門ニ

煩火炎時痔即出テ、菜ヲ去リ護痔膏ヲ上ス當シ

護痔膏 嘴痔散ヲ用痔出ノ後先ツ此菜ヲ用四邊ノ好肉ヲ圍護ス

白芨

石羔

黃連各三枝

氷元

麝香各二分

右細末シ雞

老子清ニ調ヘ膏トナシ四邊ノ好肉ヲ護シ方ニ枯痔散ヲ上ス

枯痔散 痔瘡泛出シテ即此菜ヲ用ナニ愈ル年淺者八五七日年深者八

八九日痔乾テ黒キヲ待テ後此菜ヲ用ハス毎日落痔湯ヲ用之ヲ洗フ

白芨二两

蟾酥二枝

輕粉四支

砒霜一两

天靈蓋

天靈蓋青綠ヲ用水浸シ

内ニ浸シ候

右共ニ細末シ小新銅鍋内ニシテ麻磁碗ヲ用密ニ蓋シ鹽泥ニ封固炭

火ニテ煅テ二炷香至リ冷テ待テ取リ開キ菜ヲ將テ研ホノ痔上ニ搽ル毎日辰

午申三時温湯ヲ用洗淨上菜三次上七八日至リ其痔枯黑坚硬菜ヲ住テ裂

達シ其自落ヲ待テ換テ起痔湯ニ洗フ

起痔湯 諸痔枯落ヲ上テ後黑色坚硬裂達古ル此菜宣シ

黃連

黃柏

黃芩

大黃

防風

荆芥

梔子

槐角

苦參

甘草各二兩

朴硝五分

己上ノ薑分ニ三次ト

作シ水ヲ用前シ洗ヘ痔落後ヲ待テ生肌散ヲ搽ル

生肌散 枯落上元ノ後脫落孔數枚者此ヲ用搽ス

乳香

没藥 合一兩

海螵蛸 水煮五錢 黃丹 飛炒四錢 赤石脂 煅七錢

龍骨 煅四錢 血竭 三錢

熊胆 四錢

輕粉 五錢

水元 一錢 麝香 八分

珍珠 殻二錢 共研キ細末シ磁礪ニ收メ貯ヘ早晚ヨリ搽半二次膏ヲ以テ塗漸々効テ平ニ

人中白散 諸痔腫痛堅硬墜重脫肛ホノ症先ツ温湯ヨ用テ洗淨ソ隨テ後患ヒ上ニ搽ル助臥ノ動クスノ勿レ其腫痛漸減此常ニ痔ニ便有リ方ハ職毒甙三品一條鎗 大八腫痔漏凡菜線ヲ用痔孔内ニ挿入ス早晚ニ次初時毎次三條ヲ挿入西口ノ後毎次挿菜五六條上七八日至リ菜力満足シ痔紫黒ニ變ス方ニ挿菜ヲ住ムト痔血邊裂縫體ヲ流ラ候フ十四日ニ至リ期滿チ痔落テ甘艶湯ヨ用洗淨ノ換テ鳳雛膏或玉紅膏ヲ搽テ俱ニ肌ヨ生シ歎收可也虛弱者營養ヒ脾ヲ健ニルノ菜ヲ兼服ス日取隱當ナリトス大抵一色人能ク痔取ル者皆此方ニ其菜ヲ輕ノ無ツ可ヌ

生肌鳳雛膏

雞卵

煮熟ノ白子ヨリ黃ヲ用エリヤ面箇銅杓内ニメ油ヲ敷シ麩内ニ

傾ケ入レ約五、油三钱、輕粉ノ細末一钱、乳香、血竭、龍骨末各五分ヲ加エ共、油内不和シ勾ヘ毎日早牛晚雞翅ニテ患口内ニ蘸シ塗リ膏ヲ以テ蓋イ凡ヨ避ク深者半月ニテ完ス可シ

煮線方 諸痔及五癰六瘤凡ソ蒂小ノ頭面大ナル者此線ヲ用其患根ヲ撲殺ク

自効有リ

莞蒼 五錢

璧錢 二錢

白色ノ細扣線三錢ヲ用ヘ一味ト同ク水一碗ヨ用ヘ小磁礪内

盛リ貯ヘ慢火ニテ煮湯乾クニ至ルヲ度トス線ヲ取り陰乾シ凡前患ニ遇ハ線一根ヨ用ニ患大ナル者ニ根雙扣繫根蒂而頭ニ繋リ留白ニ漸ク緊シ其患自然ニ此紫黑水冷ノ弊セズ度トス輕者七日重者十五日後必枯落ス後珍珠散五錢半舟見工ヲ用テ

口收ム至妙ニ

臘連丸 寄新久論互丁無ク但舉發便血痛ヨ作シ肛門墜重ナル者

黃連 漬末八兩 公猪大臘 尽頭一段長尺守 温湯洗淨ノ通ホヲ將テ灌テ臘

内入兩頭ヲ線ヲ以テ孔リ緊ノ煮酒二行半ヲ將テ砂鍋内煮酒乾多用度  
ト大臍菜取リ起共搗テ泥如ク如ク菜爛ハ再晒す一時許リ復搗テ丸ノ桐子大サノ  
加ク毎服七十九空心温酒三手送下ス久服之根ヲ除ク

胡連追毒丸 疽漏遠近拘ラス漏者リ陽通シ汚孔ヨリ出瓦者先此丸用

膿毒ヲ追ニシ後菜ヲ服ス自然ニ効ラ取ル最隱ナリ

胡黃連 姜汁拌炒一兩刺蝟皮炒黃末一兩鹿麝香ニ合 軟飯丸トシ麻子ノ  
大サ毎服一丸酒下服菜後膿水及多是菜カ到也惧ルヲ勿レ  
漏皆効有リ

黃連開管丸

胡黃連二兩 川山甲 麻油内煮黄色石决明 煅 槐花 微炒各五錢

煉蜜テ丸シ麻子大サノ如ク毎服一丸空心清半湯ニテ送下ス早晚日ニ二服重  
西四十日ニ愈此方針刀掛線ヲ用バ若楚ヲ受ク誠ニ痼疾ヲ起テ良方也如シ

漏血邊硬肉突起瓦者蚕齒二十箇ヲ加テ炒末シ菜中ニ和シ入此遍身諸

消毒散 外痔ヲ洗フ

連壳 銀花 忍冬 防風 茄荷

黃連 下防 己 黃芩 甘草

灸法 外痔瘡人形如芋子治艾用ヘ灸五年七壯痔瘡入水出不愈

刀針法 漏孔小丸故膿水出瓦ノ愈半年先ツ刀針ヲ以テ切り刑キ孔ヲ開キ  
膿血出ノ膏ヲ貼ス患人切刑ヲ恐ル者砒石ヲ用テ破可シ

當歸連壳湯 痔漏治ス

當歸 連壳 防風 黃芩 荆芥 白芷 菖蒲

生芉

山梔 乌梅 束一枚

水煎服

消毒百應丸 痔漏瘡并臍毒

蒼朮

黃柏

槐花

當歸

皂角

銀杏各四兩

右分四分ト作シ每分水七碗用前ノ皿碗ミリ盃ヲ去り菜汁ヲ留矣煎二行

ヲ浸す一宿。次日取出シ篩内に安て晒乾。此ノ如クスリ四次ヲ以テ水漫シ晒尺二クシテ度よス。大黄ヲ將テ細末トシ麵糊ミルトシ梧桐子大ツノ如ク毎服六十四丸白湯半升入厚味胡椒燒酒ノ類ヲ忌ム。

釣腸丸 新久諸痔肛邊腫痛或瘡ヲ生ノ養食ノ時膿血有ルヲ治ス又腸月下血及脱肛

瓜萎ニ面燒炭存性 刺蝟皮ニ菌刺礮内燒存性 白荳桔二面白雞冠老薑微炒

胡桃仁十五個不油者燒存性 錄巻桔

白附子生

南星生

訶子

煨 半夏 枳壳炒

附子生各二面

白附子生

南星生

訶子

服二十九臥臨テ温酒半升遠年愈者十日ニ効ヲ見ル久服ノ永ノ根ヨアル少兒腸凡ホ三年ナル者連リミ十四帖ヲ服ノ永ク再發セス

臍連固本丸 凡膏梁富貴人久痔ヲ患ルハ甚多シ必飲食色慾ミニナレ致ス所及ヒ酒房ヲ犯シ此病ヲ生ス若根ヲ除ケント要セ必此藥ヲ服シ兼テ醇酒厚味戒メ懇寡ナメ方ニ全忌可シ

生芋

六兩

山茱

山茱

黃連

各四兩

茯苓

牡丹

蕷朮

槐角各三兩 欽泻 知母

人參

當歸

皂角

蒼粉各二兩 右末トシ積積大臍頭一段ヲ用油ヲ去リ茱萸末ヲ灌シ西頭ヲ線ニテ扎往ニ糯米糸用テ飯ヲ煮テ半熟ヲ將テ搗り起シ甌内ニテ茱萸搗碎ヲ將テ飯中ニ盛茱萸飯ノ熟迄加ク冷コ待テ些時ノ取出シ西頭茱萸<sup>末</sup>を腸ヲ去リ東腸ヲ將テ搗爛シ丸より若过硬久ハ此シ飯ヲ加テ搗キ九ス梧桐子ヲ齊ノ如ク毎服百丸空心白湯半升下ス

洗痔神方

老椒

艾葉

葱白

五倍子

皮硝

馬齒莧

茄根各一分 右釣ミ水煎薰ノ後洗ア痛言日ヲ指ノ薦可シ

敷洗茱萸

皮硝

炒

五倍子

炒

黃柏

猪胆炒

黃連

骨石

各二錢

血竭

乳香

沒藥

蜜陀僧

荆芥

各三錢

先皮硝倍子ヲ將テ湯三盞シ患處ヲ洗ヘ候葉ヲ將テ細末トシ燥キ湯テ水出ル丁無多、胡麻油三調敷シ

神雷湯 漏治ノ神効有リ

鶴虱一  
麦芽仁

雷丸白耆  
木贼

苗芽

防風

茄子

各五分  
當吸酒洗

毫板酒洗

敝鱗甲酒洗

蟬退

枳實酒洗

益退

三分皂角刺二十箇用黃蠟一  
支炒大黃少許

右共二服ト作シ水一大鍾烏梅

一箇竹葉七片無灰酒半鍾煎メハ方ニ至リ空心ニ温服ス乾煎精猪肉ヲ用之ヲ  
壓服五つ八服ニ至リ筋根虫ヲ出メ後皂角刺蟬退ヲ去テ用ス外肌ヲ生ル茶ヲ  
用白龍骨五分 赤石脂五分 二味雞胚胫皮ヲ用包ミ猪蹄甲内ニレ火燬過シ  
膳甲ヲ去リ用スニ味ヲ將テホトシ前ノ湯藥内ニレ毎貼二味ノ薬一錢ヲ加ヘ再四帖ヲ服ソ  
根除ク酸辣鷄魚麵筋安毒動凡ノ物ヲ忌ム

清生蓮英散

蓮英一  
当吸

五倍子

岩紅各五  
分

黃連三  
分

乳香

沒藥各一  
錢

大黃 黑牽牛各二  
錢

右禦ノ薬ヲ服セト欲只先ツ一日晚飯

吃足了勿レ次日空心ニ淡猪肉汁一鍾半ヲ用テ猪肉汁和シ前薬ホ一  
钱二分ヲ秤テ調服

午後淨キ黄土ノ上於テ疎宣シ時ニ毒物ヲ見ヌシ出スラ驗トス或、爛杏ノ如ク五色相雜  
生モ亦驗トス如シ散薬服シ難キ、酒糊ヲ用ルシ薑豆蔻ヲ加ク每服一  
錢五分此方効神有リ  
燒酒色慾惱及羊魚大肉發物忌ム

千金不易治漏仙方

茺蔚根 川烏 草烏 南星

半夏

血竭

乳香

沒藥各三  
錢

當吸

味

菜用

麝香四  
厘

黃蠟一  
錢

孩兒茶

二  
錢

元脑

二厘  
黃絲線ヲ下ノ銜蜘蛛絲ヲ合過シ箒ノ頭と圓ヲ作シ之ヲ綱ニシ線ヲ合せ繩

搓成シ薑水ヲレ煮火アルラ度トス猪蹄ヲ用線ヲ引キ漏内ニ穿チレ大便ヲ俟テ後線ヲ帶  
出シ未ル札繫ノ一日繫ツル十三遍ハ九日ヲ待テ偏治テ肉平ナリ如シ孔多キモノ段平ノ孔  
好ス外ハ此方ヲ用ヒ尚ハ平藏丸ヲ服メ根ヲ除ク

平藏丸 漏瘡ヲ治ス向日ノ効ヲ見ル

黃連酒燒

枳壳炒

地榆

槐角各一  
兩

當吸

蓮英各三  
錢

側柏葉一  
錢

乳香

沒藥各二  
錢

京墨燒

序性五  
錢

右ホトシ水丸シ毎

服百九白湯三下ノ漸減ノ六十日止ム若ニ黒牽牛子頭ノ五枚ヲ加ヘ共ニ丸ノ右智  
白銀錠子 漏止一孔有ル者此薬ヨ用テ十日ヲ過スノ全ク愈

白芷 三四  
白芍 一兩  
左ニ味辛細末ト鐵杓ミ鎔カシ錠ト成シ再炭火ニレ煅  
テ煙ヲ淨クリ令テ取り出シ火毒ヲ去リホトシ麵糊ヲ用テ和シ錠子トシ條十シ漏内ニ挿ヒ直  
裏ノ痛處ニ透テ止ムヲ為ス毎日止三次七日ニ至テ止ムヲ為ス九日ニ至テ瘡癒ヲ結シテ  
愈エ如シ漏痊モハ生肌ノ薬ヲ用ヨ

生肌散

乳香

没薑

輕粉

寒水石 煅

龍骨 煅

海螵蛸 膜湯

煮過各  
水分

細末トシ患處ニ擦ス太平膏覆フ

太平膏

防風

荆芥

梔子

連翹

黃芩

大黃

卷活

獨活

當歸

生芻

赤芍

甘草

銀花

五倍

烏啄

頤髮

各二錢

白芨

山慈孤

隔簷灸法 療漏ヲ治ス神効有リ  
白欵各一面 香油一升 右剗ミ油内ニ浸スリ三昼夜文火用テ熬リ焦シ濁  
一カリ再熬テ水滴シテ故セス黄丹用火飛過シ炒リ黒クシ半斤ヲ用内ニレ再と熬テ  
烏水滴テ珠ト成ルヲ度トス温冷ヲ待テ再ヒ乳香没薑輕粉血竭各二錢ヲ内ニ水を攪  
セ白ヘ茶色嫩ナルク如シハ再ヒ培糊五枚ヲ入ルモ亦佳ナリ務テ其火色老ヘ嫩ナカルヲ  
要ス

隔簷灸法

痔漏ヲ治ス神効有リ

綠岩一斤用瓦一瓦頭用泥作一模再用香油

川山甲

一錢入紫粉確煅  
存性取出为末

木鼈子去壳取肉

乳香

沒薑

齡各一錢半時加入

右一處ニ和シ匂ヒ冷

水ヲ以テ調ヘ瘡火小量ヲ餅子ト作シ瘡上ニ貼ク艾炷ヲ將テ灸三面壯灸シ畢テ就テ

薰洗ノ藥ヨ用エ先薰ノ後ニ洗フ日三六度三五日前法ノ如ク灸スルト妙ナリ瘥リラ度久

薰洗方 焉シ單テ薰洗ス

皂莢製法加前为末  
手搗二把

知母四兩

知母乾名本

貝母四兩為末各

右件先ツ葱七茎

ヲ將テ水ヲ用煎牛三兩沸瓶内ニ傾ケレ再ニ煎藥ヲレ患者ヨノ上ニ坐セシ瓶口ヨリ

薰水温瓦待テ一半ヲ傾ケ煮ヲ洗ヒ一半ヲ留テ再々モ再ヒ薰洗スルヲ候テ蓋ルヲ以テ度トス  
黄連散 素ヨリ痔漏有リ又肛門邊ニ塊ノ生ス皮厚ク腫痛テ膿ヲ作ス就チ痔孔音  
テ出ツ食積注下ト作ノ治ス

黄連

阿魏

神麆

山梶

桃仁

連壳

槐角

犀角合水方

右末トシ少許ヲ以テ掌心置キ時々歛リ津液ニテ嚥下ス如シ

三方ノニ消セ後服ヲ止ム

加味槐角丸 痔漏治ス通用及ヒ腸風下血

槐角二兩 生半二兩 當歸

黃芪各一兩

川芎

阿膠各半兩

黃連 條芩 枳壳

藜芦

防風

連壳

地榆 升麻各二兩 白芷半兩 右末トシ煉蜜丸或酒糊丸ス橘子ノ  
子ノ加ノ毎服五十丸漸ノ加テ七八十九至リ百丸ミ至ル温酒或米湯送下ス

一方

柏殼ヲ用テ水浸シ穰ヲ去リ二元毎三合豆一粒ヲ用テ内ニ在ラン銀釦ニ傳ツテ銀石

墨内ニ於テ醋ヲ以テ浸丁宿高煮乾シ巴豆ヲ去テ末トシ醋糊ミテ丸トシ橘子ノ大サ  
梦每服十五丸空心茶清湯送下ス

烏玉丸 男子婦人下血腸風痔漏者疼痛忍フ可サルヲ治ス服五十三四次ノ効有リ  
初ノ此病ヲ得或痒ク或疼ニ糞道周廻ヌ多々硬核ヲ生ス是痔ナリ下血必是漏ナリ下血  
是凡皆酒色過度因テ即チ此疾トナル多々外ヨ医ソノ病腸胃ニ在テ寒有ルイシ知  
ニ若シ根ヨモハ其除半難シ

槐角六兩

雷丸四兩

敗棕八兩

苦棟皮五兩

芝麻四兩

牛角鰐十一兩

亂髮槐角丸

右剉碎シ磁署内ニ燒テ性ヲ存シ末ノ乳香二兩

射干

玄々入レ研キ匂ヘ酒糊丸ノ梧子ノ大ワノ如ク毎服五十丸胡桃一箇ヲ嚼ノ温酒ニ下ス  
禁忌心法ノ如クス

薰男婦翻花漏瘡

算麻子

防风

南星合半兩

粗末トシ盆内ニ焼テ烟上ニ墨貝ヲ用之

四效散

鼠膝痔漏

蜜陀僧二钱 射香

元脑各半钱 铜绿一字 末トシ温水洗拭と乾シ敷

生地黄膏 漏疮

露蜂房灸 五倍子

木香各三钱 乳香一钱 轻粉一字 右条トシ生

半握テ用搗テ膏トシ生绢ニ摊テ貼ス

主方 痔瘡腫痛

黄连一钱

萸芩一钱 黄柏一钱

連翹一钱

赤芍一钱

梔子一钱

槐花一钱

芳多一钱半 大黄一钱半

右剉水煎ノ空心服ス

逐瘀湯 痔漏疼痛ヲ治ス内ニ瘀血有テ痛ヲ作サハ大腸ヲ通利シ要物ヲ下シテ要  
立効有リ兼テ赤血刺ヲ治ス

川芎

白芷

枳壳 麵炒

赤芍

阿膠炒

茯苓

甘草

靈脂炒

合一錢

桃仁

大黄各一钱半 生姜三钱

蜜三匙

水煎服利元ヲ度トス

川芎

生芹

茯神

木通

甘草

靈脂炒

合一錢

桃仁

大黄

各一錢半

水煎服利元ヲ度トス

追風補腎十漏大金丹 痘ヲ治ス

當歸二兩

人參一兩

生半

熟半二兩

天門一兩

麥門二兩

破故

二兩 小茴一兩

大茴三兩 肉蓯蓉二兩

山茱二兩

白茯苓二兩

鹿茸

二兩 厚朴一兩

附子一兩 川烏一兩 陳皮一兩 丁子五粒

木香一兩

青木香一兩

砂仁一兩

青皮一兩

陳皮一兩 枳壳二兩

枳實三兩

香附四兩

烏藥

一兩 白芷二兩

肉蔻一兩 天麻二兩

杏仁二兩

松節四兩

礪砂五粒

乳香一兩

沒藥一兩 右不トシ煉蜜ニ丸シ彈子ノ大サノ加ク金竹油ヲ衣トス每服一丸

寒心酒三送下ス 戊申甲子ニ成ノ除日三食

下疳之論

下疳ハ邪淫慾火鬱滯ノ成ル真未ルト三右リ男子慾念萌動陽物興舉スル由ヲ淫  
火猖狂ノ末タ癰池ヲ経ス敗精泻血中途ニ流滯不平ヲ致シ結ノ腫ヲ為ス也婦人陰  
器乘精泻氣未タ淨カラ接手ニ父搘以テ淫精傳襲ノ成ル也房術搘案玉茎ニ  
塗抹之陰器ヲ洗拂リ陽火ヲ興助シ陰精ヲ煽動シ衰ヘカル僥幸シノ頃ニ池艾多父

爵ノ未タ癰セカルト致成ニ也男子崩急少爵ノ症初起先必淋小便渴痛次ニ黃渴敗精ニ流陽物漸ノ損シ甚トニ腰痛腐爛ニ當ニ肝腎ノ邪火ヲ疎利ニシハ正故清肝道子湯ノ類是ナリ婦人陰莖潔ラカヌ初起先皮ヨリ腫レテ光亮甚キ水晶如ク皮破レ水ヲ流シ腫痛曰ニ生ニ痒麻時ニ至ニ治毒ヲ解シ夙ニ消奇シ龍胆泻肝湯兼平胃散ヲ用ニ男婦房術傷ニ益毒ノ致ス所初起陽物痒痛坚硬紫色疮瘡漸ノ生ニ腐爛漸作テ水淋漓時ニ多興举ス治火ヲ泻シ毒ヲ解ス可シ黃連解毒母湯蘆薈丸ノ類是也外ニ銀粉散珍珠散人中白散選用ニ又先瘡ヨモ花時悞テ薰條擦茶ヲ用毒ヲ結石者結毒門ニ詳ナリ

清肝導滯湯 肝經湿熱玉莖腫痛小水滯滯疼ヲ作者  
扁蓄四錢 瞼麥三錢 滑石二錢 甘草一錢 大黃二錢便秘加水煎 灯心二十根 茄尾

竜胆泻肝湯 肝經湿熱玉莖患之或便毒懸心燒小便亦柴或久瀉爛愈又陰囊腫痛紅紫甚已者

竜胆 連翹 生芐 次深各一錢 車前 木通 鮫尾

山梔

甘草

黃連

黃芩各五分

大黃二錢便秘加水煎

水煎服

清肝導濕湯

陰囊玉莖湿腫猪肚ノ如ク水小利及墜重ノ痛ヲ作者

蒼朮

白朮

茯苓

山梔

厚朴

次深

陳皮

木通

荳粉

昆布各一錢

甘草

五分

木香三分

川芎

當歸各六分

枳作ノ紅色皮黃連龍胆加水煎

七分水煎服

八正散

肝絆積焚小便淋閉通也及一切淋疾

大黃

車前

瞿麥

扁蓄

山梔

木通

甘草

各一錢

滑石

二錢

水煎服

蘆薈丸

下疳瀰爛痛作シ又婦人陰蝕瘡

瘡ニ生シ牙齦蝕爛水

胡黃連

黃連

蘆薈

白蘆薈

青皮

白雷丸

鶴虱各一兩

麝香一錢

木香

三錢

右末トシ蒸餅糊テ丸シ麻子ノ衣

如々毎服一至清米湯送下ス

銀粉散 下疳斂久論ニテ母ノ但腐爛痛ヲ作シ及楊梅瘡蒸シ後結毒玉

莖腐爛或陽物半傷半全者

好錫 六錢

化ノ開キ硃砂末二錢ヲ不搅炒シ砂枯レテ砂コヨリ錫ヲ留メ再化シ開

水銀一兩ヲ投シ和シ白ヘ便ケ出角用瓦聽ス杭粉一兩研テ細紙上鋪ク捲テ一條ト成シ  
頭火ヲ點メ煨ソ紙尺ニ至テ度ト吹テ灰ヲナリ粉ヲ用前ノ汞錫ト同ノ眞輕粉一兩  
ヲ加テ共ニ一家ト成シ研リ細カシ凡ソ前患ニ遇ヘ先ツヨ草湯ヲ用淋洗挹乾シ隨テ此  
葉ヲ用テ上ニ捲ス痛ヲ止メ肌ヲ生シ收歛極妙ナリ

珍珠散 下疳皮損シ腐爛痛極テ忍ヒ難ク及諸瘡新肉已滿ナ皮ヲ生花丁般

又湯洗火燒皮損シ肉爛レ疼痛止ム

青缸花 五分加無用頭力龍花輕虛色 翠者代之於不及缸者名也 珍珠 一錢不論大小以新白为上入豆

眞輕粉 一兩 右三味共ニ研フ千轉細クテ飛麵ノ如ノ方ニ礪ニシテ收ム凡下疳初起皮

損シテ搽テ即愈腐爛疼痛者甘草湯洗淨ノ猪脊髓ニ調捲ス諸瘡皮生花者

此ヲ用テ乾捲エ即皮ヲ生ス可シ又婦人陰蝕瘡或新嫁内傷痛是者亦此ヲ搽ル可シ極効  
有リ湯洗火燒痛是者玉紅膏ヲ用調捲ス  
玉革皮損シ疼痛止花者太乙膏ヲ貼ス其疼即止ム

雄輕硃砂散 下疳遠近拘攣ニラ捲ル

輕粉 一錢 雄黃 七分 硃砂 五分

右細末ノ塗ル

洗瘡方

葱白十根 甘草一錢 黃連一錢半 山椒一錢 右並シ洗アトヨニ數次

又方

白苔 一錢 黄丹 六錢

熬飛紫色ニ研テホトシ溝渠中ノ惡水立洗ア過夜乾

上付ク

敷瘡方

鳳凰衣砌抱雞蛋壳内 元脑

輕粉各少許

ホトシ患處敷

治蠟燭瘡神方 下疳腫痛潰爛

鍾乳石二分

朱砂三分

珍珠三分

琥珀一分半

元脑一分半

右細末トシ每用上

茯苓西猪蹄一隻水三碗ニ煎じ早間ニ碗ヲ服ス煎茱萸四厘ヲ調晚間ニ碗ヲ服ス茱萸四厘ヲ調午間ニ碗ヲ服茱萸四厘ヲ調晚間ニ碗ヲ服ス茱萸四厘ヲ調一日ニ服スリ三次共三分ニ重十日ニ服シニミ其意必愈里ノ禁忌ニ可シ

### 治瘡瘍疾癰不能忍方

元脑一分

官粉煅五至

水銀三分用錫三分製

細末ナシ瘍上ニ擦ル又馬齒莧四

雪研研火硝青黛二兩ヲ入レ再研匀ヘ上ニ付ク

### 治外腎生瘍及風瘻

菜豆粉一分

蚯屎二分

水研テ塗ル若乾ク又付ク又黃連輕粉雞蛋壳火燒

キホトシ擦ル

### 治腎藏风癰瘍疥

紅椒ヲ用田ヲ去リ水浸ノ半日許リ生杏仁ヲ和シ研爛ノ西手掌ニ擦ル外腎ヲ擦ル極

効有リ

### 患處擦

五倍子炮七分存性一分朱砂二分兒茶五分水丹半分輕粉二分半水銀一分

一邊爛起至三從テ狗骨灰二分ヲ加フ周圍爛起至三從テ散靈丸燒灰二分ヲ加フ安半ト

患處擦

### 魚口便毒

夫便毒ハ左ラ魚口右ラ便毒トニ德テ皆精血之未成ル初起寒熱ヲ先シ而膀胱合道ノ間生  
小結腫アリ是ナリ近キ小腹下陰毛ノ傍ニ生シ結腫ス名ニ横瘻トナニ又外亦ト名ク是甲女大  
慾己ナシ能ワス直ナニ其志ヲ遂ク故ニ精ヲ敗リ血ヲ搏テ中途ニ留聚ノ結ノ便毒トナルノ脚  
腿ト小腹合道ノ間ト精氣所出ノ道路ナリ或景物觸レテ心ヲ動キ或夢寐躁ノ泄レバ既ニ陰  
陽ヲ偶合スルヲ得ス立情ヲ忘レ念ヲ息ムルヲ能ワス故ニ精ト血トニ大ケ滯テ腫結ラ多不當  
滯ラ散シ疾ヲ行ヒ少ニ便ヲ通利スベシ九竜丹山甲内消散是ナリ七日已後ニラ服根本  
堅固恐ハ作膜冥ノ火針ノ法ニ用テ刺スビニ膜ヲ出ス者十全補湯ヲ用庶ハ收斂ニ易ラ  
シ遲キ寸咫ノ別志ヲ生シ瘻難カレ回春ニシテ便毒ニ跨馬瘻ト名ク此奇経衝任病ヲ

ノ癰歎瘡経ノ分野見其經多血又血症名ク或ハ先ツ病瘡右半身ニ或ハ半身トシテ  
梗ヲ起シ疼痛ナキニ告熱前粟聚未成ル初塗ハ疏利ノ即チ故ニ可膿ニ成ノ後常如  
托裏内補用當シ

山中内消散 魚口便毒騎馬癰横瘡初起膿ヲ未ニ成ナリ者

當吸稍

甘草節

大黃各三戈

山甲炒ニ元大者

疆蚕

黑牽牛

各一戈 土木蠶三箇 水酒各半煎

九竈丹

魚口便毒騎馬癰横瘡初起未久膿ラ成ナリ者

兒茶

血竭

乳香

沒藥

巴豆不玄油

木香各少分

右ホトシ生蜜調一塊ニ成シ磁盒ニ之ニ盛リ時ニ鹽シテ旋丸ニ安豆ノノリ每服丸九丸空心ニ  
熱酒ニ送下ス行クノ四五次方ニ稀粥テ吃ス腫甚キ者日三四回テ一服ヲ用エ自消ス

紅花散瘀湯 房ニテリ精ヲ忍ヒ強固ノ池ニテ以テ瘀精渴血致シ兩脣ニ癰結ニ或小  
腹ノ傍ウ待テ腫痛ヲ成シ小水渙滯ノ者

當飯

皂針

鷺葦

蘇木

姜朮

連翹

當飯

皂針

鷺葦

蘇木

姜朮

連翹

石决

穿山

乳香

貝母各一戈

大黃三戈

牽牛二戈

木酒各半煎

黃芪內托散

魚口便毒ノ症ニ成リ内消不アラ得ナリ者

川芎

當飯

黃芪各二戈

白朮

銀杏

天荳粉

皂針

合一戈

甘草

沉浮各五分

水並服

火針法

魚口便毒小症行菜ニ用内消アラ得ナル者

麻線針二條用竹筋一頭ヲ特テ劈キ開キ針ヲ將テ離ルテ一分半許リ夾シテ筋頭  
ニ在テシ内側ヲ以テ札リ緊ソ相油ニ用燈盞内貯ヘ燈炒五根ヲ油内ニ排シレ點シ着  
針用油蘸キ紅ニ燒キ患項向重手ニ刺シルテ五六分隨テ出ス或血或膿ナリ膏ニ以  
テ蓋貼ス

針刺法 便毒初起未ク瀕々アリ時三緩針ヲ以テ凝血ヲ出名ハ立ニ愈

灸法 便毒未ク瀕膜アリ時冬ニテ二百壯乍膿ニ乍瘻ニ愈

神奇散 魚口便毒

穿山甲 三尾土炒木鳖子 去壳三面 牛肪

大黄 各三钱 黄连

黄芩

黃柏

金銀花

連翹 合二錢半 黃蠟 三錢

酒水各半煎

洗法

葱白 一升根 甘草 一钱

黃連 一錢半 乾山椒

右煎洗

雞蓮膏 諸薑

蓮葉

青木葉 各三十目

方麻油 一升入煎之濃糟

鴻內松脂 唐蠅黃丹 各五面入慢火熬之膏ト作入

### 囊癰之論

囊癰乃陰虛濕熱囊流注ノ結ノ腫ト成ル潰リ至テ後單丸懸掛スル者猶人ニ傷  
テ其毒外ヨリ發ルヲ以テナリ當ニ陰ヲ補ヘ湿熱ヲ清利スヘシ効ヲ取者十八九百リ  
近時ノ人恨テ病家ノ契葉用多々熱ヲ致スニ甚ノ膿ヲカス收斂シ難キヲ慮ル初竟胆  
渾肝湯宣シ稍久キ則ハ滋陰内托散外ハ如意金童散ヲ敷ノ俱ニ内消又一種水瘤有リ  
皮色光亮热ナリ腫痛時有リ内聚水有リ針ヲ用便處ヨリ水乞シ引去ル宜シ如ニ腫痛

日久内膿已成テ脹痛立者卽針奇丙六十全天補湯ヲ服ノ山茱萸牡丹芍藥加間  
三六味地黃丸服ノ亦愈工

滋陰内托散 囊癰已成リ腫痛矣熱ノ服ノ膿有ハ穿潰ス可シ

當歸

川芎

白芍

熟地

黃芪 各一錢半

皂角

決浮

山甲 各五分

水煎服

清肝滲湿湯 囊癰肝經濕熱結腫小水不利者熱燥痛入者

川芎

黃芩 各一錢 汁浮

木通

甘草 各五分

燈心二十根水煎

導水消腎丸 囊癰內生冷ニ傷ラレ外风寒ニ受ケ以寒湿囊中ニ浸入シ小者升加

ク大者斗ノ如ノ皮膚頑厚陽物短縮小水不利痛多々冷二俗ニ沙垢ト称是ア  
些服ノ水氣ヲ引キ久ノ漸ク消シ身ヲ除ルマテ瘡疾ト为テス

蒼朮 一斤炒黃 木通 半斤 木香 一兩

肉桂 一兩

牽牛 二兩微炒

細芥子 陳

米粉打糊丸桐子大ノ如ノ每服百丸空心白滚湯清半湯テ任下ス生冷麪食忌

ム此囊夏月冬天ト金瓦亦衣被ヲ以テ覆フヲ妙トス

亥偏墜法 天晴ヲ候取り人神白ヲ犯ヌ患者身ヲ平シ仰ギ夙ニ木肾子根下硬梗尽ル處ニ墨ヲ以テ點シ記ニ安豆ノ火ノ艾炷ヲ用三年内ハ冬至一七壯年多者冬至一九壯十壯ヲ止メ内ニ木香補腎丸ヲ服シ生冷ヲ食不すヲ戒ム兼テ房事ヲ已ム百日メ妙トス

木香補腎丸 偏墜二名木腎疼又痒々漸々ノ大ニ最頑疾ヲ為ス行動ニ妨有リ多々不便ヲ致ス但灸ノ後此藥ヲ服メ内消ス可シ此藥独痴ヲ治スルミナラス中年ノ後寛服可シ寿ヲ益シ年ヲ延キ髪ヲ黒シ筋ヲ壯シ髓ヲ填テ目ヲ明シ耳ヲ聰シ腎ヲ補ヒ元陽ヲ助ケ飲食ヲ調ヒ其功尽シ遂カテ婦人之ヲ服ノ頬童マノ如ノ肌膚莹潔玉妙又精寒ニ血冷久ク嗣自心無者更服ノ妙ナリ

生半四兩酒 蟲搗膏 兔絲子 肉蓴蓉 黃精 黑棗肉 牛膝  
蛇床子微炒 苍苔 遠志各二錢 當歸二兩四錢 丁香三錢 大茴  
木香各六錢 拘杞子一兩五錢 巴戟 杜仲各二兩 青鹽五錢 人參錢

右細末ノ煉蜜ニ丸シ梧桐子ヲアガク毎服六十丸空心ニ温酒ニ送下ス又諸症常テ  
テ半量或五分者ニシテ服ノ亦宜シ  
如意金黃散 肓瘡初起紅赤腫痛若熱隆重者葱湯ヲ用蜜ト同ク調敷シ  
夏月溫瘡急甚者溫茶湯蜜ト同ク調敷ノ妙ナリ

### 懸心瘡之論

懸心瘡乃三陰虧損溫熱結聚ノ成ル此究谷道之前陰器ノ後有リ又海底ノ穴謂初生ノ蓮子如ク痒少ク痛多クヨクノ漸桃李如ク赤腫燥痛膿出膿外シト欲破後輕キ小漏ト成リ重キ才ハ氣寧テ瀝尽ノ憂ノ病瘳ト成リ起立者多シ初起元氣壯實者九竇丹ヲ用テ病根ヲ泻シ去テ稍虛者内消汝雪湯濕熱利ニ云々亦消可シ者十中三四加シナ餘ワノ後腫勢已成テ内消不ツ得シハ托裏消毒散ニ山甲角刺ヲ加テ服之、自破ル如ク腫高ノ光亮膿熟ノ破頭者針ヲ用テ急破レ微膿出テ其患易安ナリ如ク膿出ノ後朝六味丸半斤大補湯ニ牡丹沢泻ヲ加テ用ニ溫補滋陰ト專ト又厚味膏梁水氣体壯实者初毫胆浮肝湯當テ後ニ滋陰八物湯ヲ服シ以テ益氣養清

大體瘦房勞氣血虛弱者初八珍湯服之次滓製甘草加費半金補湯  
牡丹根附子加脾弱者補中益元湯以化源滋百合湯成者因老膏湯化蠶  
壳丸香服首尾慎寒涼服之損脾傷氣血凝以患乳漸開之蠶膜當  
定處變處羸弱療愈難之タス醉己ニ若初起濕熱雍滯シ未だ脹成ノスメ  
痛作矣小便澑滯也、龍胆泻肝湯用之痛緩痛甚シ仙方治命飲之覺寸  
草ヲ以テ佐ト此如之患ルト雖ハ亦輕ク潰

滋陰八物湯 懸瘻初起狀蓮子ノ如ノ紅赤滿腫、終々痛作ス

川芎

當歸

赤芍

生芍

牡丹

芍粉

甘草節各一錢

次滓五分

大黃、便秘加一錢蜜炒

水煎燈心二十根一並服

炙粉草膏 懸瘻已成、取藥內消之不得者服未成者即消之、未者即  
潰色、潰者即愈此懸瘻治之良藥ナリ

大物草四兩 長流水用浸透シ炭火ノ上炙り乾ニ再ニ浸シ再ニ炙ル此如是  
三度功行甘草二錢當歸三錢水三碗慢火三度煎之稠膏至リ渣ヲ去リ再煎シ稠膏ヲ度ト

為不每用三錢無灰好燒酒大杯膏化之空心服

還元保真湯

懸瘻已潰、口闊張裂水淋漓改歎之能ワル者

當歸

川芎

白芍

熟芍

梔子

茯苓

人參

黃芩各一錢

牡丹皮

枸杞子各八分 甘草炙

熟附子各五分 肉桂

次滓各三分

姜枣煎

九竈丹、初起元氣壯實者病根、泻之

方見魚口

蠶壳丸、癰疽發背已成、未入膿ナル際恐之毒氣外出、牛乳能止內攻、牛乳敷

預シ此丸服ノ膜、護之心、護之而且ツ血、散シ毒ヲ解ス

白芩一兩二錢

黃芩一兩

雄黃一錢二分

琥珀一錢別研碎砂一錢

蜂蜜二錢

右四味ヲ先ツ研研極細シ別ニ蜜蠶ヲ將テ銅杓内溶化少々離テ、に時カリ蠶血邊稍  
凝ル時、候テ方せん上茱ヲ七粒セ勺へ共ニ塊、或シ一人、茱ヲ將テ火上微シキ烘リ、象手テ  
急ニ丸ス、小安豆大サ砂砂用テ衣トシ、砂礫、收ノ貯、火毎服二三十丸、白湯テ食後送

下ス、病甚者早晚日進半二次

滋陰九味散 懸心癰厚味膏梁蘊熱結腫小水滯滯大便秘結內熱口乾煩渴飲  
冷及六脉沈寢力有ル者

川芎 當歸 白芍 生芻 黃連 花粉 知母

黃柏 大黃 黑水拌炒二錢 水煎服

心用方 托裏消毒散 腎氣丸 十全大補湯 八珍湯 補中益氣湯  
四物湯 内消沃雪湯 童胆泻肝湯 附子餅 懸心癰頭上附子角二餅盛

灸元十七度三月三日愈工

### 臂膀癰之論

臂癰小腹後半位遠ノ僻興ナリニ氣亦到ヒテ罕ナリ血亦未ナリ少シ凡リ此生元者  
濕熱凝滯結聚乃成此得毒心外、發不廣シ内攻セス初起毒五臟、蘊積従者患  
必頭右リ紅熱シ墜重石如ノ内、必口乾キ是熱内消沃雪湯ニ宣シ積熱ヲ通利ス外ニ膏膏  
以テ瘡項頂貼ス邊金黃散ヲ以テ之ク敷ク瘡膜紫血ヲ拔出シ内ニ托葉ヲ鋪テ自愈。若シ  
内敗毒寒、利服外涼藥數十克血水凝ノ毒氣外發スルヲ得べ及テ内攻致其瘡

頭軟陷ノ膿方根脚平散ノ痛又内挾口乾ノ煩燥譫語癆喘氣急羸恍惚トノ寧カニ俱不治  
ト人薦己ニシテ治スル者脾胃ヲ傷ルノ母レ氣血損ルニ無レ但根本ヲ固シ王下名當シ若ノ腫硬ノ痛犀  
者形氣虛ノ邪氣实才リ托裏消毒散用ノ微腫微痛ノ者形氣病氣俱ニ虛ニ托裏散等  
補ノ膿ヲ作ヒト密、托裏羌活湯ヲ用ヒ若痛甚已クハ仙方治爭飲ヲ用ヒ大勢退カヘリ托裏消  
盡散用ノ脾虛ヲ消散ルノ能ロ又或八喝ヲ作シ便淋ノ者六味丸五味子ヲ加フ陽虛ノ實者丁能ワス  
或膿清ノ鮮可然分ノ者補中益氣湯急血俱ニ虛正者十全大補湯若腫硬ノ未ク膿ヲ成ケル者隔  
蒜灸并活血飲用ノ或葱白ヲ用搗爛シ熱ノ頻リニ患處ヲ熨火ス冷火再ニ換ノ膿熟ノ破ク  
者針ノ破ク後ハ補中益氣十全大補若多々候大勢已退タ餘毒消至ノ頃ニ考ヘ熨火用ノ其  
氣ヲ補ヒテ餘毒ヲ消ス

内托裏活湯 臂膀臂僵硬腫痛者

羌活 黃柏各二錢 黃芩 防風 藁本 當歸 蒼朮  
連翹 陳皮各一錢 甘草 紅花 麝香名一方  
梔要内托裏活湯 臂膀腫痛而尺脉收緊按ノ方ヲ無ク

恙活

黃蘖各一錢

防風

藁本

連壳

炙甘

蒼木

陳皮

黃芩各一錢五分

水酒並服

活血散瘀湯

臂癰初起紅赤腫痛墜重石如及大便秘微

川芎

當歸

防風

赤芍

蘇木

連壳

花粉

乳香ヲ加フ

紅花

黃芩

枳壳各一錢

大黃三錢

水煎便通者大黃三錢

黃芩內托散  
臂癰已成前藥ヲ服シ勢定ル者潰瘍ヲ飲ス

黃芩二錢

當歸

川芎

銀花

皂刺

山甲

日卿節

各一錢水煎酒又レ服ス

### 楊梅瘡論

楊梅其形似鴉以子也又時瘡ト名ク時氣垂浸邪氣凌竄表因生又棉花瘡ト名ク綿タトノ絶難此三ツ者称有リ總ニ湿熱邪火化丸但氣化傳深者輕ノ精化慈濟者專故氣化乃チ肺脾毒ヲ受ク其患先ツ上部コリ見化皮膚痒ヲ作并助骨疼之具形

少メ且ツ乾ノ精化乃肝腎毒ヲ受ク其患先下部ヨリ見ル筋骨多ノ疾水小水淋其形大ニノ且硬氣化如毒皮膚在リ未裏ニルト經天萬靈丹ヲ服ト洗浴汗ヲ免シ皮膚日毒ヲ解散精化者毒骨髓有リ未肌膚透え九竜丹ヲ服ス大小二便ヲ通利ノ骨中ノ毒シ浮ス行散後体實丸者升麻解毒湯体弱者歸靈丹ヲ服ノ筋骨疼子丸ニ至ル瘡根治白ノ内毒已ニ解ニ方ニ點茶ヲ用輕キ者半年重キ者一年始ニ方ニ愈ニルノ得若シ此法遵カツカ速ニ愈ニラ歟メ守ニ薰條擦茶喰吸少ノ法ヲ用テ往後患ヲ致者多ニ熟思言加味遺糧湯 楊梅瘡初起筋骨疼痛及己成リ數月延綿トノ已不并楊梅凡毒誤テ輕粉取之難煥骨疼履ヲ動スア能ワス

川芎

當歸

防風

薏苡

木瓜

銀毫

木通

白蘚

蒼木

威靈仙各一錢

甘草

芍藥子

五箇切元微炒

仙遺糧二兩

人參詹久元虛者加

水煎下部ニハ午膳ヲ加フ此瘡發尤多ハ先ツ下

痘ヨリ発ル此方ヲ服スルトメ楊梅ヲ発セス

解毒天將散 楊梅瘡久問只遍身潰爛及筋骨疼ヲ作ス

天花粉二钱

防风

防己

皂针

白藓皮

連壳

川芎

當歸

風藤

木瓜

銀毫

蟬脫

薏苡

各一錢

甘草

五分

土茯苓二兩

牛膝下部加各一錢

水煎服至臨之酒入服

水煎服

升麻解毒湯

楊梅瘡筋骨疼痛久愈不及遠年近日流注結毒皮肉破爛咽喉

損破

升麻

皂針

各四錢

土茯苓一斤

白芷

項以上加

桔梗咽肉加

白芍

胞腹加

米仁

防己

肩背加牛膝下部加各一錢水煎麻油三匙ノアレ匀入服ス

欗靈湯 楊梅瘡新久問口但元氣虛弱者

川芎

當歸

白芍

熟地

米仁

木瓜

防己

威靈六分

土茯苓二兩

牛膝下部加五分

水煎服渣再煎服入

加味荆防敗毒散 初症前後愈後重之用可ナリ

荆芥

防風

卷舌

獨活

前胡

柴胡

川芎

桔梗

欗苓

次厚

大黃

人參

白朮

甘草

各半方

姜火艸水煎元氣不足者多益加

土茯苓

甘草

各半方

消凡敗毒散 楊梅天泡初起

當歸

川芎

赤芍

生芻

升麻

乾葛

黃芩

各一錢

黃連

黃柏

連翹

防風

各六分

卷舌

銀毫

甘草

五分

蟬退二分

水煎初服六大黃芒硝加ノ

欗苓湯 同

大欗苓四兩

桔梗

防風各二兩

乳香

沒藥各五分

水煎溫服入鍼善急

雄黃

朱砂

狼兒茶

輕粉各一錢

苦參一兩

右米丸梧桐子ノ

大ナ毎服二十九米湯送下口裏豆湯ヲ嚥ム

通仙五室散 凡ソ人楊梅天泡棉毛亦ノ瘡ヲ病過メ致成ノ一切以テ名狀シ難キ疾

或楊梅瘡爛ニテ骨見シ年ヲ経テロヲ收メス或筋骨疼痛ノ舉癰時ナク或

通身瘡瘍消りス或チ足皴破出ニ或遍身皮ヲ起シ醫ニシ一層ヲ能ヒ一層ヲ起ス  
或赤白癰我鳥掌凡瘻或皮好ノ骨爛口臭ノ當リ難ク及久年ノ臘瘡愈ヘニ切  
頑瘡惡毒并比治ス

鍾乳粉三分 大丹砂二分 瑞珀 永元 合五厘 珍珠一厘半 鈿末ノ毎服

五厘別飛白麵二分半炒過合ノ一服ト作シ毎料ニレ合ニ十貼ト作シ毎日夜若  
一行ヲ用ニ水煎シ十二碗ト作シ薄ヲ去リ清晨三碗ヲ以テ茶一貼ヲアレ梶包ヘ温服ス其後  
苓湯一日三服シズス須ヘニ別ニ湯水并茶ヲ用可ラス日々是ノ加ク一料ヲ服シテニス十二日以テ  
即愈ニ

西聖復煎丸 楊梅瘡治ノ後腫塊年ヲ經破ヒ愈雅ク以テ危キヲ致ス

乳香

沒藥

兒茶

丁香

阿魏

血竭

鬼蛇

名四味

白麵

炒一斤 蜂蜜

煉

熟

六兩

香油

四兩

煎熟

未肉

水煮

豆蔻

校

共

米

搗

千

餘下彈子大ガニ丸シ毎用一丸ニ茯苓四兩水四碗煎ニ二碗ニ至リ丸ヲ煎化滲ヲ去温服

茯苓餅

遠近頑瘡爛ヒテロヲ歛ス並治ス

防風

人參

五加皮

白蘚

當歸

川芎

丁皮

木瓜

甘草

各一錢

土茯苓

半斤

細辛

三味

朱末

四雪

以テ

麥

麵

水

和シ一處

餅ト

作シ

焙リ

乾ヒ

熟シ

用ル

時

拘

ワニ

外未タ

細ナ

粗ホ

将テ煎

湯ト

作ス瘡

好ヲ

以テ度

大

太痕方

楊梅天疱愈テ後疤痕紅黑ニ治ス

大黃

白芍

各半錢

同ノ研テ

患處

擦

貨

痕即

青色

亦舊如シ

玉脂膏

楊梅愈テ後我鳥掌凡

舞

ヨミ

出ニ

白皮ヲ

起シ

一層

ヨミ

去レ

ニ層

ヨミ

發シ

前ノ者

粉錫ニ

麝香

各半錢

銀硃

一錢

香油

相油

牛油

黃蠟

各二錢

細末トシ油内ニ入

搅

火ニ

燒リ

其

茶

將テ上

擇

再烤

リ再擇テ即効有リ

翠雲散

楊梅瘡乙內

茶ヲ

根脚紅ニ

瘡勢

己ニ退ク者

銅綠

胆苦

各五錢

輕粉

石膏

煅各一兩

共研テ

極

細

之

礮

確

收

野

溫瘡

乾シ

撚リ

乾瘡

ハ公猪

胆汁

調

點

三日

三方

點

直

瘡

自乾テ愈

十九

又點藥方

杏仁 四十九箇 雄黃 一錢 輕粉 二钱

再研白シ猪胆調<sup>ヘ</sup>點ス

鴛黃散 楊梅瘡潰爛元<sup>ヲ</sup>成<sup>ニ</sup>膿穢多<sup>ノ</sup>癥其<sup>シ</sup>干者

石膏 煎 輕粉 黃柏 炒

以上名ホケ極ホトシ乾テ燭上<sup>ニ</sup>捲<sup>ル</sup>即泡<sup>ヲ</sup>生<sup>ス</sup>

可シ再燭再捲<sup>ス</sup>毒尸<sup>ニ</sup>乃愈<sup>ニ</sup>此毒<sup>ヲ</sup>解<sup>シ</sup>痛<sup>ヲ</sup>止<sup>フ</sup>收乾<sup>ノ</sup>効<sup>カ</sup>ナリ

結毒之論

結毒<sup>ハ</sup>薰火瘡毒<sup>ヲ</sup>收遏<sup>シ</sup>骨髓<sup>沈</sup>沈<sup>ム</sup>薰擦<sup>シ</sup>經<sup>ス</sup>又<sup>ホ</sup>薰擦<sup>シ</sup>服<sup>ス</sup>多<sup>カ</sup>ラス内毒未<sup>尽</sup>、便<sup>點</sup>茶<sup>ヲ</sup>用<sup>ス</sup>收歛<sup>シ</sup>尊遏<sup>シ</sup>毒氣<sup>ヲ</sup>去<sup>ス</sup>示能<sup>ミ</sup>ト致<sup>ス</sup>矣<sup>ト</sup>則<sup>ハ</sup>先<sup>ツ</sup>筋骨從<sup>リ</sup>疼痛<sup>日<sup>ニ</sup>漸<sup>々</sup></sup>、  
腫起<sup>リ</sup>矣<sup>ト</sup>定處ナリ<sup>関</sup>節<sup>中</sup>ニ在<sup>ル</sup>トキ<sup>ハ</sup>筋<sup>ヲ</sup>損<sup>シ</sup>骨<sup>ヲ</sup>傷<sup>リ</sup>縱愈<sup>ヘ</sup>トモ曲直便<sup>ナ</sup>ス口鼻<sup>三</sup>元<sup>スル</sup>才<sup>ハ</sup>梁<sup>ヲ</sup>崩<sup>シ</sup>脣<sup>ヲ</sup>缺<sup>ク</sup>瘻<sup>ト</sup>金<sup>モ</sup>形<sup>ヲ</sup>破<sup>リ</sup>相<sup>ニ</sup>更<sup>フ</sup>咽喉<sup>ニ</sup>登<sup>ル</sup>者<sup>聲音<sup>ヲ</sup>憂<sup>シ</sup></sup>足<sup>庵</sup>者<sup>行走<sup>ヲ</sup>妨<sup>ク</sup></sup>初起筋骨疼痛<sup>ニ</sup>芳飯<sup>ニ</sup>木湯仙遺糧湯頭痛破<sup>シ</sup>ト<sup>ス</sup>者<sup>天麻餅子</sup>俟<sup>ミ</sup>真<sup>裏</sup>碧霞云<sup>故</sup>吹<sup>ク</sup>年餘筋骨<sup>ヲ</sup>流串<sup>シ</sup>愈<sup>ハ</sup>若<sup>五</sup>宝散虛弱潰爛疼痛<sup>歟</sup>ナ<sup>ル</sup>者<sup>者</sup>

十全大補<sup>ト</sup>茯苓<sup>參<sup>ト</sup>同<sup>ク</sup></sup>煎服<sup>ス</sup>初起筋骨痛患<sup>ニ</sup>者<sup>雷火針<sup>ヲ</sup>用<sup>ヒ</sup></sup>潰<sup>テ</sup>腐爛<sup>スル</sup>  
者<sup>解毒紫金膏法<sup>依</sup>テ治<sup>フ</sup></sup>施<sup>ス</sup>年遠<sup>ク</sup>毒盛<sup>ナル</sup>者<sup>玄龜丹<sup>兼<sup>テ</sup>靈芝<sup>ホ</sup>擦<sup>ム</sup>年</sup></sup>  
近<sup>ク</sup>毒淺<sup>キ</sup>者<sup>百日<sup>ニ</sup>愈<sup>シ</sup></sup>再薰<sup>得<sup>ハ</sup></sup>母<sup>レ</sup>禍<sup>ヲ</sup>為<sup>シ</sup>人<sup>ヲ</sup>傷<sup>ル</sup>

仙遺糧湯 楊梅結毒初起筋骨疼痛已<sup>破</sup>レ肌肉潰爛

仙遺糧<sup>四</sup>零

防風

荆芥

川芎

當歸

天花粉

金銀花

白蒺藜

蒼芷

威靈仙<sup>各一錢</sup>

山梔子

黃連

連翹

乾葛

白芷

甘草

黃芩<sup>各六分</sup>

牛膝<sup>下部加</sup>

水煎<sup>渣<sup>ヲ</sup>再煎服<sup>ス</sup></sup>

苦飯<sup>二</sup>木湯 楊梅結毒已成<sup>リ</sup>未<sup>久</sup>感<sup>ニ</sup>筋骨疼痛步履難<sup>シ</sup>及<sup>ハ</sup>潰<sup>後</sup>腐肉臭敗<sup>シ</sup>肌<sup>ヲ</sup>

生救欽<sup>ハ</sup>牛糞<sup>アル</sup>者

白朮

蒼朮

川芎

當歸

人參

茯苓

蒼芷

皂針

厚朴

防風

木瓜

木通

枳活

穿山

炒各<sup>一</sup>錢 銀<sup>苍</sup>二<sup>錢</sup>

銀<sup>苍</sup>二<sup>錢</sup>

甘草<sup>一</sup>兩

精豬肉<sup>二</sup>兩

土茯苓<sup>四</sup>兩

水煎渣ヲ再煎服

薰洗結毒方

蒼朮一兩 川椒三錢

水五碗用薑ノ四碗ニモリ確内ニ入レ患止ヲ確ロニ對シ  
焚氣ヲ以テ薰シ半火焚ノ葉ヲ盆内傾ケ患處ヲ淋洗シ淨布ヲ以テ捲ヘ乾シ解毒紫金膏貼

解毒紫金膏

松脂各二升

共ニ碾ツテ細末シ麻油ニ調ヘ稠ニ至テ前ノ湯ヲ用テ薰洗  
テ此茶ヲ搽上ス油紙ヲ以テ蓋を住シ軟布條ヲ以テ要札ノ至テ收系ノ晝ノ行ヲ令ルト母ニ三百一  
換如シ前湯無キオ葱ヘ艾寸草等ノ湯ヲ洗フ又諸毒頑膿瘡ホヲ治エ

荅紅

共ニ碾ツテ細末シ麻油ニ調ヘ稠ニ至テ前ノ湯ヲ用テ薰洗

神仙碧玉膏

結毒演爛真徹疼痛歎及凡膿水

輕粉一兩

桔粉一兩

白芍五錢

乳香三錢

沒藥同

樟冰二錢

公猪淨熟油五兩用白芍同ノ熬化ノ碗内ニ傾ケテ上茶ヲレ水内ニ和シ勾一時ニ取リ脣膚  
止膿ニ根脚膏ヲ桃ケ牛心中ニ擦化シ油紙上ニ摊ケ葱心湯用瘡ヲ洗ヘ淨メ之敷  
五宝散  
結毒筋骨疼痛口鼻ヲ腐爛シ諸藥初有ニヨラ治鼻子腐爛ニ萸革辛仁

結毒此金丹

遠近楊梅結毒筋骨疼痛日久ノ腐爛真敗闇瘡ヘ或咽喉唇鼻

破壞ノ諸藥効有アズ

龜板

山火上放千枚魚シ酒漬水濃ナルヲ用ヘ筆ヲ潔ニ蘸シ板上

石決明

九孔大音角用煅エシ

硃砂

名六味  
共ニ再碾シ細末シ爛朱飯丸シ麻子ノ大ア毎服一粒筋骨疼痛亢者酒半升

腐爛不ル者土茯苓湯一升至テ重者單日ニソ愈工効五宝散ニ勝レリ

結毒靈藥  
楊梅結毒腐爛真作シ或咽喉唇鼻腐爛日ニ見者

水銀一兩

珠砂

雄黃

碓黃各三錢

共ニ碾ツテ細末シ礮内ニレ鉢蓋

蓋ニ泥ニ固ク封シ點ニ香ヲ度トス用木炭内ニ擦シ火畢テ次日蓋底ヨリ取出ス靈藥  
約不ニ二兩五六克右リ尋常腐爛ノ症ヲ治スルニ靈藥五錢輕粉五錢和シ勺ヘ碾ツテホシ礮  
盛リ貯ヘ沙三錢礮口ヲ封シ用ヒ臨シ甘草湯ヲ患止ヲ洗ヘ淨ソ礮ヲ將テ倒ヨシ沙眼  
懸ケ葉患止師後罩油盞ヨリ一極ノ男子婦人咽爛ル者ハ靈藥一錢人中白粉  
研細シ吹クヨリ三次内ニ不敵ヲ服シ疾即止

硫黃不二散

楊梅結毒咽內癰瘍爛瘍水入難者治ス

硫黃一粒

繖花一分

共、細辛涼水一大杯ニテ調服其喉即止飲食用矣シ

鉛回散

楊梅結毒筋骨疼痛朝輕夜重ノ弊手三テ按揉スルヲ好ム者

鉛半斤

銅杓内化開キ水中ニ傾ケヘレ鉛ヲ將テ取り起シ再化シ再傾ケ如此百遍

鉛灰ラ度ト为ス半日ラ候チ水澄清ナルラ待テ傾ケ去テ鉢底内ニ沈ム鉛灰ヲ取リ三重  
底上下ニ在テ水気ヲ收ノ乾シ硫黃半分細末シ確ニ收ノ毎服一钱温酒調服ス至テ

重者モ三次ニ過キスノ効有リ

草油膏　結毒瘡藥上三點

麻油二斤　熬水滴テ珠成シ續テ杭粉十三兩下シ檀セ白膏ト成シ水内傾

ケ凡時ニ取り起シ攤ケ用エ

草解湯　結毒筋骨疼痛頭脹破綻ト欲シ及已潰時膿爛並ニ効有リ

草解二粒

防风

苦參

石菖

何首烏各一錢

咸靈仙

當歸

黃柏各六分

羌活

川椒

白芷

蒼朮

胡麻

石菖

黃柏各六分

羌活

川椒

碧雲散

結毒頭頂ニ有テ以テ頭疼脹痛ニ效破瘀如者

鵝不食丹一兩

川芎一兩

青黛一錢

細辛

患者口涼水嚥

蘆

苟子テ茶ヲ吹タ疼左右鼻内嚏ニ取テ効トス

多骨疽論

多骨疽、瘡潰久シ口ヲ收メカルニ由リ乃先血運行乞丁能ワス此至ニ骨榮養乞丁無シテ  
致々所謂骨毒氣由ニ結聚メ化ノ大骨ト成胎ヲ受時精血火錯ノ結シ日後必ス此痘  
ス成ス但腎骨骨主ル宜ク腎氣丸十全大補ヲ服メ先ツ脾腎ヲ補ノ次ニ艾附餅ヲ用テ灸  
温煖士ラシメ膚肉毒朽骨自然脱落シノ肌生シロタ歟ニ愈エ  
固本養榮湯　骨疽已成テ骨吐出或ニ既ニ出テ收斂乞丁能ワス氣血虛脾胃  
人弱ニ鬼ニ服スハ骨出ニサル者自ラ出テ收斂セカラ者自効ル

川芎

當歸

白芍

熟地

白朮

山茱

五味子各五分

姜寒煎

生肌散 腐骨脫出肌肉生ルテ達ク收斂ルテ能ル者

石羔

輕粉

赤石脂各一兩 黃丹二錢

龜骨

血竭

乳香

朝腦各三錢

糞シ先當炒當飯白芷各一錢煎湯用テ患上洗淨

此用テ乾シ捺リ軟油紙テ蓋ヒ扎シ日三洗換

附子餅

附子ヲ用テ搗キ餅ヲ作シ患上數キ灸ス先ツ葱白艾葉山椒甘草四味煎シ洗後

灸火

應用方

碧玉膏

玉紅膏

十全大補湯

腎氣丸

陰瘡之論

婦人ノ陰瘡ハ七情鬱火肝脾ニ傷損シ過熱下注ノ患ヲ為ス其形固多ハナラズ惣テ邪火ノ化元所ニ繇ル腹中一條蛇形ヲ挺出スルガ如ク十尺有り尸許リニソ墜重シ水ヲ流

ヲ溺溢者乃脾氣ノ下陷肝火之從ア朝補中益氣湯ヲ服シ晩毫胆泻肝湯ヲ服外ニ雄黃藜蘆散ニ棄其患漸ク收ル腹中突出苗子ノ如ク四邊腫痛不著乃肝鬱脾虛致ス所先ツ補中益氣山梔子茯苓青皮ヲ加ヘ肝ニ清シ脾ニ補ニ兼テ中氣升シ更飯脾湯ヲ以テ巖川芎芍藥神香附陳皮ヲ加テ調理ス腹戶忽然トノ腫痛作リ血氣ノ旁傷立ニ因テ湿火下流而物舟皮汎泻在粉紫胡シロコウヲ加テニラ台ス腹中寒氣匯ニ告シ小柴ノ如ク者乃心氣鬱シ邪火化元所四物ニ黃連膽草木通石菖蒲加テ以テ心竅前滯ヲ通散ス外ニ銀杏散ヲ以テ腹中ニ納入ス腹墨ノ外疣瘡ヲ生ニ内細虫ニ生ニ痒作リ心火可ニ充者此虫食テ臟腑ニル即處久ノ多ク寒熱ヲ發シ勞瘵ト相似此症有ル婦人畏羞亨郁テ不肯テ說ク因循至丁巳ノ面黃肌瘦せ身寒熱ニ發シ咳嗽痰ヲ生ニ往々治セサル者多シ如シ此症右ラム急ニ逍遙散ヲヘ黎蘆丸ヲマシノ早晚二服外ニ銀杏散用錦裹ニ腹中ニ塞入ス寒ハ殺シ痒津キ止ソ半月ニノ漸愈腹戶閑テ閑シ憂思ノ過ナリ逍遙散飯脾湯俱ニ紫胡施白芍丹皮ヲ加テ間へ服ミ父接ノ寸血ニ出者肝虛火有ニ血藏丸丁桂又四物湯ニ龍胆黃芩山梔柴胡ヲ加テ新交房夏傷ニテ腫痛

至者珍珠散ヲ猪脊髓調捺シ又婦人久ク寢室居ニ處火妄動ノ薦シ骨ノ文  
妄邪火久注ソ多ク陰中痒キモカ作シ要ヲ生ニテア致ス此虫食内藏ニ及陰中腐爛攻刺  
疼痛臭水淋漓口乾テ糞便之形削不食此症有者菜ノ味ケ愈ニ所非之發灰  
飯不失合症ト名ク

清肝滲湿湯 肝經鬱滯邪火流行ニ陰腫痛或汎熱痒キラ作ス

川芎

當歸

白芍

生芻

山梔

黃連

連壳

甘草三分

防风八分

竹葉燈心水煎

涼榮浮火湯 婦人懷抱憂鬱清多ニ内熱アヒ生ニ小水滯滯大便糞結及陰中火盛痛

ヨ作ニ赤洪淋ノ如シ此湯宣

川芎

當歸

白芍

生芻

山梔

黃連

連壳

木通

柴胡

茵陳

龍胆

知母

麦門冬

山梔

黃酒炒交

水並服便利セハ黃コウト充血

銀杏散 婦人濕熱下注ソ陰中痒ヲ作シ及内外瘡ヲ生

杏仁

輕粉

水銀鉛製

雄黃コウイエイ

右細末トシ六一處和

每服五

金裏肉一枚和シ九分錦用包裹シ綿條ヲ留ソ線ヲ栓テ外在ラシ塙痒湯ヲ用煎  
れ洗ハ菜求衣ヲ陰内安ヒシ線ヲ留テ外在ラシ

塙痒湯 黃洗ス

苦参

咸靈仙

蛇床子

當歸

狼毒合五分

鶴虱草

一兩

水煎熱ゾ薰洗後洗フ猪胆又洗フ更妙

雄黃藜蘆散 婦人陰中突出蛇如ノ或雞冠菌様似者

雄黃コウイエイ

藜蘆コウイ

輕粉

鱉頭合一分

水元

名末トシ苦参湯洗後菜ヲ搽ナニ次其患自收ル

苦参湯 洗菜ナリ

川芎

當歸

白芷

甘草

黃膽名木分

水煎

傷寒癰頤火亦汗毒ト名ク此因原十尺寒ヲ受ケ葉ヲ用テ發散未タ久ニス日久ノ傳化丸  
为シ敵ニ以テ項ノ前後結腫疼痛ヲ致シ初起身熱シ渴在者柴胡葛根湯宣シ熱清シ  
毒ヲ解ス寒ヒ上紅色ニシテ熱甚キ者如意金黃散ヲ敷ク初起身涼ノ渴セナル者牛蒡  
甘桔湯ニシテ患ノ微勢ノ紅ナラス疼痛在者膏ヲ以テ和ス腫深ノ退クス膿ヲ作サド欲  
在者托裏消毒散ニ敷テ氣血虛弱食少者補中益氣湯未タ成ニカル者消シ己ニ  
成ル者瘻已癢ル者收リ易シ

柴胡葛根湯 頤毒表敵未タ久ニス身熱解矣紅腫坚硬痛ヲ作ス者

柴胡

石羔

白草

升麻

水煎服

連翹

牛蒡

牛蒡子桔湯

桔梗

陳皮

花粉

黃連

川芎

赤芍

牛蒡

桔梗

蘇木

水煎服

牛蒡子

白草

升麻

水煎服

連翹

牛蒡

牛蒡子

桔梗

蘇木

水煎服

連翹

牛蒡

肌膚爛シ痛心ヒ尤者外ス腎突出ムツクモ外ス

酒洗法 先ツ瓜萎根ハナシタ用ヘ酒シ薑シ乳香シ沒藥シ五靈脂シ皂角刺シ各半分ミホントシ煎酒シ  
テ下ス可シ其毒シ下ステ次ツ蠅アブ巣ス瓦カマ用ヘ或シ奪金丹シ下ス手足シ生スル者指本シ緊シク  
繫シリ毒シ外ス走ラワラシム

### 蠅巣丸

明谷アヤカ四兩シロ 膏薑シカク三两サンロ 黃蠅シロアブ二两ニロ 共シ和シ白シ桔子シタマ各三两サンロ 清酒シ送ス下ス

### 洗法

荆芥シラカビ

白芷シキ

山椒シラカビ

葱白シロウ二十根ニシロ

白鹽シロソル二两ニロ

石蠅シロアブ洗ス四两シロ

### 膏法

天南シラカビ

牛夏シカク 白芷シキ

硫黃シロウ

雄黃シロウ各小分シコ

ホトシ蠅合シカク

眞君妙貼シカク 敌シ諸毒瘡痘及異形異類頑硬シ大寒瘡走敵シ膿シナマル者此藥シ貼シ

し痛シ而シ者痛シ痛是シ者即止シ

硫黃シロウナシ 蒼麵シロウ

白麵シロウ各五升シコ

共シ處シ清水シ用ヘ微シ拌シ乾湿宜シ得シ

木龜內シ曬シテ麵シロウ斤シ成シ單紙シ包裹シ凡中シ陰シ收シ用ヘ工時シ臨シ再シ研シ細シ  
新汲水シ用ヘ調シ敷シ皮破シ血流シ溫爛シ瘡シ黃シ赤シ瘡シ麻シ油シ調シ擦シ天泡シ火舟シ肺シ凡酒シ  
刺シ深布シ青汁シ調シ擦シ

### 小腹癰

小腹癰シ乃シ七情火鬱シ以シ脾シ虛シ致シ氣滯シ成シ其患シ小腹漫腫シ坚硬シ肉色變シ變シ赤シ熱シ漸紅シ爾シ陽シ虛シ治シ易シ熱シ變シ赤シ紅シナシ爾シ陰シ屬シ治シ難シ  
初起七日以前艾用ヘテ腫頂シ當シ灸シ之シ七壯膏シ以シ首尾シ蓋シ內シ脾胃シ壯シ氣學シ養經シ行シ補托シ利シ服シ於シ古シ保シ可シ如シ誤シ剋伐政利シ涼藥シ用ヘ者敗症シ出シ全太補湯シ之シ炎シ姜附シ倍加シ救シ內シ腐シ深シ陷シ者玉紅膏シテ肌シ長シ收欵シ又シ補托應守シ者俟シ久シ縱シ愈シルトモ必シ漏シ十

### 鶴口痘

鶴口痘シ乃シ三陰シ虧損督脉シ經シ渴氣溫疫流結シ成シ其患シ脊尾閭シ亢高骨頭尖シ在シ初起形色肥似久寸八突シ鶴口嘴シ加シ朝寒シ暮熱シ輕シ夜重

シ瀆後稀膿出テ禁キニ血ク或ハ鮮血出テ停えス凡此発生者八壯年猶可ナリ老年  
慮ナム初起滋陰除湿湯ニテニハ成リ未瀆ノ者和氣養榮湯ニテ托ス  
潰テ歎ナフ者滋腎保元湯ニテ補ノトメ漏ト成ル者琥珀蠅蓄丸宣シ

滋陰除湿湯 鶴口痘初起朝寒暮熱日軽ク夜重ク瘡モ如キ症

川芎

當歸

白芍

熟半

柴胡

黃芩

陳皮

知母

貝母

水浮

骨皮

甘草

姜水煎

和氣養榮湯

前症已成リ内消ノ得ル者托ス

人參

陳皮

白朮

黃芩

水煎服

熟半 各一钱 沉香

甘草 各五分

附子

杜仲

當歸

滋腎保元湯

前症元氣虛弱ノメ膿水淋漓久ノ歎ナル者

人參

黃芪

白朮

茯苓

飯身

山茱萸

當歸

牡丹

熟半 各一錢

附子

肉桂

甘草 各五分

蓮肉

桔梗

姜半煎

### 龍泉痘虎頭癧毒

此毒乃任督二脉ノ分合行佈驟ニ外邪ニ搏ケテ成ル龍泉痘、癰ノ人中ノ間有リ  
虎頭毒、地角上ニ生初癰癧ヲ起シ次ニ腫痛ニ生シ漸ク寒熱ヲ發シ毫キ者ハ惡心乾  
嘔、頭項俱腫レ此症久シ忌ム初起銀針ニテ患頂ヲ挑ケ破、腫上ニ蟾酥ヲ貼シ上ニ膏ヲ蓋  
シ速焫腫上ニ金黃散ヲ敷ク表症有ル者荆防敗毒散ニ斧速牛蒡方ヲ加フ裏症ニ内  
疎黃連湯己ニ膿ヲ作サシト歎ス者芳飯内托散膿成ツテ脹痛止者針入潰後只膏  
藥ヲ換貼ス、寘具口完ナリ易シ此症多ク元氣壯實ニ生ス故ニタク心シモ藥ヲ服セス

芳飯内托散

川芎

當歸

陳皮

茯苓

荳粉

桔梗

銀杏

石榴痘

石榴痘乃少陽相火外湿ト並搏成ル其患財ノ尖リノ上ニ生ニ初起一點ノ黃粟小泡根  
便開大色紅ノ坚硬腫而復碗ノ如ク皮破ケ溢出テニ膿ニ石榴子ノ加ク人ヲノ寒、戰セシ猶重

瘡ノ如ク初起即發于丁九壯内。蟾酥丸ヲ服シ汗ヲ發シ以テ瘧毒ヲ解ス。頂上ヲ多々蟾  
酥ヲ貼シ膏ヲ以テ蓋フ。焮、腫ノ處金黃、散ヲ敷内。菊花清燥湯。琥珀蠍粉丸ヲ服。燥燥  
熱甚ニ者、護心散。服ス九日ノ後、患上膿ノ作ス。稠黃ノ疼痛、稍減。表重症退キ飲食微  
進者無虞。可ノ瀆後元氣虛弱雜症相兼ル者、瘡痘調理ヲ照ソ之ヲ治ス。  
本作裏

菊花清燥湯

甘菊

川芎

當歸

知母

貝母

白芍

生芻

麥門冬

地骨皮

柴胡

黃芩

葛根

升麻

犀角

竹葉

水煎

蟾酥丸。疗瘡、癰、背、脳疽、附骨、醫眼小ノ痘、切、患瘡、口瘡、痛、或麻木、或呑  
吐病重者、必多々昏憒。此藥ヲ服ノ起、發、止者、即、發、止、痛、癪甚者、即、止、  
昏憒者、甦、止、呑、吐者、解、矣。未、成、未、告者、即、消、已、成、者、即、瘳。真、向、生、功、有、リ。患瘡、至、  
宝丹。

蟾酥

酒化

輕粉

五分

桔荅

寒冰

煅

銅錄

乳杏

沒藥

膽粉

戶雪

白芷

雄黃

三兩

蝎牛

二十九

硃砂

三兩

以上ホトシ端午ノ日、先ツ蝎牛ヲ將テ研爛シ再蟾酥ト同ク、和レ研リ、稠粘メ方、若  
茶末を、搗キ極テ、勺入九分、茶豆ノ大ノ如ク、毎服三丸、葱心白五寸ヲ用、患者嚼爛ノ急  
吐シ、茶ヲ包ミ、無灰、契酒一茶鍾ヲ用、送下シ、被フ以テ、人行五六里、カリ汗ヲ出ソ、效、甚  
き者再服ヲ進ム。

琥珀蠍粉丸。瘡痘發背已成リ、未、夕、膿、マヌ、之、際、恐、久、毒、氣、外、出、ル、能、ワ、ス、必、內、攻、平  
テ、致、予、預、シ、メ、此、丸、ヲ、服、シ、膜、ヲ、護、シ、心、ヲ、護、ノ、亦、且、ツ、亨、ヲ、散、シ、毒、ヲ、解、ス。

白荅

二兩

黃蠍

一兩

雄黃

一錢

琥珀

一錢

另研極末

蜂蜜

二錢

右研シ極末シ別ミ、蜜蠍ヲ將テ、銅杓内、溶化シ火ヲ離ヒテ、元時ニ、蠍凹、凹、稍、凝、ル、時、時候  
テ、方、ニ、ト、茶、ヲ、レ、攬、セ、勺、ヘ、兵、ニ、塊、ト、成、ヒ、テ、一、人、ハ、茶、ヲ、將、テ、火、上、ニ、微、シ、煤、リ、衆、手、ニ、急、ニ、丸  
不、安、草、ヲ、大、ナ、硃、砂、ヲ、用、テ、衣、ト、为、シ、磁、礮、承、メ、貯、ヘ、每、服、三、十、丸、白、湯、ミ、食、後、送、下  
ス。病、患、者、早、晚、日、ニ、進、ル、テ、二、次、最、効、有、リ。

穿踝疽

穿踝疽足三陰湿熱下流停滯成癰。初起內踝腫痛，疼骨底，微舉動艱辛。  
甚者串外踝及遍腫頭有陽瘍，破易。頭無者陰屬之，潰之難。此二  
者初起必寒熱，又作荆防敗毒散。牛膝加之，久之膿成，腫痛不差。  
針入腐處，取孔大告玉紅膏之，培形休虛弱者之，補之。此症早治，  
因循久，瘻疾久，初起未分膿，及寒熱之痛者，荆防敗毒、牛膝防己加葛根。  
膿潰後，元氣不足者，大金太補湯。

### 翻花瘡

翻老者乃頭大ノ蒂小ナリ。小豆ノ如ク大蔥加ノ苦無ノ灰ナク揩模每ニ鮮血ヲ流ス。久ニ亦今  
虛火津ヨ以テ冰蠅散ヲ調へ遍ノ正西襟上。軟油紙ヲ以テ包裹シ根蒂細處ニ線ヲ用ヒ  
紙連子丸緊シ。十日ノ後其患自落。珍珠散ヲ換テ換テ口ヲ收之。又根蒂小ナニ散薑根  
子様ノ如クノ丸シ難キハ以前ノ茶ヲ上捺シ麵糊錦紙ヲ用テ上ヲ封之。二重心ヲ用テ動ス  
ノ勿レ亦十日ノ外ラ以テ之ヲサ洛。珍珠散ヲ換ル。

### 大麻風

大麻風症乃天地間ノ異症ナリ。但感受同シカニ體虛ノ人有リ。驟々陰陽暴曬  
露霧風雨ノ氣侵セ感シ。覺ス。發泄經ス。肌膚凝滯ノ積テ。スク必作火房熱ノ後體  
虛風邪。襲ワレ。或露臥ノル。當リ溼地。睡眠ノ或洗浴涼ニ乗ノ快意ヲ稀。圖リ  
或冷水招ク。世代留毫此未相感ノ俱。飲クミヲ致。其患先ツ麻木不仁ヨリ次紅班  
ニ疊シタ破爛浮腫。膿ナク又皮肉ノ麻木不仁。肉外ノ刀割スレ。痛ス。血肉ノ破爛水流  
筋肉ノ指節脱落。骨外ノ鼻梁崩塌。此五症俱。未治トス。又曰心ニ受。冬ニ先日擾  
シ肝受テ面紫泡ノ聲シ脾受テ偏身癱ノ如ク肺受テ眉毛先脱。腎受テ足底先穿  
ツ之ヲ五敗症也。總テ皆凡温相兼相乘シ。元血凝滯表裏和セ。藏府痞塞。陽火變  
口元此其根蒂也。初起麻木不仁。肌肉未タ外セ。萬靈丹宣シ洗浴ノ汗ヲ發シ以テ凝  
滯止。散シ後苦ヲ九服ス。年多肌破肉死。死者先ツ必勝散ヲ用テ藏府ヲ疎通シ  
次萬靈丹ヲ服メ。每日酒一丸化ス。血脉通活ノ服五十一月至。換テ苦ヲ九服轉  
半年。重者載漸愈。或兼テ酒茶ヲ服。厚味動凡ホノ物忌戒。終年保

チモセアル可シ

萬靈丹 大麻凡初起麻木不仁或既久少皮膚破裂手足拳挛肢體便不可但  
未タ指脫シ足穿タク者並服ス宣シ方見癒矣  
心勝散 大麻凡血瘀秘結臟府通セル者

大黃 桃榔 白牽牛各一錢 粉霜一錢五分 右藥酒半升壯筋、五服  
作中年全者七服ト作生姜四兩搗汁赤砂糖三錢ヲ用ヒ水二杯ヲ加ヘ三味和焉睡時  
臨腹中稍空半守頤溫トテ通ヨミ服入即睡睡テ三更至リ遍身麻木針ニ刺分如頭  
目迷達俱痛此藥病ヲ尋ル之功已達ノ大小二便ヲ行出、或青白黑黃又或紅紫之  
類此乃病根十リ月内薬ヲ服五ト亥漸ク痊テ眉髮俱生シ肌膚舊ノ如ク速愈  
有ル者後薬ヲ漱ク宜シ

漱藥方

大黃裹 黃連各三錢 水二鍾煎ノ一半至リ水阮少許ヲアレ毎日陸續之ヲ漱ク其  
首止兼テ動凡油膩之物忌ム

苦多丸 大麻凡新久分ツイ母ク穿破潰爛老幼俱宜シ  
苦多一钱 大凡子肉三分 荆芥十二兩 防凡 白芷各六兩 全蝎  
白附子 枸杞子 咸靈仙 當歸 大胡麻 川芎  
蔓荆子 風藤 蔓活 連翹 蒼朮 天麻 杜仲  
草烏 日吵各三兩 人參二兩 砂仁二兩 白老蛇二兩切片炙黃  
右藥トシ醋三テ老米糊ヲ打テ丸トス梧桐子ノ大ア毎服三至九溫酒テ食前後任下  
凡ヲ避ケロヨシ心ニ砂トス

麻凡藥酒方

防風 當歸 虎骨 泰丸 卷活 苦多 牛膝  
姜黃 松節 蟬甲 藥末 抱抱子 抱抱子 白茅根  
全而草麻子仁二兩 好雪酒二斤用生葉ヲ以テ袋盛り酒内浸三晩口ヲ  
封ソ煮丁香三枝取起ソ水内浸丁伏時取テ數杯ヲ服ソ自効有リ

雄黃硫黃散 大麻凡眉毛鬚髮脫落痒

・<sup>ヲ</sup>作<sup>フ</sup>者

雄黃

硫黃

鳳凰皮即雞殼燒黃存性各五錢

川山甲

生炒黃

滑石

一兩

右螺トシ牛油核桃肉ニ西ラ用搗爛シ公猪胆汁一箇ト同ク前藥ト和シ

匂青紗ヲ用葉ヲ包ミ之ヲ擦ス日用ル丁亥其髮漸生ノ舊ノ如シ

擦麻凡方 面紫塊毛瘡ヨリ生シルヲ治ス

川山甲

川椒炒各等分

末トシ生姜汁土大黃汁調稠シテ銅包ミ患止擦ス

分葉乾々水ヲ加エ調擦ス亦効有リ

脹瘡

脹瘡俗夾癰ト称ス此肝脾二經患ニテ多耳肝經血滯脾經氣壅矣信ノ腫ヲ為ス初起皮色變  
矣漫腫頭無ク日久クノ方ニ疼乃寒熱ヲ生此患消シ難シ終ニ心又脹トル未破レサル者柴胡  
清肝湯己ニ破者十全大補湯肉桂ヲ去リ杏附陳皮ヲ加エ軟腫脹痛者針ス膏ヲ貼  
此症首尾溫補可シ寒涼ヲ用エハ勿ム

大風腸瘡

脹瘡久留不愈肝火ヨリノ起ル者之ヲ肥脾内实者此症鮮ナシ初起ヲ梔子清肝湯宣シ  
亦柴胡清肝湯宣シ蔚ヲ解シ少ラ浮ス己ニ成ル者托裏消毒散青皮香附ヲ加エ脹己ニ  
成者針内膜ヲ傷ヒトケレ破後ハ珍湯舟皮山須臾次浮ヲ加エ兼テ腎水ヲ滋ス又虛勞  
人得所ハ破ヒテ臭敗稀膿ニ流ス補托應サレハ效ス

鼻痔

鼻痔肺氣清カラニ絲ルニ湿蔚滞ノ成ル鼻内瘻肉結ノ榴子ノ如ク漸太シ下リ垂レテ  
孔竅閉塞ニキヲ宣通スルヲ得サラシム内ニ辛夷清肺飲ヲ服ノ外ハ硇砂散ニ用ユ遂  
日點大劑化ノ水トカリ乃愈兼テ飲食ヲ節シ厚味ヲ断テ急暴戒ノ房慾ヲ省キ  
愈後庶久再發矣

辛夷清肺散 肺熱鼻内瘻肉初テ榴子如ク後漸大孔竅散ニ閉塞ニキ宣通スル  
者

辛夷六分

黃芩

山梔

麥門

百合

石羔

知母

甘草三分

枇杷葉三錢

升麻三分

右水煎服

硇砂散

鼻瘻肉ヲ生シ初メ榴子ノ如ク漱太ノ下無不意名ケテ鼻瘻トス

硇砂一茶

輕粉三分

冰片五厘

雄黃三分

共ニホトシ草桔子用毛咬ニ葉リヲ

薰シ勸テ瘻上點ス日用テ五六次自然漸化ソ水ト為リ愈

### 取鼻瘻法

先曰杏艸散角連リ吹丁二次次細銅筋二根角筋頭一小孔鑽ス絲線角孔内穿  
十二筋相離リ丁五分許リ一筋頭ヲ以テ直ニ鼻瘻根上ア筋銀ヲ將テ段際ソ下ニ雪  
一枝モ其瘻自然拔落ス水中置テ其大小觀ル頑シテ胎髮燒灰角象牙ノ末ト同シ  
分鼻中吹ク其首ヲ止

### 回香艸散

回香草高良姜麗シ乾シ水分ホトシ此用先ツ鼻瘻上吹ニ次元時後方隨取法ヲ  
行フ其瘻自然脫シ易シ

骨槽風

槽當作槽下同

骨槽凡初メ耳前生ニ連テ腮項及痛筋骨隱シ寸々漸々浸腫シ寒熱瘻ノ如ク牙

之關以緊閉食ヲ進ヒ能ワ此瘻怒ソ肝ニ傷ル得テ筋骨以緊急致思慮脾ニ傷リ肌  
肉腐爛致ス膏梁厚味膿致ノ多、臭穢初ソ坚硬消シ難ク寸々瘻口合シ難シ初ソ腫頂  
交發入室及耳垂下五分各灸至十七壯膏ヲ以テ貼ス以テ內毒ヲ泄シ真君妙貼散ヲ腫上敷  
一牙關内腫セ、線針ヲ用テ刺ノ出血去ル氷硼散ヲ捲ス内外毒氣ヲ解化シ得セ云降火化瘀  
清熱消腫剤服宜瀉後托裏藥中夾門五味ヲ加フ當シ外腐者玉紅膏水昇リ火降  
脾健金清ノシメテ乃愈、又外腐合只虛熱退ク、堅腫消セス形焦體削充者少ス

清陽散火湯 牙根尽ル處信腫連ツテ耳項皮ニ痛ヲ作シ骨槽八十名ク

升麻

白芷

黃芩

牛蒡

連翹

石羔

防風

當歸

荆芥

白芷

名一

甘草

五分

水煎服

中和湯

前症已定、潰瘍、流膿、臭穢、疼痛皆有者

人參

黃芪

白朮

白芷

川芎

當歸

甘草

桔梗

白芍各一錢

肉桂

麥冬

霍香名五分

姜棗煎酒ヲ入服ス

紫白癰風

癰凡乃一體ニ腫紫ハ血滿肉リ白ハ氣滞ニル總テ其體凡濕侵アレモ孔<sup>ノ</sup>凝ツテ氣血行<sup>フ</sup>ガ<sup>ル</sup>ニ蘇ツテ致ス所此皆外ヨリ未<sup>ル</sup>初起毛竅閉<sup>テ</sup>體強キ者萬靈丹<sup>ヲ</sup>汗<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>散宣<sup>シ</sup>候胡麻丸<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>常服シ外蜜陀僧散<sup>ヲ</sup>搽擦<sup>ス</sup>亦愈<sup>ハ</sup>ト<sup>ヲ</sup>得可<sup>シ</sup>

胡麻丸 癰凡初起皮膚痒キ<sup>ヲ</sup>作<sup>シ</sup>後癰凡<sup>ヲ</sup>癒<sup>ノ</sup>漸開大ナル者

大胡麻四兩

防凡

威靈

石菖

苦<sup>ク</sup>各<sup>二兩</sup>

白附子

独活各<sup>二兩</sup> 甘草五錢 納<sup>ト</sup>シ新安酒漿<sup>ヲ</sup>跌<sup>テ</sup>丸<sup>ト</sup>シ毎服二粒形瘦<sup>ル</sup>者<sup>一丸</sup>五分<sup>ヲ</sup>白滾湯<sup>ヲ</sup>送下ス愈後百日禁已<sup>ス</sup>

雌雄四黃散 癰凡搽<sup>ス</sup>

石黃

雄黃

白附子

硫黃

雌黃

川槿皮各二分

末トシ此紫癰凡<sup>ハ</sup>堅槿木毛頭<sup>ヲ</sup>用菜<sup>ヲ</sup>蘸<sup>シ</sup>患上<sup>ニ</sup>搽<sup>ル</sup>白癰<sup>ハ</sup>姜<sup>ヲ</sup>角切開<sup>キ</sup>菜<sup>ヲ</sup>蘸<sup>シ</sup>搽<sup>ル</sup>

後三日湯水<sup>ヲ</sup>下<sup>ス</sup>乞<sup>ム</sup>

又方

雄黃

硃砂一分

茄蒂炒

細末<sup>ニ</sup>患處搽<sup>ス</sup>

蜜陀僧散

蜜陀

硫黃

輕粉

茄蒂炒二分

末トシ姜汁<sup>ヲ</sup>調<sup>ヘ</sup>搽<sup>ス</sup>

一方

蜜陀

雄黃

胆卷

硫黃二分

末トシ醋<sup>ヲ</sup>調<sup>ヘ</sup>塗<sup>ル</sup>

又蜜陀僧散

硫黃

雄黃

蛇床子各二钱

石黃

蜜陀各二钱

輕粉五分

末トシ醋<sup>ヲ</sup>調<sup>ヘ</sup>塗<sup>ル</sup>

肥皂方 癰凡酒刺雀斑<sup>ヲ</sup>治<sup>ス</sup>

皂角

寸松

朱索

皇<sup>ク</sup>各<sup>二钱</sup>

蜜陀僧

白附子

朝脑各二钱

猪突子

菜荳粉各三分

糸繩<sup>ト</sup>淨皮弦<sup>ヲ</sup>充肥皂一筋用

テ槌<sup>テ</sup>匁<sup>ヘ</sup>患<sup>ト</sup>洗<sup>ヒ</sup>標<sup>ス</sup>日<sup>ノ</sup>自効有<sup>リ</sup>

瘡病

齒病凡有り久有り亦陽明濕熱有り俱能ノ之ヲ致ス風痛凡遇テ浮腫ヲ發作ス隨後  
痛生ス消凡敵ニ宜シ火痛少齒根必腮觀・樟扯シ陳々痛ヲ作る時登シ時止水硼散ノ  
以樟ル延テ出ノ自愈陽明經濕熱痛ヲ作者且患腮觀浮腫甚者太陽三章引疾頸  
項連リ口中熱氣大便結燥ス涼膈散ニ宜シ石羔ヲ加フ又腫高ク軟ナルモノ必膿有リ針ヲ用テ  
刺破シ膿ヲ出ノ自愈ニ齒根腐爛出ノ止マカル者犀角地黃湯ヲ服シ外入中白散ヲ搽又  
小兒鑽齒牙根尖リテ齒根肉外ミ穿出シ芒刺唇ヲ嘴者痛ヲ作ス拔針角牙面好  
肉ヲ桃破ス午ヲ以テ本牙ヲ取り去ル血ヲ出ノ止スハ湿散ヲ以テ換貼ス二三度其血自止必  
厚味成可シ其牙復生元ト舊ノ如シ

涼膈散 陽明經ノ湿熱上攻牙根齦腮項腫ヲ作シ痛者

連壳 山梔 黃芩 薄荷 各一錢 甘草 五分 大黃 二錢 朴硝  
麥門冬 石羔 一錢五分 大竹葉 三十片 水煎每服蜜丸

清寒散 曾經積熱牙齒或牙根腫痛或頭腦三章引シ痛ニ或高燒耳紅並治火

當歸 茜蓮 生芒 山梔 各一錢 牡丹皮 六分 升麻 八分 甘草

人五分 水煎服

草楂散

凡濕蟲牙腫ヲナシ夜痛ヲ治ス陽明內熱用半勺レ

草楂

阿魏各三錢 水元 广香各一錢

牙疼方

痛齒中之楂散ス熱涎ヲ吐去リ溫湯ニテ嗽ク再搽ハ愈ニ獐水一錢ヲ加フ

牙疼方

楂

蟾酥 二分 川椒 五分 飛鹽 三分 鈿末トシ卿桔角用毛咬ニ菜ヲ蘸

之痛牙根上之楂點ス

犀角地黃湯

陽明積熱牙根腐爛出ノ止及諸吐血衄血吐血

犀角

生芒 白芍 牡丹

各三分 木煎服面色痿黃大便黑者

更服至宜シ牙齒中牽引血出者亦妙ナリ

止齒生湯

生荷葉

生艾

生柏葉

生芒 各三錢

木煎溫服每用童便二

今更妙ナリ

消风散 凡遇<sup>テ</sup>炭火浮腫痛<sup>ヲ</sup>作<sup>ス</sup>

當歸 节 防風 知母 苦参 胡麻 木通

姜水煎

冰硼散 火痛齒根心扯動<sup>シ</sup>腮顎陳々痛<sup>ヲ</sup>時發<sup>シ</sup>時止<sup>ス</sup>

冰元<sup>五分</sup> 珠砂<sup>六分</sup> 玄明粉 硼砂<sup>各五錢</sup> 细末<sup>ス</sup>

棟果茶 陽明胃経ノ实火上攻<sup>シ</sup>斷血<sup>ヲ</sup>出<sup>ス</sup>者

棟果二箇<sup>ヲ</sup>用肉桂<sup>ヲ</sup>連子<sup>ヲ</sup>搗キ爛<sup>シ</sup>包<sup>ミ</sup>收<sup>メ</sup>先温湯<sup>ヲ</sup>用<sup>ヒ</sup>口<sup>ヲ</sup>漱<sup>キ</sup>血<sup>ヲ</sup>出<sup>ル</sup>處<sup>ヲ</sup>塞<sup>ケ</sup>ハ血

自止<sup>ス</sup>

蘆薈丸 胃虛火動<sup>シ</sup>牙根腐爛常々血<sup>ヲ</sup>出<sup>ス</sup>者

蘆薈

柴胡

黃連

胡連

葛根

芍藥

甘草

桔梗

竹葉<sup>十枚</sup>

山梔

石羔

薄荷

羚角<sup>各五分</sup>

升麻

甘草<sup>各三分</sup>

桔梗

人中白散 小兒大人牙齒走動腐爛<sup>シ</sup>牙逢<sup>ヨリ</sup>血<sup>ヲ</sup>出<sup>ス</sup>者

人中白<sup>ニ</sup> 白兒茶<sup>一兩</sup>

黃柏

薄荷

青黛<sup>各三錢</sup>

冰元<sup>五分</sup>

知母<sup>シメイモ</sup> 温湯<sup>ヲ</sup>漱<sup>テ</sup>血<sup>出</sup>ル處<sup>ヲ</sup>擦<sup>ル</sup>

●温熱甚<sup>シ</sup>痛<sup>モ</sup>兼氣湯 ●上下牙痛忍可<sup>ス</sup>牽引<sup>シ</sup>惱入<sup>ル</sup>者或寒<sup>ニ</sup>喜<sup>ヒ</sup>熱<sup>ヲ</sup>惡<sup>ム</sup>脉數  
力有<sup>リ</sup>涼膈散酒蒸大黃<sup>ヲ</sup>加<sup>フ</sup> ●大腸熱<sup>ノ</sup>止<sup>ム</sup>斷<sup>ム</sup>脛痛<sup>ノ</sup>者清胃散 ●火煖<sup>シ</sup>痛<sup>者</sup>越  
鞠丸 ●腎虛<sup>ノ</sup>痛<sup>者</sup>六味丸<sup>ヲ</sup>骨碎補<sup>ヲ</sup>加<sup>フ</sup> 腎經寒<sup>ニ</sup>痛<sup>ニ</sup>八味丸<sup>ヲ</sup>細辛<sup>ヲ</sup>加<sup>フ</sup> ●凡熱  
厲<sup>シ</sup>者卷獨荆防芎<sup>辛</sup>薄生半<sup>ノ</sup>類宣<sup>シ</sup>若愈<sup>ス</sup>八茵陳散

茵陳散 蔷薇赤腫疼痛及骨槽尺熱

茵陳

連壳

荆芥

麻黃

升麻

羌活

薄荷

姜桑<sup>各五錢</sup>

細辛<sup>二錢半</sup>

大黃

牽牛頭末<sup>各一錢</sup>

散トシ毎服三錢沸湯<sup>ヲ</sup>煎<sup>シ</sup>茶<sup>ヲ</sup>入<sup>シ</sup>攪<sup>セ</sup>急<sup>シ</sup>傾<sup>テ</sup>出<sup>シ</sup>食後寧<sup>シ</sup>和<sup>シ</sup>热<sup>取</sup>ス

●跟蹤筋弩出<sup>シ</sup>或凡毒及熱壅上攻牙齦痛<sup>シ</sup>消風散 ●凡脳充<sup>シ</sup>者卷活附子湯

●牙痛涼茶<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>更毫<sup>キ</sup>者從治又草<sup>ノ</sup>根川椒薄荷細辛毫脑青鹽末<sup>ト</sup>擦<sup>ル</sup> 梢  
得<sup>テ</sup>痛涼<sup>ヲ</sup>得<sup>テ</sup>止<sup>ス</sup>者小兼元<sup>シ</sup>草苦建<sup>ヲ</sup>加<sup>フ</sup> ●凡齒痛勞過<sup>ハ</sup>即發<sup>ス</sup>午後是<sup>キ</sup>

者補中益元湯六味丸下脾胃ノ虛熱ナリ

犀角升麻湯

齒銀腫痛癥赤頬頰及此胃經久熱

犀角 鎏三枚 升麻一枝参 防风

羌活各一枝二分白芷

黃芩

白附子

全瓜 甘草 各四分 水煎服

●善飲者齒痛頬頰煩熱腫此胃經虛熱清胃散葛根ヲ加フ  
●補胃桃葉茶水服之上下痛

忍可也者或頭腦引滿面老熱大痛冷喜之熱不寒也清胃之蘭香ヲ加フ寒桃皆痛

當吸毫胆散宣上邊痛升麻ニ信シ下邊痛白芷ニ信ス

當吸毫胆散

齒痛寒熱身疼

升麻

麻黃

生半

當吸硝

白芷

草蔻

草蔻胆

黃連

羊胫骨灰

水

散トシ

每用少許牙疼處搽良多

涎吐シ去ル

●口臭近ノ可交牙根疔蝕血出ツ乃チ恣肥寸食シ美酒ヲ飲シ致所胃中湿熱大忌  
清胃散：茵陳香薷白豆蔻ヲ加フ先ツ熟大黃ヲ以テ泻五一二次胃中ノ湿熱ヨリ除白芷

清胃散

散

羊胫骨灰

水

散トシ

每用少許牙疼處搽良多

清胃散

散

羊胫骨灰

水

散トシ

每用少許牙疼處搽良多

房齶齒牙即動搖長久虛腎清胃藥水服ノ便ニ効有矣若肾火邪盛ナリ

黃芩

酒三枚

青鹽

升麻各一枚

旦ツ漱キ且嚥以テ之ニ撮ス或ハ生半

生而骨碎補

細辛一方

秦椒七粒

酒水搗キ畧煎青鹽少許入レント如日漱吉嚥水服毛利良

●牙疳腫腐肉痛ヲ作人

人中白

青鹽

水

散

小兒瘡毒ノ食

丁ヲ好克ク病ヲ生ス之ヲ治ム愈アル者石蜜ヲ以テ不時ニテ嚼シ糖並煉肉ニ温熱ヲ助

各石蜜火熬ヲ経ズノ其性木寒故ニ能ク存ス專ニ同氣ノ相應尤取ル

●龋蛀數年愈不當陽明畜血ト作シ治スシ桃梗姜半湯ヲ細末トシ蜜丸トシ桐子大ア

如クニ服ス好飲家此多シ屬服ノ効有リ

●局方引涎止痛方

川椒

露蜂房

微炙水

木三分

水並鹽少許入丸

頻漱之冷テ

即吐出ツス

或ハ

蟾酥銀硃

散和丸

大菜菔子

大ナガ

毎用一丸患處

搽

便痛

三丸至濃涎數口

吹シ即愈工

●又不蛀ノ皂角一莢ヲ用皮子ヲ去リ皂子處於テ巴豆一粒ヲ安シ鹽泥固ク清シ燒令研  
細末シ蛀孔内填令白芷細辛ヲ煎シ漱或以溫米醋漱久出メ自愈或食鹽ノ滴齒  
ニ用漱ナニ三次以テ其虛陽ヲ根ス且痛即止但暫久可シ其能ク瘻ヲ損スルヲ以テナリ

●牙齒動搖者六味丸膏碎補ヲ加陰虛內熱者且露飲角子外五倍子散金

散長春穿牙散宣

五倍子散 牙齒物傷ニ動搖治シト歟

五倍子

干地毫 微焙為末小分

先生姜ヲ將テ牙齦擦シ後以茱萸數ヶ七日

硬物ヲ嚼テ得ス骨碎補濃煎用テ時々漱ノ如シ齒初テ傷レ若シ歎ノ故加シ

茱萸擦ス齒槽中貼ス止血上至テ即牢ノ故加シ

烏金膏 牙齒動搖髮鬚黃赤此ヲ用テ齒助牢髮即黑シ

生姜汁半兩搗取自然

生芷一觔酒浸一宿

大皂莢 不蛀者十粒刮去黑皮將前二汁和

度右皂莢ヲ將テ地黃、澤卜同ノ磁罐内に入煅テ性ヲ存シホトシ牙齒初テ搖ク茱萸用テ

銀擦ス鬚髮黃赤鉄墨ヲ以テ茱萸三粒盞利湯調合三口過シ茱萸ヲ將テ鬚髮ヲ

洗擦ス鬚髮黃赤鉄墨ヲ以テ茱萸三粒盞利湯調合三口過シ茱萸ヲ將テ鬚髮ヲ

傷寒

長春穿牙散 鬚須髮ヲ烏クシ牙爪ヲ去リ口氣ヲ除ク

天升麻

川芎 細辛 白芨藜

五方

當作槽

散トシ早暮牙擦ス次ニ水ヲ以テ漱キ吐出ス髮毛ヲ洗フ

五倍子

皂芳

青鹽 各半兩

河子肉

役石子 各三錢

鹿射香

●骨槽同 耳前三生三痛筋骨引キ寒熱瘡如ク牙關緊閉食ヲ進ムト一能ロ府匱  
待多ノ葉使脫落此凡毒竈入骨槽ノ致斯所ナリ初火坚硬消ニ難シ急艾灸宣シ且外  
齒齦ヲ鍼刺シ以テ其毒ヲ泄ス冰瓦硼砂云明粉ヲ散トシ吹拂ス内之降火化瘀ヲ服ノ腫ヲ消ス久  
キトキハ瘡口合難シ多茂飯芍補托兼子肉主冬味ノ類ニ非アハ結ヲ破リ肌ヲ斂牛能只治法前  
詳ナリ若ニ膿腫消セバ虛熱退カス形焦レ体削立者治セ

脳漏

脳漏又鼻漏ト名ク總テ凡寒惱戸ニ凝ス太陽溫熱下交ノ蘇シ乃为真患鼻漏涕流  
或黃水ヲ流シ點々滴々長濕乾ケテ無ク全寸頭眩虛暉已ニ霍香湯ヲ以テ治シ天麻

餅子ヲ調フ漸ク愈エ可シ如ヨタメ虛ム眩ム已マシ補中益元湯六味地黃丸相間ヘテ服化  
涼ラク滋シ始テ愈エ多シ陽明伏火致ス所レ茶ヲ以テラニ散ス辛夷散シ蒼木甘ハ薄荷ホ  
加フ夏月八黃芩石羔ヲ加應セ瓦火ニ非入膈上溼疾ニ宣ヒ發ハ有リ雙解散シ辛夷ヲ加フ當ニ  
寒ヒヤクシ方カシ涕濃シ臭キ者ノ湖トス熱ヒヤクシ屬ス清涼ノ藥ヲ散ス涼清シ臭カニホルモノル勦トス  
虛寒ニ属ス辛溫イ藥ヲ調フ鼻中時々真キ黃水ヲ流ス者甚大ハ惱モ亦痛ハ俗ニ控ハ愁シ砂ト名  
ク絲瓜藤近根三五尺許燒テ性ヲ存シ藥シ酒調服ス即ヒ愈エ凡テ鼻ノ惱ハ漏生附子モ  
トシ煥葱ノ延ハ和ハ泥ク如ク夜間湯泉穴ニ塗ル

辛夷散

鼻塞リ香臭ヲ聞カス涕出テ止マス

辛夷仁一兩

細辛三錢

藁本七錢

升麻

川芎

白芷

木通

防風

甘草

散トシ每服二錢食後茶ヲ調服ス

天麻餅子

鼻渴涕或黃水ヲ流シ長ク湿リ乾ク無ク久寸頭瘡虛暉止マス

天麻

艸烏頭煨

川烏頭炮

川芎

細辛

蒼木

甘草

薄荷

防風

白芷

附子各三錢

雄黃

甘草

薄荷

甘松

防風

白芷

附子各三錢

雄黃

雙解湯散

鼻渊癰ヒヤクシ屬ス者ノ

大黃

巴硝

甘草

連翹

黃芩

梔子

薄荷

桔梗

川芎

當歸

白朮

防風

荊芥

麻黃

石羔

滑石

連翹

黃芩

水煎服

奇愛霍香湯

鼻淵黃水渴涕長ク流シ腦戶虛瘡已マシ

藿香連枝帶葉者五錢

水一小碗七分煎シ公猪胆汁一枚加シ和ハシ勦ハシ食後通口服ス至テ

重者三服過マ菜苦シ毫モ服ス堪シ藿香末一兩用公猪胆汁ヲ稠膏シ熬シ丸トシ每服二錢食後白滾湯ヲ送下ス

破傷風

破傷風皮肉損破ル因テ復外ハ被リ絆合シ龍襲アリ漸傳テ裏ハ真シ寒ヒヤクシ交ク作り口禁咬牙角弓及張口延沫ヲ吐シ陰元寸半身涼自汗傷處及平陷ヲ作シテ  
故ノ具毒內收ル萬靈丹ヲ用テ汎フ安ス當ニ取リ出サシ次ミ玉真散

ス患心ト一貼ス膿ヲ得テ効トシ如シ汗後前症退カヌ傷處高カヌ漸醒メ漸リ昏時<sup>ニ</sup>  
時止ロ噤閉クス語声出テスハ終ニ矣

玉真散 破傷爪牙閻緊急角弓反張甚キ才咬牙舌縮

南星

防風

白芷

天麻

羌活

白附子 各一小分

末トシ毎服二支熱酒二鍾調服ス更傷處敷ク若牙閻緊急腰背及張甚者毎服三  
支樊童便用調服ス内ニ瘀血有リト雀尾示愈工倍久至テ心腹尚溫者二服ヲ連進  
ス亦保全可シ若爪犬咬ヲ治スルニ漱口水ヲ用テ洗清之處ニ搽ムニ効古リ

鎮爪散

破傷爪諸藥効力大危急ナル者用テ必不應ス

鯉膠 加殿微焙 桑粉焙黃 皂角各一而炒紅色 砂砂二錢另研 末トシ毎服二支

無灰焚酒調服ス如シ一切猪羊爪尾癰ノ昏倒人古又知ニル者毎服三支二服即愈ハツ  
其外傷處多ニツレ七壯疼痛ヲ知者乃吉兆トス

○或人云ク破傷爪皮肉ヲ數キ破ル肉テ爪テ爪邪毫衣ノテ發熱寒ヲ憎木感冒ト異ナラス又諸瘡  
潰後凡邪虛乘ノ内毫衣ノ其症最急ナリ往々視テ尋常より終ニ變テ致干種々多殺

口鼻ニ至ル亦瘡樊齧結多ク白痴ヨリク瘡口閉塞元宣通其地甚ノ爪ノ生ニ或湯淋ノ用  
湿氣瘡口アリ入リ其人昏迷沉重者有リ或艾灸火燐ノ火燒逼今煩燥蒸熱者有リ  
但瘡口アリス可ニ瘡口平ニナキ者破傷爪ナリ瘡口迎黃水ヲ出モ破傷濕ナリ瘡口焮  
腫赤色アル者破傷火ナリ其湯火ノ毒亦破傷火ト異ナルテ血シ薛己云膿血大泄陽陰  
隨テ散シ或筋脉拘急忍寒惕搦甚シキ者舌強リ噤頂及張疼涎壅甚便閉チ  
汗出テ不時登机次此氣血俱虛ノ傳变破傷爪ト相類スト金匱主治法大元血ヲ補  
可シ若東爪症係モノテ須テ大元血ヲ補フヲ以テ本トソ爪葉ヲ兼スシ若是  
非ヲ審キテノ安ニ葉セ誤慎マカル可シヤ

羌活防風湯 破傷爪邪初メ表裏在者

羌活

防風

甘草

川芎

藁本

當歸

白芍

羌活

地榆

細辛各五分

木煎服

羌活

菊花

麻黃

川芎

石羔

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

白芍

蔓刑

枳索各五分

薄荷

白芷各二分半

水煎服

大芎黃湯 破傷風裏在者疎導子入シ

川芎

羌活

黃芩

大黃各二錢

水煎服藏府通和化度久

五積散

八腎ノ傷リ腰痛或左或右痛常處ナリ而足三牽引尤者宣シ

當歸

川芎

白芍

蒼朮

厚朴

陳皮

茯苓一方裹

牛夏

白芷

枳壳

桔梗

乾姜

官桂

各五分

瓜石湯

破傷風熱証

瓜萎仁

滑石一錢半

南星

蒼朮

赤芍

陳皮各一錢

水煎

黃連

黃柏

黃芩

白芷

甘草二分

姜木薑

水煎

養血當歸地黃散

破傷風久ノ元血漸虛シ邪氣冒入ル

四物湯

藁本

防風

白芷

細辛

水煎服

水煎溫服覆蓋微汗ヲ取ル

芎黃湯 破傷風便秘弱赤

川芎

黃芩

甘草

葱白四茎

香豉一合

水煎服微汗取

左竅丸 破傷風牙關緊急

左盤龜

即鵝糞微炒

姜黃炒

鱉膠

蛤粉炒各五錢

雄黃一錢

末トシ飯糊九梧子大ナメ服ナカニ温酒下ス一日三服ス如シ症重ノ已ラハ每服茱萸一錢  
飯糊中巴豆霜ヲ五厘加シ每服中二丸ヲ加フ此如ク漸加至テ十九ニ至ル利尿ヲ度トス

八珍湯

十全大補湯

補中益氣湯

逍遙散

此等ノ方或牡丹皮山梔子釣藤症隨テ加ス

萬靈丹

鴻臚館考略卷之二終

