




徽瘡口訣

吐方考
全

十武
402



獨嘯菴先生著

癩瘡口訣

全

發行書肆

積玉圃
文寶堂
藏

武
402

癩瘡口訣序

史評云子長平生好游將盡天下之大觀然後
為書鳴虜嘯菴之於醫也亦猶腐令之於文也
歟洛下之游北越之行汗吐下三瀉於是乎備
矣而山陽西海皆其試技之地游記之言可以
槩見焉若茲編則匯行餘口訣耳蓋癩毒之
流乎海內生民之一大厄而俗手粗工往往
戕以降敵也如不為橫天之冤鬼或為廢殘之
畸人嘯菴有憂之苦心求其治法凡診察之中
機方藥之經驗隨而錄之以為後學標準其有



功於濟世豈淺鮮乎哉又嘗聞之斯人少小患斯疾乃知件之錄不唯周游天下多見闕殆而親以身試之昔太史公以救李陵卒下蠶室故其於游侠偵殖殊極摹畫固非國字小錄之可得而比也然憤蘊之所發事情相近也醫家取準於此慎施其治則庶乎寡悔矣

天明戊申冬十月岡山菱賓書于浪華推枕軒

獨嘯菴口訣

凡此微毒一症、中古以來、病之、中華、三、テモ決

定端的ノ方書無シ、陳九韶ガ、微瘡秘録ト云ヘル、一書

アレドモ、下手醫者ノ、著タル書ナレバ、治療ノ手本ト

ナレ難シ、近年此病、諸國ニ、流傳スルヲ、大方ナラズ右

在津々浦々、至ラヌ所ナク、跡先ナシノ、年少ノ徒ハ、治

療ノ道又疎略ニ打遣リ、終身ノ患トナル者夥シ、况ヤ

此病、一度傳染スレバ、兔角、筋骨關節ニ流注シ、年ヲ累

ノ遺毒ヲ受テ、出生ノ後、或ハ終身全人トナラズ、或ハ
鼻落チ咽破レ、手足毒腫ヲ發シ、或ハ惡血凝結シテ、何
トモ知レヌ、症ヲアラハシ、痘瘡麻疹等ノ節害ヲナス
事、種々無量ニシテ、枚舉シガタシ、予、諸國ヲ經歷セシ
内、肥前長崎、或ハ京大坂、江戸ナドノ如キ、都會繁華ノ
地ハ、十人ニ八九人ハ、此病ヲ病、医ヲ業トスル者、能々
心得アルベキ事ナリ、又此病ハ、昔ヨリ、素人療治ニモ
スルコト、仕似セトナリテ、夫ニテ、輕粉水銀ノ毒ニ中リ
テ、終身廢疾トナル者モ、亦多シ、此病ニハ、輕粉水銀モ、
用ヒザレバナラヌコトモアレド、至テ峻峻ノ藥ナレバ、

素人業ニハ、アブナキコトナリ、是又大ニ傷ムベキコトナ
リ、箇様ノ事、イツレ生民ノ大患ナル故、目ニ見耳ニ聞、
手ニ仕覺エタル事ヲ、アラアラ書付侍ルナリ、猶追々
非ヲ知り、又經驗ノ事モ出來バ、裁定添削スベシ
此病ヲ受タル人、下疳便毒ニ限ラス、一度受ルトモ、ツ
百日ハカリハ、病ト思フベシ、大抵世上ノ人多ク人ニ
カクシ、傳藥チラシ藥ナドヲ用ヒ、或ハ早ク山歸來ヲ
服シ、早クナホサンヲ事トシ、日ヲ經テ毒氣内攻シ、或
ハ骨痛トナリ、或ハ目鼻ニカ、リ、耳聾、楊梅瘡ヲ發ス
等、其類一ナラズ、一大事ナリ、此病ヲ受得タル人、體強

キ人ナラバ、新瘡ヲ問ハズ、當歸芍黃連翹金銀ノ類ヲ
 服シ、徐々ト毒氣ヲ下シ、腫物ニテモ、疵ニテモ、大概勢
 衰タル所ニテ、山歸來ヲ用フベシ、尤新ナル内ハ、隨分
 毒忌セザレバ、毒氣内ニ增長シテ、左程ニナキ病モ、大
 切ニナルナリ、後藤左一郎、香川太冲ナトハ、隨分毒ヲ
 食テ、毒ノ上ニ発スヤウニ、スルガヨキト云ヘリ、是尤
 ノ論ニテ、諸病ハ勿論、此病ハ別シテ、上ニ浮タルハ、治
 シ易ク、底ニ沈タルハ、治シ難シ、瘡疾ト成テハ、隨分肉
 食ナドヲスルハヨケレド、新病ハ、又一槩ニ、左様ニテ
 ハ、悪キナリ、タトヘ瘡疾タリトモ、元氣腹力ノ見合セ

アルベキコナリ、一定ニ論ジ難シ、然レド、便毒ハ、未タ
 脹出ヌ内ハ、隨分肉食スルガヨシ、サテ餘程脹出シタ
 時、備急圓ナドニテ、二三日ニ一度ヅ、モ、下シテ、始終
 解毒ノ方ヲ用ヒテ、ジツトシテ居ルト、十分ニ脹滿、口
 ヲ明ケルト、膿汁出テ、毒氣跡ニ残ラス、此様ニユクカ、
 便毒病ニハ、第一ノ仕合ナリ、愈口ニナリテハ、隨分毒
 忌スベシ、是又一、大事ナリ、
 此病ヲ受タル人、房事ヲイタセバ、血氣散乱シテ、治シ
 難シ、藥ヲ服シテモ、益ナシ、第一ニ慎ムヘシ
 腹力人ニスグレテ弱久、腹ニ沈寒アル人ハ、餘リ下シ

過シテハ悪シ、**葶**改皂角子木通金銀白鮮皮ノ類ニテ、解毒スベシ、**太黄**ハ用ヒ難シ、**輕粉**ハ用ヒテヨキ症間アルモノナリ、氣ヲ付テ見ルベシ

下疳便毒ニ限ラズ、病ヲ受テ久シカラヌ内ニ、**長途**或ハ荷物等、或ハ寒冷ノ地ニ、久坐シ、或ハ體ヲツカフ、多ケレバ、必ズ骨痛トナル、心得アルベキナリ

此病痼疾ニナリテハ、**輕粉**モ用ヒザレハ、ナラヌ道具ナレバ、病新ナル内、訣モナク、**輕粉**ヲ用ヒテ、早ク癒タルト、心得居ル内、一二年モ経テ、毒氣内ヲ攻テ、種々ノ症ヲアラハシ、或ハ何トナク、毒氣表ヲ塞キ、アチナ氣

クセヅキ、咳血ヲナシ、齒衄ヲナシ、脉數ニシテ、肌肉脱シ、一生病身ニナル者、少カラズ、是モ心得アルベキナリ

輕粉ヲ用ルハ、七日ニ貳錢目モ、用ヒテモ、ヨキ人アレバ、大抵、右様ニシテハ、多ハ廢人トナル者ナリ、**輕粉**ヲ少シ炒テ、**梧桐子**ノ大ニ丸シ、十五粒二十粒ツ、緩服サスルモヨシ、必ズ効アルナリ、又大剛強ノ人、大毒氣ヲ受テ、癒ヌ、數十年ニ及ブ者多シ、是等ハ、貳錢目モ用ヒ、大ニ瞑眩ヲ得テ、後巴豆**大黄**ニテ、三日間四日間ニ毒氣ヲ下シ、大**功**ヲ得ル、モ有、何レ治術ノ機變

ハ其人ニアレ、預ニ言難シ

此病骨ニ入り、附骨疽ナドノヤウニナリ、或ハ中ノ骨、
摧ケテ出テ、或ハ胸腹腿ナドニテ、腫物出来、其廻リ、岩
窟ノヤウニナリ、紅色ヨリ、紫黑色ニ變ジユクナリ、此
症、親ヨリ受タル遺毒ナラバ、不治ト知ベシ、一代拵ノ
毒氣ナラバ、能療治スレバ、癒ルナリ、能々レツホリト、
雞肉ナドヲ食ヒ、輕粉烟藥縵藥ノ類ヲ用フベシ、烟藥
縵藥ノ方ハ、漫遊雜記ニ出レ置タリ、考ヘ合スベシ、自
餘ノ藥、何程用ヒテモ、癒ユベキニアラズ、謾ニ藥ヲ用
ヒテ、訣ナキ事ニ、年月ヲ送ル内ニ、腹アレタナリテ、輕

粉丹砂ノ類用ヒラレヌヤウニナリ、果ハ咳ヲ癸シテ、
死スル者ナリ、床下リ蓋ハヤリ、
下疳便毒ヲ病ニ、大抵臭氣多キハ、毒深シト知ルベシ、
然レモ、折ニハ、腹力弱ク、膿ヲ張り出ス、カウスタテ、臭
氣少キモアルナリ、氣ヲ付テ、見分ベシ、
此痼疾ノ内、一種腹背面部四肢何レニテモ、小キ腫物
出来、針ノ跡ノ様ナル、穴有テ、夫ヨリ黄水出テ、膿ニ成
ラズ、年ヲ重テ、愈ヌモノアリ、甚癒エ難キモノナリ、是
等ハ、雞肉縵藥輕粉丸ナドノ、主ル所ナリ、
京大坂江戸ナドノ人ハ、氣アツカヒ多ク、大方ハ腹ニ

積癖アリテ、諸病ノ妨ヲ成ス事ナリ、瘡毒別レテ、其害多シ、其故ハ、積氣腹ニ凝結スレバ、四肢骨節ノ氣脈不通ニナル故、毒氣是ニ隨テ、凝定シテ、遂ニ一應ニ、毒氣ヲ下レニ、カ、リテモ、腹ノカハ盡テモ、毒氣ハ盡キズ、或ハ狂症トナリ、鼓脹トナリ、勞效トナリ、ナドスル類、少カラズ、世ノ愚昧ノ医者ドモ、其仔細ヲ知ラズ、俄ニ、餘症ノ出来タルヤウニ、思フモヲカシ、箇様ノ症、尤積氣ヲ治スルノ方ヲ、主トシテ、毒氣ヲ驅レバ、積氣ノ治スルニ隨テ、毒氣下リ盡ルナリ

濕毒愈ヘ、毒氣上ニ凝リテ、頭痛ヲ發スルモノアリ、

甚ダ愈難キモノナリ、医者、早夕立廻リテ、石羔連翹苓連ノ類、或ハ沈香寄居蟹鹿角霜ノ類ヲ用ヒ、頭痛ニ成ヌヤウニ、療治スベシ、
五寶丹ト云藥成程、能痼疾ノ凝リヲチラス藥ナレバ、實ニ、毒氣ヲ盡ス藥ニアラズ、咽喉面部ノ間ナドニテ、火急ナル症ナラバ、一應服レ、愈タル跡ニテ、解毒ノ藥ヲ服スベシ、総テ、瘡毒ハ、急ニ愈難キ病ナレバ、急ニ愈ス藥ニテハ、五寶丹ニ限フズ、輕粉、或ハ嗅藥薰藥ノ類タリトテモ、跡ニテ、能々解毒セザレバ、後年ニ至リ、再發スルヲ多シ、其時ニ又、前ノ利有レ藥ヲ用テモ、効ナ

久竟ニ一生ノ病トナルモノナリ

此解毒ノ場ニ、温泉宜キモノ多シ

温泉モ、瘡毒ニ、甚ダ宜キモノナレト、新染ノ、毒氣感ナ

ル時、浴スレバ、毒氣骨節ニ入テ、大患トナルモノ多シ、

餘毒ノ場ニハ、大方、的中セズト云フナシ

婦人ノ、毒ハ、經水ニ隨テ下ル故、男子ヨリハ、治シ易

キモノナリ然レト、妊娠ノ時ハ、熱氣催シ易キモノ故、

其心得アルベキナリ、總テ、毒ニ、熱強ク、舌黒クナル

症間アルモノナリ、石羔苴消ノ主ル所ナリ、妊娠ニテ

モ苦レカラズ、用フベシ、然レト、其人ノ、稟賦ノ強弱、病

ノ淺深ヲ見分ル眼ナク、是ヲスレバ、人ヲ殺スヲ多シ、

能々診察スベシ、

下疳ニ、袋下疳トテ、皮カブリノ内ニ、出来ル疳瘡ハ、外

科ノ方ニテモ、傳授モノニテ、愈エ難キヨシ、云傳フレ

トモ、別ニ何ノ仔細モナシ、解毒ノ藥ヲ久ク服スレバ、

愈ル、再造散甚宜シ、此方、漫遊雜記ニ出タリ、考フベシ、

但シ、便毒モ下疳モ、腹ニ積アリテ、腹弱ク、或ハ疳疾ノ

餘氣アルモノナド、瘡口黒ク陷テ、陽氣ウスク見ユル

ハ、心得シテ、療治スベシ、多ハ、雞肉、并ニ雞卵ナドノ、餌

膝ヨリ下、向フ脛ト云所ノ骨高クナリ、飯櫃形ニ、饅頭ノヤウニナル症アリ、多ハ治セズ
 此症、山歸来ヲ用ル事、大ニ時アルモノナリ、山歸来ハ、小便ヲ利シ、毒氣ヲ驅散シテ、早ク効驗アルモノ故得テハ、毒氣ヲ跡ニ殘スナリ
 痔疾淋病モ、大半、皆儻毒ノ變症ナリ、尤疝積カ、惡血ヨリ出来ルモアリ、能見分テ、療治スベシ、淋病モ、年久クナルハ、療治ニ趣アルモノナリ
 濕家ニハ、灸治、多ク不相應ナルモノナリ、吐法カドモ、得テハ、毒氣ヲ上部ニ、逆上サスルナリ、併シナカラ、一

束截斷ノコトハ、心得アルベキコトナリ
 此病ノ内、一種、毒氣内攻シテ、表癢セズ、或ハ齒齦、或ハ鼻ノ孔ノ裏、或咽喉ナドノ内、肉次第ニ落テ、一向膿汁潰爛ノ氣色ナク、遂ニハ齒脫シ、鼻柱落テ、聲啞スルノ類、總テ、火急ニ、命ハ殞サ子トモ、皆不治ノ症ト思ヘシ
 一種、毒胸膈ニ結テ、痰喘咳逆シテ、勞瘵肺癰ノ模様ニ、似タルモノアリ、又トヒ、脉數ナリトテモ、亦愈ルコトアリ、輕粉ヲ、程ヨク用ベシ、自餘、尋常ノ煎湯ナドハ、効アリ、難シ、然レ、氏腹根弱クナリタル人ニハ、是ヲ用ヒ、一旦ハ、快氣シテモ、程無ク、死ニ至ルモノナリ、能々見合

セアルベキナリ

毒陰囊ニ発シテ、穴アリテ、便液洩出テ、或ハ囊ノ後、蟻ノ戸渡ト云所ニ、小穴出来、或ハ愈エ、或ハ発シテ、年月ヲ経テ、解毒山歸來、輕粉ナドニテ、愈ルモアリ、又愈エサルモアリ、六七ノ比マテ、病有ナリニ、命連屬シテアル、箇様ノ宿疾アル者、多分ニ精神鬱滯スルヲアレバ、夫ヨリ腫物悪クナリテ、命ヲ取ルヲ毎々アリ、病中、氣ヲ養フ沙汰、心得第一ト思フベキナリ

此病、毒胸膈ヨリ上ニ凝リ、或ハ項背腦後ナドニ、惡腫ヲ発シ、起伏常ナラズ、或ハ耳聾目盲、鼻濁涕ヲ流ス等、

種々ノ惡症ヲ見ハス、是等ノ症ノ初發、多ハ頭眩シ、行步難ク、臟腑胸膈ニ迫リテ、腹ノ皮背ニヒツ付クモノナリ、是ハ元來、腹ニ癖塊アリテ、發病ノ節、氣火ヲ動シ、塊癖胸ニ上ルト見ユ、箇様ノ症ハ、イカ程、腹ノ摸樣、ウスク見ユ氏、元氣カヒナク見ユ氏、黃連大黃ヲ用ヒテ、苦レカラズ、塊癖下リテ、腹候漸々常ニ復スレバ、毒氣自然ニ解スルモノナリ、然レ氏、腹ノ虛實、甚ダ見分ケ難ケレハ、初心ノ手段ニハ、ナリ難キヲナリ、大法ハ、大便二日ニ一度カ、三日ニ一度カ、キツチリト、秘スルカナラハ、右様ノ藥モ、用ヒタリ氏、害無ルベシ、大便ユル

久、或ハ二三日モ、秘スルトテモ、通ズル時ハ、ユルキ類
ハ、苦寒ノ藥ニテ、攻難シト、心得ベシ、用藥ノ機變ハ、一
心ノ妙用ナレバ、其人ニアラザレバ、云難キモノナリ、
書ニ著シ、口舌ニ残りタル事ハ、皆糟粕ナレバ、一定ノ
事ト思ワバ、大ナル不覺ヲ取ルナリ

氣腫結核ノ類、頭面頸項喉嚨ノ間ニ、生スル者、濕毒ノ
氣ヲ兼ズ、或ハ胎毒氣火鬱結一手ニテ生スル者ハ、多
ハ不治ナリ、蠱毒ヲ兼タルハ、治スルモノナリ、去レバ、
氣火ノ鬱結セヌヤウノ、將養心得第一ナリ、又腰腹陰
囊ノ前後ニ、生ズル腫物モ、蠱毒ノ氣ヲ兼テ生ジタル

ハ、治レ易シ、前ニモ云タル、懸癰腎癰囊癰皆然リ、能
心ヲ附テ見ベキ也、蠱毒ハ父母ヨリモ、傳來シ、兄弟乳
母奴婢ノ類ヨリモ、一談一笑ノ間ニモ、交感スルヲ、ア
ルナレバ、假令、其人的實ニ、下疳横痃ヲ病タル、覺工無
トテ、夫ニテ、蠱毒ニアラズト、言ベカラズ、又初感ノ時、
僅ニ瘡ヲ見、レ、或ハ粟粒ノヤウナルモノ、出来タル
バ、カリニテ、數日経ヌ内ニ、愈工、是等ノ事、仔細ナシト、
思テ居ル内、或ハ五年十年十五年ノ、久ヲ経テ、レツカ
リト、内ニ熟シテ、持出ス類、去リトテハ、生根惡キ物ナ
レバ、孰シ、能々根元ヲ、推極テ吟味スベシ、又、一種ノ惡

瘡ノ時有テ、婦人ヨリ傳染シタル程ノ者ハ、皆鼻落耳聾廢人ニナルナリ、是等ハ、妙方奇方モ、驗ナキ者ナリ、是等ノ事モ、心得テ居子バ、察病詳ナラヌモノナリ、
黴毒ニテ、耳ノ聞エスヤウニ成タル者、初感ノ時ナレバ、治スルモノナリ、二年三年五年十年ト、年ヲ重ル程、治シ難シ、目ニ入タルモ、亦然リ

黴毒ヨリ、子舌木舌ニ成テ来ル者アリ、甚タ治シ難シ、右太法ヲ書付タルマデナリ、診察用藥ノ機變ハ、其人其人ノ妙用ナレハ、巧拙萬殊ト、知ベキナリ、兵法ニ、神ニレテ明^ラト云コアリ、^ラ醫術モ、然リト思フベシ

附録 水ニ茶盃煎取一茶盃

獨嘯菴囊中秘方

治諸濕瘡毒方

當歸 芍藥 黃芩 黃連 連翹 大黃各一錢

右水ニ茶盃煎取一茶盃所謂甲方

又方

於右方中、去大黃連翹加木通二錢所謂乙方

輕粉丸 治癩毒痼疾

輕粉各一兩半 天靈蓋各一兩半 梅肉一兩半 黑燒一兩半

東右細末糊丸所謂丙方

東洋先生五物解毒湯方

土茯苓錢三 芎藭 大黃各五分 荊芥 蕞菜各六分

金銀花錢一

右水二茶盞煮取一茶盞

治疥瘡方

大黃 硫黃 樟腦

右細末和胡麻油傳

治疥瘡內攻者方

推子殼兩一 大黃兩半

右水二茶盞煎取一茶盞

治頑癬方

硫黃 黃丹 雄黃

右細末醋調傳患上

治疣目黑子赤白癩風方

赤丹礬錢一 雄黃五分

右細末和生薑汁傳

治乳癰乳核初發方

梓葉黑燒

右一味白湯送下

皂礬丸 治黃胖

皂礬 蕎麥分等

右糊丸白湯送下

治淋痛小便如膿方

草薢錢 龍膽 芣苢 朮 甘草各一錢

右水二茶盃煎取一茶盃

赤小豆湯 治水腫

赤小豆錢三 商陸 大黃錢各一

右煎法如前或去大黃

治犬毒方貴丹 壯黃

雄黃

右一味白湯送下外塗傷處

治湯火傷方

塗雞子白於傷處

治口舌腫痛方

細茶末和蜜傅患上

附錄終

散書口决

漫遊雜記

獨嘯菴著

全壹冊

吐方考

同 全壹冊

囊語

同 全壹冊

醫宗金鑑

傷寒論部

全八冊

北久太良早心齋橋北江入
河內屋喜兵衛

浪萃書林

博勞町佐野屋橋南江入
播磨屋新兵衛

吐方考序

長門獸嘯菴從余先人學有年矣

以裁古鑿之道示洋溢於四方負書

擔囊棲人遑周行諸州得其人以

及其學思欲成復古濟世之功者

非一日也而令秋家大人逝矣嘯菴于

里來而且茲囊示所撰吐方考

卷熟讀之其論覈實激古試今淵
乎無不至也於是慨然嘆曰有是哉
嘯菴之勤也余往年同適越受
吐法於粵村氏爾後相去十數年
檢院底厲有若斯者出焉則至於
其要機微摧沈固運用可知焉牙
甫菴以吐方之未行於世欲上粹以弘

焉就余需言欲使後世不誤進取之
途噫余曷敢當雖然同臭之誼曰
好學厚不可以已於且乎苔塊之上
黽勉應需蓋吾鑿之道有汗吐下
之三法法也者所以攻病也而道有迂直
漸有緩急迂則迷焉直則達焉在高
才篤志已緩則靖焉急則攻焉在

應變要機已凡技偏則有長長則妙
亦存然自周者視之不為無失也是
以學問之道不博則固不篤則移合
異為同者蓋為之故也修業之道日守
其師法慎其所習業詭守則從易
入難而後淵源可窺也遠奧可探也
是之謂迂則迷焉直則達焉凡病有

卒暴也有漸曼也有卒而淺曼而深
也有曼而淺卒而深也索症搜因審
畫斷斷不可忽諸若夫方於卒暴峻
危生死在前而權衡忽移之時恬然
而中穴款非有應機處變之才不能以
奏効也至於漸曼深固生死難明之
病凜然而持重非有強梁沈深之才

不能以起一疾也是之謂緩則靖焉息
則攻焉斯四者不可不詳矣不可不慎
矣是之為古醫道之道也是余之所聞
於先人也可以序之

寶曆壬午初冬山脇保撰

吐方考

赤馬關獨嘯菴

汗吐下並行古之道也今能汗下不能吐其於能也
不亦難乎今知可吐之病不知可汗下之病其於知
也不亦危乎 日本古方書之學與汗下之術數
于四方十數年至于吐方艱澁不行夫汗吐下異途
同歸學者真會其機吐豈特難乎余幼見事洛東洋
氏與越與村氏有所學試之十年粗知其利病故聊
述鄙見告同好之士云焉

扁鵲望桓公之邑而走是我枝古之道也故從事於此者知死者與不治者為第一義也鑿不能知死者與不治者汗吐下誤施取凶暴之名非古方之罪也欲決死生定治不治者當審腹氣虛實候腹如易實難其故何則有如虛而實者有如實而虛者有邪來而虛邪去而實者有邪來而實邪去而虛者得之於手應之於心不可喻子也

人有脉猶尸有槌微乎微乎可感而通不可思而得水陸州木之花實不二有忽開忽落者有忽花徐萎

者有花盛而無實者有結實而無花者有花至小而長存者疾病染人亦如此鑿當察其開落之機謹艾刈之期

張子和汗吐下齊行是銳意欲奪病之蔽也夫病初發則雖重易治經久則雖輕難治苟不知其條理而施之則雖百汗吐下齊行難奈之何學者取其果決之行而莫眩其迫切之見矣

盛夏嚴冬毒入不為少羸弱之人雖無病宜謹其修養況吐下之方避其時可也雖然不得已則用之

用吐方之時既吐則須飲白湯飲則須吐吐之宜接
吐接吐促其間也連日連夜虛竭元氣
紅夷俗能汗吐下其言曰病者在牀蓐不宜吐是自
初學之繩墨

吐後三五日當調飲食省思慮不可風不可酒不可
內不可勞動

古曰病在膈上者吐之是用吐方之大表也而其變
不可勝數沈研不久經事不多則難得而窮詰
吐後氣道極多用下氣之方可也或三黃湯或承氣

湯

嘔噎勞瘵鼓脹吐之則促命期

張子和吐瀉余未見其可也

張子和儒門事親有時氣溫病傷寒一二日以裏頭
痛身熱惡寒以通聖散益元散葱白連鬚豆豉一撮
吐之法余試之數十人時有効要之不為之亦可也
初學不可吐下妊娠產後吐血欬血癥毒血崩血虛
家暨年過六十者

吐過不止則進冷粥一杯飲冷水一盞亦可也吐後

吐血者直止其吐可也吐鮮血者往有之雖吐可也

中瓜蒂之毒甚者服麝香三五分

傷寒吐之不可過二三回得一快吐則止用瓜蒂若

三分若五分其治一逆則急者促命期緩者為壞症

瓜蒂越福井產為可它邦所出不中用用之若五分

若一錢二錢以上不可與

苦瓠標檢如大豆若七粒若十粒寒鄉無瓜蒂則可

代之其形至小研淨無厭翳為佳品

藜蘆華產為可尤多毒用之若二分若三分

常山華產為可末用之則若五分若一錢

巴豆不去油可也

豆豉從本州製造之法可也

傷寒二三日心下痞鞅脉沈數者後為大患可微吐

之

傷寒用承氣湯不下者吐了再下

傷寒外症既去胸中有停痰病水者微吐之

諸氣疾諸積聚心下痞鞅臟腑逼上者問其平生無

吐血欬血衄血之患者悉可吐之後服寫心之方數

十日

胸有蓄飲外發諸症者腹侯堅實則可大吐之

喘息初發暨未發者按其腹脉知之腹氣堅實則吐

之後服寫心湯小承氣湯之類數十日灸數千壯

小兒顛癇十歲以裏者吐之後灸數千壯

狂癇可數吐之

五十以裏偏枯痰涎滿胸者可吐之腹氣不堅實者決不可與

月事積年不下心下痞鞭抵當諸藥不驗者吐了再

服

淋疾濁症心下痞鞭諸藥不驗者吐之後論所宜服

藥

反胃諸嘔尤可吐

黃疸煩喘欲吐者可吐之

腫病用吐尤難須謹方法

宿食變見他症者可吐之

口吐大便者吐之後服附子寫心生薑寫心半夏寫

心之類數日

痿痺初發暨欲發者按其心下痞則吐之後論所宜

服藥

右各以瓜蒂散吐之腹氣不堅實者決不可吐
又曰服吐方既吐之時直視搖擗之候見者直
可止其吐

瘧以常山吐之病發後十日許可服

肺癰未見浮腫者用桔梗白散吐之腹氣不堅實者
雖吐之無益

積氣在臍上者吐之胃中空虛則氣上衝動心豎當
預備焉

凡豎為病見制則雖劑大攻峻其病不易治也豎制
病則雖劑小攻不峻其病可治也是為汗吐下之機
也古曰上工治未病豈惟未病之人既病之人亦百
未病豎謀諸未病之日微諸既病之日則其機可知
矣今世輕薄浮淺之徒試之一旦病不愈則舉科歸
諸古方不自揣之甚也

試効方

瓜蒂散

瓜蒂一分 赤小豆一分

右別搗篩為散已合治之取一錢七以香豉一

合用熟湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之
不吐者少少加得快吐乃止

病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞
鞭氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐

之右出傷寒論

病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中心中滿

而煩餓不能食者當須吐之右出傷寒論

宿食在上脘者當吐之右出金匱要畧

一物瓜蒂湯 瓜蒂二十箇

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

大陽中暈身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷

冷水行皮中所致也主之右出金匱要畧

桔梗白散 桔梗三分 巴豆一分 貝母三分

右件三味為末內巴豆更於臼中杵之以白飲

和服強人半錢羸者減之病在膈上必吐病在

膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥

一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆者若以水澀

之洗之益令熱不得出當汗而不汗則煩假令

汗出已腹中痛加芍藥二兩如上法右出傷寒論
欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭
久久吐膿如米粥者為肺癰主之右出金匱要

皂莢丸

皂莢 木皮

右一味末以蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸

日三服夜一服

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皂莢丸主之

右出金匱要畧

若瓠穰圓

出千金方

若瓠白穰

右一味

吐河豚魚毒暨一切魚毒方

溫藍汁一盞服之

又方 八九月槁子將熟之時毀菓納胡椒三粒粒待

菓熟取燒之為末含少許於小竹管吹入咽中

過咽則吐

按食傷尤為暴急苾蒂得吐遲用此方可也

又曰張子和儒門事親有三聖散稀涎散二仙

散之方余試數十人得其意則有効可考

又曰大抵古今用吐之方法不一余未試者闕

如焉

嘯菴曰大凡病者百人不治而愈者六十人其餘四十人十人者雖治必死十人者得治必活十人者不死又不愈其命在于治不治之間權衡屬于鑿人者十人而已識病鑿症如斯始可與言鑿是下工也我觀世之爲方技者多是世家膏粱之子不然則亡命輕信之徒失餽日之資遠遯爲鑿是其心固不爲極人故視富貴之人則撓情從之如奴隸視貧賤之人則掉頭避之如寇讎不知病之治不治死者與活者

其病自愈者以爲我活之不愈而死者以爲當死之病或至于寒熱誤治使不治而愈者死之其如斯者不足稱鑿也鑿明斷秀出於人者焦心積思三年可爲下工焉下工之資既成則當勉去名利之心我觀世之爲方技者雖研精於藥石經脈之間其爲則休咎相均其故何也名利之心滿於胸得則喜失則悲悲喜交生則其心不輕散則沈鬱以沈鬱之心診病則脈浮者不得不遲以輕散之心診病則脈沈者不得不浮且深固之病一方持重暴疾之病互方逐機

而欲得而不休則心疑阻疑阻則會機不能行恐失而不休則心躁競躁競則可持重而數轉況欲名利甚者知其不可治而治之治之而不愈則人不信人不信則醫不行醫不行則憂悶積於中鑿病之機隨之焉遂不異乎夫亡命輕狷之徒遲遽而為醫者鑿去斯諸累者始可與言古鑿是中工也下工之鑿積思焦心三年可為中工中工之資既成構思不休積久忘物猶佝僂丈人於蚰遠然逢其源則汗吐下皆中肯綮是上工也上而難遇焉余受汗吐下之方試

之於顛癇帶瘵喘息鼓脹膈噎之類數年功不蓋料枝不允於人雖然沈研感刻忘思於榮辱積年之久經事之多知死者不治者徐明知死者不治者徐明而治者不死者在于目中始信古人之技不在既病在未病矣

吐方考終

明治十年五月廿日

茨城縣下等六大區四小區

真壁郡界屋村

派出種痘兼內外科

根本養元

真壁郡分種所

界屋村
根本養元

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

