



門中武
407
卷一

棗軒本間先生著

初帙

瘍科秘錄

自準亭藏

瘍科秘錄敘

常陸本間玄調和卿視余為益友。常簡寄詩文請鉛槧焉。傍觀之清。不唯弈碁。愚亦不遜辭。略加點竄。和卿欣然如心醉者。今茲八月卜居江戶。袖一編來視。盖其積年所施。治瘡之見効。今緝綴之。顏曰瘍科秘錄。行文措

自準亭藏

方寸公案

序

一

自準亭藏

癸科秘錄 序
辭之失。煩予雌黃。鑿板問世云。
夫經籍滯義。詩文疵類。有人詔
詢。不肖寧不竭兩端。軒岐之緒。
余懵乎無解。則造語撰言。如或
含蓄使人思索。或活筆揮霍。使
一讀瞭然。豈敢代其大匠斲之。
姑通讀一再。加刪潤。塵、什、
也。嗟和卿匪精神其道。有年所

矣。宜夫奏効烜赫。非二三榮之
所能收載耶。南紀華岳翁稱曠
世老工。四方遊士。雲從雨集。和
卿襍被自携。隨逐若干年。既獲
庶蘊。施治有功。如此其偉。蓋其
於翁造詣雖深。別有所發明。抑
有以也。其意不專執一家。漫遊
遠涉。足蹟頗遍。而苦學勤業。以

此為娛。所謂秦府之裘。非一狐之腋也。伊子襄美。非以其鍾多耶。乃知此書必行矣。彼本間氏起業之祖。曰道悅。及今七世。乃父積善。新得水府寵聘。見列侍醫。和卿今且以術鳴。繁仁之慶。發祥今日。豈不亦昌哉。愚居儻名。則秦和之

稱瘵國。蒙莊之說屠龍。身任其責。如班醫上流。而薄宦祿仕。寔由不知辟穀之禁方已。自揆其力。何曾望於大用矣。今白首負笈。重繭于役。世有鄧禹其人。必且咲吾寤。是姑不問。近視本間氏之截癰割痔之速功于人。豈弗忸怩而屏營哉。

天保丁酉南至之日。江戸唐公愷。識於姬路客舍之東廡。



六十二老人菱湖卷大任書



瘍科秘錄序

余嘗讀宋伍起予論至云菩薩心劊子手以為瘍醫巫秘訣此二句盡之矣夫有菩薩心而劊子手始可能施有劊子手而菩薩心能為其用如極危極險之病可畏可愕之證必從容處措吐嗟奏績者非二者兼全則不能也世之以瘍醫名者多然未有如南紀

華岡青洲翁之寂著也翁之於伎以神詣獨
造之妙得史跗元化之意搦探抽割置之死地
而後生而所用之藥猶折衷古方不敢取異
端弔詭之說蓋於彼訣深相契者已余蚤與
翁之門人交聞翁為人踈宕不屑著書而其
門亦少載筆之徒每恐其術之久而為廣陵
散焉水戶本間和卿嚮在翁之門悉受其訣

身親試驗益有所得頃日表章師說著為若
干卷刊印以傳翁之術於是乎遂不泯且和
卿踵事加精博有考辨牖世之功願不為
鮮余因擊節嘉歎而亟頷其序焉抑學
者嗜博駁為嗜駁和卿善守翁之教勿取
異端弔詭之說此余所望于和卿也

天保丁酉歲涂月江都醫官丹波元堅蒞庭撰

既之永固。而和卿用心之勤且密。真繼千古之絕學也。余雖不知醫。而竊嘉翁之術之有深契于古。和卿之能恢張其師之道也。故於此書之成也。樂序而道之。不辭其禱昧也。

天保丁酉嘉平月穀旦南總海保元備百順識于江都傳經樓

江都渡邊執書

邱嘉平刻

余從學青洲先生數年。歸鄉患痔漏。痔漏治法必用斷截術。不然則毫無全愈之理。但余之所患。瘡口與肛門相距約二寸五分餘。尤為險證。果可能斷截之否。斷之之後。又能無害否。皆未可知也。議之同學諸友及當世名流。皆以為不可。遂遙致書於青洲翁而問之。翁亦未能決。以廢人自居四年矣。一日慨然歎曰。夫痔漏治法者。余之平生之所試驗。而活人固已多矣。而身自嬰此病。而不能治之。遺恨何已。若得盡其治法。死亦不悔也。因決意斷之。服藥傳膏。不日得瘥。於是躍喜不自堪。著痔疾編。以述痔漏險證亦可。

斷截將付諸梓以示同好。後數月。又以眼疾廢業。無以消閑。惟徵門人日談醫事耳。門人從傍筆之。積而成編。更取曩所著之痔疾編。置之卷首。合為十卷。名曰癩科秘錄。凡先師之秘蘊奧旨。先祖道悅先生以來。世世所歷驗之神方。及余之漫遊於四方所驗之一得。二十年間。所研精而默會之術。具舉而縷載之。遂命剞劂。以公于世。語涉鄙俚。深愧博雅之誚。志期濟世。庶無浮文妨要之失。刻成。因錄其所由如此。天保八年歲次乙酉。冬十二月。本間玄調和卿識。

癩科秘錄總目

卷一

痔疾

脈痔

微痔

乳岩

卷二

微瘡

楊梅瘡

卷三

痔漏

內痔

瘰癧

乳岩

下疳

結毒

腸痔

牡痔

馬刀瘻

乳岩

包莖下疳

便毒

脫肛痔

蟲痔

舌疽

乳岩

癰 脫疽 翻花瘡 附骨疽
骨槽風 穿髌疽 鶴膝風

卷四

全創 免缺 鎖陰 鎖肛
鎖尿口 鼻痔 鎖鼻 豆入鼻中

駢拇枝指

筆磬

水癩

大陰莖

陽癩

打撲損傷

合陰打撲

落架風

卷五

疥癬

內攻腫

癩癧

癩風

肺瘡

漆瘡

油風

鵝掌風

卷六

酒鼓鼻

腎囊風

白禿瘡 湯發火燒

癰疽

疔瘡

疔疔

腦疽

卷七

流注

肺癰

腸癰 肢癰

癰疽

懸癰

囊癰

乳癰

癰疽

甲疽

牛程躑

卷八

淋

淋漏

臟毒

帶下

疔瘡

腦漏

頭痛

衄血

喉痺

痰泡

重舌

木舌

鵝口瘡

燕口瘡

牙疳

腐牙癰

齩齒

體氣

卷九

竹木刺

百蟲入耳

誤吞鍼鐵骨硬碁子等

諸獸咬傷

諸蟲咬傷

食兔中毒

卷十

癭瘤

枯筋箭

黑子

痣癩

赤血痣

失榮

委中毒

弱死

白癩

小便閉

大便閉

陰萎

傷科秘錄目錄

卷一

痔疾

痔漏

腸痔

脫肛痔

脈痔

內痔

牡痔

蟲痔

微痔

瘰癧

附馬刀瘰

舌疽

乳岩

瘡科秘錄目錄



瘡科秘錄卷之一

水戸本間玄調和卿著

痔疾

痔漏 腸痔 脫肛痔 微痔 脈痔

痔ハ素問ニ出莊子ニモ載痔ト見ユ説文ニ後病ト云

リ陳言カ三因方ニ痔ハ如大澤中小山突出為痔ト字

義ヲ説タルハ大ニ面白シ其病因ヲ考ルニ肛門ハ乃

子腸ノ端末ナリ腸ハ二重ノ膜ヲ合テ囊ヲ成モノニ

テ常ニ膏梁ニ飽タ人ハ自然ト敗血ヲ生シ敗血下墜

シテ肛門ニ行キ二重ノ膜ノ間ニ滯リ大便タビニ努

瘡科秘錄 卷一 自筆亭藏

責^{ツム}ユハ敗血マス^ク此ニ流レ来テ消散スル^トナク遂
 ニ痔トナルナリ或ハ内ニ發シ或ハ外ニ發スルニテ
 形状ヲ異ニスル故色々ノ名アレ^レ疝實ハ一病ナリ古
 ハ單ニ痔ト稱セシヲ隋ノ巢元方ニ至テ始テ五痔ヲ
 區別ス孫思邈王燾モ亦其目ヲ踏襲ス後世ニ及テ七
 痔或ハ二十四痔ノ目ヲ別ツニ至ル多名ノ敬却テ人
 ヲ眩惑ス陳若虛晚世ニ出ルト云^レ疝五痔ノ目ダモ設
 サルハ卓見ナリ○其毒肛門ノ外ニ發シテ膿ニ化ス
 ル者ヲ痔漏ト名^ク其證候肛門ノ内久シク痛ミ後肛
 門ノ近^クハ酸漿實^キノ如ク腫レ出シテ大ニ痛ミ發熱

惡寒アリ四五日ニシテ膿成リ自ラ潰テ直ニ愈ルモ
 ノハ輕證ナリ其重キモノハ肛門ノ内痛ム^ト或ハ半
 年或ハ一年ニ至テ^レ熱惡寒肛門ヨリ腎尻ヲカケテ
 一面ニ漫腫シ尿道マテモ腫ル^ト見エテ或ハ小便
 不利スル^トモアリ十四五日ニシテ漸ニ膿ヲナスモ
 容易ニ潰ヘズ潰ザルモノハ膿管ヲ尋テ鍼ヲ刺ベシ
 外肛門ノ遠クニ潰ユルモノハ内直腸ヲ穿ツ^ト深ニ
 外肛門ノ近クニ潰ユルモノハ内直腸ヲ穿ツ^ト淺シ
 深キモノハ治シ難ク淺キモノハ治シ易シ何程ニ藥
 ヲ服シテモ膏ヲ貼シテモ口ヲ斂メス或ハ口ヲ斂モ

實ニ愈ニハ非シテ少間アレバ又發ス内ハ深ク口ハ
 狹キ故ニ其毒思ヤウニ出難ク其邊へ流注シテ又口
 ノツクアアリコレヲ名テ子管ト云ヒ初ノ瘡口ヲ母
 管ト名ク年ヲ經ルニ從ヒ其毒處々へ流注シテ或ハ
 陰囊ニ發シ或ハ臀尻ニ發シ或ハ延テ腰ニ發スルモ
 アリ此ハ尤モ險證トス輕キモノモ肛門ヲトリ卷テ
 幾ツモ子管ヲ發スルモノナリ其漏口ヨリ稀膿常ニ
 淋瀝シテ止ス遂ニ氣血ヲ亾ヒ身體削瘦往來寒熱咳
 嗽盜汗等ノ證出テ虛勞トナルモノナリ或ハ幸ニ免
 レテ居ルモノモ常ニ氣ヲ塞キ人ニ應接スルヲイ

ミ或ハ何業ヲ始テモ半途ニ廢棄其事ヲ遂ル不能ハ
 ズ或ハ常ニ肌寒クシテ冬ノ日ニハ火闔ヲ離ルル
 能ハズ春暄ニテモウス着ニナルヲ恐レ或ハ風ノ
 北ニ變リ或ハ雨雪ヲ催ス寸ハ愈氣ヲ塞テ口ヲキク
 モイヤニナルモノナリ夕トモ其為ニ死スルヲ免
 ル、疔壽ヲ得ルハ難シ痔漏ノ治法ハ業已ニ千金
 方ニ載タレ但内服外用ノ藥方ノミニテ技倆ヲ施
 ストヲ云ズ元明ノ頃ニ及テ糸ヲカケ或ハ剪刀ヲ用
 ルノ説アレ其法ヲ詳ニ言フモノナシ痔漏斷截ノ
 法早ク和蘭ニ始レリ痔漏刀ト云器モ和蘭ヨリ渡リ

タルモノナリ其治法和蘭翻譯ノ書ニ載ルト云ヘ
 徒ニ其概略ヲイフノミナレハ其書ニ據テ治療ヲナ
 スベキニハ非ズコノ術ニ妙ヲ得ルモノハ我カ青洲
 華岡老翁ナリ老翁ノ術ハ痔漏ニハカキラズ總テ活
 物窮理宋儒ノ格物窮理ノ上ニテ會得シタルモノ故
 今其術ヲ施ニ必ス効ヲ成シ決シテ人ヲ誤ルナシ
 予嘗テ老翁ニ親炙シテ活物窮理ノ術ヲ研精スル
 久シ業成テ歸ル後日ニ經驗スルナリ此ニ十有餘年未
 タ其蘊奧ニ至ルナリ能ハサルモ某ノ證ニ臨テ術ヲ施
 ス寸ハ或ハ害アリ某ノ證ニ臨テ術ヲ施ス寸ハ必ス

害ナキヨリヲ知ルナリ得タリ痔漏斷截ノ一術ニ於テ
 ハ人ニ試ムニニアラス予カ身ニ驗ミテ知ル處ナリ
 予先ニ痔漏ヲ患フ尤モ險證ニテ漏口腎ニ發シ漏口
 ト肛門トノ間曲尺ヲ以テ度ルニ二寸五分彎測バカ瘡子
 ヲ漏口ヘ挿入サシユスルニ五寸許ニ至レリ餘リ遠キ故糸
 ヲカケテモ切ラセラルモノカ切テモ能ク肉ヲ
 生スルモノカ出血ノ能ク止モノカ何程出血シテモ
 害ナキモノカ或ハ斷截ノ後ニ變ヲ發ヤ否ヤモ決シ
 難キ故遙ニ書テ青洲老翁ニ致シテ此ヲ問ニ先生ダ
 モ決スルナリ能ハズ予自ラ思フニ手ヲ束子テ斃ヲ待

ハ術ヲ盡シテ死スルニハシカズ友人ニ佐藤友達朝
 倉真齋ト云モノアリ何レモ活物窮理ノ術ヲ研究セ
 リ因テ治ヲ二人ニ託ス天保甲午五月六日初テ藥線
 緊紮ノ法ヲ施シ六月十七日ニ至テ斷截シ七月ノ末
 マデニ全ク愈ユ漏口何程遠ク凡虚候サヘナキナ
 ラハ斷截ノ法ヲ施シテ害ナキナコレニ據テ知ベシ
 斷截ノ法ヲ施シハ肛門ノ内ヲ詳ニセザレバ治ヲ施
 シ難シ予ハ三度マデ人屍ヲ解剖シテ直腸ト肛門ト
 ノ位置ヲ知ルナリ得タリ肛門ヨリ指ヲ入ルニ狭
 クシテ指ヲシメル様ニ覺ユル處ハ肛門ニテ其深サ

七八分位ノモノナリ此處ヨリ奥ハ乃チ直腸ニテ至
 テ廣シ解剖ノ時指ヲ此處ニテ揺セハ直腸ノ外ヨリ
 知ルナリ此處ヨリ直腸ヲ穿テハ直ニ腹ノ中ナリ腹
 ノ中ト肛門ノモヨリトノ肉ノ厚サ僅ニ七八分ナリ
 俎一寸モ二寸モ深キ痔漏ヲ截ル寸ハ腹ノ中へ切通
 リソウナ理ナレ凡切通ルナハ決シテナシ腸ハ二重
 ノ膜ニヘ内ノ一枚ノミ切テ外ノ一枚ハ切又故何程
 深ク截リテモ腹中へヌケルナシ又鯨測瘡子ヲ漏
 口ヨリ入テ七八寸モ深ク入モノハ此二重ノ膜ノ間
 ヲ行ナリ○治法先病人ヲ側卧セシメ瘡口ノアル右
 〇五 自隼亭藏

ノ手ニ彎測瘡子ヲ把リ漏口ヨリ肛門ヘ向テ徐々ニ
 挿入シ已ニ直腸ヘ貫タリト覺ユル寸ハ左ノ食指及
 ビ病人ノ肛門ヘ鹿角菜ヲ湯ニテトヌリ食指ヲ入
 ルルニモ出ス長強ノ方ヘ觸ルハ推ヨスル様ニ肛門ノ
 内ヘ挿入シテ露珠ヲ搜索スベシ淺キ處ニ出テアラ
 ハ指ヲ露珠ヘツヘ右ノ手ニカヲ入レテ肛門ヘ引又
 クベシ若シ淺ク肛膜ヲヘタテ未夕肛門ヘ出ザル
 寸ハ又一役カヲ入レ彎測瘡子ニテ膜ヲ突ヌキ肛門
 へ引ヌクテ前法ノ如シ此時痛楚ニ堪カヌルモノナ
 リ手早クカヲ入テ一擧ニ引
 生ス可シ若シ姑息ノ心ヲ彎測瘡子肛門ヨリ出タラ

ハ美濃紙ヲ幅三四分位ニ切テ縮糸ヲヨリコミ太サ
 五ト結ノ如クニシ其糸ヲ露珠ヘ結付彎測瘡子ヲ本
 ノ孔ヘ引戻シ糸ヲ貫キ彎測瘡子ヲ切放シ紙ヲ枕ニ
 ツクリ長サ一寸許太サ
 筆管ノ如クス漏口ト肛門トノ中央ニ置キ
 枕ノ上ニテ糸ヲ膝結ニ結ブナリ初メハ緊ク結テヨ
 シ漸々ニ切ク結テヨ
 後ハ肉一杯位ニ結ブ可シ若シ緊クハスル寸ハ痛ミニ
 堪カヌルモ便ノナリ朝イキカケル寸ハ夜ニ入テ痛ミ
 ヲ發ス又小便ノシマコムト失笑ノ人ハトクム其
 ノナリ痛ム度ニ糸ガ切コムハ盗汗出テ安ムナリ結テ
 譯ハナラガレ可シ明朝マテハ痛ミエテ安ムナリ結テ
 後ハ漏口ヘメイチヤニ破敵ヲヌリテ挿入シ遊奕ヲ
 貼シテ蓋トス糸ノ故遊奕ノ中央ヘ縮ヲカヘノ寸大ニ痛
 ム

付テ用フル寸 明日ニ至テ新ニ枕ヲ取カヘ糸ヲ結ビ
 痛ムナシ 如クス 枕黒ク染リテ臭氣甚シキ日ヲ
糸切レコムノ兆ナリ
 直ス 前日ノ如クス 枕黒ク染リテ臭氣甚シキ日ヲ
糸切レコムノ兆ナリ
 經テ糸深ク切コミ瘡口廣クナリタラバ破敵ヲ綿片
 へ攤テ瘡中一盃ニ填ベシ遂ニ肛門ノ近クヘ切コミ
 四五分ニモ成タラハ痔漏刀ヲ摠括テ圓クナシ右ノ
 手ニ持テ漏口ヨリ肛門ニ貫キ露珠ヲ左ノ手ノ拇指
 ト食指ニテ撮ミ右ノ手ニテ肛門ノ方ヘ推ス氣味ニ
 カヲ入左ノ手ハ右ノ手ノ方ヘ引上ル氣味ニ一舉ニ
 斷截スルナリ截ト手早クヨクモミタル還魂紙十張
 ホトヲ四ツニ疊ミ瘡口ヘアテ掌ニテ緊シク壓スル

ナリ少間ニテ痛ミモ去リ血モ止ユヘ其時破敵ヲ綿
 片ニ攤ベ瘡中一盃ニ入レ遊奕ヲ貼シテ蓋トス小疵
 ハコレニテ止ムナレバ大疵ニ至テハ猶出血スル
 アル故又還魂紙ヲ膏ノ上ニアテ、壓スル前法ノ
 如クス血止タルナラバ尻ノ間一盃ニ綿片ヲアテ、
 續鼻禪ヲ緊シク結ビ膏ノ動ヌ様ニシテ側卧セシム
 可シ二時許ハ身ヲ動サバルヲ佳トス斷截スミテ後
 ハ局方ハ人參養榮湯ヲ主劑トス若シ出血過多ナル
 モノハ人參調榮湯ヲ與フ飲食ヲ減シ少間廁ニ行ヌ
 様ニスベシ截テ間モナク大便スル寸ハ大ニ出血ス

ルニアリ膏ヲ更ル一日ニ二次始終此方ニテ全愈
 スルナリ瘡口淺キ處ヨリ愈始ルモノ故深キ處ノ長
 肉セヌウチニ上愈ノスルニアリ上愈スル寸ハ後ニ
 再發ス膏ヲ入ル、疔疵ノ淺深ニ從ヒ能一盃ニ押込
 ベシ若シ瘡口紅軟ニシテ白クナラズ長肉シ難キモ
 ノハ雞卵左突ヲ破敵ニ換ス可シ漏管深キモノハ彎
 測瘡子ヲ腸中へ通シテモ強テ肛門ノ外へ抜難シ是
 ハ糸ヲ引コカシニ結ビ食指頭ニ僅ニ入レ糸ノ端ハ
 掌中ニ握リ其指ヲ肛門へ挿入シ彎測瘡子ヲ鹽梅シ
 テ露珠ト指頭ト相應スル寸糸ヲ露珠へ結付彎測瘡

子ヲ引テ糸ヲ通ス可シ漏口ヨリ糞汁或ハ放屁ナド
 ノモル、モノハ膿管ノ必ス腸中へ貫テアルナレバ
 彎測瘡子ヲ入ル、ニ何レニシテモ露珠ノ指ニ應ゼ
 サルモノハ病人ヲ仰卧セシメ兩脚ヲ左右互ニシテ
 夷踞狀ノ如ニシ病人ヲシテ自ラ兩足ヲ持シノ紙ヲ
 堅ク燃テ左突ヲヌリ漏口ヨリサシコム寸ハ紙燃自
 ラ肛門ヨリ出ルモノナリ若シ管ノ未ダ肛門へ貫カ
 ザルモノハ猛汞丹米粒ホト紙燃ノ内へヨリコミ剪
 刀ニテ切り猛汞丹ノ入タル小口ノ腸ニアタル様ニ
 挿入スル寸ハ遂ニ腸ヲ穿ツナリ尋常ノ人ハ右ノ治

法ヲ施ニ得心スレバ富貴安逸ノ者ハ兔角痛ニ堪カ
 子テ治療中道ニシテ廢スルコトアリ何程利害ヲ説ト
 云ヘバ治療ヲ遂ルコトアタワズ是ハ日數ヲ長ク延テ
 緩漫ニ術ヲ施ス可シ其法紙燃ニ左突ヲヌリ漏口ヨ
 リ幾等テモ入ル程サシコミテ置ク寸ハ紙燃腸中ニ
 タグマリ廁ニ上ル寸ハ大便ト共ニ出其時混堂ニ行
 カ腰湯ニテモシテ紙燃ヲ洗ヒ清淨ニシ其ヘ前ニ用
 ル處ノ絹糸ヲ結付通スナリ結びヤウ前法ノ如シ糸
 ノキレ込シ寸漏口ノ方ハサホドニハナケレバ肛門
 ノ方ハ至テ難儀ナルモノナリ若シ難儀ニ思フモノ

ハ糸ノ肛門ヘ當ル處ニ別ニ紙ヲ卷付肛門ノ方ヨリ
 ハ一向キレ込又様ニシ漏口ノ方ノミ切ル様ニシテ
 二三十日糸ヲシメ更ル寸ハ痔漏刀ヲ用ヒズシテ切
 テ疼痛ノ患ナシコレ予ガ發明セシ所ナリ又漏口ヲ
 見ルニ秘法アリ漏口濶大ニシテ内ノ肉赤ク露レ皮
 卷コム氣味アルモノハ虚候ナリ斷截スルモ長肉シ
 難ク其儘置モ必ス虚勞ヲ患フ漏口縮小ニナリ或ハ
 軟肉ノ突起スルモノハ實證ナリ斷截スル寸ハ必ス
 ヨク長肉ス○痔毒ノ内ニ發シテ贅肉ト成モノヲ腸
 痔ト名ク病源候論ニ肛邊腫核痛發寒熱而血出者腸

痔ナリト云タレ其論腸痔ノ名ニ的當セズ千金方
 ニ腸痔者更衣挺出久乃縮ト説タルヲ是トス腸痔ト
 云ヘハ肛門ノ外ラ指スニアラズ何レ腸中ノ痔テナ
 ケレバナラズ腸癰腸風ノ名ヲ見テ知ル可シ其病敗
 血直腸ノ中ニ凝滯スルニ因テ腸ノ裏面ノ膜初ハ疣
 瘡ト顆粒ヲ生シテ三五相連リ椒目ノ如ク或ハ大豆
 ノ如シ久ヲ經ル寸ハ漸大ニシテ贅肉トナリ廁ニ行
 カ或ハ力作スルカ或ハ遠行ノ寸贅肉肛門ノ外へ挺
 出シテ痛ハナリ大サ拇指ノ如ク或ハ中指ノ如ク三
 ツ四ツモ出ルニ至ル贅肉ノ中ニ瘀血ヲ包テアル故

自ラ下血スルコトアリ若シ試ニ鍼ヲ刺ス寸ハ血迸リ
 出○治法先患者ヲシテ廁ニ上リ努力シテ贅肉ヲ肛
 門ノ外へ脱出セシメテ後左手ノ拇指ト示指トヲ以
 テ緊シク撮ミ出シ金創鍼ニ木綿ノ糸ヲ太キヲ佳ト
 引出ス爲ニ通ス糸ナリ縮糸ニテハキレコミ易クシテ宜カラズ穿チ右手ニ把テ痔
 ノ根蒂ヲ貫キ鍼ヲ去リ糸ノ兩端ヲ結ビ合セ佗者ヲ
 シテ緊シク引出サシメ又金創鍼ニ縮糸ヲ通シ二重
 ニナシ先ノ孔ヨリ再ビ貫キ鍼ヲハサミ去リ糸ヲ去
 ル寸ハ糸二條一條ノ糸ハ左側ニテ緊禁シ一條ノ糸
 トナルナリハ右側ニテ緊禁ス糸ヲカケル寸ハ痛ミヲ發シ小便
 閉ルコトアレルトモ大害ヲナサズ

明日モ亦如此緊禁スルヲ數日ニ至レハ痔根漸ク細クナリ氣血モ通ハヌ様ニ成タル處ヲ見テ剪斷ス可シ出血スル寸ハ右ノ示指頭ニテ強ク壓シ決勝ヲ傳ルナリ血ノ止タルコト青蛇ヲ綿ニ攤テ肛門ノ内ニ挿入ス可シ内服ハ乙字湯加牡丹皮桃仁ニ宜シ加味解毒湯モ効アリ初メチサク顆粒ヲ生シテ未ク膨脹ザルモノハ鑷子ニテ撮ミ上ケテ剪斷シ後ハ決勝ヲ敷キ青蛇ヲ綿ニ攤テ貼ル可シ○痔毒ノ為ニ肛門ノ脱出スルヲ脱肛痔ト名ク惠民和劑局方ニ痔ヲ論シテ大腸不收名脱肛ト云ヒ本事方續集ニ肛腸努出名

曰脱肛痔ト有テ脱肛モ痔ノ一證ナリ尤モ難治トス小兒ノ痢疾或ハ婦人ノ産後ニ脱肛スルハ努力ニ因テ脱出スルナレハ毒ノアルニハ非ズ是ハ痔ニ屬セス假ノ脱肛ト云フ可シ脱肛痔ハ直腸ニ重ノ膜ノ間ヘ敗血凝滯シテ其毒ノ為ニ脱出スルナリ脱肛ノ内ニモ陽脱肛ト陰脱肛ト二證アリ陽ニ屬スルモノハ大ニ腫テ疼痛スル故起ツテモナラズ坐スルヲモナラス唯側卧シテ日ヲ送ルノミ或ハ日數ヲ經レハ熱々ト瘀水流レ腫消シテ自ラ愈ルモアリ愈ザルモノハ乙字湯加牡丹皮桃仁ヲ内服シ蟻鉞蟻ヲ捕リ盆水ニ故シ一夜ヲ〇十一 自隼亭藏

經テ竹筒ノ中ニ入患處ニアノ法ニテ血ヲ吸ハシメ
 テル寸ハ蛇患處ニ著ナリ
 又調和煎ヲ以テ慰シ其間ニハ紫雲ヲ綿片ニ攤テ貼
 シ乾ヌ様ニス可シ乾ク寸ハ大ニ痛ムナリ是ハ痛ミ
 劇シケレ疔治シ易キ證トス陰ニ屬スルモノハ疼痛
 焮腫ノ患ナク唯生平ニ便心ノミアリテ數厠ニ行キ
 裡急後重スレ疔大便ハ不通シテ惟脱肛スルノミ脱
 肛スレバ便心姑ク止ミ厠ヨリ歸レハ又通シタキ心
 出テ一日ニハ幾度モ厠ニ上ルナリ數脱出スルニ從
 テ升提ノカヲ失ヒ脱肛漸ニ長ナニナリ初メ一寸出
 ルモノ二寸モ三寸モ出ル様ニナリ遂ニハ鞣子ノ大

サニ至リ脱出スル度ニ下血シテ面色萎黃ニナルモ
 ノナリ死スルヲハナケレ疔尤モ難治トス赤石脂湯
 ニ宜シ外用ハ玫瑰蜜ニ乳香ノ末ヲ加ヘテ塗ル可シ
 假ノ脱肛ノ斂リカヌルモノハ先鹿角菜ノトキタル
 ヲ塗ヲキ左手ニテ脱肛ヲ握リ却テ引ヌク氣味ニ十
 シ右ノ示指ト中指トヲ脱肛ノ穴ヘ入テ指込ム寸ハ
 ヨク入モノナリ○一老夫適便心ヲ催シ急ニ厠へ行
 ニ大便一點モ通ゼズ歸ルニ又便心ヲ催シ厠ニ行ニ
 又通ゼズ如此スルヲ五六次ニシテ餘リ便心ノ急ナ
 ル故極メテ努力スルニ卒ニ脱肛スルヲ長サ七八寸

大サ甜瓜ノ如ク一醫コレヲ斂メ入ントスルニ何レ
ニモ入ラズ腸遂ニ腐敗シテ死ス是モ脱肛痔ノ一證
ナリ得効方ニ載ル截腸病ト云モノ是等ノ證ヲ指ス
ヤ○脈ノ破レテ痔毒ノ出ルモノヲ脈痔ト名ク病源
候論ニ肛邊生瘡痒而後痛出血者脈痔也ト云ヒ證治
要訣ニ脈痔外無形而所下血一線如箭或點滴不能已
此由脈竅中來也ト云ヘリ脈痔ハ直腸中ニ瘀血凝滯
シ脈絡自ラ壞レテ血ノ射出スルナリ俗ニ云ハシリ
痔ナリ是ハ毒スクニ泄ル、故痛ハナケレ下血
一次二三合或ハ五六合ニ至ルコトアリ數下ル寸ハ

遂ニ亡血ニテ肌膚萎黃唇舌灰白ニナリ虚里及臍下
築々トシテ鼓動シ手足ノ爪甲枯槁ニテ少シク起步
スル寸ハ呼吸促迫シ或ハ眩暈恰モ黃胖ノ如クニナ
ルモノナリ其因真ノ黃胖ト異ナレハ黃胖ノ方法ニ
テハ驗ナキモノナリ兎角血ノ下ラヌ様ニ手當ラス
ルヲ專務トスベシ腸風ニ似タレ凡自ラ異ナリ脈痔
ノ血ハ肛門ノ近クヨリ出腸風ノ血ハ腸中ヨリ出ル
ナリ混ス可カラズ○治法決勝ヲ後衝ニ和シ綿片ニ
攤テ肛門ニ挿入ス可シ連珠飲芍歸膠艾湯ニ宜シ斷
紅飲ヲ間服スルヲ尤モ佳トス○痔毒ノ内ニ發シテ

痛ムヲ内痔ト云外臺秘要ニ許仁則ヲ引テ内痔ハ每
便即有血ト云リ此ニテハ脈痔ト同シナリ然レモ
外科正宗ニ内痔ト云ハ凡ソ痔ノ肛外ニ發セズシテ
肛内ニ發スルモノヲ指スナリト云リ世ニ裂痔ト唱
ヒ切痔ト稱シ又内痔ト云フモノ古書ニ的當スルノ
目ナキ故今内痔ニ屬シテ論ス裂痔ハ多ク酒客ニア
リ肛門墜重腫レ痛ミテ大便スル寸ハ切ラル程ニ
痛ミ大便スル寸破裂スル故ナリ必切リテモ
便心猶去リ難ク肛門ノ中何トナク心持口ルク痛ミ
神氣ヲ塞キ鬱々トシテ口ヲキクモイヤニナルモノ

ナリ歩行ナラズ夷踞モ快カラズ踵ヲ肛門ニアテ
テ坐スレハ少シ堪ラルナリ俯臥ニナレバ姑ク快
キヲ覺ヘ午後ニナレバ痛ミ少シ減シ日暮テ風呂
ニ入温レハ大ニ快クナレモ又明日ニ至テ大便スレ
ハ前日ノ痛楚ヲ發シ百藥無効シテ日ヲ延クモノナ
リ或ハ一年或ハ二三年モ難儀スルナリ或ハ痔漏
ニ變スルモアリ大便ノ硬キハ通ズル寸ハ痛ムナレ
モ後ノ痛ミハ少シ大便溏ナレハ通スル寸ハ不痛ト
便通シ鹽梅ヨロシケレハ其日ハ快ク通シ鹽梅ヨロ

シカラザレバ其日ハ快カラズ步行スレハ瘰癧水禁々
ト肛門ヨリ出テ臀マテ濕ナリ病入ヲ側卧セシメテ
肛門ヲ開キミルト長強ニ寄タル方必ズ裂テアルモ
ノナリ裂タル瘰癧ヨリ瘰癧水ノ出ルモアリ膿ノ出ルモ
アリ何モ出ヌモアリ○治法後衝ニ乳香ノ末ヲ和シ
綿片ニ攤ハ肛内ニ挿入スルト一日ニ三次此證大黃
劑ヲ禁ズ丹溪五痔方神驗アリ長強ニ灸スルト毎日
一二百壯ニ至ル可シ若シ腸ノ内裂ズシテ但瘰癧ノ甚
シキハ痔漏ヲ催スル兆ナリ大黃牡丹皮湯ヲ與フ可
シ○痔毒ノ外ニ發シテ贅肉ヲナスヲ牡痔ト云病源

候論ニ牡痔肛邊生鼠乳出在外時時出膿血者是也ト
有テ俗ニ云フ疣痔ノトナリ是ハ痔ノ毒肛門ノ四邊
ニ生スル贅肉ナリ形チ牛奶ノ如ク或ハ櫻桃ノ如ク
或ハ蜆肉ノ如ク大小長短不一是ハ尤モ治シ易シト
ス○治法其大ナルハ糸ニテ瘡根ヲ緊繫シ枯槁シテ
後斷截ス小ナルモノハ直ニ小反剪刀ヲ以テ截リ後
エハ青蛇ヲ貼ス○痔ヲ患フル人肛門ハ蟲ノ生ズル
ヲ蟲痔ト云本草綱目雞肉條ニ梁ノ陶弘景カ言ヲ引
テ蟲痔ノ名アレハ其名唱ヘ来ルト尚シ古ニ蟲痔ト
云ハ蟲ノ肛門ヲ蝕スルト云フ意ニテ名ケタルモノ

ナレハ穀實ノ言ニ非ズ痔毒ニ因テ肛門カ濕リ爛ル
故遂ニ細蛆ヲ生ズルナリ蟲ノ肛門ヲ蝕スルニハ非
ス内痔ニモ痔漏ニモ夏月ニハ生ス生スルサハ肛門
痒クシテ擦抓セザレバ止ムナラヌモノナリ是ハ
畢竟肛門ノ掃除宜シカラヌ故ニ起ルナリ三因方ニ
ハ之ヲ下部蟲瘡ト云リ又小兒ハ蟻蟲ノ肛門へ自ラ
出ルナリ是ハ痔ニアツカラス○治法肛門ヲ湯ニ
テ能ク洗ヒ神水膏ヲヌルニ奇効アリ三因方ノ雄黃
兒散モ効アリ○黴毒肛門ニ出テ痔ノ如クナルヲ黴
痔ト云本痔ニ非ズ肛門ノ結毒ナリ故ニ黴瘡ノ治法

ニ從_レ治_レバ治セズ其因_ハ下疳便毒ナドノ誤治シ
テ後肛門ニ發スルナリ其形狀色々レモ先ハ大豆
ヲ二ツニ坵タル形ニ平塌不起ノ小瘡ヲ生シテ或ハ
痛ミ或ハ痒ク瘡水少シヅ、出或小肛門ノ襞腫大ニ
シテ蜆肉ノ如クナルモアリ又小兒父母ノ遺毒ヲ受
テ發シ或ハ小兒へ黴氣アル婦人ノ乳ヲ哺セシムル
寸ハ小兒必ズ其氣ヲ受テ黴痔ヲ發ス○治法先肛門
ノ掃除ヲ專要トス常ニモ濕_ク處ニハ掃除行_ハトツカ
ザレバ乾キカヌルナリ掃除ノ法湯ニテ能ク洗ヒ破
敵_ク綿片ニ攤テ貼スルナリ一日ニ三次ヲ常式トス膿

汁多キモノハ四五次ニ及ベバ益佳ナリ五物解毒湯
ヲ與ヘ島藤丸ヲ兼用トス

痔疾主治方

人參養榮湯和劑局方治肺與大腸供虛

白芍藥三兩 當歸 桂心 甘草 陳皮

人參 白朮 黃芪各一兩 地黄 五味子

茯苓七錢半 遠志半兩 大棗一枚 生薑三片

右十四味煎服

人參調榮湯春林軒藏方治金瘡損傷脫血者

當歸 川芎 芍藥 白朮 茯苓

人參 地黃 蓬萊根各一錢 牛皮消九分 甘草三分

右十味煎服

乙字湯叢桂亭藏方治痔疾脫肛痛楚或下血腸風前陰痒痛者

柴胡 黃芩各七分 外麻 大黃各四分 甘草三分

大棗四分 生薑二分

右七味煎服

加味解毒湯壽世保元治大便下血大腸痛不可忍肛門腫起者此下焦熱盛也

大黃 黃連 黃芩 黃柏 梔子

赤芍藥 連翹 枳殼 防風 甘草

右十味煎服

赤石脂湯 春林 治痔疾臟毒

補中益氣湯內加赤石脂

連珠飲 家試 治脫血

茯苓求甘湯合四物湯

調和煎 春林 治肛門腫痛

梔子 大黃 黃連 芒硝 黃芩

黃柏 槐花 防風 苦參 荊芥

右十味內加毛茛水煎頻洗患處

斷紅飲 和蘭 治肺血吐血衄血下血或婦人赤白帶下崩

漏

地黃 玫瑰花 錢各一 大麥 分五 甘草 分一

右四味煎服

丹溪治五痔方 證治

參 黃連 生地黄 當歸 川芎

槐角 條芩 枳實 升麻

右九味

五物解毒湯 叢桂 治諸毒方

荊芥 分五 金銀 分七 芎藭 分三 義菜 分五 大黃 分二

右五味煎服

烏藤丸 同前 主徽毒新舊方

大黃 輕粉各二錢 桂枝 沉香 甘草

丁香各一錢

右六味細末糊丸

雄黃兌散 三方 治下部蜜瘡

雄黃研 青箱子 苦參 黃連各二分 桃仁研一分

右五味為末以生艾搗汁和如棗核大綿裹內下部

决勝 春林 治諸失血方

麒麟血三錢 硫黃二錢

右二味為散

神水膏 和蘭方 徽毒ノ骨節疼痛或ハ固結腫ヲ成モノ及

ヒ療癰乳核等ヲ消散シ又驚掌風ヲ治シ又殺蟲ノ

效アリ

水銀四十八錢 猪脂百六十錢

先猪脂ヲ鍋内ニ入溶化セシメテ後濾過シ稍冷ル

ヲ俟テ水銀ヲ和シ擣テ星ヲ見ザルニ至ル

左突 春林 此方性溫ニシテ堅硬ヲ和シ膿ヲ釀シ腐肉

ヲ分離シ新肉ヲ長セシム温補ノ効アル故虚候ヲ

見スモノニ貼ス可シ

松脂 瀝青各四十錢 黃蠟七十錢 麻油百九十錢

右四味共ニ鍋内ニ入文火ニ上セ攪スルヲ手ヲ止メズ純黑色ニ至ルヲ度トシテ濾過シ貯フ

雞卵左突同前 主治左突ニ同シ尤モ虛證ヲ治ス

前方左突内加雞卵

青蛇同前 能膿血ヲ吸ヒ腐肉ヲ去リ腐蝕ヲ止ム

烏賊骨 乳香各十錢 綠青二十錢 枯礬 丹礬各五錢

黃蠟八十錢 松脂百錢 麻油四合 酢三合

右為末先麻油松脂黃蠟ノ三味ヲ鍋内ニ入溶化セシメ水氣ノ盡ルヲ俟テ火ヲ下シ麻布ニテ漉シ冷

處ニ置キ稍冷ル寸ハ上面膏凝テ薄氷ヲ結フガ如クニ至ルヲ度トシ烏賊骨ヲ下シ混和セシメ次ニ

乳香枯礬ヲ下シ又混和セシメテ後膏全ク冷ル寸

丹礬綠青ヲ下シテ能混和セシメ一夜ヲ經三合ノ

酢ヲ一合ニ煎熬シ膏中ニ入日ニ爆シ度々攪シ純

青色ニ至テ收メ貯フ

破敵同前 能膿ヲ吸ヒ穢物ヲ去リ肉ヲ長セシメ腐蝕

ヲ止ム

左突七錢 青蛇三錢

右二味混和シテ貯フ

白雲 同前 性清凉ニシテ腐蝕ヲ收斂シ速ニ瘡口ヲ愈スノ効アリ

麻油 合ニ 白蠟 錢四十 官粉 錢三十 椰子油 分八

輕粉 龍腦 各二錢

先麻油ヲ煮テ水氣ヲ盡シ白蠟ヲ入溶化セシメ後火ヲ下シ冷ルヲ俟テ諸藥ヲ和ス

後衝 同前 餘毒ヲ除キ腐爛ヲ收斂ス

青蛇 錢三 白雲 錢七

右二味混和

紫雲 同前 肌肉ヲ潤シ疼痛ヲ止メ肉ヲ長ズ

麻油 合八 當歸 錢四十 紫根 錢三十 黃蠟 錢八十

マンテイカ 錢八

先麻油ヲ煮テ水氣ヲ盡シ次ニ當歸「マンテイカ」ヲ入煮ル「五六沸次ニ黃蠟ヲ下シ硬軟ヲ試ミ火ヲ下シ紫根ヲ入攪シ麻布ヲ以テ漉シ貯フ

玫瑰蜜 和蘭 性收斂シテ腐蝕ヲ止ム

玫瑰花 錢八十 蜂蜜 錢三十 沸湯 錢五百七

先玫瑰ヲ沸湯ニ浸ス「一日一夜ニシテ又文火ニ上セ煮テ半ヲ減シ絞テ汁ヲ取り蜜ヲ和シ再ビ煮

テ水氣ヲ盡ス

芎歸膠艾湯 大黃牡丹皮湯以上金匱 猛汞丹ヒルガハ

癰疽ハ素問ニ鼠瘻ト稱シ靈樞ニハ癰癧ト云リ瘻ハ
已ニ潰ルノ稱癰癧ハ未潰ノ名千金方ニ氣腫ト云ノ
モ乃チ癰癧ノ一ナリ此病少壯ノ人ニ多ク老大ノ人
ニ少シ其因ヲ考ルニ父母ノ遺毒ナリ故ニ治シ難シ
和蘭内景ノ説ヲ讀ニ「キリイルト云モノノ頸項ヲ纏テ
アリ其「キリイルト云モノヘ遺毒ノ附テ固結スルナ
リ後世ノ方書ニ鼠瘻ト云名ニ本テ鼠殘不潔ヲ誤リ
食シテ發スルト云説アレ氏臆説ナリ其證頸ニ核ヲ
結ビ大サ大豆ノ如ク或ハ櫻桃ノ如ク或ハ栗子ノ如

癰癧 馬刀癧

癰癧ハ素問ニ鼠瘻ト稱シ靈樞ニハ癰癧ト云リ瘻ハ
已ニ潰ルノ稱癰癧ハ未潰ノ名千金方ニ氣腫ト云ノ
モ乃チ癰癧ノ一ナリ此病少壯ノ人ニ多ク老大ノ人
ニ少シ其因ヲ考ルニ父母ノ遺毒ナリ故ニ治シ難シ
和蘭内景ノ説ヲ讀ニ「キリイルト云モノノ頸項ヲ纏テ
アリ其「キリイルト云モノヘ遺毒ノ附テ固結スルナ
リ後世ノ方書ニ鼠瘻ト云名ニ本テ鼠殘不潔ヲ誤リ
食シテ發スルト云説アレ氏臆説ナリ其證頸ニ核ヲ
結ビ大サ大豆ノ如ク或ハ櫻桃ノ如ク或ハ栗子ノ如

ク累々トシテ四ツ五ツ連リテ發スルナリ多キモノハ延テ耳根ニ至リ或ハ缺盆ニ及フ或ハ右ヨリ起テ左ニ及ブモアリ或ハ左ニ起テ右ニ至ルモアリ蟠蛇癰瓜藤癰ノ名モ此等ノ形狀ヲ指スナリ其毒必ズ腋下ニ延テ核ヲ結ブモノナリ予ハ癰癧ヲ診スルニ先腋下ヲ按シ其核ノ大小多少ニ就テ險易ヲ決ス是ハ乳岩ヲ患フルモノ、必ズ腋下ニ核ヲ結ブト同理ナリ癰癧ノ核ヲ撮ミ揺ニ左右上下へ能ク運轉ス初ハ痛ミノナキモノ故心附ズシテ居ルモノナリ日ヲ積ミ月ヲ累ニ從テ漸ク大ニナリ數モ多クナリ或ハ半

年或ハ一二年ニ至レハ先ニ發シタル核ハ膿ニ化シテ軟ニナリ色モ赤ク變スルナリ此ノ時ニ至テ微ニ痛ミノアルモアレハ痛マサルモノ多シ鍼ヲ刺テ膿ヲ出スニ膿佗ノ腫瘍ト異ニシテ粘稠スルモノナリ黄色モアリ白色モアリ一旦ハ低クナリ快ク覺ユレハ稀膿淋瀝トシテ出遂ニ漏ヲナスナリ其内ニ又次ノ核モ膿ニ化シテ終ニハ五ツモ六ツモ口ヲ生スルナリ或ハ自ラ潰へ或ハ鍼ヲ刺テ潰モ共ニ口ヲ斂ス或ハ漏口自ラ腐蝕内陷シテ筋骨ヲ露モアリ漸ニ氣血ヲ亡ヒ往來寒熱面色萎黃身體羸瘦ニ或ハ咳嗽或

ハ盗汗遂ニ勞瘵ノ如クニナリテ死ス又頸及ビ頷下
ニ核ヲ結ンデ癩癰ニ似タルモノ多シ眼病或ハ咽喉
病或ハ輕粉劑ヲ服シテ口中ノ腐爛スルモノ或ハ免
毒ニ中ルモノ或ハ痘瘡麻疹等皆此ニ結核ヲ生ス原
病治シテ後モ結核ハ久シク消散セザルモノナリ誤
テ癩癰トナス可カラズ小兒ノ時ニ頭瘡ヲ患フル寸
ハ又必ス此ニ核ヲ結ビ七八歳或ハ十五六歳ニ至リ
テ核ノ殘テアルモノアリ不圖自ラ探リ當テ大ニ驚
クナリ自分ハ勿論父母モ小兒ノ才ニ頭瘡ヲ患ヘ
シナラ忘レ真ノ癩癰ト心得醫藥ヲ請ニ醫モ亦其因

ヲ詳ニセスシテ其人ノ言ニ雷同スルナリ笑フ可
キナリ勞瘵ヲ患フルモノモ亦核ヲ結ブテ癩癰ノ
如シ是ハ咳嗽ニ因テ生スルナリ就中癩癰ニ混シ易
キモノハ微瘡ナリ下疳或ハ便毒ヲ誤治シテ其毒頸
項ニ上リ核ヲ結ブテ恰モ癩癰ノ如シ予ガ門ニテ微
癰ト名ク又父母微瘡ヲ患ヒ其遺毒ヲ受テ生ルモノ
ノモ結核ヲ生ス乃チ遺毒ノ微癰ナリ一人微瘡ヲ患
ヒ其兒微癰ヲ患ヒ其孫ニ至テ又微癰ヲ患ヒシモノ
アリ微毒ノ血脉ヲ傳フテ恐可キナリ又馬刀癰ト
云モノアリ靈樞及金匱甲乙經千金方等ニ出頸ニ生

ス核大ニ楯圓ニシテ馬刀ノ如シ故ニ名ク癰癰ニ較
レハ起脹シ易ク膿ニ化シ易シ膿ヲ釀ス寸ハ疼痛アリ
リコレハ難治トセズ○治法真ノ癰癰ハ十人アレバ
九人マデハ難治トス初發ニテ未タ膿ヲ催サバ
ノハ翹玄湯ヲ主劑トシ夏枯草煎ヲ兼用トス可シ此
方尤モ奇驗アリ用フル一二三劑ニ至レハ能ク消散
スルモノナリ其核小クニナリテ全ク散ジカヌルモ
ノアリ然レモ其儘ニテ害ヲナサズ悉鳩烏答丸モ効
アリ此等ノ方ニテ消散セザルモノハ膿ニ化セズ
テハ濟ヌ故葛根湯加朮附或ハ伯州散ヲ兼用ニテ釀

膿ヲ促ス可シ膿潰テ後ハ彎測瘡子ヲ入テ瘡中ヲサ
クリ測ルニ廣ク成テアルモノナリ彎測瘡子ノ下
ク處マデ突當テ外ヨリ摸索スレバ露珠指ニ應ズル
ナリ其處ヲ鉞鍼ニテ刺シ彎測瘡子ヲ外へ貫キ糸ヲ
露珠ニ結ビ入タル穴へ引戻シ其糸ニテ緊禁シ明日
ニ至レバ兩方ヨリ糸ニテ切コミ糸ユルムナリ又糸
ヲ緊禁スルノ前日ノ如ク彎測瘡子ヲ入テ探ルニ
次ノ核へ通シテアル寸ハ其處へ鉞ヲ刺テ緊禁ノ法
ヲ施ス可シ緊禁ノ法ヲ施ス一二三日ヲ經兩瘡口ノ
間ノ六七分ニツマリタル寸痔漏刀ヲ入テ截ナリ痔

漏刀ヲ用フルノ法ハ痔疾ノ門ニ詳カナリ截開テ見
レハ軟肉トテ淚阜ノ如ク紅軟ナル肉瘡中一盃ニ滿
テアルモノナリ試ニ鯨鮫ニテ觸ルニ知覺ナシコレ
ハ生肉ニ非ル故ナリ赤汞丹ヲ敷ヘシ一夜ヲ經レハ
其肉腐敗スルナリ是ヲ鑷子ニテ除キ去ル可シ軟肉
猶殘リタラハ再ビ赤汞丹ヲ敷テ軟肉ノトクト除テ
後破敵ヲ綿片ニ攤テ瘡中一盃ニ填ム可シ膏ヲ更ル
十日ニ二次或ハ三次スル寸ハ生肉自ラ長スルナリ
核潰テ後或ハ自ラ口ヲ斂ルモノモアレ氏實ニ愈ル
非ズ外ハ愈テ内ハ軟肉ニテアルモノナリ鍼

ヲ刺テ前ノ治法ニ從テ可シ若シ漏口多ク疲勞ノ状
ヲ見スモノハ斷截ノ法ヲ施シ難シ正宗ノ夏枯草湯
或ハ十全大補湯ニ宜シ愈勞状ヲ成モノハ聖濟ノ人
參養榮湯及ビ芪歸建中湯ノ類見合用テ可シ痘瘡麻
疹頭瘡等ニテ結核ヲ成モノハ柴胡加石膏湯神驗ア
リ涼膈加石膏湯モ亦効アリ微癰ノ治法ハ微瘡門ニ
詳カニス馬刀癰ハ柴胡加石膏湯夏枯草煎ニ宜シ是
ニテ消散セザル寸ハ葛根加反鼻湯托裏消毒飲等證
ニ從テ與テ可シ食餌ニ海藻昆布裙帶菜羊栖菜昆崙
菜等ヲ食スル寸ハ消散ノ効アリ

癰癧主治方

翹玄湯 山脇家方 治蛇盤癰癧頸筋凝硬

連翹 錢一 玄參 錢一 木通 各七分 升麻 各七分 羌活

山柅 各三分 薑陸 各三分 甘草 各二分

右八味煎服

夏枯草煎 春林 治癰癧神方

夏枯草 新鮮者百 鯽魚 八十錢去腸

貝母 八錢剉以填

右三味先以醇酒二升漬夏枯草一日一夜煮取五合絞去滓入鯽魚更煮半日許如膏下火又去貝母但食

鯽與汁三日而盡之若吐血則止服

夏枯草湯 外科正宗 治癰癧馬刀不問已潰未潰或已潰日久

成漏形體消瘦飲食不甘寒熱如瘧漸成勞瘵並効

夏枯草 二兩 當歸 三錢 白朮 三錢 茯苓 三錢 桔梗

生地 柴胡 甘草 陳皮 貝母

香附 白芍 各一錢 白芷 各一錢 紅花 各三分

右十四味煎服

托裏消毒飲 正宗 治癰疽已成不得內消者宜服此藥以

托之未成者可消已成者即潰腐肉易去新肉易生

人參

川芎

白芍

黃芪

當歸

白朮 茯苓 金銀各一 白芷 甘草

皂針 桔梗各五分

右十二味煎服

悉鳩烏答丸 天真樓藏方 治瘰癧乳岩諸結核

悉鳩烏答 錢二分 米粉 錢八分 白芷

右二味糊丸

葛根加朮附湯

傷寒論葛根湯內加朮附

葛根加反鼻湯

傷寒論葛根湯內加反鼻

芎歸建中湯

金匱黃芩建中湯內加當歸

柴胡加石膏湯

傷寒論小柴胡湯內加石膏

涼膈加石膏湯

局方涼膈散內加石膏

十全大補湯

局方 人參養榮湯

聖濟總錄 伯州散 本朝經

破敵 方見痔疾門 赤朮丹

[Blank page with vertical lines for text]

舌疽

舌疽ノ名ハ古書ニ考ル處ナシ本邦ニテ唱へ始メタルト見ユ隨分多キ病ナレ其證候ヲ詳云フモノハ未ダ見アタラズ證治要訣ニ曾有舌上病瘡久蝕成穴ト云ヒ醫宗金鑑ニ舌疔ト云フモノヲ載テ百無一生ト断リタルハ思フニ舌疽ノコトナリ其病失榮乳岩ト同因ニテ翻花スル氣味アリ至極大病ニテ三十人ノモノナレバ二十九人マデハ死ヲ免レズ又微毒ノ舌ニ發スルモノ固結陷蝕シテ其形狀舌疽ニヨク似タレ氏治シ難シトセズ香川太仲行餘醫言ニ真

舌疽ヲ徵毒ト心得タルハ誤リナリ舌疽ノ初メ多クハ舌尖或ハ右偏或ハ左偏ニ發ス或ハ舌下或ハ舌心ニ發スルモアリ固結スルト豆ノ如ク粟子ノ如ク久キヲ經レハ瘡頭自ラ腐蝕シテ凹ニナレト鹽醋辛辣及ヒ熱飲モ一切染ルトナシ染ミザルハ至テ毒ノ深キ故ナリ凡ソ口舌何程腐爛シテモ飲食ノ染ル證ハ治シ易シトス腐蝕日ニ深ク固結月ニ蔓リ舌ヲ轉動シ難ク言語蹇澁シ一年或ハ二年ニ至テ遂ニ舌缺ケ盡テ死スルナリ始メハ痛ミモナケレト腐蝕スルニ從ヒ痛ミモアリ寒熱ヲモ發スコノ病少壯ノ人ニ少

ク多クハ五六十ノ頃ニ及テ患フルモノナリ舌疽ヲ患フルモノハ頰下及ヒ頸ニ核ヲ結ビ疽ノ大ニナルニ從テ核モ大ニナリ或ハ潰ルトアリ潰ル寸ハ其腐蝕シタル形狀舌疽ニ同シ同毒ナレバナリ○治法痛ミ強キモノハ尚足飲涼膈散加石膏痛ミナクシテ虛候アルモノハ甘露飲附子理中湯ニ宜シ外用ハ五寶丹冰硼散崑崙散ノ類ニ宜シ先年崎港ニ遊學セシ頃和蘭醫「イボルト」ナルモノ舌疽ヲ斷截シ後ハ金創ノ治法ヲ用テ治シタリト吉雄幸載ノ説話ヲキケリ最初ナラバ治ス可キ理ナレト手ヲクニ成タルハ

中々術ヲ施シ難カル可シ奇方多クアレ凡驗ミルニ
効ヲ奏スルモノ少シ獨リ青洲老翁ノ金粉散神驗ア
リ予其門ニ留學セシ頃治セシモノ二人マテ見請タ
リ歸省ノ後舌疽ヲ療治セシ一已ニ二十二人ニ及
ヘ凡皆効ナクシテ死ス獨リ安食村平吉ト云モノ舌
ニ固結スル一太サ小粟子ノ如ク蝕スル一深サ豆ヲ
容ル、ニ至ル諸家皆難治トス因テ予ガ門ニ治ヲ請
フ予診シテ微瘡ヲ患フル一アリヤト詰ルニ絶テ患
ル一ナシ試ニ猛烈水ヲ瘡中ニ點ズルニ少シモ痛ミ
ヌ知ラズ是ハ真ノ舌疽ナリ先猛烈水ヲ點スル一曰

ニ二次點シテ少シ過ル寸ハ腐肉ト金粉散ヲ嗅シメ
レテ赤肌ニナルモノナリ
尚足飲ヲ與フル一三十日餘ニシテ全愈セリ舌疽ノ
愈シ一ハ至テ珍シキ一故其始末ヲ詳ニスル一如此

舌疽主治方

尚足飲 叢桂 理舌唇生瘡牙痛喉痛一切口病

石膏 錢一 黃芩 分六 紅花 分五 玄參 大黃 各四分

黃連 分三 甘草 分二

右七味煎服

甘露飲 局方 治舌疽

地黄 麥門 枳殼 甘草 茵陳

枇杷葉 石解 黃芩 天門冬

右九味煎服

附子理中湯 局方 治脾胃虛寒發舌疽

理中湯內加大附子一枚

五寶散 萬病回春 治微瘡及舌疽

鍾乳石 六分 琥珀 三分 龍腦 一分 辰砂 三分 真珠 五厘

飛白麪 三錢

右六味極末土茯苓二十錢以水一升二合煎至六合去滓分湯二合入散二分空心頓服日服三次以知為度

崑崙散 叢桂 理舌瘡及一切口中諸瘡腐爛并止齩齒痛

昆布 末經製造者佳 鹽梅 連核燒存 巴豆 燒存性

枯礬 二分

右四味研末傅瘡處甚良

冰硼散 正宗 治口中諸瘡

冰片 五分 辰砂 六分 玄明粉 硼砂 各五分

右四味為散

金粉散 春林 治舌疽之神方

硼砂 七分 白檀 五分 辰砂 一錢 烏梅 五分 鬱金 七分

金屑 三分

右細末ト為シ七ツニ分子艾葉ニ和シ紙ニ包ミ二
十許ノ條トナシ一日ニ一條宛嗅クナリ

涼膈散加石膏

方見癩門

猛烈水

乳岩

乳岩ハ至極ノ大病ニテ古ヨリ難治トス宋ノ竇漢卿
未破可療ト云タルハ無替ノ言ナリ外科正宗ニ百人
百必死スト斷タルコソ實ニ數治療ヲ經タル上ノ言
ニテ卓識ナリ獨嘯菴漫遊雜記ニ乳岩不治自古然而
紅毛書中有言曰其初發如梅核之時以快刀割之後從
金瘡之法治之斯言有味雖余未試之書以待後世ト云
リ其法詳ニ傳ハラザレバ誰モ其術ヲ行フモノナシ
後ニ我青洲老翁出テ始テ麻沸湯ト云方ヲ組タテ
乳岩ヲ截テ療治スルヲ心匠セシハ曠古ノ一人計

謂ツ可シ其病少壯ノ人ニハ少ク多クハ五六十ノ間
ニ發ス是ハ老タル人ノミ患テ若キモノ患ザルニ非
ス若キ寸ヨリ萌^チシテ歲月ヲ積ミ五六十ノ頃ニ至テ
發スルト見エタリ獨リ婦人ノミ患ヒテ男子ニハ
絶テ無キ病ナリ乳岩ニハ限ラズ乳癰乳癰乳癖ノ類
凡テ乳ノ病ハ婦人ニ限ルトナリ其理ヲ考ルニ婦人
ハ乳汁ヲ釀ス為ニ血ノ乳房へ運リ來ルト男子ヨリ
モ尤モ多シトス血多キ寸ハ凝返シテ敗血ヲナシ易
シ其敗血乳病ノ病因トナルナリ乳岩ノ初ハ乳房ニ
小核ヲ結ブト大ヤ豆ノ如ク漸久シクシテ粟子ノ如

ク之ヲ撮テ揺スニ左右上下ニ能ク運轉シテ裏肉ニ
モ附ス表皮ニモ附ス中央ニ懸テアル様ニ覺ユルナ
リ痛ミモナク痒ミモナク何モ外ニハ患ノナキモノ
ナリ一年或ハ二三年或ハ七八年ヲ経テ漸ニ大ニナ
リ桃ノ如ク或ハ茄子ノ如クニ至ル乳岩ヲ患フルモ
ノ若シ娠メル寸ハ核急ニ大ニナルモノナリ又肥胖
ノモノハ不^レ久シテ大ニナリ易ク疔癰ノ人ハ急ニハ
大ニナラヌモノナリ肥胖ノモノハ核モ矢張堅硬ナ
レ疔癰ノ人ニ較レハ軟ナル氣味ナリ是ハ脂肪ノ
多ク纏テアル故ナラニ羸弱ノモノハ核ハ堅硬如石

ナリ結核大ニナル寸ハ始テ表ノ皮ト相附着シテ皮
色赤ク變シ遂ニ自ラ潰ユ潰ヘテモ粘膿ハ出ス稀水
ノミ流レ漸ニ陷蝕シテ凹凸磊落岩穴ノ如クニナリ
臭氣モ出或ハ痛ミノ出ルモアリ瘡口ヲ鯨籠ニテ觸
レ試ミルニ不仁スルモノナリサレバ兎角出血シ易
キモノニテ物僅ニ觸ル寸ハ血大ニ迸ルナリ潰テ
モ直ニハ死セズ半年或ハ一年モ過テ死スルナリ潰
テ後ハトテモ治法ハナケレバ此ニ一奇方アリ青芋
ヲ薑擦ニテスリ一夜ヲ経テ紙ニ攤ハ貼シ置寸ハ瘡
水出スシテ姑ク快ヲ覺フ一貼シテ幾日モハナレ又

内ハ其儘置テ互シ○治法核ノ小クシテ左右上下ハ
運轉シ皮ヘモ附ヌ寸ニ斷截スレハ必ス治シテ再發
ノ患ナシ其頃ハ患ニモナラヌ故捨置テ大ニスルト
リ或ハ醫藥ヲ請モ内科ハ乳岩トモ心附ツシテ潰テ
後始メテ外科ニ託スルナリ外科モ他門ノモノハ却
テ斷截ノ法ヲ誹謗シ姑息ニ藥ヲ與ヘ遂ニ潰ユルニ
及テ始メテ辭スル故共ニ斷截ノ度ヲ失テ不起ニ至
ルハ悲ム可キナリ核大ニ成寸ハ未潰モ其毒延テ
腋下ニ至リ必ス核ヲ結ブ是ハ至テ惡證トス假令斷
截ノ法ヲ施スモ必ス再發ス故ニ老翁モ晩年ニハ心

匠シテ腋下ノ核ヲモ截テ取ルコトヲ發明セリ然レモ此術至テ危険ニシテ容易ニ施シ難シ斷截ノ度ヲ得ルト云ハ結核大ヤ栗子ノ如ク或ハ桃ノ如クニシテ皮色不變腋下ニモ何ノ言分モナキ寸ナリ結核ノ小ナル寸ハ乳癰乳核ニ誤リ易キ様ナレモ乳癰ハ二ツモ三ツモ連ツテ生シ乳核ハ一旦核ヲ結ンデ後ハ二月三月捨置テミレハ其核小クナルモ大キクハ成ヌモノナリ乳岩ハ一月毎ニ心持ツ、大ニナル氣味アリテ自ラ異ナルナリ愈術ヲ施サント思ハ、其人ノ肥瘦脈ノ虛實ヲ察シ腹候ヲモトクト按シテ後ニ術

ヲ施ス可シ其法先早ニ麻沸湯ヲ與フ麻沸湯ニ錢水

二合活火ヲ用テ煎ジ一合八勺ヲ取り頓服ス晨饌ハ飯一椀

汁一椀ヲ食シテ後ニ服シテ後蒲團ノ上ニ卧サシノ寢衾ヲ以テ覆ヒ又蒲團ヲカケテ首ノ出ヌ様ニスル

ナリ春秋ハ此法ニテ宜シ暑時ハ蒲團ノミニテ宜シ

嚴寒ノ時ハ兎角ニ藥ノキ、カヌルモノナリ其時蒲

團ノ四隅ヲ持テ病人ヲユスブリ或ハ酒ヲ飲シメテ

早ク藥ニ酔シムルノ法アレモ火桶辻番ト稱ニ火ヲ

活ケ文武ニ適シ病人ノ裾ヘ容ル、寸ハ乍ナ瞑眩ス

コレ予カ新驗ノ法ナリ服後小使ニ行タカルモノ小便スル寸ハ藥氣薄

ハトル故服後藥ノ瞑眩ノ候ハ稟賦沈靜ノモノハ醉
 テ靜ニナリ豁達ノモノハ躁シクナリ妄言罵詈シ面
 色赤ク眼中赤脈ヲ生シ瞳孔散大ニナリ舌上乾燥シ
 テ口臭ク或ハ渴シ或ハ虛里ノ動タカブルナリ藥ヲ
 與ヘテ二時許ニシテ此證候ヲ見スナリ此術ヲ施シ
 テヨキ刻限ナリ佞者ヲシテ病人ノ四肢ヲ緊シク押
 シメ左ノ手ヲ以テ核ノ根蒂ヲ緊シク握リ核ノ運轉
 セヌ様ニ下ヘ押ツケ右ノ手ニコロンメスヲ把リ指
 及ビ中指無名指小指ヲ以テ刀柄ヲ握氣ヲ丹田ニ納
 リ示指ヲミ子ニアテ持堅ムルナリ
 如何ニモ急ガヌ様ニ術ヲ施スヲ肝要トス少シ核

ヲ除テ刀ヲ截コシ徐々ニ核ニ從テ纖月様ニ截廻シ
 指ヲ瘡口ヘ入結核ト皮肉ノ間ヲサグリ筋絡ノ核ニ
 纏フモノヲ刀或ハ剪刀ニテ瓜ニテ撮ミ切ルモア截
 放シテ結核ヲ出スナリ結核ニハ脂肪纏テアリ脂肪
 ノ核ニ附ヤウニ截ヘシ若シ核ヲ截テ核ノ少シニテ
 モ殘ル寸ハ瘡口其毒ヨリ腐蝕シテ遂ニ斂マラス或
 ハ幸ニ愈ルモ必ス再發スサレハトテ存分ニ生肉ヲ
 截寸ハ或ハ肋骨ヲ侵シ或ハ動脈ヲ斷テ變ヲ生スル
 一アリ至テ功者ノ入處ナリ此時出血スル一多キ故
 寸ハ却テ誤ルナリ截終ルマテニハ六七合ノ血ハ出
 ルナリ心配スルニ足ラズ動脈モ靜脈モ斷ツ故血迸

少縫縫七殘シ左突メイチヤヲ挿スナリ
膿ヲ持タル時此メイチ
 ノ間ヲ縫ヒ糸ト糸トノ間ハ四五分位ヲ隔テ下邊ハ
 貫キ深サハ五分位モ穿ツ心持ニス可シ第一ハ創口
 中央次ニハ其左右ヲ縫ヒ又其次ニハ三箇處ノ糸
 處ヨリ鍼ヲ穿チ右邊ノ創口ヨリ五分モ離ル、處へ
 縫ヒ合ス縫法ハ創口ノ左邊創口ヲ離ル、五分ノ
 綿布ヲ浸シ創口ヲ洗ヒ瘀血ヲ去リ金創ノ法ノ如ク
 其法口授ス結核ヲ出シテ後ハ火酒ヲ温メ寒温ニ適シ
 施ス可シ其法動脈ノ截レ口ヲ見定メ右ノ示指頭ヲ
 二升モ三升モ出ント欲スル勢アラハ先止血ノ法ヲ
 ヲ專一トス只動脈ヲ截テ血飛走スルガ如クニ出テ
 ルハモアレハ大抵ノハ捨置テ早ク核ヲトリ終ル
 外科金 卷

去ルヲメナリ膿ヲ縫合セテ後ハ綿布ヲ雞子白ニ浸シ
 創上ニ貼スルヲ五重又綿布ヲ醋ニ浸シ前ノ綿布ノ
 上ニ貼スルヲ五重次ニ綿布ニ先鋒ヲ攤テ其上ニ貼
 シテ蓋トス綿布ニテ枕ヲ作り瘡口ノ兩方ニ置此枕
梅ニテ繃帶ノ都合宜シクナリ瘡口ヨク合スルナリ
又瘡中へ膿ヲ催モ此枕ニテ左右ヲ押ユル故膿ノ外
ヘ流注スル綿布ヲ八重ニ疊ミ其上ヲ一圓ニ覆ヒ一
幅ノ綿布ヲ豎ニ二重ニ折テ半幅トナシ其綿布ノ中
 央ヲ脊髓ニアテ其右ノ一端ニテ胸ヲ覆ヒ左ノ腋下
 ニ至ラシメ其左ノ一端ヲ以テ又胸ヲ覆ヒ右ノ腋下
 ニ至ラシメ別ニ綿布ノ細帶ヲ以テ其上ヲ卷テ緩ク
○三ノ
 外科金 卷

紫スル一ニ匝又別ニ綿布ノ細帯ニテ頸ニカケ胸上
 ニ至リ已前ノ細帯へ結び合セ繃帯ノ動カサル様ニ
 シテ閑室ニ安卧セシメ煎茶ニ鹽少シ和シテ與フ能
 麻沸湯ノ瞑眩ノ醒ルヲ待テ人參調榮湯ヲ與フ常ノ
 毒ヲ解ス後痛ミノ出ルモノハ醒テ後モ痛ムトナシ麻沸湯次
 時ヲ移シテ後痛ミノ出ルモノハ醒テ後モ痛ムトナシ
 日ニ至テ又雞子白綿布醋綿布ヲ改メテ貼シ及ビ繃
 帶ヲ施ス一前日ノ如シ如此スル一凡ソ三日ニシテ
 雞子白綿布醋綿布ヲ去リ前衝ヲ貼ス膿成モノハ隨
 分ヨク膿ヲ推出シテ左突メイチヤヲ挿入ス可シ六
 七日ニ至テ瘡口附著スル寸ハ糸ニユルミ出テ運轉

スルモノナリ其時瘡口ノ兩端ヨリ糸ヲ去ル一
 日ニ一糸或ハ二糸中央ノ糸ハ二糸モ三糸モ殘シ置テ
 瘡口ノ全ク附著シタルヲ見トバケテ後ニ去ル可シ
 岩ヲ取テ後熟視スルニ外ハ脂肪一圓ニ纏テ黄色ナ
 リ半截シテ其中ヲ見ルニ一箇ノ頑肉ニテ決明ノ肉
 ニ彷彿トシテ淡白色ナリ岩ノ大ナルモノハ其肉ノ
 裏カ腐レカ、リテ軟カニナリ紫色ニ變シ臭氣モア
 リ隣里幸介ト云モノ、妻帶下ヲ患ヒテ一塊ヲ下ス
 大サ雞卵ノ如ク其質全ク乳岩ニ同シ程ヶ谷驛與三
 郎ナル者頭ニ贅肉ヲ生ズ大サ拳ノ如ク堅キ一石ニ

似タリ此病ヲ治シタルハ斷截シテ後ニ又半截シテ
是ヲ見ルニ其質又全ク乳岩ニ似タリ何レモ全愈シ
タルハ乳岩ヲ斷截シ核ヲ去テ治スルト同理ナリ

乳岩主治方

先鋒春林瘍未成者散之已成者連化膿

松脂二百錢黃蠟百六十錢香油三合翠雲草三十錢

右四味煮熟至焦黑色以麻布濾過

前衝同前治全創

先鋒六錢白雲四錢

右二味混和

麻沸湯

春林軒秘方

人參調榮湯

左突

以上見疾門

