

瘍科秘録

四之上

武
407
3



門中武日
第407
卷3

棗軒本間先生著



瘍科秘錄

自準亭藏



瘍科秘錄目錄

卷四

金創

兔缺

鎖陰

鎖肛

鎖尿口

鼻痔

鎖鼻

豆入鼻中

瘍科秘錄

卷四 目次

自準亭藏

駢拇枝指

筆磬

水癩

大陰莖

腸癩

打撲損傷

會陰打撲


落架風

瘍科秘錄卷之四

水戸 本間玄調和卿著

金創

金創ノ名ハ巳ニ金匱要略ニ出デ、稱シ來ルコト舊
 シ然レモ創ヲ本字トス漢書ニ曹參身被七十創トア
 リ周禮ニ金瘍ト云ヒ後漢書ニ金瘡ト云フモ皆金創
 ノ別名ナリ凡ソ金創ノ診法ハ先輕重虛實ヲ知テ死
 生ヲ鑒定スベシ胸脇ヲ衝タル創ニ臨ミ但創口ノ狹
 キヲ見テ創中ノ深ヲ察セズ輕症ト心得テ居ル中ニ
 漸漸ニ危險ニ至ルトアリ咽喉及ヒ陰囊等ノ創ニ臨



ミ創ノ淺深ヲモ測ラズ要處ヲ切りタルユ工危篤ナ
 リト爲シテ手ヲ束子後ニ容易愈ル^{タスク}一アリ皆是醫者
 ノ誤診^{ミカガ}ニテ我門ノ尤恥辱トスル所ナリ世ニ經穴ヲ
 以テ創ノ吉凶ヲ定ムルノ法アレ^レ凡^レ逐一據ル可ラズ
 要處ノ創モ淺キ寸ハ必シモ害アラズ要處ヲ避タル
 創モ深キ寸ハ重シトス頭顱ハ諸陽ノ會ニテ氣血ノ
 多キ處ナレバ小創ニテモ多ク失血ス然レ^レ凡^レ動搖屈
 伸ノ無キ處ナレバ創ハ附易ク愈易シ腦蓋骨ハ至極
 丈夫ニ出來テアルモノナレバ大抵ノ創ニテハ腦中
 へ切り通ルコトナシ若シ切り通^ル或ハ鳶嘴ノ類ニ

テ打子貫キタルハ何レモ必死ナリ其時直ニ死セズ
 凡^レ瘀血腦中ニ入り膿ヲ成シ膿耳目口鼻ヨリ出テ腦
 漏ノ如ニナリテ死スルナリ腦蓋骨ハ一枚ノ骨ニ非
 ズ前後左右ヨリ組合テ出來タルモノナリ其形巔頂
 ニテ工ノ字ヲ畫スルニ似タリ此處ヲ強ク打ツ時ハ
 凹^{クボ}ミ易ク碎ケ易シ碎ケテモ凹^{クボ}ミテ^テ危險ナレ^レ凡^レ些
 少ノコトナレバ幸ニ死地ヲ免レ漸々ニ附骨疽ノ如
 ク成リ朽骨^{クワカク}創中ヨリ出テ愈ルモノアリ骨ニ創附キ
 タレバトテ一概ニ難治ト爲スヘカラス打撲ノ創ハ
 小創ニテモ強ク骨ニ中ルモノニテ創愈テ後モ久ク

隱隱トシテ頭痛ノ愈ザルモノナリ終ニ宿疾ニナリ
 風ノ變リ雨ノ催シナドニハ必ス發スルモノナリ咽
 喉ハ氣道食道表裏ヲナシテ飲食呼吸ノ道路ナレバ
 至テ大切ノ處ナリ氣道ヲ截ル寸ハ氣息瘡口ヨリ泄
 テ白沫ニ血ヲ雜テ吹キ出スモノナリ食道ヲ截リタ
 ルハ飲食及ビ涎沫等創口ヨリ湧出テ止マス何レモ
 難治トス大創ナレバ必ズ人迎ノ動脈ヲ截ル故血大
 ニ迸リ出テ頃刻ノ間ニ死スルモノナリ氣道食道へ
 創ノ附カザルモノハ勿論創附キテモ少々ナレバ難
 治トセズ肩髃ノ創ハ灰生ニハ關ラザレ氏手へ引カ

レテ肩モ下垂リ刀口モ大ニ開クユエ療治ノ至テ六
 ケ敷モノナリ隨分氣ヲ付テ縫合スレバ附キ兼ル者
 アリ此處ハ肩胛鎖骨及ビ膊骨ノ三箇所ヨリ相接シ
 テ關節ヲナス處ナレバ創愈テ後モ故ノ様ニ復セズ
 屈伸ノ不自由ニナル者多シ眼球ノ創ハ雞蛋白ノ如
 キ水出テ明ヲ失スルナリ背脊ノ疵ハ刀口大ナルモ
 淺ケレバ治シ易シ深フシテ脊髓ヲ切り或ハ胸腹へ
 切貫ルモノハ難治トス幸ニ死地ヲ免ルモノモ膿
 ヲ醸シ遂ニ漏ニ成ルモノナリ胸脇ハ肉淺クシテ内
 へ近ク内ニハ心肺ノ二臟ヲ容レ肝膽ノ類モ近隣ニ

ニ在レハ至極大切ノ處ナリ心肺へ創ノ附タルハ必
 死ナリ腹ハ創口ノ廣キハ勿論突創等ノ狹キ創モ内
 へ切貫ル寸ハ腸必ズ脱出ス初ハ少シ出ルモ呼吸ニ
 從テ漸々ニ出テ遂ニハ大小腸共ニ脱出スルニ至ル
 ナリ出ヌ様ニトテ綿布ニテ卷キ抑遏スルニ中々止
 ノ難キモノナリ腸出盡ル寸ハ腹拘急シテ死スルナ
 リ凡ソ腸腹外へ出ル寸ハ空氣腸中へ聚リ膨脹シテ
 肥大ナリ腹ノ上ハ勿論胸ノ上マテモ蔓延スルモノ
 ナリ又小兒ノ驚風癖疾腹痛等ヲ患ル者ニ神闕へ漫
 ニ灸ヲ灼ヘ大ニ腐リ未ダ愈サルニ病又發シ號泣努

力ノ勢ニテ臍脱シ腸モ亦從テ出ルヲアリ鷹取流ノ
 秘訣ニ腸臍上ノ創ヨリ出ルモノハ治シ臍下ノ創ヨ
 リ出ルモノハ不治ト云リ怪我人ノ檢使ヲ司ル者モ
 此法ニ據テ死生ヲ決定スレバ臍上ノ創モ腸多ク出
 ル寸ハ不治ニ至リ臍下ノ創モ腸少ク出ルモノハ難
 治トセズ創腹中へ切貫ル程ナレバ是非臍腸へ疵ノ
 付理ナレバ腸ハ軟カナル故大抵ニテハ創ノ付ヌモ
 ノナリ是ハ幕へ鐵炮ノ當リテモ打貫サルト同理ナ
 リ腸ノ出タルモ速ニ腸ヲ納レ療治シテ全快セシモ
 ノ尠カラズ陰囊ハ緊要ノ道具ニテ少シ截テモ死ス

ル様ニ世人心得テ居レ左程ノモノニハ非ズ陰囊
ヲ蒂ヨリ完^ズテ切落シタルモノ又半分切タルモノ又盜
賊ノ為ニ陰囊ヲ擘^キレテ罽丸ノブラリト下垂^リテ遂ニ
腐敗シタルモノ又丘陵ヨリ轉ヒ墮テ陰囊ヲ損傷シ
皮ノチギレ落テ雙丸ノ下垂タルモノ、類多ク親目
スルニ何レモ全愈セリ四肢ハ至テ治シ易シ手足ヲ
截リ落シタル者モ多クハ治スルナリ但臂腕膝踝等
ノ關節ヲ截タル創ハ速ニ愈難シ愈テモ屈伸ノ不自
由ニナルモノナリ手掌足心ハ附キニクキモノナリ
脈絡ハ總身ヲ貫通シテアルモノナレハ小創ニテモ

動脈ヲ切サルコトナシ然レモ小管ヲ截タルニテハ大
害ナシ人迎寸口等ノ大管ヲ截ル寸ハ血大ニ奔飛シ
テ止ズ遂ニ脱血シテ死スルモノナリ何處ノ創ニテ
モ先ツ創口疼痛ヲ發シ脈浮數惡寒發熱頭痛大便秘
シ小便少ク或ハ嘔シ或ハ渴シ或ハ口舌乾燥シ或ハ
眩暈スルヲ常式トス若シ大ニ脱血スルモノハ創口
潤澤ヲ失ヒ面色萎黃唇舌刮白ニナリ妄言謔語面赤
シテ狂ノ如クニナリ脈沈微四支微冷シ或ハ喘シ或
ハ嘔吐不止或ハ呃逆或ハ寒戰或ハ自汗出ルモノハ
何レモ凶候ナリ此等ノ症ヲ見ハスモノニ至テハ瘵

治中ニ死スル者モアレハ油斷スヘカラズ金創ニテ
 瘻ヲ發スルモノアリ一大事ナレモ利刀ニテ切りタ
 ル創ニハ至テ少シ打撲損傷或ハ竹木刺ノ類ヨリ發
 スルモノ多シ瘻ハ内科秘録ノ中ニ詳ナレバ此ニ贅
 セズ○治法金創ハ身體被服血ニ染リ人多ク群リ疾
 言遽色ニナリテ騒動スルモノナレバ醫者モ共ニ驚
 テ倉皇スル様ナリニテハ速モ療治ハ施シ難シ先ツ
 精神ヲ鎮メ少シモ臆セズニ療治ニ臨テ修行ノ第一
 トス得ト創ノ淺深吉凶ヲ辨シ脈症ヲ參考シテ病ノ
 輕重死生ヲ決斷シ次ニ入用ノ藥物器用等ヲ調ヘテ

| | | |
|--------------------|------|------------------|
| 座右ニ備フベシ | 金創鍼 | 少シ反テ織月ノ狀ヲナスモノヲ用フ |
| 鍼ニ長短アリ創ノ淺深ニ應シテ撰用スヘ | 剪刀 | |
| 鑷子 | 鑷子 | |
| 尖鑷子 | 彎測瘡子 | |
| 水銃 | 測瘡子 | |

鯨鮫

絲 木綿ノ絲ヲ三條撚合セテ一條ト為シ三子ト呼ブモノナリ或ハ麻絲ヲ用フベシ一尺五寸許ニ切り鍼眼ニ穿テ置クベシ

綿布 創ノ各處ニ從テ繃帶ヲ製ス或ハ洗滌ノ手帕ト為ス

金公水

先鋒

雞卵 殼ノ上下ニ小孔ヲ穿テ一方ノ口ヨリ吹キ白精ノミヲタラシ盤ニ盛ルベシ黃精ハ


用フ可カラズ

醋

火酒 寒温適宜ニ煖ムヘシ若シ寒ナル寸ハ寒氣肌肉ヲ侵シテ破傷濕ヲ發スルヲアリ熱ニ過ル寸ハ肉傷テ色ヲ變シ創ノ附著ヲ妨クルモノナリ寒温ノ加減ヲ失ハザルヲ肝要ナリ

綿布ヲ酒ニ浸シ輕ク絞テ創口ノ四邊ヨリ徐徐ニ洗ヒ創口ノ際マテヲ清淨ニシ又綿布ヲ食指ニ卷テ創中ニ入レ凝血ヲ洗ヒ去ル可シ若シ固ク凝滯シテ除

諸具圖




外科必錄

卷四

〇八

自維亭藏

金創



外科必錄

卷四

自維亭藏

キカヌルモノハ鑷子鯨篋等ヲ用フ可シ強テ凝血ヲ去ル寸ハ再ビ出血スルモノナリ出血ハ姑ク捨テ凝血ノ少シモ残ラヌ様ニ洗フ可シ若シ凝血少シニテモ残ル寸ハ膿ヲ催スノ種トナルナリ綿布ハ屢火酒ニテ洗ヒ出シ如何ニモ創口清淨ニナルヲ肝要トス幾度洗滌シテモ愈出血シテ又汚ル、モノナレハ凝血サヘ盡タリト思ハ、急ニ价者ヲシテ創口ヲ吻合ヒシメ鍼ヲ把テ糸ヲ津唾ニテ潤シ淺キ創ナレバ創口ノ左側三四分モ離レテ鍼ヲ刺シ右側ノ三四分モ離レタル處ヘ貫キ鍼ヲ去テ絲ヲ結フナリ結ヒノハ

創口ノ上ニナラヌ様ニ少シ側ヘヨセテ結ブ可シ結ヒ加減ノ緩緊至テ大切ナリ緩ニ過ル寸ハ創口附著セズ緊ニ過ル寸ハ大ニ腫痛ヲ發ス深キ創ナレハ創口ノ左側五六分モ離レタル處ヨリ鍼ヲ刺テ右側ノ五六分モ離レタル處ヘ貫ク可シ若シ創ノ至テ深キモノハ深ク縫ヲ良トスコレハ左側ヨリ刺テ創口ヘ貫キ再ビ創口ヨリ刺テ右側ヘ貫キ絲ヲ結ハズニ姑ク捨置キ次ヲ縫フ又前法ノ如クニシテ次第ニ縫ヒ終テ後絲ヲ一時ニ結フ可シ又鍼ヲ絲ノ兩端ニ貫キ一端ノ鍼ハ創中ヨリ刺テ右側ヘ貫キ一端ノ鍼モ

亦創中ヨリ刺テ左側ニ貫キテ縫合スルノ法アリ其
 時ノ便宜ニ從フ可シ縫法初メ創ノ中央ヲ縫ヒ次ニ
 ニ中央ノ絲ト創端ノ間ヲ縫ヒ又絲ト絲トノ間ヲ縫
 ヒ次第シテ縫ヒ終ルナリ絲ト絲トノ間相距ルル四
 五分ヲ常式トス深サ二寸已上ノ創ニ至テハ瘀血火
 酒等ノ殘ルモノナレハ縫ヒ終リタル處へ水銃ヲ挿
 入シ餘液ヲ喻收シ去リ後へ左突メイチヤヲ挿入ス
 可シ創底へ突當ラヌ様ニ弱ニ挿スヲ佳ナリトス縫
 ヒ終テ後再ビ火酒綿布ニテ拭ヒ清淨ニシ三重ノ綿
 布綿布ノ剪法創ノ短長ニ從フ可シ次ノ木綿モ亦此ニ準ズ雞蛋白ニ浸シ創上ニ

貼ス又三重ノ綿布ヲ金公水ニ浸シ雞蛋白綿布ノ上ニ
 貼ス次ニ綿布へ先鋒ヲ攤テ貼ス是ハ創口ヲ固封シ
 テ動搖セシメズ又雞蛋木綿等ノ乾カガナル為ナリ若
 シ是ヲ用サル寸ハ木綿乾キ附テ張替ノ寸痛ムモノ
 ナリ此處ニテ枕木綿トテ綿布ヲ細長ク疊ミ創口ノ
 兩邊ヨリ當ルヲアリ是ハ創口ノ能ク附著スル為ナ
 リ腋下咽喉等ノ凹凸ノ有ル處へハ臨機應變ニ用フ
 ベシ一通ノ創ニハ一々用フルニ及バズ先鋒綿布ノ
 上ハ綿布ヲ四重ニ疊ミ安定布ト名ク當テ、其上へ繃帶ヲ
 施スナリ次日ニ至リテ繃帶及ビ諸綿布ヲ去リ又諸

法ヲ施ス一前日ノ如クス三日モ亦如此凡ソ切タル
當座ハ一旦痛ノ去ルモノナリ縫合セタル後又必ズ
痛ヲ發シ其夜ハ安眠モナラス程ナリ然レモ次日ニ
至テ痛大ニ減シ三日ニ及テ痛ノ全ク去ルハ創附著
シテ膿ヲ催サルノ候ナリ若シ三日ニ至テ患處焮熱
腫痛ヲ發シ寒熱交來ルモノハ膿ヲ催スノ候ナリ四
日ニ至テ雞白金公ノ二綿布ヲ去リ綿片ハ前衝ヲ攤
ハ創上ニ貼シ先鋒及ビ安定中ヲ前法ノ如クニ當テ
綿帶ヲ輕ク施スナリ六七日ニ至レバ絲緩ミテ搖ク
モノナリコレハ創口ノ全ク附著シタル候ナリ緊シ

クシテ搖カサルモノハ未ダ附著セサルノ候ナリ附
著シタルヲ得ト見定メテ絲ヲ剪ミ去ルナリ左ノ針
口ノ極際ヨリ剪斷シテ右ヨリ抜クベシ若シ表ニ出
タル處ニテ剪寸ハ絲乾キ強リテアル故スクトキニ
疼痛ス初ハ一絲ツ、間ヲ隔テ、去リ一概ニ殘ラズ
去ル一ヲ禁ス大創ノ絲ヲ一概ニ去ル寸ハ再ビ創口
ノ離ル、一アリ將息ヲ失フ可カラズ始終膏ハ前衝
ヲ貼ス若シ創膿潰シテ軟肉ヲ生スル者ハ破敵ニ宜
シ内服ハ輕重共ニ人參調榮湯ニ宜シ大ニ脱血シテ
虛候多キ者ハ獨參湯人參湯ニ宜シ疼痛退カズ寒熱

久シク止サルモノハ逍遙散ニ宐シ眩暈頭痛心下痞
 シテ便秘スルモノハ苓桂朮甘合三黃ヲ與フヘシ身
 體各處ニ因テ手術ニ小異同アレバ今論スル處ノ治
 法ヲ運用スル寸ハ何處ノ創ニテモ治セズト云フナ
 シ金創ノ療治ニ臨テハ第一止血ノ法ヲ心得ヘシ淨
 給ヲ切タルハ出血シテモ限ノアルモノニテ自ラ止
 ムモノナリ動脈ヲ截タルハ容易ニ止マス其儘ニ舍
 寸ハ遂ニ脱血シテ危篤ニ至ルナリ或ハ切りタル寸
 ハ左程ニ出血セスシテ少ク時ヲ移シ却テ大ニ迸ル
 一アリ或ハ一旦血ノ止タルモ凝血ヲ洗ヒ去リテ再

ビ出血スルヲアリ何レモ出血ノ甚シキハ築々ト鼓
 動シテ泉ノ如ク湧出シ或ハ刺絡ノ如クニ注射モノ
 ナレハ血竭乳香等ノ散藥ヲ敷タルニテハ直ニ排出
 シテ少シモ利クベキ理ナシ動脈ノ口へ烙鐵ヲ當テ
 テ血ヲ止ルノ法初テ千金方ニ出ツ和蘭ニテモ亦專
 ラ行フ術ナレバ大出血ニ至テハ血頻ニ迸出テ、創
 口眞赤ニ染リ脈管ヲ分明ニ察スルヲ能ハス若シ漫
 ニ當ル寸ハ火氣良肉ヲ焦枯シテ創口ノ附著ヲ妨ル
 ナリ予活物窮理ノ學ヲ唱フル一此ニ二十年乳岩痔
 漏癭瘤微癘等ノ病ニ至テ皆斷截シテ其毒ヲ去リ壽

域ニ歸セシムルヲ專務トス故ニ日々ニ截斷ヲ行フ
一始ド虛日ナシ其中ニハ大出血ニモ數出合タレバ
一モ失策ナシ夫レ止血ノ法ハ先ツ狼狽セズニ能ク
血ノ出ル源ヲ察シ左ノ食指頭ニテ緊ク按ジ暗ニ平
假名ノ乃ノ字ヲ畫スル氣味合ニ指ヲ運轉スル寸ハ
血ノ出ル勢ヲ頓挫ナリ其時右手ニ鍼ヲ把テ脈管ノ
下邊ト思フ處へ貫キ創口ヲ吻合シテ絲ヲ緊ク結ヒ
餘ハ常ノ如ク間ヲ近ク縫合スヘシ鍼ノ刺シヤワ脈
管ノ位置ニ從テ縱橫正斜一定セス兎角脈管ヲ緊扎
スル様ニ鹽梅スベシ如何程ノ出血ニテモ精神ヲ鎮

テ此法ヲ施ス寸ハ止スト云フ一ナシ若シ肉ヲ切り
去テ縫合スルニ手段ノナキモノハ糊入ノ紙ヲ能ク
揉ミテ二重ニ疊ミ其中へ石灰ヲ入ル、一布團ニ錦
絮ヲ入ル、カ如クニシ急ニ創口ニ當テ其上へ按定
巾ヲ置キ緊ク繃帶ヲ施スヘシ石灰ヲ止血ニ用フル
一古方書ニ出タレ紙ニ入レテ用フルハ予ガ新工
夫ナリ腹創ニテ腸ノ脱出シタルハ腸腹上一面ニ屈
盤シテ創口ノ知レカスルモノナリ入レヤウトスレ
ハ呼吸ニ從テ却テ出テ、止ス容易ニ入ラヌモノナ
リ世醫窮シテ創口ヲ切廣ケ或ハ腸ヲ刺テ縮マシメ

入ル、ノ法アリ少シニテモ切廣ゲテハ拙キナリ
 聖濟總録ニ小麥三升。用水九升。煮取汁五升。以綿濾過。
 候冷含噴瘡上。漸入。以冷水噴其背。不令病人知亦可。不
 可使傍人語。卒然急噴其腸自入トアリ此方如何サマ
 思白シ少シク出タルハ效アル可キ様ニ思ヘ凡多ク
 出タルハ此等ノ法ニテハ中々入ヘカラズ納腸ノ法
 右手ヲ腸ト腹皮トノ間ニ入レ創口ニ到リ食指ト拇
 指トヲ以テ腸ノ本ヲ撮ミ徐々ニ送り込可シ若シコ
 レニテ入カヌル寸ハ左手ノ食指ヲ添テ助ル寸ハ容
 易ク入ルモノナリ手ヲ創口ヘヤラントスル寸ハ腸
 却テ出ル氣味アリ恐レテ猶豫人

ル腸出ル寸ハ創口ノ疼ムノミナラズ或ハ腹痛マ
 ルトアリ内ヘ入テモ又腹痛スルトアリコレハ風寒
 ニ襲レテ發スルナル可シ本論ニモ云フ通り大抵ノ
 創ニテ腸ヘ創ノ附トナシ若シ創附テモ少々ニシテ
 切貫又ハ其儘推込テヨシ腸モ切貫ルホトノ大創十
 レバ先難治ナリ腸ノ縫法ハ常ノ如ク縫合セ絲ノ兩
 端ヲ互ニシテ一ツ結び其次ハ膝結ニムスビ引キテ
 解又一端ハ結タル際ヨリ切ステ引ハ解ル一端ヲ創
 外ヘ出シ創ノ愈タル頃ニ糸ヲ抜キ去ルベシ喉嚨ノ
 創ハ皮バカリ縫合シタルニテハ氣息滿テ呼吸ノ度

ニ皮ノ扇テナラヌモノナレバ鍼ヲ喉龍ノ軟骨ヘ掛テ縫合セ氣道モ皮ト共ニ吻合スル様ニスベシ耳郭ノ創ハ肉ノ薄キ處ユエ常ノ如ク縫テハ創口ノ齟齬スルモノナリ先ヅ一鍼ハ耳側ヲ堅ニ縫合セテ桶ヲ合セルニ合釘ヲ刺ス意ノ如クニシ餘ハ常ノ如ク横ニ縫ナリ鼻孔ノ創モ耳ト全様ニテ齟齬シ易ク又四ミ易キモノナリ是ハ常ノ如ク縫合テ后綿布ヲ卷テ筆管ノ大サニ造リ鼻竇ノ中ヘ挿入スベシ初ハ雞蛋白ニ浸シ后ニハ前衝ヲ塗テ用フベシ肩髑ノ創ハ本論ニ述ル通り手ニ引カレ創口開キテ附著シ兼ルモ

ノナリ隨分鍼ヲ深ク貫キ糸ノ間ヲ近ク縫フヘシ蛋白金公綿布及ビ先鋒ヲ貼シテ后絆瘡膏ヲ用ヒ其上へ繃帶ヲ施スヘシ

金創主治方

金公水 和蘭方 解_ス 焮_ス 熱_ス 消_ス 腫_ス 痛_ス

青金糖 一錢 新汲水 十錢

青金糖

鉛丹 蒸露醋 各適宜

右二味入瓶内安暖所時時攪勻數日至其醋變甘澄定取上醋濾過入鍋内微火煎待面結腰膜下火置冷所

候凝固。取乾用。其餘液再微火煎如始。凝固日乾貯。


人參湯傷寒論 獨參湯外科正宗 苓桂朮甘三黃合方

人參調榮湯 左突 先鋒 前衝 破敵 雞卵


火酒

Blank columns for text on the right page.


創形一字縫法圖




創形十字縫法圖




創形門字縫法圖



創形川字縫法圖



創形人字縫法圖




唇創縫法圖



鼻創縫結之後卷綿布以入孔中




眼臉創縫法圖



腸創縫法圖



耳創縫法圖



金創繃帶法并圖

繃帶法和蘭ノ傳フル所本邦諸家ノ製スル所各異同アリ金創ハ急卒ノ者ナレハ其法簡便ヲ尊テ迂遠ヲ賤ス予ハ諸家ノ法ヲ折衷シテ簡便ヲ專要トス

頭顱帶 頭顱及ビ額ノ創ニ用フベシ

一幅ノ綿布ヲ長サ三尺ニ切り兩端ヲ各三裂スル

一尺許リ左右六帶トナシ中央ヲ百會ニ當テ六帶ヲ

左右ヘ下ケ後ノ兩帶ヲ前ニ廻シ天庭ニテ結束シ前

ノ兩帶ヲ後ヘ廻シ項窩ニ至テ結束ス

後部ノ帶ノ結束ヲ覆ヘ藏スベシ中央ノ兩帶ハ捻リテ繩ノ如クニシ

耳前ヲ過キ領下ニ至テ結束ス

又一法 主用前帶ニ同シ

綿布ノ幅一寸五分許リ長サ三文許リ甲端ヨリ卷テ

中央ニ至リ又乙端ヨリ卷テ中央ニ至リ甲端ハ乙端ヨリ三尺モ

多ク卷ク可シ左右兩軸トナス先ヅ中央ヲ天庭ニ當テ甲帶

ハ病人ノ左ノ耳上ヲ過テ項窩ニ至リ乙帶ハ右ノ耳

上ヲ過テ同ク項窩ニ至リ甲乙相合シ左右ヘ取違テ

緊シク引キ乙帶ハ上行シ百會ヲ過テ山根ニ至テ置

キ甲帶ヲ以テ又左ノ耳上及ビ乙帶ノ上ヲ過テ右ノ

耳上ニ至テ置キ乙帶ヲ折カヘシテ上行シ百會ノ左

側ヲ過キ項窩ニ至テ置キ甲帶ヲ以テ乙帶ノ上ヲ過

テ左ノ耳上ニ至テ置キ乙帶ヲ折カヘシテ上行シ百

會ノ右側ヲ過キ山根ニ至テ置キ甲帶乙帶ノ上ヲ過

テ右ノ耳上ニ至テ置キ甲帶乙帶互ニ如此スルテ六

七回ニ及フ可シ乙帶ヲ施ステ前後互ニ一左一右ス

二行ハ初行ヘ半分カケ三行ハ二行ヘ半分カケ次第

ニ左右ノ耳邊ニ下リ頭ヲ全ク裹盡スニ至ル乙帶ノ

一行スル度ニ甲帶ハ乙帶ノ上ヲ一周スルナリ裹盡

シテ後ハ又乙帶ヲ項窩ニテ折反シ再ビ上行シテ百

會ヲ過リ山根ニ至リ甲帶又其上ヲ一周シ又乙帶ヲ

折カヘシテ項窩ニ至リ乙帶ヲ用ヒ盡シ甲帶ハ前ノ
 如ク頭ヲ二三周シ端末ヲ裂テ兩帶ト為シテ結束ス

頭顛帶圖



頭顛帶乙法圖



顛顛帶 顛顛ヲ截タル創ニ用フヘシ

綿布ノ幅一寸五分許リ長サ一丈四尺許リ甲端ハ三分ノ二ヲ卷キ乙端ハ三分ノ一ヲ卷テ兩軸トナス假令ハ創左ニアル寸ハ帶ノ中央ヲ右ノ顛顛ニ當テ甲軸ハ額ヲ過テ左ノ顛顛ニ至リ乙軸ハ項ヲ過テ亦左ノ顛顛ニ至テ相合シ甲乙取違テ顛顛上ニテ十字形ヲナシ甲軸ハ下行シ領下ヲ過テ右ノ顛顛ニ至リ乙軸ハ上行シ顛頂ヲ過テ亦顛顛ニ至テ相合シ甲乙取違テ十字形ヲナシ甲軸ハ下行シ領下ヲ過テ左ノ顛顛ニ至リ乙軸ハ上行シ顛頂ヲ過テ左ノ顛顛ニ至リ

相合シ甲乙取違テ前ノ十字形ヲナス側ニ於テ亦十字形ヲナシ乙帯ハ額ヲ過キ項ニ至ル帶餘ル寸ハ此ニテ斷シ去ル可シ甲軸ニテ其上ヲ二三周シ餘リタル端ヲ裂キ兩帶トナシテ結束ス

顛額帶

顛額帶

顛額帶

顛額帶

顛額帶

顛額帶

顛額帶圖



咽喉帶 咽喉ノ創ニ用フベシ

一幅ノ綿布ヲ三尺ニ切り豎ニ四重ニ疊ミ先ツ乙端ヲ項ニ當テ甲端ヲ把テ頸ヲ卷ク一ニ三匝別ニ一帯長サ五尺許リ一端ヨリ卷テ一軸トナスヲ以テ其上ヲ環周シ盡テ端末ヲ裂キ結束ス

咽喉帶圖



肩羈帶 肩羈缺盆等ノ創ニ用フベシ

綿布ノ幅一寸五分許リ長サ三丈許リ一端ヨリ卷テ
 一軸トナス假令ハ創左ニアル寸ハ手帕テヌ横ニ折リ又
 折シテ以テ左ノ腋下ニ置キ帶ノ一端ヲ右ノ腋下ニ
 當テ軸ハ胸ヲ斜ニ上テ左ノ肩ニ至リ從テ腋下ニ下
 リ再ビ左ノ肩ニ上リ背ヲ斜ニ下テ右ノ腋下ニ至リ
 又胸ヲ斜ニ上テ左ノ肩ニ至リ腋下ニ下リ再ビ左ノ
 肩ニ上テ背ヲ斜ニ下リテ右ノ腋下ニ至ル如此ル
 一凡ソ六廻右ノ腋下ヨリ肩ニ上ル寸初帶ヨリ次帶
 ハ微シツ、下テ肩羈ヲ覆ヒ盡ス様ニスルナリ六廻

終テ後ハ右ノ腋下ヨリ胸ヲ横ニ過テ左ノ腋下ニ至
 リ背ヲ横ニ過テ又右ノ腋下ニ至ル一ニ三周ニシテ
 甲端ヲ裂テ結束ス

肩鞆帶圖



肩背帶 肩背ノ創ニ用フヘシ

帶ノ尺寸卷裁ノ法前帶ニ同ジ手帕ヲ前法ノ如クニ
 折テ左右ノ腋下ニ置キ一端ヲ右ノ腋下ニ當テ軸ハ
 斜ニ背ヲ過テ左ノ肩ニ上リ腋下ニ下リ再ヒ斜ニ背
 ヲ過テ右ノ肩ニ上リ腋下ニ下リ又斜ニ背ヲ過テ左
 ノ肩ニ上リ腋下ニ下リ再ヒ斜ニ背ヲ過テ右ノ肩ニ
 上リ腋下ニ下ル如此スルヲ凡ソ五廻初帶ヨリ次帶
 ハ微シク下テ牡鷄羽ニ合スルナリ五廻終リテ後右
 ノ腋下ヨリ右ノ肩ニ上リ斜ニ胸ヲ過テ左ノ腋下ニ
 至リ左ノ肩ニ上リ胸ヲ斜ニ過テ右ノ腋下ニ至リ背

ヲ横ニ過テ左ノ腋下ニ至リ胸ヲ横ニ過テ右ノ腋下ニ至ル一二三周ニシテ餘リタル端ヲ裂テ結束ス

架肘帶 患手ヲ護シテ動搖セサル為ニ用フ

綿布一幅ニテ長サ四尺五寸許リニ切り豎ニ四重ニ疊ミ兩端ヲ結び合セテ輪ト為シ頸ニ掛ケ胸へ下ケテ患手ヲ輪中ニ擔閣ヘシ肩髑帶或ハ肩背帶ヲ施シテ後ニ此帶ヲ加フベシ

肩背帶圖



架肘帶圖



胸脇帶 胸脇腹腰ノ創ニ用フヘシ

一幅ノ綿布ヲ長サ八尺ニ切り横ニ二重ニ折り又豎
 ニ二重ニ折り帶ノ中央ヲ脊椎ニ當テ右端ヲ以テ胸
 ヲ覆テ左ノ腋下ニ至リ左端ハ右端ノ上ヲ覆テ右ノ
 腋下ニ至リ別ニ一細帶ヲ以テ本帶ノ上下ヲ一周
 シテ結び又別ニ一細帶ヲ以テ頸ニ掛ケ前ノ細帶ニ
 組附テ結束スベシ

胸脅帶圖



陰囊帶 囊創及ビ囊癰等ニ用フヘシ

綿布半幅ヲ長サ三尺ニ切り豎ニ四重ニ疊ミ姑ク記
 シテ甲帶ト名ク別ニ綿布半幅ヲ長サ三尺ニ斷テ横
 ニ折テ二重ト爲シ姑ク記シテ乙帶ト呼フ乙帶ヲ甲
 帶ノ中央ニ繫ケテ丁字ノ形ト爲シ先腰ニ當テ甲帶
 ノ兩端ヲ臍下ヘ廻シテ結ビ乙帶ハ二重ノ儘ニテ鹽
 梅空ク陰囊ヲ裹ミ陰囊ノ際ニテ裂テ兩端ト爲シ左
 右各甲帶ニ掛テ結束ス

陰囊帶圖



面目帶 耳目口鼻ノ創ニ用フベシ

綿布ノ幅二寸長サ二尺餘リニ切り兩端ヲ裂テ左右
四端ト為シ帶ノ中央ヲ面部ニ當テ四端ハ項上ニテ
左右上下ヲ互ニシ斜ニ十文字ヲ成スヤウニ結束ス
ヘシ

四肢帶 手足ノ創ニ用フヘシ

帶ノ幅一寸七分長サ處ノ肥瘦創ノ大小ニ應シテ製
シ一端ヨリ卷テ一軸トナシ先ツ創ノ側ヲ卷ク一ニ
三周ニシテ斜ニ卷テ少シツ、重子創上ヲ覆ヒ盡シ
テ後端末ヲ裂テ結束ス

面目帶圖



面目帶

其目口鼻入腫...

四肢帶圖



其二圖



絆創膏 肩髑胸背等凡ソ創口^ハ圻^キ易キ部位ニ施

スベシ

綿布ヲ創ノ大小ニ應シテ切り疊ミ二重ト為シ綿絲
 ニテ四圍ヲ縫ヒ又中ヲ斜ニ十字ニ縫ヒ一方ニ長
 サ三寸許リニ絲ヲ著ルナリ絲ノ數ハ創口ヲ縫ヒタ
 ル絲ニ準ス甲乙ト二片ヲ製シ各偏面ニ遊奕ヲ厚ク
 攤^タ創ノ兩傍ニ貼シ甲乙ノ絲ヲ合セテ結束ス

兔缺縫合并繃帶圖



兔缺

兔缺ノ名ハ病源候論ニ出ツ淮南子ニハ缺脣ト云ヒ
 博物志ニハ脣缺ト見ユ本邦ニテハ「イク子トモ又ハ
 ズク子トモ云其形狀ノ兔脣ニ似タルユエ兔缺ト名
 ケタルナルベシ妊娠ノ時ニ兔肉ヲ食ヒ或ハ兔ヲ見
 ル寸ハ其兒必ス缺脣ヲ患ルト漢ノ頃ヨリ説來レ氏
 信用ス可ラス一説ニ兒胞衣ノ内ニ在ル寸居様アシ
 クシテ自ラ爪ヲ當テ裂ルト云フハ尤無稽ノ言トス
 此ハ駢拇枝指ナト、同様ニテ自然ニ生レ附モノナ
 リ青柳村ニ兄弟四人兔缺ニ生レタル者アリ此症人

中ノミ裂ケ鼻下ニテ止リタルハ至テ輕症ニテ治シ
 易シトス或ハ鼻孔ノ内ヘ裂ケ込モアリ或ハ齶肉及
 ヒ上腭マテ裂モアリ或ハ人中ノ側左右二筋ニ裂ル
 モアリ或ハ齒牙ノ突兀ト聳出テ療治ヲ施シ惡キモ
 ノアリ術ヲ施スニハ二三歳ヲ尤良トス初生ト成人
 トハ療治ニ宜シカラズト云フ説アレド予ハ初生ヲ
 モ二三歳ノ者ヲモ數療治スルニ又妨ルナキヤ
 ウニ覺ユ○治法一人ノ价者ヲシテ患兒ヲ膝ニ載テ
 抱カシメ又一人ノ价者其後ヨリ兩手ヲ以テ兒ノ頭
 ヲ緊ク持又二人ノ价者ヲシテ左右ヨリ兒ノ手足ヲ

緊ク持シメ少シモ搖クナラヌ様ニシテ術ヲ施
 ス可シ其術鑊様剪刀ヲ把テ兒ノ正面ニ坐シ唇ノ缺
 タル止リト齶肉ト相附著シテアルモノナレバ先ヅ
 此處ヲ剪リ離シ次ニ兒ノ右側ニ居ナヨリテ唇ノ缺
 タル左邊ヲ剪ミ又左邊ニ居ナヨリテ右邊ヲ剪ミ
ウ至テ功者ノ入ナリ剪ヤウ宜シカラザル寸ハ愈
 テ後創口ノ齶齶スルアリ先ヅ鑊子ニテ唇ヲ挾ミ
 血ノ出ヌヤウニシテ赤白分肉ノ處ヨリ截ルベシ表
 ヲリ裏ヲ心持多ク截ル様ニ鹽梅スベシ左邊ヲ剪テ
 後モ鑊子ヲ去可ラズ又別ノ鑊子ニテ右邊ヲ挾ミ前
 法ノ如ク剪ル寸ハ血出ズシテ術ヲ施スニ大ニ便宜
 ナリ一先火酒ニテ洗ヒ左指ヲ左唇ノ下ヘ入置キ鍼ヲ
 左唇ノ中央ヘ刺テ缺タル處ヘ貫キ再ビ右唇ノ裏ノ

中央ヨリ刺テ外へ貫キ又火酒ニテ洗ヒ糸ヲ結束ス
 又左脣ノ鼻ト中央トノ間ヲ刺テ脣ノ裏ニ貫キ再ビ
 右脣ノ鼻ト中央トノ間ヲ裏ヨリ刺テ外へ貫キ又火
 酒ニテ洗ヒ糸ヲ結束ス又左脣ノ中央ト口トノ間ヲ
 刺テ脣ノ裏へ貫キ右脣ノ中央ト口トノ間ヲ裏ヨリ
 刺テ外へ貫キ又火酒ニテ洗ヒ糸ヲ結束ス第三針ノ
縫法先師
遺教ナレモ此法ニテハ人中ノ端附著シ難ク愈テ
後微ク夾ルモノナリ予ハ新工夫ニテ左脣ノ赤肉ヨ
リ刺テ半月ノ如ク兩脣ノ肉中ヲ貫キ右脣ノ赤肉ハ
通シ其鹽梅桶ノ合釘ヲ刺様ニシテ糸ヲ結束スルニ
創口好吻合シテ微針ハ創口ヨリ三四分モ離レテ刺
シモ斧鑿ノ痕ナシ
 ス可シ火酒ノ温メヨウ及ビ止血ノ法金創ノ治療ニ

同シ縫終テ後又火酒ニテ脣ノ内外ヲ清淨ニシ極末
 ノ無名異ヲ雞子白ニテ硬ク煉リ合セ創ノ内外ニ塗
 ル可シ外へハ別シテ厚ク塗り乾ク寸ハ又塗ル一
 日三四次ニ及フ可シ藥末乾固シテ石ノ如クニ成リ
 決シテ創口ノ離ル、フナシ即缺脣ノ絆創膏ナリ無
 名異ヲ貼シテ後保護ノ繃帶ヲ施ス可シ其法先ツ細
 帶ヲ作り頭ヲ一周シテ抹額ノ如クニシ項窩ニ至テ
 結束ス其端末上行シ百會ヲ過テ鼻上ニ垂レ置キ別
 ニ綿布ヲ幅二寸長サ四寸ニ切り折テ二寸四方トナ
 シ鍼糸ヲ以テ南隅ヨリ東隅ヲ縫ヒ廻シテ北隅ニ至

リ糸ノ端六七寸モ殘シ置キ別糸ニテ又南隅ヨリ西隅ヲ縫ヒ廻シテ同ク北隅ニ至テ兩糸相合ス如此キ綿布ヲ製スルコト二片此上へ遊奕ヲ一圓ニ攤テ糸ノ附タル一隅ヲ人中へ對スル様ニ兩頬ニ貼シ左右ノ糸ヲ把リ人中ノ上ニテ引違チカヒ一重ニ結ビ其兩端ヲ揃テ一條トシ鼻上ニ上リ頭ヨリ垂タル細帶ト合セテ結束ス療治ノ濟テ後ハ看病ヲ肝要トス創ノ附ト不附トハ一夜ノ中ニ在リ若シ其時ニ不附トキハ幾日ヲ過テモ附コトナシ啼笑飲食等ニテ脣ヲ動スモ附著ヲ妨ルモノナレバ終夜眠ラスニ保護スベシ初生

ハ二日程ハ乳哺ノ禁シ三日ニ至テ乳ヲ絞リ蛤殼ニテ汲入ベシ二三歳以上ノ者ハ稀粥ヲヒニテ舌本へ送り入レ脣ノ動カヌ様ニスベシ次日ニ至テ繃帶ニルム寸ハ价者後ヨリ兩手ヲ以テ兩頬ヲ推寄セテ結ビ改ベシ第三日第四日ハ其儘ニ置キ唯糸ノ緩急ヲ斟酌スベシ第五日ハ紫雲ヲ綿片へ存分ニノベ貼ス是ハ無名異ヲ潤ス為ニ用フルナリ第六日ニ至テ鯨篋ニテ無名異ヲ刮去リ前衝ヲ綿片へ攤テ貼ス第七日ニ至リ絲及繃帶ヲ去リ前衝ヲ創口へ貼シ別ニ遊奕ヲ綿布へ攤前衝ノ上ヲ一文字ニ蓋ヒ貼スベシ○

小兒五歲以下ハ麻沸湯ヲ用フルニ及ハズ六七歲以
上ハ麻沸湯ヲ用フ可シ幼少ノ者ハ急ニ瞑眩シテ醒
ガタキモノナリ二三日モ人事不省ニシテ狂躁スル
コアリ故ニ服法ヲ謹慎ニスベシ十歲ヨリ十五歲マ
テハ麻沸湯煎汁ハ勺ヲ與ヘ六歲ヨリ十歲マテハ五
勺ヲ與フ可シ此服法ニ依テハ假令瞑眩甚シキモ死
スルコト決シテナシ

兔缺主治方

無名異 雞卵 火酒 前衝 紫雲

