

瘍科秘録

八之上

武
407
9



門 中武
籍 407
卷 9

瘍科秘錄目錄

卷八

淋

淋漏

臟毒

帶下

聾耳

腦漏

頭痛

衄血

方

目次

自註

喉痺

痰泡

重舌

木舌

鵝口瘡

燕口瘡

牙疳

附牙癰

齧齒

體氣

癆科秘錄卷之八

水戸本間玄調和卿著

淋 淋漏

淋ハ素問ニ出ツ六元正氣論ニ小便黃赤甚則淋ト云
 又其病淋ト有リテ淋モ又古名ナリ世醫多クハ瘰ヲ
 古名トシ淋ヲ後世ノ名ト心得テ居ルハ夏蟲ノ見ト
 謂フヘシ此病ハ常ニ酒肉膏粱ニ飽モノニ多シ病因
 ヲ考窮スルニ尿道中へ潰瘍ヲ生シ遂ニ糜爛テ膿血
 ヲ出スナリ初發ハ尿道ノ中微ク痒ク小便熱シテ甚
 澀ルナリ二三日ヲ經レハ尿道熱痛シ膿血雜出シ小



便澁滯淋瀝シテ頻數ニナリ兔角迹へ殘ル氣味ニテ
 永ク廁ニ居リ今歸リテモ又直ニ行キタクナリ小便
 少シ溜リテモ急ニ便心ヲ催シ廁へ行クモ間ニ合ヌ
 程ニナリ其情態痢疾ノ裏急後重スルニ似タリ劇者
 ハ惡寒發熱アリ尿口及ヒ皮へ腫ヲ起シ透明テ水泡
 ノヤウニナリ腿夾縫へ核ヲ結フ丁便毒ノ初起ノ如
 シ毒ノ淺キモノハ小便ノ時ノミ痛ミテ常ニハ痛マ
 ス毒ノ深キモノハ小便ノ時ハ勿論常ニモ痛ムナリ
 又其毒少腹マテ波及シテ急痛シ宿疾ニ痔ノアルモ
 ノハ必ス發シテ併病スルモノナリ或ハ小便ノ閉テ

通セサル丁アリ常ノ小便閉ハ小便ノ一杯ニ溜ル迄
 ハ苦痛ハナキモノナレ氏淋ノ小便閉ハ少シ溜リテ
 モ便心急ニナリテ忍フ丁能ハス反覆顛倒シテ苦腦
 スルモノナリ小便閉ハ久淋ニ特ニ多シ私臆度スル
 ニ尿道中ノ糜爛タル處へ息肉ヲ生シテ尿道ヲ閉塞
 スルモノナルヘシカテイテ此ヲ挿シテ一旦通スレ
 氏又閉テ一滴モ通セス丁アリ此證へハ數カテイテ
 ルヲ挿サレバナラヌモノナリ是ハカテイテ此ニテ
 小便ヲ取リタル跡へ紙撚子ニ紫雲ヲ塗リテ尿道へ
 挿シ置キ小便ノ時ハ抜き去リ又跡へ挿シ置ク時ハ

再カテイテ此ヲ用フルニ及ハス至テ捷徑ノ法ナリ
 詳ナル丁ハ小便閉ノ門ニ出ツ陰莖及會陰等總テ尿
 道ノ通りハ核ヲ結フ丁大サ豆ノ如ク或ハ銃丸ノ如
 クニシテ痛ムハ淋漏ノ催シナリ尤モ恐ルヘシ遂ニ
 ハ大ニ腫レ出シテ焮熱疼痛シ小便モ秘澁ニナリ惡
 寒發熱シテ舌上黑胎ヲ生シ飲食モ進マズ大ニ苦痛
 シテ膿ニ化スルナリ鍼ヲ刺シテモ自カラ潰テモ漏
 ニナリテ小便ノ瘡口ヨリ滴瀝スルヤウニナルナリ
 本尿道中ノ毒ノ尿道ヨリ出テ間ニ合ハスシテ發ス
 ルモノユヘ孔ノ尿道へ貫テアルモノナリ小便ノ常

ニ漏ル、モノユヘ瘡口愈カ子ルナリ全ク愈カ、ル
 寸ハ是迄漏レ来リタル小便ノ行キ所ナクナルユヘ
 又外へ腫レ出シテロニナリ幾箇所モ漏ニナリテ會
 陰ノ邊ハ勿論陰囊マテモ孔ヲ穿テ頑固シテ巖石ノ
 如クニナリ其漏口ヨリ稀膿小便等滴瀝トシテ禁セ
 ス酒肉等ヲ過飲放食スレハ乍腫痛ヲ發シ百計スレ
 疔全愈セス終身ノ沉痾ニナルモノナリ或ハ小便但
 瘡口ヨリ出テ、尿口ヨリ出テス瘡口漸愈カ、ル寸
 ハ狹窄ニナルユヘ小便絲ノ如ク出テ、思フヤフニ
 出テス更衣タヒニ努力カシテ苦シムモノアリ淋漏ハ

痔漏ヨリモ治シ難キモノナリ婦人ノ淋ヲ俗ニ消渴
ト呼ヘ凡消渴ハ咽ノ乾ク病ニテ淋ノ了ニ非ス金匱
ノ八味丸ノ條ニ消渴小便不利ト云ヒタル文ヲ讀ミ
誤リテ消渴ヲ小便淋瀝ノコト、心得タルナルベシ
婦人モ男子ト同シ了ナレ凡子淋トテ妊娠ノ内ニ患
フルハ至テ治シ難シ胎ニテ膀胱ヲ壓スユヘ別シテ
小便頻數ニナリ疼痛溢滯モ甚シク痛ミ腰腹ヘ引キ
腰ヲ伸テ歩行スル了能ハス夜ハ特ニ小便頻數ニナ
リ小便免角殘リテ便心絶ス長ク廁ニ居テ冷ルユヘ
疼ミ愈ツヨグ膿血モ多ク出ルナリ世人淋ヲ小患ニ

心得多クハ其儘ニ捨置疼ツヨキトキハ姑息ニ賣藥
等ヲ用フルノミ若シ久シク愈サルトキハ虚脱シテ
勞状ニナリ或ハ水腫ヲ發スル了アリ假令死セス凡
病身ニナリテ生涯ヲ送ルモノアリ或ハ他病ヲ併病
シテ死スルモノアリ小患ト侮リテ捨置ベカラズ諸
書ニ五淋ノ目ヲ載ス是モ五瘤五痔ノ類ニテ五臟ニ
配當シテ建タル名ナルヘシ約ニシテ視ルトキハ二
三淋ニテ是レリ若證候微ノ差ヲ別ツトキハ五淋ニ
テモ是ラス七八證モアルナリ五淋ノ中ニテ石淋ト
云アリ金匱ニ淋之為病小便如粟状ト云タルハ即石

淋ノ一ナリ已ニ醫宗金鑑ニ今所謂石淋也ト注セリ
 和蘭家者流ニテハ結石ト云即溺^{ニヨクベシ}溜^シノ凝タルニテ齒^ハ
 塗^{ニホ}ノ凝結スルト同様ナリ真ノ石ニハ非ス細ナルモ
 ノハ小便ニ雜リテ出レ^レ大ナルモノハ膀胱ノ下口
 或ハ尿道中へ留^ト礙^カテ小便ヲ閉ルトキハ大ニ苦痛シ
 テ悶絶セントスルニ至ル努カシテ通スルトキハ頓
 ニ愉快ヲ覺ユ結石碎テ細ナルハ剃^{カミ}刀^{ツリ}砥^トヲ碎キタル
 ヤウナルモノナリ大ナルハ固結シテ棗核杏仁ナト
 ノ如ク一箇ノ石ニナリテ稜角ノアルモノナリ常ニ
 ハ小便能ク快利シテ痛モナク但石ノ滯リタルトキ

ノミ苦痛スルモノナリ此證ハ膀胱中へ結石ノ出来
 ル病ニテ尿道ニハ滯ノナキモノナリサレハ病根ハ
 淋ト異ナルモノナルベシ血淋ハ小便ノ前後ニ鮮血
 滴瀝ト出テ澁滯刺痛スルナリ或ハ凝結シテ魚腸ノ
 腐リタル様ニナリ陸續ト出ル^トアリ初ヨリ血淋ヲ
 患フル者ハ少シ多クハ膿淋ニテ血淋ヲ併病スルモ
 ノナリ一種尿血ト云モノアリ血淋ニ疑^イ似^シキモノナ
 リ世醫多クハ血淋ト心得テ居ルナリ血淋ハ痛ミア
 リテ血ノ出ル^ト少シ尿血ハ痛ミナクシテ血ノ出ル
 ト多シ一次ニ二三合モ出ル^トアリ或ハ瘀血尿道中

へ凝滯シテ小便閉ヲ患フルヲアリ至テ治シ難キモノナリ一旦治シテモ必ス再發ス久シク愈サルトキハ脫血シテ面色萎黃唇舌刮白虚里動悸氣急脚弱等ノ諸證ヲ發シ黃胖ノ如クニナルナリ此證ハ産後及ヒ脉痔或ハ衄血ノ後ニ黃胖ノ状ヲ成スト同因ニテ真ノ黃胖ヨリモ治シ難シ遂ニ水腫ニナリテ死スルモノ多シ恐ルベキ證ナリ膏淋ノ初ハ小便白濁ナリ其中へ粘液ノ凝テ桃膠ノ如クナリタルモノヲ雜へ下スナリ又肉ニモ似タルユハ肉淋トモ云病因ヲ考究スルニ疝ニ屬シテ實ニ淋ニ非ス粘液數尿道中

へ閉塞シテ小便澁滯淋瀝スルユハ淋ト為シタルモノナルベシ一耕夫小便白濁ヲ患フル丁年餘白濁愈テ後適小便セント欲スルニ何カ尿道へ塞リテ小便一點モ通セス苦シキユへ急ニ廁ニ上リ強テ努カニ葛粉ニテモ煉リタルヤウノモノ凝テ丸ク大サ雀卵ノ如クニナリ逆リ出ツ指ニテ碎ミルニ粘アリ後ニハ常ニナリテ小便ノ毎ニ塞リテ難澁セシモノアリ即膏淋ナリ桃膠ノヤウナルモノ、出ル者ハ多ケレ氏丸ク一箇ノ球ニナリテ出ルハ珍シキ事ナリ氣淋ハ膿血膏石等ノ物ハ出テス但便心頻數ニシテ數廁

ニ行キ夜ハ寐間モナキヤウニ至ルモノアリ小便ノ
 仕舞キハニ餘瀝滯滞シテ微痛スルナリ一體カ虚證
 ニ属スルモノナリ若シ久シク愈サルトキハ膀胱尿
 道共ニ衰弱シテ約アシクナリ便心ヲ催ストキハ廁
 ニ行クモ間ニ合ハスシテ途中ニテ遺又咳嗽ヲシテ
 モ遺スヤウニ至ルモノナリ稟賦虚羸ノ人及ヒ老人
 婦女子ニ多シ初發ヨリ氣淋ヲ患フルモノニ非ス膿
 淋血淋等ヲ數患ヒテ後ニ氣淋ニ變スルモノナリ此
 證モ疝ニ係ルモノ多ケレハ能病因ヲ熟察スヘシ○
 治法第一ニ酒肉房室ヲ禁断シ漫步兼行ヲナスベカ

ラズ至極ノ重證ナラハ斷塩スベシ何程藥餌ヲ服ス
 ルトモ養生ト禁忌ヲ謹マサレハ愈ルナシ稠膿ノ
 多ク出テ、痛ノツヨキモノニハ龍膽瀉肝湯ニ鷄殼
 應鐘散ヲ兼用トスベシ効ナキトキハ小解毒湯ヲ與
 ベシ皮マテ腫テ水泡ニナルモノハ猪苓加大黃湯効
 アリ刺痛ニ堪カタキモノニハ小建中湯ヲ與フベシ
 若シ効ナクンハ阿芙蓉液三ヲ用ユベシ砂糖湯雞
 卵湯葛粉湯ノ類ヲ多ク飲トキハ小便快利シテ微シ
 ク愉快ヲ覺ユルモノナリ全ク姑息ノ法ナレトモ已
 ニ勝レリ淋ハ一體尿道中ノ瘡瘍ニテ内藥ノ利カ子

ルモノナリ外へ出タル所ナラハ直ニ愈ベキモノナ
レトモ尿道中ニテ常ニ濕リ又小便ノ數通ル所ユヘ
愈カ子ルナリ故ニ新舊共ニ膏藥ヲ紙燃子ニ塗テ尿
道中へ挿入スルヲ第一ノ良法トス痛ノツヨキハ熱
雲ニ宜シ毒ノ深キハ破敵ニ宜シ瘡ヲ愈スニハ中黃
ヲ用フヘシ日數過多ニ及ヒ膿漸減シテ薄クナリ痛
モ微ク退キ荏苒トシテ愈サルモノニハ腎氣丸補中
益氣湯ヲ撰用スヘシ凡久淋ハ下元不足ニナルモノ
ナレハ瀉火利水ノ劑ヲ久服スルヲ宜シカラス久淋
ニ神効ノアルハ「テレメン」テイ油ナリ一味ヲ五分ツ

ツ白湯ニテ毎日用フヘシニ廻リモ用フルトキハ必
ス奇驗アリ小便閉ハ第一ニ「カ」テイテ「ル」ヲ挿入シ證
ノ虚實ニ随テ猪苓加大黃湯ハ味丸等ヲ撰用スヘシ
淋漏ハ至テ治シ難キモノナリ先ツ瘡口へ「彎測子」ヲ
挿シ坑ニナリタル處ハ「剪刀」ニテ剪坑ノ間ノ遠ク隔
リタル處ハ線ニテ緊紮スルヲ痔漏治法ノ如クニシ
逐一坑ヲ剪ミテ創口ヲ一ツニシ破敵ヲ綿片ニ攤テ
入レ瘡口漸狹窄ナルトキハ紙製紐ニ破敵ヲ塗テ挿
入ス時々赤汞油ヲ挿テ瘡口ヲ微ク開大テ永ク膿ノ
出ルヤウニスベシ膿永ク出ルトキハ「凝結」モ自ラ消

散スルナリ尿道へハ破敵ヲ紙撚子ニ塗テ深ク挿ス
ヘシ尿道ノ通りヲ好クシ小便快利スルトキハ小便
自ラ漏口へ廻ラヌマウニナルナリ潰ヌ前ハ大黃牡
丹皮湯加薏苡仁宜シ潰テ後モ暫ノ間ハ前方ヲ與フ
ヘシ久漏ニナリタルハ八味丸新加薏苡仁ナリ龍膽
瀉肝湯清肝滲濕湯大解毒湯等ヲ撰用スベシ石淋モ
沉痾ニナリテ愈カ子ルモノ多シハ味丸烏苓通氣湯
聖惠方ノ琥珀散ヲ撰用スヘシ結石尿道へ滯リタル
トキハ指ニテ徐々尿口ノ方へ推シ出スベシ又努カ
テ自ラ小便ト共ニ出ルナリ又カテイテルヲ挿シ

消息シテ出ルナリ百計ニシテ出サルトキハ尿道
ヲ割テ結石ヲ取ルヨリ外ノ手段ナシ然レトモ療治
拙キトキハ刀口ヨリ小便漏レテ淋漏ノ如クニナル
モノナリ至テ工夫ノ入ル術ナリ結石ノ有ル處ヲ能
摸索シテ尿道ノ脇ノ方ヲ披鍼ニテ切り成丈刀口ノ
小ナルヲ要トス結石ヲ挑ケ出シ尿道へハゴムカテ
イテルヲ挿シ置キ刀口ヲ縫合ス極細キ鍼ニテ小鍼
ニ縫フヘシ跡へハ無名異ヲ雞子白ニテ硬ク煉リ患
處へ傳ケ繃帶ヲ施スヘシ創ノ早ク愈ルヲ緊要トス
小便ヲスルニ刀口ヨリ出ルトキハ愈カタシ小便ノ

時ニハ自カラ患處ヲ緩急適宜ニ握リ小便ノ漏レヌ
 ヤウニ消息スベシカテイテルノ濕テ柔ニナラハ新
 管ニ更換ヘシ又會陰打撲ノ門ヲ參考シテ術ヲ施ス
 ヘシ血淋モ別ニ治法ノ易リタル事ナシ黃連阿膠湯。
 龍膽瀉肝湯。ハ正散猪苓湯ヲ撰用スヘシ多ク血ノ出
 ルニハ犀角地黄湯ハ味丸四物猪苓合方ヲ撰用スヘ
 シ膏淋ハ猪苓湯加大黃ニ宜シ氣淋ハハ味丸ニテ大
 抵ハ治スルナリ若シ効ナキトキハ補中益氣湯ヲ用
 フヘシ疝候アルモノニハ烏苓通氣湯三和散ヲ用フ
 ヘシ一男子淋愈テ已ニ二三年ヲ過キ嚴寒ノ時漁ニ

出テ、身ヲ冷スニ小便心ヲ急ニ催スヲ頻數ナレト
 モ點滴モ通セスカテイテルヲ挿シテ一旦通シタレ
 トモ又閉テ通セス便心急ニシテ悶絶セントスルニ
 至ル又カテイテルヲ用フレトモ又閉ル一日二十
 餘次ニ及ヘリハ味丸ヲ與ヘテ全愈ス川越伊勢屋仙
 松ト云者年三十餘淋ヲ患ヒ一旦愈テ後婚姻ノ賀筵
 へ招カレ大醉スルニ淋再發シテ膿血淋瀝小便澁痛
 遂ニ會陰へ腫レ出シ潰テ漏ニナリ熱痛愈甚シク熱
 スルヲ火燒ノ如ク痛ムヲ錐刺ノ如ク小便ハ日夜滴
 瀝ト出テ續キニテ暫モ絶ツヲナシ若シ僅ニ睡ルト

キハ小便出スシテ熱痛常ニ十倍シ躍テ淨器ニ上リ
 切齒咬ミ大聲ヲ立テ泣ク丁晝夜ニテハ五六回ニ至
 リ眼モ泣爛テ爛臉風ノ如クニナリ微モ身ヲ動ス丁
 能ハス倚リカ、リニナリテ坐スルトキハ又卧ス丁
 能ハス其儘ニテ半年ニ至リ若シ卧ストキハ復起テ
 坐ス丁能ハス其儘ニテ一年ニ及ベリ頗ル富タル者
 ヲへ看病人ヲ給金ニテ傭ヒ四五人宛左右ニ侍シテ
 看病セリ祈禱藥餌等ニ大金ヲ費シ百計ニスレトモ
 寸効ナク幾三四年一日モ快キ丁ナク予モ萬方ニ療
 治シタレトモ功ヲ奏セス後ニハ當人モ手ヲ束テ藥

餌ヲ用ヒス遂ニ法華宗門ニ歸シ但經文ヲ唱フル丁
 二月餘ニシテ自ラ愈タリ是ハ藥餌ノ過劑ニテ却テ
 害ヲナセシカモ知レス今捨置テ治シタルハ所謂不
 醫得中醫ノ意ナルヘシ此ノ通り久シク苦痛セシ丁
 ヲへ死スベキ理ナレトモ思ノ外ニ飲食モ減セス羸
 瘦モ加ヘス脈モ胃氣ノ絶ヌユヘ治シタルナルヘシ
 淋ノ重證モ多ク診シタレトモ如此證ハ初テ療治セ
 シユヘ此ニ記シテ後考ニ備フ

淋主治方

小解毒湯 春林

治莖中下疳。疼痛而膿出者。

遺糧 滑石 皮膠 茯苓 木通

忍冬 澤瀉 大黃

右八味水煎

琥珀散 聖惠 治石淋水道澀滯。頻下沙石宜服。神効。

琥珀 燒酒淬七遍 細研水飛過 桂心 滑石

葵子 大黃 膩粉 木通 木香 各半兩

右為散。每食前葱白燈心湯調下二錢。

朴硝散 經驗良方 治五淋

朴硝 海金砂 皂角 燒存性

右各等分為細末。沙糖并華水調下。

琥珀散 御藥院秘方 治五淋澀痛。小便有膿血。

琥珀 海金砂 沒藥 蒲黃 各一兩

右研為末。每服三錢。食前濃煎萱草根湯調下。

八味丸 小建中湯 黃連阿膠湯 猪苓湯加大黃

猪苓四物合方 犀角地黄湯 千金 補中益氣湯

大黃牡丹皮湯加薏苡仁 烏苓通氣湯 三和散

八正散 龍膽瀉肝湯 大解毒湯 雞殼應鐘散

阿芙蓉液 テレメンテイ油 無名異 破敵

中黃 紫雲 赤汞油 雞蛋白

床蓐ニ就クホトニモナラヌユヘ強テ家業ヲモ勤メ
歩行ヲモシテ居ルウチニ膿血ヲ下ス一愈多ク廁ニ
上ル一愈頻數ニナリ日夜ニテハ四五十行ニ至ルモ
ノアリ裡急後重スル一痢病ノ如ク少腹肛門共ニ刺
痛シ或ハ腰痛シ或ハ小便澁滯シ大便却テ秘結シテ
快通セス下劑ヲ投シテ一旦通シテモ又秘閉シテ難
澁スルモノナリ後ニハ肛門結腫シテ痛ミ遂ニ膿潰
シテ幾ツモ孔ニナリ痔漏ノ様ニナルモノナリ世醫
多クハ痢病ニテ痔漏ヲ併病シタルナリト心得テ居
ル者アリ捧腹スベキ一ナリ荏苒トシテ數月ヲ經ル

ニ及テ諸證漸々ニ加ヘ初テ微シク寒熱ヲ發シ飲食
モ減シ脈細數ニナリ面色萎黃唇舌刮白ニシテ潤澤
ヲ失ヒ遂ニ肉脫骨立シテ死スルナリ或ハ其毒口中
へ上攻シテ牙根腐爛シ齒齦紫暗色ニ變シ穢氣薰蒸
シ走馬牙疳ノ状ニナルモノ有リ裏急後重シテ膿血
ヲ下ス所ハ痢疾ニ疑似キヤウナレトモ痢疾ハ初必
ス惡寒發熱下痢シテ後ニ膿血ヲ下スマウニナルナ
リ臟毒ノ初發ハ寒熱モナク下利モ無ク但膿血ヲ下
スノミナリ然レバ二病自カラ判然トシテ差別アリ
肛門結腫潰膿シテ幾ツモ孔ニナリタル所ハ痔漏ニ

疑似シキヤウナレトモ痔漏ナレバ潰ル寸ハ痛下退
 キ膿モ減シ一旦ハ愉快ヲ覺ユルナリ但膿ノミ出テ
 テ血ハ下ラス臟毒ハ潰テモ痛退カス膿血愈多ク下
 リ且裡急後重等ノ證アレハ是亦二病自カラ判然ト
 シテ分別アリ得ト診法ヲ心得テ誤ルヘカラス腸風
 脈痔等モ同シク下血スル病ナレハ紙上ノ論ノミヲ
 的ニスレハ臟毒ニ混シ易シ腸風ハ腸ノ傷レテ血ノ
 出ルナリ鮮血ニテ敗血ニ非ス痔疾ノ血ニ比スレハ
 深キ所ヨリ出ツ脈痔ハ肛門ノ裂ニテ血ノ出ルナリ
 是モ鮮血ニテ線ノ如クニ逆ルモノナリ腸風ニ比ス

レバ出ル所淺シトス二病各病因ヲ異ニスレバ混淆
 スヘカラス臟毒ノ原因ヲ考ルニ膏粱ヲ放食シテ蘊
 毒ヲ積ミ腸中ニ瘀滯シ腸中遂ニ腐爛シテ膿血ヲ下
 シ刺痛後重等ノ諸證ヲ發スルナリ肛門ノ邊圍ニ孔
 ヲ生スルハ内ニ積ミタル毒ノ餘リテ外ヘ發スルナ
 リ淋病ニテ淋漏ヲ發スルト同理ナリ少壯ノ者ニハ
 少ク四十五六ヨリ六十以上ノ者ニ多シ老人ノ久痢
 ニ少腹及肛門刺痛シ膿血ヲ下ス丁愈多ク臭氣ノ出
 ルハ痢ノ臟毒ニ變シタルナリ内外諸候ヲ詳ニシテ
 臟毒ノ治法ヲ用フベシ○治法痛ミ強ク少腹微滿シ

裏急後重ノ甚シキニハ大黃牡丹皮湯加薏苡仁ニ宜シ寒熱往來スルニハ乙字湯加桃仁牡丹皮ニ宜シ日數過多ニ及ヒ脈弱ニシテ四肢倦怠シ飲食ヲ欲セズ或ハ盜汗出テ或ハ咳嗽シ膿血ヲ下マ事頻數ナルニハ赤石脂湯神驗アリ新渡ノ赤石脂ハ何カ煉物ニテ効ナシ古渡ノ上品ヲ撰テ用フベシ又桃花湯附子理中湯等ヲ撰用スヘシ此病素ヨリ寒疝ノ有ル人ニ多シ若シ疝候アラハ諸證ヲ捨テ置キ先ツ疝ヲ治シテ奇効ヲ得ル一アリ桂枝加茯苓附湯烏苓通氣湯ヲ撰用スヘシ外用ニ玫瑰蜜ヲ薔薇露水ニ和シ水鏡ヲ以

テ肛門ヘ射入シテ患處ヲ洗フベシ患所ヲ洗淨スルハ膏藥ヲ附テ膿ヲ取ルト同意ニテ毒ヲ除クノ効内服ノ劑ニ勝レル一有リ

臟毒主治方

薔薇露水 春林 其能清熱愈瘡專治口中腐爛腸痔臟毒帶下等

野薔薇 井華水 各適宜

右二味先ツ野薔薇ノ花ヲ采リ塩少シ許リヲ和シ一夜醗シ水ヲ適宜ニ入レ蒸露罐ニテ水ヲ取り貯ヒ患處ヲ洗フベシ

癩科秘錄 卷ノ
大黃牡丹皮湯加薏苡仁 乙字湯加桃仁牡丹皮
赤石脂湯 桃花湯 附子理中湯 桂枝加苓朮附湯
烏苓通氣湯 玫瑰蜜

帶下

帶下ハ素問ニ見ユ金匱ニモ出テ治法ヲ載セタリ婦
人良方云。人有帶脉。橫於腰間。如束帶之狀。病生於此。故
名為帶。ト云フ說ナレ氏強解ソヤウニ思フナリ。帶ハ
滯ノ義ニテ穢物淤滯シテ下ル意ナリ。痢ノ下ヲモ滯
下ト云フユヘ水ヲ去テ混淆セヌヤウニシタルモノ
ナルベシ。後世ニ及テ赤白ノ二症ヲ分ツ本邦ニテ赤
帶ヲ「ナカチ」ト云白帶ヲ「シラチ」ト云フ至極ノ大病ニ
テ先必死ト定メテヨキ程ノ者ナリ。老媪ノ患ヘテ
壯婦ニ無シ多クハ五六十歳ニテ發ス稀ニ早ク發ス

ル者モ四十歳以上ナリ壯婦ノ帶下ヲ患フルト云フ
ハ多クハ月信ノ不調ニテ真ノ帶下ニ非ス老媪ノ月
信一旦断テ后惡露適下ル一月信ノ如ク自今モ月信
ノ誤テ復来リタルモノナラント輕ク心得テ居ルウ
チニ期日ヲ過レ止マス愈多ク下リ少腹絞痛シ或
崩漏シテ一次ニ一升餘モ下リ或ハ雞肝ノ如キ凝血
ヲ下シ血ノ濃モノハ紫黑色薄キモノハ桃花色ニテ
鮮紅ナラス多ク下リタル後ハ下リ物減少スレ又
腹痛シテ大ニ崩下スル一前日ノ如ク幾度モ漏下ス
ル一數月ヲ經レ止マス遂ニ白穢物ヲ下スニ至ル

續テ白穢物ノミ下ルモノモアレ止赤白雜下スルモ
多シ最初ハ廁へ行テ濟ノ止多ク下ルヤウニナリ
テハ常ニ帛ヲ當テ、居ルヤウニナルモノナリ氣血
多ク亡スルユヘ身體羸瘦シテ顔色萎黃唇舌刮白ニ
變シ或ハ頭眩耳鳴モアリ其人素ヨリ少腹臍傍ノ邊
ニ癥塊アリ穢物ノ下ル毎ニ前陰ニ引テ痛ミ或ハ腰
痛或ハ脚攣急シ或ハ寒熱往來スル一骨蒸ノ如ク久
シキ寸ハ臭氣ヲ生ルニ至ル必死ノ候ト為スベシ臭
氣ノ生スルヤウニナレハ產門ト尿道ノ間腐リ穿テ
一ツニナリ小便モ陰門ヨリ常ニ滴瀝ト出テ絶ス帛

ナトニテハ間ニ合ハス床ヲ切り穿テ居ルヤウニナルモノアリ又穀道ヘモ腐リ穿テ大便ノ陰門ヨリ出ルヤウニナル者モアリ脉ハ必ス細數ニナルモノナリ遂ニハ肉燂骨立シテ死スルモノナリ或ハ水腫ニナリテ死スルモアリ或ハ血ノミ下リテ白穢物ニ變セス臭氣ノ出ヌモノハ能ク療治ヲ加レハ一旦止ミ半年或ハ一年ニシテ再發シ又療治ヲ加レハ又止ミ但病身ニナリテ長ク死セスニ居ルモノアリ或ハ少壯ノ婦人經閉スルヲ數月ニシテ后適月信ニナリ期ヲ過レ氏止マス彌多ク漏下スルモノアリ或ハ月信

ヨリ續テ下血ノ止サル者アリ或ハ産後ヨリ惡露多ク下リ因循トシテ久シク止サルモノアリ是等ノ症ハ疑似シキ者ナレハ得ト診法ヲ詳ニシテ混淆スヘカラス予幼年ノ頃老媪ノ帶下ヲ療ス甲字湯加大黃ヲ投スルヲ數月ニシテ一日前陰ノ急脹スルヲ覺フ遽ニ廁ニ行テ努カスルニ一物陰中ヨリ脱出ス形楕圓ニシテ大ク雞子ノ如ク其質石決明ニ似テ一箇ノ肉塊ナリ一方尖起シテ小孔アリ塊物ヲ壓スル寸ハ敗血小孔ヨリ點滴ト出ツ半截シテ塊物ヲ視ルニ文理錯綜シテ敗血少許アリ塊物ノ下リテ后帶下ハ脱

然トシテ愈ユ又乳岩ヲ割ク毎ニ其塊ヲ屠リ驗ルニ
今帶下ニテ下ス所ノ塊ト同物ナリ因テ臆度スルニ
帶下ト乳岩トハ同病ナルヘシ乳房ト子宮トハ上下
ニ位シ内外ニ在テ形状ヲ異ニスレモ上下相通シテ
其用ヲ同シ其體ヲ異ニセス然レハ同病ヲ生スルモ
理リナリ婦人ノ經水ハ妊娠スル寸ハ子宮中へ入テ
胚胎ヲ養ヒ分娩スル寸ハ乳房へ入テ乳汁トナリ櫻
兒ノ成長スルニ從ヒ乳汁ノ不用ニナル寸ハ又下リ
テ子宮へ入り月信トナルナリ上下互ニ升降スルモ
ノナレハ乳房ト子宮ト同物ナルヲ愈明ナリ乳房ニ

テ氣血留滯スル寸ハ乳岩ノ因トナリ子宮ニテ蘊積
スル寸ハ帶下ノ由トナルナリ帶下ノ白穢物ヲ下ス
ハ乳岩ノ稀水ノ之出テ、粘膿ノ出ヌト同シ帶下ノ
數血ノ漏下スルハ乳岩ノ數血ノ逆^{ホトシ}り出ルニ同シニ
病俱ニ臭氣ヲ同シ又二病俱ニ月經絶テ后ニ發ス又
二病俱ニ初發ハ痛マス日ヲ經テ后ニ痛ヲ發ス前文
ニ載セタル婦人ノ塊ノ下リテ愈タルハ乳岩ノ塊ヲ
割キ取テ愈ルト同シ塊モ亦同質ナリ窺官管ヲ以テ
子宮ヲ視ルニ宮口ノ腐爛シタル形状殆ト乳岩ノ翻
花スルニ似タリ先師南陽翁ノ物語ニ帶下ヲ患フル

者適陰中ヨリ一物ヲ脱出ス熟視スルニ即チ子宮ナ
リ宮頭腐爛シテ膿血滴瀝シ臭穢薰蒸ス乃藥線ヲ以
テ宮根ヲ緊扎スルニ遂ニ脱落シテ宿痼全治セシト
云ヘリ是亦乳岩ノ結核ヲ除キ去テ愈ルト同意ナリ
帶下モ乳岩ト同シク初發固結シ漸々ニ腐敗シテ膿
血ヲ下スモノナルヘシ後學ノ者前論ヲ熟讀シ活物
ニ就テ實驗スル寸ハ予カ言ノ証サルヲ知ルヘシ
凡帶下。乳岩。膈噎。中風等ノ病ハ老大ノ者ノ患ヒテ
少壯ノ者ノ患ヒサルハ少壯ノ者ニ全ク無キニハ非
ス斯等ノ病ハ少壯ノ頃ヨリ胚胎シテ漸々ニ積老大

ニ至テ初テ發スルナリ稀ニ少壯ノ者ノ患フルハ思
慮ヲ費シ或ハ飲食ヲ放ニシ不養生ニテ早ク發シタ
ルナリ○治法其人未疲勞セス少腹微滿シテ瘀血ノ
多ク下ルモノニハ甲字湯加大黃ヲ與ヒ坐藥ヲ陰中
ヘ挿入スヘシ坐藥ハ奇驗ヲ奏スルモノナレハ新舊
ヲ論セス始終用フルヲ宜シトス甲字湯加大黃ヲ與
フル丁數十日ニ至リ瘀血ノ最早盡タリト思フ頃ニ
丁香飲ヲ與フヘシ此手段ニテ寸驗ナキ者ハ先難治
ト知ルヘシ下血崩漏盆水ヲ傾ルカ如クニシテ止サ
ルモノハ芎歸膠艾湯。犀角地黄湯。斷紅飲ニ宜シ虛里

動悸タカフリ眩暈耳鳴。面色痿黃。唇舌刮白ナル者ハ
連珠飲。十全大補湯ニ宜シ寒熱往來シテ穢物臭水愈
多ク下リ疲勞日ニ加ユル者ハ補中益氣湯。逍遙散加
人參等ヲ撰用スヘシ此通り治法ハ立テ、置ケル全
ク姑息ニテ全愈スヘカラス前文ニ論スル通り乳岩
ト同病ナレハ藥餌鍼灸ニテ効ノナキハ理ナリサレ
ハ乳岩ノ治法ノ如ク塊物ヲ除キ去ルノ手段ニアラ
サレハ決シテ治スナシ余苦心ヲ費スナシ此ニ二十
年始テ其術ヲ工夫セリ其法先窺官管ヲ陰中へ挿入
シ位置ヲ窺ヒ知リ麝香ヲ左突ニ和シ紙ヲ燃リ太サ著ス

ニ塗リテ宮中へ挿入スルノ墮胎劑ノ法ノ如クニシ
テ一夜ヲ經ル寸ハ必腹痛ヲ發シ瘀血大ニ下リ果シ
テ塊物後テ脱落シ全愈セシモノ有リ後帶下ヲ療ス
ル毎ニ此術ヲ勸レル最初ハ陰處ノノエヘ羞テ得ル心
セス久シク愈ス萬方盡キテ后ハ己ムヲ得ル請者
モアレル其項ハ疲勞シテ術ヲ施シ難シ實ニ遺恨ト
謂ツ可シ

帶下主治方

丁香飲 山脇理婦人血積。或帶下。吐沫上氣。腰冷寒熱咳
嗽。

水莎 一錢 乾芩 八分 當歸 五分 川芎 三分 昌陽 八分
丁香 三分 紅花 三分

右七味煎服

坐藥 叢桂 治女人赤白帶下經日不止者

杏仁 甘草 各二分 丁香 一分 枯礬 一分 片腦 五厘

右五味為末盛絳囊納臍中三日一換○囊如拇指大

以糸繫禪小解則出之又納之穢惡粘着囊頭則拭之


而再納若覺微痛者間日而納之可也

芎歸膠艾湯 犀角地黄湯 斷紅飲 甲字湯加大黃

連珠飲 十全大補湯 補中益氣湯 逍遙散加人參

帶下肉塊圖

塊大如鴨蛋。木
硬不易斷。以快
刀截之。肉有分
理脈絡貫通紫
血微出。



タク反覆顛倒シ然レ膿水一滴モ出テス一兩日ニシテ自ラ愈ルモノアリ俗ニ「カラミ」ト云フ此症ハ但腫レタルノミニテ膿ニナラス消散シタルナルヘシ
 聾耳ハ小患ナレト至テ治シ難キ者ナリ一旦治スルモ再發シテ長ク愈サルモノ多シ聾耳ニハ限ラス九竅ノ瘡瘍ハ總テ治シ難キモノナリ鼻淵。淚管漏。淋疾。痔疾。帶下等ノ類ヲ見テ知ルベシ

耳聾ハ其因一ナラス先耳ニ聲音ノ聞ユル機關ヲ思フニ太鼓ニ聲音ノ應スルト同理ナリ近世西洋學大ニ行ナハレ予モ傍ニ其說ヲ聞キ屢解剖ヲ試タルニ

耳竅ノ中ニ鼓膜ト云フモノアリ耳ノ聾ルハ此膜ニ滯リノアルナリ聾耳ニテ聾ルハ鼓膜ノ腐爛或ハ瘡口ヨリ瘰肉ヲ生シ耳竅ヲ塞キタルモノナルヘシ治シ難シトス疫ニテ聾ルハ鬱熱ノタメニ鼓膜知覺ノ官ヲ失ヒタルナリ熱解ストキハ自ラ愈ル故藥用ニ及ハス人老テ耳ノ聾ルハ鼓膜衰弱シテ張ノ弛ミタルナリ敗鼓ノ皮ノ弛ミテ聲音ノ應セサルト同シ又老眼ノ衰弱シテ鎖屑ノ物ノ見ヘヌト同理ナルヲ知ルヘシ藥餌ノ治スル所ニ非ス聾聾ニテ聾ル丁アリ常ニ聾聾ノ濕リテ出或ハ脂ノ如クニ出ル者ハ自

然ト耳中一杯ニ塞リテ聾ル_レアリ江戸室町嶋屋平
七ト云フ者耳ノ聾ル_レ已ニ數年ナリ来テ治ヲ請フ
先ツ紫雲ヲ耳中へ滴入スル_レ數日後ニ水鏡ニテ温
湯ヲ耳中へ射注スルニ炒菽ヲ圻タル様ナ物二片出
テ又脂ノ如キモノ多ク出テ、宿痾脱然トシテ去リ
特ニ聰ヲ覺フ後此手段ニテ耳聾ヲ療治シテ奇驗ヲ
得タル_レ尤多シ此事已ニ病源候論ニ載ス耳聾候ノ
候ニ耳裏津液結聚所成人耳皆有之。輕者不能為病若
加以風熱乘之則結鞞成丸核塞耳亦令耳暴聾ト云リ
幼少ノモノ頃嗽ヲ患ヘテ後耳ノ聾ル_レアリ必ス耳

下ニ結核ノ多クアルモノナリ是モ治スルモノナリ
初發耳鳴スル_レ濤聲ノ如ク松風ノ如ク蟬吟ノ如ク
鐘鼓ノ如ク漸ニ鳴リノ止ムニ從テ聾ルモノハ真
ノ耳聾ニテ不治ノ證ト知ルヘシ婦人産後或ハ嘔血
下血等ノ後ニ耳ノ鳴ルハ動ノ鼓膜へ響クナリ又種
種ノ鳴聲ヲ覺フルモノアレ此症ハ耳聾ニハナラ
ヌモノナリ結毒ニテ聾スルモノアリ癰瘡ノ門ニ詳
ニス難治トス聾耳潰テ瘡口ヨリ瘰肉突起シテ大サ
棗核丁子ノ如クニ至リテ永ク消ヒザルヲ耳聾ト云
フ又耳痔トモ名クルナリ一小児生レテ左右ノ耳珠

ノ旁ニ各小贅肉ヲ生シ太サ筆管ノ如ク長サ一寸許
リ截断シテ愈ユ是モ耳痔ニ属シテ可ナリ又小児生
レナカラ耳竅ノ無キモノアリ鎖肛ト同證ナリ鎖肛
ノ治法ニテ治ス○治法初發耳根ノ前後マテモ腫痛
スルモノハ涼膈散加石膏。小柴胡湯加石膏ニ宜シ膿
水ノ多ク出ルモノハ五物解毒湯加辛夷ヲ與ヒ金公
水薔薇露水ノ類ニテ耳中ヲ洗ヒ後ニ紫雲ヲ滴入ス
ヘシ又椰子油一味ヲ滴入スルモ佳ナリ水銃ヲ用フ
ルハ過度ナルトキハ眩暈嘔吐等ヲ發スルハアリ頭
腦ヲ衝動スル故ナリ此理ヲ心得テ緩急適宜ニ術ヲ

施スヘシ耳聾ハ一體難治ノモノナレト先ツ水銃洗
法ニテ一掃除シテ見ルヲ良策トス若聴聾ノ多出ル
モノハ速ニ治シ聾聾ノ出サルモノモ姑ク愉快ヲ覺
フ洗テ後ハ紫雲椰子油等ヲ滴入シテ蔓荊子散ヲ與
フ咳嗽ニテ耳ノ聾ルモノニハ紫胡加石膏湯奇驗ア
リ耳根及ヒ頤下ノ結核ヲ撮ミ舉ゲ灸ヲ炷テ奇効ヲ
得ルハアリ耳鳴ハ苓桂朮甘合三黃湯ニ宜シ虛里ノ
動マテモ高キモノハ針砂湯ヲ與フ血虛シテ耳鳴ス
ルモノハ連珠飲ノ主治ナリ耳痔ハ猛汞油ヲ貼シテ
取ルヘシ贅肉ノ類ハ反剪刀ニテ截断スヘシ

聾耳主治方

蔓荊子散 直指 治耳聾耳鳴

蔓荊 升麻 木通 赤芍 麥門

生地 前胡 赤茯苓 桑皮 菊花

甘草

右十一味。薑棗煎服

涼膈散加石膏 小柴胡湯加石膏 五物解毒湯加辛

荑 苓桂朮甘三黃合方 針砂湯 連珠飲 金公水

薔薇露水 紫雲 椰子油 猛汞油

腦漏

腦漏ハ病源候論ニ載セ鼻淵ハ素問ニ出ツ後世ニ至
テ腦漏鼻淵ヲ一病トシテ論ス外科正宗ニ腦漏一名
鼻淵ト断リタルハ穩ナラス予カ歷診スル所ニテハ
二證アリ壽世保元ニ濁涕ノ出ル者ヲ鼻淵ト為シ臭
膿ノ出ル者ヲ腦漏ト為シタルニテ予カ言ノ証ヒサ
ルヲ知ルベシ腦漏ハ必死ニシテ生路ナシ至テ輕キ
者ハ姑ク死ヲ免ルモ荏苒トシテ愈ス遂ニ死スル
モノナリ初發ハ頭項及ヒ顴骨鼻梁骨ノ中隱トシ
テ疼痛スル丁常ノ頭痛ト異ニシテ如何ニモ腦髓ト

思フ所ニテ痛ミ肌表ヨリ摸索シテハ知レ魚ルモノ
 ナリ萬方スレ氏因循トシテ止マス微ク往来寒熱ア
 リ遂ニ鼻中ニ潰ヘ臭膿滴瀝トシテ常ニ禁セス仰カ
 シメテ鼻中ヲ見ルニ瘰肉圓ク張り出シ鼻痔ノ初起
 ニ似タリ膿ハ軟肉ノ中ヨリ出ルナリ多ク出ルニ從
 テ目眦ヨリ出或ハ耳竅ヨリ出或ハ咽喉ヨリ出ルモ
 アリ或ハ鼻ニ潰スシテ先ツ左右ノ耳竅ヨリ出ルモ
 アリ耳下及ヒ頤邊疣瘡トシテ核ヲ結フ丁五六枚ニ
 至リ項背強リ久クシテ目陷ミ頰削テ微ニ浮腫ヲ生
 シ潤澤ヲ失シ痿黃ニナリ身體モ又從テ柴瘦シ殆ト

勞瘵ノ如クニナルモノナリ是ハ瘰癧流注乳岩失榮
 等ノ遂ニ虚脱シテ勞狀ニナルト一致ナリ鼻淵ノ初
 發ハ偏頭痛ミ或ハ全頭痛ムモアリ或ハ鼻梁骨ノ甚
 痛ムモアリ或ハ衄血ノ出ルモアリ後ニハ鼻中ヨリ
 臭水濁液滴瀝シテ止マス神思モ爽快ナラス是モ至
 テ治シ難キモノナリ一旦愈テモ又再發シテ生涯ノ
 痼疾トナルモノ多シ一人鼻淵ヲ患ヒ朽骨クハネ一塊鼻中
 ヨリ出テ、全愈セシモノアリ是ハ附骨疽ノ骨ノ出
 テ、愈ルト同シ一婦人鼻淵ヲ患ヒ緊ク鼻涕ヲ拭ニ
 灰色ニテ糊ノ如キモノ茶椀ニ一ツ程出ツ熟視スル

ニ腦髓ナリ出テ、後ハ臭惡水モ減シ頭痛モ止ミテ
 何ノ害ヲモナサヌ又一婦人鼻淵ヲ患フル丁久シ一
 日適鼻中ヨリ灰ヲ煉リタル様ナルモノ大ニ出ル丁
 五合許明日又出ル丁五合許堆ク席上ニ盈一旦ハ驚
 キタレ氏後ニ多年ノ沈疴脱然トシテ愈腦海ハ精神
 ノ源ニテ至極大切ノ地ナレ氏二人ノ如ク腦髓ノ流
 出シテ害ヲ為サ、ルハ不審ナリ偏正頭痛甚シク清
 涕多ク出テ、止マス殆ト鼻淵ニ疑似モノナリ同病
 ノ様ニ心得ル者モアレ氏自ラ異ル所アリ其證候頭
 痛ノ門ニ詳ナレハ深思シテ別病ナル丁ヲ知ルヘシ

^{ヒキカヒ}感冒ニテ清涕ノ多ク出ルニ從ヒ黃水ノ滴瀝ト多ク
 出テ、止マザルモノアリ世ニ是レヲモ鼻淵ト為セ
 氏是レハ決テ鼻淵ニアラス感冒ノ愈ルニ從ヒ又黃
 水モ止ムモノナリ鼻鼈ト云モノアリ又鼻不聞香臭
 トモ見ユ鼻中何ノ滯リモナク但感冒ニテ鼻ノ塞リ
 タル心地ニナリ飲食一切ノ香臭ヲ覺ヘス鍼灸藥餌
 等ヲ頻用スレ氏寸驗ナク又其儘ニ捨置モ大害ナシ
 一旦適香臭ヲ聞ク様ニナリテモ又乍塞リテ終身愈
 サル者多シ世醫之ヲモ鼻淵ノ一症ト心得ル者アリ
 大ナル誤ナリ○治法腦漏ニハ第一葦夷ヲ主藥トス

何方へモ加味シテ用フルヲ良策トス初發頭痛ノ劇
 キモノハ防風通聖散加辛夷ニ宜シ如シ効ナクハ
 辛夷清涼飲辛夷清肺飲等ヲ撰用スヘシ因循トシテ
 日ヲ延キ膿水愈多ク虚候並起ルモノニハ補中益氣
 湯加藿香辛夷ヲ與フベシ極テ虚脱スルモノハ十全
 太補湯ナリ鼻淵ノ治法モ腦漏ノ諸方ヲ撰用スベシ
 又川芎茶調散小柴胡湯加石膏モ奇驗ヲ奏スルモノ
 ナリ又五物解毒湯加辛夷ヲ用フヘシ外用ニハ蒂辛
 散ヲ吹入スベシ

腦漏主治方

辛夷清涼飲 春林 治頭眩諸病

- 石膏 辛夷 忍冬 防風 天麻
- 玄參 芎藭 黑豆 芽茶 蔓荊子
- 遺糧

右十一味煎服

辛夷清肺飲 正宗 治鼻痔。又治鼻淵

- 辛夷 六分 黃芩 石膏 梔子 麥門冬
- 百合 知母 各一錢 升麻 三分 甘草 五分 枇杷葉 三分

右十味煎服

蒂辛散 春林 治諸頭痛。或梅毒頭痛。或鼻中生息肉

瓜蒂 細辛 各等分

右二味為末。以吹管入鼻中。

防風通聖散加辛夷 補中益氣湯加藿香辛夷

十全大補湯 川芎茶調散 小柴胡加石膏湯

五物解毒湯加辛夷

