

門
武
407
卷
10

頭痛

頭痛左カ右カ一方ニ限リテ痛ムヲ偏頭痛ト為シ百
會天庭及ヒ鼻梁骨ヲ痛ムヲ正頭痛ト云フ至テ治シ
難キモノナリ多クハ宿疾ニナリ氣候ノ寒暄ニ移リ
或ハ風雨ノ催ス前ニ發スルモノナリ發スルヲ瘧ノ
如ク時ヲ期^{カキ}テ痛ミ時ヲ期テ止ム多ハ平旦ニ發シ午
後ニ至レハ止ムモノナリ頭痛發スルキハ刀錐ニテ
刺カ如ク少シモ目ヲ開ケテ能ハス涙及ヒ清涕滴瀝
トシテ出或ハ頭顱ニ微腫ヲ催シ恶心嘔吐甚シク黃
水酸汁ヲ吐キ飲食藥餌等モ一切納ラヌ様ニナル者

アリ其人痛ミニ堪ス呻吟顛倒シ家人モ愴皇シテ急
遽ニ醫ヲ迎ヘテ介抱スル中ニ休期ニ至レハ劃然ト
シテ止ムト忘ル、カ如シ明日ニ至レハ又發スルト
前日ノ如ク毎日如是丁延テ數十日ニ至リ或ハ二三
月ニ至ルモアリ或ハ朝タニ緩急ノアルノミニテ始
終痛ミノ去ラヌモアリ又卒ニ頭痛スルト頭顱ノ破
ル、カ如ク涕涙頻出心煩喜嘔等ノ症并ニ起リ反覆
顛倒シテ暫クモ眠ルト得ス朝ニ發シテタニ死シ
タニ發シテ朝ニ死スルモノアリ真頭痛ト名ク頭痛
ノ急證ニテ恐ルヘキモノナリ又天庭印堂及ヒ額骨

ノ邊疼痛シテ涙涕ヲ流シ殆ト偏正頭痛ノ如ク時ニ
緩急アレ此全愈セスシテニ三年ニ至リ或ハ八九年
ニ至ルモノアリ是モ又偏正頭痛ニ属シテ可ナリ雷
頭風モ頭痛ノ一證ニ属シテアレ此實ハ眼病ナリ初
發頭痛發熱嘔吐等アリテ感冒中暑ノ様ニ見ヘ一二
日ノ内ニ瞳孔散大シテ烏睛曇暗色ニナリ腐タル鰥
ノ眼ニ似テ乍チ明ヲ失スル者ナリ決シテ不治ト為
スベシ不案内ノ者ハ徒ニ偏正頭痛ノヤウニ心得テ
居ル内ニ失明シテ惡名ヲ取ルト多シ頭痛ノ強キ病
ニハ此所ヘ注意シテ失策ノ無キヤウニスベシ凡偏

正頭痛ハ勿論諸病ノ頭痛ニテモ必ス嘔吐ヲ發スルモノナリ是ハ西洋ノ說ヲ聞クニ神經トテ内外ノ知覺ヲ司トルモノ有リ其一經ニ頭中ヨリ起リテ胃脘ヲ纏フモノアリ故ニ頭痛甚シキトキハ必嘔吐ヲ發スト云ヘリ予モ實地ノ上ニテ攷究スルニ確說ノ様ニ思フナリ一婦人額上掌ノ大サ程冷ル丁水ヲ灌カ如ク覺エ日暮ルトキ尤甚シク氷ニテモ載ルカ如シト云フ涙涕ノ出ル丁偏正頭痛ニ同シ其人冷ルニ堪薰ルトテ小布團ヲ作リ常ニ額上ヲ覆フ痛ミハナケレ氏頭痛ト同因ノ見込ニテ沉香天麻湯ヲ與ルニ速

ニ効アリテ全愈ス○治法頭痛ノ妙藥ト云ハ家試阿芙蓉液ナリ發スルトキニ三十滴許モ用フルトキハ痛ミ立ドコロニ止テ忘ル、カ如シ明日又與フル丁前法ノ如ク如此十餘日ニ至ルトキハ痛漸々ニ退キテ全愈スルナリ内藥ハ川芎茶調散。防風通聖散ヲ撰用スヘシ又蒂辛散至靈散ヲ鼻中ヘ吹入スベシ又醋一升ヘ木炭ヲ碎キ二合程入レテ煎シ患處ヲ熨ヘシ寒熱ノアル者ハ紫胡桂枝湯嘔吐ノ甚シキ者ハ半夏瀉心湯。六君子湯虛冷ニ屬スル者ハ半夏白朮天麻湯。沉香天麻湯ヲ撰用スベシ

頭痛主治方

半夏白术天麻湯 東垣 治脾胃虛弱。痰厥頭痛

半夏 陳皮 麥芽各一錢半 白术 神曲各一錢

蒼朮 人參 黃芪 天麻 茯苓

澤瀉各五分 乾薑三分 黃柏二分 生薑

右十四味水煎服

乳香散 圓濟 治偏頭痛。不可忍

乳香如皂子大 高良薑如指頭大

右二味於火上燒。迎烟熏鼻。隨痛左右用之。

至靈散肘後 治偏頭痛

雄黃 細辛

右二味研令細。每用一字。已下吹入鼻中

消石散 治頭痛欲死者

消石

研末

右一味吹入鼻中

阿芙蓉液 家試治偏正頭痛。寒疝急痛。咳嗽不寐等諸證。有神驗

阿芙蓉錢 再滴火酒錢十

右二味ヲ硝子罐ニ入レ密封シ大陽ニ晒ス。丁數日紫色ニ變ズルヲ待テ。滓ヲ去リ密封シテ貯フ大人

ハ三十滴ヨリ四十五滴迄用ニ小兒ハ二十滴ヨリ三十滴マデ用フ可シ

川芎茶調散 沉香天麻湯 紫胡桂枝湯 半夏瀉心湯 防風通聖散 六君子湯 蒂辛散

衄血

衄血ハ靈樞ニ起居不節。用力過度。則絡脈傷。絡脈傷則血外溢。血外溢。則衄血。スト云タル通り氣血ノ逆上レテ鼻中ヲ衝キ細絡自カラ破レテ血ノ溢レ出ルナリ。準頭ヲ打チ或ハ鼻^{ハナ}尖^{アハ}ヲ探リ酒ヲ飲過テ衄血スルハ一旦ノ一ニテ直ニ止ムモノナリ。一體ノ稟賦多血ニテ常ニ上衝シ面目赤ク數頭痛ノスル者ハ善衄血スルモノナリ。或ハ日^ヒニ衄血シ或ハ月^ヅニ出ルモアリ。次ニ三合或ハ五六合ニ至ルモアリ然レ氏衄血ハ吐血ト異ニシテ何程出テ、モ決シテ死スルトナシ。但

出ル丁過多ナルトキハ崩漏腸風等ニテ亡血スルト
同シニテ面色萎黃。唇舌刮白ニ變シ虛里ノ動悸煽力
如ク衣ノ外ヘ應スル様ニナリ胸脇苦滿。呼吸促迫耳
鳴眩暈。一身微腫等ノ諸證並起リ四肢倦怠シテ力作
ハ勿論步行モナラス黃胖ノ如クニナルモノナリ如
此ナリテハ死セスト雖氏因循トシテ故ニ復シ難シ
故ニ亡血セヌ内ニ能ク療治スベキ丁ナリ一男兒年
十三歳衄血スル丁一次五六合ニ至リ總身ニ班ヲ發
スル丁小ナル者ハ麻子^{アヤメ}ノ如ク大ナル者ハ菽^{アサガホ}ノ如ク
色赤キモアリ紫ヒアリ青藍モアリ是ハ青腿牙疳ノ

牙縫ヨリ多ク出血シテ總身ニ班ヲ發スルト同シ丁
ナリ面色萎黃ニ變シ虛里ノ動悸篤ミトシテ衣ニ應
シ微熱アリテ床蓐ニ伏ス醫藥ヲ加ヘ衄血モ止ミ發
班モ過半^ハ消シタル頃ニ至テ又衄血發班スル丁前
日ノ如ク後ニハ癬ニナリテ一月ニ一次或ニ次ニ至
リ萬方スレバ全愈セス終ニ疲極シテ死セリ是ハ衄
血中ノ異證ニテ希有ノ事ナリ一女子頓嗽ヲ患ヒ日
ニ衄血スル丁數次ニシテ止マス山根及目眶ノ邊藍
色ニ變シ打撲ニテ青班ニナリタルカ如ク眼中赤ク
シテ深ルニ似タリ青龍麻杏合方ヲ與ヒ洗塵散ニテ

患處ヲ洗フ丁月餘ニシテ全愈ス是モ亦奇證ナリ温
疫ニテ邪氣ノ大陽少陽ノ部位ニ入タル頃衄血スル
ハ至テ吉候ナリ其儘熱ノ解スモアリ又戰汗ヲ發シ
テ愈ルモアリ痘瘡ニテ衄血ノ出ルハ至テ凶兆トス
痘毒ノ壅滯シテ溢レ出タルナリ衄血ノ出ル程ナレ
ハ痘瘡モ必紫黑色ニシテ難治ナリ○治法輕症ハ綿
ヲ金公水及蘿蔔^{ロコ}ノ絞リ汁藕根ノ絞リ汁等ニ浸シ鼻
皁ヲ過防シテ止ムナリ又項後髮際ノ穴ニ灸ヲ炷^ヒル
モヨシ又病人ノ手ノ中指節紋ノ處ヲ線ニテ緊^キシク
繫^{カル}ベシ若左ノ鼻皁ヨリ出ルハ右ノ手指ヲ繫リ若右

ノ鼻皁ヨリ出ルハ左ノ手指ヲ繫ルベシ若左右共ニ
出ルハ左右ノ手指ヲ繫ルヘシ以上手段ニテ治シ難
キ者ハ灌水スヘシ其法手帕ヲ横ニ四重ニ疊ミ冷水
ニ蘸シ面上ヲ覆ヒ徐々ニ引テ頂ニ至リ又冷水ニ浸
シ再術ヲ施ス丁前法ノ如ク數回ニ及フトキハ必ス
止ムモノナリ此法ハ予曾テ春林軒ニ游學ノ時青洲
翁手自ラ此術ヲ予カ頭上ニ施シテ傳ヘタリ故ニ特
ニ此術ノ秘蘊ヲ知ルヲ得タリ又法藤紙ヲ幾重ニ
モ疊ミ大サ五寸四方ト為シ冷水ニ浸シ頂上ニ置キ
熱熨斗ヲ以テ紙上ヲ熨シ紙乾クトキハ血立トコロ

ニ止ムモノナリ内服ニハ三黃湯加犀角。犀角地黃湯ヲ撰用スベシ若諸藥効ナキトキハ阿芙蓉液四十滴許用エベシ微頭痛シテ數衄血スルハ涼膈散加石膏。防風通聖散ニ宜シ衄血ノ後ニ血故ニ復セス虛悸頭眩耳鳴等ノアルニハ連珠飲。大補湯ヲ撰用スヘシ虛里ノ動悸如煽。呼吸促迫。四肢倦怠シテ步行ナラヌ證ニハ家試黃胖丸ヲ兼用ニスベシ

衄血主治方

黃胖丸家試治黃胖及脫血為黃胖者

厚朴

白朮

陳皮

神曲

大棗各八錢

綠礬

炒四錢甘草二十錢醋適宜

右七味散ト為シ大棗ヲ剥テ核ヲ去リ醋ヲ以テ煮熟シ研テ泥ノ如クニ至リ米糊及散ヲ入レ又研テ調勻シ丸ト為シテ日ニ九十五錢ヲ用ユ

三黃湯 犀角地黃湯 凉膈散 防風通聖散
連珠飲 大補湯 鍼砂湯

喉痺

喉痺ハ咽喉ノ癰ニテ又喉癰ト云フ痺ハ麻痺スルノ
義ニ非ス中藏經ニ痺者閉也トアリテ咽喉閉塞スル
ノ謂ナリ焦氏筆乘ニ已ニ喉閉ト見ヘタリ又乳鶩風
トモ名ク兩傍ノ腫ル、ヲ雙乳鶩風ト為シ一邊ノ腫
ル、ヲ單乳鶩風ト云和蘭陀ノ說ニ懸壅ノ左右ニ巴
且杏腺ト云フモノ有リ喉痺ハ此ノ處ノ腫ル、ナリ
ト謂ヘリ咽喉ハ飲食ノ道呼吸ノ門ニテ至極ノ要地
ナリ故ニ早ク救ハザレハ危篤ニ至ルトマリ此病ハ
刺縫臨摹剖剗等ニテ極イテ肩ヲ使ヒ強テ腕ヲ勞ス

ルモノニ多シ初發項背強痛シ頭痛發熱惡寒等アリ
テ咽喉腫痛ス杉箸二枝ヲ紙ニ裹ミ舌ヲ押ヘ病人自
カラ氣息ヲ内ヘ引クトキハ洞ニ見ユルモノナリ左
右ヨリ丸ク腫レ出シ深紫色ニナリテアリ飲食ハ勿
論津唾ヲ嚥テモ痛ニ甚シク齒牙ノ盡ル處及ヒ舌本
マテモ腫レテ牙關微シク緊急ンロモ縱意ニ開キ難
ク言語モ不自由ニナリ頤ノ下邊ニ累ミト核ヲ結ビ
幾ト飲食ヲ廢ス是ハ一通ノ喉痺ニテ治シ易ク決シ
テ死スルノナシ六七日モ經レハ自ラ潰破シ膿血出
テ、速ニ愈ルナリ後ニハ癧ノヤウニナリテ再發ス

ルモノナリ急喉痺ハ又走馬喉痺トモ云テ迅速ノ病
ナリ古書ニモ暴發暴死ト斬ハリテアリ纏喉風ト云
モ腫ノ外ヘ透達シテ咽喉ヲ纏タル意ニテ實ハ急喉
痺ノ一證ナリ急喉痺ノ候ハ咽喉暴ニ腫痛閉塞シ痰
涎壅盛ニナリ聲モ啞シテ發セス呼吸モ滯リテ利セ
ス咽喉ノ外モ微腫シテ色ヲ變シ舌上黃胎或ハ黑胎
ニナリ惡寒發熱頭痛等強ク其状疫ノ如ク藥餌一滴
モ下ラス二三日ニシテ死スルモノナリ死シテ後膿
ノ口鼻ヨリ出ルノアリ一男子咽喉腫痛ヲ患ヒテ予
ヲ迎フ病人燼邊ニ夷踞シテ診ヲ請フ予一手ヲ握リ

テ未タ診シ終ラサルニ病人卒然トシテ起キ又卒倒シテ死セリ後間^{アラク}アリテ膿口鼻ヨリ出タリ是ハ全ク膿ノ氣道ニ入りテ死シタルナリ纏喉風ト為スヘシ喉痺ニテ死スル證ハ常ノ喉痺ヨリ一段深キ處ニテ腫ル、故食道氣管共閉塞シ幸ニ自潰スルモ膿血氣管ニ入り呼吸ヲ絶テ死スルナリ喉痺ト云フモ咽喉ノ腫痛スル病ナレハ喉痺ニ混々ヘカラス其候初發咽喉微痛シテ飲食モ深ミ津唾^{ツヅク}ノ嚥ムニモ痛ミ内ノ微腫スルモノト見ヘテ結喉ノ邊ヲ按スレハ微痛ヲ覺ユルナリ聲モ啞シテ發セス但涎沫ヲ吐クナ多ク

數唾壺ヲ傾ルニ至ル久シク愈スレテ遂ニ骨立脱肉シ初テ咳嗽寒熱等ヲ起シ虛勞ニナリテ死スモノナリ是證咽喉結毒ナト、疑似スルユヘ熟視スルニ腐蝕シタル處ナク但糜爛ンテアルモノナリ癰毒ニ非ル、^ヲ決診スヘシ虛勞モ久シキトキハ咽喉痛ンテ飲食ノ染ルヤウニナルナリサレハ喉痺モ虛勞ノ一證ト為シテ可ナリ○治法初發ハ項背ノ強バルヲ目的ニシテ葛根湯加石膏ヲ與ヘ金鎖ヒヲ吹クベシ其儘ニ消散スルモノ有リ腫痛益甚シク膿ニ成ラントスルノ勢アラハ涼膈散加石膏ヲ用ヒ草兵丸ヲ兼用

ニシテ一先下スベシ膿ニ成リタルハ鍼ヲ刺スラ上
策トス若鍼ヲ刺スト甚早キトキハ却テ衝動スルユ
ヘ腫痛ノ増劇スルモノナリ熟診シテ其端的ノ度ヲ
知ルヘシ赤ク腫レタル上ニ白點ノ班ミト出ルハ膿
成ルノ候色ノ紫暗ニ變スルハ瘀血凝滯スルノ徵何
レモ刺シテ膿血ヲ去ルベシ膿血多ク出ルトキハ痛
ミ失スルカ如クニ去リ飲食モ從テ進ミ速ニ愉快ヲ
覺ユルモノナリ若シ怯懦ニテ鍼ヲ恐ル、モノニハ
筆鍼ノ法ヲ施スベシ張果ノ醫說ニ云ク李王公主患
喉癰、數日痛腫飲食不下醫官言須鍼刀開方得潰破公

子聞用鍼刀哭不肯治痛逼水穀不入忽有一草澤醫曰
某不使鍼刀只用筆頭蘸藥灑上霎時便潰公主喜遂令
召之方兩次上藥遂潰出膿血一盞餘便寬兩日瘡無事
令傳其方醫云乃以鍼繫筆心中輕々劃破其潰散爾別
無方長文ナレトモ面白キ詰ユヘ此ニ記シテ傳フ纏
喉風ニハ驅風解毒湯ニ石膏ヲ多ク入レテ用フベシ
石膏ハ咽喉ニ効ナルモノナリ何方ヘモ石膏ヲ加
ヘテ用フルヲ佳トス咽喉壅閉シテ藥餌一滴モ下ラ
サル者ハ手段十シ咽喉ノ左右ヘ大發泡ヲ施スベシ
又尺澤ヨリ刺絡又足ノ少商ヨリ瀉血スベシ冰硼散

紫雪等ヲ吹モ佳ナリ喉癬ハ涼膈散ノ甘桔ヲ倍シテ用ニ虛證ニハ甘露飲ヲ用フベシ

喉癬主治方

驅風解毒湯

凹春治疔瘍腫痛

春林軒用此方以治咽喉諸證

防風

荆芥

羌活

連翹

牛房子

甘草

各等分

右七味水煎服

葛根湯加石膏 涼膈散加石膏 甘露飲

草兵丸

金鎖ヒ

冰硼散

紫雪

發泡膏

痰泡

痰泡ハ舌下ノ左右微ニ匏腫ボウレテ大サ梅ノ如ク色赤クシテ透徹スキトウツルヤウニ見ユルモノナリ初メハ格別ノ障リモナケレトモ漸大ニナルニ従ヒ舌本強リ微ク痛ミ言吾飲食モ不自由ニナルモノナリ指頭キテ按スルニ軟錦ニシテ中ニ水ニテモ畜ヘタル手應テコタクノアルモノナリ鍼ヲ刺ストキハ粘膠チカラ黃水ノ出ル丁脂瘤ニ同シ若久シク治セサルトキハ其毒流注シテ頸下或ハ頸下又頸ノ邊ニ腫レ出シ大サ茄子ノ如ク又甜瓜ブリクワノ大サニ至ルモ有リ皮色微シモ變セス焮熱疼痛等モ

無ク全ク癰瘤ニ似タリ右手ヲ以テ腫上ヲ壓シ左手
ヲ以テ痰泡ヲ按シ内外ヨリ互ニ相按スルヲ緩急抑
揚シテ試ルトキハ内外相通シテアルヲ分明ニ知ル
ベシ又外ノ腫上ヲ刺ストキハ粘稠ノ黃液出テ、舌
下ノ腫モ從テ消シ舌下ノ腫ヲ刺ストキハ外ノ腫モ
亦從テ消スル丁外腫ヲ刺スニ同シ以上ノ徵候ニ因
テ考ルニ實ハ舌下ノ脂瘤ニテ必シモ痰ノ留滯シタ
ルニハ非ス服藥吹藥等ハ一切寸効ナシ截断ノ法ヲ
上策トス○治法舌下ヲ刺シテ黃液ヲ去ルトキハ一
且ハ治スレトモ鍼口ノ愈ルニ從テ又黃液溜リテ再

發シ至極治シ難キモノナリ予ハ新作意ニテ鍼口ヘ
剪刀ヲ入レテ膜ヲ柿核ホト剪ミ去ルトキハ復黃液
ヲ蓄ヘス創口ヘ金鎖ヒヲ吹キ涼膈散加石膏ヲ用フ
ルトキハ全愈シテ再發セス外へ腫レ出シテ癰瘤ノ
如クニナルモノハ外ヨリ刺シテ黃液ヲ去リ破歟ハ
イチヤニ赤汞丹ヲ塗テ挿入スヘシ黃液日ニ減シテ
内外共消スルナリ或ハ刺シテ後却テ焮熱腫痛ヲ起
シ稠膿ノ多ク出ルアリ驚クヘカラス破歟メイチ
ヤヲ一日ニ二度ワ、モ挿更ルトキ膿水自カラ減シ
テ愈ルナリ内服ハ紫胡加石膏ニ宜シ

痰泡主治方

涼膈散加石膏 小紫胡湯加石膏 金鎖ヒ 破敵
赤汞丹

重舌

重舌ハ俗ニ云フ「ゴシタナリ大人ニ少ク小兒ニ多シ
舌下ヘ息肉ヲ生シ尖起シテ舌端ノ如シ長サ七八分
ニ至ルモアリ左右ヘ二片ニナリテ生スルモアリ或
ハ數片ニナリ舌本ヲ圍^{トリヤキ}テ蓮花ノ形ニ出ルモノヲ蓮
花舌ト云フ何レモ一病ナリ腫痛シテ舌モ木強ニ十
リ言語飲食等モ不自由ニテ多ク涎ヲ流シ頷下ニ核
ヲ結ヒ大サ梅子ノ如クニシテ痛ミ或ハ色ヲ變シ或
ハ膿ヲ成スモアリ幼少ニテ未タ言^{モイ}ス痛所ヲ告ルト
ノナラヌモノ卒ニ乳ヲ哺ス但氣ムツカシク涎ヲ多

ク流シ頸下ノ漫腫スルモノハ必重舌ナリ常ニ診法ヲ心得テ治法ヲ誤ルヘカラス下總佐倉ノ藩臣勝間為五郎ト云フ者アリ舌下微腫シテ痛ミ一醫ヲ引テ治セシムルニ重舌ノ類ナリトテ吹藥ヲ點スルニ一夜大ニ痛ミ自潰シテ一箇ノ石ヲ出シ痛ミ失スルカ如クニ愈エ瘡痕凹ニシテ菽ヲ容ルヘシ石モ菽ノ大サニテ堅シ予其石ヲ乞フテ近頃マテ歲セシニ類焼ノ時鳥有トナレリ又下總佐原ノ一醫ノ療治ニ一男子舌心ニ小核ノアルト數年漸大ニナリテ初テ痛ヲ發ス醫刺シテ血ヲ出スニ一片ノ石創口ヨリ出テ、

愈タリト友人山本貞淳ノ物語ナリ古書ニ瘡石癖石石瘕等ノ丁アレ氏舌ヨリ石ノ出タルコトヲ言ハス崎陽ニ游學ノ時西洋醫シイホル止ニ此事ヲ物語シニ「トンク。ステイン」ト云フ病ナリト云ヘリ後ニ杉田錦腸翁ノ譯セシ「ブレンキ」ノ外科書ヲ讀ムニ其事ヲ載セテ舌石ト譯シテアリ珍シキ丁ナリ初發ハ重舌ナトニモ混シ易キモノナレハ此ニ記ス○治法先患處ヲ刺シテ血ヲ出シ氷硼散。金鎖ヒノ類ヲ吹キ涼膈散加石膏。尚足飲ヲ撰用スベシ寒熱ノアルモノハ柴胡加石膏ニ宜シ又頸下へ發泡ヲ施スヘシ若キ手段

ニテ治セサルトキハ息肉ヲ剪断シテ前法ヲ用フヘ
シ舌下ナリトテ遠慮スルニ及ハス縦意ニ鍼刀剪断
ノ術ヲ施シテ害ヲナサス

重舌主治方

涼膈散加石膏 尚足飲 小紫胡湯加石膏 水硼散
金鎖匕 發泡

木舌

木舌ハ木強ニシテ柔和ナラサルノ意木腎ナト、同
義ナリ發熱惡寒シテ舌丸クナル程ニ腫レ短ク縮リ
テ齒牙ノ外ヘ出ス木強ニシテ卷舒スルノ能ハス胎
厚クシテ黃色或淡黑色ニナリ牙關微ク緊急シ縱意
ニロヲ開クノ能ハス第一ニ飲食ヲ妨ケ甚者ニ至テ
ハ幾藥餌ヲ絶シ痰涎多ク出テ、咽喉ヲ閉塞シ呼吸
ノ邪魔ニナリ又舌ヘモ粘著シテ吐ケトモ出テス呑
トモ下ラス箸ニテ搦取ニ粘稠テ断ヌモノナリ聲音
モ低ク言語モ含糊トシテ分明ナラス微痛スルモノ

モ有レトモ痛ミノナキ者多シ藥ノ能ク通ラヌ病ユ
ヘ療治モ思フヤウニナラス因循ト日ヲ延愈カ子ル
モノナリ重證ニ至テハ痰涎ニテ呼吸ヲ絶チ卒死ス
ルモノ有リ至極危險ノ病ナレハ油斷ナク注意シテ
療治ヲ施スヘシ一男子年四十二歳適瘡ヲ患フ嚮ニ
モ數回瘡ヲ患シユヘ格別ニモ思ハス居ルニ一日食
ニ臨テ噎シテ下ラス悶絶シテ死ナントス予診スル
ニ脉浮ニシテ數ナラス舌木強ニシテ卷舒セス短縮
シテ歯牙ノ外ヘ出テ斯胎厚クシテ米粉ニテモ傳ル
力如ク粘稠シタル痰涎口舌咽喉ヘ膠固シ愈吐ケハ

愈出テ遂ニ除キ去ルト能ハス語言モ分明ニ云フ
ナラス牙關緊急シテ口ヲ開ケトナラス腹ハ飢レト
モ飲食スルト能ハス糊飲一酒盞ヲ一日ノ食トスソ
レモ坐シテハ飲トナラス強テ飲トキハ鼻ヨリ出ワ
仰卧シテ徐ニ滴スノミ服藥モ亦此法ニテ入ル、
故一小盃ニ過キス初ハ甘桔湯加山豆根ヲ與ヒ冰硼
散ヲ水ニ解キ舌上ニ點シ額下ヘ發泡ヲ施スニ寸驗
ナシ後ニ涼膈散加石膏ヲ與フ又効ナシ疲勞日ニ加
ヘ肉燶骨立シ荏苒トシテ日ヲ延キ二十餘日ニ至リ
自分モ死ヲ決シ親屬ニ後事ヲ託スルニ至レリ予モ

他ノ伎倆ナキユヘ矢張前法ヲ用ヒテ堅守スルニ諸證漸々ニ緩ミ飲食モ少シツヽ通ルヤウニナリ五十餘日ヲ經テ全愈ス氣力ノ故ニ復スルマテニテハ百日ニ及ヘリ一兒年二歳卒ニ乳ヲ哺セス母強テ乳頭ヲ児ノ口中ヘベテ勧ルニ但含タルノミニテ一口モ哺セス乳ヲ杯ニ絞リテ與フルニ常ノ如クニ飲ミ外ノ食餌モ常ノ如クニ食シ又乳汁ヲ嫌フニモ非スト見ヘテ常ニ乳頭ヲ含ムトヲ求ム母ハ乳房脹リテ難儀ユヘ醫ヲ更チ色ニ療治スレ疋寸驗ナシ終ニ乳ヲ哺セス母モ其内ニ乳汁出ヌヤウニナリ惟糊飲軟

飯ノ類ヲ調理シテ養育セリ何故ニ乳ヲ哺セザル事カ知ルベカラス當時熟視スルニ乳鵝風。鵝口瘡。重舌等ニモ非ス若木舌ノ類ニモ有リヤ此ニ書シテ後攻ニ備フ○治法内藥ハ尚足飲涼膈散加石膏。甘桔湯。加山豆根。甘露飲ヲ撰用スヘシ外用ハ冰硼散。金鎖七等ヲ水ニ解テ塗ルヘシ頷下及耳下ヘ發泡ヲ施シ舌下ノ絡脈ノ怒脹シテ紫色ニナリタルヲ刺シテ血ヲ瀉スヘシ諸藥効ナクシハ本事方ノ治木舌方奇驗アリ

木舌主治方

治木舌腫脹方 本事

玄參

升麻

大黃

犀角各三分

甘草半兩

右五味水煎服。

尚足飲
涼膈散加石膏
甘桔湯加山豆根
甘露飲

冰硼散
金鎖七
發泡

鵝口瘡 燕口瘡

鵝口瘡ハ俗ニシラシタト云フ小兒初生ノ病ナリ初
發ハ舌上及ヒ上脣ニ班々ト白點ヲ發シ乳瀆ニテモ
付タルヤウニ見ユルモノナリ二三日ノ内ニ口舌及
唇マテモ一圓ニ白ク米粉ヲ敷タルヤウニナルモノ
ナリ舌腫痛シテ不自由ニナルト見ヘテ乳ヲ吸カ子
或ハ一向飲マヌモアリ久シク愈サル寸ハ啼叫シテ
止マス遂ニ驚癇ヲ發スルトモアレハ忽略ニセスレ
テ早ク愈スヲ專務トス大人ノ鵝口瘡ハ微ク因ヲ異
ニス癰疽溫疫痢病久シク愈ス及産後等ニテ虛脱シ

タル者ニ有リ口舌腫痛シテ白點ヲ生シ眞白ニナリ
テ米粉ヲ敷カ如シ飲食モ一向ニナラヌ様ニナリ至
極ノ虚候ニテ治シ難シ白砂胎ト云フモ此證ヲ指ス
ナルヘシ但鵝口瘡ノミ悪候ト為スニ非ス一體本病
力大病ユヘ治シ薦ルナリ

燕口瘡ハ病源候論ニ載ス俗ニ鵝ニ灸ヲ炷ラレタリ
ト云フ左右ノロ吻腐爛テ白クナリ灸瘡タルニ似タ
リ常ニモ痛ミ欠ニモ笑フニモ裂ル氣味ニテ痛ミ難
儀ナルモノナリ小患ナレ止久シク愈カ子ルナリ大
人ニモアレ止先幼少ノ者ニ多シ

小兒唇ノ周圍赤クナリ丹毒ノ如ク肌膚ト齊クシテ
微モ腫レス微ニ痛痒アリ舌ニテ舐リ潤セハ姑ク愉
快ヲ覺フ故ニ常ニ舐リテ止マス愈舐ルニ從テ愈蔓
延シ舌ニテハ届カヌヤウニナリ手背ヲ舐テ潤スニ
至リ半面赤フシテ染ルカ如ク至テ治シ難シ○治法
鵝口瘡ハ金鎖匙ヲ井華水ニテ解キ筆ニテ患處へ點
スルヲ一日ニ五六次甘連大黃湯ヲ與フ若シ此法ニ
テ驗ナキ寸ハ草兵丸ヲ與ヒ冰硼散ヲ水ニテ解キ點
スルヲ前法ノ如クニス燕口瘡ハ乳香散ニ宜シ唇ノ
周圍赤色ニ變スルモノハ神水膏ヲ患處ニ摩擦シ尚

足飲ヲ與フヘシ

鵝口瘡主治方

甘連大黃湯

金鎖匙

冰硼散

乳香散

草兵丸

尚足飲

神水膏

牙疳

牙疳ハ齦縫消爍シ歯牙宣露スルニヘ又宣露風ト名ケ亦牙宣トモ云フ俗ニ「ハクサ」ト云フ初發惡寒發熱頭項強痛等ノ症アリテ感冒ノ如ク齦縫腫痛シテ黙色ニ變ス試ニ指ニテ齦縫ヲ按ニ膿血微ク出テ氣息甚臭ク顎頰下邊ニ累クト核ヲ結ヒ諸症輕粉劑ノ瞑眩ニテ口中ノ腐爛スルニ似タリ漸久キ寸ハ齦縫肉脱シテ齒牙動搖シ或ハ脱落スルモアリ小患ナレバ至テ治シ難キモノナリ時ニ因テ緩急ハアレバ決シテ膿ノ止ムトナシ日久クシテ歯牙盡ク脱落スル寸

ハ膿自ラ止ムモノナリ因テ考ルニ此ノ病ハ其毒齒根ニ附テ有エヘ治シ難キナリ附骨疽ノ毒ノ骨ニ附テ治シ難キト同シ癰瘡へ輕粉劑ヲ用フルニ齒牙ノ有モノハ齦縫必ス腐爛シ齒牙ノ無キモノハ微モ腐爛セス牙疳ノ齒牙脱落シテ膿ノ止ムハ此ノ意ヲ推テ知ルヘシ

走馬牙疳ハ牙疳ノ急症ナリ走馬ハ迅速ノ義ニテ急喉痺ヲ走馬喉痺ト云フニ同シ自然ニ發スル者モアレ氏先痘瘡麻疹ノ後ノ餘毒ニテ發スル丁アリ痘瘡起脹灌膿ノ頃ニ至リ數切齒カギルヲシ氣息ノ臭キモノハ

後ニ牙疳ヲ發スルノ候ナリ此症ノ初發ハ寒熱疫ノ如ク齦縫腫痛シテ紫暗色ニ變シ乍潰爛シテ膿血ヲ出シ或ハ紫血ノミ大ニ逆リ齒牙動搖シテ多ハ脱落シ其毒唇舌及ヒ顎頰へ浸淫シ硬ク腫レテ黒靨ニナリ臭水ヲ流シ幾處モ孔ヲ穿チ或ハ兩頰共ニ脱落シテ口中ノ洞カニニ見ユルヤウニナリ或ハ唇ヨリ鼻マテ脱落シ臭氣益甚ク一室ニ満ルニ至ル舌上厚ク黑胎ヲ生シ痰涎口舌ニ凝滯シ六七日ニシテ死ス或ハ十餘日ニシテ死スルナリ家嚴研堂先生ノ療治シタル中ニ某氏兄弟三人一時ニ牙疳ヲ發ス其熱疫ノ如ク

齦縫腫痛腐爛シテ膿血流出シ其勢迅速ニシテ即ち
馬牙疳ナリ日ニ齒齦ヲ刺テ血ヲ出シ崑崙散ヲ傳ケ
尚足飲ヲ與ヘテ皆愈ユ三人一時ニ牙疳ヲ發スルハ
不審ナリ痘瘡麻疹モ一種ノ雜氣ニテ痘疹ノ後ニ牙
疳ヲ發スルニ因テ考レハ是等ノ證ハ雜氣ニ感シタ
ルナルヘシ○治法緩急二症共ニ至テ治シ難シ諸方
書ノ方法ハ勿論諸名家ノ禁方及俗間ノ妙藥等マテ
モ試ノ凡一百餘方ニ至レ氏未タ根治スルノ良術ヲ
得ス然レ氏歷驗スル所ノ手段ニテ十中ノ一二ヲ治
スヘシ初發齦縫腫痛シテ寒熱甚キ者ハ齦縫ヲ刺シ

テ血ヲ出シ金鎖匙ヲ傳ケ尚足飲涼膈散ヲ撰用スヘ
シ久シク愈スシテ齦縫消爛歯牙宣露スル者ハ乳香
散崑崙散ヲ傳ケ甘露飲ハ珍湯ヲ撰用スヘシ走馬下
疳ハ齦縫ヲ刺テ血ヲ出シ涼膈散加石膏犀角ヲ與ヘ
紫雪ヲ兼用トス便秘スルモノニハ草兵丸ヲ與フヘ
シ又含嗽劑ニテ數口ヲ嗽キ金鎖匙ニ人中白ヲ加ヘ
テ傳ケヘシ黃連解毒湯加犀角三黃湯加石膏犀角等
ヲ撰用スヘシ若頤頬マテモ腐敗スルモノハ疔瘡ノ
門ヲ参考シテ治法ヲ施スヘシ

牙疳主治方

尚足飲

涼膈散

甘露飲

黃連解毒湯加犀角

角

三黃湯加石膏犀角

含嗽劑

草兵丸

紫雪

千金翼

金鎖匙

乳香散

嵐峯散

附牙癰

附牙癰ハ準繩ニ出ツ又牙癰正云フ又百効方ニ牙癰風ト見ニ此病陰陽ノ二證アリ陽發ノ者ハ初起齒根痛ミ齦縫急ニ焮腫熱痛シ五六日ニシテ自カラ潰爛ス癰ノ形ニナリテ膿血流レ出テ臭氣ヲ生シ齒牙動キ或ハ脱落スルモアリ其毒唇ハ勿論額下及頭面ニ波及シテ微腫スルナリ惡寒發熱頭痛等モアリ此證立馬牙疳ニ疑似シキヤウナレ此牙疳ノ毒ハ全齒ニ發シ此證ハ必ス一部分ヲ定メテ發ス此其ノ差別也得ト診法ヲ詳ニシテ治法ヲ誤ル丁ナカレ陰發ノ者

ハ老人ニ多シ初發齒齦硬ク腫テ久ク消セス數月ヲ
經テ自ラ潰ヘ稀膿瘀水滴瀝トシテ出テ漸ニニ瘡口
濶大ニナリ小息肉簇生シテ瘡中一杯ニ盈千其形鰐
魚ノ縁ニ似タリ金鎖匙。冰硼散。嵐崙散ノ類ヲ頻ニ外
用スレ止微モ消磨セス瘡口ノ漸大ニナルニ從テ小
息肉モ亦愈多クナリテ穢氣薰蒸ス乃翻花ナリ遂ニ
齒牙脱落シ膿血止ス身體羸瘦飲食減少シ疲勞ヲ極
テ死ス愚按スルニ陽發ノ者ハ王肯堂ノ所謂附牙癰ニ
ニテ治スヘシ陰發ノ者ハ春林軒ニテ唱ル附牙癰ニ
テ治セス陰發ノ證ハ實ハ翻花瘡ニテ古ニ云フ附牙

癰ニ非ス今姑ク師說ニ從テ陰發ノ證ヲモ此ニ載ス
○治法陽發ノ者ハ日ニ刺シテ膿血ヲ去リ跡ヘ金鎖
匙ヲ傳ヘシ内服ハ尚足飲涼膈散加石膏清胃散等ヲ
撰用スヘシ齒牙ノ脱落スルヲハアレ止死スヲハ決
シテナシ陰發ノ者ハ舌疽ノ類ニシテ百死一生ナシ
姑ク嵐崙散ヲ外用トシテ清胃散甘露飲附子理中湯
ノ類ヲ撰用スヘシ

附牙癰主治方

清胃散(準繩) 治膏梁積熱唇口腫痛。齒齦潰爛。焮痛連頭
面。或惡寒發熱。

升麻二錢 生地黃 牡丹皮 黃連

當歸

酒洗各一錢

右五味水煎痛未止石膏之類可量加

尚足飲

涼膈散加石膏

甘露飲

附子理中

湯

金鎖匙

冰硼散

嵐崙散

齲齒

齲齒ハ素問ニ出ツ史記倉公傳ニモ齊中大夫病齲齒
ト見ヘテ古ヨリ有ル病也俗ニムシハト云フハ齒牙
ノ朽タル處ヘ蟲ノ生シタル義ニテ說文ニ齲ハ蟲ナ
リト云ニ本キテ名ケタルナルヘシ又ムシハ熱ノ蒸
ス義也ト云フ說モアレモ穩ナラス此病ハ齒牙ノ病
テ自ラ枯ル、ナリ齒牙枯ル、寸ハ無用ノ長物トナ
リテ竹木刺ノ肉中ニ在ト同様エ工疼痛ヲ發スルナ
リ初發飲食スル毎ニ冷物熱飲ナト大ニ染ミ硬物ヲ
食スル寸ハ疼痛シ漸久シテ齒牙焦黒色ニ變シ潤澤

ヲ失ヒ或ハ朽テ孔ヲ生シ或ハ齒牙片ニ碎ケテ牙根ノミ齦中ニ残リ或ハ朽タル孔ノ中ニ食物瘀滯腐敗シテ細蟲ヲ生スルトアリ發スル寸ハ痛ニ甚シテ飲食モナラス言語モナラヌ程ノモナカリ遂ニ煩ニ^{トボクニ}腫レ出シテ痛ノ減スルトアリ敷藥等ニテ一旦愈レ^ハ數再發シテ久シク愈サル者多シ或ハ齒牙ノ自ラ脱落シテ自ラ愈ル者アリ又齧齒久ク愈スシテ遂ニ骨槽風ニ變スルモノアリ○治法世ニ妙藥名灸等多アレ^ハ寸効ヲ奏セス妙藥名灸ニテ愈タリト云フハ自然ニ愈タルニテ藥効ニアラス予モ金鎖匙冰硼散。

崑崙散等ヲ用フルトアリ姑責ヲ塞クノミニテ十全ノ効ヲ要スルニ非ス第一ノ良策ハ齒牙ヲ拔キ去ルヘシ先齒牙ノ朽タルト未^ハ朽トヲ熟視スヘシ朽牙ヲ安ニ抜ク寸ハ半ヨリ折テ根ノ脱ヌモノナリ又齒牙朽盡テ根ノミ齦中ニアルモノハ牙縫ノ内外ヲ鑷ニテ深ク切り創^{ハス}口ヘ猛汞丹ヲハレ齒齦腐蝕シ牙根ヲ露^{アラ}ハシテ後ニ術ヲ施スヘシ未^ハ朽牙モ前方ノ如ニシ穀動カシテ動ノ付キタル寸ニ術ヲ施スヘシ其術骨槽風ノ条ニ載セタレ^ハ未善ヲ盡サス其後齒牙ヲ拔丁益多クシテ其術ノ肯綮ヲ得タリ故ニ再ヒ此ニ記

ス其法醫患者ノ前ニ跪キ假令ハ左牙ヲ拔シト思ハ
ハ左手ノ食指ヲ手帕ニテ裹ミ病牙ノ内ニ當テ右手
ニテ槽柄ヲ持チ病牙ノ外ヘ當テ内外相應シテ端的
ヲ定メ一人ノ价者左側ニ坐シ木棍ヲ持チ力ヲ極メ
テ槽柄ヲ打ツ寸ハ齒牙脫然トシテ落チ痛モ亦失ス
ルカ如クニ去ルナリ跡ニテ血ノ多ク出ルモノハ金
鎖匙ヲ創口ヘ入レ紙ヲ揉ミテ其上ヘ當テ指ニテ緊
ク按ル寸ハ立ニ止ムナリ牙科ハ止血ノ法ヲ心得ヌ
ユヘ出血ニ驚キテ狼狽ル丁アリ病人モ其騒ニ懲リ
テ齒牙ハ拔マシキモノ、様ニナリタルハ歎スヘキ

トナリ予カ術ヲ會得スレハ容易ニ拔ケルナリ又大
出血等ノ患ナシ惟上牙ハ頭顱ヘ響ク故妄ニ拔クヘ
カラス得ト動シテ後ニ術ヲ施スヘシ此術十全ノ良
法ナレ凡臆病ノ者ヘハ施シ難シ其者ニハ牙縫ヲ深
ク切テ血ヲ出シ跡ヘ金鎖匙ヲ附ケ尚足飲ヲ與フヘ
シ若シ切ルト淺クシテ血出ルト少キ寸ハ却テ痛ノ
益モノナリ隨分縱意ニ切ト佳トス若此術ヲモ施シ
難キ者ニハ阿芙蓉ヲ梧桐子ノ大サ程朽牙ノ内ヘ入
ルヘシ亦阿芙蓉液ヲ内服スルモ奇驗アリ内藥ハ始
終尚足飲ヲ用フヘシ又法此病ハ頬顎ノ下邊ニ必結

核アリ強ク按スレハ齒牙ニ應スル也其結核ヲ撮ミ
上テ灸ヲ炷ル丁六七壯ニ至ル寸ハ必ス奇驗アリ又
其核ヘ鍼ヲスルモ効ヲ奏ス繆刺論ニ齒齲刺手陽明
不已刺其脉入齒中者立已ルト云ヘリ刺法モ古法ナ
リ又糞蛆退數十枚ヲ燒灰ト為シ紅絹ニ裹ミ紫テ乳
頭ノ如クニ造リ病齒ニテ緊咬寸ハ痛立ニ止ムナリ
又方巴豆或ハ丁香ヲ病齒ニテ緊咬モ亦奇驗アリ食
物ニ章魚明鱉木魚干柿等ノ物ヲ嚴禁スヘシ

齒齲主治方



尚足飲 金鎖匙 崑崙散 水硼散

阿芙蓉

芙蓉 阿芙蓉液

槽柄并木鉗圖

槽柄圓如小指。
長一夫半。一端
微瘦而成槽。可
以容齒牙以堅
木造之。
木鉗長尺許。
方二寸。亦以堅
木造之。



體氣

體氣ハ又狐臭。胡氣。腋氣。腋臭。溫瓶等ノ名アリ俗ニ「口
キカ」ト云フ身體ニ一種ノ惡氣アリテ液下ヨリ發泄
シ常ニ汗ニ化シテ潤ヒ鬱蒸シテ臭氣ヲ釀成スルナ
リ故ニ夏月暑時ノ汗多キ頃ニ甚シク冬時嚴寒ニ至
テ汗出サレハ臭氣モ亦減スルナリ少壯ノ者ノミ患
テ小兒老人ニ絶テ無シ老人小兒ハ蒸氣ノ發泄スル
少々少壯ノ者ハ蒸氣ノ發泄スルト多キ故ナルヘ
シ敷藥ニテ一旦消スレバ數日ニシテ再發シ根治ス
ルトナシ老衰ニ至レハ必ス自ラ愈ルモノナリ○治

法先ツ腋下ノ毛ヲ抜去リ銅器ニテ酢ヲ温メ清ク洗
ヒ跡ヘ檀礬散ヲ傳ヘシ又方正宗ノ五香散ニ宜シ又
方青木香石灰ノ二味ヲ細末トナシ腋下ニ敷ヘシ又
方水銀胡粉ノ二味ヲ胡麻ノ油ニ和シテ傳ヘシ又方
石灰一味ヲ三年ノ苦酒ニ和シテ傳ヘシ又方胡粉銅
青ノ二味ヲ乳汁ニ和シテ傳ヘシ腋臭ヲ治スルノ方
多クアレ氏約スルニ水銀礬石銅青石灰胡粉苦酒ノ
數品ニ過キス是トテモ一旦ノ功ヲ得ルノミニテ根
治スル工能ハス今姑治療ノ法方ヲ舉ルノミ

體氣主治方

檀礬散 叢桂 治腋臭方

白檀

枯礬

各二錢

輕粉

五分

右三味為末。溫湯洗腋下。而後塗散少許。又生陰蠶者。
將散捲毛中。即去。

五香散

正宗

沈香

檀香

木香

零陵香

各三錢

麝香

三分

右五味共為細末。每用五厘。津調。搽擦兩腋下。三日一
次。或用香末二錢。絹袋盛貯。掛於腋下。亦効矣。

瘡科秘錄卷之八 終

