續瘍科秘錄

五

十武9
407
19止

門 ヤ武9
編 407
巻 17止

續瘍科秘録卷之五

目録

顴骨疽
附圖
膿耳流注
頭瘟
蝦蟆瘟
涎嚢損傷
會厭腫
胃脘癰

解顱
附圖
蚯蚓吹
蹠戾
附圖
誤吞硝子球
莽草毒
河豚毒
礜石毒
菌毒

鴉片毒

自準亭藏

續瘍科秘録卷之五

棗軒本間先生口授
下野　川又誠
陸奥　目黒安
越後　稲葉賢　同記
常陸　石塚雄
下總　篠塚節

顴骨疽

顴骨疽ハ證治準繩ニ載セテ顴疽トモ又顴瘍トモ云フ少壯ノ者ニ少ク老大ノ人ニ多シ至極ノ難證ナ

自準亭藏

リ百丸ニシテ一生ナシ初發顴骨ノ上微ニ硬腫シテ色ヲ變セス日久シクシテ顴骨ヨリ齒牙ニ連リ隱隱トシテ痛ミ或ハ涕淚頻ニ流レ或ハ衄血數出テ宛モ偏頭痛ノ如ク又齲齒痛ニモ似タリ漸ヽ腫テ愈堅ク幾處モ凸起シテ疼痛モ亦加ヘ始テ紫色ニ變シ漸次ニ自潰シテ瘡口深ク巖岫ノヤウニナリ稀膿臭水淋漓トシテ止マス穢氣薫蒸シテ一室ニ滿チ瘡口ヨリ瘜肉翻出シ藥線或ハ腐藥ニテ之ヲ去ルニ去ルニ隨テ又生シ乳岩瘻瘤等ノ翻花肉ト同質ナリ若シ誤テ揩損スレハ鮮血迸リ出ルモノ

ナリ面貌異狀ニナリテ偏眼腫レ塞カリ或ハ瞳孔散大シテ明ヲ失シ鼻モ曲リ或ハ瘜肉ニテ鼻孔塞カリ上齶ヘモ潰エ齒牙モ脫落シ膿血滴瀝シテ口中臭ク或ハ翻花シタル肉ニテ咽喉ヲ塞キ微ニ往來寒熱シ脈沉遲或ハ細數ニナリ飲食漸減少シ苦楚日ニ加ヘ半年或ハ一年ニ至リ疲勞極テ死スルモアリ或ハ癇ヲ發シテ死スルモアリ

治法此病必死ナレハ決シテ救フヘキノ手段ナシ然レトモ療治ヲ誤ラス調理ヲ得ル時ハ苟モ歲月ヲ延フヘシ初起腫痛ノ微ナルモノハ凉膈散加石膏ヲ

服シ神水膏ヲ摩擦スヘシ漸漸ニ高ク腫レ堅硬石ノ如キモノハ仙方活命飲ニ宜シ瘡頂紫色ニ變スル寸ハ先鋒ヲ貼スヘシ潰爛翻花スルニ至ラハ破歛ヲ綿片ヘ攤テ貼スヘシ翻肉高ク出ルモノハ消疣水ヲ點シ後衝ヲ貼スレハ一旦ハ消スルナリ其證ニ應シテハ藥線ニテ緊紮スル丁アリ若シ截斷スル片ハ血ノ多ク出ル者ナレハ妄ニ刀ヲ下スヘカラス稀膿臭水多ク出テ、疲勞スル者ニハ十全大補湯ヲ專用スヘシ寒熱アリテ飲食ヲ思ハサル者ニハ補中益氣湯ヲ與フヘシ口中ヘ潰爛翻花スル者ニハ氷硼散金鎖匕ノ類ヲ吹ヘシ

顴骨疽應用方

涼膈散加石膏　仙方活命飲　十全大補湯

補中益氣湯　氷硼散　金鎖匕　神水膏

先鋒　破歛　消疣水　後衝

顴骨疽圖

又圖

岸浦亭藏

膿耳流注

膿耳流注ハ膿耳ノ流注ナリ初發ハ常ノ膿耳ニテ耳中痛ミ微シク惡寒發熱シ數日ニシテ膿出レ氏痛尚減セス寒熱彌增加シテ耳輪及ヒ耳根ノ周圍焮熱腫痛シテ頭モ半分ハ微ク腫レ偏頭痛ノ如クニ痛ミ舌ハ黃苔ニナリ或ハ黑苔ニ變シ或ハ渴シ或ハ喜嘔シテ飲食ヲ思ハス或ハ眩暈スルヿ有リ大便多クハ秘結シテ通セス七八日ニシテ先ツ耳後ニ膿ヲ成スモノナリ早ク之ヲ割開スヘシ若シ鍼ヲ刺ス度ヲ失スル氏ハ外ヘ流注シテ或ハ鼻ヘ潰

ヱ腦漏ノ如クナル者アリ或ハ耳上及ヒ耳前ヘ潰ヱ或ハ廣ク流注シテ鬢髮ノ中マテ膿ニナルヿアリ膿出テモ腫速ニ消散セス瘡口ハ盡ク耳底ヘ通スレヒ膿管曲折シテ紙撚膏及ヒ消息子モ深ク入カタキモノナリ膿ノ快出セヌユヱ或ハ腫レ或ハ消シ荏苒トシテ日ヲ延キ數月或ハ半年一年ニ及フ者アリ老人ハ遂ニ疲勞シテ死スル者有リ此證ヲ患フル者腫痛甚シキ寸ハ卒然トシテ癇ヲ發シ反覆顛倒。手足搐搦。口眼喎斜。號叫妄語。或笑或悲人事ヲ省(カヘリミ)ス直視失溲等ノ諸證蜂起スル者ハ毒ノ腦海ヘ入タルニテ必死ナリ凡頭面ノ諸病頭項打撲。偏正頭痛。結毒頭痛。解顱。疔瘡。顴骨疽。對口疽等或ハ妄ニ齒牙ヲ拔ノ類モ亦癇ヲ發スルヿノアルハ膿耳ニテ癇ヲ發スルト同シ世ニ此證ヲ頭瘟ト為ス者アリ是大ナル誤ナリ頭瘟ハ皮膚ノ病ニテ腦海ヘ内攻スルヿ無シ又此證ノ鼻ヨリ膿ノ出ルヲ見テ誤テ腦漏ト為モノアリ腦漏ハ其病腦ヨリ起テ鼻及耳ヨリ膿ノ出ルナリ此證ハ毒ノ耳ヨリ生シテ腦ヘ波及スルモノナレハ其病因判然トシテ自ラ異ナリ能ク明辨シテ治療ヲ誤ルヘカラス

治法初發耳中痛ミ寒熱強ク未タ膿ヲ成サヽルモノハ葛根湯ノ證ナレ氏凡頭面ノ諸病腫痛スル者ニハ石膏ニテ奇効ノ有モノナレハ大青龍湯。桂枝二越婢一湯ヲ撰用スヘシ膿出テモ腫痛減セス往来寒熱。喜嘔頭眩スル者ハ小柴胡湯加石膏ニ宜シ又柴胡清肝湯ヲモ用ユヘシ舌上黒苔ニナリテ乾燥シ或ハ渴シ大便秘結スル者ハ凉膈散加石膏ニ宜シ外治ハ鯨篦ニ綿ヲ纏ミ耳竅ノ膿ヲ拭ヒ去リテ潤肌油ヲ滴入スルヿ一日ニ三次スヘシ耳後耳上ニ膿候アラハ早ク割開スヘシ瘡口潤クシテ膿快ク出レハ腫痛從テ退クナリ若シ瘡口狹クシテ膿滯フル時ハ又外ヘ流注スルモノナリ瘡口ヘ努肉ヲ生スルハ猛汞丹。赤汞丹ノ類ヲ點シテ之ヲ除キ去リ膿ノ快出スルヲ専要トス鍼ヲ刺シテ後ハ托裏消毒飲ニ宜シ日久クシテ身體疲勞シ潮熱盜汗等ノ出ル者ハ補中益氣湯ヲ與フヘシ毒ノ腦海ヘ入テ鼻ヨリ膿ノ出ル者ヘハ何方ヘモ卒表ヲ加フヘシ癇ヲ發スル者ハ専ラ癇ヲ療治スヘシ實證ノ者ヘハ三黄湯加辰砂。柴胡加龍骨牡蠣湯及ヒ瓜蔕吐酒石ノ類ヲ撰用ス虚證ノ者ニハ沉香天麻湯。抑

肝散加羚羊角等二宜三

膿耳流注應用方

柴胡清肝湯正宗 治膿耳燃熱腫痛

川芎　當歸　白芍　生地黄　柴胡

黄芩　山梔　天花粉　防風　牛蒡子

連翹　甘艸節各一錢

右十二味煎服

大青龍湯　桂枝二越婢一湯　小柴胡湯加石膏

三黄湯加辰砂　柴胡加龍骨牡蠣湯　瓜蔕散

涼膈散加石膏　托裏消毒飲　補中益氣湯

沉香天麻湯　抑肝散加羚羊角　吐酒石　潤肌油

猛汞丹　赤汞丹

頭瘟

頭瘟ハ古書ニ見ヘス宋元ノ頃ヨリ唱ヘタル名ナリ多クハ大頭瘟ト稱ス又大頭腫ト名ク瘟疫論ニ雜氣ニ中リテ發スルト論シタル通リ即チ外感ナリ初發ハ惡寒發熱脈浮數ニシテ瘟疫ノ如ク頭痛甚シク頭面赤ク腫レ迅速ニ轉遷シ朝ニ右ノ耳邊ヨリ起テタニ左ノ耳邊ニ及ヒ或ハ頭項ヨリ發シテ面目ニ至リ水泡疣瘡トシテ發シ忽チ破レテ脂水ヲ流シ一旦經過シタル跡ハ腫消散シテ平肉ニナリ五六日ノ間ニ頭項耳目ノ邊ヲ一周シテ速ニ愈

ルモノヲ一通リノ頭瘟ト為ス頭瘟ハ急卒ノ病ナレ𪜈大抵治スルモノ多シ稀ニハ劇證ニテ死スルヿアリ其證表裏共ニ灼熱シ舌上黑苔ニ變シ煩渴シテ水數椀ヲ飲ミ脈洪大ニナリ胸滿喘急困睡シテ人事ヲ省ミス頭面大ニ赤腫シテ目モ閉チ耳モ塞カリ數(シバ)嘔吐シテ黃水酸液ヲ吐キ絶食ニ至テ死ス又赤腫消散シ熱モ全ク解シテ後頭痛隱隱トシテ久ク止マス數月或ハ半年ニ至ル者アリ雷頭風ヲ頭瘟ト同病ニ論シタル人モ有レ𪜈其因自ラ異ナリ雷頭風ハ第一瞳子ノ散大スルヲ定候トス頭瘟ハ頭痛甚シト雖𪜈瞳子ノ散大スルヿ無シ頭瘟ハ赤腫ノ轉遷スルヲ定候トス雷頭風ハ頭痛甚シト雖𪜈赤腫轉遷ノ證ナシ是其判然トシテ自ラ異ナル所ナリ雷頭風ハ前編頭痛ノ門ニ詳ニス宜ク參考スヘシ

治法發熱惡寒。脈浮數。頭痛スル者ハ桂枝加葛根防風湯。葛根湯ニ宜シ灼熱表裏ヘ散漫シ舌上乾燥シテ煩渴スル者ハ大青龍湯。白虎加桂湯ノ類ヲ撰用ス往來寒熱シテ喜嘔スル者ハ小柴胡湯ニ宜シ腫上疙瘩トシテ脂水ヲ流シ乍チ凝結シテ松脂ノ如ク

ニナリ頭痛止マサル者ハ防風通聖散ヲ與フヘシ
腫痛甚シキ者ハ亂刺シテ瀉血スヘシ又紫雲ヲ塗
リ或ハ中黄ヲ紙ニ攤テ貼スルモ可ナリ

頭瘟應用方

桂枝加葛根防風湯　葛根湯　大青龍湯
白虎加桂湯　小柴胡湯　防風通聖散
紫雲　中黄

蝦蟆瘟

蝦蟆瘟ハ俗ニ「ハサミハコ」ト云フ即天行病ノ一證ニ
シテ一人病ム片ハ舉家盡ク患ヒ或ハ闔鄉比屋ニ
及フ有リ初發惡寒發熱シテ風邪ノ如ク耳下ヨ
リ頰ヘ漫腫シテ微痛シ色ハ變セス初メ偏腫レテ
両方ニナル有リ或ハ左右一齊ニ腫ルヽモ有リ
此證何ホト腫レテモ膿ヲナサス頷下ニ核ヲ結テ
痛ミ喉モ腫レテ喉痺ノ如クニナリ津唾頻ニ出テ
或ハ口中乾燥シ或ハ聲啞シテ發セス大抵五六日
モ過レハ全愈スル者ナリ

治法熱強キ者ハ桂枝加葛根湯葛根湯大ニ腫レタル者ハ小柴胡湯加石膏奇驗アリ患處ヘハ中黄ヲ貼スヘシ

蝦蟆瘟應用方

桂枝加葛根湯　葛根湯　小柴胡湯加石膏

中黄

涎嚢損傷

涎嚢損傷ハ始テ證治準繩ニ見ユ涎嚢ハ即耳前ニアリテ涎唾ヲ生スルノ器ナリ素靈及千金外臺等ニ載セス葢王肯堂ノ發明スル所ナルヘシ西洋ノ解剖書ニ所謂唾管是ナリ打撲金創及瘡瘍等ニテ此器ヲ損傷スレハ涎唾瘡口ヨリ漏テ永ク愈ヘス痔漏淋漏目眥瘍ノ類ト同シ或ハ誤リ認テ骨槽風ト為ルアリ骨槽風ハ其毒齒牙ノ根ヨリ起テ病因自ラ異ナル者ナレハ混淆スヘカラス又骨槽風ノ涎嚢ヘ流注スルアリ一磨工年六十骨槽風ヲ患ヒ

前醫ノ療治緩慢ニシテ披鍼割開ノ度ヲ失ヒ其毒
咽喉及耳邊ヘ流注シ膿水淋漓トシテ多ク出テ潮
熱盜汗等ノ證アリテ疲勞日ニ加ヘ殆ト危篤ニ及
ヘリ先瘡口ヲ盡ク割開シ膿水ヲ快出セシメ病根
ノ齒牙ヲ拔去ルニ諸證速ニ退キ瘡口愈ル丁過半
ニ及ヘ𪜈但耳前ノ瘡口ノミ自若トシテ愈ヘス出
ル所ノ水ヲ熟視スルニ膿ニアラス清稀ノ水滴瀝
トシテ出テ微モ臭氣ナシ即涎囊ヲ損傷シテ津唾
ノ出ルナリ數消疣水ヲ點シ後衝ヲ貼シテ全愈ス
治法瘡口ヘ紙撚膏ヲ挿入スル丁ヲ禁シ消疣水ヲ點

シ或ハ赤汞丹ヲ傅ケ後衝ヲ貼スヘシ又前編骨槽
風ノ門ヲ參考シテ療治スヘシ

涎囊損傷應用方

後衝　消疣水　赤汞丹

會厭腫

心氣病ヲ患フル者常ニ取越苦勞シテ格別ニ患フル處モナケレ𪜈病ノアルヤウニ心得テ色色ト思慮ヲ費シ身體ヲ探索シ適指ヲ口中ヘ入レテ會厭ヲ探リ當テ固有ノ物ナルヿヲ辨ヘス妄ニ瘡瘍ノ類ト為シ常ニ氣ニ掛ケテ屢摩挲シ會厭モ亦是カ為ニ腫痛シ多ク涎沫ヲ吐キ初テ病トナリ愈摩挲シテ愈腫レ百方スレ𪜈愈ヘスシテ永ク難澁スルモノアリ愚昧ノ醫者ハ會厭ナルヿヲ知ラス重舌ノ類ト為シテ藥ヲ吹キ或ハ鍼ヲ刺スヿアリ捧腹ス

ヘキヿナリ

治法第一ニ瘡瘍ニ非ス有用ノ道具ナルヿヲ諭シ會厭ヲ摩挲スルヿヲ禁シ乳香散ヲ吹キ半夏厚朴湯ヲ與フヘシ若シ効ナキ片ハ涼膈散ヲ投シ金鎖匕ヲ吹テ專ニ腫痛ヲ治スヘシ

會厭腫應用方

半夏厚朴湯　涼膈散　乳香散　金鎖匕

胃脘癰

胃脘癰ノ名ハ素門ニ出テ古ヶ有ル疾ナレ𪜈其病候ヲ知ルモノハ勿論其名ヲ唱ルモノモ少ナシ故ニ胃脘癰ヲ患ルモノアリテモ痰飲ノ類トナシテ人ヲ誤ルハ實ニ歎スヘキヿナリ胃ト腸トハ形狀ハ異ナレ𪜈同體同用ノモノナリ故ニ腸ノ病ム片ハ胃モ亦病ミ胃ノ病ム片ハ腸モ亦病ムモノナリ假令ハ痢病ニテ下利スル片ハ必嘔吐ヲ發シ霍亂ニテ嘔吐スル片ハ必下利ヲ發スルノ類ニテ知ルヘシ腸ニ腸癰ヲ發スルヿアレハ胃ニモ亦胃脘癰ヲ發

スルヿ必有ノ理ナリ胃脘癰ノ候最初胸膈ノ内隱
隱トシテ微痛シ飲食膻中ノ邊ニ滯リテ下リ難ク
懊憹シテ乍チ吐キ出シ或ハ飲食半途ニ窒碍シテ
上ヘモ出テス下ヘモ下ラス只多ク涎沫ヲ吐キ宛
モ膈噎ノ如シ其患狀ヲ熟察スルニ二口三口ハ強
テ呑ミ下セヒ胃管ニ滿ルヒハ乍チ吐逆スルニ似
タリ胃口ノ腫テ開カサル故ナルヘシ數日ノ間ニ
疾增加シテ時時欬嗽モアリ屢涎沫ヲ吐キ口舌乾
燥シテ冷水ニ漱キ晝夜ニテハ水數斗ヲ傾クルニ
至ル漸漸ニ口中ノ腥臭ヲ覺ヘ涎沫ヘモ膿血ヲ交

ヘ項背強リ頭痛モアリ惡寒發熱モアリ脈浮數ニ
ナリ虛里ノ悸動築築トシテ亢ク呼吸促迫シ後ニ
ハ一滴ノ水モ飲ムヿヲ得ス若シ一滴ノ水咽ニ下
ルヒハ煩悶ヲ發シ反覆顚倒シテ死セント欲スル
ニ至ル遂ニ飲食ハ勿論水藥ヲモ絶チ十餘日ニシ
テ死スルモノナリ予モ初ハ膈噎ノ急證ト心得タ
レヒ屢經驗シテ胃脘癰ナルヿヲ知レリ

治法藥ノ飲メヌ病ユヱ外ニ手段ノナキモノナリ桔
梗白散。甘草桔梗湯。麻杏甘石湯。凉膈散加石膏等試
用シタレヒ反テ苦惱ヲ加ルノミニテ寸効ヲ得ル

「能ハス又一時ノ新工夫ニテ沈香。艾葉。乳香。没藥等ヲ薫劑ト為シテ嗅シメ又西洋ノ「ハンテルマチセ」法ヲ用テ臑ニ發泡ヲ施シ龍腦麝香等ノ細末ヲ附ケ遊奕ニテ葢ヒ繃帶ヲ施シ種痘ノ法ノ如クニシテ藥氣ヲ入レタレ𪜈是モ亦寸効ヲ得ル「能ハス實ニ必死ノ疾ト謂フヘシ

解顱

解顱ノ名ハ初テ病源候論ニ出ツ頭顱ノ開解スル病ユヱ解顱ト名ツク先ツ必死ノモノト定ムヘシ發シテ後二三月ニシテ死スル者アリ或ハ半年一年ニシテ死スルモノアリ至極ノ輕證ナレハ𤸷倖ニ死ヲ免カルヽ者モアレ𪜈成人ノ後モ頭大ニシテ身體不相應ニ見ユルモノナリ大抵初生二三月ノ間ニ發スルモノ多シ初發ハ顖門高ク脹リ出シ頭ノ皮一圓ニ張テ晃晃トシテ光リ青筋怒脹シ黑睛ハ下ヘヨリテ白眼ノミ多クナルナリ頭顱ハ前後

左右ヨリ湊合シタルモノユヱ開解スルニ從ヒ湊合シタル界(サカヒ)ハ溝(シヽ)ヲナシ指ヲ没スルヤウニナリ其開キタル隙ヘ頭腦張リ出シ柔軟ニテ手ニ應ス頭ノミ次第ニ大ニナリ後ニハ胴ヨリモ大ニシテ且重ク總體ノ釣リ合惡ク抱クモナラヌホトニナリ四肢ハ瘦セ元氣モ惡ク乳哺モ減少シ遂ニ驚癇ヲ發シ四肢搐搦(ヒキツリ)直視上竄(ウワツ)口眼喎斜等ノ證ヲ發シ數(シバ)發作スルニ從ヒ漸漸ニ疲勞シテ死ス又初ニ驚癇ヲ患ヒ後ニ解顱ニナルモノモ有リ

治法古人ノ論ニ小兒ハ腎氣未成ユヱ多ク此病ヲ患フ腎ハ骨髓ヲ主リ頭腦ハ骨髓ノ根本ユヱ腎氣成ラサル寸ハ頭腦モ亦不足ニシテ開解スルト云ヘリ愚按ニモ腦病ノヤウニ思ハル試ニ解顱ノ顱門ヲ刺スニ必痰水流レ出テ腦モ腐敗シテ豆腐ヲ碎キタルヤウニナリテ出ルナリ因テ考フルニ頭腦腫レ痰水停蓄シテ頭顱合縫ノ開解スルナリ骨ノ病ニハ非スト知ルヘシ古方ニ棉布ヲ以テ頭顱ヲ緊束シテ保合スルノ術アレ𪜈臆度ノ療治ニテ實驗ノ法ニ非ス何程緊縛シテモ腦髓ノ腫消シ痰水去ラサレハ頭顱吻合スルノ理ナシ此病必癇ヲ發

シ又癇ヨリ此病ニ變スルモノアレハ解顱モ亦癇ノ一證ナルヘシ上文ニモ云フ通リ難治ノ病ナレトモ治法ヲ盡シテ百死ニ一生ヲ求ムヘシ古人ハ腎氣ノ未タ盈タスシテ腦海ノ虛シタル見込ニテ六味地黄丸加鹿茸。八物湯。補中益氣湯等ヲ用ヒ顱門ヘ天南星ノ末ヲ糊ニ和シテ貼スルノ法アリ青洲先生ハ葛根加朮烏湯ヲ用ヒテ敗液ヲ驅除スルヲ專一トセラル予ハ癇ノ見込ニテ羚角飲ヲ與ヘ頭上ヘ龍腦水ヲ摩挲シ又石灰水ニテ蒸スナリ便秘スルモノヘハ草兵丸ヲ與フヘシ先年江戸僑居ノ

頃堺町ノ觀物場ニ解顱ノ出タル一アリ年三歳ニシテ頭顱ノ大サ茶鐺ノ如ク頭重クシテ須臾モ坐スル能ハス又抱クヿモナラス終日蒲團ノ上ニ仰卧セシムルノミ

解顱應用方

羚角飲（高階家試）治驚癇

羚羊角　柴胡　當歸　川芎　釣藤　白朮
茯苓　甘艸

右八味煎服

龍腦水　散腫消瘀

解顱圖

火酒九十六錢　龍腦二錢

右二味研和摩擦患處

六味地黄丸加鹿茸　八物湯　補中益氣湯

葛根加朮烏湯　石灰水　草兵丸

蚯蚓吹

小兒ノ腶卒ニ腫テ硝子ノ如クニナルヿアリ世俗ニ蚯蚓ニ小便ヲ注瀉テ腫レタルナリトテ其蚯蚓ヲ尋子テ洗ヘハ自ラ愈ルト云ヒ傳ヘリ本艸綱目蚯蚓ノ條ニ云今小兒陰腫多以為此物所吹又吹火筒條ニ云小兒陰被蚯蚓呵令婦人以筒吹其腫所トアレハ世人ノ言モ本ツク所ナキニアラサレ𪜈予此事ヲ實驗スルニ一兒モ蚯蚓ニ吹カルヽ者ナシ小兒ハ腶ヲ玩弄スルヿ常ナレハ戯ニ自ラ皮ヲ剥ク モアリ或ハ他ノ兒童ノ為ニ剥カルヽモアリ或ハ

看護スル女子年頃ニナリ春竇自ラ動キ戯ニ小兒ノ腔皮ヲ剥クヿアリ極幼稚ノ兒ノ蚯蚓吹ヲ患ヲルハ皆人ノ為ニ剥カルヽナリ初ハ手輕ク剥ル者ナレ𪜈小兒ハ皮ノ口狹窄ナルユヱ龜稜ノ太キ處ニ至リ縊レテ鐔ノヤウニナリ故ニ復シカ子痛ミテ大ニ腫レ小便ノ通シヲモ妨ケ難儀スルナリ此證特小兒ノミニ非ス大人ニモ度度アルヿナリ大人ノ色莖ヲ近世ノ俚語ニ「ユチゼン」ト稱シテ大ニ耻ルヿナリ故ニ自ラ强テ皮ヲ剥キ大ニ腫テ熱痛シ後悔スレ𪜈故ニ復シ難ク醫ノ療治ヲ請フヿア

リ自分モ耻テ其因ヲ明サマニ告ルヿ能ハス醫モ蚯蚓吹ノヿヲ心得ヌモノハ黴毒トナシテ粉劑等ヲ與ヘ大ニ難儀スルヿアリ小兒ハ其儘ニ置テモ大害ハナケレ𪜈大人ハ腫レタル處頑固シテ甚タ難澁スルヿアリ早ク皮ヲ故ニ復スルヲ專要トス治法先ツ腫處ヲ亂刺シテ水ヲ絞リ去リ腫脹ノ弛ミタル處ニテ醫左手ニ陰莖ヲ握リ引キ出ス氣味ニシ右手ノ大拇指ニテ龜頭ヲ押シ込ミ左右ノ手ニテ互ニ按排シ其疼痛スルヲ顧ミスカヲ極テ故ヘ復スル寸ハ乍チ痛ミ去リ腫モ從テ消スルナリ跡

ヘハ中黄ヲ貼スヘシ内服ハ猪苓湯加大黄ヲ宜シトス又小兒ヲ襁負シタル時股被服ニテ擦損シ水泡ニナルヿ有リ又蚯蚓吹ノ皮ヲ直ニ故ヘ復シテモ股ノ少シク腫ルヽモノナリ是等ハ皆中黄ニテ治スルナリ

蚯蚓吹應用方

猪苓湯加大黄　中黄

蹶戾

小兒生レテ一脚或ハ兩脚共ニ蹶ノ内ヘ乖戾スルモノアリ稍成長シテ歩行(アリシ)頃ニ及ヘヒ蹶横ニナリテ直ニ歩行ヿ能ハス木履艸履ヲモ正シク着ヿヲ得ス大人ニナリテモ杖ニ扶ケラレテ歩行シ終身癈人ニテ終ルモノアリ實ニ可憐ヿナリ醫書ニ此事ヲ載セス漢書賈誼傳ニ跽盭トアルハ是ナリ其因ヲ考ルニ胚胎ノ時其母鎮帶ニテ緊シク腹ヲ縛リ或ハ顛仆等ニテ兒ノ居様ヲ誤リ惡ク癖ノ付キタルナリ古ヨリ廢人ニ定メテ其治法ヲ工夫スルモ

自雄亭藏

ノ無シ予カ新工夫ニテ數人ヲ療治スルニ皆全愈シテ平人ノ如クニナリ少シモ斧鑿ノ痕ヲ遺ス者ナシ

此術初生ノ時速ニ施スヘシ成長シタルモノハ療治スルモ治シ難シ其法一人ノ价者小兒ヲ膝上ニ載セ動カヌヤウニ緊シク抱クヘシ又一人ノ价者左手ニテ脚腕後ヲ緊シク握リ少シモ動カサラシメ右手ニテ兒ノ脚腕前ヲ持チ徐徐ニ檍栝シテ乖戾ヲ正シ常ノ足ノ如クニスル寸ハ外踝ヘ皮襞積シテ有餘ヲ生スルナリ醫左手ニテ有餘ノ皮ヲ撮ミ

上ケ右手ニ反剪カヲ把テ剪断シ創口ヲ缺唇鍼ニテ小鍼ニ縫ヒ合セ餘ハ金創ノ法ノ如ク雞子白金公水棉布ヲ各一片ツヽ貼シ其上ヲ先鋒ノ棉布ニテ蓋ヒ又其上ヲ棉布ニテ輕ク卷キ別ニ甲乙ノ二帶ヲ製シ創口ノ開カヌヤウ檍栝ノ撚ノ復ラヌヤウニ繃縛スヘシ甲帶ノ法棉布幅七分長サ八寸ニ裁シ一端三寸許ヘ遊奕ヲ攤ヘ趺陽ノ邊ヘ粘シ蹠ヲ一二廻シテ一端ハ足心ヲ過テ外側ヘ出ス乙帶ノ法先ツ長短二帶ヲ裁シ長帶幅七分長サ九寸短帶ハ幅七分長サ七寸ニ裁シ短帶ノ一端ヲ長帶ノ

中央ヘ縫ツケ丁字形ニ製シ長帶ノ兩端三寸許ヘ遊奕ヲ攤ヘ兒ノ膝上ヲ左右兩端ニテ互ニ轉廻シ固ク粘著セシメ少シモ動カヌヤウニスルヲ肝要トス短帶ハ其儘脚ノ外面ヘ下ケ甲乙ノ二端ヲ合シテ結束スヘシ結束ノ法緩急適宜ニシテ檻栝ノ弛マヌヤウニ工夫スヘシ療治シタル日ハ至極大切ニテ缺唇ノ療治ト同樣ニ心得テヨシ夜モ父母ハ眠ラスニ意ヲ注キ足ヲ物ニ觸レヌヤウニ繃帶ノ弛マヌヤウニスヘシ若シ緩ム寸ハ結ヒ直スヘシ明日更貼ニ繃帶ヲ解クトキハ亦一人ノ价者ヲシテ兒ノ脚腕ノ前後ヲ持チ檻栝シ創口ノ開カヌヤウニ將息スヘシ第四日ニ至ラハ前衝ヲ貼シ第七日ニ至リテ絲ヲ去リ創痕ヘハ遊奕ヲ棉布ヘ攤テ貼シ甲乙繃帶ハ續テ施スヘシ大略五十日ヲ經ルトキハ蹶形常ニ復スルモノナリ少シモ乖戾セヌヤウニ成リタルヲ見定テ繃帶ヲ去ルヘシ

蹶戾應用方

雞子白　金公水　先鋒　前衝　遊奕

蹶戾圖





甲乙繃帶抹墨
即攤膏處

甲乙繃帶兩端相
結束勿少弛

誤呑硝子球

同藩某氏ノ男年十四習字ノ席上ニテ硝子球ヲ含弄シ誤テ呑ミ下シ尚胸膈ノ間ニ留滯スルヲ覺フ吐ケヒ出テス呑メヒ下ラス深ク念ニ懸テ止マス一二日ノ後發熱惡寒黙黙トシテ飲食ヲ欲セス同僚藤谷春永疫ト為シテ球ノ致ス所ニ非サルヿヲ諭セヒ本人及ヒ家人共ニ其言ヲ疑ヒ更ニ予カ療治ヲ請フ予診スルニ脈浮數ニシテ寒熱交起リ咳嗽喘急等アリ疫ニ相違モナキヿユヱ小青龍湯加石膏ヲ與ヘ球ノ害ニ非ザルヿヲ辨スルニ亦予カ言

フ信セス再ヒ療治ヲ藤谷ニ託スルニ荏苒トシテ
諸證退カス加之盜汗多ク出テ羸瘦日ニ加ヘ勞狀
備リタルユヱ藤谷モ勞ノ見込ニテ緩疾湯ヲ與フ
ルヿ數月ニシテ諸證過半退キタル頃四花患門ノ
灸ヲ炷ヘ几案ニ據テ熱痛ヲ忍フニ一聲喝ト云テ
忽チ硝子球ヲ吐キ出セリ球胸中ニアルヿ已ニ八
十一日其色幽黯ニ變セリ球出テ後ハ神思愈快爽
ニナリテ速ニ全愈セリ予因テ按スルニ某ノ疾疫
ニ非ス又勞ニ非ス蓋シ硝子球ノ肺中ヘ入テ病ミ
タルモノナルヘシ凡潮熱盜汗・欬嗽喘急等ノ諸證

ハ肺臓諸病ノ定候ニテ勞瘵ニ限リタルヿニ非ス
肺臓ハ勿論附骨疽・流注毒及打撲金創等モ肺臓ヲ
侵ス寸ハ必ス勞狀ヲ見スモノナリ今硝子球肺中
ニ入テ留滯シタルユヱ勞ノ如ク病ミタルモノナ
ルヘシ喉嚨ハ至極ノ要處ユヱ一滴ノ水入リテモ
忽チ咳嗽ヲ發シテ吐キ出ス程ノ處ナレハ球ノ入
ルヘキ理ハナキヤウナレヒ稀ニハ物ノ誤テ肺管
ヘ入ルヿモ有ヿナリ本州太田村某神祠ノ池中ニ
奇石ヲ生ス色瑪瑙ノ如ク玲瓏トシテ愛スヘシ方言ニ「メコイ」シト云フ里中ノ女子其神祠ニ詣リ石ヲ採テ戲ニ

口中ヘ含ムニ誤テ肺管ヘ入リテ出テス呼吸ニ從ヒ升降シテ聲ヲ成シ潮熱欬嗽喘急等ノ諸證起リ五六日ノ後ニ馬脾風ノ如クニナリテ死セリト村醫奥山雋長ノ物語ナリ又門人烏山醫員川又玄玠ノ話ニ一賈竪ノ兒𤇾栗ヲ口ニ含ミ戲ニ几上ヨリ跳下スルニ誤テ氣道ニ入リ喉中塞カリ聲啞欬嗽呼吸促迫等ノ諸證竝起リ少頃ニシテ死セリト云フ此二事ニ依テ考レハ某ノ病モ硝子球ノ肺中ニ入テ勞狀ヲ病タル〻明カナリ

治法西洋ノ醫籍ヲ閲スルニ李核木片等ノ誤テ肺管ニ入タルヽ肺管穿孔法ヲ施シテ誤呑ノ物ヲ呼氣ニテ噴キ出サシムルノ治法アリト雖ヒ其術詳ナラス予此ニ本キテ心匠シタル治法アリ先ツ患者ヲシテ仰卧セシメ人迎ノ動脈ヲ避ケテ結喉ノ下ヲ横ニ徐徐ト截リ動脈断ツヽハ或ハ烙シ或ハ紮リ出血ヲ禁シテ後肺管ヲ切貫ケハ創口ヨリ呼吸ヲ起シ呑タル物ヲ噴出ス〻必然ナリ若シ截タルノミニテ創口狹ク出テ難キヽハ輪ニナリタル者ヲ一枚切去ルヘシ肺管ヘ切貫タレバトテ死スル者ニ非ス咽喉ヲ刺シテ死スル者ハ多クハ出血ニ

因ルモノナリ年来歴験スルヿ頗多シ金創ノ條ヲ
參攷シテ知ルヘシ物ノ出タル跡ハ縫合繃帶等總
テ金創ノ治法ニ從フヘシ屢肺管ノ創ヲ療治スル
ニ思ノ外治シ易ク又西洋ニ肺管穿孔法ニテ此證
ヲ救ヒタル實驗アレハ右ノ手段ヲ行フヿ難事ニ
非ス試驗シテ面生ヲ萬一ニ求ムヘシ

莽草毒

莽草ハ大毒ノ物ニテ本草綱目ノ毒草ノ部ニ組入テ
其毒ノ人ヲ殺スヿヲ云ヘリ小野蘭山カ本草啓蒙
ニ姦商莽草實ヲ大茴香ノ偽物ニスルヿヲ載タリ
今眼前ニ藥店ニテ此品ヲ鬻キ又枝葉共ニ抹香ト
ナシ又枝葉ヲ墳墓ニ手向ケ畜禽家ニテ「ヤマガラ」
ニ啄シメテ人人常ニ手ニ觸レ目ニ慣レテ其大毒
ノ物ナルヿヲ知ラス先年予カ舊郷ノ隣里三箇村
ト云ヘル處ノ寺ヘ村童習字ニ集リ五六人ニテ適
庭前ノ莽草ノ實ヲ食スルニ忽顛倒煩亂シテ危篤

ニ見ヘタレ氏暫ク有テ多ク涎沫ヲ吐キ其毒モ隨テ出タルト見ヘテ幸ニ死ヲ免レタリ近頃府下南街村田屋吉五郎ト云ヘル者ノ宅ニテ莽草ノ實ヲ「ヤマカラ」ノ餌ニ為サントテ檐前ニ晒スニ其家ノ兒二人比隣ノ兒二人俱ニ之ヲ食スルニ忽瞑眩悶絶シテ幾人事ヲ省ミス四肢微ニ搐搦シ面目赤ク瞳孔散大ニナリ牙關緊閉シテ白沫ヲ吐キ或ハ飲食ヲ吐シ或ハ血ヲ吐シ其病狀癇症ノ如ク又烏頭曼陀羅花等ノ毒ニ中リタルニ似タリ四人ノ内二人午食前ニテ腹ノ饑タルモノハ一時許ニシテ死セリ午食後ニテ腹ノ饑サル者ハ患狀ヤヽ輕シ先ツ草兵丸ヲ與ヘ續テ甘豆湯ヲ冷服セシムルニ下利十餘行ニシテ死ヲ免レタリ

莽草毒應用方

甘豆湯（奇効醫述）解礬石。砒石。甘遂。天雄。附子。射菌。巴豆。芫菁。斑蝥。百藥之毒。

黑豆一兩　甘草半兩

右二味煎服

草兵丸

河豚毒

河豚一名ヲ鯸鯸ト云フ鯸鯸毒ノ治法ハ金匱要略ニ初テ見ユ五雜俎云。河豚最毒殺人。所忌血與子耳。又云。以燕脂染不紅者。即有毒。紅者即無毒。本草綱目云煮忌煤炲落中。今世人ノ血ト鮞ト煤ニ毒ノアルト炲ヲ河豚ニ合スル寸ハ必ス人ヲ殺スト云フ口實ト為ス皆本ツク所アリ然レトモ但血鮞ノ二物ニノミ毒ノアルニ非ス割烹ヲ丁寧ニシテモ又燕脂ニテ染テ紅ニナルモ又枯魚ニシタルモ皆其毒ニ中リタル者アレハ古人ノ言モ必信用スヘカラ

ス常ニ有毒ノ物ト定メテ決シテ食スヘカラス中毒ノ候最初ハ唇舌麻痺シテ言語蹇澁シ須臾ニシテ總身麻痺痿弱骨節緩縱ニシテ起居スルヿヲ得ス精神恍惚トシテ中風ノ如ク癲ノ如ク又麻藥ヲ服シタル者ニ似タリ或ハ四肢拘急搐搦或ハ厥逆スルモアリ或ハ眩暈或ハ喜笑スルモ有リ脈初メハ沉伏シ發熱スレハ浮大數ニナリ面目赤クシテ染ルカ如ク重キ者ハ但沉醉シタル狀ニナリテ其儘ニ死スル者ナリ輕キ者ハ煩亂シテ嘔吐ヲ發ス宿食ヲ吐ク者ハ幸ニ死ヲ免ルヽヿヲ得ルナリ其

毒ニ中ル者腹滿腹痛等ノ證ナク但心中懊憹シテ煩悶スルノミ風茄兒烏頭等ノ毒ニ中リタル者ニ彷彿タリ

安政三年辰ノ冬明年己ノ春東海ニテ河豚ヲ捕ルヿ尤多ク府下ノ人其毒ニ中リテ死シタル者尠カラス予カ親ク聞見スル所下街裏五町目ニテ小兒一人高野村ニテ婦人一人平磯村ニテ一人太田村ニテ一人飯田村ニテ一人豊食村ニテ二人青柳村ニテ二人本州笠間ニテ二人都合十一人但毒ニ中リ病タル者ハ枚舉ニ遑アラス青柳村農夫彌兵衛總

身麻痺痿弱。四支逆冷。昏沉如醉。醫者紫金錠ヲ與フ
續ヒテ備急圓。黄龍湯。魚油。地漿。鐵漿等ヲ頻服セシ
ムルニ微モ吐ヲ催サス又惡心モナク已ニ死地ニ
墜タル所ヘ予馳附テ先吐酒石一分ヲ與フルニ乍
宿食及飲タル所ノ穢物ヲ吐ク一升許ニシテ諸證
退キ二三日ニシテ全癒ス
治法ハ吐法ヲ第一ノ良策ト為ス吐酒石一分急ニ研
末ト為シ頓服セシメ續テ鹽湯ヲ二三椀與フヘシ
乍ニ宿食ヲ吐スナリ快吐ヲ得レハ豁然トシテ神
思快爽ヲ覺ヘ諸證從テ緩ミ初テ言語スルヿヲ得

ルモノナリ但發熱脈浮。麻痺痿弱等ノ證ノミ殘ラ
ハ東洞ノ黄連解毒湯ニ宜シ或ハ橘皮大黄朴硝湯
中正湯ヲ撰用スベシ若シ吐酒石無キ寸ハ瓜蔕一
味研末シ五六分白湯ニテ送下スヘシ世ニ黄龍湯。
地漿。菜油。魚油。藍澱等ヲ用ユルハ皆吐法ナルヘシ
然レ氏吐酒石ノ少量ニテ快吐ヲ得ルニ如カス其
毒已ニ腸中ヘ下リ吐劑ヲ投スレ氏吐セサル者ハ
救ヒ難キモノナレ氏走馬湯ヲ用ユヘシコロトン
油ト云フ物即巴豆ノ油ニテ薩摩ヨリ出ツ峻下劑
ニテ走馬湯ヨリモ神効アリ宜シク試用スヘシ河

豚毒ヲ解スルノ方世ニ傳フルモノ極テ多シ今此ニ數方ヲ舉テ廣ク救急ニ備フ

河豚毒應用方

中正湯（原氏藏方）治陳舊宿食及一切傷食

半夏五分　朮四分　藿香　橘皮　乾薑　厚朴　大黄各三分　黄連二分　木香　甘草各一分

右十味煎服

糞清　黄龍湯。人中黄ト云フモ皆一名ナリ本法ハ淡竹ヲ切テ両端ノ節ヲ留メ青皮ヲ去リ糞缸ノ中ヘ浸入シテ稀汁ヲ取リ用ユ急ニ取ルニハ先糞上ヘ綿布ヲ布キ其上ヘ目ノ細ナル籠ヲ置キ押付テ汁ヲ取ルヘシ

地漿　又土漿ト云フ黄土地ヲ掘テ坎ヲ作リ深サ一尺許新汲水ヲ沃キ攪濁シ少頃アツテ清ヲ取リ用ユ

橄欖　水ニ浸シ龍脳少許ヲ入テ用ユヘシ

藍澱　水ニ和シテ用ユヘシ藍ノ葉ヲ揉ミ汁ヲ絞リ用ユルモ可ナリ

荏油（エアブラ）　若シナキ寸ハ魚油菜油ニテモ可ナリ

白鰲（スルメ）　煮テ汁ヲ飲テ宜シ又焼テ食スルモ可ナリ

蘆根（ロコン）　擣爛シテ汁ヲ取リ服スヘシ又煎汁ヲ服スルモ可ナリ

橘皮大黄朴硝湯　走馬湯　黄連解毒湯

吐酒石　瓜蔕　コロトン油

礬石毒

礬石ハ大毒ノモノニテ藥店ニテモ素人（シロウト）ヘ賣ルヿヲ禁シ素人モ亦之ヲ恐ルレ𪜈世ニ礬石ノ末ヲ白砂糖或ハ炒豆粉ト誤認（ヰチガヘ）テ嘗メテ死スル者尠ナカラス又毒鼠劑（ドクミヤリ）ノ誤テ食物ニ混シ毒ニ中ルヿアリ初メ面目色ヲ失シ心腹蒸蒸トシテ煩熱スルヲ覺ヘ須臾ニシテ腹滿シ慍慍憒憒トシテ悶絶セント欲シ卒然トシテ嘔吐ヲ發シ初メハ宿食ヲ吐キ續テ涎沫或ハ膽汁肝液等ヲ吐キ煩渴シテ水ヲ飲ミ水入ル寸ハ乍吐テ水逆ノ證ノ如ク反覆顛倒シ肉瞤

筋惕等ノ證並起テ即死スル者多シ即死セサル者ハ煩熱スルヿ傷寒ノ如ク煩渇引飲舌上黄胎ニナリテ食ヲ思ハス面目微腫シテ萎黄ニナリ身體酸痛痿弱シテ歩行不自由ニナリ遂ニ死スルナリ分量ヲ多ク飲ミタルハ百死ニシテ一生無シ少量ナレハ速ニ吐シテ死ヲ免ルヽ者有リ礬石ヲ瘧ニ用ルヿ本草綱目ニモ見ヘテ今世ニ賣藥ニスル所ノ截瘧ノ方ハ即礬石ナリ瘧ヲ患フル者此賣藥ヲ服シテ嘔吐ヲ極メ胃氣ヲ損シ久ク飲食ヲ思ハス危篤ニ至ル者亦尠カラス

治法是モ河豚毒ヲ治スル法ノ如ク毒ヲ吐カシムルヲ第一ノ良策ト為ス已ニ醫學入門ニ瓜蔕ヲ用テ有レ𪜈吐酒石ノ捷功アルニ如カス大抵ハ自カラ嘔吐ヲ發スルモノナリ假令嘔吐ヲ發スル𪜈更ニ吐法ヲ行テ胃中ヲ一洗スヘシ吐シテ後ハ當歸甘艸ノ煎汁ニテ黄礬散ヲ送下スヘシ若藥物ヲ缺ク𪜈ハ糞清。人尿。釅醋。麻油ノ類ヲ服スヘシ秋燈叢話ニ白礬一味ヲ冷水ニテ服スルノ法アリ宜シク試用スヘシ大熱如灼煩渇引飲スル者ハ黄連解毒湯。參連白虎湯。及紫雪ヲ撰用スヘシ水逆ニテ藥餌共

ニ下ラサルモノハ五苓散。小半夏加茯苓湯ニ宜シ
其毒已ニ盡テ尚精神了了タラサル者ハ甘豆湯。三
豆飲等ヲ服スヘシ

礬石毒應用方

三豆飲得効方　疎解熱毒。又解金石草木一切諸毒

緑豆　赤小豆　黑大豆各一升　甘草二兩

右四味以水八升煮極熟。任意食豆飲汁。七日乃止。

黄礬散醫學心悟　解砒毒

大黄　明礬各等分

右二味散服

苦參湯求古館方譜　解砒毒

苦參研末　苦酒各適宜

右二味混和頓服

瓜蔕散醫學入門　治砒毒在膈上者

萬病解毒丹同上　治砒毒在腹中者

五苓散　小半夏加茯苓湯　黄連解毒湯

參連白虎湯　紫雪　吐酒石　瓜蔕

黑鉛　白礬　香油　地漿　青藍汁

釅醋　糞清　人尿

菌毒

菌ハ種類ノ多キモノナリ松蕈(マツタケ)紫蕈(ムラサキタケ)香蕈(シイタケ)ノ類人ノ知リテ常ニ食スルモノハ中ルヿナシ名ノ知レヌ菌ハ必ス毒アリ凡蓋(カサ)ノ上ニ毛茸ノアルモノ蓋ノ裏ニ襵(ヒダ)ノ無キモノ蓋ト莖ト脆ク離ルヽモノ夜見テ光ノアルモノ採リ置テ色ヲ變スルモノハ皆毒アリト云フ夜見テ光ノアルモノヲ吾郷ノ方言ニ「ツキヨタケ」ト云フ「シメシ」ニ疑似(マギラハ)シキモノナリ若シ誤テ食スル片ハ其毒ニ中リテ醉ルカ如ク喃喃トシテ妄言止マス或ハ喜笑或ハ欣躍或ハ歌舞シ一

時ノ狂ヲ發スルノミニテ死スル者稀ナリ又「テングタケ」ト云フアリ是モ「ツルタケ」ニ疑似シ若シ誤テ食スル片ハ亦一時ノ狂ヲ發スルモノナリ菌毒ノ劇證ハ迅速ニシテ救ヒ難キモノ多シ食シ了レハ乍チ心腹卒痛反覆顛倒シテ即死ス較緩ナル者ハ霍亂ト略相類シ腹痛煩亂嘔吐下利惡寒發熱脈沉ニシテ四肢厥逆シ或ハ轉筋等ノ諸證蜂起シテ死スルモアリ又幸ニ生路ヲ得ルモ有リ

治法急證ユエ急ニ救フヘシ第一糞清ヲ用ユルヲ良

方ト為ス竈林玉露ニ日本ノ僧某衆僧ト同シク菌ヲ採リ食スルニ皆其毒ニ中リ糞清ヲ服シ死ヲ免レタル時日本ノ僧寧死スルモ穢物ヲ食ハスト云テ獨リ死シタルヿヲ載セタリ又紫金錠ニテ効ヲ取ルヿ多シ太田村ハ松蕈ノ名物ニテ同村ノ弟子ヨリ松蕈ヲ贈ラレタルヿアリ舉家之ヲ食スルニ人人惡心ヲ發シ或ハ嘔吐スル者アリ予モ亦惡心ヲ催セリ蕈毒ナルヿヲ覺ユルユエ直ニ自ラ紫金錠ヲ服シ其外ノ者ヘモ與フルニ錠ヲ服シタル者ハ惡心乍ニ止ミ嘔吐モ無シ實ニ紫金錠ノ効ナリ最初心腹卒痛シテ吐瀉ノ無キ者ハ麻油草兵丸備

急圓吐酒石ノ類ヲ撰用スヘシ吐下ノ後餘毒尚盡ザル者ハ中正湯大柴胡湯ニ宜シ四肢厥冷脈沉微ナル者ハ四逆加人參湯附子理中湯ニ宜シ煩渇水逆等ノ證アル者ハ五苓散ヲ與フ大抵霍亂ノ諸方ヲ撰用シテ可ナリ

菌毒應用方

大柴胡湯　四逆加人參湯　附子理中湯
五苓散　紫金錠　草兵丸　備急圓　吐酒石
麻油　糞清

鴉片毒

鴉片ハ奇効ノ有モノニテ疾疢ヲ救フ最多シ然レ𪜈大毒ノ有モノユヱ分量ヲ妄ニシ服法ヲ慎マサレハ人ヲ殺スヿ亦鮮ナカラス洋烟ノ毒ハ人人既ニ知ル所ナレハ復此ニ論セス今洋烟ノ外ニ鴉片ノ一大害有リ世ニ賣買スル調痢丸活兒丸痢病丸ノ類總テ痢病ノ妙藥ト云フハ皆鴉片ナリ輕痢或ハ泄瀉等ニテ熱ノナキ證ヘ用ユル寸ハ下利速ニ止ミテ奇驗ノアル者ユヱ下利ニハ一概ニ宜シキヤウニ心得熱ノ强ク下利ノ多キ證ヘ用ヒ下利速

ニ止ミ腹満嘔吐。脉沉伏。四肢厥冷等ノ證並起リテ死スル者夥シ凡小兒ノ痢病ニ下利ノ俄ニ減シ嘔氣出テヽ乳ヲ哺ヌヤウニナリ乍ニ容體ノ變スルハ必竊ニ痢病ノ賣藥ヲ用ヒタルモノナリ右ノ諸候アラハ病家ヲ詰問シテ鴉片ノ毒ナルヿヲ知ルヘシ如此害ノ有ル藥ヲ賣ル者モ其非ヲ省ミス服スル者モ亦其禍ヲ悟ラス賣買ノ益行ハルヽハ其害洋烟ニ異ナラス

予カ家ノ轎夫欬嗽出テヽ毎夜喧シク傍人安眠スルヿヲ得ス弟子等之ヲ厭ヒテ阿芙蓉液ノ量ヲ定法ヨリモ倍シテ與フルニ終夜昏睡シ明旦ニ至テ起タレ𪜈瞑眩尚未タ解セス予ハ阿芙蓉液ヲ服シタルヿヲ知ラサル故轎夫ヲ使令シテ市中ヘ遣ハスニ精神恍惚トシテ行ク處ヲ忘レ方角ヲモ辨スルヿ能ハスシテ同シ道ヲ幾回モ往来シ大ニ時ヲ移シ日晡ニシテ歸リタレ𪜈用モ辨セス又往来シタル處ヲ回顧スレハ夢ノ如シト云ヘリ是過量ニ服セシムル故ナリ然レ𪜈痼疾ノ欬嗽全治シテ再發セサルハ鴉片ノ神効ナリ府下常盤山圓淨寺ノ僕柳治年五十歳泄瀉ヲ患ヘテ久シク愈ヘス因テ阿

芙蓉液六十滴ヲ與ヘニタニ用ユヘシト教ユルニ誤テ一度ニ服シ昏睡シテ明旦ニ至リ忽チ高ク喚一聲同室ノ者驚テ之ヲ視ルニ人事ヲ省セスシテ中風ノ如ク癲癇ノ如ク又醉人ニ似タリ煩亂シテ衣被ヲ發開シ直視口噤或ハ涎沫ヲ吐キ氣息微急脈沉遲ニシテ四肢微冷シ昏睡シテ居レヒ至極苦痛ノアルヤウニ見ユ弟子等代診シテ必死ト爲シ先ツ吐劑ヲ與ヘント欲スレヒ牙關噤閉シテ用ヒ難キユヱ醶醋ヲ齒隙ヨリ吹込ミ又顏ヘモ噀テ介抱スルニ日晡ニ及ンテ稍安靜ニナリ又鼻息鼾

鼾トシテ昏睡スルユヱ其儘卧サシムルニ第三日ノ旦ニ及ヒ初テ醒覺シ常ニ復セリ瞑眩中ノ事ヲ問フニ少シモ覺ヘスト云ヘリ是ハ服法ヲ誤リテ死地ニ隣スルニ至レリ嘗テ崎港ニ遊學ノ時洋醫「シイボルト」一男子ノ粉瘤ヲ截斷シ縫合スルノ後燃熱腫痛殊ニ甚シクシテ阿芙蓉液ヲ與フルニ本人ハ勿論看病ノ者モ其痛ノ止ムヲ喜テ頻服セシムルニ昏睡シテ遂ニ死セシ者有リ又城南ニ一里塚ト稱スル地アリ此ニ盲人長門一ト云ヘル者アリ頗占法ヲ善クシ且人ノ口氣ニ因テ其懷抱ヲ迎

ヘ知リ百占百中ニシテ一失ナキニ近シ世俗皆其
妙ヲ稱シ請者遠近ヨリ輻湊シ旦ヨリ暮マテ絡繹
トシテ絶ヘス履常ニ其門ヲ塡ニ至ル一草醫ノ旦
ニ過テ占ヲ請フアリ時ニ長門不寐ヲ患フルヿ日
久シ談次治法ヲ尋ヌルニ草醫鴉片ヲ服スヘシト
テ教ユ長門大ニ喜テ遽ニ人ヲ藥舗ヘ走ラシメ錢
二百文ニテ鴉片ヲ買フヿ僅僅一撮ニ過キス其三
分ノ一ヲ分チ水ニテ頓服スルニ須臾ニシテ睡ヲ
催シ鼻息鼾鼾タリ家人其容體ノ異常ナルヲ見テ
大ニ驚キ喚ヒ起セヒ沉昏シテ醒ス倉皇テ醫者ヲ

迎ヘ診セシムルニ六脈已ニ絶シ藥餌鍼灸交施セ
ヒ遂ニ蘇セス予自ラ其家ニ就テ其首末ヲ詰問ス
ルニ家人飲ミ殘シタル藥ヲ示セリ即チ津輕鴉片
ニテ重サ七分アリ藥舗ヲ審問スルニ鴉片ノ定價
孔方二百文ニ付一匁ナリ因テ考ルニ服スル所ノ
鴉片ハ纔カ三分許ノミ鴉片ノ分量五分ヲ服スル
ヿハ死スルヿ西洋ノ書ニモ見ヘタレヒ僅ニ三分
ニテモ死スル者ト見ヘタリ以上ニ述ル通リ奇驗
モアレヒ又酷毒ノ物ナレハ分量服法等ハ謹慎シ
テ使用スヘキヿナリ

治法鴉片ノ毒モ他ノ中毒ト同様ニテ吐法ヲ第一ノ良策トス吐酒石ハ七厘「イペカコアナ」ハ一錢瓜蔕ハ五分用ヒテ可ナリロヲ噤シテ藥ノ入リ難キモノハ鼻孔ヨリ灌クヘシ又釅醋ハ鴉片風茄兒等ノ麻毒ヲ解スルノ聖藥ナレハ頻服セシメ又面目及身體ヘモ噴ヘシ又釅醋ヲ以テ灌腸スヘシ又尺澤ヲ刺絡スルヲ善トス

鴉片毒應用方

吐酒石　「イペカコアナ」　瓜蔕　釅醋

續瘍科秘錄卷之五　終

桑軒本間先生著述目錄

傷寒論類釋　十卷　近刻
傷寒論取策　五卷　近刻
内科秘錄　十五卷　近刻
瘍科秘錄　十卷　既刻
續瘍科秘錄　十卷　既刻
療治知要　五卷　近刻
醫方纂要　五卷　近刻
醫方纂要分註　七卷　近刻
經穴撮要　一卷　近刻

皇朝醫林談　七卷　近刻

藥室雜識　三十卷　近刻

日新醫談　三卷　近刻

我棗軒先生。折衷漢蘭。兼精内外。平生生死肉骨。不可勝紀。所著之書。凡若干種。盡出于實驗。往往發前賢所未發。誠臨證施治之指南車矣。非世之掇緝古人陳言紙上逞空談者之比也。門人相謀將陸續開雕。以公諸天下。茲揭其目。以諗四方學者。

門人　川又誠等謹識

水戸　本閑救著

安政六年己未三月

江戸横山町三丁目　和泉屋金右衛門