痘治經驗録

武9
434

七武四
門 一
諸 434
卷

瘡治経験録

吉田元卓撰

瘡之毒百骸五臓諸
根於精血之初成淫火不舉
淫火ハ則火毒ナリ故見點淫火ヲ潤シ消スノ意也
火就燥義也
則重キハ四物湯涼血解毒加味普連麥門冬
石膏紅冬牡丹或ハ犀角等ノ類差別有
又火症ノ黄耆湯ナリ十神解毒大方

ノ湯ニ涼血清解ノ加減スヨシ症ノ軽重差別有ルナリ他此意ヲ不解他ニテ十神解毒湯消毒飲ノ類用ユル心得タル療治ナリ四物湯黄芩湯ノ類用ユルニ方ヲ尋バ十神解毒類ト云大カ子湯ハ流義ノ和物ナレ共世上ニテ多知ルナリ四某ノ消毒飲加減ト云カヨシ

慾燵則火毒中ニ云々

壮年十八九歳ヨリハ此患有テ多出トナレバ害アリ都テ年齢六七歳ヨリ十三四歳ノ年齢ヨシト矩定スベシ色慾淫事無シ六七歳以下當歳乳子ハサシテノ多出ル時ハ由断ナラズ

瘡初熱之辨

瘡五臓之症倶見古方中微驚悪熱而両眼含涙鼻出氣睡中不悪寒是瘡症之有死也云々

瘡初ノ熱ト思バ他症無ヌルモ大底ハ香葛湯佳シ容易ニ佗症ニカヽハリ亨偏ノ熱薬等不可用熱盛シト見バ同方大剤ニシテ數服ヲ用ル表発利氣ヲ專トスルナリ

臓腑鬱毒非微汗不解云々

裏内ニハ瘡発スルナリ殊ニ熱不退然レ共瘡ト定ル時ハ瘡ノ剤ニ直スナリ此方ハ瘡ニナラント疑似ニ用ユルナリ又熱裏ニ或ハ吐シ或ハ乾嘔喘沫ヲ吐ノ類アリ然ト云共切ニ是ニ不泥シテ唯熱ヲ追事専ナリ吐ヲ止メントシテ必辛温ノ剤又ハ補脾ノ剤ハ悪シ只熱嘔ナリ若又大人酒客ナトニハ溜飲化痰ノ剤ヲ兼施スモ可也節ニ嘔ニ不泥ヨシ病家ニ能是ヲ示スナリ猶又瘡ノ験ハ鼻スヂ少シノ黒煤スル鼻氣裏ニ赤ク眼候氣重ノ膿滞有ルナリ猶脉ニ次第有リ皆熱ニ属スナリ児輩又異ルアリ初面色赤ク枯弱シテナノミ熱モ無ク気膿モ不清アクビ多出食滞ノヨウニテ渇アリ肌ヘ冷ヘナトスルアリ脉ハ浮大ニフルナリ此症瘡疹ト眼ノツケルハ一盤ノ流行ナラテハ云カタシ流行スルニ依リ又瘡初熱ナラハ同方ヲ用テ候ツベシ発シテ熱ヲアラス色赤リ変シテ全身発熱スルナリ又

内热剧シク虚弱ノ小児引ツケルヿ不可驚急ニ癇症驚風ノ薬不可用清熱ノ剤ニテ表発スルトキハ驚モ止ムヿ又常ニ癖アツテヒキツケル児多アリ症ニ対シテ見計ベシ虚弱ニヨラスヒキツケルモノ有歳ヨリ二三歳ノ乳子ハヨリ病家ニモ示シヨクヨシ肝癖アル小児或ハ虚弱ノ児上空直視スルハ風寒暑湿軽キ症ニモ有ルモノナリ邪熱発スル時ハ自ラ止ム痘モ亦生発スルヿナリ

中指耳扁冷等

猶是ヲ初熱疑似ノ内ニ云ナリ或ハ向事有リ

中指耳扁冷至老事迄（下ノ上）験朱鳳人云

如此是症ナリナトヽ答ヲヨクヨシカヨウノ説ニ餘リコミ入リタルハ忘ルヽノ基ヘナルヘシ○痘ノ熱雑症ト異ナリ痘ハ序熱ト云若有ル何ノ故ナルト問事有リ

又脱

痘不熟　乃與動内傳百蚘住皮膚痘未見而先
時氣相感觸

非有

此意ヲ以テ序述ト云ナリ又瘡ヲ除カントス欲シテ色ミノ咒ヲシ又医者ヘモ瘡ヲ除クノ術ヲ尋ヌル有リ時氣ト相感觸シテ動ストモ先時候ニ中テサル様ニ心付ケ物中リナドナキ様ニ予當シテ常ヲ加護スルヲ專ナリ偖冬ノ時児葦ノ淚ヲ流シニ虫ヲ生ジ又ハシモヤケナド多クノ有ナリ中ニ以上ナキヲナレモ是等ノ事ヲ當ヲスル專ナリ

飲食過多ニ無キ様ニ持病癖ナド有ル

児ハヨク其所ヲ常ニ有ナト怪我ナドセザルヨウ專ラ心付ケテヨシ怪我ヨリ瘡ヲ諸ルニアラサレ共疵アル時ハ愈テモ瘡ヲ防ノ予當ノ是等ヲヨリ示シ瘡ヲ除ノ醫ニ術ナシト云テ発熱三日熱有軽ト毒重則熱重

是説一摩ニ泥マサルヨシサレ共病家ニ相答ヘルトキハ此意思ヲ含テ軽重ノ差別ヲ言ル

何事ノ有リ熱軽リシテ瘡ノ出口ヲ考テ軽重ヲ診察スルヨシ発熱軽キトテ瘡ノ軽キニ不限ナリ

有熱五六日而出者有熱一日即出者

熱ノ日数有ハ吉兆ナリ極テ瘡ハ軽キ者ナリ熱ノ日合長キニ雑症ヲ兼ヌル事ノ彌瘡ノ初熱ト思ヒ定メハ香蘇葛湯ニテ伝ヲ見ル也

治瘡症不治雑症萬古之秘論云々

太レモ瘡症軽リ雑症重ケロハ時ニ臨テ奇療也

有一日而出者

是悪候ナリ熱ト拘レリ出ルナリ極テ多生ノモ午リ朝ニ卧シテ晩ニ見点スルニ思ノ外軽リ見ヘル有リ太レモ瘡皮下ニ隠タト見ルナリ食モ不絶症ユルカセニ見ヘルトモ必由断ナラズ一日ニシテ発スル處ノ意ヲ能リ心付ケ熱アル前ニ何ゾ常ニ異ナルヤ又ハ飲食ノ次第熱ノ有無ナトヨリ醫筌穿スルヨシ小児ハ尚更ナリ少シノ熱ヤリ心地不常ハ二日三日モ思ヒヨラズ有リ又ハ病家ノ斎忽等

却モ有ルモノナリ一日臥シテ熱ト・ヒト・レク出発シタレバ
トテ症モ軽ク瘧モ軽キハ却テ秘ノ瘧軽症
ニ有ルナリヨリ客脉ヲ尋第一脉状ニ軽
重有ルナリ秘軽ハ脉平和ナリ悪候ハ脉
沉數有リ俾大數有リ又熱退ニ出シテ
厲シク成ルアリ夫ヨリ追々重症加リタルア
リ此症舌ヨヨク見ルナリ舌乾燥シテ未ダ苔
ハナケレモ赤ミアリ霖昪ノ如ク細カク白ク
有リ又ハ黄苔有モアリ此皆乾枯スルナリ十日
ニシテ見点ニ熱モ厲シク諸症ハ全ク

熱トヒトシク多出スルノ悪候ナリ故ニ瘧症ノ熱
軽重ノ験有リ初熱ニ日數ハ無ト定ムベキ事
ノ繁多無ク規定シテヨシ
置ヘシ醫者熱ヲ日數ニ
非ナリ病家ニテ日數ヲ問フ有リ瘧ノ見
点スルヲ初日ト定メ三四
ヨリ十二日ニ計ル
見点三日 発ル日ヲ出発ト云 起
結痂三日
都而十二日ト云

起脹三日 貫濃三日

痘見ユルトキハ撚子ヲ以テ見ルナリ此紙撚ヲ
流ト異ナリ撚子ヲ以テ痘ヲ見ルニ生死吉凶
ヲ分ツノ第一ナリ紙撚ヲ指ルニ俯入紙ヲ
横ニ四ツニ切リ大底切テ
一枚ヲ随分堅クヨリ巻テ端キ糊ニテ紅脂
ヲ以テ持ツ處ヲ一寸バカリ紅ニナルナリ墜先
ヲ少シ切リキレイニ揃テヨシ巻様和ラカクテ
ハ火ヲトモス時疱落テシマツアレハ蠟ノシンヲ切
ル切如クカタキ程ニシテヨシ先病室ニ入ル前
ニ行燈ヲ点テ紙撚ヲ油ヘヨリ浸シ白漆ニ油

得トシナリ合タル時随分ヨリ丁寧ニ油ヨシ
シ火ヲ燈スト キ油ノハゲカヌ様ニイカニモ心自ルヨシ
得ト丁寧ニスルナリ紙
ナリ第一面部其外共火ヲトモス時ハ随分ヨリ照シ見ル
ノ落サルヨウニスルナリ火燈リシニ立チタラハ
火著テシンヲ切ル程ヲ悪シ紙燃ノ解ノ文ト吾
ナリ
痘ヲ見ルニ先ツ面部天庭頭上咽喉ヨリ
胸股迄見ル夫ヨリ手足ニヨリ見ルナリ稀痘

軽症ハ紙撚児輩イヤカリ嫌フモノナリ是ハ見計ヒテヤリ熱盛ニ出物面部余程出ルヨウナラバ隔々ヤヲ能クシ可見ナリ面部赤ク唇舌乾燥シ痘モ一向潤ヒ無キト思ハバ燈火ヲ照スト格別皮膚ニ隠々ト形見ヘルナリ撚子ヲ照ストキハイカニモ暗ヨシ夫アル時ハ燈ト混シテ見悪キナリ

見點次第

稀痘軽症ハ熱鮮シロヨリ痘発ルナリ痘出面部手足チラリト見点スルナリ

明潤光活色之有彩也云

是稀軽ノ痘ナリ痘色潤ヒ見点ヨリ潤色活色シテホンノリト美色有リ紙撚ヲ照スト是ヲ云ツヤ有テ呆粒起ツ

不薬治

軽症モ如是シテ面部手足ニ程能ク出痘有ルナリ痘出ルトリサテ出テ隔熱モ鮮シ食モ相應ニ進ミ随テ諸症和キ常ニ拘シリナリ又見点シテ熱モ不退欝シテ乳食不常アリテ又見点シテ痘ハ面部手足ニモ餘程

エテ壅塞ナル則重症トモナリ又多虫ノ兆ナルベシ

大人虚実有脈可辨痘児虚実脈不足辨痘之舌者心之候也五臓皆係乎心故内外無症舌必潔浄内火一起白苔必見火盛則苔黄太盛而虚色老苔里生剌火而虚舌必陥白而且生胗証用薬之要全在乎

惟舌ニ候有ルナリ大人雖有脈乳子當歳ハ候モナラヌナリ寒涼下剤ハ舌淫アラハ苔有ルトモ又吉ナリ熱剤ヲ服シテ効有ルモ亦然リ火邪モ無リ陥白胗数剤ヲ服シテ効有ルモ他症ト陥合セザレバ虚症トニガタシ壅証ニ因テ温中益氣ヲ用テ痘起テ後四君子湯醫王湯ノ類ニテ届ク者リ是ハ百ニ一二ヲ云先聖無見ヨリ偏補ヲ用ルハ是稀シテ流ニテセサルコトナリ他症亦温ノ剤ニテ痘

ヲ治スル有レドモ始終ノ症不レ全餘症加テ輕症或ハ
煩痘モ却テ順ナラズ終ニ雜症多加テ病家モ
疑惑スル類多シモツレル有リ皆治ノ背ケルヨリ
唯痘ハ醫ヒ實閉ノ症多シ清解專ナリ
此清解ニ輕重有リ大便通シ小水快通
クサミナドモ出テ清心爽ナルトキハ清解行
届リナリ見点二日メ出脊起腹ノ初日ヨリ
迄ニ如是症和キ食モ好ムモノナリ渇モ止
ムナリ當歲ヨリ二三歲ハ藥モイヤカルヨウ
ニ扱解ス

○又覚大人モ序扱ハケレク悶乱狂燥スル症无
絶食冷物ヲ好ムモノ等ノ症皆醫毒扱ヒ
盛也大解毒劑ニテ全リニ行届キ諸症
和キ清神爽ナル者痘多出ナラバ小便
ノ通ヒヲ心自見ベシ小ヲバカリ通ルヲ
白紙ヲ入浸シテ血色ニ染ル有リ又血
便通ル有リ濁ノ通利ト違テ即
尿血血マヂリタル小水ナラバ是血ノ亡行
スルニテ甚悪候ナリ秘シテ不可治ヨリ試
テヨシ左多出ニ有リ是大底面部ノ色

ニテ可察ナリ可秘一也

神氣清爽

是等解毒清解ノ行届タルナリ

痘則啟春花之在露云々

爽ナルトキハ春花ノ露ナルカ如ク潤色神彩有テ俗ニ山モアゲ美シキ痘ト云是ナリ

明潤光有彩神戸也

彩着死生之門

便モ通シ嘘ナトモ十分ニ出テ諸症和ラギ上下醫毒経ヲタレテ離散スルナリ故ニ解ス清解ノ後ヨシ後レタルトキハ痘ノ始終形ノ不全是ヲ療シテ難症ヲ可考痘潤紅頂白ナル吉兆ナリ由ノハウカ如クムツクトカユミ有ルナト起脹ヲ催スノ険ナリ此痒ヲ病家悪候ト思ヒ驚リ時ハ解ノ言舎ルヨシ借薬行届カハ是ヨリ薬ヲユルメタルヨシ太シキ清解ハ離レカタシ起脹ノ容子飲食便ノ泡等ヲ心付テ追々薬ヲ投スルナリ○又重症有リ見點必死ノ症有リ重症ハ発熱煩渇人事不省シ舌苔厚リ童ミ或ハ豆ノ乾燥シ唇

乾キ或黒ノサケントスルナリ或ハ譫言囈乱
狂燥ヲ食痘隠ニ下皮下ニ有テ稠密ナリ
手足ニ多ノ痘色面部皮膚ニ如生
痘乾燥シテ便秘ス即四物湯黄芩ヲ姿
門冬柴胡犀角ノ類加呉テ
数服ヲ投ルナリ引
シ起脹初メ二日メナド近ニ漸ク毎解シ
テ行届リ有リ起脹初日ニ至テ症盛ン
ナラバ必死ナリ又諸症ニ化ムルキハ精神ヲ
食モ好ミ出ル煩渇止ム第一熟睡スルニ及テ

症モ和ラナリ痘モ出尽ニ及ビ起発シテ皆
粒起ルナリ痘紅色トナリ
膚ト痘ト紅白相分テ彩色紅潤シテ或
増シ精神モ居リ二便通シ能リトキハ吉
毛備テ譬多出トイヘドモ可治ナリサレド年
齢ヲ計ルナリ乳子ハ勿論四五歳ニ至テハ
難治モ有リ順ヨリ起脹貫膿ニ及フトモ
由断ナラズ
備乳子ヨリ四五歳ニ至ル小児又十歳前後或ハ
大人モ見点三日ノ内全ク死症有リ是ヲ俗ニギハ

デト云序無ハケシク絶食人事不省狂言囈乱
面部手足ニ肉脹レテ如桑舌苔黒燥唇黒
ク剝ケ歯黒ク枯テ痘剥破スルトテ薄ク
皮剥ケ血ハシリテ働ク五日ヲ過テ死スルナリ此症初発
見ヨリ悪候備テ必死ナリ正気ナレモ無上毒
不解食モサシテ進ミ舌苔モ薄ク乾燥シ或ハ
赤リサラクト何トナク乾キ有テ痘ハ増多
出テ面部赤リ瞳レ手足枯渇シテ秋霜ノ
如ク経霜ヨリ云痘バサバサト稠密シ何程
諸症ユルムトモ乾枯シテ多出ナレバ難症ナリ火
毒ヲ解スル専ナリ四物湯柴胡芍薬葛根黄連
麦門冬黄芩ノ類ナリ又大カラ湯ニ加某ル
モ有ヘシ起脹二日迄ニモ快ク湯ヲ用テ痘色潤色
ヲ催サズレハ譬症ハ和キユルムトモ難治トナルベシ
○又痘見レテ形根景ワカリガタノ尚発悪盛ン
ニ痘色乾焦舌苔厚薄トモニ乾枯シテサラクト
シテ或ハ舌上苔ナリ赤リ如朱ニテ栗景ノ如ク
細リサラクト乾燥シテ精神
少ク大便秘シ痘色不開是モ亦難症ナリ
火盛ンニ煩渇舌苔黒焦ニ便閉塞ホハ白虎

湯火症ノ甚キヲ傷（ナドモヨシ）瘡色不潤トキハ
瘡書ニ氣血相乏テ倶ニ有熱也トイヘリ日ヲ経ル
トキハ津液枯レテ増火盛ンニナリ元気不續
起脹終ニ至リ又ハ膿穢ニ至テ死故ニ瘡見
ヨリ出ル起脹ノ初日ナト迄ノ位ヲ能ク見
極テ善悪死症ヲ考ルル事第一ナリ瘡ノ形
色死生ハ纔ニテ見ル處ニ有ルナリ偖又此症
ニ色ニ有リ初熱ヨリ療シテ表發清解大
解毒ヲ用テ難治アリ又他医療シテ温涼
辛辣ヲ剤ノ程モレサルアリ或ハ温熱ナト
ノ剤ヲ用テ熱毒火邪ヲ助ケテ如此リ害ヲ
成スアリ如之ニロクト療スル歟不可療唯瘡
色ヲ見テ和セリ大ニレハ又瘡面部ニテ吉
凶死生ヲ分ツナリ

頭者諸陽之聚會両頬五臓精
華○咽喉者水穀通路呼吸
之門○胸腹者諸陰陽受気心肺
所居也

如此ナリ故ニ善悪死生ハ瘡ノ形色ヲ生ル處ニ
善悪アリ一ニ手足ハ都テ能ク見エルナリ何程

手足ノ痘色ヨリ悪シケレハ面部ノ内ニテ又天庭口邊頭上ト手足ノ痘ト矛盾シテ見覚ベシ天庭多出スルヲ吉ト云ヒ是出ル處ノ吉凶ノ多ツ見當ノ第一ナリ百秘ナリ左シテ多出タリモ差目ノ痘アラハ吉ト云ヒナリ口邊ヲ次ト咽喉胸股ニ出ルモノ痘ニハ少シ宜ルモノナリ咽喉ハ其内多出ノ二處共ニ痘胞ニ多出ハ必死ナリ軽症ハ果シテ二處共ニ痘モナキナリタトイ多ク出ルモ症軽リ痘モ軽キトキハヨシ痘中ヨリ又胸股ニ面部手足ニモ出レハ是ヲ都テ痘ハ形色美出ノ多募善悪ヲ云ハ皆面部ヲ差シテ云ヒナリ手足ハ二ノ次ト心得ヘシ

起脹三日

痘根呆起テ脹スルナリ水ヲミトニ痘薄倪ナルヲ持ナリ水醬ナリ根紅頂白トテ根呆紅頂白ト膿ヲ入テ膣ヲ追々催シ精神常ノ如ク飲食常ニ拘ラス二便子便ナルトキハ出痘多募ニヨラス吉ナリ面部ノ痘周圍濃紅子

ニ拘リ成テ誠ニ春花ノ如キ香露全身皆脆
キ瘡ニテ膏瘡ハ大カ与湯柴胡麥門冬ノ
類ニシテ起脹一日ヲ用後内補黄同方ニ加
棗シテ毎貮濃一日二日ヲ送ルナリ稍瘡ハ大力
ナル湯加味無クス貼シテ二貼ツヽ用テヨシ瘡書
ニモ稀瘡着不薬治トスルアルトキハ却テ害
有リ至テ軽症初甚見点ニ清解過剤ス
ルトキハ瘡ヲ生ゼス空虚シテ破ル内托補過ル
時ハ瘡膿スルトキ不レ膿シテ粘沾衣破スル如是ノ症アリ又膏々
テ不食ニ乳重クシテ知ト成テ却テ余症
加ル有リ故ニ軽症ハ清解ヲ軽リシ内托モ
軽リスルヨシ度ニ過タルハ害ナリ稍瘡ハ尚更
又重症起脹ノ初日中ノ日ニナド至テ
漸ノ毎ニ解シ脈モ
居食モ少シリ瘡多
煙枯シテ潤活ナリ瘡
ニ照スストキハ枯煙シテ瘡日ニ照ストキハ潤活燈
解スニ似テ不解ナリ瘡色悪キ類皆毎
清解不免ナリ瘡ノ出ニヨルナリ此等

又痘五分以上ハ危症ト心得ベシ見ハカラヘ第一
ノ五分以下痘ノ出軽キハ行届ナリ痘児
一年ニヨル二三歳ハ甚ダ危シ五六歳ヨリ十歳
以上ハ行届ナリ婦人此朝ニ及デハ経水
下ル有リ吉モナリ熱解シテ一日二日シテ
止ムレハ順候ナリ何レモ皆ハ物傷加某
ニテヨシ加ルニ大便秘シ舌苔不潤食絶ス
ルトキハ正気熱モ稍解スレハ死症ナリ
畳濃ノ終リ結痂ニ至テ可死リ
○又童子ハ必死ノ二症アリ漸ク出ル
日ヲ送リ起脹ノ中或ハ終ニ至テ痘蚕種ノ如ク煤
色面部剥破シテ唇舌粘燥煤黒色絶食
大便秘シ或ハ泄アリ正気モ有リ又人事不省
有リ煩渇アリ又痘ハ剥破無ク唯乾粘
シテ手足ハ水醬相應ニ見ヘルナリ正気ニテ食
モ白粥冷物ナトヲ好ムノ類難症ナカラモヨリ見
エルモノナリ是痘剥破モナク形不崩故ニヨリ
見エルナリ容易ニ療治不成ナリ毒ハ盛ニテ
気ハ巧拙ノ故ナリ後免症ニ及ブ膿落痂
又テ死ス

又瘡五六ヶ有テ起脹ノ内迫ニ近モ解シ瘡色
開陥シテ精神爽トイヘドモ只絶食シテ何ニ
テモ一切口ヲ禁シテスル人食アリ是ハ死症ニ非ス
初発解毒ノ不足ヨリ此等ノ症ニ十味異
功散ヨシ数効ヲ奏ス 倥雑スル事アリヨク
々巨細可診察

貫濃三日

瘡著並也形肖則生形不肖死
瘡ノ形ヲ診察スル此意ヲ含テ可心得ヘシ

紙燃テ灰ヲ診視スルニ紙ノ如ク瘡軽瘡ハ面部ノ
瘡皆臙色ニメ豆ノ如クリ黄色ニテ根窠起テ
粒大ノ実満ス飲食二便平ナリ
圓実而凸周浄而鬆者形之肖
神也

干陽加當帰黄芪或ハ加味シテヨシ此症前
ニ云如リ某過ルハ悪キナリ中ヶ以上ノ出ニテ四
五歳ヨリ以下當帰ノ加味ニテヨシ中ヶヨリ少
出モ多キハ症ト瘡ノ位ヲ見テ内補散ヨシ
中ヶ以下多出ナレハ皆内補陽ヨシ症ニ因テハ

醫王湯モヨシ又多出ニテ膿気モ薄ノ或ハ乳子
出カサアラハ鹿茸ノ湯保元湯醫王湯ノ類
ナリ衛ノ起脹ヲ送リ濃ウスリモ入リテ
送ニ相應ニ濃入テ眼封スルナリ飲食相應
大便実ニ気力モ備ル時ハ内托專ラニシテ
他事ナシ加ルニ渇有リ是モ軽症ニ無シ皆虚
煩渇ナリ医王湯麥門五味子黒姜ナド
ヨシ乳食ヲヨリ宗トシ可考ナリ乳食不進
ハ難症ナリ

眼封不及期而眼封者重軽則不拘

又過期而眼不開
者眼開期也

眼封虚実

眼封ハ稀ノ症軽症ハ眼不閉症ノ多キニ因ル
ナリ多出ハ起脹ヨリ閉テ貫濃ニ至テ
ヲ順トス重キハ衛ニ貫濃ニ至テ封シ結痂ニ至
テ追々ニヒラクヨシレトスナリ十二日十三日ニ至テ衛ノ
開ク事有リ症ノ虚実見ハカラヘナリ又證ノ
大補ヲ偏ニシテ却テ開カサルアリ元気ノ虚
実ヲ計リ眼封久シキモ害アリ多出或ハ黯
症衛ノ変キテ眼閉タルナトハ開布ノヲ以テ歩

セリ蒸迫々開リヨシ一擘ヲ不開ヨシ閉眼ハ虚実ヲ詐リ開リニ運速アルナリ又他流補ヲ偏ニシテ十三四日ヲ過シテ其餘モ開カサルアリ眼余毒ヲ発スルノ害アリ

痘多者毒盛也表裡気血俱虚多出ハ自ラ毒モ盛故ニ解毒凝劑ヲ以テ駈ヲ気血自ラ虚ル故ニ膿ニ至テ元気不續ナリ咀精神ノ居借食ノ増減次ニ痘ノ形チ善悪ヲ能診察スルコト肝要也

○先厥部孤破スルヨリ全身ヘ不至益元気損ニ

フセリコトヲ專ナリサレモ孤破ヲ備スハ皆悪候ナリ破トキハ真元洩レテ濃全身ヘ不至益元気損ニ臆スルナリ專ニ要トスルニ處ノ痘ハ天庭口邊ノ處ナリ是ヲヨリ審視ニ義目ノ痘アラハ吉兆ナリ他處ハサシリ剥破スルトモ唯面部第一ナリ其中又要トスルハ天庭也借貫儂ノ痘色唯痘ハ黄也ト云如リ全リ備リタル痘アラハ死症ニアラス黄濃ノ痘ハイカニモ蚶色粒皃キリチルル吉シ痘ヲ要トスル天庭口邊ニ有ヲバ是ヲ驚ヲ善悪可ニ察試ニ百皃ニ三ノ吉痘ヲバ皆可活是ニ不足ハ

不可救施ス事無シ惜乳ヲ多出ニテ是ノ朝迄ノ
イカニモ順リ送テ濃モ十分タルトキ俄ニ不乳不食
シテ忽憂ヲ成ス是元気ノ虚備ハラス急卒
出ルニ曾濃ニ有リ故ニ何程濃気充満シテモ是
ハ元気ノ不續リ故ニ乳食又二三歳迄ハ何程癒
ノ形ヨリトモ卒症有ル故多出トナテバ沙由断ス
ヘカラズ癒ノ順候ト見ヘルヨリ他ヘ抬ヲ譲ルモ
ヨシ惜又三四歳或ハ十歳以上壮年ノ者ニモ死
生半々ノ危症アリ是ハ癒ノ日利ト症ヨリ思
シ考テヨシ生癒ノ多出ナルハ皆難
症加テ危験アリ是ヲ見ルニハ如第一元気
虚実ヲハカリ元気ハ又食ニ有リ精神ノ充リヲ
考テヨシ是等大底ノ矩格ナリ惜テ症拠破
モ有リ脈数大ヲシテ力ナリ盧煩渇有リ大便
不通咀癒ツヨリ手足剥破シテ寝卧不安
或ハ少シリ冏ヘ眼封スレモ不安ホリタシテ不浄
口ニ穢臭ノ気甚シク又加ルニ合牙戦慄有リ
其外一切候備ハル時ハ症全リ死症ナリサテ癒
ノ形チ剥破シテ癒剥有ルニ拠破スル處皆無

ニシテ乾枯紫黒色ナリ蕎麥粉生肌散ノ類
敷(ヒ)ク膿(ウミ)汁乾テ不自是疽ノ悪候ナリ悉皆
死ナリ膏(カサ)薑ノ症アリテ又此内ニ生不ク明
ノ症アリ悪候悉リ加ル中ニ疽ニ吉兆有リ
蒼蠟色ト成テ悪キ疽ノ内ニ甚悦目ノ吉疽
面部ノ彼ノ有ルニ連々ナラヒテ七八景ヲ連テ
皆実満シ臙色神魂イカニモ吉疽有レハタトヘ諸
症危(アヤ)ク非トシテ不可捨ナリ但シ此症
貫濃二日ノ終迄ノ日ニ有ル王劑ハ医王生肌散
黒姜各量可考又專
獨參湯ヲ兼用ス

又ハ下痢煩渇有リ只脾胃ノ虚事ナルトキハ
君子多參白朮散加參大補湯用ユル事有
リ何レモ皆前ニ清解補ニ移ル所ナト治療
肖ケサルニ有リ發端ヨリ温補浮寒涼ノ治
混雑スルトキハ不可ラ療

又參蒼鹿茸湯ヲ用ルノ症有リ十二七歳
ヨリ以上都テ大人ノ重キ疽ニ用ルナリ寒邪
解毒連翹等ヲ用テ起腹ノ二日目晝濃ノ初日ト
ヨリ若(モ)シ未タ解毒モハナハタシキノ内托モ兼
テルトキニ場合ナリ若(モ)シ信解十分ニ行届キ内托

尊テ一症ニ拘テハ不可用是ハ攻補和並度時ノ主剤也
此場ヲ以テ他ニハ症ノ見試能ク定ムル手ハ容易用難キ
ナリ

出痘稠密毒火既盛然元氣虛亡
気弱津液枯竭不能制火或渇或
咽喉痛難任温補痘必成膿不成
結痂　是則チ参若鹿茸ノ湯ノ主治也左参加五分也
此主治ヨリ参考シテ可施咽喉痛專ラ加ルモノナリ
利咽解毒ノ類並用テヨシ左膿ニ至テ此参ヲ
用ルニハ人渡ハ離レヌヤウニ

膿之悪候者寒熱合并煩渇氣
逆泄瀉糞利皆凹胃腹飽滿悶乱
咳喘咳声啞音不
清口臭穢臭皆悪候也又脉遅細
弱者表寒而虛也脉沉細而皆遅
者裏寒而虛也

此脈論ノ九ヲ取テ云実ハ脈数難計ケレモ席上ニ
因テ大数ヲ云ノ為ナリ悪症ヲ主ノ備ル時ハ必死ナリ

重症ニハ何レモ是等悪症ヲ兼ル時ハ必死ナリ左悪

後ノ内ニモ軽重ノ候アリ軽キハ痘ノ形吉シ重キハ形不
宜キ歟難症ヲ見テ診察ヲ巨細ニシテ筆ニ任セカタシ
厭ニ似テ不厭痂ウスリ如紙ハ皆津液枯竭血
気虧損ニテ真元ノ気竭ル可疾
如斯ノ症起脹実濃治ヲ不誤術ヲ尽シテ日ヲ
送ルナレハ前症ヲ宗トスルナリ又痘成テ治ヲ誤テ
終ニ収厭ニ至ル症ヲ発シ痘モ不厭
ノ類モ有リ是ハ又必ス死ニ非ル有リ
是ハ前症ノ手当ヲ誤ル故ナリ