





武
436

巢源中古有巫方立小兒顯凶經以占天壽判疾病死生世所相傳有少小方焉

千金引小品又載此
方作坊





欽定四庫全書

顛顛經

提要

讀本暇齋記



臣等謹案顛顛經不著撰人名氏世亦別無傳本獨永樂大典內載有其書考歷代史志自唐藝文志以上皆無此名至宋藝文志始有師巫顛顛經二卷今檢此書前有序文一篇稱王母金文黃帝得之昇天秘藏金匱名

曰內經百姓莫可見之後穆王賢士師巫於
崆峒山得而釋之云云其所言師巫與宋志
相合當即此本疑其唐末宋初人所為以王
冰素問注第七卷內有師氏藏之一語遂托
名師巫以自神其說耳其名顛顛者案首骨
曰顛腦蓋曰顛殆因小兒初生顛顛未合證
治各別故取以名其書首論脈候至數之法
小兒與大人不同次論受病之本與治療之

術皆深中肯綮要言不煩次論火丹證治分
列十五名目皆他書所未嘗見其論雜證亦
多秘方非後世俗醫所可及蓋必別有師承
故能精晰如此宋史方技傳載錢乙始以顛
顛經著名至京師視長公主女疾授翰林醫
學乙幼科冠絕一代而其源實出於此書亦
可知其術之精矣謹據永樂大典所載哀而
輯之依宋志舊目釐為二卷俾不至無傳於

後為乾隆五十年二月恭校上

顛顛經

世傳為黃帝之書至周穆王時師巫得之於崆峒洞今不可攷

知新書卷四十一前代方書第十三

原序

夫顛顛者謂天地陰陽化感顛顛故受名也嘗覽黃帝內傳王母金文始演四序二儀陰陽之術三才一元之道採御靈機黃帝得之昇天秘藏金匱名曰內經百姓莫可見之後穆王賢士師巫於崆峒山得而釋之叙天地大德陰陽化功父母交和中成胎質爰自精凝血室免感陽興血入精宮女隨陰住故以清氣降而陽谷生濁氣升而陰井盛也甚者二儀互換五氣相參日覩元



機非賢莫達，謂真陰錯雜，使精血聚而成殃。陽發異端，感榮衛合而有疾，逆使嬰兒終養驚候多生，庸愚不測。始末亂施，攻療便致枉損嬰兒，吁哉！吁哉！遂究古言，尋察端由，叙成疾目，曰：顛顛經為真憑，辨證乃定死生。後學之流，審依濟疾，天和太清降乘赤海，真一元氣乘之，則母情先搖蕩漾熾然，是陽盛發陰當姓男也。六脈諸經皆舉其陽證，所謂姓衰不勝藏氣，則觸忤而便傷，姓勝而氣劣，則母疾三五月而發，皆隨五藏心藏乾而口

苦舌乾，肺藏端而多涕發寒，肝藏邪而胆酸多睡，脾藏發而嘔逆惡食，腎藏困而軟弱無力，藏姓氣平則和而無苦，胎若劣而強得藏養，至生亦乃多疾。二儀純陰之證，昇雜真一者，謂陰發陽，則父精薄，姓當成女也。六脉諸經皆發陰證，若血盛氣衰則肥而劣氣，若氣盛血衰則瘦而壯氣，餘藏姓之氣皆同。男說孩子處母腹之內，時受化和之正氣，分陰陽之綱紀，天地降靈十月而化，萬物以生成，隨其時變，大理清純化成祥瑞之基，全真

道一、故生成為一月為胚、精血凝也、二月為胎、形兆分也、三月陽神為三魂動以生也、四月陰靈為七魄靜鎮形也、五月五行分藏安神也、六月六律定腑滋靈也、七月精開竅通光明也、八月元神其降真靈也、九月宮室羅布以生人也、十月氣足萬物成也、太乙元真在頭曰泥丸、總衆神也、得諸百靈以禦邪氣、陶甄萬類、以靜為源、是知慎於調護、即以守恬和、可以保長生耳、故小兒瘦疴、蓋他人之遇也。

顛顛經卷上

脈法



凡孩子三歲以下呼為純陽元氣未散、若有脈候即須於一寸取之、不得同大人分寸、其脈候未復呼之脈來三至吸之脈來二至呼吸定息一七至此為無患矣、所言定息呼氣未出吸氣未入定息之中又至此是和平也、若以大人脈五至取之即差矣、如此七至以上即為有氣或脈浮如弓之張弦、此為有風、並可依後方合藥治。

之或七至以下此為冷候亦宜依後方合藥療之或診
候取平或忽而不見和沉浮不定伏益根平者此為神鬼
之病且合求崇續宜使葯或桃柳枝湯浴煎飲子為使
一兩顆挑心

孩子脉呼吸十五至以上三至以下皆死矣

病證

初生小兒鵝口撮噤並是出胎客風着顛臍致有此可
以小艾灸三壯及烙之愈

初生小兒一月內乳痢並
是母胃有滯熱所作也

初生小兒至夜啼者是有瘀血腹痛夜乘陰而痛則啼

初生小兒一月內乳痢如膠是母寒氣傷胃所致也

初生小兒一月內兩眼赤是在胎之時母喫炙博熱麪

壅滯氣入胎中熏兒腦所致也

小兒溫熱昏因同從氣熱實而搏胃氣使然若下之平氣即愈氣

壅則生驚而變癇

小兒驚癇一從虛邪客熱相持搏而生其候當用補養安

和即愈加以性冷及太過即死

虛驚虛

小兒噦逆吐皆胃氣虛逆氣客於藏氣而作當和胃養氣至如下冷即極小兒霍亂吐逆皆胃氣與陰陽氣上下交爭而作當用分和補葯調養即愈餘皆死

小兒客忤無辜皆因客入所觸及暴露星月小兒嫩弱

所以此候多惡

小兒一眼青揉養是肝疳二齒焦是骨疳三肉色白鼻中

乾是肺疳四肢乾肉裂是筋疳五髮焦黃是血疳六舌

上生瘡是心疳七愛喫泥土是脾疳孩子肌骨肥實皮

膚白無故煩渴此自小姪猛衝損肺但依後方內用甘

草人參合飲子若氣急其胃脹起鼻連眼下臉青色呻

吟之聲者以必死之兆不得與藥

孩子利如泔散者難效利如鵝鴨血者脾已爛損不宜

與藥

孩子凡有諸色疾苦但眼臉下垂牽必定死矣

孩子瘡昏難效或發無時即口噤咬牙作聲以必死矣

呼為瀝瘡疳瘡亦名為鎖腸疳

孩子渴喫乳食夜啼作聲此即腹肚痛

孩子無故搖頭此是腦頂風

孩子喫乳食皆出是脾冷

孩子無故肚大頂細四肢消瘦筋脉骨節起自是小米

少乳嚼食與喫早成骨熱疔勞先宜與保童丸喫續與

柴胡鱉甲引子

保童丸方見一切疔門中
柴胡飲子方見行遲門中

孩子頭面胷膊肌厚臂脛細瘦行走遲者是小時抱損

孩子鼻流清涕或鼻下赤瘡此是腦中鼻中疔極宜用

後方青黛散吹鼻兼傳下赤爛處

方見疔疾
吹鼻門中

已前並診候孩子疾狀孩子氣脉未調藏府脆薄膝理

開疎看脉以時依方用藥

孩子或夏中熱時因乳母沐浴多使冷水妳得冷氣血

脉皆伏見孩兒氣未定即與妳使孩子多胃毒及赤白

兩般惡痢此乃是妳母之過凡浴後可令定息久良候

氣定氣探與之即全無患

師巫燒錢乳母須預祝之勿令著水噴兒皆令驚熱入

心轉成患害切細填之

凡孩子自生但任陰陽推移即每六十日一度變蒸此
骨節長來四肢發熱或不下食乳遇如此之時上唇有
珠子如粟粒大此呼為變蒸珠子以後方退熱飲子療
之不宜別與方藥幼幼新書注云顯顯經以六十日為
一變巢氏病源以三十二日為一變
說有不同
故魚存之

驚癇癩證治

牛黃丸 治小兒胎驚及癇或心熱牛黃圓

牛黃 龍齒 馬牙硝

鐵焰粉各一分

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每日乳食前熱水調
破一丸灌下令母忌口

又牛黃丸 治孩子驚熱入心遂成癇疾面色不定啼
哭不出潮熱無度不喫乳食大段眼翻露白手足逆冷
呼喚不應牛黃丸

牛黃研

大黃

獨活各一分

升麻

琥珀研 各別

萊菔粉

大麻仁別研 各半兩

右為末蜜丸如梧子大空心熱水下一丸頓服之食後再服一九至十歲加金銀箔各五片忌博炙毒物

虎睛丸 治孩兒風癇驚啼不喫乳虎睛丸方

虎睛一隻

犀角

子芩各等

梔子仁

大黃各十分

右五味為細末鍊蜜丸如梧子大桐驚啼不喫乳无汁

下一服七丸風癇米飲下五丸至七丸兒小減丸數取利

二為度忌毒物若有虛熱加知母六分

又虎睛丸 治小兒孩子二十四種驚癇壯熱抽掣脚

手嘔吐夜啼眼腫安驚癇虎睛圓方

虎睛一隻 對聖惠

梔子仁

茯苓各二分

牛黃少許 聖惠

人參一分 聖惠

鉤藤

大黃各四分

犀角

末一分 聖惠

蛇退七寸 燒一分 聖惠

右為末蜜丸如黍米大空心熱水下隨年九輕者一服重者三服妳汁下亦得聖惠熱水下妳母忌一切生冷油膩毒物

廣利方 治孩子驚癇不知迷悶嚼舌仰目

牛黃一大豆

右為細末研和蜜水服之

二十二味虎睛丸 治孩子從一歲至大癩發無時口

出白沫小便瀝不利 **二十二味虎睛丸**

^一虎睛乾一雙 酒浸令黃色

^五蚱蟬翅四枚 去足

^二真珠

蜂房各三錢

麻黃二分 去節

鈎藤分三

鐵精

防葵

大黃

子苓

龍齒

銀屑

梔子仁

羌活各四分

柴胡

升麻

白鮮皮

雷丸燒令赤

人參各三分

細辛一分

蛇皮五寸

石膏分五

右為末蜜丸如赤豆大四五歲五九日再服大兒十
丸濃煎米飲下忌生冷油膩

疳痢證治

保童丸 治小兒孩子諸色疳疾或腹內虛脹驚癇頭

髮立常咬手指脊疳疳勞臂脛細弱仍立不得及鼻下

常去清涕涎流不止舌上生瘡腦疳口疳腹上筋脉青

保童圖方

虎睛半

砂硃朱砂

麝香射子各一分

牛黃

龍腦

巴豆

芎藭

桔梗

枳殼

檀香

茯神

人參

當歸

羌活

代赭

雞鶴虱

白朮各半

右為末細下香砂巴豆各半令勻鍊蜜丸如梧子大一歲
至五歲每日一九十歲每日兩丸並空心米飲下但
稍知孩子病甚即加葯與之孩子未效妳母忌生冷
油膩炙博毒魚大蒜米醋

又方 治孩子疳痢諸色疳并一十五種病狀一腹大
二皮膚黑黃三骨節羸四眼赤五口赤六鼻中生瘡七
頭髮黃八咬指甲九愛喫土十受喫甜物十一身熱十
二頭大十三臍凸十四項細十五面無光並宜常服保
童丸方

硃砂

分半

牛黃

麝香

蟾酥

許各少

阿魏

分二

右先將硃砂於淨器中研如粉入諸藥一時以蒸餅

為丸忌羊血生冷等

又方 治孩子疳氣或釀肚脹上筋脉頭大項細喫物
不知足夜中即起腹內長鳴方

大黃

兩一

陳橘皮

浸二兩酸醋二日晒乾

二合

蜨娘

二十箇去翅足子熟燒醋安之以
益益地上去火毒候冷取出炒過

右為末蜜丸如梧子大每日空心熱水下十九忌如

常

紫雪圓方 治小兒五疳魚腹肚虛脹疳氣煩悶或時

燥渴

大黃

黃連

代赭各二分

硃砂

麝香各許

杏仁別去皮尖

肉豆蔻

巴豆別去皮以冷水浸

右為細末蜜丸如赤豆大每服空心米飲下一圓五

歲十歲只可服五丸臨時加減忌冷水油膩炙博

硃砂丸

治孩兒疳痢辨虫顏色定吉凶

硃砂蓮半大石

阿魏研如大硃

蝙蝠血三兩

益壽蟾酥許 右為細末和少許口脂調先以桃柳枝煎湯浴免後看小兒大小以菘豆大填兒臍中後用紙片向臍中貼之用青衣蓋免看蟲出來黃色輕青黑色重青黛散治孩兒鼻流清涕或鼻下赤瘰

青黛錢一

蘆薈

地龍各半

硃砂錢一

瓜蒂錢半

細辛錢一

宣連錢半

右為細末研和合吹鼻中入麝香少許

保童丸方

硃砂

麝香

新蟾酥各等

右研合成劑合子內盛丸如麻子大又於一合子內浸一丸以筋頭點入鼻中亦名問命丸但孩子病甚即與吹之或得七噴可以治之五噴即甚三兩噴必死矣此不可深著水浸臨時入水亦不畏

益腦散 治孩子腦疳鼻癢毛髮作穗面色赤益腦散方

地榆炙

蝦蟇一燒各

蝸牛殼一二十箇

青黛

石蜜各二

麝香二大許

右為末吹鼻當有黃水出忌甜物

胡黃連丸 治孩子熱疳

胡黃連

蟾酥各等

右為末蜜丸如菉豆大五歲熱水送下二丸

調中丸 治孩子諸疳或熱攻衝心肺氣急晝夜有汗

日漸羸瘦不喫乳食調中丸方

柴胡

茯苓

人參

木香

桂心

大黃

濕紙
裏煨

枳殼

燒炒去
穢

甘草

炙

鱉甲

醋炙各
等分

右為末蜜丸如桐子大每歲兩丸至五歲三丸熟水

下忌如常

地黃煎方

治孩子疳勞肺氣熱咳嗽四肢漸瘦心肺

乾地黃煎方

生地黃汁

蟾酥

生薑汁

蜜

各兩

鹿角膠

半兩

右先將地黃汁安鍋內慢火煎手不住攪約五六沸

下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎候如

稀飭即住火每食後兩度共與一匙頭忌毒物

又方治孩子疳蝕口齒齲宣露臭穢不可近

葶藶

梧桐律

右為末以臘月猪脂調微煎作膏取柳木筋子綿裏

微溫藥時烙

又方 治孩子疳蝕唇鼻及諸瘡方

硫黃

乾漆

文蛤

右等分燒灰稍烟盡研為末入麝子少許以帛拭瘡
膿血後用葯乾摻之立效

又方 治孩子初患諸色痢及微有疳氣

右用枳實不限多少炒令黑拗破看內外相似為散
空心米飲下半錢以歲加減服之忌如常

又方 治孩子赤白痢方

阿膠

赤石脂

枳殼炒

龍骨

訶子

炮 煨 各半兩

白朮一分

右為末一歲二歲空心米飲下半錢

又方 治孩子冷毒疳痢白膿疳疔日加瘦弱不喫食
腹痛方

青木香

黃連

右為末以蜜丸如梧子大一歲以上空心熱水下一丸
三歲五歲服二丸葯性熱者不宜多服忌生冷

溫脾散方

溫脾散 治孩子水瀉利并脾冷食乳不消喫奶頻吐

附子

乾薑

甘草

白朮一兩

炮劉各半兩炮

右為末空心米飲下半錢忌鮮魚毒物

顛顛經卷上

顛顛經卷下

火丹證治

黃帝問岐伯曰後生少稚多被惡疾丹毒二品若何分
之岐伯曰陽解百年一十以上為毒一十以下為丹丹
毒一也隨其大小分別以治之有毒至依方萬無一差
喻人間男女皆遭丹毒至依此枉死者復何限哉良由
信邪師之語仍被恐之愚昧之人勿與下手請依方用
之今出此圖形狀如後按此圖

伊火丹從兩脇起

神竈丹從肚起

尿竈丹從踝起

胡吹竈丹從陰囊上起

天水丹從腹背遍身起

天雷丹從頭頂起

標火丹從脊甲起 方閣

胡漏竈丹從臍中起

廢竈丹從曲臂起

神氣丹從頭背起 上

土竈丹從陰踝起

朱黃丹赤豆色遍身上起

螢火丹從耳起

野竈丹從背脊起

鬼火丹從面上起

伊火丹從兩脇起

右用猪糞燒灰并鐵槽中泥拌調塗之曰三神竈丹從壯起

右用土蜂窠杏仁臙粉生油調塗立差

尿竈丹從踝起

右用屋四角頭茅草燒灰使雞子白調塗之

胡吹竈丹從陰囊上起

右用水茄窠下沉和苦酒塗之

天水丹從腹背遍身起

右用梓皮白末和生油調塗之亦用赤名脂羊脂調塗之

天雷丹從頭頂起

右用陰乾葱末拌脂塗又用竈下土雞子白調塗

胡漏竈丹從臍中起

右用屋漏水調竈中土塗之

廢竈丹從曲臂起

右用屋四角茅草灰雞子白調塗之

神氣丹從頭^背上起

右用牯牛骨燒灰羊脂^調塗之

土竈丹從陰踝起

右用屋四角茅草竈橫麻及雞子白調塗之

朱黃丹赤豆色徧身上起

右用慎火草搗汁和酒調塗之

螢火丹從耳起

右用慎火草搗汁^{和酒調}塗之^立聖惠以醋調塗之

野竈丹從背脊起

右用桑香茸^菴菴菴赤小豆末塗之立差

鬼火丹從面上起

右用竈下土雞子白調塗之^立差

雜證

平和飲子治小兒初生可日與之^无平和飲子

人參

茯苓

甘草

升麻

^{已上各一分}

右以水一白盞煎至一合半月以來時、與之乳母
忌油膩滿月及百晷以來加之臨時冷加白朮熱加
缺各半錢

又方 治孩子臍中不乾

白礬一錢 龍骨

右以細末入麝香少許每次使拭臍乾摻之用怕裏

避風

青水香散 治孩子陰囊或如疔腫脹青木香散方

狐陰一雙

蒺藜炒

地膚子

昆布

枳殼炒

槐子炒各

右為末一歲二歲空心米飲下一錢

又方 治孩子蛔虫咬心痛面伏地卧口吐清水痰涎方

檳榔

苦棟根

鶴虱炒各

右為末空心熱茶下一錢以意加減忌粘食

杏仁丸 治孩子或渴此是蛔虫傷宜服杏仁丸方

杏仁去皮

膩粉各一

右為末每用唾丸空心米飲茶任下二丸

又方 治孩子赤遊腫或如丹煩渴渾身赤瘤壯熱方

菜豆粉 鉛白霜

右細研薑薑汁調塗之

又方 取鉛霜法將鉛來於石上打令薄抵地作坑可

鉛片大以杵搗坑實滿坑著醋以鉛蓋定經一宿去取

霜如珠子大和藥使之如煩渴以後服解熱飲子方

又方

麥門冬 小蘆根

乾葛搗末

木漏蘆

犀角屑各等

右用水四合為半兩煎一合無問食前後徐服與之服

消石散 治孩兒身上無故腫但覺肉色赤熱消石散方

消石

大黃

菜豆各等

右為末每用時隨腫大小取菖蓮根研汁調塗腫上

如有惡物即看有點子以膏貼之四面以散子燻之

若無菖蓮根即用雞子白或車前根葉亦得

又方 治孩子胎中受風長後或滿身疥癩如疥癩或
如飲飽痒瘡方

葱白

硝

臭黃

硫黃

各等分

右用油半兩燒令熱下少許蠟先剥葱白三莖細切
得油熱即潑葱上細研續下硫黃臭黃硝更研之旋
塗

苗香散 治孩兒赤眼并胎熱及疳障多淚苗香散

苗香

冬青膽

陰乾

生甘草

各等分

右為細末每洗眼時取藥一分水一盞煎十沸後溫
洗之或孩兒長大即加藥并水

引子方 孩兒用藥洗眼後可更服之飲子方

知母

黃芩

青箱子

地角子

秦皮

車前子

山梳子

獨活

各等分

右藥以水五合煎二合去滓溫服忌食如常

又方 治孩兒聾耳方

白礬 半兩 燒過

龍骨

鉛丹 燒各一分

麝香 許少

右為末以綿裹竹枝子淨探膿水以一小豆大為傳之別以綿裹塞填之勿令見風

又方 治小兒聾耳

石硫黃 製

右為末以糝耳中日一夜

又方 治孩子小便不通方

茯苓

車前子 各等分

右以水四合藥半兩煎一合半作二服忌油膩

側柏散 治孩兒風熱側柏散方

側柏

鬱金

天麻 酒浸一宿

乾蝎

天南星

地黃 去土

子苓

大黃 已上各半兩

右為末治風及驚溫酒下退熱每夜熱水下半錢
柴胡飲子 治小兒行遲小兒自小傷抱脚纖細無力
行止不得或骨熱疳勞肌肉消瘦

柴胡

蟹甲

米醋
塗炙

知母

桔梗

枳殼

麩炒
去殼

玄參

升麻

右藥等分並細剉每日煎時三歲以下取藥半兩水
五合煎二合去滓分兩服空心食前後各一服忌毒

物飲後用澡浴方

澡浴方

苦參

茯苓皮

蒼朮

桑白皮

白礬

各半
兩

蔥白

少許

右藥剉細每浴時取一兩沸水二升浸藥後通溫與
兒浴之避風於溫處妙

又方 治小兒數歲不能行

取葵家未開戶盜其飯食來以哺之不過三日便起

行勿令人知之

治孩子脫肛方

右用苦葫蘆一箇并子細擣時々水調服之切忌動風之物如瀉血用菰蘆一個慢火燒令熟細研為末熟水下一錢

又方

大黃二兩

木賊草一分

白礬羊蒿

右為細末空心米飲下半錢

顛顛經卷下

己卯桂月廿日括明人鈔本劉氏幼々新書所援文按勘併補證則方道

元胤識

文政辛巳九月念一日括于筆修堂鈔本對校併錄劉柳泚

朱書校補

卯田章記



上海

上海
第九百四十四号

