

傷寒論句解

上

十武
453
/



武
453
1

序

醫之爲術不可不易簡也傷寒論之
文易而簡鑿之尚易簡也尚矣深齋
先生之爲醫欲芟其榛蕪以復古道
則其言不得不辨辨則煩其事不得
不詳詳則雜煩而且雜論者或謂不
切乎療術也豚犬命也剪裁其書間
亦廁其新意韋之於句中名曰句解



令讀者不勞思煩雜也易簡之法於
是乎在深齋先生之道亦殆不泯哉
其意蓋勤焉因姑題其首以此言也
文化丙寅秋八月

淡齋吉川元茂識

傷寒論句解卷之一



傷寒論十卷殷伊尹所著所謂湯液論是也漢志
曰湯液經法隋志曰辨傷寒十卷唐志曰傷寒卒
病論十卷皆謂此書也今傷寒論分為八篇太陽
三陽明一少陽一太陰一少陰一厥陰一是也私
按仲景必分藥方為二卷載之卷末亦猶玉函經
請方載之卷末也今傷寒論諸加減方載在卷末
蓋古之遺意也古人皆謂傷寒論漢長沙太守張
氏仲景所著私考其文理淵奧與推起適秦漢

中邱元恒著



洄殷周實古文之可尚者漢末之人非復所能作也夫病之為道元為訂物變化縱橫莫知其所究唯傷寒論子能應之治術之繁然簡冊之述然非天下之至精其孰能與於此乎醫人不知文儒士不識醫是以上下數百年間但有察此者也仲景氏所著金匱玉函經隋志曰張仲景方十五卷唐志王叔和校仲景藥方十五卷是也當時唯稱仲景藥方未有金匱玉函之稱名之金匱始見葛洪肘後方序及賈公彦周禮疏稱之玉函始見外臺秘要此胡加芒硝湯條下金匱玉函經後又改之

曰金匱方論王氏洙得於館中復改之曰金匱玉函要略後又及林氏億等校之分為二書一為玉函一為金匱方論今之金匱要略是也王氏意以仲景藥方為之傷寒論又以此名之仲景氏而伊尹傷寒論之名遂亡不亦惜乎傷寒論自是傷寒論耳金匱玉函自是仲景藥方耳孫氏思邈之撰千金翼方舉金匱要略所載為之仲景方是也仲景氏首取傷寒之文下輯集諸方名之仲景藥方特公行天下傷寒隱微不見觀千金方不引用之可以知已林氏億序曰以其傷寒文多節略故

斷雜病以下云云傷寒論亦至宋開宣中出高繼
冲所編錄上進是也後九十七年治平中林氏德
莘校正於是傷寒論又盛行與金匱要略並立而
王函之書不復行也夫仲景氏之述王函經也本
取之傷寒論而尤其古者文字異同有就而取正
者視其有節略為之異本者不可也視為二書愈
不可也羽趙開夫合傷寒金匱為一書自謂得復
古之意此則以傷寒論為王函經者余即合王函
金匱為一所謂仲景方十五卷儼然復于古與傷
寒論並行庶幾得古意哉外臺所引有十八卷之

數十八二字必有誤耳清康熙中陳世倅得宋本
王函經始行之于世今所存者是也余亦用之也
傷寒有二本一為宋本宋治平中高保衡等校定
一為成本成氏自注本今收之醫統正脈中而
又有汪濟川王執中張遂辰等校本傷寒論本是
一家之言其所謂三陰三陽固非經絡之義寒固
非冬時嚴寒之寒傷寒論宜以傷寒論不復求之
素問難經也素問所謂太陽即本論所建太陽麻
黃證陽明即本論太陽太青龍證三陰即本論陽
明其所剽竊者如此也陰陽本是寒熱要之素問

有熱但寒寒熱不具療法不全也素問即後人之偽
撰本取之傷寒論失其義者也漢儒唯言太少而但
陽明而陰也三陰三陽傷寒一家之言不假儒家之
言不用道家之說獨步字箇孤行古今豈可以尋常
方書視之乎哉藥之為能大性也或一味而通其證
或合數味應其病非如後世以臆合之以私去之妄
妄意攸行亂其真之比也非殷家之古書何也漢世
儒者著書但自此之者而謂仲景氏所著者我則不
信之矣嗟仲景何人漢書但傳血錄考其實唯林
氏億寺校正序引名醫錄曰為長沙太守不知名醫錄

何書或曰名醫別錄或曰耳伯宗名醫傳二書又
今俱亡而不傳亦無錄就考之果太守而通此
伎也非常之人未有儒而及此者又何無一善政
之稱其職從龔遂侯霸之輩見于青史乎或曰以
其所能名高掩之耳若然則又何不與扁鵲倉公
顯于世世大可怪也按三國志漢靈獻之間長沙
太守有張陵及其子憚未聞張機字仲景者或曰
仲景蓋陵之族未詳一說又曰肘後方序曰仲景金
匱曰元化青囊抱朴子雜載篇曰龔霸金匱曰華
佗青囊夫華佗與元化為一人則龔霸與仲景為

一人亦可知耳果其然乎益知仲景氏所著金匱
而非傷寒論也或以為金匱上函傷寒論美稱非
別有其書說也或又以為劉知幾論史不作史故
世不以良史稱之嚴滄浪論詩不作詩故世不以
詩人目之也即若仲景氏著本論亦自不能醫故
又但醫人之稱劉敞二子之比已余謂本論之文
躬修實踐非徒說其理者則豈可同之焉服君之
子誦兵視之乎哉嗚呼走卒聽矣次之殷家隆德
為心盜也討夏桀而天下服之夜太甲而諸臣信
之遂享世八百年不亦盛乎伊尹輔相之力為

多也特懿雍之慨今之間無有一書爭先日月者
但訓太甲諸篇固係後人偽造而猶有古言可耐
佩服者則時事亦可想像也唯有此篇之傳美乎
哉以觀國光也伊尹始耕于有莘之野樂堯舜之
道于畝畝之中出輔湯王嚴軍事謀政令建功于
革命之間載于經見于史伍之周公太公稱聖之
任伊尹而及此方伎固屬土直亦猶神農氏黃帝
氏位居禹東之尊淵兮其淵浩兮其大匪夷攸思
傍及此末伎也亦何疑焉元儒學氏激既為之說
實得吾心者也余^故斷曰傷寒論伊尹所作也仲景

氏所著金匱玉函耳

此知大陽上篇為之成書也

七脈之是不皮了

七脈之是不皮了

太陽上篇

太陽上篇 三陽皆主熱而乾之不同其淺深也太陽則在表之表以頭項為其部也以發熱惡寒為其狀也故治法則宜發汗而復有輕重之別方劑從之也又合病併病而治法亦從之有先後之別也若一失其輕重之等與先後之例則真不誤而變也今為三篇特與他篇不同其趣也

太陽之為病

先說太陽病狀故脈浮有熱之候頭項

強痛

言頭項強痛而惡寒上已望三陽皆主熱特以惡寒為

太陽標也

蓋脈浮三陽皆主熱特以惡寒為

所通也

惡寒太陽所專也○太陽病發熱果在干發

也汗出

此非汗必汗出也對傷惡風音也而傷寒之輕

寒風不別之也

在風脈緩者不言其緩也緩於常脈之謂也

此知大陽上篇為之成書也 七脈之是不皮了 氏所著金匱玉函耳

氏所著金匱玉函耳

太陽上篇
卷之六

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

太陽上篇

三陽皆主熱而乾之不同其淺深也太陽

之別方劑從之也也故治法則宜發汗而復有輕重
之別方劑從之也也故治法則宜發汗而復有輕重
之別方劑從之也也故治法則宜發汗而復有輕重

太陽之為病

先說太陽病狀故脈浮有熱之候頭項

強痛

言頭項強痛而惡寒上已望三陽皆主熱特以惡寒為

太陽

標也蓋脈浮三陽皆主熱特以惡寒為

所通也

惡寒太甚也蓋脈浮三陽皆主熱特以惡寒為

也汗出

此非汗必汗出也對傷惡風惡寒之輕

風不別

之在風脈緩者不言其緩也對傷惡風惡寒之輕

寒分

別之也脈緩者不言其緩也對傷惡風惡寒之輕

戴霸金匱曰華佗青囊夫華佗與元化為一人則
戴霸與仲景為一人亦可知也果其然乎益知仲
景氏所著金匱而非傷寒論也或又曰劉知幾論
史不作史故世不以良史稱之也嚴滄浪論詩不
作詩故世不以詩人目之也即若仲景者醫書亦
自不能醫故又無醫人之稱劉嚴二子之比已余
曰本論之文財修實踐徒非說其理者則豈可同
之焉服君之子論兵視之乎哉嗚呼克瘳邈矣次
之者殷家尤為盛也討夏桀而天下服放太甲而
諸民信不亦盛乎遂享世八百餘年伊尹輔相之力為多也

特憊雍々熙々之間無有一書單光日月首但訓
太甲諸篇因係後人偽造而猶有古言可耐佩服
者則時事亦可想像也唯有此篇之傳美十載以
亂國光也伊尹始耕于有莘之野樂克寧之道于
厥畝之中出輔湯王議軍事謀政令建功于革命
之間載于經見于史伍之周公太公稱聖之任伊
尹而及此方伎固屬土直亦猶袖農氏黃帝氏位
居焉衆之尊淵々其淵浩々其大匪夷攸思停及
此未伎也亦何疑焉元儒吳氏濂既為之說曾得
吾心者也余故緘曰傷寒論且且所作也

中風 統言之則皆是傷寒今姑分
其差而石輕者為中風也
○太陽病或已發
或未發也 必惡寒
發熱非言體痛嘔逆
無熱者言體痛嘔逆
之緩緊與有汗脈上太陽證
則於文為煩也然嫌于陰陽
太陽中別有陰陽也
者三陽以浮緊為傷寒則在
風寒也後汗亦可知也
輕重為之別也唯脈之緩緊可
與名曰傷寒之輕重之分也
○病
主太陽言之惡寒者發於陰
故言發熱也惡寒者發於陰
暈言熱也惡寒者發於陰也
承上陰言三陽也而無熱也
示

無熱者之別也而不特惡寒下
利疼痛及煩躁皆可從而知也
太陽中風 上篇主太陽中風今於
在太陽特在桂枝湯則或脈不
大則或為輕于陽者明也其弱
其機即在于此也察陽浮者熱
自出已陷于里也如身將惡寒
惡寒或翁翁起氣浮越之類蓋
惡風也翁翁起氣浮越之類蓋
混陽明也是以辨之形即斤兩
風惡寒又言其形狀者即斤兩
嘔者氣鬱桂枝湯主之桂枝湯
耳中兩生薑大棗十二枚右五味
大豆以水七升微火煮取三升去滓
適寒溫服一升

服已須更飲桂枝粥一升餘以助藥力溫覆令一時
許遍身粟令微似有汗首益佳不可令如水流清病
必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑遺二若
下汗更服依前法一又服又不汗後服膏小促其間半
日許令三服盡已盡若病重者周時十一觀之歷觀
服一劑盡初所謂令病證猶在首更作服如始服
若汗不出首已服乃服至二劑禁生冷粘滑肉麪
五辛酒酪臭惡等物○太陽病對前條太陽中風服
頭痛對次條發熱○汗出惡風者桂枝湯主之
此對前條則為少重也然又在太陽中風之中矣
是以不二其方劑而略之從促其間與否之際

太陽病○項背強几几○項背難反汗出此證
根湯故主焉○根湯論之惡風音發於陽首也而不舉
汗出日反欲其不混也○惡風音發於陽首也而不舉
同其病位桂枝加葛根湯主之○同其病位桂枝加葛根湯主之
而略之也根枝加葛根湯方於桂枝湯方中加葛
去麻黃湯○根枝加葛根湯方於桂枝湯方中加葛
根四兩餘如桂枝湯法○根四兩餘如桂枝湯法
太陽病三日發汗之法○發汗不解○發汗不解
發熱者或大便為胃也○發熱者或大便為胃也
調胃承氣湯方大黃四兩芒硝二兩芍藥二兩甘草二兩
變有也○調胃承氣湯方大黃四兩芒硝二兩芍藥二兩甘草二兩
三味以咀以水三升直取一升去滓升芒硝更上火
微直令沸少少溫服○太陽病下之承氣湯後○承氣湯後
與調胃後○與調胃後

後之其氣但形而上衝者可與百對之辭凡曰可與則
也曰不可與則言此桂枝湯此可與而後不可與
不可與而彼可與也桂枝湯之方用煎法
汗之用發若不上衝者汗下之變不可與之
與之○太陽病三日已發汗尚不若下若湯
也○仍不解者桂枝不中
汗之○仍不解者桂枝不中
街○仍不解者桂枝不中
過○仍不解者桂枝不中
可為非桂枝證也故不曰不可與也○仍不解者桂枝不中
病難察之證故觀其脈證知○仍不解者桂枝不中
治之○桂枝本為解肌
麻黃汗不出者○桂枝本為解肌
須識此勿令○桂枝本為解肌

太陽病承桂枝湯及加發汗遂滿不止
言位之惡風發於小便難
已變者惡風發於小便難
急物急之難以屈伸者
弱之桂枝加附子湯方於桂枝湯方中加附子一枚
餘依桂枝湯法太陽病下之後
胸滿者此言上衝之甚者未至胸
藥湯土之桂枝去芍藥湯方於桂枝湯方中去芍藥
餘依桂枝湯法若微惡寒者
藥加附子湯主之桂枝去芍藥加附子湯方於桂枝
去芍藥湯中加附子壹枚餘依桂枝湯法

太陽病得之八九日以桂枝如瘧狀若陽明發熱惡寒仍在熱多寒少已非桂其人不可更發汗大便欲自可未轉一日二三度發至此為各脈微緩者以後服為欲愈也若之為緊脈微而惡寒者諸病皆此陰陽證已愈但虛不可更發汗此陰陽證已愈更下更吐也豈仍全未欲解也以其不能得小汗出身必痒不唯此亦復例于桂枝二麻黃一宜統其類之辭桂枝二湯及桂枝二越婢一湯也在越婢一湯皆桂枝麻黃各半湯桂枝麻黃各半湯方桂枝二兩芍藥生薑麻黃甘草兩半大棗六枚杏仁十二

五石七味以咀以水八升先煮麻黃一二沸去上沫同芍藥取二升去滓分溫三服餘如桂枝湯法大陽病初服桂枝湯得之八九日其人不可更發汗欲自可在反煩不解者宜服桂枝湯其法也枝湯則愈桂枝湯○服桂枝湯大汗出發汗不如脈洪大者此雖已及陽明于惡寒胸桂枝湯如前法若形如瘧日再發者自發熱惡寒至清便即汗出必解服後宜桂枝二麻黃一湯桂枝二麻黃一湯芍藥枝二兩芍藥生薑各二大棗八枚甘草兩麻黃一兩杏仁二十個百七味以咀以水八升先煮麻黃一二沸去

上沫丹諸藥煮取三升分溫三服餘如桂枝法○服
桂枝湯大汗出後世承前條而言大煩渴不解未解

也前除雖不曰渴其有渴以可知也未解脈洪大者白虎加人參湯主之白

虎加人參湯方於白虎湯方中加人參三兩餘依白
虎湯法○服桂枝湯或下之非必誤仍頭項痛

翁發熱無汗對前之有汗也心下滿微痛此因小便

為少陽證也與大承小便利不利有此為太陰長熱首

氣湯日心下痛祇同小便不利有此為太陰長熱首

太陰病脈浮者發汗是也而今不發汗者為小便

不利之為急證也然何不用五苓散于五苓散亦能

屬表輕于熱有深且專于類召禹少陽也

桂枝發汗之正治法宜去桂利之變治法不加茯苓

苓白朮湯主之桂枝去桂加茯苓白朮湯方於桂枝

湯方中去桂加茯苓白朮各三兩餘依桂枝湯法小

便利則愈音表証而先救小

太陽病發熱惡寒仍多寒少已非桂脈服後微

弱首始之為緊數此魚陽也證也不可發汗宜桂枝

二越婢一湯此證特不舉再發之例不可拘也此雖輕於彼不無再桂枝二

越婢一湯方桂枝芍藥甘草麻黃各一生薑三石膏

二兩大棗十二石七味以水七升先煮麻黃一

二沸去上沫丹諸藥煮取二升分溫再服餘依桂枝

法書云... 十一

傷寒 上篇結尾且顧桂 脈浮 緊數微弱 自汗出小便

數心煩微惡寒 腳攣息 此似桂枝證而非桂枝證也

湯也緊數則為白虎湯也 反 傷與桂枝加附子 蓋

此陰蓋主芍藥牛膝湯也 反 以脈微弱音言之也

與桂枝湯欲收其表此誤也得之 言與桂便微咽

中乾煩躁 煩之吐逆者作耳 中乾 豈湯與之若便愈

足溫者 惟以下諸證悉愈 更作芍藥甘草湯與之惟

於與耳 惟乾豈湯之後在 豈與調目承氣湯若四逆

若 湯之後亦當與芍藥中乾湯也 此立方也故曰更

冒承氣湯 不舉之者 讓之期 冒承氣湯略之于此首

也且桂枝加附子湯之變至于四逆湯則白若 又言

虎湯之變至于太承氣湯亦可知也 已 桂枝

加附子湯 重 汗 言用 脈 復 加 燒 鐵 者 甚 四 逆 湯

主之 不舉 四支 厥令 背承 之中 中乾 豈湯 彼為 微咽

於上 篇也 已 備全 篇之意 故且 舉方 略證 也 〇 太陽 之

寒為 終也 所謂 全篇 之意 故且 舉方 略證 也 〇 太陽 之

陰弱 之變 自桂 枝加 附子 湯至 白虎 湯至 調目 承氣 湯

備全 篇之意 亦承 陽浮 陰弱 之義 蓋之 于此 陽浮 陰

弱即 是全 篇 甘 艸 乾 豈 湯 方 耳 艸 兩 乾 豈 兩 右 二 味

之綱 領也 也 艸 兩 乾 豈 兩 右 二 味

取一升半去滓分溫再服四逆湯方耳 艸兩乾豈兩

取一升半去滓分溫再服四逆湯方耳 艸兩乾豈兩

取一升半去滓分溫再服四逆湯方耳 艸兩乾豈兩

取一升半去滓分溫再服四逆湯方耳 艸兩乾豈兩

取一升半去滓分溫再服四逆湯方耳 艸兩乾豈兩

取一升半去滓分溫再服四逆湯方耳 艸兩乾豈兩

率分過再服強人可大附子一枚乾薑三兩
也湯
脈則通

傷寒論句解卷之二

中邛元恒昔

太陽中篇
上篇則論太陽中風中篇則論傷寒傷
標之者此為太陽中風也中篇以上篇以太陽病
者此為傷寒也今自篇起以桂枝湯中篇傷寒以
又及大青龍湯蓋從輕重之存者其變又極
千四逆湯而後承桂枝麻黃出小柴胡湯以博
其變也其變之未盡于此而後及下篇則以傷寒
桂枝之變也而己非以太陽之藥則標之以傷寒
而不以太陽病也飲以六部位通而一之也
皆本論之
如本也
太陽病
本位其
項背強
對麻黃
八分無汗
根桂枝加葛
也出惡風
熱發者
痛恒逆等自具其中
葛根湯主之

葛根湯方葛根四兩麻黃二兩桂枝二兩芍藥二兩甘草二兩生薑二兩大枣十二枚右七味以水一斗先煮麻黃葛

根減二升去上沫作諸藥重取三升去滓湯服一升

覆取微似汗不須啜粥餅如桂枝湯將息及禁忌○

太陽上之葛與陽明惡熱煩合病者葛根湯所主也

病必自下利主未下利者然葛根葛根湯主之則

先長後衰之治例也若葛根證○太陽與陽明合病

舉前不下利亦與前降但嘔者葛根加半復湯主之恒下

葛根加半復湯主之若麻黃及大青龍湯證而葛根

加半復湯方於葛根湯方中加半復半升餘依葛根

湯法○太陽病桂枝證頭痛發熱汗出惡風是為桂

舉之者示為根黃今黃證也不必拘桂枝證而今

連湯之不類葛根湯也深谷之辭反下之利遂不止

止脈促者下利不止則脈當微弱表未解也喘而汗

出行屬女葛根黃連黃芩湯主之葛根黃連黃芩湯

方葛根一斤甘草二兩黃芩三兩黃連三兩右四味以水八升

先煮葛根減二升內諸藥重取二升去滓分溫四服

太陽病標其頭痛對葛根湯發熱明疼痛及喘身疼

腰痛骨節疼痛不拘其惡風無汗而喘者此主無汗

喘也麻黃湯主之麻黃湯方麻黃二兩桂枝二兩甘草二兩杏仁五十

仁同右四味以水九升先煮麻黃減一升去上沫

升請藥宜取二升半去滓溫服八合復取微似汗不

須勞粥餘如桂枝湯將息○太陽麻黃與陽明實

病喘而胸滿者未至胸滿則尚專于太陽未不可下

似可宜統葛根湯及小青麻黃湯主之○太陽病十

日以去猶言脈浮細而嗜卧者其始脈浮數熱外已

解也設外逆已解不無胸滿脇痛者日胸滿與小柴

胡湯下論小柴胡脈但浮者蓋舉脈略證首也與

麻黃湯下論小柴胡脈但浮者蓋舉脈略證首也與

太陽中風初位在桂脈浮緊發熱惡寒身疼痛舉麻

言之已與桂枝湯不得汗出已與麻黃湯而煩躁

者不唯麻黃證不大青龍湯主之此又論陽浮若脈

微弱又論陰汗出惡風者若有發熱則桂枝湯所宜

宜也不可服或止示陷十陰位之微服之則順逆

筋惕肉瞤此為逆也下附子湯乾薑四逆湯皆胎胎

于此大青龍湯乃麻黃兩桂枝兩杏仁四生薑兩

也大青龍湯乃麻黃兩桂枝兩杏仁四生薑兩

升去上沫升請藥宜取三升去滓溫服一升取微似

汗一服汗者停後服○傷寒對前條曰太陽中風乃

二脈浮緩對緊言其不緊也身不疼似證又但重於沉

乍有輕時在陰位者也此似無少陰證者為少陰證也

之脈浮緩此似輕而重者也身不疼似證又但重於沉

乍有輕時在陰位者也此似無少陰證者為少陰證也

之脈浮緩此似輕而重者也身不疼似證又但重於沉

乍有輕時在陰位者也此似無少陰證者為少陰證也

之脈浮緩此似輕而重者也身不疼似證又但重於沉

乍有輕時在陰位者也此似無少陰證者為少陰證也

之脈浮緩此似輕而重者也身不疼似證又但重於沉

大青龍湯發之

對女陰發熱之微發言之前條言服大青龍湯則遂陷于陰位者也此條

言似女陰之不可大發而不

○傷寒微與大青表不

可下發者也對舉以詳之也

傷寒微與大青表不

解或得汗而表證未解也

心下水氣以下數證

氣之乾嘔發熱

或兼證以下渴或微

利或噦或小便不利

或喘者小青龍湯主之

日麻黃湯而後大青龍湯同異之分也

小青龍湯方

先大青龍湯而後小青龍湯同異之分也

麻黃湯方

復升和辛兩右八味以水一斗先煮麻黃減二升去

上沫下諸藥重取三升去滓溫服一升○傷寒同前

心下水氣効而微喘發熱

前條日渴渴

也可知

服湯已渴者此寒

指抑氣也此解去微解

也小青龍湯主之

○太陽病外證黃而青之未解脈

浮弱者承大青龍湯以汗解

彼或大青龍湯之不可

不可不發汗也唯宜桂枝湯

服則似不可發汗者而

桂枝麻黃之分也

宜桂枝湯

太陽病若吐若下若發汗

不熱漸趣裏而亦微煩不至

小便數大便因

因小便數者與承氣湯

扣之愈微扣之

小承氣湯方大黃四厚朴二枳實二

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫再服初

服湯當更衣不兩者盡飲之若更衣者勿服之○太

陽病下之以醫見其惡寒下之止費微喘者抑氣仍在表

也故衣未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之桂枝加厚

朴杏仁湯方於桂枝湯方中加厚朴二杏仁五十餘

如桂枝湯○太陽病外證發熱未解者此以有陽明

不可下也治例下之為逆併論欲解外者宜桂枝

湯主之○太陽病先發汗不解表猶不解則而復反

下之脈浮者下之不愈外證當須解外則愈先表後

宜桂枝湯○太陽病脈浮緊與下四逆湯無汗發熱

明發於陽者凡太陽證發熱惡寒而特舉惡寒者對

多時舉發熱身疼痛八九日不解與四逆湯者表

證仍在對四逆湯此當發甘汗即言麻黃湯也與四

此條又承前條而言其能八服藥已微除猶白漸除

九日猶不可不發汗者也

也其人言變發煩目暈刺者必血非更有血者乃解

其將解也自此三道之別凡壞病麻黃湯主之○太

陽病脈浮發熱身疼無汗證麻黃自不發汗未用麻因致血

傷寒此為麻黃脈浮緊證麻黃不發汗未用麻因致血

者不此因病麻黃湯主之○病人此猶在太陽而發

無他病謂但發熱潮熱自汗出而不愈者已與桂

愈則益疑乎先其時將發熱發汗則愈對陽明宜桂

非桂枝證也○傷寒非在太不大便六七日對藏無頭

枝湯主之○傷寒非在太不大便六七日對藏無頭

痛有熱者熱者皆謂陽明之熱與承氣湯其小便清

痛有熱者熱者皆謂陽明之熱與承氣湯其小便清

者知不在裏非裏仍在表也當須發汗桂枝湯若頭痛

者上熟鬱子也必血宜桂枝湯唯麻黃湯○傷寒論傷寒中

風之發汗解已用桂枝麻黃半日許復煩陰位有之脈浮數者

其之陰位者可更發汗此仍在陽宜桂枝湯主之微

弱之脈也逆凡此承發首也病三陰若發汗若吐若下發汗吐下皆

也至其前條病則若上三若字即或之義特亡津液此

不得止而用之若此若字當如倘字看之亡津液

已愈而漸陰陽起非疾自和者穀因果必自愈不須

○大下之後復發汗小便不利者此非亡津液故也勿治之

所治之非藥之得小便利新氣必自愈○發汗已非

病病已不解非言長反在裏則當惡寒者已發於陰

也明音与藥耳附子湯主之考藥耳附子湯方考

藥耳附子湯右二味以水五升煮取一升五

合去滓分過再服發汗若下之病陰位仍不解煩

躁者是唯煩躁未至茯苓四逆湯主之茯苓四逆湯

方茯苓二人參附子一枚甘草二兩乾薑一兩右五味

以水五升煮取一升去滓過服七合日三服下之

後復發汗亦解晝日煩躁不得眠此似在夜而安靜

明了則識語相反不嘔明非柴不渴明非白無表

證陽證太脈沉微身無大熱者乾薑附子湯主之乾薑

附子湯方乾薑兩附子一枚右二味以水三升煮取一

升去滓頓服○發汗過多逆其義于相籍自胃心

而及心胃之心下悸動得按者今人按之則安在冬

則似可忍治心下悸者也而在茯苓甘草湯唯在心下而不在心

中小建中湯雖在中心中又兼長證且按之不安者也

桂枝甘草湯主之桂枝半斤甘草二兩右

二味以水三升煮取一升去滓頓服○發汗後其心

疼脈汗身疼痛脈沉遲者屬太新加湯主之新加湯

方於桂枝湯方中加芍藥生薑各兩人參三兩餘依桂

枝法發汗後其人臍下悸者欲作奔豚○發汗後

桂枝加茯苓桂枝甘草大棗湯主之茯苓桂枝甘草

大棗湯方茯苓半斤甘草二兩大棗十五枚桂枝四兩右四味

以葶藶水一名石白一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮

取三升去滓溫服一升日三服發汗後始在腹脹

滿者則為陽之太陰也厚朴生薑甘草半斤復人參

湯主之厚朴生薑甘草半斤復人參湯方厚朴半斤生薑

半斤復人參兩甘草二兩右五味以水一斗煮取三

升去滓溫服一升日三服發汗後表已惡寒者虛

故也精氣不惡寒此為轉但身熱者實也胃當和

胃氣與調胃承氣湯發汗後表已不可更行桂枝

湯以汗出之似桂汗出而喘表不解者桂枝加厚朴

枝證故戒之也

也但大熟者也麻黃杏仁耳朮石膏湯主之麻黃

杏仁耳朮石膏湯方麻黃四兩杏仁五十耳朮二兩石膏

半右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥煮取二升去滓溫服一升○太陽病初發汗汗出

不解汗出不解與病不解頗同言病之變也此與上

其人初位仍也發熱心下悸頭眩則身動振身動振身動振

者身動振直武湯主之此則身動振直武湯方

茯苓三兩芍藥三兩生薑三兩白朮二兩附子一枚右五味以水

八升煮取三升去滓溫服七合日三服○傷寒屬陽

若吐若下發汗亦後諸證心下逆滿水氣氣上衝胸

澀澀起則頭眩水氣動搖脈沉緊因心下逆滿氣

也故舉之發汗則身為振者此為真茯苓桂

枝白朮耳朮湯主之茯苓桂枝白朮耳朮湯方茯苓

四兩白朮二兩耳朮二兩右四味以水六升煮取三升去滓

分溫三服

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水

者出也飲之不日消渴也以候其今胃

氣和則愈愈者其若由愈者脈浮有起小便不利為

停微熱對白虎湯而曰微熱蓋消渴者所飲之水後

其熱劇者為曰虎湯也

飲愈五苓散主之五苓散方借苓茯苓白朮各四桂
枝南濕瀉五兩石五味為末以白飲和服方寸匕日

三服多飲煖水汗出愈○發汗已蓋岐二道而一脈

浮數表已解則煩渴者更加煩渴音五苓散主之

傷寒與麻黃汗出小便不利而渴者五苓散主之不

渴者始之渴字所指甚快茯苓甘草湯主之此方蓋

不渴者證而茯苓甘草湯方在苓桂枝湯生薑白朮

中風又言始與桂枝湯者蓋五苓散之或自桂枝或

除互而見之發熱六七日已與桂不解而煩進病已有

表裏證柴胡渴初飲水亦柴水入則吐者水猶吐

與小柴胡湯也不名曰水逆常例名以示其有異五苓

取土之不渴音亦茯苓

傷寒以下至下篇皆以傷寒發汗吐下後虛煩

在胸中而不得眠者劇者必反覆顛倒躁之太心中

惛懷煩之太甚而梔子豉湯主之劇易俱皆用梔子

也若以氣者氣息短氣如將絕梔子甘草豉湯主之

若嘔者梔子生薑豉湯主之梔子豉湯方梔子十四

香豉合右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉

煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐者止後

服枳子甘草豉湯方於枳子豉湯方中加甘草兩餘
如枳子豉湯法枳子生薑豉湯方於枳子豉湯方中
加生薑兩餘如枳子豉湯法○發汗用桂枝湯若下之調
胃承而煩熱能其所因有二道之分而及于胸中室
氣湯而煩熱此則一也故不言後而曰而也
者下枳子豉湯主之○傷寒五六日遂轉大下之
後與承氣湯不知一其身熱不云心中結病者下之
故不在胃中而在未欲解也非內有枳子豉湯主之
心中而為結胸也所挾也
○傷寒下後于胃心煩腹滿卧起不安者下卧乍起
也而較之反覆顛枳子厚朴湯主之枳子厚朴湯方
倒則為稍輕也枳子厚朴湯方
枳子厚朴湯方厚朴兩枳實枳子厚朴湯方右三味以水二升半煮取

一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服○傷
寒已在醫以丸藥大下之其誤治法也辛不身熱不
去微煩者來若心中結痛或臥起不安枳子乾薑湯主
之枳子乾薑湯方枳子厚朴湯方厚朴兩枳實枳子厚朴湯方右三味以水二
升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止
後服凡用枳子湯病人舊微瀉者病在不可與服之
亦可推而知也
傷寒醫下之逆續得下利已專于清圖穀完穀不止
身疼痛者或兼長陰所謂急當救裏裏謂陰也蓋
則陽明為裏也對三陽後湯之後身疼痛之屬陰

則當自愈也勿謂其愈清便自調者大便急當救表

者其不愈者此為表也依常

救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯下利清穀厥陰不可

攻表此言外証裏實汗出必脹滿病發熱頭痛

黃湯曰發脈反沉此非麻若不差與麻黃附子細身

體疼痛愈專膏救其裏宜四逆湯

傷寒其初中風其初桂五六日其證往來寒熱非已

初之發胸脇苦滿不欲飲食心煩言嘔至此為

或以下裏證胸中煩而不嘔枳子或渴

白虎或腹中痛連中湯或胸下痞硬大柴或心下悸

小便不利茯苓或不自渴身有微熱胡冒承或類者

小育與權之上小柴胡湯主之決之于小柴胡湯方

柴胡斤黃芩兩人參兩甘草兩半夏半升生薑大棗

十二右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取

三升溫服一升日三服傷寒中風桂枝有柴

胡證已及但見一證便是已制之不必悉具世示太

併病之治○食穀不食穀欲嘔者柴胡證之嘔屬

陽明也食穀而嘔為吳茱萸湯主之非辨得湯

吳茱萸反不惟劇者屬上焦也在胸中此為吳茱萸湯

方吳茱萸更升人參兩生薑六大棗枚右四味以水

七升煮取一升去滓溫服七合日三服傷寒合病

四五日示與柴胡湯六日身壯明惡風頭項強太陽下

滿陽也手足溫而渴者對手足壯而渴之屬陽明者也

所以少陽治法之一字柴胡小柴胡湯主之○服柴胡

湯已諸證渴者唯渴屬于陽明也此熱之進以法治

之百自尻循脊之別先後

傷寒病位之涉陽脈陰太脈弦傷寒不可拘

也其在太陰腹中急痛則其脈當弦而反弦腹中急痛

者未定法當先與小建中湯先以其不差者若其為

則當自差也其不與小柴胡湯主之此為輕而及重小

建中湯方桂枝術芍藥六生薑三

膠飴升右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更

上微火消解過服一升日三服嘔本柴胡一證則

柴胡湯回無謂耳家助不可用建中湯與小柴○傷

寒二三日仍在心中悸而煩者此為陽也○傷

不用小柴小建中湯主之脈浮數者專于法當汗出

而愈謂麻若下之身重心悸者已及于不可發汗傷

凡凡例於柴胡湯病證而下之已非定證也若柴

胡證不罷者柴胡證自罷者復與柴胡湯必虛令而

振振卻發熱汗出而解亦見其變也壞病○太陽病

十餘日其始之不大甚或發汗而不解反二三下之
見其不大便後四五日柴胡證仍在者復不大便柴
以承氣下之先與小柴胡湯淺深未嘔不止柴胡湯心下急
不舒微煩者為未解也所加也柴胡湯與大柴胡湯下之
二下之則愈大柴胡湯方柴胡半斤黃芩兩半芍藥
藥兩生薑兩五扣實枚四大黃兩二大棗枚十二右八味以水
一斗二升宜取六升去滓再煎取三升溫服一升日
三服傷寒十餘日不解自前條反二胸脇滿而嘔
日哺所發潮熱證定已而微利此本柴胡證下之而不
得利柴胡證今反利有知醫以丸藥下之非其治也

潮熱者實也實謂胃實也下之不宜小柴胡湯以
解外非外對胃實之為內也後以柴胡加芒硝湯主之
此為少陽陽明兼治之方也柴胡湯也柴胡加芒硝
則不得用之也改先以小柴胡湯也傷
湯方於大柴胡湯芒硝半斤餘依大柴胡湯法○傷
寒十三日不解此亦自反二三下之折來蓋似柴胡
證諸者唯舉一以有証也熱也裏有當以湯承氣下之者
小便利者大便當硬而反下利脈調和者不浮不沉
雖微必有知醫以丸藥下之非其治也若自下利者
力者也知醫以丸藥下之非其治也若自下利者
脈當微而反下利脈當微而反下利今反和者此為內實也利
之為證屬陰位者也故論調胃承氣湯主之○太陽
在陰位者以決在陽位者

病十餘日與大柴胡湯心下溫欲吐而胸中痛

痛之因大便反溼大便反溼微煩此調胃大

也欲吐也先此時自極吐下者調胃承氣湯曰不吐與調

胃承氣湯此言自身熱惡氣下今與之反也若不兩者

無發熱惡寒者不可與此言大柴胡但寒往來欲嘔

胸中痛微溼者此為調胃此非柴胡證也柴胡湯曰

○傷寒八九日既經汗下也此言似白虎湯及桂

下之不可知也胸滿煩驚神也小便不利津液散語

其一身盡重不可轉側者身自見湯則在三陽合病而

也此則在三陽而身于少陽者也柴胡龍骨牡蠣湯

主之柴胡龍骨牡蠣湯方半復合大柴胡四生

薑一兩人參一兩龍骨一兩桂枝半兩茯苓一兩鉛

丹半兩大黃二兩牡蠣半兩石上一味以水八升煮取

四升丹大黃更煮一二沸去滓溫服一升

傷寒脈浮此則以桂枝麻黃醫以火迫却之逆必驚

狂此與煩驚之初位高之也在於胸中而身重不可起

臥不安者救逆湯主之救逆湯方於桂枝湯方中去

芍藥加牡蠣五兩龍骨四兩漆三兩右七味為末以水一

斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫

一升燒錢煑錢而文令其汗表邪幸臧臧被寒邪

核起而赤者火毒或必發奔脈與桂枝加桂湯桂枝

加桂湯方於桂枝湯方中更加桂枝兩餘如桂枝湯

法火逆逆下之因燒鍼逆煩躁者不固逆之太

甚桂枝耳艸龍骨牡蠣湯主之桂枝耳艸龍骨牡蠣

湯方桂枝兩耳艸兩牡蠣兩龍骨兩右四味為末以

水五升煮取二升半溫服八合日三服

太陽病標曰太陽病者有二義也一則上額太陽之

初起之前起三則對不解熱結胸臑亦有三義揭示

其外不解去之三句其人如狂血自下病位一也下照

愈服後其外不解者發熱當先解外言桂枝麻黃也

對胃首所謂太

謂病不外解已但小腹急結者所謂熱結胸臑也或

音也即見之小腹急結小便自利或手掌煩乃可攻

之宜批核承氣湯批核承氣湯方批仁個桂枝兩

大黃兩芒硝兩耳艸兩右五味以水七升煮取二升

半去滓內芒硝更上火微沸下火過服五合日三服

○太陽病與前六七日以不大便言之大便在六七

則必結表證仍在牀微而沉脈當反不結胸胸不熱

似結胸惟在小其人發狂者如狂發狂以熱在下

腹而不在心下互而言之

焦亦指小腹也腸脫小腹傳熱滿急結熱滿小便自

利者自利對不利謂下血乃愈服後材停渴止之而此

去證仍在則當先發汗也今不言之者抵償湯方水
覆之前條也此條比之前條則為稍重
蛭個二十箇 蘇二十箇 桃仁三十箇 大黃兩 右四味為末以

水五升煮取一升去滓溫服一升不下再服○太陽

病例於前身黃脉沉結小腹滿小便不利者為無血

也痰在在小便自利其人如狂者血證語也即二湯

○傷寒有熱對裏寒言之蓋小腹滿應小便不利裏

而小便不利者為真武湯也小便自利者為四逆今

湯也裏熱而小便不利者為四逆散及猪苓湯也今

反利者為首血也不至如狂在較之抵償湯則其稍後

湯所宜也下之宜抵償丸抵償丸方水蛭二十箇 蘇二十箇 桃仁二十箇 大黃兩 右四味分為四丸以水一升

煮一丸取七合服之晡時下血若不下者更服

禁！七版力包張以將非短下包治水十半改改

