

傷寒論句解

下

十  
453  
24





傷寒論白解卷之三



太陽下篇

太陽之於下篇也承中篇之柴胡以

為表之表陽明為表之裏故二陽之表

後者示其表裏也而以其表裏之表裏

下篇先出少陽之變先及于少陽也故自中篇及

待示自變而之變之治用豆備以見其要也

乃約三三三陽之變之治用豆備以見其要也

太陽病脈浮而數頭痛發熱微盜汗出轉入而

反惡寒者表未解也小柴胡湯醫交下之逆數發遲

膈內拒痛短氣躁煩主煩主躁之令耳但心中煩懣

心下因鞅則為結胸大胸胸滿主之若不結胸但頭



汗出小便不利身必發黃也變之又變非結胸則大發黃始舉其一二耳

陷胸湯方大黃六兩芒硝半斤連翹一斤遂心一錢右三味以水六

升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內連翹

末過服一升得快利止後服○傷寒六七日以不大便言之

大陰在結胸胃實及結胸熱實此對寒實也實胃實也實較之夫因誤下

者為脈沉而緊此似在陰位者以其心下痛按甚矣

之石鞭者大陷胸湯主之○傷寒十餘日額調胃承氣湯承彼

條誦熱結在裏調胃承復也往來寒熱者調胃承氣

之也但無身熱頭微汗出者此為水結證也且包結胸也

發熱惡寒及大陷胸湯主之○太陽病重發汗而復

往來寒熱也津液不大便五六日裏熱舌上燥而渴日晡所

下之直似大承從心下至小腹鞭滿而痛不可近

者一變大陷胸湯主之心下鞭滿者不可所以

小結胸病較之前條結正在心下大結胸之在胸按

之則痛按之不痛者脈浮滑者對沉小陷胸湯主之

小陷胸湯方黃連一斤半夏半斤枳實一箇右三味以

水六升先煮枳實取三升去滓內諸藥煮取二升去

滓分溫三服○寒實對熱結胸但熱證者寒實對熱

證言之故雖以寒名之與小陷胸湯此方寒白散亦

非發於陰之義也

與小陷胸湯

此方寒白散亦

與小陷胸湯

此方寒白散亦

與小陷胸湯

此方寒白散亦

與小陷胸湯



可服其最重者白散方括梗分巴豆分貝母分石三味為

末丹巴豆更於白中杵之以白飲和服強人半錢匕

羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥

一杯利過不止進冷粥一杯○結胸證其脉浮大者

仍在表也與不可下小柴胡湯下之與胸則死○結

胸證悉具煩躁者胸胸湯已言短氣煩躁亦死

太陽與少陽併病頭項強痛或眩暈時如結胸心

下痞鞭者當先制慎不可發汗○婦人中風對後條

發熱惡寒經水適來而來得之七八日熱除而脉遲

初之身涼胸脇下滿如結胸狀譏語者此為熱入血

室也○婦人中風承前條七八日自前條續得寒熱

彼則得熱發作有時經水適斷者此為熱入血室小

柴胡湯主之○婦人傷寒對前條發熱經水適來盡

日明了暮則譏語如見鬼狀者此大似陽明首也而

則不取之此為熱入血室也○傷寒六七日邪已發

熱微惡寒表支節煩疼微嘔不喜嘔則異心下支結

此似小結胸而不鞭滿如百物而反而外證未去者

微痛音也是皆疑字丹有指而然者也

非其百柴胡桂枝湯主之柴胡桂枝湯乃桂枝一兩

芍藥一兩黃芩一兩人參一兩生薑一兩柴胡四兩

枳實六兩半夏半升芍藥半升九味以水七升煮取三升



去滓溫服一升○傷寒五六日與柴胡湯已發汗而

復下之與柴胡湯胸膈滿微結支結之小便不利渴

因單夜而不嘔嘔者小柴胡但頭汗出往來寒熱心

煩者復似外自此為未解也非有所柴胡桂枝乾薑

湯主之柴胡桂枝乾薑湯方柴胡半斤桂枝兩三乾薑兩

枳實根兩黃芩兩牡蠣兩耳艸兩右七味以水一斗

二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

初服微煩復服汗出便愈少陽百柴胡桂枝湯柴胡

傷寒五六日深熱已嘔而發熱者未百往柴胡證具而

以他藥下之逆柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已

下之不為逆必蒸令而振卻發熱汗出而解此非不

也若以下語逆治心下滿而嘔痛者此為結胸也大

陷胸湯主之但滿而不痛者對結胸之痛此為痞

為大黃黃連連柴胡不中胸之應復胸宜半復瀉心湯

瀉心湯也宜此方則半復瀉心湯方半復柴胡湯宜半復瀉心湯

兩黃連兩大棗枚十二耳艸兩右七味以水一斗煮取

六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○心下痞

較之痞按之濡對其脈浮者緩大黃黃連瀉心

湯主之大黃黃連瀉心湯方大黃兩黃連兩右一味



以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服○心下痞主而復惡寒此無熱發於汗出者客附子瀉心湯陰者也

主之附子瀉心湯方大黃二兩黃連一兩黃芩一兩附子一枚

右四味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁

分溫三服附子一枚以水一升五合者取六合去滓取

汁用之○心下痞兼痞與瀉心湯痞不解此非瀉心湯證

其人渴而口燥煩小便不利者此心下痞之因小便不利與桂枝去桂加

茯苓白朮湯心下痞微痛正同五苓散主之○傷寒大下後復發汗

也發於不可攻痞當先解表此疑乎心下痞之在表也陽也

解乃可攻痞解衣宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯

傷寒汗出解之後大柴胡湯曰汗出不解乃此

胃中不和心下痞硬下篇主心下痞硬故皆蒙之上

也乾噎食臭所以胃腸下有水氣腹中雷鳴所以利

也下利者生薑瀉心湯主之生薑瀉心湯方生薑四

其半三兩人參三兩乾薑一兩黃芩三兩半夏半升黃連一兩大棗十

枚十二右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升

溫服一升日三服○傷寒發汗若吐若下既為生薑

證解後已與瀉心湯心下痞硬噎氣不除者唯此二

從復代赭石湯主之始若無雷鳴下從復代赭石湯

利宜與此湯也



方旋復花兩人參兩生薑兩半夏兩代赭石兩大棗

十二枚甘草兩右七味以水一斗煮取六升去滓再煎

取三升溫服一升日三服傷寒中風桂枝醫

反下之其人下利日數十行穀不化此與清穀同而彼

位故里腹中雷鳴心下痞硬而滿此似乾嘔心煩不

得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此

非結熱結熱謂熱但在裏但以胃中虛客氣有所激觸而發

氣之上逆故使嘔也此辨醫耳心湯主之耳心

瀉心湯方甘草兩黃芩兩乾薑兩人參兩半夏兩大

棗兩黃連兩右七味以水一斗煮取六升去滓再

煎取三升溫服一升日三服傷寒服湯藥逆下利

不止心下痞硬服瀉心湯已下利復以他藥下之

見其下利止而心下利不止再醫以理中與之逆利

益甚亦石脂禹餘糧湯主之亦石脂禹餘糧湯方亦

石脂斤禹餘糧斤右二味以水六升煮取二升去滓

分溫再服

太陽病外證發熱未除而數下之遂協熱去熱

合寒協而利利下不止心下痞硬表發熱裏不解

者桂枝人參湯主之桂枝人參湯方桂枝兩甘草兩

白朮兩人參兩乾薑兩右五味以水九升先煮四味



取五升內桂更煮取三升去滓溫服一升日三服○

病如桂枝證以氣上衝頭不痛項不強此言非以表脈

微浮非在表之謂也或曰弦遲胸中痞硬不但胸中

下亦堅或曰乍緊見其不可定也氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也寒者

裏和也當吐之宜似帝散方似帝散方似帝兩赤小豆

一右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香

豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓

服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不唯

血之人亦謂不可與瓜蒂散謂脫

汗下之後也此言表證之最在者下利嘔逆此為大柴

太陽中風且對下條曰傷寒也胡湯證也

此為大柴表解者先救其表證唯不以桂麻乃可攻

之表解而後與其人亦有良證聚汗出發作有

時頭痛心下痞硬滿引脇下痛乾嘔短氣比之大柴

稍汗出不惡寒者其表證之未解者亦此表解裏未

未和也其在大柴胡湯則其表不解者此為小柴胡

湯也其在小柴胡湯則其表不解者此為大柴胡

也十水湯主之十水湯方芫花耳遂大戟大棗十石

上一味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗取

八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服半錢湯之

平且服若下少病不除者明日更服加半錢得快下

利後糜粥自養對前傷寒發汗出不解前條曰

表解者



可收之乃其表不解者即以大柴胡湯與之也生薑  
瀉心湯曰汗出解之後乃其解者即以生薑瀉心湯  
與之心下痞嘔吐而下利者大柴胡湯主之

太陽少陽併病心下鞅頭項強而眩者慎勿下之○

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯黃芩湯大柴胡

利者則若嘔者黃芩加半夏復生薑湯主之黃芩湯方

黃芩兩甘草兩芍藥兩大棗枚右四味以水一斗

煮取三升去滓溫服一升日三服黃芩加半夏復生薑

湯方於黃芩湯方中加半夏復生薑兩餘如黃芩湯

法○傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛所以胃中

欲嘔吐者所以胸中黃連湯主之黃連湯方黃連兩

甘草兩乾薑兩桂枝兩人參兩半夏升大棗枚右

七味以水一斗煮取五升去滓溫服一升日三服夜

二服

傷寒若吐若下後發汗自七八日不解以不大乾結

在裏乾結在裏亦在少陽言表身熱良大渴而上俱

熱時々惡風此言表證之微也不惡風但熱未至大

寒則為白虎湯也復往來大渴舌上乾燥而煩欲飲

水數升者為大渴引白虎加人參湯主之○傷寒無

大熱謂無表口燥渴對附子湯心煩背微惡寒者此

在陰位者故上舉口白虎加人參湯主之○傷寒脈

燭渴明其非陰位也



浮發熱無汗麻黃其表不解者白不可與白虎

湯此先衣後裏渴欲飲水無表證者前條背微惡寒

用白虎湯則嫌字白虎於有表及特々惡風皆白虎加人參湯主之

證者尚用之也舉此例示之也

傷寒八九日與柴胡龍骨牡蛎身體疼痛煩而嘔不能

自轉側此為似柴胡龍骨壯不嘔不類柴胡龍骨不渴

不同白脈浮陽盛而濇陰者此則屬少桂枝附子湯

主之若大便鞅此因小便自利也與裏証之小小便

自利者對不利去桂加白朮湯主之桂枝加附子湯

子湯在少陰表熱俱為小桂枝附子湯方桂枝兩附

便難也此方特小便依常桂枝附子湯方桂枝兩附

子枝生薑兩甘草兩大棗十二枚右五味以水六升煮

取二升去滓分溫三服去桂枝加白朮湯方於桂枝

附子湯方中去桂枝加白朮四餘如桂枝附子湯法

骨節煩疼製痛不得屈伸前條痛在身體故不得

不得屈伸麻黃湯則主熱與寒者也此則病在骨節故

與身體此則主疼痛故肢骨節與身體而殊其方法

也近之則痛刺汗出短氣小便利惡風不欲去衣

或身微腫者皆較之前條甘草附子湯主之甘草附

子湯方甘草兩附子兩白朮兩桂枝兩右四味以水

六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗

則解○傷寒脈浮滑承桂枝附子湯曰脈浮虛此表

有熱裏有寒寒指邪也白虎湯主之桂枝附子湯曰

以難言之



之在柴胡龍骨牡蠣湯也既載之中篇其渴之在白  
虎湯也舉之于此彼脈如彼而此脈如此以辨其  
也白虎湯方知母六石膏斤一耳仲兩梗米合六右四味  
以水一斗二升煮米熟去米泔藥取六升去滓分  
六服日三服本論所載煎法甚略  
今以升壹秘要補之

傷寒論句解卷之四

陽明篇 陽明之土也 也在表之裏而以身熱惡熱  
重之別也 復名以陽寒中風而不殊其方劑也  
不以方之也 病之於陽法如於太陽與陽明  
則見于太陽篇如於少陽與陽明則先少陽後  
陽明以收陽之不可下也 陽明之胃以胃為其部  
位也 三陰亦其所在不詳也  
唯百寒熱之令耳不可不詳也

陽明之為病 胃陽明之主胃也 胃不可見而見之飲  
舉胃則太陽之為表之後也 胃不可見而見之飲  
為表之裏以可知也 三陰之為裏之裏亦可推察也  
太陽舉發熱惡寒則少陽之為往來寒熱惡寒亦可推察也  
身起惡熱可知而三陰之為寒亦可推察也



互以備家物實也燥屎不大便夫實實邪氣之實也

之已陰亦有良實則譏語倫之虛虛精氣之虛也

之精氣已虛和氣未則鄭聲鄭聲重語也

乾陽腹滿微喘陽發熱惡寒陽脈浮而緊假太陽發

首名曰傷寒羽太陽之重首也太陽之重孰與此陽

陽明之重改如標以太陽中風也治法無師此陽之

重首太陽能重制之以小柴胡湯也又雖陽明之重

餘蓋小柴胡若下之則腹滿小便難也傷寒對前

陽明暈陽明亦不能無暈也食多是非非雖有陽明證陽

用唯在一下病不可攻之陽明病面合赤色

及下不得赤也而赤色合不可攻之陽明病不吐

不下未經吐下則心煩者可與調胃承氣湯

陽明病脈遲桂枝湯及四逆湯曰脈遲即合彼雖汗

出太陽者不惡寒者承氣湯此則其身必重短

氣腹滿而喘有潮熱者此大小承氣此外欲解可攻

真也此通三承氣手足濇然而汗出者此大便已硬

也大承氣湯主之決之若汗出微發熱惡寒者外未

解也桂枝湯其熱不潮大便亦不硬此則調未可與

所之也

所之也



承氣湯若大滿不通者可與小承氣湯失與小承氣湯而後及大承氣湯論曰腹滿不減微和胃氣勿大泄減不足言大承氣湯主之是也  
下大承氣湯方大黃四兩枳實五枚芒硝三兩右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上丈微一兩沸分溫再服得下餘勿服○陽明病潮熱大便微硬者可與大承氣湯法夫與小承氣湯不硬者其熱不與之謂胃承氣湯若不故不日主之  
大便六七日恐有燥屎欲知之法以與小承氣湯六指為湯入腹中轉矢氣者便硬為之定轉運在此有燥屎乃可攻之服大承氣湯一升若不轉矢氣者此但初

頭鞭後必瀉不可攻之謂胃承氣湯攻之必脹滿不能食也  
遂將之初飲水者與水噦陰其後初有燥屎氣之發熱者必大便復鞭而少也若但發熱而不在後之所所以小承氣湯和之不轉矢氣者慎不可攻也  
能食也謂胃承氣湯攻之必脹滿不能食也  
○陽明病脈遲謂胃承氣湯攻之必脹滿不能食也  
發汗對可宜桂枝湯○陽明病脈浮謂胃承氣湯攻之必脹滿不能食也  
枝麻黃無汗陽明又有而喘者發汗則愈宜麻黃湯謂胃承氣湯攻之必脹滿不能食也  
病人有部位難煩熱謂胃承氣湯攻之必脹滿不能食也  
瘧狀發汗音宜日晴所發熱者偏陽明也謂胃承氣湯攻之必脹滿不能食也



者包熱之實宜下之脈浮虛者對實期仍在宜發汗未及良首

下之與大承氣發汗宜桂枝湯○陽明病發熱汗多

者此似太陽宜發汗者太陽篇曰病人瘧而無他病云

也汗多仍在太陽而似陽明宜下者也將對以照之

字有方急下之對彼可宜大承氣湯○發汗不解

始在腹滿痛者不至譏語潮熱也已發汗熱不去津

急二條其最急下之宜大承氣湯○腹滿不減減不足

言已與小當下之宜大承氣湯○陽明病脈浮初在

時而暈承氣湯今至于此也而額之大承氣湯長熱良寒

熱下利清穀者三陰之主寒也陽明之主熱也俱在

易察也故繼曰逆湯主之于胃中固雖有寒熱之分乎候之不

二陽併病未離太陽存太陽證罷惡寒但發潮熱已

汗馬牛足聚汗出雖非滋然汗出乎太便秘而嚴

語者下之則愈對可宜大承氣湯○三陽合病方治

道腹滿身重難以轉側此陽明之口不仁不能辨互

味而面垢此為譏語遺尿又陽明之重也不舉太陽

在少陽而太發汗則譏語下之則額上生汗手足逆

冷遂變若自汗出者陽白虎湯主之此陽明之重於

在陽明也而不以承氣以白虎此陽明之重於

合併病標之者治法有二岐之別也右治法在干一

道則不以合○陽明病此三陽之合病也對上條脈

浮而緊咽燥口苦陽也腹滿而喘發熱汗出不惡寒反



惡熱身重 此陽明之重者又若發汗則躁心憤々反

白虎湯之所之也 亦在白若下之

酸語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠 慮湯

則胃中空虛客氣動腸心中惛憊方上胎者 上胎者

豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者 中白虎加人參

湯主之若脈浮發熱 此對渴欲飲水小便不利者下

豬苓湯主之 良寒則為猪苓湯方猪苓茯苓阿膠滑

石澤瀉 右五味以水四升先煮四味取二升去

滓丹阿膠烱消溫服七合日三服汗出多 小便而渴

者 此雖小便少者本因汗出多則為白虎湯所宜不

可與猪苓湯

陽明病 二陽之腸下 澀滿不大便而嘔 此陽方上白

胎者 黃黑胎音宜大柴可與小柴胡湯 ○陽明病二

陽之相發潮熱 用柴胡加 大便澀 柴胡加芒硝湯則

利而復已 此已澀小便自可 此非自下利故胸膈

滿不去者 胸膈滿自始有之已用 小柴胡湯主之 此

發潮熱 字未至大便硬則非加芒硝湯及大小承

氣湯所宜也 乃但大便硬者此為調胃承氣湯也

陽明病下之 以承氣其外有熱 或言有寒午足溫

蓋其有熱則手足必熱 不結胸 此非胃實及寒寒則

又非結胸則心中懊憹 不能食但頭汗出 梔子豉

湯主之 ○陽明病下之心中懊憹而煩 此以梔子豉



手足溫則手足熱即胃中有燥屎者可攻當審有  
否而攻腹微滿與下承初頭硬後必瀉  
之也此承前條曰有燥屎不大便五六日繞臍痛煩  
可攻之承氣湯及調胃若有燥屎者宜大承氣湯

病人此承前條曰有燥屎不大便五六日繞臍痛煩  
躁發作有時者此有燥屎故使不大便也○大下之

後和氣傷六七日不大便煩不解腹滿痛者  
整者此有燥屎也宜大承氣湯此由百

陽明病其人滿陽明之多汗胃中燥以津液外出胃  
中燥大便必鞅硬則瀉語胃中燥小承氣湯主之若

一服瀉語止更復服○陽明病瀉語發潮熱脉浮

而疾者對後曰小承氣湯主之  
詔而轉矢墮承氣湯一升候燥屎之因不更

燥屎之成否而更審之也乃大  
便不瀉小便利屎定鞅硬也更服一升若不轉矢

氣者勿更與之調胃承氣湯  
脉反微瀉者脉浮疾不大便裏虛也  
也為難治此言精氣不續則不可更與承氣湯也

一升而有二道別一則為燥屎而更服一升也  
則為非燥屎而用調胃承氣湯也一則為裏虛而復

何耳○陽明病瀉語有潮熱反不能食者熱之入  
當有穀進胃中必有燥屎五六枚也胃之裏容飢食

燥屎之成不若能食者對不能食而但鞅爾  
無其今也言其輕重已

燥屎之成不若能食者對不能食而但鞅爾  
無其今也言其輕重已



之宜燥采不煎不過二三枚者大承氣湯主之

傷寒以下皆為吐後已非胸中蓋對厚朴生薑車

下後也傷寒四五日傷寒四五日四五日之脈亦浮也

滿汗出譫語者以有燥屎在胃中也須已解下之宜

大承氣湯○傷寒六七日此不始在於表而專在胃

中不了了即言睛不和也蓋但長良證謂但往大便

雖身有微熱者此未成燥屎也若能以小承氣湯

七日已不得微和不能小安大便與承氣湯一升

苦不大便六七日與小承小使少者雖不能食但初

頭硬後必溲未定成硬此不攻之必溲遂將

便利屎定硬乃可攻之此已用小承氣湯而後須小

每不大便不能食下便利等病人此不得微和不能小

不利汗又但大便乍難小使不利血汗津液

時有微熱但特令微發于外也喘且不能臥

者有燥屎也宜大承氣湯○傷寒若吐若下後不解

不大便五六日上至十餘日此承太陽下篇白虎加

彼音日喘所則喘字日喘也然潮熱之

日喘所亦不可拘也發潮熱不惡寒對白虎湯曰特

也所標之潮字不可拘也

日喘所亦不可拘也發潮熱不惡寒對白虎湯曰特

也所標之潮字不可拘也

日喘所亦不可拘也發潮熱不惡寒對白虎湯曰特

也所標之潮字不可拘也



去獨語不對人而如見鬼狀此為大承舌劇者發潮

發則不識人似百對首循衣摸牀惕而不安微喘直視之極脈

弦音者生瀉屈者死微者但發至譫語雨調此為

承氣大承氣湯主之若一服利止後服直視譫語喘

滿者危下利者胃實為下利危證也以復之亦死

陽明病論陽明自汗出始有若發汗其始去未小使

自利者小便當此為津液內竭此非雖硬不可攻之

當自須初大便宜蜜煎導而通之若工瓜根及與

物案檀弓鄭大豬膽汁皆可為導蜜煎方蜜註一

丹銅器中微火煎之稍疑似飴狀授之勿令焦毒欲

可丸併手捻為挺今爾銳大如指長二寸許當乾時

急作冷則硬以丹穀道中以手急把欲大便時乃去

之豬膽汁方大豬膽一枚瀉汁和酥少許以灌穀道中

如一食頃當大便出○陽明病本自汗出醫更重發

汗皆此津病已差辛尚微煩此似有不了者此

大便已硬故也此非以亡津液胃中乾燥因汗故令

大便硬也

陽明病此以胃實言之下血譫語者有二道之別

為挑核承氣湯一則在胸脇此為熱入血室其

為紅結在腹者此但頭汗者此則在胸脇之候澀然汗

為紅結在腹者此但頭汗者此則在胸脇之候澀然汗



出則愈服後陽明病其人初起已喜忘者似所謂

必有高血善饑或腹不滿而乾燥午掌煩熱或消穀

也采鍾硬大便反易當難其色必黑燥屎亦黑而燥

如漆則結宜抵背湯下之湯對大承氣○病人日傷寒六

七日長喪證蓋血長喪證柴胡證也發熱七八日

自彼打來也頭雖脈浮數者寒者可下之氣假令前瘀血已下脉

數不解言熱合熱夫疾血之成于熱與則消穀善饑食

乍欲食亦齊至六七日下大便者食穀已多則大有

血之一候也疾血宜抵背湯者謂便膿血之候脉數不解而下不

止必協熱下利之因于寒與而使膿血也此為桃

花湯

陽明病發熱汗出小便此為熱越發揚兩雅曰越揚

也不能發黃也也熱之能甚乎發揚于外則不能發黃

也所由但頭汗身無汗小便不利渴引水將身熱之已

衰而不能發揚此為痲紅在裏身必發黃茵陳蒿

湯主之茵陳蒿湯方茵陳蒿兩梔子十四大黃二右

三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升

去滓分溫三服○傷寒對前條曰陽明病彼以陽明

二條七八日對前條見其後也身黃如橘子色對寒

黃之如小便不利腹微滿者此因大便硬也雖不曰

何以別之寒溼字且如寒溼則腹脹滿者不必硬也

此則必硬後又大便秘不得硬此則硬也寒熱之別曰



不詳茵陳蒿湯主之○傷寒身黃發熱者較之前證則其最輕  
音也故不至小便不利渴引水得腹微滿也發熱對  
寒溼在裏之血熱者也亦裏熱之在裏者也  
 梔子蘘皮湯主之宜明辨此方曰頭微汗出小便  
利而微發黃者宜服之為得之也  
 梔子蘘皮湯方梔子一十個 耳艸兩 黃蘗兩 石二味以  
 水四升煮取一升半去滓分溫再服○傷寒寒溼在  
 裏溼之已甚壅滯于裏而不能身目為黃如薑麻黃  
浮散音亦猶曰痰熱在裏也  
 連軛赤小豆湯主之麻黃連軛赤小豆湯方麻黃  
亦小豆一連軛兩杏仁四十八枚 生梓皮升  
 蘆兩耳艸兩 右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去  
 上沫再請藥煮取三升分溫三服

傷寒論句解卷之五

少陽篇 少陽之土熱也在表裏之間而心胸為  
其部位也以往來寒熱為其狀也其治法  
不宜發汗吐下以為正證也復有可吐者此  
為陽證也正屬明而後治法可度發之也亦猶  
寒中風之別則大小柴胡湯重互之也亦猶  
陽明白虎脈氣之例也少陽因在表裏之間而  
莫非太陽之變也故脈證方脈已備之太陽而  
篇本篇存一二以為之篇目也如於存併病  
之治法亦已見  
之太陽陽明篇  
 少陽之為病口苦咽乾目眩也少陽之為證耳目口  
也即見其一證則雖存太陽字不宜發汗是以前論  
往來寒熱及胸脇者滿等之不可發汗雖口苦咽乾  
之微證字不得取之○少陽中風對少陽兩耳  
少陽也故特舉之以示焉



但所聞目赤胸中滿而煩者瓜蒂散曰心不可吐下  
其則少陽正證宜柴胡湯首也而以中風標之者以  
明篤自與陽明此已能重乎亦不無重於此者又與陽  
中風者祇同傷寒脈弦細收頭痛發熱者屬少  
陽此則二陽合病也而不曰合病少陽  
首治法專于少陽一道者也且舉少陽者  
發汗不唯此證少陽走皆不可不可發汗本太陽  
發汗也故凡例之少陽也不可發汗  
病初不解乾嘔不能食往來寒熱  
本尚未吐下服吐下之藥脈沉緊者  
柴胡湯傷寒六七日  
人蹙頰者不吃煩躁下利疼痛此為陽指三陽也而去入陰  
指三陰也而主故也若脈浮數熱氣熾者此為陽明也  
少陰言之也此為三陽結尾以為進請陰篇之根也

傷寒論句解卷之六

太陰篇三陰之主寒也其所以均皆在于胃中惟  
陰其不同後急之勢於此分以為三太陰也  
也凡三陰之氣治法也一子救其外熱而特太陰  
則不然矣若百外熱則先救其外熱此為法也  
如桂枝湯之於厥浮五苓散之於吐利是也  
太陰之為病腹滿厚朴生薑耳炒半而吐食不下時  
腹自痛桂枝加芍藥湯加大黃湯若下之  
故設必胸下結題自利而石脂禹餘糧湯及益甚  
此或腹痛之在陽明乎彼則自利不渴者  
腹滿腹痛之在陽明乎彼則自利不渴者  
也此則寒豈可不能辨乎彼則自利不渴者  
在渴之與不渴之屬太陰為之太陰正證



為五苓散厥陰篇叶利頭痛以其藏外有寒寒裏寒

身疼痛云云當參方也太陰之於病位

外熱故也當通之○太陰病脈浮者

浮而略發熱惡寒者可發汗宜桂枝湯

麻黃湯桂枝湯本自其分而回其方

本太陽病初醫反下之因雨雨而腹滿時痛者

且偏大陰也未至自利則疑字為桂枝加芍藥湯主

之桂枝加芍藥湯方於桂枝湯方中加芍藥三餘如

桂枝湯法大實痛者對時痛言之非言陽明胃實也

也陰病六七日腹脹不大便急下之是桂枝加大黃

湯主之桂枝加大黃湯方於桂枝加芍藥方中加大

黃兩餘如桂枝湯法



傷寒論句解卷之七

由陰絛及厥陰之為寒也... 其間不容毫髮則不外也... 上其又自畏熱有外也... 之為急也難於先救外也... 以附子則已其於太陰之... 亦畏熱之治法必從其輕... 用外承氣湯可在女陰或... 是以承氣湯見於傷寒中... 之外寒也詳見於傷寒中... 山陰之為病脈微細三陰... 微細也小建中湯曰脈陰... 微細也小建中湯曰脈陰... 微細也小建中湯曰脈陰... 微細也小建中湯曰脈陰...



之三但身一欲寐也毒雨如液齋然似○少陰病欲  
吐不吐心煩欲吐不吐但欲寐此我前條復論其有  
不吐互而自利而渴者今不渴示之渴不必拘也縱  
言之也屬少陰也為少陰苦小便色白濁者少陰病形悉具  
不唯小便白濁或不○病人脈陰陽俱緊此承太陽  
渴亦為少陰正證也陰陽俱緊者名反汗出者若為太陽病則縱令其亡  
日傷寒之條通陽也陽此屬少陰其汗出則縱令其亡  
痛而復吐利此為少陰發熱者此為非太陽也○少陰病脈微  
細但欲臥此承上條一條及第二條汗出不煩似不  
煩之輕于條二條自欲吐寒將至五六日寒漸將自  
之以汗出字不輕量

利復煩躁對曰雖煩下利必愈添不得臥寐者死  
少陰病始得之始于少陰而反發熱外熱脈沉者麻  
黃附子細辛湯主之麻黃附子細辛湯方麻黃二兩細  
辛二兩附子一枚右三味以水一斗先煎麻黃減二升云  
上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升日三服○少  
陰病得之二三日此之前條麻黃附子甘草湯微發  
汗少陰之於外熱也在其裏證未具之始則發之為  
法也然非桂枝麻黃而在麻黃附子又非大發而  
在微以二三日但裏證故微發汗也此則謂真武湯  
發也膠湯桃花湯猪苓麻黃附子甘草湯方麻黃二兩  
湯等之證未具也兩附子一枚右三味以水七升先煎麻黃一兩沸去上



法并諸藥並取三升去滓溫服一升日三服○少陰

病得之二三日以上比之前二日心中煩不得卧者熱

深于裏按施子豉湯曰不得眠此曰不得卧蓋彼則

在不得眠勿論卧與否此則在不得卧勿論眠與否

此之多黃連阿膠湯主之黃連阿膠湯方黃連四芍

藥兩黃芩兩鷄子黃一枚阿膠兩石五味以水五升先

煮二物取二升去滓內膠烱盡少冷內鷄子黃攪令

相得溫服七合日三服○少陰病脉細沉數謂沉數

病兼裏寒裏為在裏脉沉數則為裏熱不可發汗謂

裏熱之不可發汗能裏寒之或○少陰病脉微裏證

自外熱者字又不可發汗也○少陰病但欲

自不可發汗此二條為麻黃附子細辛湯及平仲湯例之也

證為其或未而無汗管發之必動其血未知從何道

出或從口鼻或從目出為難治今訣之病首

少陰病得之一二日殊之麻黃附子細辛及平仲湯

有其分口中和謂口不燥且湯也對其背惡寒者

背微惡寒者附子湯主之白虎湯曰血大熱豈不類

此則裏寒故口不附子湯方附子一枚茯苓兩芍藥兩

白朮兩人參兩右五味以水八升煮取三升去滓溫

服一升日三服○少陰病身體重一身痛手足寒其人

其寒骨節痛脉沉者脉沉對麻黃湯也彼則主熱此

在疼病故不拘疼痛之在身體與骨節也此條又分

其證二之一則身體痛手足寒一則骨節痛脉沉脉



沉手足寒附子湯主之○少陰病二三日不已至四

五日此比之前條腹痛小便不利四支沉重謂急情

疼痛自下利者裏證此為有水氣其人以下皆或欬

或小便不利或不下利或嘔者直武湯主之○少陰

病二三日至四五日此又比前條則為急也腹痛小

便不利下利不止已與真武湯便膿血者桃花湯主之膿

血之傷熱有黃連阿膠湯白桃花湯方赤石脂一斤乾

薑兩粳米半升右三味以水七升煮米令熟去滓分溫

七合分赤石脂末方寸匕日三服○少陰病下利細

便膿血者桃花湯主之○少陰病六七日此上條

深息高者死

少陰病二三日咽痛者木槿其可與甘草湯不差者

與桔梗湯耳輕重甘草湯方甘草兩二右一味以水三升煮取

一升半去滓溫服七合日再服桔梗湯方桔梗兩一耳

甘草兩二右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服○

少陰病咽中痛比前條半復散及湯主之半復散及

湯方半復桂枝耳更為重今各等右三味別搗篩已合治之

白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升

煎七沸丹散兩方寸匕更煮三沸下火令小冷中令

噉之○少陰病咽中傷生瘡其人自謂瘡腫不能語

起之寒咽中



言聲不出者所以知咽中傷生瘡也苦酒湯主之苦酒湯方半

復十四鷄子白一枚右二味杯半復青也苦酒中以鷄

子殼置刀鏤中安火上丹鷄子白令三沸去滓少

合噀之不方更作三劑

少陰病下利此但主下利未咽痛胸滿心煩者又未

吐無則却豬膏湯主之豬膏湯方豬膏斤右一味以

水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香

和相得分溫六服○少陰病下利此但在下利不至

等者白通湯主之白通湯方通白四乾薑

兩附子一枚人尿五合右四味以水三升煮取一升去滓

丹人尿和令相得分溫再服○少陰病下利脉微者

包四支厥冷言之與白通湯蓋四支厥冷則四逆湯

且對下白無脉也利不止已與白通湯厥逆無脉微者乾嘔煩者

證二白通加豬膽汁湯主之已與白通湯不唯下

也舉白通加豬膽汁湯而通脉四逆湯在中也又

逆湯也或利已止脉不出者又為通脉則為通脉四服

湯謂白通加豬膽汁湯脉暴出者死微續者生白通

加豬膽汁湯方於白通湯方丹加豬膽汁一合餘依

白通湯法○少陰病下利細清穀目裏寒外熱手足

厥逆脉微欲絕身反不惡寒四逆湯曰惡寒然其人

則非必可醫也



以下或面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利已已與

如猶膈脈不出者不但脈不出或又下通脈四逆湯

主之此條得首標也陰病而證舉四逆湯而通脈四

逆湯方耳仲兩大附子一枚乾薑兩右三味以水三升

煮取一升二合去滓分溫再服其脈即出者愈○少

陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者對下條曰吐利煩

則專于吳茱萸湯主之○少陰病吐利煩躁四逆者

吐者也此則四逆湯之所也而專于利者也此之前條

死更急如此者故各○少陰病下利止既與白通真

而下利頭止者此則不然而頭眩下利之氣特令自胃者

死又自胃心也煩也○少陰

病四逆惡寒而身濇脈不至既與四逆湯不煩而躁者死

又與前證類

少陰病脈緊有裏至七八日稍自下利熟已通脈暴

微又自寒熱之分也手足反溫若其之寒也手足脈

緊言反去者若其熱未去也子為欲解也寒熱雖

煩下利必自愈藥而自愈也○少陰病八九日則

不下利乃一身手足悉熱者以熱在膈也若手足寒

結胸必使血也此則挑核承氣湯所之也○梅

為陰位亦不無至于此首也



少陰病四逆微其人<sub>以下或效或悸或小便不利或</sub>

腹中痛或泄利下重者<sub>此則裏熱之最輕者也○恒</sub>

逆者<sub>也泄利下重者</sub>四逆救主之四逆<sub>多見之柯琴已言之</sub>

救方柴胡枳實芍藥甘草<sub>石四味各等分搗篩白飲</sub>

和服方寸匕日三服○少陰病下利<sub>綱六七日</sub>

有此證也<sub>輕者因下利除者又不與七八日之後矣</sub>

又遂<sub>其血者不與八九日之後矣</sub>而<sub>遂變</sub>熱<sub>其正</sub>

者<sub>此又裏熱之猶令易主之</sub>○少陰病得之二三日

今<sub>傳在二三日</sub>口乾咽燥者<sub>裏熱之急下之宜大承</sub>

氣湯○少陰病下利<sub>綱○本自作自利</sub>今清水<sub>目色花</sub>

青心下必痛<sub>邪氣之甚有氣上衝心之口乾燥者非</sub>

寒<sub>急下之宜大承氣湯</sub>○少陰病六七日<sub>此對前條</sub>

最<sub>見其重也</sub>又與<sub>續本</sub>腹脹不大便者<sub>急下之宜大</sub>

承氣湯○少陰病脈沉者<sub>此承上三條論之也彼則</sub>

急者<sub>一寒一熱變出之機在脈息之間也舉急溫之</sub>

脈沉而不舉<sub>四支厥冷者示非之於微也</sub>

對上條宜四逆湯○少陰病飲食入口則吐<sub>心中惕</sub>

今<sub>欲吐復不能吐</sub>此證<sub>有三</sub>始得之<sub>手足寒</sub>及<sub>手足</sub>

厥冷在<sub>脈弦遲者</sub>實<sub>在此中</sub>也<sub>此物中實</sub>胃中實<sub>及</sub>

中不可下也<sub>此非胃</sub>當吐之<sub>而脈重實者</sub>此<sub>胃中實</sub>

當下之<sub>若膈上有寒飲</sub>厥逆<sub>脈微細者</sub>乾嘔<sub>者不可</sub>



吐也 不可下 亦急温之宜四逆湯

少陰病飲食入口則吐 中温之欲吐復不能吐

胃中實

脉重實 手足温

當下之

胸中實

脉弦遲 手足寒

當吐之

膈上有寒飲

脉微細 手足厥冷

當温之

傷寒論句解卷之八

少陰篇

少陰病飲食入口則吐 中温之欲吐復不能吐... 類以列

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼絛餓而不能食



厥陰則寒之極也病之終也其已至于此則食則吐  
危真甚於此也故先舉心者故挾此一候以示其有二  
蛇也連也余數觀此證于梅園而得救之後下之則利不  
偶察其此證者不如此也始梅園而得救之後下之則利不  
又治此證者不如此也始梅園而得救之後下之則利不  
止寒厥之極有似此證之可下者也故復戒之其寒  
傷寒四五日以仍在陽位腹中痛者轉氣下趣少腹  
者將自此欲自利也將之陰○大汗始于若大下利  
始于而厥冷者所歸則同而四逆湯主之○大汗出  
又始于熱不去未解外熱內腹痛拘急四肢痛於內威又大  
下利又始于厥逆而亞寒者與內拘急四肢逆湯  
主之○下利腹脹滿身體疼痛者陰位之先溫其裏

裏乃攻其表表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯○下  
利清穀裏寒外熱汗出而厥者湯曰脈微欲絕互而  
言之彼則既吐且利小便復利通脈四逆湯主之彼  
於此而與以四逆湯此輕於彼而與以通脈四逆湯  
也故互顧之令知其○傷寒下利日十餘行脈反實  
者脈虛死○傷寒六七日甚脈微手足厥冷證煩躁  
寒劇發厥陰又與四逆不還者脈不復煩死○傷寒  
發熱外下利厥逆證躁不得臥者暴死○傷寒發熱  
外下利至甚暴厥不止者逆用四逆死○傷寒六七日  
者不利常便不還意發熱證利亦而利常證其人汗出



不止厥不還利者死傷寒五六日以不大便不結  
胸若病之重者在五六日或六七日不結心胸則腹  
需若復實于胃則脈虛大便復者不可下  
大便之如可下乎未此為亡血與亡津液同但津液  
至結胸若胃實則不可下腸胃視之汗出血  
之陰視之不利也今雖不下利于下之死湯四逆  
腹濡脈虛及厥冷屬之亡血也  
利手足厥冷無脈者四逆灸之不溫若脈不還反惟  
不微喘者死喘之發於陰  
愈即與四時時脈還手足溫者死  
逆湯以上十二條皆  
論列寒利音也  
熱利對寒下里者後重白頭翁湯主之白頭翁湯方

白頭翁兩黃連兩黃蘗兩秦皮兩石四味以水七升  
煮取二升去滓湯服一升下利欲飲水者以有熱也  
利也下利瀉水瀉者有燥屎也宜小承氣湯  
利按之心下堅者此對腹濡言之非急下之宜小承  
氣湯下利脈遲而滑者實也胃利未欲止寒外急下  
之宜大承氣湯下利已差至其年月日時復發者  
以病不盡故也嘗下之宜大承氣湯  
匱要略所載補之干此也他越婢湯大建中湯之類  
亦皆本論所脫而今不詳其所填則始從其旧文耳  
○下利有微熱而渴微脈弱者反緊數之重也今自  
愈非言不須藥  
○下利脈數數非大有微熱汗出



今自愈此二條對前段舉寒利之死候者○下利脉

數而渴者今自愈此舉前設不愈之實也○下利後更煩

黃連阿膠湯以有熱也○下利後更煩已愈

心按之心下濡者對瓜蒂散日也○下利後更煩已愈

煩也對結枳子豉湯主之此九條皆

傷寒脉微而厥至七八日脣冷此而有藏厥其人無

暫安時者此為藏厥也通脉四逆非為也○下利後更煩

音故辨蛇厥者其人當吐蛇復時煩此為藏寒蛇上入膈故煩一守循史復止得

食而嘔又煩者蛇聞食臭出其人當自吐蛇蛇厥者

烏梅圓主之烏梅圓方烏梅三百細辛六黃連一守

歸四附子六蜀椒四乾薑十桂枝六人參六黃蘗六

右十味與檳榔合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸

之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得丹白中與蜜

并二十下圓如梧桐子大飲服十圓日三服稍加至

二十圓○傷寒厥而心下悸者此證始似真武湯

之已甚者也此則唯在于當服茯苓甘草湯○手足

心胸而寒之未太甚者也厥者脈細欲絕者比之下利

厥者其寒比之厥冷為輕也當歸四逆湯主之此既與茯苓甘草湯治

又為輕也當歸四逆湯主之心下悸與茯苓甘草湯治

當歸四逆湯方當歸三桂枝三芍藥三細辛二大棗



十二 牛 通 右 七 味 以 水 八 升 煮 取 三 升 去  
滓 溫 服 一 升 日 三 服 若 其 人 中 腹 有 久 寒 者 疾 也 如  
寒 疝 之 膏 歸 四 逆 加 吳 茱 萸 更 生 薑 湯 主 之 膏 歸 四 逆  
類 是 也 加 吳 茱 萸 更 生 薑 湯 方 於 膏 歸 四 逆 湯 方 中 加 吳 茱 萸 更  
生 薑 湯 方 右 九 味 以 水 六 升 清 酒 六 升 和 煮 取 五 升  
去 滓 分 溫 五 服 病 人 午 足 厥 冷 對 少 陰 篇 曰 一 身  
之 於 言 我 不 結 胸 似 結 胸 小 腹 滿 按 之 痛 者 此 為 冷  
結 在 胸 臍 也 小 腹 滿 復 似 言 高 血 之 候 也 然 高 血 則  
也 此 為 冷 結 在 胸 臍 也 而 小 便 不 利 者 果 非 高 血 之 候  
真 武 湯 所 之 小 便 自 利 者 曰 逆 湯 所 之 嘔 而 脈 弱  
此 似 小 便 復 利 約 也 身 有 微 熱 見 厥 者 果 非 其 難  
輕 首 也

治 四 逆 湯 主 之 傷 寒 脈 促 脈 促 對 脈 微 言 其 不 微  
如 不 微 也 不 能 無 疑 乎 非 陰 證 也 或 午 足 兩 逆 者 可  
灸 之 非 衰 也 也 於 是 姑 行 灸 法 又 向 不 可 乎 此 則 四  
逆 湯 所 之 也 以上  
傷 寒 脈 滑 不 唯 脈 滑 不 大 使 腹 硬 而 頭 首 長 有 乾 也  
白 虎 湯 主 之 而 則 口 乾 咽 燥 而 渴 者 也 若 腹 硬 〇 傷 寒  
熱 中 嘔 微 指 明 寒 輕 者 之 熱 今 不 欲 食 煩 躁 數 日 柴  
胡 湯 之 小 便 利 色 白 者 此 熱 除 也 欲 得 食 其 病 為 愈  
所 之 也 以 既 與 小 柴 胡 湯 若 進 者 言 之 〇 病 人 午 足 厥 冷 似  
湯 之 後 言 之 湯 也 小 柴 胡 湯 其 後 必 便 血 道 示 之 〇 病 人 午 足 厥 冷 似



四逆脈乍緊者在四逆湯則和結在胸中於脈乍緊則非四逆

湯證也故舉其心中滿而煩饑不能食者此似吳病

一言邪一在胸中則非吳病更湯也當須吐之

非二湯之宜瓜蒂散乾嘔吐涎沫頭痛者

而未有所異也吳茱萸湯主之以上四條皆

傷寒本自寒下對乾醫復吐下之更逆吐下若

食入口即吐者與瓜蒂散曰食入口則吐不同也蓋

字即字乾薑黃連黃芩人參湯主之乾薑黃連黃芩

人參湯方乾薑兩三黃連兩三黃芩兩三人參兩三右四味以

水六升煮取二升去滓分溫再服吐利頭痛發熱

身疼痛輕多欲飲水者此則屬太陰五苓散主之寒

多言下不用水者理中丸主之理中丸方人參兩三

朮兩三白朮兩三乾薑兩三右四味持篩為末蜜和丸如鷄

黃天以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三服夜二

服腹中未熟益至三四丸吐利止使與理而身痛不

休者與四逆湯之後身疼痛清宜桂枝湯每疼痛之

未見發熱者宜桂枝湯此為屬太陰表熱者當

先與桂枝湯也若其發熱也此為屬太陰表熱者當

而止焉是謂其病未止者此為桂枝湯證也

○吐利止中與理中丸惡寒當病已愈則脈微而復利

當不利止津液亡血也非病愈首止四逆加人參湯



主之四逆加人參湯方千金方名於四逆湯方中加

人參兩餘如四逆湯法吐利與五苓散若理中丸吐利尚未止者也

汗出發熱惡寒外熱四肢拘急手足厥冷者四逆湯主

之既吐且利小便復利吐利之於證而大汗出下

利清穀丹果外熱脈微欲絕者與通脈四逆湯自汗出而厥互而言之

四逆湯主之吐已下斷既與四逆湯汗出而厥四肢拘

急不解尚如脈微欲絕者通脈四逆湯主之以上六條皆節

列吐利有也吐下發汗後病已解脈平如小煩者非以新虛不

勝穀氣故也胃氣未復不能消穀故也傷寒差已後更發熱者

餘熱未除者而非其有所加也小柴胡湯主之其在于嘔而發

熱者更詳前條也小柴胡湯主之大病差後從腰以下

有水氣者其在于牡蛎澤瀉散主之牡蛎澤瀉散

方牡蛎澤瀉括躉根蜀漆亭蕪高陸根海藻各等分

七味異檇下筋為散更入白中治之白飲和服方寸

匕日三服小便利止後服大病差後喜唾又不了

夕者久無胃上所謂上焦有寒飲停溫之對寒宜理

中丸其在于傷寒解後虛羸精氣未復少氣氣逆欲吐

者身熱未去首也竹葉石膏湯主之其在于竹葉石膏湯方

竹葉兩石膏兩助半夏半人參兩甘草兩粳米半麥門

冬

冬

冬



冬牛古七味以水一斗煮取六升去滓内粳米煮米  
熟湯成去米溫服一升日三服

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 牛古七味, 粳米, and 湯成.]*



