





武門  
第 455  
卷 1

武門



產寶序

頽聞至靈者人最重者命人皆知命之所重而不知養命之  
方天年未終疾病攻奪嗟呼世無良醫著述則急難倉卒尋  
醫其舛誤多矣醫之中嗚產難為急子母性命懸在片時頽  
勤志方書常忌救療每覽名醫著述皆誌於心且夫男女構  
精陰陽分氣就中女弱疾扶頗多蓋其稟柔質以為人有血  
臧而抱育妊娠之內導理有常至於飲食之間動靜之際尤  
多制忌以節情及乎既產鮮保安者蓋是損觸藏府傷動筋  
骨將理稍失疾患便生更值盲醫取次下藥致其所苦積漸  
懸危日後一日亟至于死可不痛哉故易曰天地之大德曰  
生則知在天地之間以生育為本又豈因生產而反危人之



命乎自惟攝理回循藥餌差謬致其產婦不保安全且婦人  
生產方二三次血氣未衰飲食易進但能節性則無病生縱  
或偶有微病不難醫治至於四五次迨乎七八次傷敗已深  
血氣衰微子藏虛弱穢敗內滯風邪外攻若有病生宜須審  
瘡醫若不子細疾使危治此醫殺之理甚明矣且士俗之家  
婦人產後復乳其子產既損氣已甚乳又傷血至深靈命耗  
神莫極於此稍失常理便合急醫或以家貧不及厚賂醫者  
醫者怠慢須臾困篤吁人之生產非小事也而醫者苗財侮  
而致死此醫殺之理又明矣且夫產前產後血氣未寧一疾  
苟生百疾同作古人所以著方論於產乳者正在此也至若  
鯉魚阿膠能治胎動芎藭當歸善瘡胎痛祇如胎動胎痛非

一理也有因母疾而胎動者有因胎不堅固而自動者痛亦  
如之此畧舉大綱蓋須知醫者之功也降及地黃益血生姜  
助氣芍藥止痛黃耆補虛用之得門其效如聖用之失理不  
如不醫乃知醫人不可苟作題以此疾心常思著方以濟危  
急而學解不博未能自信所以偏採產術志在廣行復見咎  
殷產寶深入醫門乃大中歲相國白敏中傷茲婦人多患產  
難詢訪名醫思救人命或人奉殷相國迎召問其產乳殷乃  
撰方三卷贄於相國相國重其簡要命日產室此方難存得  
者甚少題志在愈疾常恨不家藏一本故輒散序之蓋欲開  
其衆聽凡五十二篇三百七十一方兼拾咎氏之遺作小論  
三篇次於序末庶幾妊娠之家目得覽斯為家內明師爾時







妊娠漏胞下血等方

妊娠忽心腹痛腰痛方

妊娠傷寒熱病防損胎方

妊娠下痢黃水赤白方

妊娠水氣身腫腹內脹滿小便少方

妊娠食忌方

卷中

生月論

瘕難產方

難產死生方

難產令易產方

卷下

妊娠千金令易產方

瘕產後心驚中風方

產後餘血奔心煩悶方

產後渴不止方

產後淋病諸方

石韋湯

產後虛羸下痢

產後腰痛羸瘦補玉門不開方

產後中風方

大豆紫湯

小品大豆湯

獨活湯



鷄糞酒

甘草湯

羌活湯

產後餘血上搶心痛方

大蜜巖湯

當歸湯

羊肉湯

產後汗不止方

粳米粉散

產後冷熱痢方

續命湯

產後虛羸諸方

增戎澤蘭丸

瘵產後煩渴方

瘵產後煩悶虛熱方

淡竹茹湯

產後血痕方

產後餘疾膿血方

瘵產後大小便數

產後小便遺血

產後大小便不通方

產後壯熱方

產後咳嗽方

產後氣痢方

產後血暈悶絕方

產後乳無汁



產後乳結癰方

連翹湯

產後乳汁自出方

產後下乳汁方

產後血結成淋方

許仁則秘方

當皈羊肉湯

產後咳逆方

產後惡露方

猪腎湯

產後下痢為渴方

產後腰痛方

產後脹滿痛方

產後驚悸方

周題增修經效方

金勝丸

黑散子

保命丸

餘方無名者散見木類







夫至精才構一氣方凝始受胞胎漸成形質子在胎內隨母聽聞所以聖賢傳乎胎教凡曰妊娠之後才及月餘則須行坐端嚴性情和樂常處靜室多聽美言令人講讀詩書陳說禮樂翫弄珠玉按習絲篁耳不入其非言目不觀其惡事如此則男女生而福壽自厚忠孝自全若虧此儀則男女或多佞劣及壽不長斯聖人胎教之道為人父母可不行乎

妊娠安胎方

瘵妊娠三四箇月腹痛時、下血方

續斷八分

艾葉六分

熬

當皈六分

竹茹四分

乾地黄六分

阿膠四分

成膠

鷄蘇四分

右以水一升煎取六合去滓空心服再腹痛隔日再服

瘵妊娠六七月忽胎動下血腹痛不可忍方

芎藭八分

桑寄生四分

當皈十二分

右以水一升煎取八合下清酒半升煎取九合分作三分溫服如人行五六里再服

瘵妊娠下血時、漏血盡子死方

生地黄汁三合

清酒三合

右相和煎三四沸分溫再服

瘵妊娠下血不止血盡子死若目房室下血名傷胞同此療方

生乾地黄一味為末酒服方寸匕日三服夜一服即愈又方生地黄亦得若腹內冷加乾薑等分依前服



瘵妊娠心頭妨滿而脇脹不下食方

檳榔 三枚

人參 四分

柴胡 五分

枳殼 四分

肉豆蔻 三分

生薑

桑寄生 四分

右以水二升煎取八合分溫三服

瘵妊娠傷寒頭痛壯熱臍節煩痛方

前胡 六分

石膏 十分

大青 四分

子芩 五分

知母 四分

山梔 四分

葱白 七莖

甜竹 三分

右以水二升煎八合食後分溫三服

瘵妊娠胎動腰痛及下血安胎方

當歸

芎藭 各四分

茅根 六分

鹿角膠 六分

兩湯下

茅外臺草  
兩疑成託

口疑吐誤

右以水二升煎取八合空腹熱喫三服

瘵妊娠嘔吐不能食魚口痰水方

生蘆根 十分

橘皮 四分

生姜 六分

青竹茹 四分

前胡 四分

大腹皮 二分

檳榔 二分

右以水二升煎取七合空心熱服

瘵妊娠脇滿腹脹心先痰見飢即吐漸加羸瘦方

赤茯苓 六分

前胡 四分

半夏 四分

生薑 五分

白朮 一分

麥門冬 一分

大腹 五枚

檳榔 五枚

紫蘇 四莖

右以水二升煎取八合空心分為三分溫服

瘵妊娠恆若煩悶此是子煩宜服此方

若當作苦



麥門冬

拾二分

茯苓

八分

防風

六分

知母

六分

竹瀝

三合湯用

右以水二升煎取七合下竹瀝食後分為二服

瘕妊娠胎動不安煩悶方

當歸

四分

芎藭

三分

阿膠

三分炙未入湯

葱白

二分七莖

豉

八合

桑寄生

四分

右以水煎空心服如前

益氣滑胎令子易產方

瘕妊娠宜服此潤胎益氣令子易產訶子丸方

訶子皮

二分

赤茯苓

五分

芍藥

四分

厚朴

三分炙

大黃

三分蒸

芎

二分

檳榔

八分

茱萸

五分

右擣篩為散煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下十九至二

十九自七八月服至分解

小品預服散令易產母無疾病未生一月已前預服遇三十

日行步不覺兒生

生甘草

八分

黃芩

二分

大豆黃

二分熬

粳米

合一

乾薑

二分

桂心

二分

吳茱萸

二分

冬麻人

二分如泥搗

右八味擣篩為散空心煖酒調方寸匕忌

妊娠惡逆嘔吐不食方

夫菹病之候心中憤憤頭悶眼眩四肢沈重懈怠惡聞食氣

好脾酸醎菓實多臥少起三月四月皆多嘔吐百節不得自

舉者瘕之方



人參

分八

厚朴

分六

茯苓

分十二

葛根

分八

白朮

分十

橘皮

分六

生薑

切十分

右以水七升煎二合分温三服忌桃李醋等

瘕妊娠三四月嘔吐不食惡聞食氣方

橘皮

分二

青竹茹

分二

生薑

分三

茯苓

分三

白朮

分二

右以水六升煎取二升分温三服忌食如前

瘕妊娠道病心中憤悶見食嘔吐憎聞食臍節煩疼身體

沈重多卧嗜睡黃瘦方

人參

橘皮

分各八

麥門冬

分十二

茯苓

分十二

生薑

分十二

甘草

分八

大棗

分十二

按者字誤

右以水五升煎取二升分温三服忌菘菜醋等

凡妊娠惡者食以所思食任意食之必愈

妊娠胎動不安不常處方

夫安胎有其二法曰母病以動胎但瘕母疾其胎自安緣胎有不堅固致動以病母但瘕胎則母差其理甚效不可違也胎不動不知可否者但看母唇口青者兒死母活口中青沫出子母俱死口舌赤青沫出者母死子活也瘕胎數落而不結實或冷或熱方

黃耆

分二

萊菔

分一

甘草

分三

芎藭

分二

人參

白朮

乾地黄

分各二

右搗篩為散空腹酒調兩錢匕忌如前



瘡妊娠胎不長魚數傷胎鯉魚臙方

鯉魚斤一

糯米升一

右如法作臙入葱豉少着鹽醋食之壹月中三五徧作食之極效

瘡胎動不安方

取好銀者取水著葱白作羹食之佳

瘡胎動下血心腹絞痛兒在腹死活未分服此湯死即下活

即安

當歸兩二

芎藭兩六

右以水四升酒三升煮取三升分為三服效

瘡妊娠搶心下血不止腰腹痛不可忍方

上銀

一斤水一升半煎取七升

芎藭

當歸兩各四

生地黄

兩三

阿膠

兩三

右以前銀水煮水取二升分溫三服

瘡妊娠無故胎動不安腹內絞痛方

葱白

斤切一

阿膠

兩三

當歸

芎藭

兩各四

桑寄生

兩二

煎銀水七升以前煎藥取二升半分三服

瘡妊娠二三月上至七八月胎動不安腰痛已有所見方

芎藭

當歸

兩各四

艾葉

兩二

甘草

兩一

阿膠

兩三

右以水煮取二升分溫三服



瘵妊娠五六月胎猶不安不常處方

白朮

三兩

旋覆花

一兩

厚朴

二兩

黃芩

二兩

芍藥

二兩 炙

生薑

枳殼

各二兩

茯苓

右以水七升煮取二升半食後分五服

瘵胎動不安方

熟艾

二兩

葱白

切一升

阿膠

二兩 炙

右以水四升煮取一升半分二服

又方

芎藭

二兩

葱白

一升

以水七升煮取二升半分為三服

瘵妊娠冷熱腹內不調致胎不安方

當歸

乾薑

各三兩

芎藭

四兩

艾葉

二兩

右以水四升煮取二升分為四服不過兩劑差

瘵妊娠經八九月或胎動不安因用力勞之心腹痛面目

青冷汗出氣息欲絕由勞動驚胎所致也方

釣藤

伏神

人參

當歸

各一兩

桔梗

三兩

寄生

一兩

右以水五升煎取二升分為三服忌猪肉菘菜若煩熱加石膏五兩臨月加桂心二兩

瘵妊娠目夫所動困絕方右取竹瀝飲一升立愈

瘵妊娠被驚腦胎向下不安小腹痛連腰下血方

當歸

芎藭

各一兩

阿膠

六分

人參

六分



艾葉

分四

茯苓

分十

大棗

枚十二

右以水四升煮取二升為三服

瘵隨胎忽因倒地忽舉動擊重但積腹中不安及子死腹中

方

芎藭

兩一

右搗為末服寸匕須臾三服即出

瘵胎動衝心煩悶欲死安胎止痛方

甘草

灸二兩

當歸

芎藭

各二兩

阿膠

各二兩

葱白

斤一

右以水七升煮取二升分為三服

瘵妊娠息黃汁下息如膠又如小豆汁方

糯米

升一

黃耆

兩五

右以水七升煎取二升分為四服

瘵妊娠胎動欲落肚痛不可忍方

茅根

去黑皮切二分

上銀

斤一

右以水九升煎銀汁取二升入清酒一升煎茅根取二升

分為三服立安

瘵妊娠腹內冷痛忽胎動方

薤白

升一

當歸

兩四

右以水五升煮取二升作三服

妊娠漏胞下血等方

瘵妊娠下血如血信來若胞乾非但只損子亦傷其母方



乾地黄

兩五

乾薑

兩五

右以為散酒服三錢七日夜三四服

療漏胞下血不止胞乾即死宜急理之方

生地黄

升一

酒

合五

右二味合煎三五沸分三服頻啣差

療妊娠無故卒下血不止方

阿膠

兩二

清酒一升半煎取一升作一服之差

又方

生地黄

兩八

搗了以酒浸之絞過去滓分為二服以止為度

療妊娠下血不止胎上衝心四肢冷悶絕欲死方

青竹茹

一升

艾葉

兩二

阿膠

一兩

白蜜

右以水六升煎取二升內蜜更煎一兩沸為分二服差

妊娠忽心腹痛腰痛方

療妊娠二月三月腹腰痛有所不安方

當歸

兩二

阿膠

兩二

甘草

各二兩

葱白

升一

右以水七升煎取二升作三服忌如前

療妊娠四五月忽心腹絞痛

大紅棗十四枚燒令焦為末以童子小便調下

療妊娠遍身或衝心欲死不能食飲甚效方

白朮

兩五

黃芩

兩二

芍藥

各四兩

黃

右以水六升煮取二升半為三服緣胎間有水致此痛兼易產

芎藭

當歸

茯苓

厚朴

各三兩

身下疑脫痛字



右以水六升煎取二升分為兩服立愈忌如前  
療妊娠心腹痛不可忍方

鹽一斤赤燒令以三指取一撮酒調服即差

療妊娠腰背痛反覆不得如折方

鹿角一枚長五六寸燒之令赤酒中淬之冷又燒淬以  
角碎為度即取酒飲之作散調服亦得

療有所觸動以致腰痛及背痛方

杜仲 五茄皮 當歸各三兩

芎藭 人參 草解各二兩

右以水七升煎取二升半分為三服

療妊娠先患冷氣忽衝心腹刺痛如刀刺方

芎藭 人參 茯苓 桔梗各三兩

吳茱萸 當歸各三兩 厚朴一兩 芍藥一兩

右以水九升煎取三升分為三服氣下即差

療妊娠患腹痛兼胎動方

葱白升切一 人參 厚朴 阿膠

芎藭各二兩 當歸

右以水七升煮取三升作三服

療妊娠疼痛不可忍方

五茄皮三兩 杜仲四兩 阿膠 狗脊

防風 芎藭 細辛 芍藥各二兩

草解三兩 杏人



右以水九升煮取三升去滓內膠為三度服

瘕妊娠二三月腰痛不可忍痛方

續斷

杜仲

芎藭

獨活

各三兩

狗脊

五茄皮

草解

芍藥

署藥

訶子已上六味各八分

右搗為散蜜丸空暖酒下四十九日再服

妊娠傷寒熱病防損胎方

非節之氣傷寒妊娠婦熱毒之氣侵損胞胎遂有墜胎漏血

俱害子母之命

瘕妊娠傷寒百節疼痛壯熱若不急理即胎落方

葱白

前胡

葛根

知母

石膏

各一分

大青

梔子

升麻

各十二分

右以水七升煎取二升半作三服

瘕妊娠壯熱頭痛嘔吐不下食心煩熱方

青竹茹

葛根

知母

各三分

蘆根

升一分

生麥門冬

去心四兩

右以水七升煎取三升分為三服

瘕妊娠時氣頭痛腰氣強壯熱方

升麻

大青

前胡

黃芩

山梔子

各二兩

葛根

三兩

石膏

八分

右以水五升煎取二升半分為三服

瘕妊娠六七月傷寒熱入腹大小便秘塞不通蒸熱方



大黃

二十分

知母

黃芩

茯苓

生薑

各八分

石膏

二分

梔子仁

十分

前胡

十分

右以水八升煎取二升半下大黃三兩沸分為三服

瘡妊娠傷寒苦熱不止身上班出忽赤忽黑小便如血欲絕

胎欲落方

梔子人

兩四

升麻

兩四

大青

兩二

石膏

八兩

葱白

斤切一

黃芩

生地黄

二十分

右以水九升煎取三升為三服忌熱物

瘡妊娠患淋小便澁不利小腹水道熱痛方

冬葵子

升一

芍藥

二兩

黃芩

兩三

茯苓

兩三

車前

兩三

右以水七升煎取二升分為三服差心三服不效更升

又方

車前

兩五

葵根

升一

右以水五升煎取一升半分為二服空溫服

妊娠下痢黃水赤白方

妊娠下痢皆因悞食生冷肥膩冷即色白熱黃赤氣不知赤

白相兼攪刺疼痛脾胃不調之所致也

瘡妊娠痢白膿腹內冷方

乾薑

兩四

赤石脂

兩六

粳米

升一

令黃

右以水七升煎取二升分為三服忌如前

瘡妊娠腹痛下痢不止方

寧下脫心字



黃連

石榴皮

當歸

各三兩

阿膠

二兩

艾葉

一兩

右以水六升煮取二升分為二服忌如前

瘡妊娠下痢腹內痛膿不止方

黃連

八分

厚朴

六分

阿膠

六分

艾葉

五分

當歸

六分

黃蘗

四分

乾薑

五分

右搗篩為散空腹以飲服一匙日三服

瘡妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者方

薤白

切一升

酸石榴皮

黃連

阿膠

灸

地榆

各一兩

右五味以水七升煮取二升半分三服不瘥更作忌

生冷肥膩

瘡妊娠臍下刺痛大便白晝夜三五十行方

根黃

厚者塗白蜜灸令焦方用

大蒜

炮令爛熟去皮所用

右以大蒜研如膏用丸根黃末丸如梧桐子大空心空肚

粥飲下三十九日三兩服疑效

瘡妊娠痢黃水不絕方

荳蔻

五枚和皮用厚朴灸三兩

黃連

二兩

右以水二升煮取一升頓服忌如前

瘡妊娠忽被驚奔走急隨胎下血不止兼痛方

乾地黄

四兩

當歸

二兩

阿膠

二兩

芎藭

二兩



右以水七升煎至二升半分為三服腹痛更如杜仲五茹皮二味各三兩

妊娠水氣身腫腹內脹滿小便少方

藏氣本弱因產重虛土不尅水血化散入四胆遂致腹脹手足面目並皆浮腫小便秘澀

瘰癧身腫有水氣心腹脹滿小便少方

茯苓兩四

檳榔兩三

白朮兩四

旋覆花兩一

杏仁三兩

郁李人兩一

右以水六升煎取二升分為二服小便通即差

瘰癧四臍皮肉狗急及腫方

桑白皮升三

樟桂根兩十

赤小豆升三

右以水一斗二升煎取二味取七升下小豆更煮令熟先食豆候渴即飲其汁小便利即差

瘰癧遍身洪腫不能食方

葶藶子升十

白朮升十

茯苓

桑白皮各十

郁李仁升八

右以水六升煎取二升分為二服小便利即差

又方

沢泻

葶藶子各三

白朮兩六

枳殼兩一

茯苓

右以水六升煮取二升分為三服小便利即差

妊娠食忌方



雀肉令子多媯

鯉魚及雞子令子多疳

雀肉豆醬令子多野

產寶卷上

產寶卷中

唐

咎

殷

撰

坐月

生產雖然觸穢排比切要清虛要在先看產圖次檢日遊所  
 在癸巳日入人家然後安排產婦備辦湯藥不得令人力雜  
 乱大小蒼忙驚動產婦祇可令親屬堂兩人及看坐產婦人  
 等承接產婦腹痛雖甚且須令凭物徐行直待兒逼產門方  
 始令坐勿令產婦坐早坐早則子在腹中難於轉動遂有橫  
 生倒產不測之憂若母子才獲分解且不得問是男是女須  
 速與產母童子小便壹盞令飲不得与酒緣酒引血逆入四  
 胆兼產母藏腑方虛熱酒入在腹中必致昏悶又不得与醋



墨服之雖即破氣而又聚血傷肺困成咳嗽皆此由也若產婦分解之後若有諸病不論巨細並有方藥鑿瘕不得信諸羣小妄投藥餌

凡婦人生產畢且令飲童子小便了不得便卧且須更方可仰卧立膝高搭床頭厚鋪茵褥遮欄四壁使無孔隙免其賊風兼時令人從心上擗至脘下如此三日可止宜且食白粥壹味時飲童子小便一盞七日後方可少進醇酒并些鹽味半月之後漸食煮肉少許三月之後方可食麪仍不得思慮恚恐有傷乱侍敗血盡腑藏自然安胎在一百日内慎勿喜怒及用力高聲工巧之勞房慾之事不得恃身體和適取次為之脫有觸傷便難整理人不得用冷水洗濯又不得

輒食菓實又不得夜後獨行緣以心虛恐有驚悸切在慎之所存血衣洗了勿於日月下曬曝免被邪口侵傷又不得濯足恐血氣攻下又不得刮舌刷齒刮舌傷心及就下伍頭背成血逆此雖產家慎謹之常法也斯所具載蓋備聞如者小

瘕難產方

易產方

飛生鳥隻一

槐子枚十四

故箭羽

片十四燒

右擣篩為散蜜丸梧桐子許覺痛服三十九未產須更再服

令易產方

白榆皮

分十四

通草

分十二

葵子

合二

滑石



藟麥各八分

右以水二升煎取八合分溫三服

又方

羚羊角一枝燒刮取末以酒調方寸匕服

又方

滑石八分

葵子合

榆皮十二分

牛膝六分

右以水一升八合煎取六合再服

又方

含醋嚙面悶即嚙之

又方

吞槐子七枚即出

証類引作一枚

又方

帶水馬一枚立出

又方

吞鷄子白二枚即產

又方

兩手各把一石鶯立出

又方

兔皮和毛燒灰

右以酒調兩錢匕服即產并衣不下者服之亦服即出

又方

大麻根三莖



又方 右以水一升煎取半升頓服立產并衣不下立出

又方 弓弩絃燒灰為末酒調方寸匕

又方 銅弩牙燒令赤投於醋三合內良久頓服

又方 酸漿皮和水少許頓服

又方 麝香壹錢重研和水服

猪脂合二

白蜜匙一

酒合八

右相和煎十沸分為三服

難產死生方

瘡胎死腹中不出母氣欲絕方

水銀二兩頓吞之兒立出

瘡產經數日不出或子死腹中母氣欲絕方

藜麥兩六

通草兩三

牛膝兩四

榆皮斤一

桂心兩三

右以水九升煎取三升為三服

瘡子死腹中不出方

伏龍肝末三錢

右以酒調服之上當兒頭上戴出



又方

朱砂一兩

右以水煮數沸服之然後取和酒服之立出

又方

水銀二兩

以水煮三十餘沸服之立出

瘡產經數日不出或子死服中母氣欲絕方

藟麥以水煮取濃汁服之佳

滑胎易產方

白蜜

苦酒

猪脂

各一升

右和前三四沸臨腹痛時以熱酒服三四錢七五六服即

出

又方

取夫單衣覆井口即出

又方

以弓弩絃縛心下立出

難產令易產方

夫產難者內宜藥外宜以法蓋出多門救療以取其安

瘡產難方坐草數日困乏不能生此為母先有病經絡拘閉

所然

赤小豆

升二

膠

升三

右以水九升煎令熱去豆內膠洋令清服之須臾更一服



又方

令夫從外含水吐着產婦口中即出

瘡產難累日氣力乏盡不能得生此是宿有痛者方

赤小豆升二 膠升三

右以水九升煎令熟去豆內膠洋令清服之須臾更一服  
瘡難產疑胎在腹已死方

當歸分四 芎藭分六

右以水六升煎取二升為二服便安胎已死即下酒煎亦  
得神驗

蒺藜子兩四 貝母兩四

瘡產困乏腹痛有所見兒及衣不出方

瘡難產方

箭一隻燒末以水服之產

又方

鱉甲燒末服方寸匕立出未出再服

瘡落胎腹痛方

桂心分四 芍藥分四 當歸分四 牛膝分四

藷麥各五分 芎藭分四

右以水壹升七合煎取八合空腹溫服

瘡妊娠經五六月胎死腹中或胞衣不出方

生地黃兩五 牛膝分八 桂心分八 芎藭分八



大黃各六分

朴消八分

蒲黃湯五分

右以水二升煎取八合空腹分為二服

瘕子死腹中不出方

雄鷄糞十一枚

右以水二升煎取五合下米作粥食胎即出

瘕妊娠經六七月子死腹中不出方

黑豆三合

右以醋一升煎取八合分為三服空腹

瘕子死腹中母悶絕方

水銀十二分

右拗口開灌之如口不開於鼻中灌下亦得子立出

瘕產橫倒不出者

令夫唾婦口中二七過立出

妊娠千金令易產方

夫婦人將產至重者胞衣也凡胞衣不出者世謂之息胞由產時用力過度已產而體以疲頓不能更用氣經停之間而外冷氣乘之則血逆否故令胞久不出殄須急與藥救理不爾妨於兒所害兒者胞系連兒脰胞不出則不得斷脰俗洗冷氣傷兒則成病也

舊方胞衣不損兒者依法截脰而以物繫其帶一頭所有產時看坐人不用意慎護而牽挽胞系斷其胞上掩心而天心命也凡欲產時必先脫常所著衣裳以籠竈神驗

不下疑脫出字或下字



胎衣不出方

取竈下土一大寸研碎用醮醋調令相得內於胎中續  
取生甘草湯三四合服即出

又方

槐子

十四枚

蒲黃

一合

以酒煎溫服須臾未効更壹服

又方

生地黄汁

五合

生薑汁

半大合

右煎三五沸頓服之

又方

燒鐵杵并錢令赤內酒中飲之

又方

苦酒服真珠一兩

又方

赤小豆生吞二七枚出若是女即二七枚

瘡產後胞不時出方

井底土如雞子中黃以井花水和服立出

經効方

槐子

槐枝一升最好切

藟麥

六分

牛膝

八分

通草

十二分

白榆

大一升切

久麻人

一大升成湯下

右以水五升煎取二大升去滓內麻人分溫二三服  
經効理胞衣不出令爛方

久疑大



竈突土三指撮和煖水服之

崔氏產菑治胞衣不出方

大豆升一

右以苦酒五升煮取三升分為三服

又方

吞鷄子三二枚解髮刺喉口令嘔苦困極即以水煮蜚  
蛄一枚三四沸泻入口中汁下即出

又方

大麥

小麥

小豆

右等分相和煮取濃汁飲之即出

又方

赤朱

兩一

右研如粉以苦酒和服即出

又方

皂角取少許未安着鼻中一兩度旦出

瘵胞衣久不出腹滿即煞人服此方即爛

桂心

牛膝

骨石

通草

當歸

葵子

藟麥

右以水九升煎取三升分為三服甚效

又方

藟麥

桂

牛膝

葵子

通草



右以水三升煎取一升半分為三服

又方

牛膝分四

滑石分末八

當歸兩二

通草兩六

藷麥兩四

葵子升一

右以水五升煎取二升分為三服

又方

取洗兒水飲之即出

療半產胞衣不出方

牛膝兩八

葵子升二

右以水七升煮取二升分為三服須臾即出

療衣半出半不出或子死腹中著脊不下數日不產血氣上

口疑心

衝口方

牛膝兩六

地黄汁

葵子升一

榆白皮兩四

右以水九升煎取三升分為三服即下







