





明武  
第 455  
卷 2止

竹瀝取二分

甘草



產寶卷下

唐 療產後心驚中風方

唐

咎

殷

撰

產後心悶氣絕張眼口禁通身強直腰背反僵狀如癩疾心  
忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒曰產心氣虛弱風曰產  
變為風症方

防風分八

秦膠分六

茯苓分八

人參分六

當歸分八

獨活

漢防己分八

芎藭分六

白蘇皮分六

麻黃去節分八

石膏分十二

甘草分六

白微分六

竹瀝

右以水七升先煮麻黃掠却沫內諸藥入竹瀝取二升半



去滓作三服忌如前

療產後狂語志氣不定精神昏亂此皆心氣虛邪風所致方

茯苓分十二

甘草分八

遠志分十

白微分十

竜齒分十

人參分八

乾地黄分十二

防風分八

獨活分八

右以水銀一大斤水一斗五升煎取七升下諸藥煎取三升分温三服忌如前

療產後心虛忪悸不定妄語謬誤精神恍惚不主當由心虛

所致方

人參分八

遠志分十

茯苓分十

甘草分十

芍藥分八

桂心分六

當歸分八

麥門冬分十二

去心分十

大棗分十二

生姜分八

右以水八升煎取三升去滓分温三服

療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭嗔笑性氣不呈方

上銀一斤

以水八升煮取一半

桂心分六

甘草分六

人參

生薑分各捌

遠志分捌

生地黄分二十

龍骨分十各

細辛分四

伏神分捌

大棗分一箇

右以銀水煮取二升分温三服

療產後多虛弱羸瘦若大汗大痢皆至於死此重虛故苦患

中風謬誤惜悶不知人者方

人參

茯苓

菴活

桂心

大棗分各十二

竹瀝分一升

遠志分十



右以水六升煮取三升下竹瀝更煎取二升分三服

療產後身忽瘥口禁面青手脚強急及張方

竹瀝二升飲之佳

療產後惡寒壯熱日夜三五度癡妄語口中瘡生時乾嘔

困乏欲絕死方

上銀一斤以水一斗五升煎取七升竹瀝二升半人參六分

伏神八分白欬十分玄參二分獨活

葛根六分白蘚皮六分防風六分

青竹茹

右以銀水竹瀝煎取三升分溫三服忌魚酒麪

產後餘血奔心煩悶方

餘血奔心蓋是分解了不便与童子小便并澣心下及卧大

疾兼食不相宜之物所致但能依此方療之無不瘥奇

療產後心中虛熱煩悶氣欲絕方

生麥門冬十二分甘草五分大棗十二分

生姜捌分茯苓十分竹瀝一升人參若逆用八分

粳米若食少加五分

右以水六升煎取三升下竹瀝二升為三服

療產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛方

生乾地黄 芎藭各二兩芍藥 枳殼各二兩

右搗為散酒服方匕日二服

療產後腹內血塊痛不止方



芎藭

當歸

乾姜

各二兩

芍藥

二兩

右搗為散酒服方寸匕日三服

療產後下血不盡腹內堅痛不忍方

當歸

芍藥

桂心

各三兩

桃仁

一百枚

右以水六升煮取二升分為二服未差加大黃三兩

療產後血結下不盡心腹絞痛不止方

芎藭

大黃

芍藥

黃芩

各六分

桂心

甘草

當歸

乾地黄

各十分

桃仁

四枚

右以水七升煮取二升半下大黃更煎三沸分為三服

療產後先患冷氣困產後發腹痛方

芎藭

當歸

桂心

茱萸

茯苓

芍藥

甘草

桃仁

各十分

右以水七升煮取二升為三服

療產後心腹切痛不能食乏氣忽熱忽寒方

當歸

芎藭

黃芩

人參

甘草

芍藥

防風

生薑

各二

桃仁

八十枚

右以水七升煮取二升內大黃更煎三沸為三服

產後血不盡腹中陣痛無計方

青木香

當歸

牛膝

芎藭

黃耆

芍藥

大黃

芒硝

各十分



右以水七升煎取二升內大黃更煎三沸作三服  
療產後血不止虛羸迨死方

蒲黃兩二

以水二升煎取八合頓服

療產後血泄不止無禁度方

乾地黄末以酒調一匙頭須臾三四服

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕方

新羊血一盞頓服如不定更服之立效

療血氣痛欲死方

槐鷄兩五

右搗為末以酒濃煎頓服立效

療產後餘血作疔痛兼塊者方

桂心等 薑黃等

右搗為散酒服方寸匕血下盡差

產後渴不止方

療產後渴不止飲水小便數多方

土瓜根 括萎根 人參 甘草

牡蛎粉各二 大棗枚十二

右以水九升煮取三升分溫三服

療產後大渴不止方

蘆根升一 菰萋兩三 人參 甘草

茯苓兩各三 大棗枚十二 生麥門冬兩四



右以水九升煮取三升為三服頓服四劑即差已忌菘菜  
產後淋病諸方

產後患淋因虛損後有熱氣容於胞中內虛則起數熱即小便澀痛故謂之淋人有因虛損血氣血氣虛則扶熱搏於血即流滲於胞中故血隨小便出為血淋者如南之淋也  
療產後淋病小便澀痛或血淋者方

藟麥

黃芩

冬葵子

通草

大棗十二枚

右以水七升煎取二升半分為二服

療產後血淋方

車前子

藟麥

黃芩

鬱金末

一兩成湯

右以水六升煮取二升內鬱金末分為三服  
廣海療產後卒患淋小便躁痛及血淋方

冬葵子

石葦

通草

子苓

滑石

茯苓

右以水二大升煮取一大升下滑石空腹服  
又療產後淋小便痛及血淋方

黃茅

藟麥

鯉魚齒

通草

車前子

冬葵子

右以水二升煎取一升入齒末空腹為二服  
經效療產後血淋熱淋方

具齒

葵子

石膏

滑石

末



右以水二升煎取一升下兩般未空腹二服

石韋湯療產後卒淋氣血淋石淋方

石韋

黃芩

通草

甘草

榆皮

兩五

芍藥

葵子

兩三

以水二升煎取一升空腹分三服

產後虛羸下痢

產後下虛患痢更加羸弱飲食不進便痢無恒赤白不之蓋因飲食傷於生冷所致也

療產後虛羸下痢膿血腹痛方

黃連

甘草

芍藥

乾薑

當歸

人參

熟艾

各一分

右以水七升煮取二升分為三服忌猪鹿肉

療產後痢不禁止困乏氣欲絕無問赤白水穀方

黃連

厚樸

芍藥

黃蘗

右以水六升煎取二升分為二服

療產後痢赤白心腹絞痛羸困方

地榆

石苗皮

黃連

當歸

薤白

升切一

右以水七升煮取二升半分為三服

產後腰痛羸瘦補玉門不閉方

療產後少氣無力困乏虛煩方

人參

分十二

甘草

分一

桂心

生地黃

分二十



茯苓

分八

芍藥

分捌

生麥門冬

分二十

右以水九升煮取三升分温三服

產後喘息乏氣羸腹內絞痛自汗出方

茯苓

當歸

甘草

芍藥

兩各二

芍藥

乾地黄

兩各二

桂心

生薑

兩各二

右以水九升煎取三升為三服

療產後或寒或熱其候如瘧瘦損喘乏名為腎勞方

宜用葱豉粳米羊肉煮粥食之兩度佳

療產後羸瘦不能食有益顏色長氣力方

黃耆

人參

茯苓

當歸

甘草

芍藥

五味子

白朮

各捌

沃蘭葉

橘皮

各六

訶子

麥門冬

各十

桂心

乾地黄

分十二

右搗為散以蜜丸空腹酒服三十九日再服

療產後風虛羸瘦勞損不生膏肉方

黃耆

當歸

芍藥

人參

兩各二

桂心

甘草

分

芍藥

各八

大棗

枚十一

生薑

分捌

右以水七升煮取三升分為三服

療產後虛勞百骨節疼痛頭疼汗不止方

當歸

人參

生薑

兩各二

黃耆

兩三

豉

合五

粳米

兩三

猪腎

切一貝

薤白

合切



右以水一斗五升煮腎取六升下諸藥取二升分為三服  
又方

猪腎

貝一

羊腎

貝一

右著葱豉作臛如當喫

瘵產後大虛心腹極痛血氣厥上搶心氣息之補益方

黃耆

白朮

當歸

甘草

各二兩

生薑

兩四

人參

兩二

白羊肉

三斤

去脂

右以水一斗九升煮肉取九升下諸藥取三升分為三服

瘵產後及傷妊娠後虛勞腹痛方

芎藭

兩三

當歸

芍藥

生薑

各兩四

右以水七升煮取二升半為三服

瘵陰腫下脫肉出玉門閉方

石灰

一斤熬令黃色

右以水一斗九升浸灰中停灰澄清重煖以浸玉門斯須

平復如故

產後中風方

產後中風由產傷動血氣勞損截腑未平腹起早勞動氣虛而風邪氣乘之虛傷之故中風風邪冷氣客於皮膚經絡但疼痺羸乏不任少氣又若筋脉挾寒則掌急喎僻挾溫則縱緩弱若人諸截恍惚驚悸隨其所傷腑截經絡而生病焉  
張仲文瘵產後中風寒授遍身冷直口噤不識人方

白朮

兩四



右以酒三升煎取一升頓服之効

經效瘡產後風虛頭痛語言時僻方

乾葛

防風

茯苓

麥門冬各八分

芍藥

黃芩各六分

犀角四分

甘草三兩

右以水二大升煎取七合分為二服

大豆紫湯瘡產後百病及中風痲痺或背強口噤或但順熱

苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆因虛風冷

濕及勞傷所為方

大豆

升五

清酒

升一

右鐵錘炒令豆熟以酒投之蜜蓋令温去豆服一升日夜數服卧取微汗避風

又方小品大豆湯

大豆三升

極熟令

右以銅罍盛清酒五升沃之密封良久去豆分為三服服

了覆衣取微汗身不潤即愈令產後皆宜服之一則防風

二則消血

瘡產後中風口噤不仕小大獨活湯方

獨活

分四

乾薑

分六

甘草

分二

生薑

分六

右以水二大升煎取一大升為二服

鷄糞酒瘡產後中風及百病并男子中一切風神效方

烏鷄糞

升三

大豆

升三

右先炒豆令声絕熬雞糞令黃以酒一升先淋雞糞取汁



淋大豆一服一升重者凡四五日服之極妙

療產後中風心忪悸或志意不定恍惚言語錯亂方

人參分六 伏神 麥門冬 羚羊角各八分

白鮮皮 黃芩 甘草各四分 石膏分十二

淡竹瀝二大合成湯下

右以水二大升煎取七合下竹瀝分為二服

甘草湯療產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼此病中風內

絕藏氣虛所為方

甘草 芍藥各五兩 羊肉斤三 當歸兩三

右四味以水一斗六升煮肉取一斗去肉內藥煮取

六升去滓分五服日三夜二

療產後中風身背拘急如束并渴方

芍藥 羌活 羚羊角各四兩

酸枣仁兩四 防風分五 葦白皮分六

右以水四升煎取二升分溫三服

療產後中風四服拘束筋節掣疼不得轉側如角弓張方

麻黃去節分八 生姜 桂心各四分 防風分六

芍藥分六 芍藥分五 白朮分四 甜竹瀝湯二合下

右以水三升先煎麻掠去沫下諸藥煎取七合下竹瀝更

三沸食後三服服了取微汗為度

療產後中風血氣不散邪氣入藏狂言妄語精神錯亂腰痛

骨疼方



麻黃

伏神 各八分

防風 各六分

白鮮皮 各六分

杏仁

當歸 各四分

桂心 各四分

芍藥

獨活 各五分

右以水二升五合煎取九合空腹熱喫

瘵產後中風身體疼痛四肢羸弱不遂羗活湯方

羗活

芍藥

黃耆 各六分

乾葛

乾地黄

麻黃 各八分

甘草

桂心 各四分

右以水二升煎取八合先煎麻黃去沫下諸藥食後熱服

覆衣出汗

瘵產後中風煩渴方

紅花子 五合微熬研碎

右以水一升煎一匙頭取七合徐々呷之

瘵產後中風口喫四肢頑疼不任或如角弓方

羗活

防風 各二分

大豆 一升淨搗炒令皮折

右以水五升先浸二味經宿大豆氣熱投酒中攪令勻密

封一日以湯煮瓶良久服八合覆衣取汗如急速且以豆

淋服羗活防風亦佳

瘵產後中風腰背強直時々反張名風痙方

防風

葛根

芍藥

乾地黄 各八分

麻黃 去節

甘草

桂心

獨活

漢防己 各六分 杏仁 剝十枚去尖

右以水八升煮麻黃去沫內諸藥取三升為三服



療產後中風口噤漬悶不能言身體痙直方

羌活 防風 秦膠 桂心

甘草 葛根各三分 生姜剉 附子一枚

杏仁八十枚 麻黃十分

右以水九升者麻黃去沫下諸藥取二升為三服

療產後中風口噤拘急困驚腰背強直時々反折方

大豆一升炒令絕

右以清酒六升投之煮三四沸去滓飲之令微醉如汗出

差慎勿觸風風成者如鷄矢白和豆炒之同喫兼飲竹瀝

加

產後餘血上搶心痛方

夫產後血上搶心痛由產後氣虛挾宿冷搏於血不結不消氣逆上者則血隨上衝擊而心痛也凡產餘血不盡得冷即結典氣相搏則痛因重過於寒血結尤甚  
集驗大蜜嚴湯療產後心痛方

乾地黄 當歸 獨活 吳茱萸

芍藥 乾薑 甘草各三兩 細辛一兩

右以水三升煎取一升空腹分為三服忌生冷

經效療產後氣虛冷搏於血血氣結帶上衝心滿脹當歸湯

方

當歸 桂心 芎藭 吳茱萸

檳榔 橘皮 生薑各二兩 芍藥



右以水三升煮取一升空腹分兩服

千金治產後內虛寒氣入腹、中絞痛下赤白痢妄語見鬼  
羊肉湯方

肥羊肉一升所去

甘草灸

當歸

芍藥各一兩

右以水六升煮羊肉取二升去肉下藥取一升為二服

千金翼茺萸酒瘥心腹內外痛方

吳茺萸十二分

右以酒二大升煎取一大升空腹分為二服

必効瘵腹中絞刺痛方

羌活二大兩

右酒二升煎或一升去滓為二服  
千金治產後渴少氣方

麥門冬十二分 大棗七枚

生薑

甘草

人參各六分

淡竹葉十二分

小麥五合

茯苓八分

右以水二升半煎取一大升去滓分作二服

產後汗不止方

產後汗不止夫汗由陰虛而得氣加之裏虛表實陽氣獨發  
於外故汗出為陰虛故令汗出而陰氣虛弱未平復也凡產  
後皆血氣虛故多汗因過風邪則變為疾  
千金治產後風虛汗出不止小便難四服微急難以屈伸方

大棗十二枚

附子

桂心各四分

甘草六分



芍藥分捌

生薑分六

右以水三升煎取七合空腹分為二服忌猪肉冷水生葱

經効治產後汗不止方

黃耆分十二

白朮

牡蛎

茯苓

防風

乾地黄

麥門冬分各八

大棗枚七

右以水二升煎取七合空腹分為二服

產後汗不止粳米粉散方

牡蛎兩三

附子炮一兩

白粳米粉升三

右為散攪令勻汗出傳之

產後冷熱痢方

產後冷熱痢由藏腑虛冷熱之氣入於腸胃腸胃虛則痢故

多冷元痢子青白為冷黃子赤為熱久不療治令人至死

陶隱居療產後餘疾氣疲乏腹肚妨痛方

沢蘭分七

當歸分六

芍藥分六

生薑

生地黄各十分

甘草分六

大棗枚七

右以水二升煎取七合空腹二服

千金治產後餘疾腹中絞痛不下食疫乏方

當歸

黃耆

芍藥各六

乾地黄

白朮各八

大棗枚十四

桂心

甘草各四

右以水二升煎取八合空腹兩服忌生葱桃李



瘵產後驟泻不止續命湯方

白蜜一匙 生薑一片

右同煎候蜜色赤投童子小便一升去薑更煎三四沸分  
為三服頓服

廣濟理產後腹痛氣脹脇下妨不食兼微痢方

茯苓 人參 當歸

甘草各六分 生薑 陳橘皮各四分

厚朴八分

右以水二升煎取七合空腹為二服忌如前

產後虛羸諸方

產後虛羸者因產損傷腑藏勞侵血輕者將食滿月即差重

者日月雖滿氣猶不調和故患虛羸

廣濟治產後風虛冷氣腹肚不調益悅沃方

沃蘭 桂心 遠志

厚朴 石斛 白芷

續斷 防風 乾薑各三分

芎藭 白朮 柏子人

黃耆各四分 甘草 當歸各五分

赤石脂各六分 乾地黄各六分 人參各三分

右以為散蜜丸空腹酒下五十九丸忌如前

千金增減沃蘭丸瘵產後百病理血補虛勞方

沃蘭 防風 甘草各七分 附子



白朮

白芷

桂心

細辛

乾薑

麥門冬

柏子人

乾地黄

石斛

人參

牛膝

厚朴

藁朮

當歸

芎藭

右為散蜜丸空腹酒下二十九忌如前

桃人煎治婦人產後百疾諸氣補益悅沢方

桃人一阡二佰枚云皮尖及雙人熬令黃色研如膏以  
上好酒一斗五升研瀝三四遍如作麥粥法以極細為  
佳內長項瓷瓶中蜜塞以麪封之內湯中煮一日一夜  
不停火亦勿令火猛使瓶口常出在湯上無令沈沒熱  
訖出溫酒服一合日再雖丈夫亦可服之

瘵產後煩渴方

產後煩渴夫產水血俱下腑藏燥津液不旦挾虛熱者躁渴  
即甚效故令渴也

紫葛三大兩

右以水二升煎取一升去滓呷之炒

集驗瘵產後心煩渴方

瓜蒌根

人參

甘草

麥門冬

大棗七枚

生地黄十二分

右以水二升煎取八合食後分二服

瘵產後煩悶虛熱方

產後煩悶虛熱夫產即腑藏勞傷血氣傷而風邪乘之搏於



血便氣不宜而倍洩則生熱或胆節煩疼口乾但因生熱其煩悶由產後血氣虛弱未復而氣逆乘之故煩悶也其氣故令脇滿妨不食方

生地黄汁升一當歸末一兩清酒升三生薑汁合三

童子小便升二

右合煎三四沸分溫四服中間藥消進食進食消更進藥經效理血氣煩悶脇肋脹痛方

芍藥分八蒲黃成湯四分當歸分六延胡索分四

荷葉帶三枚

右以水二升煎取七合下二味末為二服空腹服集驗瘡產後血氣煩悶方

生地黄斤一酒合二

右合煎一兩沸為二服立効

千金瘡產後血氣喘乏心煩悶不解

淡竹葉 麥門冬 小麥 茯苓各二兩

甘草 生薑各一兩大棗枚七

心忪加仁參兩二食少加粳米合二

右以水二升煎取七合食後分為二服

淡竹茹湯瘡產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解方

淡竹茹分八麥門冬分三甘草分六小麥合二

乾葛

右以水二升煎取八合食後分為二服



產後血瘕方

產後血瘕由產之後有血氣相搏謂之瘕痛瘕者畜也謂其痛浮瘕無定緣內宿有冷血氣不治至產血下即少故成此矣方

童子小便升三生藕汁升一大地黃汁升一生薑汁升三大

右先煎三味汁三分減二次下薑汁漫大煎如稀餈每服

一合煖酒調下

瘕血瘕痛脘下脹不食方

當歸分八桂心芍藥蒲黃

麟竭分各六延胡索分四

右搗為散空腹温酒下二錢匕

千金瘕血瘕方

乾地黃兩一烏賊骨兩二

右搗為散空腹温酒下二錢

又方

鐵秤燒赤

右以酒一升泮之分為二服

產後餘疾膿血方

產後餘疾由產勞傷藏腑不旦日月未滿起早勞動虛損不捕為所傷令氣力疲乏若風冷入於胃、傷虛冷生血冷極即變白膿、血相雜冷熱不調為滯痢方

深師方



黃連 兩六

烏梅 兩三

乾薑 兩二

右為散蜜丸空腹飲下三十九忌如前

廣濟療產後赤白痢脘腹絞痛方

當歸

黃連 各八

艾葉

地榆

甘草 灸

龍骨 各六

厚朴

黃芩

乾薑 各六

右以水二大升煎取七合空腹為二服

經效療產後赤白痢脘下氣痛方

厚朴 剉

當歸 六

肉苳菟人 五 枳殼

甘草 五

訶子 六

薤 切三

右以水一升煎取九合空腹分為二服

張仲文療產後赤白痢腹中絞痛方

黃連

阿膠 各一

梔子人 兩三

蒲黃 兩一

當歸

黃芩 各二

右為散空腹米飲下方寸匕日兩服

投急療產後赤白痢腹中絞痛方

阿膠

艾葉 各二

乾地黃 各二 甘草

當歸 各二

右以水煎取八合空腹作二服

必效療產後赤白痢腹中絞痛不下食方

薤白 斤切一

當歸

石榴皮

地榆 各三

粳米 合二

黃連 各十

黃蘗 各一

犀角 各四



黃芩

枳殼

甘草

分六

茜草

分八

白藜蘆

分十二

升麻

分六

右以為散蜜丸空腹飲下二十九

療產後血痢小便不通脘腹痛方

生馬齒莧

右搗汁三大合煎一沸下蜜一合攪頓服

千金療產後水痢霍亂下痢無度方

白石脂

分二

乾薑

分十二

右為散以麩糊丸空腹飲下三十九

療產後大小便數

產後小便數此由胞內宿有冷因產後冷癸動冷氣入腹虛

弱不能制其小便即數也有遺尿者由產用氣傷於膀胱而冷氣入於胞胞囊決漏不禁小便故令遺米因產難所致也方

取雞屎燒作灰空腹酒服方寸匕

千金翼療產後小便數及遺尿方

桑螵蛸

枚三十

鹿茸

灸

黃耆

各三兩

牡蠣

人參

赤石脂

厚朴

各二兩

右為散空腹以米飲調方寸匕忌冷茶

產後小便遺血

療產後大小便利血方

車前子

黃芩

牡蛎

芍藥



蒲黃

乾地黄 各六分

右為散宜腹飲下方寸匕忌麪蒜

崔氏療產後血氣滲入大小腸方

車前葉 汁一斤蜜合一大

右相和微煎一兩沸分為二服

又大小便利血方

乱髮

燒灰

研如粉飲調方寸匕服

古今錄驗療產後勞傷熱極大小便赤澁方

鷄蘇

一分

通草

十分

冬葵子

三合

芍藥

八分

滑石

八分

生地黄

十二分

芒硝

八分湯下

右以水三升煮取八合空腹為二服

產後大小便不通方

產後大小便不通腸胃本挾於熱因產又小便血俱下津液

竭燥腸胃痞澁熱氣結於腸胃故不通

集驗療產後津液渴燥大小便不通方

芍藥

大黃

枳殼

各

麻人

研各二兩

右為散蜜丸空腹煎水下二十九漸加以利為度

經效療大便不通熱氣結於腸胃方

大黃

二兩

芒硝

一兩湯下成

右以水一大升煎取六合下硝空腹分為二服

古今錄驗療產後大便不通方



杏仁八分去皮尖研加膏

芍藥

大黃各捌分

黃芩 芒硝各六分

右以為散蜜丸空腹煎水下利為度

千金療產後熱結大便不通方

蜜五合

右以火煎令強以水投中良久取之陰如母指長二寸內

下部即通

產後壯熱方

產後壯熱因產勞傷血氣使陰陽不和互相乘剋陽勝即熱陰勝即寒陰陽相激故發寒熱又產餘血亦令人寒熱其腹時時痛即是

療產後虛羸喘乏乍寒乍熱狀如瘧名之蓐勞方

猪腎一貝去脂膜切 豉五合綿裡

白朮二兩 葱白升切一

人參二兩 當歸二兩

右以水二升煎取八合分為二服

療產後乍寒乍熱通溫胃心煩悶方

知母 芍藥各捌分 黃芩

桂心四分

右以水二升煎取八合空腹分為二服

經効療產後虛煩頭痛短氣欲死心中亂不解方

淡竹茹八分 麥門冬三分 甘草六分 小麥

乾葛八分 石膏十二分



右以水二升煎取八合食後分為二服

瘡產後虛熱頭痛方

芍藥分十二

黃芩

桂心分各六

乾地黄分八

牡蠣分八

茯苓分八

右以水二升煎取一升令為二服

產後咳嗽方

產後咳嗽由肺藏微寒即成咳嗽而肺主氣因產後氣虛風

寒傷於肺故合咳嗽也

集驗瘡產後無傷寒咳嗽多痰唾粘方

桔梗分六

款冬分四

空麥門冬分十二

生地黄分十二

甘草分六

葱白握一

豉合二

右以水二升煎取八合食後良久二服

經効瘡咳嗽多痰唾粘氣方

前胡

五味子

紫菀

貝母分各六

桑白皮

茯苓分各八

淡竹葉斤二十

右以水二升煎取八合食後為二服

瘡產後咳嗽氣喘方

桑白皮分十二

乾百合

赤茯苓分各八

百部根

桔梗分各六

右水二升煎取七合二服

產後氣痢方

妊娠之時脾胃氣挾於冷大腸氣虛因產後轉加虛損或悞



食生冷酒麪便成痢疫赤白氣不利赤白胃熱或青色冷極也

瘡產後氣痢不止方

青木香分三 訶子皮分八 分合 酥黃

右為散空腹飲調服方寸匕

瘡產後赤白痢方

黃連分八 阿膠分六 赤茯苓 當歸分各四

黃蘗分四 乾薑分三

右為散蜜丸空心粥飲下二十九

瘡產後水痢方

枳殼分四 厚樸分三 茯苓 黃連分各六

當歸分三

右以水一升煎取八合空腹分為二服

又方

黃連分六 烏梅肉分五 石榴皮分四 當歸分四

乾薑分三 赤石脂

右為散蜜丸空腹米飲下二十九

瘡產後下痢赤白有血方

赤石脂 黃連 地榆分各六 當歸分四

乾薑 甘草分各三 厚朴分十二 薤白分七

右以水二升煎取八合空腹為二服

瘡產後血痢不止方



產寶考卷之十一  
鳧棗根分六

右為末以水和丸如枣核許以麪袒作餛飩每度煮二七箇熱吞之

產後血暈悶絕方

產後血暈者其狀心煩氣欲絕是也亦有用心過多而暈亦有下血極少亦暈若血下多暈者但煩而已下血少而氣逆者則血隨氣上掩心心下滿急此二者雖並為暈而狀候各異當問其產婦血下多少即知須速投方藥若不怠療則危於命也凡暈者熱血氣乘虛奔逆逆上所致也但才分解了燒秤礮紅石令赤置罌中向產母床前帳裡投醋淬之得醋氣可為除暈之法也十日內時作此法不妨暈者如日月

之有暈也

經效產後忽悶胃汗出不識人方

雞子三箇

右碎而吞之便醒不醒者可濯男子小便入腹即醒若久不醒忽時發者此為有風因產血氣暴虛風行脉中若虛去血多者尤甚

又方

馬齒見

右擣取汁三合煎一沸投蜜一匙攪勻頓服若無時乾者亦得

療產後血氣暴虛汗出方



淡竹瀝 合三

右微煖服之須臾再服

廣濟療產後血暈心悶不識人忽神言鬼語氣息欲絕方

生地黄汁 升一 芍藥 升一 甘草 升一 蜜 合一

丹參 分四 生姜汁 合一

右以水二升煎取八合下地黄汁等分二服

療產後惡露不多下腹絞痛方

牛膝 分六 牡丹皮 分六 當歸 各二分 芍藥 分六

桂心 分六 蒲黃 各四分 大黃 分八

右為散空腹煖酒服方寸匕

救急療產後血不盡疼問心痛方

荷葉 熬令黃

右為散以前煎水調方寸匕

療產後下血不盡煩悶腹痛方

羚羊角 燒成灰刮取二兩 芍藥 二兩 枳殼 一兩細切熬令黃

右搗為散以水調方寸匕

又方

擣生藕取汁飲二升甚驗

療初平安血氣煩悶方

童子小便 合五 生地黄汁 合三

右微煎三沸溫、再服

療產後血暈心悶方



紅藍花分十二

紫葛分捌

童子小便合三

芍藥分捌

蒲黃湯四分

生地黄汁合二

右以水二升煎取七合下地黄小便三五沸每服二合

產後血暈心悶乱恍惚如見神鬼方

生益母草汁根汁亦得

地黄汁合二

小便合一

鷄子三枚

右微煎三四沸下鷄子白攪合散為一服

癩產後血暈狂語不識人狂乱方

童子小便合五

地黄汁合二

紅雪分捌

赤馬通七枚

右小便地黄汁浸馬通絞去滓下硝温為二服

產後乳無汁

血氣虛弱經絡不調所致也乳忽投於地虫蟻食之令乳無

汁可沃東壁佳

癩產後乳無汁方

土瓜根

漏蘆各三兩

甘草二兩

通草四兩

右以水八升煎取二升分温三服忌常法

又方

通草

漏蘆

土瓜根各二兩

桂心

甘草各一兩

右為散飲服方寸匕日三服更煉乳二兩甚益速下

又方

母猪蹄二枚切通草



右以綿裹和煮作羹食之妙

又方

括萎末

右以井花水服方寸匕日二服夜流出

又方土瓜根治下篩服兩錢匕日三乳如流水

產後乳結癰方

產婦宜勤去乳汁不宜畜積... 不出惡汁內引於熱則結  
硬堅腫牽急掣急疼痛或渴思飲其奴午近不得若成膿者  
多妬乳乃急於癰宜服連翹湯利不熱毒外以赤小豆末水  
調塗之便愈忽數祖去乳汁忽小兒午勻動之忽大人含水  
咽之得汁吐之其汁狀如膿也若產後不自乳兒畜積乳汁

結作癰也連翹湯癩產後妬乳并癰

連翹子

升麻

芒硝

各十分

玄參

芍藥

白欬

防己

射干

大黃

十分二

甘草

六分

杏仁

八十枚  
去皮尖

右以咀每服八錢水一盞半煎至八分下芒硝去渣通口

服食後

癩產後妬乳并癰方

蒲黃草

右熟搗傳上口三度易之并煎葉汁飲之亦佳食之亦得

妬及癰並差

又方地黃汁塗之熱即易之差



瘡乳癰方以馬溺塗立愈

瘡癰疽婦人發乳丈夫發背潰爛生膿血後虛掇少氣者方

黃耆

地黃

麥門冬

升麻各三兩

人參

茯苓各二兩

當歸

芍藥

遠志

甘草各一兩

大棗十枚

右以水二升煮取一升分溫二服

瘡乳頭裂破方

一香末傳之立愈

瘡乳妬及癰方

葵莖及子

右擣篩為散服方寸匕即愈

又方鷄矢末右服方寸匕須臾三服愈

又方

皂莢十條

右以酒一升揉取汁入硝石半兩煎成膏傳之

瘡諸癰不散已成膿懼針令白決破方

白鷄翅

右取第一翎各一莖燒末服之即決

又方

雄雀白屎研塗上乾即易之

瘡乳癰初得令消方

赤小豆

茵草



右等分為末苦酒和傳之愈

瘡腫癰發背乳四肌虛熱大渴方

竹葉切三分升以水一斗 生地黃六兩 黃芩

人參 芍藥 知母 甘草

茯苓各二兩 升麻 黃耆 栝婁

麥門冬各三兩 大棗十二枚

右以竹葉汁煮取三升渴即飲之

瘡乳腫方

升麻 白欬 大黃各三兩 黃芩二兩

芒硝二兩內湯

右以水二升煎取一升分為二服忽以繇縕藥帖腫上日

夜忽傷即差

又方

紵麻根擣傳之愈

又方

黃蘗一分

右擣末和鷄子白塗之乾即易之立差

又方

鹿角石上磨取濁汁塗上乾即易之

又方

鹿角燒作灰以酒調塗之立愈

又方



梁米粉

右熬令黑以雞子白和如泥以塗帛上帖之穿作穴以泄  
癰毒氣易之效

產後乳汁自出方

產後乳汁自出蓋是產後身虛所致宜服補湯以止之若乳  
多溫滿急痛者溫熨之

癢乳癰始似方

大黃

棟實

各二兩

芍藥

六分

馬蹄

各六分

右搗為散空腹飲服方寸匕取汁為度

癢乳癰初覺有異方

子芩

五分

甘草

五分

桑寄生

六分

防風

五分

通草

十分

麥門冬

六分

赤芍藥

五分

黃耆

五分

大棗

五十枚

右以水一升煎取九合去滓內乳糖六分為四服

癢乳堅硬方

芍藥

人參

枳殼

各三兩

黃耆

通草

各六分

桂心

各一兩

蒺藜子

四分去角

雞骨

右為散空腹酒服方寸匕日再服

產後下乳汁方

產後下乳方

黃瓜蘗

一枚取子



右以水一升煎取六合下酒合煎勻分二服

又方

通草分十

鐘乳分六

麥門冬分六

右為散以酒服方寸匕食後服

又方

漏蘆分三

瓜瓠根分四

蛭螬分三

土瓜根分四

為散酒下方寸匕日三服

產後血結成淋方

瘡血氣癰結成淋諸方宜以停騰用之

瘡氣結成淋小便引痛或如豆汁面目萎黃方

貝齒三枚末

葵子一合研

石膏分十二

骨石八分研

右以水二升煎取八合下猪膽汁半合煎三四沸空服温服

瘡胞不轉小便不通八九日方

滑石分十二

寒水石分捌

葵子分一

右以水二升煮取九合空服分三服

瘡卒不得小便方

杏仁

二十枚去皮尖熬黃去却

右和米飲頓服立止

瘡小便淋澁不通方

葵子

朴硝捌分湯成下

右以水二升煎取八合下硝分為二服立通



又方

紫草分捌

右為末以井花水五合頓服立愈

許仁則秘方

許氏昔在西京為女祕妙不傳此方於後人則女輩尋得依狀相傳萬不失一

瘡產後石覺血氣不散心腹刺痛脹滿悶喘息不得食飲方

鬼前羽

三兩折之如金色良

當歸兩二

白朮兩三

細辛兩三

右以無灰酒三升水四升煎取二升分為二服

瘡產後若覺惡露下多心悶氣短憎寒無力不能食方

當歸

艾葉

生薑

人參

地榆兩二

乾地黄兩四

右以水三升者取一升分為二服

瘡露下多少得所冷熱得調餘伏但覺腹內切痛方

當歸

生姜

桂心

芍藥

右以水及酒各五升者取二升分為二服

瘡產後諸狀亦無所異但不能食者方

白朮

生薑

右以水酒各二升煎取一升分為二服

瘡產後更無疾狀但覺虛弱欲得補氣力兼心腹痛方名曰

當歸羊肉湯



肥羊肉一斤去脂以水一斗取捌升去肉當皈五兩

生薑六兩

黃耆四兩

右三味以肉汁煎取二升五合分為四服多風如芎藭二兩有冷加茱萸一兩有氣如細辛二兩有熱如生地黃汁二合

瘵產後雖甚通利唯覺心腹滿悶脇肋脹兼咳嗽喘息不能飲食大便不通眼淚起坐不安心腹時痛方

白水

當皈

桑白皮

大黃各三兩

細辛

桂心各二兩

生薑四兩

右以水二升煎取一升為三服如行七八里再服服此湯當得利又不宜通多所利者為不獲已而利之其不然未

合令利既初產後知身皆虛尚藉藥食補之豈宜取利此緣病熱既要不利苟以當途服湯得通氣息安帖利既未止即便須急取三匙醋餅喫即止止後但須適寒溫將息後取瘵復飲食之節量其所宜如利諸不減宜依後方服之

當歸十分

白朮捌分

甘草七分

桂心

人參

生薑各三分

細辛四分

桑白皮六分

右為散蜜丸酒下三十九

瘵產後水利方

神麴五合

枳殼

白朮

乾薑各六分

赤石脂十二分



右為散以粥飲調方寸匕

療產後血利方

艾葉分三

阿膠分十

黃連分七

芍藥

黃蘗

甘草各六分

右為散以粥飲調方寸匕

療產後下膿利方

附子炮

乾姜

甘草各七分

白朮分七

黃耆分四

右為散以粥飲調服

療產後諸痢方

煮薤白食之唯多益

肥羊肉炙食之唯多好

羊腎脂炒薤白空腹食之任

產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力遂覺頂博臍節皮

肉痛乍寒乍熱此為辱勞宜服後方

猪腎一具脂去

當皈

芍藥

生姜各二兩

桂心一兩

葱白切三兩

右以水八斗煮腎取汁六升下諸藥取二升為二服

產後咳逆方

因產用力氣亂胃口冷熱不和或冷氣入脾胃采衛錯亂遂

成斯患

療產後咳逆氣麁數々不止方

生姜汁合

蜜合

菽訶汁合



右三味用煎一兩沸投酒二合更煎放溫分為三服  
瘵產後或患咳逆氣亂心煩方

乾柿一個碎之以水十分煎熱呷

瘵產後咳逆經三五日不止欲死方

桂心半兩末 姜汁三合

右同煎取二合向火煎灸背塗之盡摩令熱時塗藥汁

又方

煎壁鏡窠三四呷之

瘵產後覺半風手足不遂言語澁恍惚多忘精神不足方

獨活 當歸 芍藥 防風

芎藭 玄參各二分 桂心一分半

右以水八升煮取二升半分為三服覺效更一劑漸差須  
通寒溫將息如不差即以此方作丸每服二十九有熱加  
乾葛五兩有冷加白朮五兩有氣加生姜六分手且不穩  
加牛膝五分卑解三兩黃耆四兩痛加當歸芍藥各二分  
不食加人參二分玄參三分

瘵產後更無餘苦但覺氣虛方

當歸十二分 澤蘭剉 防風 黃耆

續斷各六分 乾地黄十分 桂心五分 地骨皮七分

人參五分 芍藥七分

右為散蜜丸酒下二十九

產後血氣不通當時不甚覺之在產出血少皆成癥結心便



痛硬乍寒乍熱食飲不生肥肉心腹有時刺痛口乾粘手  
且沉重有此狀者宜服此方

當歸

芍藥

甘草

鬼箭羽

牛膝各五分

白朮

牡丹皮

苦杖各六分

桂心四分

大黃剉分

蠅蠅頭二七去足

水蛭二分

蒲黃六分

烏梅熬四分

人參五分

朴硝十二分

白微四分

乾地黄七分

右為散蜜丸空腹酒下二十九日再服

產後膿血相兼方

赤石脂

五色龍骨

黃連各分

阿膠六分

白朮五分

黃蘗四分

黃耆六分

右為散飲下方寸匕  
瘡產後下血不止方

桑耳灸

芍藥灸

地榆

茜根

牛角腮

阿膠各六分

艾葉四分

鷄蘓四分

白龍骨十二分

右以水二升煎取八合分為二服

產後惡露方

瘡產後三四日惡露不下吐食吐逆兼壯熱方

芍藥十分

知母八分

生姜

當歸

蒲黃各四分湯下

紅藍花

荷蒂七枚

生地黄汁三合

右以水二升煎取七合去滓下地黄蒲黃煎三四沸空腹



三服

瘡產後七八日惡露下不止方

敗醬

當歸

各六分

芍藥

八分

芎藭

四分

竹茹

四分

生地黄

十二分 熟乾

續斷

一分

右以水二升煎取八合空腹溫服

瘡產後七八日腹痛兩脇滿兼痛方

桔梗

當歸

金寄奴

各六分

桂心

橘皮

各四分

芍藥

茯苓

各八分

延胡索

四分 湯研下

右以水二升煎取八合空腹為三服

瘡產後腎勞寒熱如瘧四肢疼痛面色萎黃宜喫猪腎湯方

猪腎

一貝去脂膜

糯米

一合 潤

當歸

四分

知母

一分

葱白

和撰 七葉

芍藥

一分

右以水二升煮猪腎取八合去腎下諸藥取五合空腹頓

服服訖即卧良久

瘡產後七日内宿血不散時衝心迷悶方

荷葉

六分

延胡索

一分 湯下

右以水二升煮取八合空腹服忌雜肉一月日

產後腹中堅硬兩脇隔脹手足冷心中煩熱欲飲水乾嘔口

瘡中風之疾方

羌活

桔梗

敗醬

各八分

防風

十二分

桂心

六分

柴胡

六分

大黃

六分 過

羚羊角

二分

右以水二升煎取八合空腹三服服了吐即久更服每服



了喫地黃酒切地黃一升炒令黑內瓷罍中下熱酒三升  
密封煮令減半任意飲

瘡產後將息不調乳母少年強為起動衝風任性冷食成癰  
結兩肋脇硬痛顆塊忽時悶亂不能識人方

桔梗分十二 烏犀角分六 芍藥分捌 萎蕤分捌

扁枚分四 朴硝成捌分湯下 桑寄生分捌 杜衛分六

敗醬分捌 桂心分四 防風

右以水二升煎取八合空腹為三服

瘡產後虛羸方

黃雌雞背上一用一隻 生百合燒三枚 白粳米飯半

右一依尋常暑五味調穰縫背合五味汁煮令熟開腹取

百合并餅相和作羹食之肉亦食冷盡略卧加

瘡產後經兩腸餘血不盡腹痛兼嘔吐不下食方

赤芍藥分十 茅根分八 桃人十四枚去皮尖 知母分八

藿麥 桂心 當歸 生地黃汁合一

紅雪湯四分成下

右以水土升煎取八合分為三服

瘡產後三臈諸疾退後身虛無力方

沢蘭葉用五分熬 黃耆分六 藁木分四 當歸分六

白芷分四 防風分六 芍藥 芎藭分一

桂心分三 柏子人分四 細辛 乾地黃各五分

甘草分四 麥門冬分八 五味子分四 石膏研十分



右為散蜜丸空腹酒下二十九至三十九

產後虛憊盜汗嘔吐方

生地黄汁合三升半

生姜汁合半

藕汁合二

酒合二

右合煎空腹溫服三度

產後下痢為渴方

產後下痢為渴夫水穀之精化為血氣津液以養藏腑藏腑虛躁故痢而渴若引飲則痢難止醜胃水氣脾胃既虛不能飲水水自流溢浸漬皮膚則令人腫但止其渴痢則差必效瘡產後痢而渴飲無度方

麥門冬分十二 烏梅二十枚碎

右以水一升煎取七分細呷之

經效瘡產後久痢津液虛渴不止方

龜骨十二分 厚朴炙

茯苓

黃耆

麥門冬 人參各八分

生姜六分

大棗二十七枚

右以水二大升煎取七合空腹分二服

古今錄驗瘡產後痢日久津液枯渴四肌浮腫口乾方

冬瓜一枚

右以黃土泥裡厚五寸煨令爛熟去土攪取汁服之

產後腰痛方

腎主腰脚產後腰痛者為女人腎位繫於胞產則勞傷腎氣損動胞絡未平復而風冷客之故腰痛痛未已後忽有娠必



致損動何然胞絡屬腎腎者主腰故也方

獨活 芎藭 桂心

續斷 生姜 桑寄生各六分 當歸

防風各八分

右以水三升煎取一升空腹分為二服忌生葱

廣濟瘡產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉方

敗醬 當歸各八分 芎藭 芍藥

桂心各六分

右以水二升煎取八合空腹作二服

產後脹滿痛方

產後兩脇脹滿痛由膀胱宿有停水因產惡露下不盡水壅

痞與氣相傳積在膀胱故令脇肋妨滿氣与水相浸故令痛

也

經効瘡產後血氣脇肋妨脹痛方

當歸十二分 芍藥 桔梗 檳榔

枳殼各八分 桂心 青木香 柴胡各六分

右以水二升煎取八合空腹作二服

又方

取藕汁煎而沸飲二服效

瘡產後惡露下少血氣壅痞脇肋脹痛不下食口乾方

蘇方 紫葛各十分 芍藥 當歸各八分

桂心 蒲黃各六分 生地黄二分



右以水二升煎取七合下蒲黃分為二服差

產後驚悸方

血主心必主血血氣通榮衝腑藏遍脩經絡產皆血氣傷腑藏皆虚心不能統諸藏其榮衛傷不足即令驚悸恍惚心神不定方

伏神

麥門冬

各三兩

當歸

人參

芍藥

酸棗仁

黃芩

白鮮皮

甘草

各二兩

大棗

七枚

右以水二升煎取七合去滓放溫食後分四服

千金治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍惚皆心所致方

茯苓

三分

甘草

桂心

當歸

各一兩

大棗

三十枚

生薑

六分

芍藥

二兩

右以水三升煎取一升食後為二服

題嘗有人傳授經效者方題自曾修合實有大切於人遂刊千卷未普傳天下咸海急乱

治產後血暈血氣并及滯血不散便成癥瘕魚浮面色黃腫嘔逆惡心頭痛目眩口吐清水四胆蕤弱五藏虛怯常日睡多喫食減少漸覺偷瘦年久變為勞疾如此所患偏宜服餌金勝丸方

沃蘭

四分

當歸

芍藥

蕤芩

甘草

芎藭

各三分

石膏

桔梗

細辛

茱萸

柏子人

防風



厚朴 各二分

乾薑

桂心 各二分

烏頭

白微

枳殼

南椒 各二分

白朮

白芷

人參

藁朮

青木香 各一分

金釵石斛

石領

蒲黃

茯苓 各二分

右以二十八味並州土分兩無差搗末煉蜜丸如彈子丸有所患熱酒研一九入口便愈大忌腥膩熱麪豉汁生葱冷水菓子等死胎不下胎衣在腹並已炒鹽酒研服如未退更進一九神効

治產後諸疾散子方

沢蘭 九分

烏頭 炮

白薇 二分

石膏 八分

乾薑

桂心 五分

細辛

卷柏 去土

柏子人

茱萸

防風 去頭

南枳 出汗

厚朴 姜汁炙

茯苓 各四分

白芷

白朮

藁朮

人參

五味子

黃耆

丹參 各三分

芎藭

當歸

無夷

芍藥

甘草 各七分

右為末以新拍罌封勿令失氣每服以熱酒調兩錢匕傳効理產後一切疾黑散子

鯉魚皮 燒皮三兩

沒藥 各一兩

鈺墨

丈夫髮灰 各半兩

芍藥 二兩

桂心

好墨

卷柏

青木香

麝香 各一兩

蒲黃 二兩



右以一十二味並依分兩搗為末以乾垣罌盛密封勿失氣每產後以好酒調一錢七頓喫如血暈衝心下血不盡臍下攪刺疼痛不可忍血塊血僻疾甚日加兩服無效不勒時候便服切忌冷物菓子粘食

傳効妊娠十ヶ月內不安至臨分解並宜服此保命丸方

石斛

貝母

石膏

黃芩

桂心

秦椒

蜀椒

甘草

糯米熬

烏豆卷

大麻人

乾薑炮

蒲黃

當歸

右件藥一十四味並須州土如法修合搗篩為末煉蜜為丸如彈子大如有妊娠諸疾喫食減少及氣喘氣痛面目

痿黃身體羸瘦四肢無力手脚浮腫胎藏不安並以粳湯研一九服氣痛酒研一九空肚服忌腥膩菓子粘食雜肉等



Blank manuscript page with vertical columns.

Blank manuscript page with vertical columns.







