

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TSUNG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

名醫方考

二·之

卷

火
瘡

泄瀉
霍亂

痙攣
痢
秘結

咳嗽
痰

特別

79

458

2

明文武
卷之二
458

醫方考卷之二

火門第八

同上

同上

歙邑 吳 崑 著

方外友蔣中穀 梓

叙曰水火人身之陰陽也。陽常有餘故火證恒多。所謂一水不勝五火是也。人能攝理其火致其冲和則調元之手矣。或者寒涼太過斯又弊焉自古五行以來不可以無火故知滅燼之爲非今考古方二十餘首以治火豈曰滅火云哉。

井花水

水足以濟火故狂燥煩渴火實之證內以水飲之

外以水漬之。此既濟之妙。自宋易以來已有之矣。

甘梨漿

甘梨漿水類也。生之可平六府之陽。熟之可濟五藏之陰。實火宜生。虛火宜熟。

人屎人尿人中白。牛屎猪屎馬通驢子。小便總考。孫思邈千金方。凡療火證熟證率用上件取汁飲之。往往稱其神良荷也。經曰清陽出上竅。濁陰出下竅。屎溺出於二陰。則無分入類物類。皆陰濁也。惟其陰濁故足以制陽光。或者鄙而遠之。夫夫未達醫之妙也。

煉秋石

古昔神良之鑒。但用人尿溺白渣耳。未嘗有用秋石之方也。近時多用之。夫藥有氣有味。有精有魄。秋石既經煎煉。則其氣味已易精華已去。所存者獨枯魄耳。惡能與人尿溺白渣論効功耶。此舉世尚奇之昧也。或用陰秋石者爲近之。

防風通聖散

防風 川芎 川歸 白芍藥 大黃 芒硝
連翹 薄荷 麻黃 石膏 桔梗 黃芩
白朮 楠子 荆芥 滑石 甘草

表裏各熱三焦火實者。此方主之。○麻黃防風疎表藥也。火熱之在表者。得之由汗而泄。大黃芒硝。

醫方考 卷二
攻裏藥也。火熱之在裏者得之由下而泄。荆芥薄
荷清上藥也。火熱之在巔頂者得之由鼻而泄。滑
石梔子清下藥也。火熱之在決瀆者得之由潤而
泄。乃石膏桔梗又所以清肺胃而連喬黃芩。又所
以去諸經之客熱也。火熱灼其血則川芎當歸芍
藥可以養之。火熱壞其氣則白朮甘草可以益之。
導赤散

生地黃 木通去粗皮 甘草稍等分
心熱小便黃赤此方主之。心與小腸爲表裏故
心熱則小腸亦熱而令便赤是方也。生地黃可以
涼心甘草稍可以瀉熱佐之以木通則直走小腸

膀胱矣名曰導赤者導其丙丁之赤由溺而泄也
三黃湯

黃芩

黃連

大黃酒潤各等分

心膈實熱往燥面赤者此方主之。○味之苦者皆
能降火。黃芩味苦而質枯黃連味苦而氣燥。太黃
苦寒而味厚質枯則上浮故能瀉火於膈氣燥則
乾火故能瀉火於心味厚則喜降故能蕩邪。攻實
此天地親上親下之道水流濕火就燥之義也。

龍膽瀉肝湯

柴胡一錢

黃芩七分

五味子

九粒

生甘草

山梔子炒黑

知母去毛

天門冬

去心

麥門冬

去心

黃連炒 人參 龍膽草各五

分

謀慮不決肝熱膽溢口苦熟盛者此方主之○肝主謀慮膽主決斷謀慮則火起於肝不決則火起於膽柴胡性溫味苦而氣薄故入厥陰少陽黃芩黃連龍膽草山梔子得柴胡以君之則入肝膽而平之矣制肝者惟金故用天麥門冬五味知母以益肺畏肝者惟土故用人參甘草以益脾。

左金丸

黃連六兩炒

吳茱萸一兩

湯泡

二共爲末作丸

肝藏火實左脇疼痛者此方主之○左肝也左金者謂金令行左而肝平也黃連乃瀉心之物瀉去

心火不得乘其肺金則清肅之令左行而肝有所制矣吳茱萸味辛熱而氣躁躁則入肝辛熱則疏利乃用之以爲反佐經曰佐以所利和以所宜此之謂也

當歸龍膽草

梔子 黃連

黃柏

黃芩各

木香一錢麝香分

大黃

酒浸青黛

蘆薈各五錢

蜜丸如豆大

風熱蓄積時發驚悸筋惕搐搦嗌塞不利腸胃燥澀狂越等證此方主之○肝火爲風心火爲熱心熱則驚悸肝熱則搐搦嗌塞不利者肺亦火也腸

胃燥澀者脾亦火也。狂越者狂妄而越禮也。經曰
狂言爲失志。又曰腎藏志。如斯言之則腎亦火矣。
此一水不勝五火之謂也。故用黃連以瀉肝。太黃以
瀉脾。黃芩以瀉肺。青黛龍膽蘆薈以瀉心。用黃
柏以瀉腎。所以亟亟以瀉五藏之火者。幾於無水。
故瀉火以存水耳。用當歸者養五藏之陰。於亢火
之時。用木香麝香者利五藏之氣於尅伐之際也。
互考見咳嗽門。

瀉黃散

藿香二錢

山梔炒黑一兩

甘草三兩

防風四兩

石膏五錢

脾家伏火。唇口乾燥者。此方主之。○唇者脾之外
候。只者脾之竅。故唇口乾燥知脾火也。苦能瀉火。
故用山梔。寒能勝熱。故用石膏。香能醒脾。故用藿
香。其能緩脾。故用甘草。用防風者。取其發越脾氣。
而升散其伏火也。或問何以不用黃連。余曰。黃連
苦而燥。此有唇口乾燥則非黃連所宜。故惟梔子
之苦而潤者爲當耳。又問曰。既惡燥。何以不去防
風。余曰。東垣已言之矣。防風乃風藥中之潤劑也。
故昔人審擇而用之。

升陽散火湯

本方去獨活加葱白名火鬱湯

升麻根

葛根

獨活

羌活

人參去蘆

白芍各五錢

柴胡八錢

防風三分錢

生甘草二錢

炙甘草三錢

過食冷物，抑遏少陽之火。鬱於脾部者，此方主之。
○少陽者，三焦與膽也。經曰：少火生氣。丹溪曰：天
非此火，不能生萬物。人非此火，不能以有生。是少
火也。生物之本揚之則光，遏之則滅。今爲飲食墳
塞，至陰抑遏其上行之氣，則生道幾於息矣。故宜
辛溫之劑以舉之。升麻、柴胡、羌活、獨活、防風、乾葛、
皆辛溫上行之物也。故用之以升少陽之氣。清陽
既出，上竅則濁陰自歸，下竅而食物傳化，自無抑
遏之患。芍藥味酸，能瀉土中之木。所宜解也人參味甘，能補

中州之氣。生甘草能瀉鬱火於脾，從而灸之，則健
脾胃而和中矣。東垣氏聖於脾胃者，其治之也必
主於升陽。俗醫知降而不知升，是撲其少火也。安
望其衛生耶！

渴白散

桑白皮

地骨皮各一兩

甘草五錢

肺火爲患，喘滿氣急者，此方主之。○肺苦氣上逆，
故喘滿，上焦有火，故氣急。此丹溪所謂氣有餘便是
火也。桑白皮味甘，而辛，甘能固元氣之不足，辛
能瀉肺氣之有餘。佐以地骨之瀉腎者，實則瀉其
子也。佐以甘草之健脾者，虛則補其母也。此云虛

實者。正氣虛而邪氣實也。又曰。地骨皮之輕可使入肺。生甘草之平可使瀉氣。故名以瀉白。曰肺之色也。

阿膠散

阿膠一兩半 鼠粘子二錢半 馬鳩鈴半兩
蛤粉炒 炒香 雞屎
炙甘草五錢 杏仁去皮尖 糯米一兩
錢 杏仁七箇 糯米一兩

肺虛有火嗽無津液咳而哽氣者此方主之○燥者潤之。今肺虛自燥故潤以阿膠杏仁。金盞則泄之。今肺中鬱火故泄以金盞粘子。土者金之母虛則補其母。故入甘草糯米以補脾益胃。

大補丸

黃柏一斤炮褐色為末水丸氣虛者四君子湯下。

腎火從臍下起者。腎水衰也。此方主之。○腎非獨陰也。命門之火寄焉。腎水一虧則命門之火無所畏而自熾矣。故龍雷之火從臍下動也。經曰水鬱則折之。木鬱者腎部有鬱火也。折之者制其衝逆也。梢皮味苦而厚爲陰中之陰故能制腎經衝逆之火。火去則陰生故曰太補。王水曰壯水之主以制陽光此之謂也。氣虛下以四君子湯恐其寒涼而壞脾也。血虛下以四物湯助其滋陰而制火也。

滋腎丸

黃柏十兩

知母六兩

肉桂五錢

腎火起於湧泉之下者。此方主之。○熱自足心直衝股內而入腹者。謂之腎火。起於湧泉之下。知柏苦寒水之類也。故能滋益腎水。肉桂辛熱火之屬也。故能假之反佐此。易所謂水流濕火乾燥也。

三補丸

黃芩

黃連

黃柏

俱酒潤等分

三焦有火。嗌喉乾燥。小便赤澁。大便秘結。此方主之。○少火之火無物不生。壯火之火無物不耗。內經曰。壯火食氣是也。故少火宜升。壯火宜降。今以三物降其三焦之壯火。則氣得其生。血得其養。而三焦皆受益矣。故曰三補。黃芩苦而枯。故清熱于

上。黃連苦而實。故瀉火于中。黃柏苦而潤。故瀉火于下。雖然火有虛實。是方但可以治實火。若虛者用之。則火反盛。謂降多亡陰也。丹溪曰。虛火可補。人參黃蓍之類。則虛實之辨。若天淵矣。明者求之。證焉。

益元散

卽暑門六一散
又名天水散

滑石

六

甘草

一

共爲末。用蜜水調下三錢。六府有實火。上有煩渴。下有便秘。赤澁者。此方主之。○滑石性寒。故能清六府之熱。甘草性平。故能緩諸火之勢。

涼膈散

黃芩

酒炒

梔子仁

黑炒

薄荷

各一兩

連翹

四兩

大黃

酒浸

芒硝

甘草

各二兩

共爲末

每服五錢

火鬱上焦太熱面赤者。此方主之。○黃芩梔子味苦而無氣。故瀉火于中。連翹薄荷味薄而氣薄。故清熱于上。大黃芒硝鹹寒而味厚。故諸實皆瀉用。甘草者。取其性緩而戀膈也。不作湯液而作散者。取其泥膈而成功于上也。

清咽太平丸

薄荷葉

十兩

川芎

甘草

防風

烏犀角

柿霜

各二兩

桔梗

三兩

蜜丸噙化

膈上有火。早間咯血。兩頰常赤。咽喉不清者。此方主之。○消風清熱莫如薄荷。故用以爲君。佐以烏犀解心熱。也入以柿霜。生津液也。用川芎有清上之功用。防風有解散之効。恐諸藥之下流。故載以舟楫。因火勢之急速。故緩以國老。○師云。咽者膽之候。若只咽間痰熱。膈內和者宜以平膽之方主之。

溫膽湯

竹茹

枳實

炒

半夏

製

甘草

各二兩

陳皮

去白

生薑

各四兩

膽熱。嘔痰氣逆。吐苦夢中驚悸者。此方主之。○膽

甲木也爲陽中之少陽其性以溫爲常候故曰溫
膽竹茹之清所以去熱半夏之辛所以散逆枳實
所以破實陳皮所以消滯生薑所以平呕芽草所
以緩逆○傷寒解後多有此證是方恒用之

珍珠散

琥珀

珍珠粉

鐵粉

天花粉

硃砂

寒水石

牙硝

大黃酒

生甘草各等分爲末每用薄荷湯調下三錢
男婦小兒五藏積熱心胃悶亂口乾舌燥精神恍
惚顛狂等證此方主之○明可以安神琥珀珍珠
皆明物也故用之以安神魄重可以去怯鐵粉硃

砂皆重物也故用之以定驚狂寒可以去熱硝黃
水石皆寒物也故用之以除積熱熱之盛者必渴
天花粉可以生津火之熾者必急生甘草所以緩
急

人參黃蓍白朮甘草考

竈火可濕宜用芩連梔柏治虛火可補宜用人參黃
蓍白朮甘草所謂溫能除太熱也或者誤用芩連
梔柏以治虛火則火益熾何以然哉四件皆降下
之品降多則士陰陰亡則不足以濟火故令火益
熾

天雄附子川烏硫黃考

諸證無火者，宜於四件斟酌之。壯火固不可有，少火亦不可無。所謂天非此火不足以生萬物，人非此火不足以有生故。凡諸證寒涼太過，幾於無陽者，宜審擇而用之。昔人以附子一物爲太陽丹，以天雄附子川烏爲三建湯，以硫黃爲金液丹，皆所以養其真陽，壯其真火，而存此身之生氣耳。明變之士，幸教我哉。

癰瘍門 第九

叙曰：無熱不癰，無濕不瘍。此二言者，癰瘍之大觀也。

也。其致疾之由，則有風寒暑濕之殊，繩證之法，則有表裏虛實之異。此在人之自悟，非可以紙上盡也。

防風通聖散

防風 川芎 當歸 大黃 芒硝 白芍藥
蓮翹 薄荷 麻黃 石膏 桔梗 黃芩

白朮

梔子

荆芥

滑石

甘草

失下，發瘍者，此方主之。失下者，腸胃燥實，當下而失於下也。失下則熱無所泄，而結於胃。胃主肌肉，故肌肉之間見紅瘍也。紅者火之色，熱之熾也。方中有大黃芒硝甘草，乃傷寒門調胃承氣湯也。

所以漏腸胃之實熱，加連翹施子黃芩薄荷乃火門之涼膈散也。所以散督脈之熱邪，全方除芒硝大黃。名曰雙解散，解表有防風麻黃薄荷荆芥川芎，解裏有石膏滑石黃芩梔子連翹復有當歸芍藥以和血，桔梗白朮甘草以調氣，榮衛皆和表裏俱暢故曰雙解散。方名曰通聖散，極言其用之妙也。正考覈中風門。

葛根橘皮湯

葛根 橘皮 杏仁 知母

麻黃 黃芩 甘草

冬月肌中癰爛，咳而心悶者，此方主之。○冬月腠

理閉竅故用麻黃以發表，肌膚陽明故用葛根以解肌，咳為肺氣不利，故用橘皮杏仁以利氣，悶為心膈有熱，故用黃芩知母以清熱，辛甘發散為陽故佐以甘草，且調諸藥而和中也。

陽毒升麻湯

升麻半兩 生犀角（镑） 麻香 黃芩

人參

甘草各二錢

傷寒吐下，後發亡面赤陽毒發癥者，此方主之。○吐下後中氣必虛故用人參甘草以補中升麻犀角寒而不滯故為散癥之要藥，佐以麻香利氣，也佐以黃芩清陽毒也。

玄參升麻湯

玄參

升麻

甘草各等

發癰咽痛者。此方主之。○升麻能散癰，甘草玄參能清咽。散癰者，取其辛溫，謂辛能散而溫不滯也。清咽者，取其甘苦，謂其能緩而苦能降也。

消毒星角飲子

牛蒡子

錢六

荆芥

錢二

防風

錢三

甘草

錢一

皮膚有癰疹無裏證者。此方主之。○辛散發散為陽。故用防風甘草，癰之為患，熱藥治之則血溢而益盛，寒藥治之則血凝而不散。惟辛涼之藥為宜。故用牛蒡荆芥無星角而名星角者，謂其功用同。

升麻葛根湯

升麻

葛根

白芍藥

甘草

癰疹已出未出。此方皆主之。○諸疹未出。升麻葛根能出之。諸疹已出。升麻葛根能散之。方藥和榮甘草和衛。

消風散

荆芥穗

炙甘草

陳皮

厚朴

姜汁炒

藿香

蟬退

人參

白僵蠶

炒

茯苓

防風

芎藭

羌活

風熱丹疹此方主之。○風熱則表實。實者宜散之。

荆芥芎藭防風羌活皆辛散也。表實則裏虛。虛者宜補之。人參甘草茯苓皆甘補也。風盛則氣壅厚朴所以下氣陳藿所以泄氣。風熱生痰治以殼蠶。表熱留連治以蟬退。

化癰湯

石膏

人參

知母

甘草

胃熱發癰。脈虛者此方主之。○胃熱者口燥煩渴也。胃主肌肉。故胃熱則肌肉痪爛。脈虛者壯火食氣而脉無力以充實也。惟其胃熱故用石膏之寒。惟其脉虛故用人參之補。知母養其榮。甘草養其衛。此方卽人參白虎湯爾。

調中湯

蒼朮一錢陳皮

砂仁

藿香

甘草

芍藥

炒

桔梗

半夏

白芷

枳殼

炒

羌活各一錢

分

川芎

麻黃

桂枝各五

內傷外感熱而成癰者此方主之。○內傷則裏熱。外感則表熱。兩熱而無泄故令癰爛。內傷者調其中。蒼朮陳砂藿半錢枳桔皆調中藥也。外感者諫其表。麻桂羌芎芷草皆諫表藥也。表裏治而癰自愈矣。

大建中湯

人參

黃耆

當歸

芍藥

桂心

甘草炙

半夏製

黑附子

裹

中氣不足。無根失守之火。出於肌表。而成瘡者。此方主之。○此是汗吐下後。之證。中氣虛之。則餘邪無所歸附。隱隱然見乎肌表。其色淡紅而不甚顛爲。繙也。人參黃蓍。所以補中。半夏甘草。所以調中。此皆健脾藥也。復有當歸芍藥之活血。則外溢之瘀流而不滯。有桂心附子之溫。則失位之火引而歸原。此中營之幟。一端而失伍之師。各就其列也。是方也。以附桂參芪。而治瘡法之變者也。醫而未至於可以權。則不足以語此。

瘡門

第十

叙曰。瘡之理難言矣。知五運六氣十內經絡。始能粗知其證。知陰陽進退消長之理。然後知夫瘡疾變遷之妙。苟非精研斯道。則所知者膚淺而已。一有問難。猶然袖手解願。今考名方十八首。說證用藥。可爲初學之啓蒙也。

麻黃羌活湯

麻黃去

羌活

防風

甘草各三錢

瘡發時。頭疼。身熱。脊強。脉浮者。名曰寒瘡。此方主之。○寒熱一日一發。間日一發。三日一發。皆名曰瘡。此云頭疼身熱。脊強。脉浮。皆太陽證也。太陽乃

寒水所化。故機要名爲寒瘡。麻黃羌活。太陽經之汗藥也。故以爲君。防風乃諸風藥之卒徒。故以爲佐。甘草能和諸藥而兼解散。故以爲使。是方乃攻實之劑。若臨病用藥。則血虛者宜加四物。氣虛者宜加參术。全在活法。不徒執也。

白芷湯

白芷二錢

知母

石膏各五錢

瘡發時。目痛。鼻乾。口渴。自汗。不得眠。脈長有熱無寒。或熱多寒少者。名曰熱瘡。此方主之。○此條皆陽明證也。以其有熱而無寒。或熱多而寒少。故機要名爲熱瘡。白芷所以解陽明之經。石膏所以清

陽明之府。知母所以養陽明之陰。虛者宜加人參。質實便燥者。此方不足與也。宜下之。用傷寒門。木柴胡湯。後以本方調之。

小柴胡湯

柴胡去蘿

黃芩一錢

人參

甘草

半夏去皮

生薑

大棗

瘡發時。耳聾脇痛。寒熱往來。口苦喜嘔。脉弦。尤著名曰風瘡。此方主之。○此條皆少陽證也。以少陽爲甲木。在天爲風。故機要名爲風瘡。柴胡黃芩能和解少陽經之邪。半夏生薑能散少陽經之嘔。人參甘草能補中氣之虛。補中所以防邪之入裏也。正

考見傷寒門

清脾飲

青皮去穰炒 厚朴姜炒 白术炒 黄芩炒 半夏製
柴胡去蘿 茯苓去皮 草菴 甘草

瘡發時熱多寒少口苦咽乾不小赤瀉脉來弦數者此方主之○此條皆太陰證也太陰脾主濕濕生痰癥生熱故見上件諸證脉來弦數弦爲痰飲數爲熱也方曰清脾者非清涼之謂乃致去其邪而脾部爲之一清也故青皮厚朴清去脾部之痰半夏茯苓清去脾中之濕柴胡黃芩清去脾中之熱白朮甘草清去脾藏之虛而草菴仁又所以清

膏梁之痰也劉宗厚先生因草菴仁之溫熱而譏焉蓋未達嚴用和氏之清矣機要云瘡在三陰經總謂之濕瘡當從太陰經論之此言可謂知要今卽古方審擇而用焉則本方爲切當矣

麻黃杏子甘草石膏湯

麻黃去節四兩 杏仁去皮尖五十枚 甘草二兩 石膏半斤

傷寒例云若脉陰陽俱盛重感於寒者變爲溫瘡溫瘡先熱後寒宜此方主之○脉陰陽俱盛者舊有熱也重感於寒者新有寒也凡瘡寒熱相搏邪正分爭併於表則陽實而陰虛陰虛生內熱陽實生外熱中外皆熱故見其煩渴而身熱惡熱莫住

也併於裏則陰實而陽虛。陽虛生外寒。陰實生內寒。中外皆寒故見其鼓額而戰慄。惡寒莫任也。若其邪正分爭併之未盡。則寒熱交集。鼓額戰慄。煩渴身熱竝至矣。此論常瘡寒熱之理也。溫瘡先熱後瘡者以其先有瘡熱而後傷寒也。方中有麻黃杏仁可以解重感之寒。石膏甘草可以解舊有之熱。仲景主白虎加桂枝湯亦良。

香薷湯

香薷兩

白朮三

厚朴姜片

茯神各一

炙甘草半兩

瘡發時獨熱無寒者名曰瘡瘍當責之暑宜此方

主之。○暑陽邪也。內經曰。脉虛身熱得之。傷暑又曰。因於暑。汗煩則喘喝。靜則多言。體若燔炭。故獨熱無寒之瘡責其因於暑也。香薷味薄而氣清能解表裏之暑。虛正味甘而性平。能解腸胃之暑。厚朴苦辛破暑飲也。甘草性平解暑藥也。易曰。火乾燥則暑邪中人。先就於心。從神之用乃所以寧心耳。或問風亦陽邪也。瘡瘍何以不責之。風余曰。風爲少陽又爲厥陰。在六氣猶未純陽。若臨證主方。燮治辛熱固不可用。如辛涼發散之劑用之未爲不可。此在鑒者潛心初不必泥於一方也。

七味湯

附子一枚

鹽水煮去皮臍

大棗七枚

瘡發時獨寒無熱脉遲者名曰牝瘡當責之寒宜此方主之○牝陰也王水曰益火之原以消陰翳故獨寒無熱之瘡用附子之辛以主之佐以大棗七枚取其能和附熱且引之入至陰耳

蜀漆散

蜀漆

燒去腥

雲母

燒去日夜

龍骨

煅各等分

共爲末於未發前漿水服下半錢

此仲景治牝瘡之方也病原於頑痰癥瘕者此方主之○牝陰也無陽之名頑痰乃至陰所化癰瘕乃凝結之陰故令人有寒無熱蜀漆雲母龍骨既

經燒燥則味澁而辛熱味澁可以固既脫之陽辛熱可以消固結之陰仲景治火劫亡陽之證於桂枝湯去芍藥加蜀漆龍骨輩名曰救逆湯是二物之爲純陽可知雲母燒一百夜則寒性亦去而純陽矣宜仲景之用之也

補中益氣湯

人參一錢

升麻三分

甘草一錢

黃耆五分

陳皮去白

當歸

白朮

柴胡各五分

瘡疾經年不愈者名曰瘻瘡宜此方主之○瘻老也經年不愈則氣血皆虛瘡邪深入矣氣虛則有參耆木草以補氣血虛則有當歸以養血瘡邪深

入則有柴胡升麻以升舉之邪氣可漸出之表也。方內有陳皮可以消痰泄氣能助升柴而成功。若瘡發於夜者丹溪所謂入陰分血分也宜於本方倍入當歸或兼四物可也正考見脾胃門互考見虛損門。

柴胡去半夏加桔梗根湯

柴胡八兩 人參 黃芩 甘草各三

桔梗根四兩

生薑二兩

大棗十二枚

瘡疾微勞不往經年不差前後復發者名曰勞瘡此方主之○任事之勞責之筋力筋屬肝少陽膽則其府也方中有柴胡黃芩可以清少陽之邪熱

有桔梗根可以生液養筋有人參甘草可以補虛祛勞有木棗生薑可以調榮益胃又曰參草薑棗胃家藥也散精於肝滻氣於筋惟胃能之故用此方以調勞瘡

柴平湯

柴胡 人參 半夏 陳皮 黃芩 甘草

厚朴

蒼朮

生薑

大棗

瘡發時一身盡痛手足沉重寒多熱少脉濡者名曰濕瘡此方主之○上件皆濕證也故用小柴胡以和解表裏平胃散以健脾制濕一方合而爲一故名曰柴平小柴胡湯正考見傷寒門平胃散正

考見濕門

紅丸子

蓬莪术

京三稜

醋煮一伏時各二兩

胡椒

阿魏

一分醋化青皮

三分兩共爲末作丸

繫紅爲衣

瘡疾口亡五味飲食腹痛脹者名曰食瘡此方主之○食瘡者食積成瘡也。內經曰留者攻之故用蓬木三稜阿魏以攻積積之爲憲氣快則行氣滯則止得熱則行得寒則結故用青皮之辛以快氣胡椒之陽以散結復用繫紅爲衣者假其上性以培脾胃云爾。

人參養胃湯

人參

茯苓

甘草

半夏

陳皮

蒼朮

厚朴

藿香

烏梅

草菴

瘡因飲食飢飽傷胃而成者名曰胃瘡此方主之○內經曰陰之所生本在五味陰之五官傷在五味故飢則胃氣弱而陰無所生飽則胃氣強而五官因以損是飢飽皆足以傷胃也胃傷則榮衛虛而穀氣耗耗則爭爭則邪正分寒熱作而成瘡矣方中有人參茯苓甘草之甘可以補胃之不足有陳皮蒼朮厚朴之辛可以平胃之有餘半夏之辛可使醒脾藿香之香可使開胃烏梅之酸可使收陰草菴之溫可使消滯○陰草菴之溫可使消滯。

太無神木散

蒼术再浸

厚朴

姜炒各一兩

陳皮

二兩

藿香

石菖蒲

甘草

炙各一兩五錢

瘧疾因感山嵐瘴氣發時乍寒乍熱一身沈重者名曰瘧瘧此方主之○山嵐瘴氣谷氣也內經曰谷氣通於脾故此方主於治脾蒼木厚木平脾家之敦阜也陳皮甘草調脾家之虛實也藿香石菖蒲開脾家之障礙也經曰治病必求其本此之謂也正考見瘧瘧門

五神丸塞鼻法

東方青黛五錢

麝香二分

西方白礬五錢

白芷二錢

南方官桂五錢

硃砂一錢

北方巴豆四十九粒

黑豆三十六粒

中央硫黃五錢

雄黃一錢

上件各依方位以磁盤盛之於五月初十日處誠安於本家侍奉神前至初五日午時共研爲末用五家粽角爲丸如梧桐子大陰乾收貯應用凡遇患瘧之人於瘧發之日侵晨用錦包裹塞於鼻中男左女右用之

瘧疾一歲之中長幼相似者名曰疫瘧此法主之神良○疫者天地不正之氣也六位勝復之氣也

禽蟲吐毒之氣也。太氣之來，無人不受。壯者逸者居者則不病。怯者勞者出者遇之，則無形之氣由鼻而入藏於分肉之間，與正氣分爭，則成瘡矣。是方也。位按五方藥按五色氣按五氣味按五味月按五月日按五日粽用五家此醫流而兼陰陽家之識也。故瘡邪入於肝，則青黛之涼可以清肝。麝香之臊可使直達。瘡邪入於肺，則白芷之辛可以瀉肺。礬石之腥可以清燥。瘡邪干於心，則丹砂之重可以鎮心。官桂之焦可以益火。瘡邪干於腎，則黑豆甘鹹可以益腎。巴豆之腐可以瀉邪。瘡邪干於脾，則硫黃之溫可以使建中。雄黃之悍可以使辟穀。

以疫氣無形，由鼻而入，故亦就鼻而塞之。塞其一竅，露其一竅者，圍師必缺之道也。修創之期，必於五者病原，於陰陽不正之氣，故亦以陰陽之理勝之。蓋曰：五者中官甲乙之數，南面之政也。諸氣之變，雖有勝復亢制之殊，要皆北面而臣守位，秉命之道也。故率以五數修創焉。

三解湯

麻黃去

節

柴胡去

蘆

澤鴻臚各三

此治瘡之套餐也。時行之瘡長幼相似者主之，神良。○病有三在表，在裏，在半表半裏也。人在氣交之中，鼻受無形之氣，藏於分肉之間，邪正分爭

併於表則在表。併於裏則在裏。未有所併則在半表半裏是方也。麻黃之辛能散表邪。由汗而泄。澤渴之鹹能引裏邪。由瀉而泄。柴胡之溫能使半表半裏之邪由中以解。則病之三在此方率治之矣。雖然。此方但可以瀉實耳。虛者猶當辯其氣血而補之。所謂虛者十補勿一瀉也。

截瘡七寶飲

常山 厚朴 青皮 陳皮 甘草 檳榔

草菴等分

先期用酒各一鍾煎熟。以絲綿裹之。露一宿於當發之早溫服。

瘡疾三四四發後寸口脈來弦滑浮大者。此方吐之。
○三四發後可截之時也。脉弦爲飲滑爲實。浮爲
表大爲陽。故在可吐。師云無痰不作瘡瘍。痰爲惡。
常山善吐。檳榔善墜。草菴善消。厚朴青皮亦理氣
行痰之要藥。陳皮甘草乃消痰調胃之上材也。是
方也。惟脉來浮大弦滑者可用。若脉來沈澁細微
者與之。則逆矣。慎之。

鱉甲煎丸

鱉甲片十三分 蜂窠灸四分 蟠螭灸六分 柴胡各六分
烏羽 瞿麥 桃仁 乾薑各二分
牡丹皮 芍藥 蘀蟲各五分 赤消十二分

黃芩 鼠婦灸 桂枝 石葦去毛

厚朴

紫盛

阿膠炒

大黃各三

夢蘆熟

半夏

人參各一

右二十三味取服竈下灰一斗清酒一斛五斗
浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠
漆絞取汁內諸藥煎爲丸如梧子大空心服七
丸日三

瘡疾久不愈內結癥瘕欲成勞瘵者名曰瘡母此
九主之○凡瘡疾寒熱皆是邪氣與正氣分爭久
之不愈則邪正之氣結而不散按之有形名曰瘡
母始雖邪正二氣及其固結之久則頑痰死血皆

有之矣然其爲患或在腸胃之中或薄腸胃之外
不易致去仲景公先取灰酒便是妙處蓋灰從火
化能消萬物今人取十灰膏以作爛藥其性可知
潰之以酒取其善行若鱉甲鼠婦蠻蟲蟻蜂蜂窠
者皆善攻結而有小毒以其爲血氣之屬用之以
攻血氣之凝結同氣相求功成易耳乃柴胡厚
朴半夏皆所以散結氣而桂枝丹皮桃仁皆所以
破滯血水穀之氣結則太黃夢蘆石韋瞿麥可以
平之寒熱之氣交則乾薑黃芩可以調之人參者
所以固元以尅伐之場阿膠芍藥者所以養陰於
峻厲之隊也烏羽赤消紫盛隋唐醫哲皆不知之

故以烏羽作烏扇。赤消更海藻繁盛，更紫葳繁茂。
今詳四物亦皆攻頑散結之品，更之未爲不可。然
依舊本仍錄烏羽赤消紫葳者，不欲遽然去之，蓋
曰愛禮存羊云爾。

痢門 第十

叙曰：始痢宜下，夫人之所共知也。久痢宜補，亦夫
人之所共知也。至如二陽合病，皆下痢。太陽陽明
合病自下痢者宜發汗。太陽少陽合病自下痢者
宜和解。陽明少陽合病自下痢者宜攻裏。非得傷

寒之玄關者不足以語此也。今考十方于後，大都
口耳之見而已。

芍藥湯加芒硝方

白芍藥錢二分 當歸尾 黃連 黃芩各一
木香火分 不見 桂心 檳榔 甘草各五分

大黃七分

芒硝一錢

痢疾便膿血，裏急後重者，此方主之。○荆滯下也，
患痢大都責於濕熱。熱傷氣，故下白。熱傷血，故下
赤。熟傷大腸，則大腸燥澀，故裏急後重。河間云：行
血則便膿自愈。故用歸芍硝黃以行血，和氣則後
重自除。故用木香檳榔甘草以和氣，苦能堅腸，寒

能勝熱故用芩連厚腸胃而去熱有假其氣則無
禁也。故假桂心之辛熱爲反佐。

桃仁承氣湯

桃仁生五枚去皮尖

桂枝分

大黃酒五錢

芒硝五錢

甘草二錢

痢疾初起質實者此方主之若初間失下反用固澁之藥以致邪熱內蓄血不得行腹痛欲死者急以此方主之○內經曰通因通用又曰暴者奪之故用大黃芒硝之鹹寒以蕩滌邪熱用桃仁之苦以逐敗血甘草之甘以調胃氣乃桂枝則辛熱物也用之者何經曰微者逆之甚者從之故用其引正治人則安治從治

清六丸

太黃芒硝直達瘀熱之巢穴乃向導之兵也。

滑石六兩

甘草一兩

紅麴五錢

血痢者此方主之○滑石能清六府之熱甘草能調六府之氣紅麴能和六府之血。

溫六丸

滑石六兩

甘草一兩

乾薑五錢

薑汁爲丸

白薑者此方主之○白薑爲寒中丸之謬論也劉守真氏出始以白薑責之熱傷氣可謂開發群蒙是方也滑石寒而淡寒則能除六府之熱淡則能利六府之濕甘草得天地冲和之氣故性平而調

六府乾薑得天地正義之氣，故入氣而辟濕邪。又曰：乾薑性溫，可使從治經曰：佐以所利，是故用之。

香連丸

黃連二十兩吳茱萸

木香四兩八錢

治噤口痢，加石蓮肉八兩。

下痢赤白相雜，裏急後重者，此方主之。○黃連苦而燥，苦能勝熱，燥能勝濕。木香辛而苦，辛能開滯，苦能濕實。石蓮肉味苦而厚，爲陰中之陰，故能破噤口痢之結熱。紅曰：有餘者折之，此之謂也。

木香檳榔丸

木香 檳榔

青皮去穰陳皮去

枳殼去穰炒

黃柏炒丑末 羌活煮
香附 黃芩酒大黃酒
水丸 楮子大每服五六十九

痢疾初作，裏急後重，腸胃中有積滯者，此丸主之。○內經曰：濕澀所勝，平之以苦熱。故用木香，熱者寒之。故用黃連、黃芩、黃柏。抑者散之，故用青皮、陳皮、附子。強者渴之，故用大黃、丑末。逸者行之，故用檳榔、枳殼。留者攻之，故用莪术三棱。燥者濡之，故用當歸。是方也。惟質實者堪與之。虛者非所宜也。故曰：虛者十補勿一瀉之。

敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 人參

茯苓 枳殼 桔梗 甘草等分

痢疾表熱裏虛者。此方主之。○皮膚受外感之邪，則表實而裏虛。表實則發熱，故用羌活獨活柴胡前胡川芎以解表裏虛。則痢不禁，故用人參甘草茯苓以補裏。桔梗可以理氣。枳殼可以破滯。昔人立此方，非以治痢，而醫者善用，則取之左右逢其源矣。仲景以葛根湯治太陽陽明合病，自利亦是妙處。舉此一例，餘可類推。

清暑益氣湯

人參去蘿 白朮炒 陳皮去白 神麴炒

澤鴻各五 黃蓍炙 菖蒲製 牛麻錢各一
麥門冬去心 當歸酒洗 黃柏炒 甘草炙各三

五味子九粒 青皮炒 乾葛分各二

痢疾已愈，中氣虛弱，暑令尚在者。此方主之。○痢疾已愈，則不復用行血理氣之物矣。中氣虛弱，理宜補之。參芪歸朮甘草皆補虛也。暑令尚在，法宜清之。麥冬五味皆清藥也。黃柏澤鴻可以養陰水。升麻乾葛可以散暑邪。青陳蒼麵可以消滯氣。正考覓暑門。

十全大補湯

人參 白朮炒 白芍藥炒 茯苓去皮 黃蓍炙

當歸 甘草 炙熟地黃 川芎 各一錢 桂心二分
痢疾已愈。氣血大虛者。此方主之。○太虛者必太
補。故用人參黃蓍白朮茯苓甘草以補氣。用當歸
川芎芍藥地黃桂心以補血。

真人養藏湯

人參 白朮 炒白芍藥 炒肉桂 炒河子 炒墨
粟殼 茯草 炒木香 不見 肉豆蔻 炒煨
下痢日久。赤白已盡虛寒脫肛者。此方主之。○甘
可以補虛。故用人參白朮茯草溫可以養藏。故用
肉桂豆蔻木香酸可以收斂。故用芍藥澁可以固
脫。故用粟殼河子是方也。但可以治虛寒氣弱之

脫肛耳。若大便燥結。努力脫肛者則屬熱而非寒
矣。此方不中與也。與之則病益甚。

泄瀉門 第十

叙曰。泄瀉似乎易識。一遇盤根錯節。良手猶難之。
所以然者。脾爲萬物之母。泄瀉能壞人之母氣故
也。今考名方十五首。用之者宜變通焉。

白朮茯苓湯

白朮土

白茯苓去皮各七錢五分

脾胃虛弱。不能剋制水穀。濕盛作瀉者。此方主之。

○脾胃皆土也。土虛則不能四布津液。水穀常留於胃而生濕矣。經曰：濕盛則濡瀉。故知水瀉之疾原於濕也。白朮甘溫而燥，其則入脾燥則勝。濕蒸芩其溫而淡溫，則益脾。淡則滲濕土旺，濕衰瀉斯止矣。戴氏云：水瀉腹不痛者爲濕，痛者爲食積。河間云瀉而水穀變色者爲熱。水穀不變色，澄澈清冷者爲寒。皆妙論也。若肛門燥澁，小便黃赤，則水穀雖不變，猶爲熱也。此由火性急速，食下即出無窮，變化仲景所謂邪熱不殺穀是也。茲在臨證精察，而加藥物之所宜者爾。

胃苓湯

蒼术 厚朴 陳皮 甘草 白朮 茯苓

猪苓 澤瀉 桂

此方亦治濕盛瀉者也。○蒼术厚朴陳皮甘草平胃散也。所以燥濕白朮茯苓猪苓澤瀉桂，五苓散也。所以利濕脾胃強健者宜主此方。怯弱者宜王前方。白朮茯苓湯平胃散正考覈濕門。五苓散正考覈傷寒門。

益黃散

丁香

木香

青皮

陳皮

訶子

細裹

胃寒泄瀉脉遲者此方主之。○腸胃熱則大便燥結，腸胃寒則洞泄不禁。大都然也。脉遲驗其為寒。

是方也。二香之辛熱所以溫中，二皮之辛利所以快脾，訶子之固澁所以止瀉。

升陽除濕防風湯

蒼术四錢 製防風二錢

白术

茯苓

芍藥各一錢

泄瀉頭痛者此方主之。○陽陷于下則成飧泄，濕犯于上則令頭痛。此清濁倒置而然也。風能勝濕，故用防風燥能制濕。故用二术淡能利濕，故用茯苓土病木乘，故用芍藥。又曰：冬風入中，則爲腸風飧泄，故用防風伐肝，疎脾非酸不可。故用芍藥。

錢氏白术散

人參 白术 茯苓 甘草 木香 藿香

乾葛

脾虛肌熱泄瀉者此方主之。○脾虛者補之以甘，故用人參白术茯苓甘草，肌熱者療之以清，故解以葛根。脾困者醒之以香，故佐以藿木。

戊巳丸

黃連附

吳茱萸泡

白芍藥炒各二兩

脾胃熱渴不止者此方主之。○熱渴者黃色黃褐，肛門斂澁也。苦從火化火能生土，故用黃連厚腸胃，而益土脾，酸從木化木能疎土。故茱萸辛臊能疎尤盛之肝，芍藥味酸能瀉土中之木。戊爲胃土，已爲脾土。用是方以調脾胃故曰戊巳丸。

詞梨勒散

詞子仁

肉豆蔻
蜜

青皮各四兩

附子一兩

內桂五錢

腸胃虛寒。滑泄腹痛者。此方主之。○虛寒者中氣虛而生內寒也。滑泄者土虛不足以防水也。腹痛者濕溼而木氣抑也。寒者溫之。故用附子肉桂。滑者瀉之。故用詞子。肉蔻。抑者疏之。故用青皮。

漿水散

半夏一兩

製

良薑

二錢

附子

肉桂

乾薑

各五錢

水瀉澄澈清冷者。此方主之。○漿水者瀉利漿水。

而澄澈也。洵間云。水液澄澈清冷皆屬於寒寒者溫之。故是方率用辛溫之劑。折而論之。半夏炙草可使健脾。脾健則能防水矣。乾薑附子可使回陽。陽回則氣上升矣。良薑肉桂可使化氣氣化則能必別清濁矣。

劉草窓痛瀉要方

炒白朮三兩

炒芍藥二兩

防風一兩

炒陳皮一兩

半

痛瀉不止者。此方主之。○瀉責之。脾痛。責之肝。肝責之。實脾。責之虛脾。虛肝實。故令痛瀉。是方也。炒朮所以健脾。炒芍所以瀉肝。炒陳所以醒脾。防風

所以散肝，或問痛瀉，何以不責之？傷食余曰：傷食腹痛得瀉便減。今瀉而痛不止，故責之土敗木賊也。

五味子散

五味子炒香二兩吳茱萸炮一錢共爲末每服二錢。賢虛子後泄瀉者此方主之。○腎主二便，開竅於二陰，受時於亥子，腎藏虛衰，故令子後常作泄瀉。五味子有酸收固澁之性。炒焦則益命門，命門火旺，可以有溫中煖下之能。炒香則益腸胃。吳茱萸生土，土生金，則泄瀉自止。酸收固澆可以生津，津生則腎液不虛。

椒附丸

椒紅
桑螵蛸炙
山茱萸炒附子泡
鹿茸酒蒸

腎藏虛寒太便滑瀉者此方主之。○虛者腎精不足也。寒者命門火衰也。腎主二便，腎藏虛寒，則不能禁固。故令太便滑瀉。味厚爲陰中之陰。故用山茱萸鹿茸以益腎家之陰。辛熱爲陽中之陽。故用椒紅附子以壯命門之火。味澁可以固脫。故用螵蛸龍骨以治滑瀉之脫。

二神丸

破故紙四兩
肉豆蔻二兩
棗肉爲丸

脾腎二藏俱虛泄瀉不止者此方主之○脾主水
穀腎主二便脾弱則不能消磨水穀腎虛則不能
禁固二便故令泄瀉不止肉豆蔻辛溫而澀溫能
益脾滋能止瀉破故紙味辛而溫辛則散邪溫則
煖腎脾腎不虛不寒則泄瀉止矣

補中益氣湯去當歸方

人參

甘草炙各一錢

升麻三

黃耆炙五分一錢

白朮炒

陳皮去白

柴胡各五分

滑瀉痞悶者此方主之○內經曰清氣在下則生
飧泄濁氣在上則生腹脹病由中氣不足而不能
升清降濁故耳是方也有人參黃耆甘草白朮所
宜也若西北高燥之區則不必去矣

以補中陳皮所以利氣有柴胡升麻所以升舉
陷下之陽清陽升則濁陰自降濁降則痞悶自除
清升則飧泄自止夫當歸者惡其滑利而非飧泄
所宜也若西北高燥之區則不必去矣

青州白丸子

半夏七兩

南星

白附子各三兩

川烏去皮臘五錢

共爲末水中浸數日爲丸
癰積滑泄不止者此方主之○肥人滑泄責之瘦
人膚滑不調責之瘦不食不肌責之癰昔肥人瘦責
之癰瘦之爲物濕土所化故用半夏南星以燥之
白附微溫能治風痰川烏辛熱能攻瘀積

~~不香豆蔻丸~~

青木香

肉豆蔻

棗肉爲丸每下梧子大二十九

稽神錄云。江南司農少卿崔萬安常苦脾泄。困甚。家人爲之禱于后土祠。萬安夢一婦人簪珥珠履。授以此方。如其言服之而愈。此謂青木香能伐肝。肉豆蔻能溫中。棗肉能健脾。久泄脾虛中氣必寒。肝木必乘其虛而剋制之。此方之用宜其効也。

秘結門

第十

叙曰。秘結燥證也。然有火燥。有風燥。有水竭之燥。有血虛之燥。從容養血。清燥爲上。手急遽攻下。通腸爲下。手平考方藥六條。古人之醫法見矣。

潤腸丸卽脾約丸

麻仁十兩入百沸湯內泡浸一宿。大黃四兩。
次日曝乾。礪之粒粒皆完。大黃酒蒸。
杏仁一兩二錢去皮尖炒芍藥酒。枳實炒厚朴姜汁炒各三兩。
胃強脾弱不能因布津液濡潤太腸後便燥結者。此方主之。潤可以去燥。麻仁杏仁是也。苦可以勝燥。枳實厚朴大黃是也。

潤燥湯

熟地黃

當歸稍

大黃酒浸

桃仁去皮尖

生甘草

麻仁各一錢

紅花五分

生地黃

升麻各二分

太腸燥結便出堅黑者此方主之。○太腸得血則潤亡血則燥故用熟地當歸以養血初燥動血久燥血瘀故用桃仁紅花以去瘀麻仁所以潤腸太黃所以通燥血熱則涼以生地黃氣熱則涼以生甘草微入升麻消風熱也。

通幽湯

生地黃

熟地黃

當歸稍

大黃酒浸

桃仁泥

紅花

升麻

結燥腹痛者此方主之。○此節前方潤燥湯去生甘草麻仁也。胃之下口名曰幽門此方服之可以通其留滯故曰通幽太便燥結升降不通故令腹痛燥者濡之生地熟地皆濡物也逸者行之大黃歸稍皆行物也留者攻之桃仁紅花皆攻物也抑者散之升麻之用散抑鬱也。

大補丸

黃柏一味炒褐色爲末爲丸

太便燥結睡中口渴者此方主之。○腎主五液腎水一虧則五液皆涸故上見口渴下見燥結也黃柏味苦而厚質潤而濡爲陰中之陰故能滋少陰

補腎水。此經所謂燥者濡之。又謂之滋其化源也。
他如六味地黃丸。虎潛丸。皆益腎之藥。均可選用。
二方見虛損門。

玄明粉散

玄明粉三錢 當歸尾五錢 煎湯調服
血熱便祕者。此方主之。○玄明粉鹹寒。取其軟堅。
當歸尾辛利。取其破血。此攻下之劑也。宜量人之
虛實而用之。

導法

燥在廣腸。欲其速出。氣弱不能傳送。而出者宜用
蜜棗導法。或猪膽導法。皆見傷寒門。

霍亂門

第十

叙曰。霍亂有陰陽二證。夫人共知之。若霍亂未顯
之時。及霍亂始定之際。醫者不察。而以逆劑。左之。
病者不識。而以膩食啖之。則死道也。今考古方八
首。以治霍亂。大都喜通而惡塞爾。

理中丸

人參 白朮

炒 乾薑

炒 甘草

炙各二兩

共爲末。蜜丸如雞黃。大每服一丸。沸湯和下。
寒犯太陰。腹痛吐瀉。霍亂寒多。不飲水者。此方主
之。○寒犯太陰。脾藏非止。外感之寒徑中太陰。凡
吞寒飲冷。皆是寒氣塞于中宮。中下二焦之陽不

得宣發則班隔而腹痛而吐瀉而霍亂也。霍亂與
吐瀉有別乃吐瀉之久其津液不足抽掣而揮
霍眼自旋視而瞭亂也。寒者溫之故用乾薑之辛
熱邪之湊也。其氣必虛故用人參白朮甘草之溫
補。

五苓散

茯苓 猪苓 白朮各八錢澤瀉一兩半桂半兩
霍亂熱多欲飲水者陽邪也此方主之○邪在上
焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉名
曰霍亂霍亂責之裏邪裏邪責之水穀是方也桂
能建中木能安穀茯苓猪苓澤瀉能安水水穀得

其安則霍亂自止矣此五苓治霍亂之意也正考
見傷寒門。

回生散

陳皮四錢

藿香各五錢爲末

中氣不和吐瀉霍亂者此方主之○中氣者脾氣
也喜疏利而惡閉塞喜香竄而惡腐穢故用陳皮
之辛以醒之藿香之竄以開之。

冷香飲子

草菜仁三兩

附子一兩

橘紅一兩

甘草五錢

薑煎冷服

夏月飲食雜以冰菓寒水之物食之脅腹大痛霍

亂者。此方主之。○肉食得水寒水菴而冷冰寒水
菴因肉食而滯。由是填塞至陰。班蘭而成霍亂。草
莫辛溫善消肉食。附子辛熱能散沈寒。橘紅之辛
可調中氣。甘草之溫堪以益脾。而必冷服者。假其
冷以從治內經所謂必伏其所生而先其所因也。

華陀危病方

吳茱萸

木瓜

食鹽各一

夏月過用。水菴填塞至陰。抑遏肝氣。霍亂轉筋者。
此方主之。○水菴得食鹽則收斂而不爲患。肝部
得茱萸則疏利而不爲抑。轉筋得木瓜則筋舒而
不復痛。

六和湯

砂仁 半夏 杏仁 人參 甘草各一

厚朴 木瓜 蕤香 白朮 白蘆豆

赤茯苓各二

夏月飲食後。六府不和霍亂轉筋者。此方主之。○
六和者。和六府也。飲食爲患。和以砂仁。夾涎。吐逆。
和以半夏。膈氣不利。和以杏仁。胃虛不調。和以參。
木中氣不快。和以藿香。伏暑傷脾。和以蘆朴。轉筋
爲患。和以木瓜。三焦畜熱。和以赤苓。氣逆急吐。和
以甘草。正考覈暑門。

藿香正氣散

藿香
三錢

白朮
炒

厚朴
姜湯

茯苓

紫蘇

半夏
製

大腹皮
淨

桔梗

陳皮去白

甘草
炙

白芷
各一錢

內傷外感而成霍亂者此方主之。○內傷者調其
中藿香。白朮。茯苓。陳皮。甘草。半夏。厚朴。桔梗。大腹
皮皆調中藥也。調中則能正氣于內。外感者疏
其表。紫蘇。白芷。疏表藥也。疏表則能正氣于外矣。
若使表無風寒。二物亦能發越脾氣。故曰正氣。

二因吐法

燒鹽
十兩

熱飲升十五

三飲而三吐之

欲吐不得吐。欲瀉不得瀉。腹中大痛者。名曰乾霍

亂冷入暴死急以此方探吐之。○鹽鹹物也。多則
苦矣。經曰鹹能軟堅。故可以開宿食頑痰。若能瀉
泄。故探之則易吐矣。此法能回生起死垂勿輕而
忽之。

瘧門
第十

叙曰。瘧證顯於外。夫人之所易知也。瘧涎隱於內
而怪證百出。夫人之所難知也。顯於外者只依常
法調理而治。隱於內者非控涎丹。神祐丸。與夫倒
倉之法不能空其巢穴也。今考古方十十首以治

醫方考卷二
痰變而通之存乎人耳。

二陳湯

半夏製

陳皮去

茯苓去皮各

甘草炙七分

濕痰爲患此方主之。○濕痰者痰之原生于濕也。水飲入胃無非濕化脾弱不能剋制停于膈間中下二焦之氣薰蒸稠粘稀則曰飲稠則曰痰痰主於濕故曰濕痰也是方也半夏辛熟能燥濕茯苓甘淡能滲濕去則痰無由以生所謂治病必求其本也。陳皮辛溫能利氣甘草甘平能益脾益脾則土足以制濕利氣則痰無能留滯益脾治其本

利氣治其標也又曰有痰而渴半夏非宜宜去半夏之燥而易貝母括萎之潤余曰尤有訣焉渴而喜飲水者宜易之渴而不能飲水者雖渴猶宜半夏也此濕爲本熱爲標故見口渴所謂濕極而兼勝色之化實非真像也惟明者知之氣弱加入參白朮名六君子湯。

千絛湯

半夏七

皂角一寸

甘草一寸

痰涎上湧喉中有聲不渴者此方主之○濕止生痰故用半夏以燥濕氣塞則痰滯故用皂角以利氣肺苦氣上逆故用甘草以緩急又甘草能益脾

皂角能去垢。半夏能破逆。曰。千縕者重其効也。

導痰湯

半夏四錢

陳皮去

枳殼炒

膽南星

赤茯苓

炙甘草各

風痰湧盛者此方主之○風痰者濕土生痰痰生熟。熟生風也半夏陳皮茯苓甘草前之一陳湯耳。加南星以治風痰入枳殼去痰如倒壁。

九蒸蒼朮散。

蒼朮

一朱九蒸九曬爲極細末每服漿水調下一錢

濕痰腹痛者此方主之○濕痰腹痛是土實也經曰土欲實木當平之蒼朮九蒸九曬則其氣輕清。

三子養親湯

而薄風木勝濕之品也。故治濕痰腹痛神良。

紫蘇子者洗水

白芥子

蘿蔔子各三錢

年高痰盛氣實者此方主之○痰不自動也因氣而動故氣上則痰上氣下則痰下氣行則痰行氣滯則痰滯是方也。蘿蔔子能耗氣蘇子能降氣芥子能利氣氣耗則邪不實氣降則痰不逆氣利則膈自寬矣痰患之有飛霞子此方爲人子事親者設也。雖然治痰先理氣此治標之論耳終不若二陳有健脾去濕治本之妙也但氣實之證則養親湯亦徑捷之方矣。

潤下丸

陳皮二斤去白鹽水洗

甘草二兩

共爲末作丸

上而痰吐下而痰瀉此方皆良○陳皮有消痰泄氣之功食鹽具鹹能潤下之性甘草有和藥調中之妙炙之有健脾益胃之能丹溪翁微加星夏者燥其生痰之源○微加芩連者撲其動痰之焰

順氣消食化痰丸

製半夏

膽南星各一

神翹炒

杏仁去皮尖

陳皮去白

蘿蔔子生用

葛根

山楂肉炒

青皮去白

蘇子沈水者

香附製

麥芽各一兩

飲食生痰脅膈脇悶者此方主之○星夏之辛能

燥濕痰葛根之清能解酒熱山楂麥芽神翹之消能療飲食之痰青皮陳皮蘇子杏仁蘿蔔子香附之利能行氣滯之痰痰去則脅膈之膨悶亦去矣

青州白丸子

半夏七兩

南星

白附子各三兩

川烏去皮臍五錢

共爲末浸水數日爲丸

濕痰作眩者此方主之○痰之生也由於濕故用半夏南星之燥痰之滯也本於寒故用烏頭白附之溫浸以數日殺其毒也

清氣化痰丸

陳皮去白

杏仁去皮尖

枳實炒

黃芩炒

瓜蔞仁去皮

茯苓各一兩

膽南星

製半夏各一兩半

薑汁爲丸

此痰火通用之方也。○氣之不清痰之故也。能治其痰則氣清矣是方也。星夏所以燥痰濕。杏陳所以利痰滯。枳實所以攻痰積。黃芩所以消痰熱。茯苓之用滲痰濕也。若瓜蔞者則下氣利痰云爾。

指迷茯苓丸

半夏二兩

茯苓一兩

風化硝二錢

枳殼五錢

薑汁糊丸

中脘停痰伏飲者此方主之○半夏燥濕。茯苓滲濕。去則飲不生。枳殼削堅。化硝軟堅。堅去則痰

不固

滾痰丸

大黃酒

黃芩去朽各半斤

礞石青礞黃金

沈香五錢

共爲丸

實熱老痰此方主之○大黃能推蕩。黃芩能去熱。沈香能下氣。礞石能墜痰。是方乃攻擊之劑。必有實熱者始可用之。若與虛寒之人則非宜矣。又礞石由焰硝煅煉必陳久爲妙。若新煅火毒未除則不宜服。

控涎丹

甘遂去心

紫大戟去皮

真白芥子各等分

瘻涎在心膈上下，使人胷背手足頸項腰膝引痛，手足冷痺，氣脈不通者。此方主之。○甘遂直達涎，結之處大戟能攻，胃腸之涎。荅子能散支痛之飲。此攻痰之厲劑也。又曰驚痰加硃砂，痛者加全蝎酒痰，加雄黃全蝎驚氣成塊者。加川山甲鼈甲。亥胡索蓬莪木臂痛加木鼈霜桂心痰熱加盆硝寒痰加丁香胡椒肉桂。因其病證而藥加焉。兵政之便宜也。

三花神祐丸

甘遂蟻累 大戟拌鹽 荆花各半兩炒
輕粉一分 大黃一兩 黑丑二兩取頭末

前藥爲末，滴水爲丸。如小豆大初服五丸，每服加五丸溫水下。日三服。以利爲度。服後痞悶極甚者。此瘻涎壅塞頓攻不開。轉加痛悶。即初服三丸，每加二丸至快。利即止。

瘻飲變生諸病。風熱鬱燥支體麻痺。走注疼痛。瘻嗽氣血壅滯。不得宣通。人壯氣實者。此方主之。○甘遂能達瘻涎壅塞之處。大戟芫花能下十二經之飲。黑丑亦逐飲之物。大黃乃推蕩之劑。佐以輕粉者。取其無竅不入。且逐風痰積熱。而解諸藥之辛烈耳。此太毒類聚爲丸。善用之則能定禍亂。於昇平不善用之則虛人真氣慎之。

哮喘門

第十六

醫方考證卷二

四十六

叙曰。膈有膠固之痰。外有非時之感。內有壅塞之氣。然後令人。哮喘能溫之。汗之。皆是良法。若逡巡調理。則虛喘宜之人而羸瘦氣弱。則宜灸其背肺。今考古方七首。而哮喘之大目可知矣。

麻黃湯

麻黃去節三錢

桂枝三錢

杏仁去皮尖

甘草一錢

肺部原有風痰。背肺復感寒邪而成哮喘者。此方主之。○背肺者。背間之肺穴。主輸藏氣者也。一受風寒。則藏氣爲寒邪所閉。不得宣越。故作哮喘。麻黃之辛能開腠散寒。桂枝之溫能解肌疏表。杏仁

微辛入肺利氣。甘草甘平調中發散。

瓜蒂散

射瓜蒂七枚爲末

大豆煎湯調下五分

凡病齁蛤氣塞不通者。此方三吐之。○苦能瀉泄。故用瓜蒂以吐之。甘能調胃。故用大豆以和之。

定喘湯

白蘂二十一枚黃芩炒

杏仁去皮尖各一錢五分

桑白皮二錢蜜炙

蘇子二錢

甘草一錢

麻黃去節

半夏炮製

款冬花各三錢

肺虛感寒。氣逆膈熱。作哮喘者。此方主之。○聲粗者。爲哮。外感有餘之疾。也宜用。表藥氣促者。爲喘。

肺虛不走之證也。宜用裏藥，塞束於表。陽氣不得泄越，故上逆氣併于肺爲陽中之陽。故令熱是方也。麻黃杏仁甘草辛甘發散之物也。可以疏表而定喘。白蘆薈花桑皮清金保肺之物也。可以安裏而定喘。蘇子能降氣半夏能散逆。黃芩能去熱。

五味子湯

五味子炒半兩 人參去蘆 麥門冬去心 生薑各二錢
杏仁尖去皮 陳皮去白 麥冬杏仁氣喜利，故用陳皮生薑。

附子理中湯

人參 甘草 炙附子製乾薑炒白术一錢各
肺脾虛寒痰涎壅塞少有動作喘嗽頸促脉來遲細者此方主之○此證爲虛而肺爲寒也。虛則宜補。參术甘草所以補虛。寒則宜溫。乾薑附子所以溫寒。

六君子湯

人參 白术 茯苓 甘草 半夏 陳皮
氣虛痰喘者此方主之○氣壯則痰行氣虛則痰滯。痰遮氣道故令人喘。甘者可以補氣。參苓术草皆甘物也。辛者可以治痰。半夏陳皮皆辛物也。用

甘則氣不虛。用辛則痰不滯。氣利痰行。胡喘之有
或惡。入參之補而去之。此不知虛實之妙者也。

久喘良方

用青皮一枚。展開去穰。入江子一箇。將麻線繫
定。火上燒盡。留性爲末。生薑汁和酒一大木呷
服之。

名鑑錄云。李翰林。天台人。有莫生患喘病。求醫。李
云。病日久矣。我與治之。乃用前方。過口便定。實神
方也。謂久喘者。肺分有頑痰結氣。青皮能破氣。
江子能攻痰。然其性悍厲。善於走下耳。未可以療
上部也。今用燒灰存性。則大毒已去。所存者幾希。

耳新燒火。性炎上。可使成功于膈。佐之以薑汁。則
頑痰易利。行之以酒。則無所不之。薑酒既行。二物
善除久喘之患。可使愈於一旦。非良方而何。

咳嗽門 第十

叙曰。新欬易愈。久欬難愈。所以難愈者。病邪傳變。
而深入也。經曰。五藏六府皆令人欬。非獨肺也。是
受邪之原亦多矣。豈可以易與乎。今考十五方。率
舉其大耳。至於諸邪雜擾。則輕重標本。在人心權
度而已焉。能編簡盡耶。

消風百解散

醫方考卷二

四十九

荆芥

麻黃去節

陳皮去白

蒼朮渾浸七日

白芷

甘草等分

傷風咳嗽者。此方主之。○有頭疼發熱鼻塞聲重者。傷風咳嗽也。傷風宜解肌。咳嗽宜利氣。荆芥白芷麻黃可以解肌。陳皮蒼朮甘草可以利氣。曰。辛甘發散爲陽。夫六物皆辛甘。則皆解散矣。然能解散。便能利氣。能利氣。便能解散。其理恒相通者也。

金沸草散

前胡

旋復花各一兩

赤芍藥

甘草各一錢

半夏五錢

荆芥穗一兩半

赤茯苓六錢半

因風咳嗽生痰者。此方主之。○風盛則氣壅。氣壅則痰上。痰上則咳嗽。前胡旋復治風而兼行痰。荆芥甘草消風而兼利氣。半夏治痰。兼破氣逆。赤芍調榮。兼能制急。茯苓用赤入丙丁也。

五苓散

茯苓

猪苓

澤瀉

白朮

桂心

水寒射肺而成咳者。此方主之。○上焦有火。渴飲涼水。水爲火格。不得潤下。停蓄於膈。水寒射肺。故令人欬淡。足以滲水。故用茯苓。猪苓。澤瀉。白朮。辛溫足以散寒。故用桂心。向非水寒爲患。則五苓非

所宜矣。有表證者以傷寒門小青龍湯主之。

丁香半夏丸

檳榔三 細辛 乾薑炒 人參各五

丁香 半夏各一

脾胃虛寒。痰飲積于胃膈之間。令人咳嗽者。此方主之。○脾胃溫燥則能運行。痰飲脾胃虛寒則痰飲停于胃膈。肺氣因之不利。乃作欬嗽。欬是有聲。嗽是有痰有聲。有痰名曰欬嗽。經曰。治病必求其本。證本於脾胃虛寒。則脾胃爲本。咳嗽爲標。故半夏之辛。所以燥脾。人參之甘。所以養胃。脾胃治則不虛。丁薑之溫。所以行痰。細辛之辛。所以散欬。辛

溫用則不寒。不虛不寒。則脾胃治。而痰飲散。欬嗽止矣。用檳榔者。取其性重。可以墜痰。經所謂高者抑之是也。

人參蛤蚧散

人參二

兩

蛤蚧一

日全者河水浸五
每換水洗炙黃

杏仁去皮尖

兩

甘草各五

兩

知母炒

兩

桑白皮蜜

兩

貝母各二

兩

二三年肺氣上喘咳嗽。膿血滿面生瘡者。此方主之。○二三年肺氣上喘。則病久而肺損。矣。欬嗽出膿者氣病。出血者脉病也。面爲清陽之分。六陽之氣皆會於面。其氣常實。不易受邪。今滿面生瘡。此

正氣衰而邪氣盛乃小人道長君子道消之象也。是方也。人參益氣。蛤蚧補真。杏仁利氣。一母清金。桑皮瀉喘。若甘草茯苓乃調脾而益金之母也。又曰。蛤蚧爲血氣之屬能排血氣之毒故此方用之調脾胃亦假其性而伏竚於正也。

補肺湯

人參

黃芪蜜

川五味

紫菀

洗去土各一兩

桑白皮

蜜

熟地黃

各二

咳嗽肺虛者此方主之○參耆脾胃藥也。肺虛而益脾胃乃虛則補其母也。地黃滋腎藥也。肺虛而益腎恐其失養而盜氣於母也。五味子酸收藥也。

欬多必失氣故用酸以收之。紫菀涼肺中之血。桑皮清肺中之氣所謂隨其實而瀉之也。益其所利去其所害則肺受益故曰補肺。

犀角地黃湯

生犀角

錢

牡丹皮

各二錢

白芍藥

二錢

生地黃

五分

心移熱於肺而咳嗽出血者此方主之○心火也。肺金也。火者金之畏心移熱於肺乃咳嗽見火證如吐血面赤是也。名曰賊邪甚是難治是方也。牛犀能解心熱生地能涼心血丹皮芍藥性寒而酸寒則勝熱酸則入肝用之者以木能生火故使二

物入肝而渴，肝此拔本塞源之治也。

當歸龍鬚丸

當歸洗酒

梔子黑炒

龍膽草酒

黃連炒

黃柏炒

黃芩各一兩

木香錢

麝香分

大黃浸酒

青黛水飛

蘆薈各半兩

煉蜜丸之

肝移熱於肺而欬嗽者。此方主之。○欬嗽而兩肋痛。多怒脈弦者。病原於肝也。肝者將軍之官。氣常有餘。氣有餘便是火。故宜瀉之。是方也。芩連梔柏草龍青黛大黃皆能瀉火而未必入肝。肝氣臊諸藥得蘆薈麝香之臊。同氣相求可以入肝而平肝矣。然肝木爲生火之本。而諸藏之火不無相扇。諸

躁蘇
曹切音
驥天
青臭

藜錐因蘆薈麝香之引而入肝。然其性各有所屬。則能兼五火而治之矣。用當歸爲君者以其能和五藏之陰。以木香爲佐者以其能行諸藥之滯也。正考見火門。

左金丸

黃連六兩

吳茱萸湯泡一兩

肝熱左脇痛。咳嗽。此方主之。○左金者。黃連瀉去心火。則肺金無畏。得以行。金行於左。以平肝。故曰左金。吳茱萸氣臊味辛性熱。故用之以爲反佐。此方君一臣一制。小其服者。肝邪太盛也。前方證邪盛矣。故用龍鬚諸藥以平之。彼之爲過滋甚。自不

得不用夫木隊之兵也。

六味地黃丸

熟地黃八兩

山藥

山茱萸各四兩

牡丹皮

澤瀉

白茯苓各三兩

腎虛移熱於肺咳嗽者此方主之○有足心熱內股熱腰痛兩尺脉虛大者病原於腎虛也。熟地黃山茱萸味厚者也。味厚爲陰中之陰故能益腎。腎者水藏虛則水邪歸之故用山藥茯苓以利水邪水邪歸之則生濕熱故用澤瀉丹皮以導坎中之熱。激其陰血去其熱邪則精自生而腎不虛病根既去。咳嗽自寧矣。正考覈虛損門。

順氣消食化痰丸

製半夏

膽南星各一斤

陳皮去白

香附

製

蘇子沈水者

青皮去穰

神麴炒

蘿蔔子生用

棠慈肉炒

麥蘖炒

杏仁去皮尖

葛根各一兩

酒食生痰五更欬嗽胃膈膨悶者此方主之○痰之原生於濕故用半夏南星以燥之痰之滯原於氣故用香附以開之。杏仁以利之。青皮陳皮以快之。蘇子薑子以降之。食痰原於酒食故用葛根以解酒。神麴麥蘖棠慈以磨食。○解酒神麴麥蘖棠慈以磨食。

瓊玉膏

生地黃四
白蜜二

白茯苓十三兩

人參六兩

白蜜二

四共熬膏

乾咳嗽者此方主之。○乾咳嗽者有聲無痰之名也。火乘於肺喉嚨澀滯而癢故令有聲病原於脾者有痰病不由脾故無痰也。易曰燥萬物者莫熯乎火相火一熯則五液皆涸此乾咳之由也。生地黃能滋陰降火白蜜能潤肺生津損其肺者益其氣故用入參虛則補其母故用茯苓又地黃白蜜皆潤銖兩又多茯苓甘而屬土用之以佐二物此水位之下土氣乘之之義乃立方之道也。他如少門阿膠散主此證亦良。

潤肺湯

荊子仁 五味子 五倍子 黃芩 甘草

咳而失聲者此方主之。○咳嗽而失聲危證也有肺絕之兆酸者能收逆者能固三子酸而甜則能收其肺氣而固其脫矣故此方用之。黃芩能清肺熱甘草能調肺氣此方乃咳嗽之劑也。

刲嗽丸

荊子仁 百藥箭 荆芥穗等

共爲末蜜丸噙化

久嗽失聲此藥亦宜用之新嗽者不宜用也。○內經曰薄之刲之薄者雷風相薄之薄藥病摩盪之

名也。刲者曹昧。刲盟之刲取之不以正也。久陵失氣不用蒲劍而用罰子藥箭之澁肺。有火邪不用潤劑而用荆芥穗之辛。故曰刲也。

粉黛散

蚌粉

新弄炒紅

青黛

少許

用漆蠶水滴麻油數點調服。

總帶李防禦京師人初爲入內醫官值嬪御閣妃苦瘡歎終夕不寐面浮如盤時方有甚寵微宗幸其閣見之以爲憲馳遣呼李先數用藥弗應詔令往內東門供狀若三日不効當誅李憂技窮與妻對立忽聞門外叫云療瘡藥一文錢一貼喫了分

夜得睡李使入市藥十貼其色淺碧用淡蠶水滴麻油數點調服李疑草藥性厲併三爲一自試之既而無他於是取三貼合爲一携入禁庭授妃請分兩服以餌是夕歎止比曉面腫亦消內侍走白天顏絕喜錫金帛厥值萬緡李雖華其安而念必宣索方書何能以對殆亦死爾命僕侍前賣藥人過邀入坐飲以巨鍾語之曰我見隣里服歎藥多効意欲得方倘以傳我諸物爲銀百兩皆以相贈不吝曰一文藥安得其值如此防禦要得方當便奉告只蚌粉一物新蒸炒令通紅拌青黛少許耳扣其所從來曰壯而從軍老而停汰頃見主帥有

此故剽得之以其易辨姑藉以度餘生無他長也
李給之終身焉。此謂蚌粉鹹而枯能軟堅痰而燥
濕青黛寒而苦能清肺膈而除熱蘿蔔酸鹹亦以
軟痰麻油之加欬其乾火而爲向導之驅爾。

醫方考卷之二終

