



明 賦 0
第 460
卷

寬政丁巳再刻

清吳門張路玉著

鰲頭

附方

麻疹精要

浪華書林文海堂藏

麻疹精要序

氣運鬱發遷正退位之所致自天疫流行
數十年之間或一次或二次焉庚戌之秋
瘟疫頻行濊秋之交麻疹復流行沿門闔
境傳染甚多焉時鑿好清涼者得十全其
七八偏溫補者固不得其治也是由顛論
麻疹書莫可以適從也張氏之爲書其設
論也具備取方也簡當得擇焉而精語焉



而詳之旨焉余依此書醫麻疹百發百中
 若鼓之應桴矣今以其全書卷帙繁重工
 程難計應書肆之需抄其麻疹門加副墨
 以登梨棗如張氏宮牆之富美則可求諸
 其全書云享保辛亥秋九月

浪華 上月專菴撰



麻疹精要目錄

麻疹總論	一葉	例治	四、	發熱	五、
部位	六、	形色	七、	欬嗽	八、
汗	九、	嚏	十、	嘔吐	
泄瀉	十、	目	十一、	發不出	
透表	十三、	不透表		沒早	十四、
難沒	十五、	渴	十六、	喘	
氣促	十七、	瘡		搖	
衄	十八、	謔妄		咬牙	
唇燥	十九、	唇舌破裂		口氣	

舌胎 廿九

口疳 二十

腹痛

便秘 廿一

溺瀦

痢

下蟲 廿二

睡

不食 廿三

鼻扇

胸高

身冷

妊娠 廿四

虛羸

麻瘡 廿五

附

水痘 廿五

種痘說 廿六

目錄終



麻疹精要

清 張璐路玉 著

麻疹總論

麻疹者手足太陰陽明二經蘊熱所發小兒居多大人亦時有之是亦時氣傳染之類其發熱時多嗽嗽多嚏多嘔眼中如淚面浮脹赤多瀉多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏通身紅赤起而成粒勻淨而小斜目視之隱隱皮膚之下以手摸之磊磊肌肉之間其

形若疥其色若丹以其陽氣從上故頭面愈多者為順法當清涼發散為主藥用辛散以外發之涼潤以清解之切忌酸收凡動氣燥悍及一切溫補之藥慎不可犯誤用禍不旋踵辛散如荊芥薄荷前胡葛根麻黃石膏鼠粘子涼潤如黑參枯婁根葳蕤麥冬生甘草芩連貝母連翹竹葉皆應用之藥又當隨所發月時量兒大小及見證輕重而為制劑若漸出漸收者其勢雖輕而熱尚未平

○黑參參也後倣此

○大青湯方
即白虎湯去桂枝
米泔水煎之
水通生牛黃不
另藥
○清毒飲方
鼠骨于桐木研
全可散
○又方
牛黃于桐木
木防風升麻
○清毒湯方
指陳氏方
本藥名曰
此藥于

須防喘急若連綿三四日者其熱雖盛而勢已發必無他變宜大青湯或清毒飲加黑參石羔麥冬竹葉若發熱時偏身汗出或衄血者此毒得也勿遽止之若汗出太多血流不止當以清肺湯去欬冬杏仁加麻黃煎以飲汗暴止黃連以止血運則氣虛神倦為難治也若發熱時或嘔吐或自利者此火邪內逼毒氣上下行也俱宜清熱解毒小使切勿止瀉大凡發熱時未有不

草

右七味水煎溫服

○犀角地黃湯方

犀角生芩牡丹

皮芍藥洛等

右四味水煎溫服

○葶豆燈心湯方

未考疑二味用

之嗽

○清咽滋肺湯方

玄參鼠粘子荆

林蕤薤貝母桔

藟根桔梗馬兜

鈴若無以薄麥

門冬路等甘草

半夏科人參兩三

右十味水煎溫服

○竹葉石膏湯方

竹葉把石膏斤

半夏科人參兩三

渴者但當與葶豆燈心湯勿與冷飲致成水蓄多生變幻也即葷腥酒麪生冷水菓咸須禁之麻疹多有熱痰在肺初發時必欬嗽宜清熱透表不得止嗽麻後欬嗽切忌辛溫酸澀但用清咽滋肺湯以清餘熱痰壅自愈多喘者熱邪壅肺也切勿定喘惟應大劑竹葉石膏湯去半夏加貝母黑參薄荷如冬天寒甚麻毒為寒鬱於內不得透出而喘加蜜酒炒麻黃一劑立止夏月熱勢甚者即

甘草配粳米升

麥門冬升

右七味以水一斗

煮取六升去滓內

粳米米熟湯成溫

服一升日三服

○白虎湯方

知母兩石膏斤

甘草兩粳米合六

右四味以水一斗

煮米熟湯成去滓

溫服一升日三服

用白虎湯加竹葉忌用外麻誤服必喘然喘為肺氣壅遏故喘必兼嗽而張口擡肩者肺竅不通不治也故諺有喘而欬嗽者可療喘而不嗽者難醫之語又其證多泄瀉慎勿止瀉惟宜芩連葛根則瀉自止疹家切忌瀉瀉則陽明之邪熱得解是亦表裏分消之義又有疹收之後飲食如常卒然心腹絞痛遍身冷汗如冰者此元氣虛弱而中惡氣也朝發夕死勿妄治之凡麻疹以鮮明似錦

○無比散方
取黃牛糞燒存性入龍腦少許研細吹之
○加味清胃散方
即本方加犀角連翹甘草
本方口氣門出

為吉黑晦如煤最凶頭面不出者重紅紫黯慘者重咽喉腫痛不食者重黑黯乾枯一出即沒者不治鼻扇張目無神者不治鼻青糞黑者不治牙疳真爛者不治疹之牙疳最為難治外用無比散吹之內服加味清胃散更加荊芥石膏緩則不救疹中諸患不宜依證施治惟當治本本者年大陰足陽明二經之邪熱也解其邪熱則諸證自退矣
有夾痘而出者此毒氣大盛故一齊湧出

○化斑湯方
玄參八鼠粘子
一此胡分荊芥
防風分六連翹
此木通分枳殼
蠟脫絡五甘草
加燈心薑竹葉
右十二味水煎日
二三溫服

不必治疹但當托痘為主然治痘宜溫治疹宜涼此又不可不審大人男婦出疹當與外感並治惟清涼解表隨天時寒暑施治凡麻疹並作藏府風熱交患也麻乃風邪外感痘為胎毒內發二者相雜赤暈發嫩多有誤認痘出大密而委之不救殊不知其為疹夾痘也當與化斑湯續頻進麻毒解而痘自起矣
有腫行漿疹子極似痘最難看然痘則必有頂盤疹雖有漿而頭粒必不堅根盤

必無紅暈也疹後痘不結痂及元氣虧損當大補脾胃為主不可誤認邪熱未盡復與清熱退火之藥

例治 四十則

麻疹俗名痧子浙人呼為瘡子麻病風熱人或不知痧之與瘡字學不收皆土音習俗之訛耳原其證之輕重今昔懸殊吾吳水土濡弱之鄉生氣最易萌動故麻疹之發自始至終不過二三日即安

從古迄今靡不皆然邇來風氣變遷有似北方氣候即尋常麻疹必六七日乃化稍若熱勢未盡或觸風寒或犯飲食變證百出其危有甚於痘者因遍攷方書從無麻疹專學間有一二及此無非附見痘疹之末一皆簡略不詳何怪見科之莫能舉措且以痘方混治曷知麻屬陽陽從陰化故外出內沒而不漿痘屬陰陰從陽化當外踈內托以助膿二者相去天淵烏可不辨然皆為嬰孺說

也。但今不特嬰孺，少壯每多患此。雖當參詳診切，仍不能舍此繩墨而臨證之。機活法在平心手繩墨又不可拘也。予聞扁鵲入咸陽，秦人愛小兒，即為小兒醫。予由是隨時兼愛，曲盡一貫之道，為麻疹特聞生面云。

發熱

麻痘之初必由發熱，但痘熱不過二三日，即出麻熱有六七日，或半月乃出，或乍涼乍熱，或壯熱經日不退，始熱之際必

○清熱透肌湯方

玄參 石膏 鼠粘

子 胡荽 防風 前

胡 葛根 杏仁 豁

分 甘草 半

右九味水煎溫服

○竹葉石膏湯方

總論中出

○葛根解肌湯方

葛根 前胡 荊芥

鼠粘子 連翹 芍

藥 蟬脫 木通 略

分 甘草 半

右九味水煎溫服

○清熱透肌湯方

見面赤眼腫多涕淚欬嗽連聲是其候也。熱甚經日不退曰壯熱，惟正出時為正候。若初發壯熱至已出而熱不少衰者，其證必重。清熱透肌湯出盡而壯熱不退者，竹葉石膏湯去半夏加荊芥黑參沒後而壯熱不退者，危急需涼解為主。其有熱數日止而復作者，有早熱而暮退者在初發時為熱邪未透，葛根解肌湯正出之際而煩熱轉甚，乃邪熱未解而復內攻也。清熱透肌湯沒後見者

前見

○四物湯方

芍藥二錢 當歸熟地各一錢

右四味水煎溫服
老人又虛弱疹發
而不透及下隱
然色灰白不注者
前方中加桂枝更
妙

為餘邪未盡四物湯換生地赤芍加連翹黑參亦有麻退身涼越六七日而復熱者非餘熱未清即復感風邪當以意消息或因大病之後中氣虛而然者治本為要臨病之機不可不審也

部位

麻屬府候發則先動陽分而後歸陰經一身之中陽部宜多陰部宜少陽部宜透陰部即不透亦可無慮若陰部多而陽部反少不透者為險防有他變陽部者

頭面背四肢向外者皆為陽陰部者胸腹腰四肢向內者皆為陰也凡發自頭至足為齊頭面多者為順先從胸腹煖處起漸發四肢者順如從手足起漸發胸腹背者逆

形色

色貴紅潤形貴尖聳若色雖紅潤而不起二便艱澀者清熱透肌湯如色淡不起二便如常此屬本虛兼當培養氣血亦有色黯不起大便秘結唇舌燥赤者為

○清熱透肌湯方
發熱門出

火邪內鬱，白虎湯加黑參、荊芥，其有白不分肉地，惟點粒高聳，時即沒者，邪熱本輕也。然有表氣本虛而色白者，調護溫煖，越一二日自變紅活也。若正出時為風寒所遏而色白如膚，必毛竅竦栗，葛根解肌湯，或麻出成片，一被風寒便變為白，身不發熱而反內攻，煩躁腹痛，痰喘氣急者，危如毒攻於胃，則嘔吐清水，攻於脾則腹脹不食，攻於肺則鼻塞喘促，攻於心包則唇舌焦躁不省。

○葛根解肌湯方
發熱門出

○涼血飲子方
生半、芩、黃連、
犀黃、荊芥、女
參、絡、紅、花、
芍藥、牡丹、木通、
各八分
右九味水煎溫服
○黃連解毒湯方
黃連、黃芩、黃
蘗、山梔子、各二
右四味水煎溫服
○益元散方
滑石、木香、甘草、
各一兩、一兩、
半、
右二味為散
○涼膈散方
薄荷、甘草、
連翹、大黃、
各八分

人事搖頭掣手，攻於腎肝則變黑而不救也。若色紫赤而黯，是火毒熾盛，頂粒起者可治。宜涼血飲子，譏語煩躁者，黃連解毒湯，調益元散，枯燥不起者難治。若頂粒焦者，無論紅淡皆為熱劇之候，並宜白虎湯，重用石膏，乾燥無汗，加麻黃以汗之。大便秘者，涼膈散下之，亦有麻發如雲，頭大片，其形有二：一者大片嫩赤，一者大片之上復有小紅點，粒皆火邪熾盛所致。白虎湯加黑參、竹葉，若

麻疹全

半芒消、桔梗、八山、桅子、黃芩、各一、右八味水煎食後溫服
○白虎湯方
總論中出

麻出班爛如錦紋或出膿血腥臭不乾
心胸煩悶嘔吐清水身溫熱者白虎湯
加黃芩芩朮若初發時有似班層者乃
風寒在表而成癩疹祇宜疎解俟麻一
透其疹自退切勿誤認為班而與苦寒
之劑致麻內陷而難救也

效嗽

麻疹乾欬連聲不斷是火邪凌燥肺金所
致然欬則毛竅開而麻易出故未出之
先最喜欬甚發透其欬自已若出盡及

○清咽滋肺湯方
總論中出
○甘桔湯方
桔梗兩甘草二
右二味以水三升
煮取一升溫服
○人參白虎湯方
即本方加入人參
方前出

沒後而欬仍不止者清咽滋肺湯欬嗽
多痰去麥冬加橘皮茯苓其有感觸風
寒欬嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽痛口舌
生瘡者耳桔湯加芩連沒後見者人參
白虎湯去知母易麥冬以滋化之

汗

麻發之際常宜微汗微汗則肌腠疎豁而
邪易透不可復用外麻外發恐汗大泄
不無亡陽之慮其有隱陷不透之壞證
用權外發得大汗而解者此特語其變

○葛根解肌湯方

前見

○越脾湯方

發不出門出

○三拗湯方

沒早門出

○白虎湯方

前見

也若壯熱無汗而皮膚乾燥者必風寒
壅滯難出多成內攻之候或腹脹痛或
發喘促宜與葛根解肌湯冬月越脾三
拗選用但不可過劑亦有因熱極火鬱
皮膚乾燥而難出者必致唇舌燥裂二
便秘瀘壯熱昏沈或身體脹痛喘促痰
鳴無論何時急宜白虎湯加黑參牛旁
苓施竹葉之類大抵麻證常以微汗為
順若始終無汗雖沒後不無餘咎其治
總不逾上法也

噎

麻疹初起而多噎者是內火因風邪激搏
而然正出時有噎者其候必輕如沒後
尚有噎者邪熱盡解可無餘患矣如噎
而多涕者濁壅得泄肺氣自清最為吉
兆若無噎而鼻塞不通必有風邪留滯
宜辛涼之劑以透達之

嘔吐

麻之初起吐瀉交作者順乾霍亂者逆欲
吐不吐者危嘔吐是胃中熱邪不得發

○葛根解肌湯方
前見

○消毒飲方
總論中出

○石斛清胃散方
石斛扶苓牡丹

枳殼扁豆藿香
橘皮芍藥各等

甘草減
右九味生姜水煎

○四苓散方
豬苓澤瀉各一

洩而作葛根解肌湯正出及正沒時見者消毒飲加枳實黃連多痰者更加貝母栝蒌根若沒後而嘔者脾胃虛而熱滯也石斛清胃散其有嘔而吐蚘者胃中痰熱膠固蟲無所養而上竄也能食即定如蚘出多而不能食為胃敗不治泄瀉

泄瀉為麻疹之常候熱邪得以開泄也發熱時瀉而黃赤稠粒小水短瀦者屬熱四苓散加木通滑石已出人參白虎湯

白朮茯苓各半
右四味水煎

○人參白虎湯方
效嗽門出

○胃苓湯方
蒼朮厚朴橘皮

豬苓澤瀉白朮
茯苓芍藥各一

甘草肉桂各五
右十味姜棗水煎

○枳殼湯方
即平胃散去蒼朮加枳殼

○枳實湯方
枳實枳殼蒼朮

右二味以水五升
煮取三升分溫服

○理中湯方
白朮人參乾

去知母易麥冬其證必多發渴甚不止熱甚不退雖數劑無妨如瀉下清稀白沫腹疼喜得溫按者屬寒胃苓湯去蒼朮不加煨薑瀉利窘迫而腹痛脹滿或噎氣如敗卵者為飲食停滯枳殼湯加檀藥木通大抵麻疹泄瀉屬熱者多屬寒者少辨治宜早不可令其瀉久瀉久則正氣下陷或成腫滿或變下利並宜枳實理中之類以理脾胃為至麻後瀉利不止口渴目閉四肢不溫者不治嘔吐

不食洞泄不知者不治

目

麻疹發熱之時眼光如水而多眵淚或目睛微紅此正候也若沒後猶見紅赤為肺經風熱未盡瀉白散加荊芥薄荷黑參牛旁閉不欲開更加連翹木通赤而腫痛者風熱上壅也導赤散加荊旁黑參若為風熱所侵而眼眶赤爛者柴胡飲子急須治之否則為終身痼疾發不出

○姜絡五
分
○一方加橘皮五分
○一方加茯苓白木各五分
右水煎至七分溫服

○瀉白散方

桑白皮地骨皮
絡一甘草

右三味生薑水煎

○導赤散方

生草一木通甘
草一竹葉

右四味水煎

○此胡飲子方

此胡羌活防風
芍藥桔梗荊芥
生草絡一甘草

右八味水煎熱服

○麻杏甘石湯方

麻黃兩杏仁伍
管甘草兩石膏

右四味以水七升

先煮麻黃減二升

去上沫內諸藥煮
取二升去滓溫服

一升

○越脾湯方

麻黃兩石膏半
生薑兩大棗五升

初起發熱欬嗽渾身脹痛有似傷寒之候惟乾欬連聲目赤多淚嘔惡便澹確為麻疹之驗若將發之際或為風寒暴襲或因肢體坦露寒鬱熱邪不能外出此全盛之勢未萌與出後沒早不同如氣粗喘促腹中脹痛煩擾不寧而不得出急與麻杏甘石湯或越脾湯去棗重用石羔輕則升麻湯以外發之若因觸犯霧露風寒隱現不能發出以新猪矢冲湯膈簞蒸之冷則更添滾者并取猪矢

右五味以水六升
先煮麻黃去上沫
內諸藥煮取三升
分溫三服

○升麻湯方
升麻一葛根芍
藥各一甘草煖
分

右四味水煎溫服

○新豬矢沖湯方
如法

○葱白湯方
如法

燒灰葱白湯下二三錢乃痘瘡黑陷用
燒人矢之變法即燒人矢亦能發之發
之仍不出者神丹不能復圖矣
按古方麻疹升發劑中多用升麻曷知
升麻性外能升動陽氣每致邪熱上浮
而作喘逆當以紫蘇葱白代用非特升
麻當慎即桔梗初起亦須酌用恐其載
引濁氣於上也蓋麻疹宜涼宜潤一切
辛燥之味咸為禁劑用藥之機可不為
之慎重乎

透表

麻疹無問尖大細小必得透表可無後患
其有一種匾潤嫩赤成塊塊上復有小
粒平塌不起者亦有一片如風毒偏高
紅腫但頭粒不尖二者雖透其中必有
熱邪留伏防有他變並宜竹葉石膏湯
去半夏以滋化之縱有餘熱從此煥散
矣

不透表

麻出而皮層乾燥毛竅竦慄不能透表者

○竹葉石膏湯方
總論中出

○越脾湯方

發不出門出

○葛根解肌湯方

前見

○白虎湯方

前見

○消毒飲方

前見

麻疹全

風寒鬱遏也越脾湯葛根解肌湯隨輕重取用其有表虛不勝踈透者一味葱白濃煎時與之但得微汗即解若頭粒隱紅紫一片而不透表者火毒熾盛也白虎湯加荊芥黑參如肌膚不燥唇色淡白二便如常而不透者中氣本虛也消毒飲加連翹木通車前茯苓雖有蘊熱不可輕用寒涼即用峻利升發亦必不能復透但當解利使之內化為主亦有胸背腰腹煖處起發而紅頭面

手足乍有乍無此證必纏綿難已且有沒後五七日復發如前兩三次而愈者此氣候之異當非不透之比祇宜辛涼透表漸次向安欲求速效轉增危殆

沒早

麻出未經三日或為風寒外鬱或熱邪內陷或誤食酸收之物一日半日即沒周身煖處絕無紅影終變危候若雖沒早肌膚煖處尚未全沒急需透表發之不

起即當審其所觸而與內解如外為風

麻疹全

○消毒飲方
前見

○越脾湯方
前見

○三拗湯方

麻黃杏仁甘草

各半

右三味姜棗水煎

○涼膈散方
形色門出

○同方

同上

○白虎湯方
前見

原形全

寒所遏邪反內攻而沒早者消毒飲如
葱頭熱服復透者吉甚則加麻黃穿山
甲或越脾三拗選用若不急治必喘脹
而死亦有偏身青紫熱腫喘脹氣急此
毒滯血凝半匿肌表急投涼膈散去芒
硝加麻黃石膏以發越之若脹喘促
溺瀦臍突者涼膈散加葶藶或可救
一二若內挾痰熱火毒元劇而伏匿煩
燥或腹脹喘急不省人事者白虎湯加
黑參竹葉若誤食酸醋收斂之物伏匿

○豬胆汁甘草煎
如法

○苦瓠生甘草煎
如法

○枳殼湯方
泄瀉門出

○消毒飲方
前見

○消風散方
川芎羌活防風

壯熱喘欬煩悶以豬膽汁製甘艸煎成
續之與之得吐微汗為效或苦瓠生耳
艸煎湯灌之亦能取吐吐中便有發越
之義誤食豕肉喘脹氣急枳殼湯加山
檀凶硝以下奪之誤食核桃喘欬聲瘖
消毒飲加石膏馬兜鈴若得熱退身安
氣息漸調者方可無慮或大病之後或
洞泄不止中氣本虛不能發越而沒早
惟當健運中氣畧兼解毒清熱若沒後
遍身搔癢者露風早也消風散以疎解

荊芥馨香人參
茯苓強蠶蟬脫
絡寺甘草炙橘
皮厚朴枳殼
右十二味水煎溫
服

之

難沒

西北水土剛勁稟質亦厚麻必五七日乃
沒東南風氣柔弱麻出不過二三日即
化邇來地運變遷未有不綿延數日者
當非難沒之比若三四日後點燥色白
隱々於肌腠而難沒者此必衛氣素微
不能燠發或衣被單薄阻其發越之機
以致綿延多日法當辛散透達不可遽
用寒涼蔽其開泄之路也

渴

○門冬甘露飲方
玄參黃芩枳實
根連翹絡一甘
草炙燈心並竹
葉片十麥門冬
二
右八味水煎溫服
○七味白朮散方
人參白朮藿香
木香茯苓甘草
絡五葛根
右七味水煎或為
末米飲調下
○白虎湯方
前見
○竹葉石膏湯方
前見

渴乃肺胃熱盛之候唇口必紅二便秘瀉
者門冬甘露飲若二便清利唇色不紅
而但渴者此必寒涼大過脾虛不生津
液而作渴也七味白朮散去木香加粳
米渴而煩躁者是熱邪凌燦心包白虎
湯加麥冬竹葉正沒時竹葉石膏湯去
半夏渴而腹脹者本虛實滯為難治也

喘

喘者熱邪壅遏肺竅氣道阻塞而然其證

未參全

○竹葉石膏湯方
前見

○三拗湯方
沒早門出

○白虎湯方
前見

○清咽滋肺湯方
前見

有虛實之分，虛者難治，實者易調。虛則小便清利，大便溏泄，身無大熱，雖清痰潤肺，多難獲效。實則大便堅燥，小便赤澀，身發壯熱。竹葉石膏湯去半，芩加薑仁貝母，冬月量加蜜炙麻黃，隨手而應。若喘而無涕，兼之鼻扇者，不治。大抵未出而喘者易治，沒後喘者難治。初發之時喘者，三拗湯加石膏芽茶喘而鼻乾口燥者，白虎湯最捷。若見於麻後，又宜清咽滋肺湯以滋肺胃。白虎湯又為切

禁故曰醫不執方，活法在人耳。

氣促

氣促多緣肺熱不清所致。初發正出時見之，清熱透肌湯在正沒沒後，清咽滋肺湯如喉中有痰，齶齶而鳴者，熱邪阻逆，不得發越也。見於初發正出之間，除熱清肺湯正沒沒後見者，必邪熱未透，或露風沒早餘熱內攻而肺氣受傷也。難

治

瘖

○除熱清肺湯方
石膏三錢 玄參生
半芍藥貝母栝
藹根各一麥門
冬半 甘草五分
右八味水煎溫服

○清熱透肌湯方
前見

○清咽滋肺湯方
前見

○清咽滋肺湯方

前見

○射干消毒飲方

射干玄參連翹

荆芥鼠粘子

甘草

右六味水煎溫服

○清熱透肌湯方
前見

肺胃熱邪為風寒所襲不能盡達於表致
盛咽傷故瘡宜清咽滋肺湯若瘡而腫
痛者射干消毒飲然瘡為麻疹之常不
可與痘瘡比例

瘡

瘡為痰熱聚於心包見於初發未透之時
清熱透肌湯加蔓仁竹葉沒後見者難
治祇宜輕清之劑調之不可誤用金石
痰涎壅盛者一味枯蕒湧吐之若瘡無
痰鳴或自嚙指者非真瘡也此為正虛

不能主持必死不治

衄

○犀角地黃湯方
前見

衄者火邪熾盛血隨火載上行而溢於鼻
麻疹初起是為順候其熱得以開泄不
治自已若衄之不止或失血者犀角地
黃湯加荆芥穗正沒及沒之後衄仍不
止者四物湯加茅根麥冬以滋降之

譫妄

○白虎湯方

譫妄是熱邪熾盛於心包若發熱正出時
見者為火邪內伏不得透表而致白虎

前見

○竹葉石膏湯方
前見

湯加荆芥鼠粘子甚則加麻黃以發越之在正沒沒後並宜竹葉石膏湯去半

咬牙

痘證咬牙有寒熱之分麻疹咬牙皆為熱例乃陽陷於陰故多發渴手足熱喜飲冷者麥門冬湯加丹皮若手足不熱而反厥冷喜飲熱湯此為熱邪內亢後必下血咽喉作痰鳴而死即與白虎湯多不可救

○麥門冬湯方

即四物湯去芍

加麥門冬換生

○白虎湯方
前見

唇燥

唇燥多屬脾胃之熱淡而燥者其熱輕赤而燥者其熱深紫黑而燥者熱劇而重也隨輕重以清潤之

唇舌破裂

唇舌破裂者心脾之火上衝也其色必多深赤初發正出時見之白虎湯加芩連黑參荆芥薄荷若正沒沒後見者為心脾俱絕及紫黑枯燥而血不活者皆難治也

○白虎湯方
前見

口氣

○清胃散方
生芩 細升麻 一
半 甘草 五當歸
黃連 各三
右五味水煎溫服

口氣穢濁乃熱邪蘊隆於胃清胃散加石
羔連翹生耳艸其有臭不可聞者此胃
敗也不治若其人本有是證不在此例

舌胎

舌者心之苗麻本火候心屬於火故舌多
有胎白為肺熱黃為胃熱但當清解疏
利更參外證而為施治純黑為心絕黑
而溼者熱淫血分黑而燥者熱淫氣分
皆為危候並宜白虎湯溼者加生地黃

○白虎湯方
前見

○加味清胃散方
總論中出

○當歸散方
當歸芍藥各一

川芎 五 大黃 三
甘草 五

右五味生薑一片
水煎溫服

○栗根白皮煎湯
如法

○無比散方
總論中出

○燒鹽散方
取椽斗大者實

鹽滿殼合起鐵
絲繫定燒存性
以篋覆地入麝
香少許研細敷

黑參燥者加麥冬竹葉黑龜漸退者吉
不退者死

口疳

疳腐爛是熱留陽明餘毒上衝所致加
味清胃散加石羔荊芥大便秘者當歸
散微利之外用栗根白皮煎湯漱淨以
無比散或燒鹽散吹之如通齟色白者
自外延入內者無膿血者齒落口臭者
喘促痰鳴者皆為不治若滿口唇舌黃
赤白爛獨牙齦無恙者此為口瘡非牙

之
 續袍散方
 荊芥薄荷青黛
 各三甘草半
 硃砂玄明粉各
 右為散點舌上令
 其自化

疝也亦胃中餘熱未盡毒壅上焦二便
 必多艱瀉導赤散以瀉心脾之火外以
 綠袍散敷之

腹痛

腹痛之由不一總為火毒內鬱或風寒壅
 遏或飲食停滯皆能致痛於發熱正出
 時風寒壅遏毒反內攻而腹痛者急與
 疎表麻透自己若飲食過傷腹滿脹痛
 者力為消導其痛自除時當正沒沒未
 盡而腹痛者兼清中外而痛自止沒後

見者分利餘熱其痛自愈又須驗其有
 無他證屬虛屬實而與治之若熱邪內
 結而腹痛者通利大便為主有麻後脾
 氣不調而致腹脹面目四肢浮腫分利
 小水為要至若元氣大虛陰陽不能升
 降小水不利遍身浮腫喘促兼見者難
 治

便秘

大便秘結火壅血燥而耗津液麻疹大非
 所宜無論日期前後速宜清潤四順清

○四順清涼飲方
 當歸芍藥甘草

大黃酒蒸各
右四味水煎入生
蜜一匕熱服
○涼膈散方
前見

○導赤散方
目門出

涼飲甚則涼膈散以通利之慎勿遲延
恐麻變焦紫而難救也大抵麻疹自出
至沒二便俱不宜秘秘即微利可也

溺瀉

小便赤瀉在初熱正出時熱邪瀉滲是為
正候沒後見之為餘熱下匿膀胱導赤
散加麥冬以滋氣化利之仍不通者必
大便秘澀之故大便一通小便自利

痢

麻之作痢為熱邪內陷在正沒或沒後而

○黃芩湯方
黃芩三兩甘草芍
藥略二大棗汁
右四味以水一斗
煮取三升溫服一
升

○白頭翁湯方
白頭翁黃連
黃蘗秦皮各三
升

右四味以水七升
煮取二升溫服一
升

○枳殼湯方
前見

○厚朴湯方
即平胃散去蒼
朮加茯苓乾姜

○又方
厚朴乾姜阿膠

痢下色白者黃芩湯加防風枳殼下膿
血者白頭翁湯去黃蘗加防風或因食
積而滯下者枳殼湯檀藥木通腹中作
脹時痛時止者厚朴湯亦有瀉久而成
痢者乾薑黃芩黃連人參湯自初至終
痢不微者必有風寒留滯於內則宜解
毒行滯而兼疎風實脾庶幾克應如痢
下紫黯如癰膿如屋漏水如雞肝色如
黑豆汁之類加之氣喘躁渴熱甚發呃
噤口不食麻色紫晦者皆死不治

絡四黃連六石
何氏艾葉絡五
右六味水煎溫服
○乾姜黃芩黃連
人參湯方
乾姜黃芩黃連
人參各三
右四味以水六升
煮取二升溫服

下蟲

下蟲多見於沒後此以胃熱少食蟲不能安而下也與過食傷中蟲不能容而下不同但須調其飲食自愈非上出之比不須治之

睡

麻疹正出時精神困倦沉睡不醒者為逆蓋緣正氣虧損邪火內鬱正氣不勝所致若沒後而沉睡不醒者為氣血俱虛補脾養血為要如沒後煩擾而反不得

寐是餘火復燃急需滋養陰血虛陽自缺亦有昏睡不知起止插其夾車合谷不知疼痛似寐非寐無問正出沒後良非吉兆當察其兼見何證而與施治可也

不食

不食是胃中邪熱熾盛不可強與雖數日不食亦無妨害在初發正出時白虎湯加荊芥麻透熱清自能食也沒後不能食石斛清胃散諒加徒運之味元氣委

○白虎湯方
前見

○石斛清胃散方
嘔吐門出

頓者急需培補防有虛羸之患

鼻扇

鼻扇者肺將絕也若兼喘滿痰鳴此必不治如咽喉清利無喘滿而精神不減者可治宜滋培肺氣為主沒後見者死

胸高

麻疹胸高肺熱熾盛而脹也多見於正沒沒後為肺經壞證不治

身冷

麻為肺胃邪熱所發本屬於陽肢體常宜

溫煖若反清冷如冰是為逆也其有沒後遍體溫涼如故獨下體厥冷過膝者為腎敗不治如初出腰以下不熱毒不能透而反漸沒者亦為逆候急當溫養脾腎或有得生者

妊娠

麻屬火候最易墮胎若初發正出時須驗其色之紅淡熱之重輕而與疎解疎解之中佐以清冷滋血安胎為主四物湯加條芩艾葉荊芥紫蘇之類若胎氣上

○四物湯方
前見

○苧根艾葉煎湯

衝急用苧根艾葉煎湯磨積，御續進以
降之一切實脾行氣溫燥之藥既礙麻
疹後傷子氣咸須禁之

虛羸

麻患既平形體羸瘦精神倦怠飲食減少
或欬嗽不止或便泄不已或身熱不除
皆真元虧損恐成勞瘵並宜雙和湯去
川芎以和之嗽加橘紅貝母欬加麥冬
百合瀉加白朮藟豆食難消化加砂仁
穀芽氣血俱虛合四君子湯隨證調之

○雙和湯方

即四物湯加黃
耆肉桂甘草姜
棗

○四君子湯方

人參白朮茯苓

絡二甘草一
右四味水煎溫服

○荊防艾葉煎湯
如法

切禁寒涼傷犯脾胃之藥專力資培緩
圖平復可也

麻瘡

麻後發瘡多緣生水濕浴太早水氣留泊
肌腠而發但須日以荊防艾葉煎湯洗
之勿用生水亦不可用瘡藥熏塗失治
必每歲依期而發雖云小疾亦須慎之
水痘

水痘者色淡漿稀故曰水痘色赤者曰赤
痘將發之時亦皆發熱由紅點而水泡

○大連翹湯方

連翹 瞿麥 車前
子木通 滑石 當
歸 芍藥 防風 荆
芥 苈胡 各一 蠅
脫 黃芩 山梔 子
甘草 煨 烙
右十四味 水煎食
前熱服

有紅盤由水泡膿泡而結疔但水痘則皮薄色嬌赤痘則紅潤形軟總不似正痘之根窠圓淨緊束也且見點起癸灌漿結痂止於五六日之間其邪氣之輕淺可知皆由風熱鬱於肌表而發小兒肌肉嫩薄尤多此證當與天連翹湯解之亦有夾疹而出者有夾正痘而出者若先水痘收後而發正痘其痘必輕

附種痘說

痘本胎毒根於先天發則由於時氣以故

沿門合境安危相率與疫癘傳染無異且多外挾風寒內停宿滯及平跌撲驚恐為患種種匪可意料自伏波迄今天生天殺莫可誰何邇年有種痘之說始自江右達於燕齊近則通行南北詳究其源云自玄女降亂之方專取痘氣熏蒸兒胎毒於安寧無病之時則開發之機裕如不似正痘之天人合發內外合邪兩難分解也原其種痘之苗別無他藥惟是盜取痘兒標粒之漿收入棉

內納兒鼻孔女右男左七月其氣宜通
熱發點見少則數點多不過一二百顆
亦有面部稍見微腫胎毒隨解大抵苗
順則順必然之理如痘漿不得盜痘痂
亦可發苗痘痂無可竊則以新出痘兒
所服之衣與他兒服之亦能出痘總取
同氣氤氳為胎毒之嚮導其盜機也天
下莫能知而聖功生焉或有熱發出遲
點不即起或雜發於麻疹之中須藥扶
持者悉如正痘法調理自安當知胎毒

有限助虐無窮况苗發之痘既無容邪
鼓動血氣勢無癢塌悶亂之虞正氣內
守雖酒氣穢氣略無妨礙脫痂絕無癢
痕口鼻亦無殘癢之厄允為避險就安
之捷徑間有意外之變此兒正氣內奪
加以容邪交迫時動必潰命之制在氣
道之理也值此而與種痘未有不告變
者故凡病後之兒及顏色太嬌骨幹太
弱肌理大踈者皆未可以輕試也其於
痘證初行疫邪方熾之時切須避其銳

氣當俟大勢稍平方可施補天浴日之妙用其間或有不順者此必苗非順痘醫非慣家是不能無握苗助長之憾然皆方士之所為人知其神之神而不知不神之所以神吾以靜眼觀之曷若順矢隨時不假強為之為愈也

○文海堂醫書豫顯目錄

浪華 書林 敦賀屋九兵衛

寺島濟生寶

法橋寺島良安著 診脈病論ノ規矩鍼灸ノ秘穴和漢經驗ノ單方 全五冊 妙藥等ノ尤モ即功アルモノヲアツム

醫學字海

寸珍本 熟字画引ノ字書ナリ但シ内經以下ノ文字本草以下ノ藥名書名 全一冊 經絡病名一字銘等ニテ詳ニラントテ訓譯ヲナス

附方 龍頭 麻疹精要

清張路玉著 病論治法ヲ委ク記シ病例數條ヲアラシ頭書目ニ 全一冊 藥方ヲ出シテ麻疹治法ノ蘊奧ヲ示シム

麻疹例草

浪華園讓之譯 此書麻疹精要ノ國字解ニシテ其病論治法藥方 全一冊 等ヲ詳ニサトス初學トイフ此書ヲ以テ共過キカラシ者ニ

麻疹便覽

法橋藥師寺壽軒著 此書張氏医通馬氏要方等ヲ以テ麻疹治法ノ 全一冊 論ヲスル且藥方ヲ記ス國字解ノ書ナリ

醫宗金鑒

傷寒論之部 全冊 醫宗金鑒 幼科種痘方 全一冊

天保四巳初夏

尚書堂

