


高氏方醫心方采輯本



下

武
471
3止




武
門
471
卷
3止






六台味者蘇鈔本



容膝齋藏鈔本



葛氏方卷下

治服藥過劑及中毒多煩悶欲死方

刮東壁土少以水三升飲之

又方搗藍青絞取汁服數升无藍者立澆

新青布若紺縹取汁飲之

又方燒犀角末之服方寸匕

又方搗藜荷根取汁飲二升夏用藜

服藥失度腹中苦煩者方

飲生葛根汁大良无生者搗干著水服五合之可

莫之 又方金月下黃土末服方寸匕

肥藥吐不出者方

取猪膏大如指長三寸者莫令熱盡吞之

又方飲新汲冷水一升即心

若藥中有巴豆下利不出者方

末干薑黃連服方寸匕

又方煮豉汁服一升

諸藥各有相解然難常備今但取一種而兼解衆毒求之易得者取甘草咀嚼濃煎多飲

其汁無所不至也內食蜜少佳也

又方煮桂多飲其汁并多食葱菜中涕也

又方煮大豆令濃多飲其汁無豆者豉亦可

凡煮此諸藥飲其汁以解其毒雖危急不可熱

飲之諸毒得熱皆更甚宜揚令小冷也

治目為物所中傷有熱痛而闇方 斷生地膚注

之冬日煮干取汁注也 又方以水和雀矢以筆注之

又方乳汁和胡粉注日五

治竹木刺目不出方 取鮑魚頭二枚合繩貫以人溺

煮令爛取汁灌目中即出

目卒芒草沙石輩眯不出方 磨石好書墨以新

筆深注瞳子上 又方塩豉各少之著水中臨視

之即出 五ノ廿五ウ

治卒失欠領車蹉張口不得還方 令人兩手牽其
頤已暫推之急出大指或咋傷也 五ノ四ウ

治脚無冬夏恒坼裂者名尸脚躄死尸疥致方取
鷄矢一升水二升煮數沸清洗之半日乃出數作
差 八ノ廿九ウ

治食魚膾及生肉住胸中不消成癥方 朴消如半鷄
子者一枚 大黃一兩 凡二物以酒二升煮取一升半
盡服之 十ノ三ウ

治男女夢與人交接精便泄出此內虛積滯耶氣感

發治之方 菹子一升 粳米一升 水四升煮取
升半一服 又方龍骨二分 木四分 桂二分 天雄
一分 搗末酒服五分 日三 又方兩足內踝上二夫
脉上名三陰交灸廿壯 夢即斷 又方合手掌
并大母指令有爪相近以一主灸之 際角令半入
爪上三壯 十三ノ廿ウ

治男女精平常自出或聞見汗好感動便已發此
腎氣之少不能禁制方 巴戟天 石斛 黃耆
各等搗酒服方寸匕 日三 又方 鹿茸二兩 桂一尺
菹子一升 附子一枚 澤馬三兩 搗末服五分 匕

日三 又方牡丹炙令變色搗末服方寸日三

又方雄鷄肝鯉魚膽令塗陰頭十三ノ十三ノ

卧厥鬼不寤勿以火照之之 斂人但痛啣齒其踵及

足母指甲際而多唾其面治之方 末皂莢以

管吹內兩鼻孔中即起已三四日猶可吹之 又方末

竈中黃土吹兩鼻孔中 又方取韭菜搗以汁

吹其鼻孔冬月掘根可絞 又方以筆毛刺鼻

孔男左女右可展轉進之 又方以牛若馬臨厥

人上二百息青牛尤佳 又方末昌蒲吹鼻中末

桂內舌下 又方令人坐頭首入於戶外呼病者姓

名坐人應曰人諾在便即得獲也

喜厥鬼及惡夢者方 枕真射香一子於頭邊

又方帶雄黃男左女右 又方作犀角枕佳

又方以肅頭為枕 又方以青木香內枕中帶之

十四ノ十五

尸厥之病卒死而脉猶動是也 以管吹其左耳自

極三過復吹右耳三過即起 又方搗昌蒲以如

棗核大署耳舌下 又方灸鼻下人中七壯 又方

灸面中穴二十七壯 又方灸陰囊裏下去大孔一寸百壯

若婦人者灸兩乳之中間 又方以昌蒲屑著鼻

兩孔中吹之令入以桂屑著舌下云扁鵲治楚王法也十四ノ十三ヲ

溺死一宿者尚可活治之方 倒懸死人以好酒灌其鼻立活

身尚温者 取竈中灰二石餘埋人從頭至足即活 又方便脫暖衾覆之取溺人伏其上腹中水出便活十四ノ十三ウ

自經死雜已久心下尚微温猶可治也治之方 末皂莢以葱葉吹內其兩鼻孔中 又方以蘆管吹其兩耳極則易入取活乃以右氣通者少以桂湯稍咽

徐乃以少粥清与之十四ノ十六ヲ

治篤病新起早勞及飲食多致復欲死方

以水服胡粉少許 又方燒飯籬末服方寸匕十四ノ十五ヲ 男女温病老後雖數十日血脉未和尚有熱毒与之交接即得病名曰陰易致人甚於時行宜急治之令人身體重小腹急熱上衝胃頭重不能奉眼中生眵眦脛拘急欲死方

取婦人禪親陰上者割取燒末服方寸匕日三小便即利而陰微腫者為當愈得童女禪益良若女病取男禪如此為之十四ノ五十三ヲ 治湯火所灼未成瘡者方

取冷灰以水和香，尔以漬之。又方破雞子白
塗之。又方以豆將醬塗之，此二者皆能不痛
不成瘡。

又方末石膏塗之立愈。六ノ三ヲ

若已成瘡者方

以白蜜塗之，竹中幕帖上日三

又方煮大豆煎其汁以傳之

又方猪膏和米粉塗日五六

又方以好酒洗漬之。六ノ三ウ

治火瘡灸瘡終不肯燥方

細末烏賊骨粉之。又方桑薪灰水和傳之。六ノ
五ウ

治灸創及諸小瘡中水風寒腫急痛方

甕中黃土水和煮令乾火漬之

又方但以火炙之令乾，火則鮮，以日六六良。老六
六ウ

治金創方

急且斫素取白汁以厚塗之。又方燒馬矢傳

創上。又方以石灰厚塗，果表之止血速愈。無石灰

從凡灰可用。又方山行傷刺血出卒無藥，按葛

根葉傳之。又方紫檀屑傳之。又方即溺中良

六ノ六ヲ

腸者欲燥而草土著腸者方

作薄大麦粥使裁煖以液之，以新汲冷水濕之，腸

則還入草土草當跡。玉從望又子陰反畏敬也。

礼記辨席是也在皮外也

金創中筋交脉血出不可以尔則血盡斂入方急熬

塩三指撮酒服之十六ノ三ノ

若血内漏者方

服蒲黄二方寸匕血立下 又方煮小豆服汁五升

又方以黑威湯令執火尉火腹達内則消

又方掘地作坎以水浚坎中攪之取濁汁飲二升許

牡丹為散水服三指撮立尿血出十六ノ三ノ

金創未愈以交接血漏驚馬者則斂入方

急以蒲黃粉之 又方取所交婦人中裙衣帶

三寸燒末服之十六ノ四ノ

金創忌瞋怒大言大呼思想陰陽行動作力多食

飲誠酸飲酒熱大蒸美臙皆使創痛創老後百日

半年乃稍復常耳

若多飲粥輩則血溢出斂入十六ノ四ノ

治卒被毒箭方

搗藍青絞飲汁并薄創无藍可漬青布及

紺輩絞飲汁急以汁灌創中 又方服竹瀝數

合至二升

又方煮藕飲汁多益善 又方以塩滿創中灸

塩上十六ノ五ノ

治箭鏑及諸刀刃在喉咽骨聾諸隱處不出方

搗杏仁塗之 又方以蜈蚣腦塗之十六ノ七ノ

治鐵入骨不出方

取鹿角燒作灰猪膏和傳之六ノ六ヲ
諸竹木刺在肉中不出方

用牛膝根莖合搗以薄之創口雜合自出
又方燒鹿角末以水和塗之立出遠久者不過一宿

又方搗烏梅水和塗上立出

又方嚼鼓塗之六ノ六ウ

治腕蹴倒多有損痛處氣急面青者方

干地黄半斤酒一斗漬火温稍飲汁一日令盡之

又方搗生地黄汁二升酒二升合煮三沸分四五服

又方干地黄六兩當歸五兩水七升煮取三升分三

服若煩悶用生地黄一斤代干者

治為人所王擺擯舉身頓仆垂死者方取鼠李皮

削去上黑切酒漬半日絞去滓飲二三升

若為人所打舉身盡有瘀血者方

刮青竹皮二升亂髮交如鷄子六四枚火炙令焦与竹

皮合搗末以一合内酒一升中煮三沸頓服之日四五過

又内補黃三兩

血聚皮膚間不消散者方

取猪肥肉炙令乾方以搗上又方馬矢水煮薄上

被擊打瘀血在腹内久不消時發動者方

大黃干地黄末為丸散以酒服

又方補黃一升當歸二兩末酒服方寸匕日三

若久血不除變成膿者方

六黃三兩桃人廿枚杏仁廿枚酒水各五升煮取三升分三服當下膿血六ノサヲウ

凡腕折骨諸瘡腫者慎不可當風臥濕及自扇中風則發瘡口噤人若已中此覺頸項強身中急者方急作竹瀝飲二三升若口已噤者以物強困發內也禁冷飲食及飲酒

腕折四支破骨碎及筋傷跌方

就火搗生地黄以薄折上破竹筒編之令竟病上急縛之一日一夕十易地黄三日後則差

又方活鼠破其背取血及熱以薄之立愈六ノサヲウ治人從高墮下若為人重物所填サヲウ得瘀血方

豉三升以沸湯二升漬之食頃絞去滓以菰黃三合投中盡服不過三四服神良

又方取茅薊蓮根葉搗絞服汁二升不過三四服愈 又方末鹿角屑服三方寸匕日三

卒從高落下瘀血脹心面青短氣欲死方

地黄干生无在隨宜用服取消

又方煮大豆若小豆令就火飲汁數升酒和弥佳為重物所填サヲウ欲死方

末半夏如大豆者以內其兩鼻孔中此即五絕法

六ノサヲウ

治忽落馬墮車及墜屋坑岸腕傷身躄頭面四肢內外切痛煩燥叫喚者方

急多覓鼠矢燒搗以猪膏和塗痛處急累
之十六ノ廿四ウ

凡狗春月白多獠治之方

以豆醬塗創日三四過

又方末干薑常服少并以内瘡中

又方即末樊石內創中裹之口痛不壞速愈良

若重發者方

搗蘆根飲汁即老 又方薤白搗飲汁良十六ノ

治凡犬咋人方

以沸湯和灰以塗創上又苦酒和塗之

又方按菖蒲以薄創冬月煮洗之

又方以甄火牛矢塗之 又方搗干薑服二方寸匕

又方生薑汁飲半升佳 又方以頭垢少內創中

治馬咋人及踏人作創有毒腫甄火疼痛方

割雞冠血瀝着創中三下若父馬用雌雞草馬

用雄雞 又方灸創中及腫上 又方以月經傳上最良

十六ノ廿六ウ

人體先有創而以乘馬汗若馬毛入創中或為馬氣
所蒸皆致腫痛煩甄火入腹則斂人方

大飲淳酒取醉則愈 又方煮鼓作湯及甄火漬

之冷易

為馬骨所刺及馬血入人故創中毒痛欲死方

以甄火灰汁更燻漬之常令甄火竟日為之冷即

易數日乃愈若瘡口而腫不消者炙石尉火灸

上名佳

又方搗麻子絞飲其汁一升日三十六ノ卅ヲ

治熊席創方

燒青布以薰創口毒即出仍煮葛根令濃以洗創日十過并葛根搗從以葛汁服方寸匕日五創甚者夕一服 又方削楠木煮以洗創日十過卅ヲ

治狐溺棘刺人腫痛欲死方

破鷄子以搗之良 又方以麩芥菜灰汁漬之冷復易十六ノ卅ヲ

中蛇毒勿得渡水則痛甚於初救虫雖車船名不免

治衆蛇螫人方

搗萍草以傅瘡上立愈神良

又方搗生蓼絞取汁飲少以滓薄之

又方按青藍薄之 又方嚼干薑傅瘡上

治蛇創敗經月不愈方

先以塩湯洗去創中敗肉見血以取干釜鏹草搗從以傅之則愈

治蛇螫人創已合愈而餘毒在肉中淫痛痒

方

取小大蒜各一升合搗熟湯淋之以汁灌創良

春薄亦良

治蛇螫人若通身洪腫者方

取糠四五斗著大甕中以水浚之令上未滿五升

許又以好酒浹之以置火上令沸氣出薰創口使毒出則消十六ノ廿五ヲ

治蝮蛇咬人方

搗小蒜絞飲其汁以滓薄創 又方搗蕪薄之

又方嚼塩唾創上訖灸創中三壯復塩嚼以唾創

又方細末雄黃以內創中三四傳之十六ノ廿七ヲ

青蛙中人立死竹中青蛙蛇咬人方

灸創中三壯毒即不行也卒无艾刮竹皮及紙皆

可以丸又了無此者便以火燼就焚燒創十八ノ

治蛇卒繞人不解方

以熱湯淋之即解若無湯者令人就溺之亦解

治蛇入口中不出方

以艾炙蛇尾即出若無火者以刀周匝割蛇尾

裁令皮斷乃引之皮倒脫得出

治蛇咬人牙折人完中不出痛不可堪方

取蝦蟆肝以傳上立出

蛇骨刺人毒痛腫熱与蛇螫無異方

以鐵精如大豆者以管吹內創中

又方燒死鼠搗末傳創中十六ノ廿九ヲ

吳公自不甚齧人其毒亦微殊輕於蜂今赤足

螫人乃痛於黃足是其毒烈故也亦是雄故也

治之方以塩拭創上即愈 又方頭垢少許以苦酒

和塗之 又方破大蒜以指之 又方接藍汁漬之

即愈十六ノ廿九ヲ

治蜂螫人方 取人溺洗之 又方斫穀樹取白汁塗之 又方煮蜂房洗之 又燒赤膏和傅之 又方刮齒垢塗之 又方接藍青尖葉者塗之 十六ノ冊ウ

厲字應作蠶字所謂蜂蠶治之方

搗常思草絞取汁以洗之 又方灸創上十壯

又方灸屋凡若瓦器令熱以尉之 十六ノ冊ウ

蠍中國屋中多有江東無也其毒應薇今石榴樹多有耗虫云々

治之方温湯漬之 又方接馬莧塗之

又方嚼大蒜塗之 又方嚼干薑塗之 三ウ

治射工中人方

初見此瘡便水摩手犀角塗之燂復塗勿住

又方急周繞去創一寸輒一灸二處百壯創上灸百壯

又方切葫搗創上灸葫上十壯并取常思草搗

絞汁飲二三升以滓薄之

又方白鴛鴦矢取白者二枚以少許湯和令相淹塗

上十六ノ冊ウ

治沙虱毒方

以大蒜十斤著灰中温之令熟斷蒜及灰

以注創上盡十斤復以艾九灸創上七壯

又方斑苗二枚敷大一枚末服之燒一枚令盡烟末

以著創中立愈

又方山行宜竹管感塩敷視體足見以塩塗之

十六ノ五十九

水毒初得之惡寒頭微痛目眩疼心中煩燥四支
振所腰背骨節皆強兩膝疼或翕之勢但欲
眠且醒暮劇手足指逆冷至肘膝上三日則腹
中生虫食下部肛中有創不痛不痒令人不覺視之
及知耳不即治過六七日下部便膿潰出上食五臟
熱感煩毒注下不禁八九日死良醫所不能治覺
得之急當視下部若有創正赤如截完者為毒
最急若創如豕虫魚齒者為陰毒猶小緩要皆
斂人不過廿日也欲知是中水非當作數斗湯以
小蒜五升汶沮投湯中莫令大沸則無烈去

滓適寒温以自浴若身體發赤斑文者是也其
無異者當以他病治之治之方

取梅若桃棗搗絞飲汁三升許汁少以水解及
絞之

又方常思草搗絞飲汁一二升并以綿染道下
部日三

又方搗藍青与少水以塗頭面身體令通
又方取藜一把就火搗以酒一坏合和絞飲汁

若下部生創已决洞者方
桃皮菜就火搗水漬令濃去滓著瓮中坐自

漬虫出 十六ノ五十二

治入井及家中遇毒氣息奄便絕方

以水濕其面并令含水又便汲其所入井若冢中
水數斛以灌之從頭至足須臾活
又方服諸解毒犀角雄黃麝香之屬豉豆竹
瀝升麻諸湯十六、五十三

欲知盪主姓名方

取鼓皮少燒末飲病人之須臾自當呼盪主
姓名可語使呼取去之即病愈

又方藁荷葉密著病人卧蓆下亦即呼盪主
姓名

治飲食中盪毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨
立色變無常方

雄黃丹沙梨蘆各二兩搗葭且以井華水服之

圭當吐盪毒

若盪已食下部肛盡腸穿者方

以猪膽瀝內中以綿滌塞之

治中盪吐血或下血皆如爛肝方

鹽一升淳苦酒一升和一服立出即愈

又方菹草根藁荷根各三兩吹咀以水四升煮得

二升去滓頓服即愈又自當呼盪主姓名菹草

即滌絳菹草也十六、五十五

治口中乾燥烏梅棗膏分等以蜜和丸如棗

含之廿、十九

治小兒落床墮地腹中有瘀血壯熱不欲乳哺
啼喚方

大黃 黃連 補黃各二分 芒消一分半

以水二升煮取一升去滓內芒消分二三服當
大小便去血 廿五ノ七十四ヲウ

粒食者生民之所資數日之絕便能致命本草
有不飢之文段酉方莫言斯術者當以其涉在
仙竒之境庸俗所能遵故也遂使荒饑之
歲委尸橫路良可哀乎今略載其易者云
若脫值奔竄在無人之鄉及墮礮谷空井深冢
之中四顧迥絕無可藉藪日者便應服氣法
開口以舌新上下齒取津液而咽之一日得三百
六十咽便佳漸習乃至千自然不飢五三日中
小疲極過此漸輕強
若得遊涉之地周行山澤間者方

方但取松栢葉細切水服三合日中二三升便佳
方掘取白茅根淨洗切服之

或方云三月三日取茅根暴干服

又方有大豆者取三升棲令光明逆契以水服之

赤小豆為佳

又方有木天門冬麥門冬黃精玄菟諸貝母或生
或熟皆可單食

又方樹木上白耳及桓榆白皮並皆辟飢

若遇芒年穀貴無以充糧應預合諸藥以
濟命方 取稻米泔汰之百丞曝搗一日食
以水得廿日都山則可終身不食日行三百里

又方粳米面米小麦麻子熬大豆黄卷各五
搗末以白蜜一斤煎沸冷水中丸如李子頓吞
之則終身不復飢之廿六ノ三十三ヲウニ十三ヲウ

入山草辟眾虵方

用八角附子麋搗之作三角絳絹囊盛以帶
頭上虵不敢近人廿六ノ三十六ヲウ

治男陰萎女陰潤无復入道方

完縱容虵床子遠志續斷菟糸子各兩

搗末酒服方寸匕日三廿八ノ卅四ヲウ

欲令陰委弱方

取水銀麋茸巴豆雜搗末和調以真麋米脂

和傅莖及囊帛苞之若脂強以小麻油雜
煎此不異關人

又方灸三陰交穴使陽道衰弱廿八ノ卅五ヲウ

治食過飽煩悶但欲卧而腹脹方

熬麵令微香搗服方寸匕得大麦生麵益佳

無麵者薩子可用之廿九ノ卅九ヲウ

飲酒大醉不可卧而上當令數搖動轉側

勿鼓扇當風席地及水洗飲水也又最忌交

接

張華飲九酎輒令人搖動取醒不尔腸即爛背

穿達席廿九ノ卅九ヲウ

治連日飲酒喉咽爛舌上生瘡方

鴉大麻子一升末 黃蘗二兩 蜜九合之

廿九ノ卅ヲ

治飲酒後大渴方

枯樓三兩 麥門冬三兩去心 皂根白皮三兩切熬

水六升煮取三升分再服不止更作之 廿九ノ卅ウ

治酒後下利不止方

陟耜維廿枚水弟末之無者用黃連三兩

牡蠣四兩末之 麋脯一斤無者用鹿若無者當

婦龍骨各四兩合水一斗五升煮取八升分三四

服不止更作之

又方寸單服龍骨末急單可煮飲之 廿九ノ卅ウ

欲飲酒便難醉則不損人方

二ノ字葛花并小豆花干末為散服三方寸匕

又方先食塩一合以飲酒倍能

又方進葛根飲芥根飲之

又方胡麻能飲酒 廿九ノ卅三ヲ

諸饌食直余何容有毒皆是假以投之耳既不知何毒便應作甘草薺苳湯通治也漢質身帝噉麩死即其事矣 廿九ノ卅四ヲ

治食卒噎方

以針二十過刺水中東向飲其水良

又方銜鸕鷀喙即下

又方以零羊角麻手噎上

又方生薑五兩 橘皮三兩水六升煮取二升

再服 廿九ノ卅五ウ

治食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死方

煮豉汁飲二三升

又方煮葛根飲汁急可生嚼咽汁

治食苦瓠中毒方

煮黍稷令濃飲其汁數升 廿九ノ卅七ウ

食山中朽樹所生菌遇毒者則煩亂欲死方

掘地作坎以水滿中攪之服二三升

又方濃者以天大豆飲之

食楓菌甚咲又野芋毒並斂人治之与毒菌

同之 廿九ノ卅八ウ

食膾多過冷不消不治必成虫瘕方

搗馬鞭草絞飲汁一升急可服諸吐藥以

吐之

治食魚中毒面腫煩亂方

濃煮橘皮去滓飲汁 廿九ノ卅九ウ

治食諸生完中毒方

以水五升煮三升左五六沸下之食頃飲上

清一升 廿九ノ卅一ウ

治食醬肉漏脯中毒方

煮猪肪一斤盡服之

又方多飲人乳汁 廿九ノ卅二ウ

食諸六畜鳥獸肝中毒方

服頭垢一錢上

又方水漬豉取汁飲數升

禽獸有中毒箭死其完毒方

以藍汁大豆汁解之廿九冊三ノ

治食蟹及諸膳中毒方

濃煮香薷去滓飲其汁一升卅三ノ

治諸魚骨哽方

燒魚骨服少

又方以魚骨搖頭即下

又方以大刀環摩手喉二三過

又方燒魚網服之

又方鸕鷀羽燒末水服半錢上廿九冊四ノ

治食諸肉骨哽方

白雄鷄左右翮大毛各一枚燒末水服一升

又方燒雁鳥鶯鳥狸虎頭諸食肉者服方寸

上廿九冊五ノ

治雜哽方

作竹篾刮令齶滑以綿纏內喉中至哽處

引之哽當隨出

又方刮東壁土以酒和服

又方螻蛄灸燂末為屑東流水服之即出

治飲食遇草芥諸物哽方

隨噴所近邊耳令人吹

又方好蜜匕抄稍咽之令下

又方解衣帶回關下部即出

又方末瞿麥服方寸匕

又方以皂莢屑少吹內鼻中使得嚏

出秘方

誤吞竹木及薄輩者方

吞蟻蝨即出

又方但數多多食白糖自消去廿九ノ卅七ヲ

治誤吞釵方

取韭曝令萎煮令就火勿切食之入束釵

隨出

又方生麥菜若薤薊縷皆可食若是竹釵者但數多多食白糖自隨去

以銀釵竹替筋物槌啞曰氣吸吞不出方

多食白糖漸至十斤當裏物自出

廿九ノ卅七ヲ

誤吞釘針箭鐵物輩方

但多食肥羊肥牛肉諸肥自果衣之出卅八ヲ

誤吞釣繩若猶在手中者莫引之

但益以珠璫若薏苡子輩就貫著繩

稍推令至鈎處小引之則出

又方但大戾頭四領少引之則出

又方取螻蛄去其身但吞其頭數枚廿九ノ卅九ヲ

吞諸珠璫銅鐵而哽方

燒弩銅令赤內水中飲其汁立出卅九ヲ

治誤吞錢方

搗火炭服方寸匕即出

又方服蜜二升即出卅九ヲ

