




徽瘡約言

坤

+武  
497  
2止



門中武  
497  
卷 2止



微瘡約言卷之下

日本 兼議郎通事舍人越後守和氣惟亨著

丹波 平井庸信

門人 平安 村上圖基 同校

澱城侍 鑿間島信言

結毒

微瘡半愈後餘毒凝於內難散者或毒氣在於內未能發外瘡者或受父母遺毒固潛伏於骨髓者皆遂能為結毒也病至結毒最難治於是鑿藥苟誤則遂

為生涯廢痼也故欲治之者宜詳察先後緩急而施之治無使有纒愈而旋起之患

○毒之結也其狀不一矣結於筋骨者筋掣骨痛動履艱澀或不能纒起床或偏枯似中風結於裏者咳嗽盜汗下利不食似肺痿結於肌肉者肌肉關節腫潰腐爛膿水淋漓結於頭項者頭項強痛或眩暈不能擗頭或頸項生結核數箇纍纍可數結於頭面者面目腐爛臭穢不可近結於耳者為聾為腫或耳鳴如鐘如風雨如鳥雀之啾啾如川流之瀧瀧之類結於目者目赤腫痛或內障失明結於鼻者腦漏鼻淵

或鼻柱潰蝕結於口舌者口舌腐爛或舌傍焦黑腫痛或穿微孔膿血時出結於牙齒者齒齲腫痛膿潰殆類牙疳或為牙宣結於咽喉者失音聲啞或咽喉腐爛飲食不能進結於胃管者噎膈反胃結於心者胸膈突腫膿潰穿孔或心痛失心狂妄結於腹部者腹滿腹痛或水脹癥聚結於腰脊者腰脊拘痛不可屈伸或麻痺不仁結於前陰者陽物疳蝕結於後陰者痔疾漏瘡結於四肢者四肢生肉瘤結核臙瘡或疼痛或潰爛其他膚則為頑癬如牛皮骨則為附骨疽或腿腳骨節推出變紫黑色之類焉而此等證

卑賤人多病之若夫附證雜證亦不可枚舉也唯能見其機投的實之治則可以收全效矣

○凡癩眚黴瘡腐爛之人自口鼻受其氣毒徹內作之根基者多不發揚梅毒而卒然為咽喉腐爛或眼目見紅花或羞明以漸昏眊或筋骨疼痛也以其始無患疔瘡便毒等不可謂非黴毒譬諸傷寒猶患直中少陰病亦宜隨結毒治法施藥也

○凡療結毒之法當先辨內外之證而後施之治毫有外證者決不可與解毒劑亦猶傷寒家表證未罷者不可用攻裏之藥也凡不分結毒之所在痛與不

痛有發熱口渴逆氣頭痛胸中不利肩背不便及腹部掣急動悸不止脉弦數及滑大洪實者我黨強名曰外證有此證者深禁解毒劑必先量其所宜可隨證而與方劑也及外證盡退結毒唯存而或痛或痺或屈伸不便或行步艱澀脉沉遲瀦結之類當與解毒劑也於此證之內外醫者最當深察而無誤也以

下稱外證者倣之  
○有結毒兼雜證者宜察標本緩急分治之或挾寒熱往來而羸瘦骨立或挾痰喘壅盛而動悸太甚或挾癩證怒狂而憤發不止或挾疔癩積塊而痛楚不

時之類總難治也然先治其急而後為其本治則或有愈之日乎

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

○歷試四方

嘗閱輓近結毒諸治方或易或劇劇者動為害易者多不中故余累年用心於此頗有所發揮乃折中諸家之意自製四方藏之於帳中而每遇沉痾廢痼數奏殊功矣今博施之不敢以吝庶希同志者能察先後緩急之機本此四方充擴之則於此證之治思過半矣

麟角解毒湯 通治徽瘡結毒之聖劑

菱薤一錢五分 木通 黃芩 當歸

川芎 芍藥 乾地黄各一錢 黃連八分

沉香 五分

土茯苓 二十錢

右十味以水一升煮取五合滓再以水六合煮取三合一日服盡禁如常法十二日為一期○余治微瘡結毒先治外證雜證而後用清熱解毒數日病已半解而及此法方故凡病至用此則無未瘥者比五寶解毒之諸劑效用大勝也大凡治微毒臨用奇良之際苟過則諸證蜂起遂為在丹難治庶幾參考前後諸論深致之思至其奧旨在口授回命而已

鳳翼紫金丹 治微瘡結毒經年不愈咽喉腐爛口

鼻破壞都在上部者

龜板 十錢 醋炒

石決明 三錢 童便製

大黃

川芎 各三錢

辰砂 二錢

白蘚皮 四錢

右為細末每服二錢日三與鱗角解毒湯兼用即以此藥汁送下○此方病結頭上者耳聾眼暗頭痛頸項結核之類通治之劑也然亦有與之後益劇者勿恐藥煩也應變之治其要存口訣而已

龜甲活命圓 治微瘡結毒在骨髓疼痛不止諸藥不能奏效者

苦楝皮 一錢  
黃蘗 半生半炒  
百草霜  
白強蠶 各五分

輕粉 一錢炒為五分  
紫葇汁 一錢

右以紫葇汁一錢和糊丸如梧子大，日用三度，每用二十九與鱗角解毒湯兼用，即以藥汁送下。○煨輕粉法：以土器一枚盛輕粉，糊生紙封蓋之，使粉不飛散，乃上火，別設水一器，蘸指彈濺紙上，燥則又濺，如此五十遍，去火安地待火毒消了，取出聽用。煨煉之法以之為第一，治效如神，且病者服之，口中不糜爛，余用輕粉之法，概做之，然不得止，則生粉亦充，臨機之用也。

龍鱗化毒丸 治徽瘡結毒在丹經年，種種異狀

葛根 各二錢  
大黃 各二錢  
芎藭 五分  
黃芩

黃連 各一錢  
茶 荒道產可用為細末各一錢  
丁子 六錢  
甘松 三分

鼯鼠 霜六分  
肉桂 東京者可用  
輕粉 煨法如珍珠上六分  
珍珠 三分伊勢產可用然高價為難

得者以舶來真珠代之則倍分量用之又稱過薩粟換用亦可  
龍腦 三分  
阿僊藥 三錢

右十四味為末糊丸，梧子大，金箔為衣，每服三十丸，日三，與鱗角解毒湯兼用，或隨症單土茯苓煎湯送下，或徽候累年不止，倦治術者，但此丸藥以忍冬煎湯服之，久而不已，則漸可除。○此丸平穩中和之劑，而治結毒甚妙，大凡上件

諸證用主治之方兼之則奏效為速歷試之中最徵者也

○結毒之發也無定處毒舍脾胃者多結於四肢也其證手臂疼痛延及肩肘者痛處腫起者焮腫者屈伸不便者或膝臏股脛腫塊疼痛難忍不能步履者之類苟有外證挾寒熱者先用正宗加味敗毒散而尚未罷者用敗毒平胃合方此方通治焮腫者疔瘡者腫痛者尋常之方而能奏殊效者也外證罷而後麟角解毒湯龜甲活命圓兼行則愈其最虛羸者十全大補湯虎脛骨丸應用之劑也  
加味敗毒散正宗 即本方加木瓜蒼朮

虎脛骨丸 見雜方類

○毒舍肺大腸者結於頭面之際也在腦中者腦痛如破俗喚曰頭風或痛甚而口鼻穢臭撲人或鼻頭赤皴俗呼曰疔或發惡瘡俗呼曰鼻多計或腦中隱隱沉痛鼻出膿汁者曰腦漏或濁涕下不止者曰鼻淵凡在口鼻牙齒者口中臭穢或黃赤或乾涕堅凝治此類別製一方名辛夷清涼飲用之三四十日許而兼用龍鱗化毒丸則當愈及酒炒防風通聖散頭風神方十香散皆歷試之劑當臨證酌量之或以三稜針刺懸顱懸厘絲竹空瞳子膠及風池風府出血暫救其急也



或頭風頭旋眼黑結毒頭痛而有停飲者半夏白朮  
天麻湯加骨碎補一味用之最妙或鼻中隱隱鼻頭  
腫痛而色紫赤或鼻梁將崩壞者必不可緩治急當  
用龜甲活命圓及薰藥兼麟角劑則可治  
辛夷清涼飲自製 治結毒在上部疼痛者

石膏 辛夷各三錢 忍冬 防風

天麻 玄參 川芎 黑豆

芽茶各一錢 蔓荊子一錢半 土茯苓半生半炒

右以水六合煮取三合滓再煎服○鼻淵者痰  
液結於腦中之所致也其證常出臭黃涕治之

宜活氣血行腦中痰液前方去石膏加附子主  
之兼服龍麟化毒丸

酒炒防風通聖散 主行腦中痰毒酒勢引藥能至  
極高之分者也

即本方分量隨法配合之全浸酒炒之酒炒法  
存口授

頭風神方 治瘡毒或粉毒之上攻清涼諸劑不能  
治者

葶藶十二錢 金銀花三錢 防風 玄參

蔓荊子 川芎 天麻 烏頭

辛夷 各五錢 燈心 細茶 各二分

右十一味每服四錢以水二合煮取一合温服

十香散 坊間藥舖有稱加字 邊久多之者是也 馮下頭中諸毒之靈劑

木香 藿香 大黃 黃芩

白芷 川芎 各二兩 丁子 沉香

人參 薩州產小人參 充用 乳香 薰陸 石膏

縮砂 鬱金 甘草 各二錢 二分

右十五味水煎照常煎服

碧雲散 正宗 結毒在於顛頂脹痛如破者吹之

鵝不食草 一兩 川芎 一兩 青黛 一錢

右三味共為細末使患者口噙涼水以蘆管吹藥於左右鼻內取嚏為效或吹瓜蒂一味未亦得

半夏白朮天麻湯 見諸方書

即本方加骨碎補一味水煎服此方藥味平穩

種類雜駁然其奏效也不尋常

薰藥方 家方 治結毒頭痛經年不止及廢痼頑瘡在

上部荏冉不愈者

人參 一錢 沉香 二錢半 朱 七分 輕粉 一錢

丁子 三分 百草霜 二錢 艾葉 一錢半

鼻臭方  
沉香 鹿茸 杏仁  
辰砂 黃丹 宿沙  
楊梅皮 百草霜  
右去細末以紙捲捲而  
着火熏之口中含清水

鼻藥方

辰砂三分 黃丹一分 百草霜一分 水銀一分 右四味細末而能入如藥  
高子橫仕立五步位也  
紙袋入一皮一季一日三本  
紙帳之內而含口中水重  
皂也  
煎藥主方  
當取川芎一分 芍藥一分 生地一分  
杜仲一分 茯苓一分 黃連一分  
黃芩一分 陳皮一分 甘草一分  
右七味也 五皮也 當一貼衣  
其寸二分一香一五五分  
一石煎二香水二五五分  
三番二番同煎不塩

霍亂終言

卷下

右七味研末合之薰法以美濃紙卷之如竹管而藥末盛其中堅封燃上口嗅之分作二十一炷日三炷充用也○若強人則加水銀一錢益佳○亨按近世用煙藥奏效者甚多然藥氣峻烈難概用唯諸治無驗在丹經年者及鼻梁將崩壞者急用之猶可救而氣稟薄弱者強欲用之則以朱丹百草霜艾葉粉各一錢如法以紙管嗅之則頗穩

○毒舍心小腸者發於胸肋缺盆或連舌本咽噎或手臂疼痛不能舉或舌上黧黑或破裂或時舌心痛

或舌傍潰缺常涎液漏脫者若有外證則用黃連散而鳳翼紫金丹以涼膈散送下之其咽喉腐爛者大抵用牛房子湯甚痛者甘桔通噎飲或桔梗解毒湯兼用天石散虛弱者加味四物湯主之吹喉散屢吹之或單牛黃末一味麝鼠黑霜末兼用亦妙挾微熱者硫黃不二散亦得焉外證已罷而後麟角鳳翼兼行則愈

黃連散自製 治上焦熱毒

黃連 石膏各七分 黃芩 大黃各三分

生地黄 藍葉各五分 甘草二分

右以水二合煮取一合再服

牛房子湯入門治熱毒衝咽喉

牛房子二錢 玄參 犀角 周麻

黃芩 木通 桔梗 甘草各一錢

右照常煎服

甘桔通噤飲家方治咽喉腐爛不勝飲食者

甘草 桔梗各二錢 山豆根 龍胆

射干各錢 土茯苓五錢

右六味以水五合煮取二合分溫三服每服送

下牛黃二分益佳

桔梗解毒湯先師遺方療結毒上攻咽喉腐爛

桔梗八分五厘 甘草二分五厘 黃芪一分五厘 川芎

芍藥各二分八厘 大黃七厘 土茯苓七錢半生半炒

右七味以水一合半煮取一合滓再以水二合

煮取一合服之莫誤分量必效

加味四物湯回春能解熱毒利咽噤

當歸 川芎 黃柏 知母

天花粉各錢 熟地黄 白芍各一錢二分 桔梗

甘草各三錢

右剉一劑水煎服

天石散 家方 治前證最劇者

犀角 一錢半 天石 一錢 真珠 二分

右細末白湯送下能愈腐爛甚效

吹喉散 家方 一切熱毒壅塞咽喉緊痛者吹之立愈

芒硝 炒 蓬砂 阿僊藥 龍腦 各二分

辰砂 一分

右五味極末以蘆管候咽喉中痛處吹之最劇者加好真珠一分益佳其毒勢輕者正宗冰硼散甚效

活魂丹 正傳 治一切惡瘡微毒在上部咽喉腐爛

藥不能奏效者

血竭 乳香 沒藥 銅棗

枯礬 黃丹 穿山甲 各錢 輕粉

蟾酥 各五分 麝香 少許

右十味為末用蝸牛搗膏為丸如菜豆大每服一九重二九菜豆粉為衣

硫黃不二散 正宗

硫黃 上好者一錢 靛花 一分

右二味為細末凉水一大杯調服其疼即止

○毒舍肝膽者結於左右脇下及肩肘脇肋或筋攣

引痛或掉眩目暈或怒火衝上在下則發腎囊風見屬

證在上則為眼暗目赤翳障難見之證微毒入眼者雖有數證治法大抵照

法龍腦散麝香散洗方湯泡散服藥則實者明有其外證者用清肝

鮮毒湯而外証除則麟角鮮毒湯龍鱗化毒丸兼行

則愈

清肝鮮毒湯見辨治肝膽見證發熱口苦眼目赤腫

及疔瘡便毒者

本方加芩苈一錢菊花五分治眼疾最佳

龍腦散家方治微眼及諸目疾之靈劑

滑石十朱 蓬砂 焰硝 樟腦

麝香各五朱 石膏十朱半生半炒

右極研末和水點少許於眼中

麝香散家方治內外障翳黑輪見白翳瞳子見黑翳

之類

黃丹 石膏精 焰硝二朱 眞珠二朱

麝香少許

右五味極研末和水點入

湯泡散銀海精微洗諸眼目之妙方

黃連 薄荷 防風 杏仁

芍藥 當歸尾各等分 銅青減半 鹽少許

右以麻沸湯漬之須臾而乘熱蒸眼中又洗之  
明朗飲家方治諸風熱眼目微氣衝上者

芎藭二錢 細辛 黃連 黃芩

大黃 茯苓各六分 甘草三分

右照常水煎服

當歸大黃湯銀海精微 治微餘瘀血生翳障

當歸尾 川芎各二錢 菊花三錢 大黃三錢

黃芩 蘓木 山梔子 紅花各錢

右八味照常水煎服

明眼地黃湯家方 諸眼目障翳主方

乾地黄 木香 白朮各二錢 黃連三分

白芷 石斛錢各 甘草少

右照常煎服

○毒舍腎膀胱者結於腰腎背部也毒結於腰腎頰帶虛候者十全大補湯加杜仲

牛膝鹿茸解食雞肉專補之而后隨結毒四劑治之 或結於上部則耳鳴耳聾頭眩戴

陽諸證蜂起結毒入耳者有數證最難療一二二年者猶可治至歷數歲不可治而屬虛耳鳴或聾聾者宜益氣聰明湯屬實者隨

結毒法治之然壯者照薰法治之 有外證則黃連解毒合四物湯用之外

證罷乃用龜甲活命圓日二錢鱗角解毒湯兼行則愈

龍鱗丸亦佳 益氣聰明湯蘭室秘藏 治耳聾鳴未甚屬虛者

黃芪

人參

甘草

各五錢

蔓荊子 一錢

升麻

葛根 各三錢

芍藥

黃柏

酒炒各一錢

右每服三錢水煎服

達啟散

戴子名家方選

徽毒入耳聾聵經歲月者間用此方而

得痊宜臨症權用之

蒸耳方 聾聵者主之

芍藥

茯苓 各一錢

丁香 五分

石菖 五錢

右四味細剉水煎煮藥器蓋穿一孔插竹管使

病者耳受之納其湯氣如此日五六次輕者即

愈○亨嘗療徽毒入七竅者入耳者最難療一

二年者尚照四劑法可治之至年月久遠者莫如之何而已

大凡結毒證雖分治臟腑所屬必不可拘泥而害活法手段若能詳察虛實淺深輕重內外而用予歷試四劑則何病能遁要之在深察機變緩急而與之而已



用子... 四... 限... 河... 濟... 道... 聖... 之... 法... 其... 效... 驗...  
 大... 功... 奇... 效... 驗... 合... 宜... 宜... 宜... 宜... 宜... 宜... 宜... 宜... 宜... 宜...  
 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子...  
 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子... 子...

結毒雜方

○諸家相傳秘方雜方及俗傳方藥不鮮今取其有裨補于治法者錄之而有予既所試效或有所未試之者應有其效者併記○亨云蓋醫之用方如將之用兵也方不擇則治不效兵不擇則戰不利故其善治善戰者擇之為務然擇之不取于衆博之中則兵之與方乏窄不能<sub>レ</sub>有活手段安得為良醫良將哉然則我術之學在該廣而知其要擔拾而用其可用耳苟有補于治法野語禪說何不取哉是則此書之歸趣所以尊實屏華間有及俗傳方藥者也見者察焉

新製五寶散

世有通僂五寶散者一方普治結毒膾炙於人口此方原出於萬病回春要之偏取奇良之効用耳他藥則些少之分量謂於此大劑之中何能足奏殊效乎故於外科正宗增五寶藥石之分量充其用然以藥價最貴故尋常之人難得用而世之銜豎者或為貪利之口實也實可惡之甚如予四劑藥氣平穩治效奇捷豈及用之哉然俗間亦有強欲用五寶散者當代予所試驗之一方而異二書所載仍今錄之

此方治楊梅天疱之結毒筋骨疼痛口臭腐爛經年不愈遂為廢痼諸藥不效者

滴乳石 如乳頭下垂敵之易碎亮似蜻蜒翅者方真五分 大辰砂

琥珀 龍腦 真珠 各三分若用過產栗真珠則一錢

石決明 童便漬之煨七分 飛羅麵 炒黃色研末三錢五分

右七味各研細約五錢餘分為十二包每以土茯苓四十錢水一升半煮取七合日服藥末一包盡十二日為一期若鼻上腐爛者土茯苓加辛夷三錢在足部者加木瓜二錢禁如藥法

改定化毒丸

頃友人某者來傳改定化毒丸一方其言云微毒廢痼當用秘錄化毒丸之證必代用此一方最驗予考其方意覺可得治故雖未試之錄示

同志亨云秘錄所載十千化毒丸原是一轍之方劑因欲奇其應用強分為排列得免飽飽之目哉

牛黃宜辨真贋也三分 血竭 雄黃 辰砂

虎脛骨 鱖鯉甲各一錢半 鐘乳二錢 犀角

烏蛇各一錢半 龍腦三分 麝香三分 琥珀五分

右十二味神麴糊丸梧子大每服十五丸砂糖湯送下虛者人參湯送下凡此丸用之無藥煩瞑眩之患而能逐廢痼之毒也

白靈砂方

蠻人呼稱曾津比留麻阿登邦俗稱蜜藥此方治便毒疔瘡一切結毒在再經年及咽喉腐爛者此藥蠻製舶來者最佳近世得其傳予亦製之然以為秘棄之方今不浸錄煨法頗類生生乳為霜用之僅二分蜂蜜二十錢水二合調和七日服之些些之藥而能奏殊效者也予雖勉不好奇於此方時亦用之○近世豎流好事者專用生生乳予少好之頗精煨煉法與上方稍同代用亦佳不得已則雖兩用之不如守常而

不好奇也

七寶丸 治徽毒廢痼者

方載予名家方選予昔年專用此方及續方奏效甚多今從麟鳳等四劑而不顧

續七寶散 治服前方而未愈者

方又見方選 此方煨煉頗似白靈砂法宜試之

鷄鹿解毒湯 一老鑿傳予秘方云楊梅結毒不論年時多少為難治者與之必治乃受而錄之

芍藥

梔子 二錢七分

當歸

川芎 各二錢半

黃芩

黃連 各二錢二分

連翹 二錢

沉香 一錢二分

人參 一錢五分

鹿角霜 三錢五分

鷄骨霜 七錢

土茯苓 一斤生炒焙三製

右十二味分為七劑水四盞煮取二盞再以水四盞半煮取二盞三以水四盞取一盞半四以水四盞取一盞約六盞半一日服盡

穹窿丸 治結毒不問遠年近日筋骨疼痛或頭痛如破或壞鼻蝕陰等證

靈天蓋 八錢

輕粉 二錢半

牛膝 二錢

孩兒茶 二錢五分

為鷓鴣菜

枯萋根 各一錢

天南星 二錢

大黃 四錢

鼯鼠 燒存性 四分

右九味為細末糊丸梧桐子大每晨一錢木解

毒湯煮汁送下○亨按凡欲用輕粉則先用諸

解毒劑配大黃諸方而後四五日則可與

大解毒湯 治徽毒痼疾骨節疼痛或下疳腐爛瘡

痕不愈一切結毒通治之方也

土茯苓 九錢

川芎

木通

忍冬

茯苓 各三錢

大黃 一錢半

右六味以水三合煮取一合半溫服

逐毒丸 治強人骨節疼痛甚引肩背手臂屈伸不

便及內有水飲者

大黃

甘遂

牽牛子 各四錢

輕粉 煨二錢

右糊丸梧子大每服二十九日用三次○此方

一切痼毒用之無輕粉眩暈之患

銀硝丸 此方及後丸一大醫家常用之治結毒廢

痼試效之靈劑也

水銀

芒硝

綠礬 各二錢

戎鹽 五分

棗肉 五分

右五味合搗和調一丸一分以蜜蠟為衣日服

五丸空心白湯送下

銀硝後丸 治同前方效最急

絳礬 枯礬 水銀 硝石 各十錢

棗肉 五分 青鹽 五分

右六味先極研棗肉加青鹽少許令相得嘗之味差鹹為度次內絳礬研和入水銀細研不見星枯礬硝石次第相和此藥極鍊益佳一丸一分蜜蠟為衣每服一丸空心自飲送下晝夜五次下大便如蚯蚓泥而止服

咸亨丸 療徽毒痼疾量患者輕重強弱而與之長服收效

方載予名家方選

甲字丸 治徽毒疔瘡難愈者

黃芩 黃栢 大黃 輕粉 各三分

鹿角霜 六分

右五味糊丸辰砂為衣日五分或三分選諸餅毒方劑水煎送下

或傳化毒丸 療徽毒沉疴治諸偏枯及一切痼毒

腹痛因徽毒者代十干化毒丸用之最奏奇效

薰陸 十錢 大黃 鷄冠雄黃

亂髮霜 各三錢 生生乳 一錢

右五味糊丸辰砂為衣每服一分日二夜一食  
遠稍冷白湯服之病重者日用至五六分服法  
依前日後寒熱如感風寒一身發赤疹者大良  
蓋此藥最酷毒而得熱或冷則消若服後覺四  
體發熱懶惰無力者下綠豆冷飲而立定或服  
冷水亦佳宜審察其虛實淺深勿謾用之切忌  
房勞怒嗔酒酢及熱飲生冷物等若犯禁忌則  
不啻不得效其害亦不淺鮮也

五物解毒湯

治一切微瘡結毒

荊芥

金銀花

薺菜

各五分

川芎

大黃

各三分

右五味照常溫服濕淹者加草薺一錢

梓葉解毒湯

治微毒骨節疼痛及癩疔發腫痔瘡

濕淹瘡

梓葉

忍冬

大黃

川芎

各五分

甘草

三分

右五味水煎溫服亨嘗治腰脚骨痛者加薏苡

木瓜杜仲用之最效

芩連解毒湯

治諸濕瘡毒在上焦者

當歸

川芎

黃芩

連翹

大黃 各一錢 黃連 木通 各七分

右照常煎服

槲木解毒湯 治濕毒發頭痛或舌黑咽喉痛眼目

浮腫耳鳴筋骨疼痛

槲木皮 蕎麥 一錢或代忍冬 大黃 芎藭 各六分

右照常水煎服

蠲痺解毒湯 治時瘡肢節拘攣手臂不便着痺疼

痛者

姜黃 土茯苓 獨活 各五錢 白朮

當歸 各一錢五分 赤芍藥 一錢 白芷 五分

右以水六合煮取四合溫服滓再煎服

鯨甲解毒湯 治便毒下疳疥癬癩

穿山甲 大黃 黃芩 反鼻 煨存性

忍冬 甘草 各一錢 土茯苓 三錢

右七味水煎服其有水氣者加茯苓二錢

四黃解毒散 治結毒筋骨疼痛諸藥不效者如神

大黃 三錢 黃連 黃芩 當歸

芍藥 葛粉 各二錢 葛根 黃蘗 各一錢半

輕粉 煨 甘草 各五分 右十味細末土茯苓煮汁日服三四錢 一方加竜腦五分



吐逆丸 治瘡毒骨痛

輕粉八分 高粉十分 赤豆五分 百草霜五分

右初九日八九方互用

神功丸 治初發下疳 便毒楊梅瘡

大黃 黃連 黃芩 各一分

輕粉三分

右

徽瘡系言 卷下

銀花解毒湯 治徽毒骨節疼痛下部最甚者

土茯苓四錢 金銀花二錢 川芎 薏苡各一錢半

木瓜一錢 大黃一錢

右六味水煎溫服

逍遙解毒湯 治楊梅結毒不除腹中有熱肌肉瘦

削俗呼曰濕勞之類或服輕粉劑變生諸證久

不愈者

當歸 芍藥 蒼朮 茯苓

柴胡 山梔 薏苡 甘草

連翹 金銀花各等分

右十味水煎服久服取效

參芪解毒湯 治肌肉枯瘦身體倦怠而結毒未除

者黃 黃芪 川芎各一錢 當歸二錢

人參 忍冬 防已各一錢半 升麻 防風

鮫鯉甲各八分 甘草五分

右十味照常煎服

順涼解毒飲 治虛弱人楊梅結毒證

白朮漢品 蒼朮和品 茯苓 川芎

當歸 薏苡 厚朴 防風

皂角刺 木瓜 木通 獨活  
人參 各等分

右十三味水煎服此方一大醫家結毒通治常用之劑試效最多云

備急解毒圓 一老醫云楊梅結毒諸惡瘡痔毒便毒疔瘡之類當用諸解毒劑者臨時與此丸屢下之則其效神速

大黃 五兩 黃芩 三兩 黃連 一兩 青黛

芒硝 各半兩 巴豆 三兩

右六味細末糊丸麻子大金箔為衣每用三五

分隨證用之○凡此方疥癬麻疹餘毒小兒胎毒諸證與之殊效

寬中解毒圓 治下疳便毒誤治遂為骨節疼痛或

一身多結核壅腫筋脉攣急如疝所為者主之

杜仲 當歸 芎藭 乾地黄

肉桂 煨榔 大黃 木通

香附子 黃芩 黃連 各一兩 甘草 一錢

右十二味細末和蜜杵之數千下為煉丸以土

茯苓十錢煮汁以水四合一日用煉丸三錢許○

亨嘗治虛羸人深此疾用此丸三十日許下臭

穢物為知此藥久服而有效

治<sub>レ</sub>黴毒骨節疼痛一奇方

大鼠<sub>一具</sub> 阿僊藥 紅花<sub>各一錢</sub> 黃丹<sub>四錢</sub>

糯米<sub>一合</sub>

右五味俱燒存性研細每服一錢白湯送下日

一

治<sub>レ</sub>廣東瘡爛壞鼻梁及淫蝕陽物奇方

鐘乳石<sub>無問厚薄但明淨光澤者充用惟黃赤者不用</sub> 蚌竹屑<sub>八錢</sub> 乳香

沒藥<sub>瓦上焙出油</sub> 象牙<sub>各五錢</sub> 枯礬<sub>三錢</sub>

右為細末用白蠟四錢總和勻每早晚各服二

錢土茯苓煎湯調下

虎脛骨丸 治<sub>レ</sub>肌肉枯瘦手足苦疼不能步履者<sub>上</sub>

虎脛骨 熟地黄<sub>各五錢</sub> 木瓜 牛膝

杜仲 附子<sub>各二錢</sub>

右六味細末糊丸梧子大空心溫酒送下五十

丸<sub>上</sub>

端的丸 治<sub>レ</sub>楊黴結毒痼疾神良之妙劑

川芎 黃芩 大黃 栝榔子

黃栢<sub>各十錢</sub> 地骨皮 土茯苓<sub>各十錢</sub> 連翹

荆芥<sub>各二錢</sub> 烏蛇<sub>二錢半</sub> 苦參<sub>十錢</sub> 忍冬<sub>十五錢</sub>

輕粉十錢 辰砂二錢  
為衣

右十四味糊丸每服三分日三以後湯送下之

和蒼朮 土茯苓 金銀花

忍冬各等分 甘草減半

右水煎送下前丸服之後口中破爛甚者用後

湯

黃連 黃芩 山梔 黃柏

連翹 甘草 牛房子

右等分水煎溫服

玉露散 或傳治結毒癰疽之良劑

葛粉 天花粉各五分 赤小豆四錢

梅子霜三分 輕粉強人一錢 弱人五分

右細末分為二十一包薄紙包之一日三包白

湯送下七日服盡之若服後口中腫痛者綠豆

煎湯洗之或四物湯加土茯苓煎服之若經二

旬涎未止者必目眩即四物湯加人參煎服又

山椒三錢以水一合半煮取一合服

雞肉散 黧瘡結毒一切難名狀之病或累月積年

潰爛不收口或筋骨疼痛手足不遂或周身發

疔瘡或咽喉糜爛或穿孔或山根腫痛或鼻梁

陷脫及久年痔漏其他頑瘡惡毒瘡皆治之其效如神不可悉述

土茯苓炒二錢 人參炒四錢俗間稱薩藩小人參者充用 鹿角截段四錢浸燒酒盛于器中炭

火炬之一日夜 黃雌雞一隻去毛腸及肉取翅骨燒存性以其肉切作四十二片方服藥時先喫一片

右為細末分作四十二包每服一包逐日以土

茯苓五錢甘草一錢以水三合煮取一合半之

煎湯為一日飲料也送下藥末日宜服六包至七日見自

愈之兆若不瘥則再作一劑若方春夏溫熱時

雞肉難收則去毛腸全燒存性用之亦可

薰嗅條 治結毒在上部頭痛咽喉痛者

硃砂光明者一錢 金箔一片 沉香一錢 百草霜一錢

右以前三味極細末次入百草霜和勻其色成

濃紫為度分之七貼而再以一貼藥末盛三箇

紙條封卷為捻紙點火其端使患者口含冷水

機則亦更之以嗅其煙氣宜日用三條完七日用盡

又方 效同前方最療廢痼者

麝香一分 沉香四分 龍腦一分 光明朱四錢

鉛丹四錢 百草霜五分 金箔 銀箔各四片

右八味為末每四分為捻紙如上件長五六寸

令患者坐紙帳中含水嗅之七日而止病人必

下利若吐是其驗也○若用此藥口中糜爛者宜平胃散加蜀椒大黃煎服若不勝藥氣者以白梅黑豆煎服禁如藥法

紫雲條 效同前法稍緩劑也

大麻楷五錢燒為灰 朱砂一錢

右二味研勻以紙為管長八寸藥末納其中捻兩頭而植之於爐灰中點火燒焉又卷方幅五寸紙令上尖窄下圓潤如筍子狀病者挿之鼻孔俯就管上含水嗅其烟氣水煖則日一夜一左 右各一管

百中飲 治下疳微瘡其他一切濕毒積年不愈或頭面腐潰或鼻柱陷塌已成廢痼者神效

土茯苓上好品百七十錢 杜仲二錢八分 甘草一錢八分 黃連一錢四分

栝榔 人參直根 牛膝 大黃堅實者充用

肉桂 黃芩 沉香好品 川芎各一錢

右一劑分為七貼七日用盡煎法以水三合半煮取二合再以水三合煮取二合三以水四合煮取二合合六合終日服七日用盡而後再以藥滓新加午膝木黃各一錢分為三貼三日服煮法同前凡十日用盡○此方載療治茶談惟

亨昔年用之多得其效故記焉

百中... 甘草... 諸毒... 凡有之... 結毒... 論屬證

徽毒屬證

大凡徽毒之變現諸證其候不一如此篇所論屬證則或兼病或不病或始病徽瘡愈後發此證皆結毒之所發也而諸方書別立病門不論有因結毒者故於是論之其散見雜病中者非書之所能盡故不論及在診者之臆度而已

屬證品目

淋疾

雖有數證要之舊年淋疾多是徽餘氣也宜從結毒法治之

痔漏

因徽毒者頗多然非言凡有之

疥癬

有梅毒交發者有因徽餘而發癬者今論之

鵝掌風

微瘡遺毒舍于手足太陰有發此證者今論之

結核

氣滯勞鬱而兼微候者問生結核今論之

陰癬

此證俗呼曰蛙九發凡人病之而後發微者或因微餘而發之者今論之

囊癰

陰囊破裂膿汁淋漓者曰之囊癰微瘡壞證多有之今論之

懸癰

毒在陰囊後肛門前者曰之懸癰治法之所重也

腦漏鼻淵

毒在于頭腦痛如破者名曰結毒頭風又毒入於腦中而鼻出膿汁濁涕者名曰腦漏鼻淵今論之

雜證

結毒變證不可枚舉大概始既論之但似某病某證者於是論之

凡十條

淋疾

○淋古曰癰其證小便頻數尿道澁痛金匱所謂小便如粟狀小腹弦急引臍中是也其他五淋方書說之詳矣一種膿淋似淋非淋也小便通利而不頻數但膿汁常漏下宛如婦人白帶下是瘀濁血液鬱結精道而使然甚則生陰瘡或陰頭下際穿小竅漏下膿水是飲酒荒淫或宿娼淫婦之微毒傳染之所致也若在丹不愈則遂致陰頭腫痛或疔蝕腐爛後又必發便毒或筋攣骨痛或微瘡或頭髮脫落治法始用治淋解毒湯而後宜結毒諸治法大抵兼用龍鱗



化毒丸則愈若夫龍胆瀉肝五淋八正清心蓮子等  
決不可與之也誤用之則多致筋骨疼痛等症何則  
以其邪不開膀胱故也其邪不開膀胱而苟用苦寒  
利水之劑則邪氣內陷而使然也所謂誅伐不辜者  
也慎旃哉

治淋解毒湯 徽家患淋通治之劑

土茯苓二錢 滑石 澤瀉

阿膠 茯苓 木通 忍冬各八分

○ 大黃三錢

右水煎服禁如藥法

浮石湯 治淋疾痛甚小便難通者

浮石各等分 通草各等分 甘草減半

右三味水煎服

枳麩湯 治淋疾莖中疼痛呻吟動四隣者甚妙

白枳美濃產可用 麩各三錢 川芎 忍冬

甘草各一錢

右五味水煎連進數劑

救淋一方 治淋痛甚者

雄黃 大黃 海金砂各等分

右細末白湯下或救血淋海金砂一味為末白

糖湯送下

草薺飲 淋家帶微氣小便如膿者主之

草薺 二錢 龍胆 芩苈 白朮

甘草 各一錢

右照常水煎服

虎杖散 治陰莖溢痛甚者

虎杖 合歡木 滑石

甘草 各等分

右細末每服一錢白湯送下

痔漏

○大凡病痔瘡經年不痊者多因微氣初起墜腫刺痛久則崩潰成漏至其甚者糞血交出宜服提痔解毒湯兼行龍鱗化毒丸而疼痛不止者或貼外藥又佳然不兼微氣者當撰本病治方與之

提痔解毒湯 治因微氣發痔者

香附子 當歸 生地黄 地骨皮

五加皮 麥門 芍藥 防風

荊芥 葛根 各一錢 甘草 五分 僊遺糧 四十錢

右一劑分為十貼每日服一貼頭煎水一盞半

煎至一盞再煎水三盞煎取一盞一日服盡  
洗痔瘡腫突者奇方

茄莖一味陰乾細剉水煎適寒溫洗痔瘡日數  
次

痔瘡傳藥方 蝸牛數枚以酒煮爛傳之妙或熊膽  
一味和水傳之亦佳

蝟皮散 治肛門傍生瘰肉腫痛不可忍及為漏者  
蝟皮 當歸 黃芪 各一錢

○大槐子 大黃 各一錢 蛇退 桂枝 或梨梨  
蜂房 藁本 各三錢

右十味為散空心服方寸匕

痔瘡妙方 治肛門突起痒痛不可忍及壞爛甚者  
赤螺 鉛粉 輕粉 各一錢

樟腦 龍腦 麝香 各一錢  
右六味和麻油傳之

疥癬

○有楊梅而似疥癬者有楊梅疥癬兼見者皆宜從  
梅瘡初起證發散之又俗間所稱痒疥痛疥二種其  
痛疥者狀類楊梅天疱而間有帶微氣者其痒疥者

决無微氣也木抵疥之為證遍身或腫或痒或膿水淋漓或發赤疹痞癩通用浮萍湯主之痒者又與樺皮散最好而後明微氣則當以麟角解毒湯也

蒼荆敗毒散 梅疥交發者此方主之  
敗毒散本方加蒼朮荆芥各倍他藥防風薄荷分量同本劑

右水煎温服  
浮萍湯 病在皮表其瘡斑斑者不論梅疥及雜瘡盡主之

浮萍 荆芥 川芎 麻黃  
大黃五分 甘草二分

右六味水煎服

莽草湯 疥癬傳染煩痒爬却痛唯癢者此湯洗之  
莽草一斤 樟腦一兩 食鹽半斤

右三味以水一斗二升煮取六升去滓温洗日二三次以瘡愈為度

樺皮散 治遍身瘡疥癩疹癢痒痂癩之類  
樺皮 枳殼各二錢 杏仁 荆芥各一錢

甘草各三分  
右為末温酒調服或剉水煎服

掌握藥方 疥瘡無他證未甚者此方主之

雷丸十錢

胡桃三錢

水銀一錢

黑胡麻少

山椒少

右各研細麻油和之如餅盛絹袋握之三四日而油氣竭則火焙之又握之不許洗手

當歸飲子 治遍身癢痒經久不愈及虛人常常身痒不止者

當歸 川芎 芍藥 生地黄

防風 白蒺藜 荊芥 何首烏各一錢

黃芪 甘草各五分

右水煎温服

止痒散 治一切疥癬搔之益痒不可忍者

羊蹄根五錢 明礬 山椒各三錢 硫黃上品者四錢

右四味為末和麻油盛布袋以之頻摩患處

驚掌風

○掌內濕癬休作不止薄皮片片起者名曰驚掌風癬方書雖論手陽明胃經火熱血燥外受寒涼微氣除毒不散而鬱此經者往往有之初起紫白斑點久則皮膚破裂不已內服樺皮散兼龍鱗化毒丸外以牡蠣湯洗之或用傳掌方而愈其最甚者當用正宗

二礬散也

樺皮散見齊

牡蠣沸湯方

牡蠣粉一味投熱湯中以筋攪之乘熱屢洗掌中甚妙○予往羊惠此症百方不效用此洗方頓愈

又方

醬豉一味塗掌中焙火上則愈輕者此方速效  
薰方毒因者最效

鼠屎二錢 川芎一錢 麻黃一錢 大黃各四錢

右三味燒煙以薰之日二三次禁煙撲鼻也

傳掌神方痒甚者擦之甚妙

杏仁 輕粉各等分

右二味研和搏之

二礬散見正宗故畧

結核

○結核之生也多在於頸項間累々可數其劇者從咽喉間及頸筋延至耳傍上關下關邊焉或潰一口出黃汁稀膿稍収口則又穿一口俗呼曰氣腫瘰癧

之類皆徵氣也宜服龍鱗化毒丸兼用絲瓜散夏枯

草湯甚者麟角龍鱗兼行則奏效神速

者

絲瓜十錢 牡丹皮五錢 甘草二錢

右三味燒存性研末白湯送下或薏苡仁湯送

下

夏枯草湯 通治結核累累者

夏枯草三錢 大黃三分 甘草二分

右三味水煎服

結核外傳方

牡蠣各細末 黃栢等分

右二味和醋塗之

陰癰

○陰癰之為證皆因濕熱蒸着于肝腎二藏餘波下注焉或父母遺毒舍下畢丸遂為之病也病之者平素陰囊濕淹如牛鼻汗每逢夏暑蒸溽痒痛不可忍經年加毒則煽動他經漸延及任督衝三脉變見種種異證者最不輕可不議之于始哉凡陰癰初生內服陰囊搔癢最甚漸漫衍小腹

尻脛久則至胸背脇肋其狀紫黑如鐵甲者名牛皮癬而小便赤色大便燥黑氣逆上衝或頭痛多怒是皆鬱熱所致也又有其色赤如連錢散漫周身及面部者俗呼曰錢癬是瘀血鬱熱結皮膚也此症先用正宗萬靈丹而後當照下諸方治之太抵先服浮萍湯而後外傳諸方換用之甚者通天再造散主之或隨結毒法治之

浮萍湯 見疥癬

通天再造散 治微毒及疥癩頑癬諸症

鬱金 五錢 皂角刺 十錢 大黃 八錢

白牽牛 六錢 反鼻 五錢

右五味為末溫酒送下

糠洗方 俗傳 洗腎囊風痒痛不可忍或平素濕淹久

而不止者甚妙

用久年糠味噌一味 臘中盒造而經十年以上者最佳 熱湯攪之頻

洗患處

陰癬洗方 陰癬痒痛難忍者洗之

煙草莖 三錢 枯礬 錢各二 硝腦 錢各二

右三味細剉水煎乘熱頻洗患處

同敷藥方 治陰癬及疥癩諸疾

川烏頭 湯花 大黃 硫黃 各等分

右四味為末以燒耐煉之以紙封固一夜而取

出醋和之敷患處



同擦藥方 陰癩通治之方

硫黃

雄黃

大黃

黃丹

各等分

黃栢 減半

右五味各細末和巖醋煉之包布帛擦患處日五六次

同薰藥方 治陰癩及痂癩

雞冠雄黃 三錢

艾葉

番木鱉子

各二錢

右先末木鱉雄黃攪和艾葉盛土器點火薰觀衣服之七日每日換薰之

囊癧

○大凡陰虛之人羅時瘡治不適法而餘毒未除則流注於陰囊為硬囊或木腎遂至發囊癧腫痛最甚穿潰出膿血者先用十全大補黃芪內托之類調補氣血而後用梓葉湯見結毒雜方兼服龍鱗化毒丸而收效  
○初起腫痛則以如意金囊散敷熨之已潰則以鷄卵膏傅之方見于上

如意金囊散

正宗

囊癧及諸瘡腫貼之消腫去毒妙

天花粉 十錢

黃栢

大黃

姜黃 各五錢

白芷 三錢

厚朴

橘皮

甘草

蒼朮

天南星

各二錢

右十味病輕則為末和醋敷患處以軟紙蓋其上若病重則濃煎入蔥白清酒熨之冷則換溫

懸癰

○懸癰者生於穀道之前陰器之後狀如松子漸如蓮子日久如桃李初生少痒多痛赤腫焮痛小便不利蓋濕熱結聚於會陰之所致也痛甚者先作麝香湯見下頻洗患處數次而勢難潰者梓葉湯見結毒方加意以黑丑內消之其已潰者十全大補黃芪內托之

類選用之腐爛愈深而小水漏下者難治

○一種有結毒堅硬如石者不潰不軟小便常澀痛此最難消散又難潰膿宜選用諸解毒劑兼服龍鱗化毒丸稍經歲月者浴溫泉則或得拔其病源

○其證最劇則必為漏瀝盡氣血發寒熱似虛羸勞瘵者難治又首尾誤服寒涼損脾陽冰凝氣血以致患孔漸闕穢膿不止者或遂致勞瘵者皆難治

腦漏鼻淵

○經云膽移熱於腦辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下而不

已也近世病之者多因微毒結於腦中其始頭痛如  
 破稍久而鼻出黃汁濁膿也治之諸方見於結毒舍  
 肺大腸之部大抵兼用龍鱗化毒丸而驗然亦有痰  
 火頭風者宜分治法而無誤用之苟有外證者斷不  
 可與解毒劑也予近治一人經年不痊者酒炒防風  
 通聖散倍加僊遺糧兼服穹窿丸方見雜而愈

雜證

○微毒似偏枯中風證

凡少年患陰瘡橫痃等其治不適法而餘邪散漫結

於半身者盛壯之時雖不知覺至衰年偶風寒相于  
 則發偏枯此非真中風故其初不卒倒眩仆而唯漸  
 漸屈伸不便或疼痛或痿軟遂至半身不遂治法宜  
 補血氣行瘀血十全大補湯加桃仁或桂枝加附子  
 湯加芎歸兼服虎脛骨丸若肌肉不消瘦而壞爛者  
 宜麟龍之二方兼行

○凡偏枯之證宜以脉腹證候辨之真中風者其脉  
 浮洪大弦腹狀虛軟而動悸散漫語言蹇澁也因結  
 毒者脉微澁沉滑腹狀實堅而少動氣語言不錯涎  
 亦少先用補藥而後無外證則當照解毒之諸方與

之若誤為中風治之則終身不得救也

黃栢散 微毒積年在內如癱瘓中風腰脚筋掣如

痿軟諸藥不效者主之

黃栢 百錢半 生半炒 土茯苓 同上

右二味為末每服二錢許以後湯服之

杜仲 川芎 熟地黄 黃連

黃芩 大黃 當歸 忍冬

土茯苓 各一錢

右照常煎服

○微毒似噎膈證

凡微家始患橫痃陰瘡誤多服攻伐或燥劑津液枯

竭而乾血結於食道者飲食滯滯難下為噎膈結於

胃脘者瘀血拒穀氣為反胃凡此證多屬難治若日

數未久真元不虛者桃核養氣湯兼用抵當丸虛者

當歸活血湯津液枯竭而噎食者復脈湯加附子潤

補之

○微毒似勞瘵證

固有微候寒熱往來形體羸瘦頸項生結核數枚或

潮熱咳嗽吐痰如肺癰之狀胸中時痛殆類瘵者鑿

妄以瘵法治之殊不知微餘之氣深竄入筋脉骨髓

之間適逢風寒之氣不能解之兩毒相搏為此證也  
宜使餌鷄肉之類而照結毒法治之通用逍遙解毒  
湯主之

○微毒似癩風證

凡微瘡發出結一痂則又起一層抓之麻痺不知痒  
痛者或手脚拳攣不能伸舒或眉髮頽落雖是似癩  
風固有微候微脉則皆因結毒法治之

○微毒似舌疳或牙疳證

固有微候面色暗慘咽喉時痛齒齦出血黑床殆類  
牙疳或舌心裂痛或舌傍潰缺涎液常漏脫者豎動

以舌疳治之殊不知微餘之氣入乎少陰也此證先  
以十全大補湯附子八物湯之類補其營血而後從  
結毒治法也

○凡微毒類似諸病世頗多或似傷寒表證頭痛者  
或因微熱與時毒相發動似瘧疾發熱者或似脚氣  
疼痛者或似痛風歷節者或似疝毒筋攣者或似氣  
鬱留滯者或似跌蹠損傷者或似帶下赤白交下者  
此等不可枚舉鑿若不精察誤施他治則禍不旋踵  
故學醫者不精於微瘡之治不能無誤人之恐也

傷寒經言卷下  
 論婦人徵證併小兒  
 婦人徵毒與男子同法然婦人太概濕熱隨月經  
 而下故比男子頗少但方妊娠時兼徵毒則熱氣易  
 催故有頭痛口乾舌上黑胎等之證宜用配太黃石  
 膏芒硝之方劑不可為傷胎之恐也  
 宿娼游妓陰器腫痛小水澀滯有寒熱者肝濕熱  
 也龍胆瀉肝湯加浮石木通用之  
 婦人濕熱陰器生蟲濕痒不可忍者以苦參蛇床  
 子煎湯洗之而後以輕粉雄黃二味細末擦之內服  
 龍胆瀉肝湯為佳

論婦人徵證併小兒

婦人徵毒與男子同法然婦人太概濕熱隨月經  
 而下故比男子頗少但方妊娠時兼徵毒則熱氣易  
 催故有頭痛口乾舌上黑胎等之證宜用配太黃石  
 膏芒硝之方劑不可為傷胎之恐也  
 宿娼游妓陰器腫痛小水澀滯有寒熱者肝濕熱  
 也龍胆瀉肝湯加浮石木通用之  
 婦人濕熱陰器生蟲濕痒不可忍者以苦參蛇床  
 子煎湯洗之而後以輕粉雄黃二味細末擦之內服  
 龍胆瀉肝湯為佳

○孀婦室女隻居經年，淫火妄行，面黃肌瘦，身發寒熱，咳嗽生痰，形肉枯削者，問有因陰中生蟲而作此證，婦人畏羞不肯說，醫亦無能察，或誤以勞瘵治之，則引日倍不愈，如此之類，可精察而與前劑。

○宿娼已嫁人，後有面色黯黑，寒熱往來，咳嗽吐痰，形肉羸瘦者，此固有微氣餘毒未散，兼肝脾勞傷者也，加味逍遙散加木通、忍冬，兼用龍鱗化毒丸，則愈。  
○婦人陰中突出如菌子，或鷄冠，四邊腫痛者，及陰戶突出作痛者，乃肝經濕熱也，加味逍遙散及洗方主之。

○婦人濕熱下注，陰中作痒痛之諸證，以摺痒湯洗之，而後搽銀杏散，則愈。

摺痒湯 正宗

苦參 威靈仙 蛇床子

當歸尾 狼毒 各五錢 鶴虱草 一兩

右用河水十碗，煎數滾，濾清貯盆內，乘熱蒸洗之。

銀杏散 同上

杏仁 輕粉 水銀 雄黃 各一錢  
右為細末，和之，每用五分，盛寸餘，緞絹縫之，如

棗子大以挿陰中留線在外欲小便則取而換之

○徽瘡餘毒及患痔脫肛後髮落不止者以後方傳之則得復故

生髮膏

白芷 附子 防風 芎藭

莽草 辛夷 細辛 黃芩

當歸 山椒 大黃 蔓荊子

右十二味為末合猪膏微火煉之梳沐後塗頭

髮

又方

白槿花黑霜輕粉少許以麻油調和塗之則頭髮再生最妙

○小兒或發瘡瘍或臍中常濕潤時出穢臭膿汁或患膿淋痔瘡者若以尋常胎毒食癖治之則成大之後多為漏瘡發於頂腋或肛門之間而又變見喉穿鼻崩寒熱咳嗽等之證也至此藥餌遂不驗焉免廢痼哉亦當議徽毒之治於其初而已



論禁解毒證  
 心下痞硬者不可與解毒劑若誤與之則有頭痛  
 耳鳴氣逆上衝之變也  
 凡不論外傷內因發熱不解者必不可與奇良劑  
 及一切解毒方見脈浮滑洪大者亦然時珍云奇良  
 去濕不能去熱宜哉  
 若有風寒表邪者決不可與解毒諸劑先解表邪  
 而後從之  
 素病他疾虛羸甚者亦勿與之  
 微毒誤治一身羸瘦寒熱虛咳盜汗乏力白沫涎

論禁解毒證

心下痞硬者不可與解毒劑若誤與之則有頭痛  
 耳鳴氣逆上衝之變也  
 凡不論外傷內因發熱不解者必不可與奇良劑  
 及一切解毒方見脈浮滑洪大者亦然時珍云奇良  
 去濕不能去熱宜哉  
 若有風寒表邪者決不可與解毒諸劑先解表邪  
 而後從之  
 素病他疾虛羸甚者亦勿與之  
 微毒誤治一身羸瘦寒熱虛咳盜汗乏力白沫涎

唾或下利者俗名曰濕勞非藥石之所能及也勿投治方

○腹部虛軟按之無力者及腹內有沉寒痼冷者不可與下劑宜用消毒通利之劑

○微毒初證必輕亦不可與粉劑誤投之雖似已愈而經數年之後毒氣攻內變見種種異證或咳血齒衄殆類勞瘵者實難治

○素有積癖之人氣血不流通於是得微毒則凝結益甚故雖用解毒之藥而毒氣不盡或狂癩或鼓脹或勞瘵此等之證先施積癖之治而後驅微毒為要

解粉毒法

○大凡微瘡毒輕未經數月者決不可用輕粉不得已用之猶徵必的之證也故非神會手熟之人則不能以得其利矣事豈輕易乎彼如庸工御騏驎凡手擊鑊錐者予為鑿流惡焉

○凡如用龜甲活命圓及諸輕粉丸服後宜用梅肉丸瀉毒丸之類逐下其毒如用龍鱗化毒丸有煨煉適法又非此例

瀉毒丸 用粉劑後宜服之或與粉劑併用亦佳

鷄舌香二錢 大黃四分 巴豆七粒

右三味為丸每用六分此丸不啻鮮粉毒又鮮  
本證結毒最妙

銀花煎方 服輕粉後口中腫痛牙齒動搖者噙之

銀花 三錢 甘草 黃栢 青黛 各一錢

石榴皮 二錢

右五味以水八合煮取五合去滓待冷屢噙之

日盡一劑

石榴皮湯 誤服輕粉口眼喎斜手足拳攣不能伸

○大舒此毒入骨髓也此湯主之

石榴皮 二錢 甘草 五分 石決明 醋煨去麤皮

右三味以水二升先煮榴甘取一升去滓入石

決明攪調分溫服

○右件所論雖備鮮粉毒之方而年月陳久者概不治特予所秘棄之化粉散一方十不誤一服之七日糞中下白物者為瀉粉之驗而此方非口授面羨不可傳之所以今不錄焉

○時珍云水銀乃陰毒物因火煨丹炒而出加以鹽礬煉而為輕粉加以硫黃升而為銀朱輕飛靈變化純陰為燥烈其性走而不守善劫痰涎消積滯故水腫風痰濕熱毒瘡被劫涎從齒齦而出邪鬱為之暫

開而疾因之亦愈若服之過劑或不得法則毒氣被  
蒸竄入經絡筋骨莫之能出痰涎既去血液耗亡筋  
失所養營衛不從變為筋攣骨痛發為瘰癧腫疔漏或  
手足皸裂蟲癬頑痺經年累月遂成廢痼其害無窮  
亨云治癩痼沉毒者輕粉不得不用然用之不適法  
則其為害也亦不僅僅至如上件諸證雖予四劑難  
為治猶須喫鷄肉充其肉腠而後或從結毒治法也

大凡醫藥皆宜中道

古三和以水二代其法雖難其理一也

溫泉浴法

○溫泉浴法雖古已有之未知其詳近世後藤艮山  
始徇之於四方其說云助氣溫體破瘀血通壅滯開  
腠理利關節宣暢皮膚肌肉經絡筋骨癥疔痲痺  
痿痺手痺脚痺攣急諸痛一切痼疾沉疴多效而後天  
下雷同浴者最多矣然因循其說不適病者強浴之  
却受其害者未鮮然則溫泉之於病可謂功過相半  
矣夫庶希切辨其當否而不漫浴之云

○凡下疳便毒淋疾疥癬黴毒之類始病之未經數  
月者不可浴溫泉也積年累月藥餌難奏效無浴禁

病目者唯可浴之也

○凡徽家氣逆上衝甚者眼目赤腫耳鳴愀愀者痰喘氣急胸腹滿悶者頭痛如破頭暈目眩者飲食不進形肉羸瘦者虛火若痰火上逆夜卧不安者六脉浮大火熱上炎者皆不可治誤浴之則終身廢痼盲聾不死不已鑿者可不察之也哉

○凡微瘡結毒在上部耳鳴目赤齒齦腮腫者項頸生結核累累然者其他咽喉或胸肋乳邊有結毒者浴溫泉多不效却有為害者唯結毒在下部腰脚不便手臂攣急或脚上有久瘡不瘥者久淋久痔者浴

之多效

○凡浴溫泉而後胸腹開豁頻飢能食食味益佳者泉應也或疥癩梅瘡浴四五日而疼痛益甚者或癢癢非痺浴後益甚難坐起行立者勿驚泉應也過二三臘則必效浴後七八日有大便瀉利二三行至七八行而裏急後重糞作臭氣者又皆泉應也浴後胸腹飽滿不能食或大便秘結者盡泉之不應也不可浴之

○溫泉雖所在有之紀州熊野但州城等為冠藥選詳論之也然路程非近險峻且甚病者多不得至故

勢州山村通菴者良山子之徒作溫泉變法使人浴之予亦遵其法出入增減新製一方氣味效用殆欺化工浴之屢效

○假溫泉法

潮水五斗若無潮水之地則水 糠一斗

當歸二百錢 酒五合 桂枝二十錢

硫黃六百錢 入糠煎湯中漬之出

右分取潮水之半以糠一斗煎之以糠赤為度而後漉之於浴桶內日浴三度甚熱則可加潮水冬月堪十二三日夏月六七日

禁忌法

○九療儻家嚴禁食色之二欲不然則藥效難奏治之無益豈可忽之乎

○禁忌品類

酒 茶服奇良劑最忌 醋 糕 濕麵

生魚 川魚 一切大魚 韭

薤 蔥 茵品 青菜服奇良劑最忌 豆腐

褐腐 禽獸肉 油膩 至鹹

其他沐浴梳櫛房慾闖爭遠行勞役皆嚴禁之

○宜用品類

麥

粟

黍

小豆

菜菔

蕪菁

胡蘿蔔

薯蕷

甘藷

干瓢

款冬

麥

飴

昆布

海苔

冬瓜

蔗汁造菓

海鰻

古知

奇須古

藻魚

鱈殘魚

牡蠣

海參

石決明

蚌

乾鯉

此類皆可食之而凡所飲啖可必以淡或薄

鹽調之

○後藤艮山云病徵毒者宜食毒物使毒氣推出表

分此言非無理予嘗便毒無餘證者強與食毒物推出之或結毒經年為沉疴痼疾者有餌食雞肉雞卵之法有餌食鰻鱺魚鼈肉之法其他無肯犯禁食者也矣

○前件禁忌之中房室遠行鬪爭三者雖徵毒差後猶忌之誤犯之則血氣散亂而藥效難奏身體不得復也

○徵家忌灸炳誤用之則助濕熱兩火相搏熱益熾矣所謂焦骨傷筋血難復也

○腹力虛脫形肉羸瘦者宜隨證補托之決勿與牽

牛大黃輕粉已豆峻利之劑

○凡徽家未經數月者決不可與輕粉誤與之則當時似少痊者經兩三年毒氣攻裏粉毒徽餘氣相搏變見種種異候遂為咳血為齒衄為脈數為頭痛為聲啞為肌肉消鑠者最多矣須照解粉毒之諸方而治之

徽瘡約言卷之下終

跋

鑄止五侯而人稱其私囊非一脈而人貴其美然則凡物之致洵美者獨固而能成其工也哉於我醫學家亦能苟不用其心術于博約為鑄鑄三折之勢而鑄亦画亦無異焉亦矣乃為良醫也哉我師近撰蘭疾約言為以定此治之基礎故其書梓博攬



蒙鈔以一家之確言而借方野說  
 不刻其肯隱亦如彼侯轉之夕  
 非一而貴焉集成之功不至美乎  
 然亦考之者唯見其體模或為  
 後錄之先就我師之牆室學之  
 而後考我不食此字云

享和二年壬戌秋

秋廣後學館本公明拜頌



大文保俊良國  
 藤原信賢

享和壬戌四月刻成

觀宜堂藏板



發行所

- 二條油小路東入事 皆山三郎右衛門
- 衣棚二條下事 西村吉兵衛
- 烏丸綾小路下事 淺井庄右衛門
- 西六條花屋早油小路東入事 永田調兵衛

