



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

武日
門
498
4



脉經卷之四

辨三部九候脉證第一 凡四十一條

松井家藏

經言所謂三部者。寸關尺也。九候者。每部中有天地人也。上部主候。從胸以上至頭。中部主候。從膈以下至氣街。下部主候。從氣街以下至足。浮沉牢結。遲疾滑濶。各自異名。分理察之。勿忘觀變。所以別三部九候。知病之所起。審而明之。針灸亦然也。故先候寸脉。中_{一作於}九浮在皮膚。沉細在裏。昭昭天道。可得長久。上部之候。牢

結沉滑。有積氣膀胱。微細而弱。卧引裏急。頭痛欬嗽。逆氣上下。心膈上有熱者。口乾渴燥。病從寸口邪入。上者名曰解。脉來至狀如琴絃。苦少腹痛。女子經月不利。孔竅生瘡。男子病痔。左右脇下有瘡。上部不通者。苦少腹痛。腸鳴。寸口中虛弱者。傷氣氣不足。大如桃李實。苦渾也。寸口直上者。逆虛也。如浮虛者。泄利也。中部脉結者。腹中積聚。若在膀胱。兩脇下有熱。脉浮而大風。從胃管。至腹脹。乾嘔。心下澹澹。如有桃李核。胃

中有寒。時苦煩痛不食。食卽心痛。胃脹支滿。膈上積。肋下有熱。時寒熱淋露。脉橫出上者。胸氣在膀胱。病卽著右。橫關入寸口中者。膈中不通。喉中咽難。刺關元。入少陰下部。脉者。其脉來至浮大者。脾熱也。與風集合。時上頭痛。引腰背。小滑者。厥也。足下熱。煩滿。逆上。捨心。上至喉中。狀如惡肉。脾傷也。病少腹。下在膝。諸骨節間寒清。不可屈伸。脉急。如弦者。筋急足攣。結者。四肢重。從尺邪入陽明者。寒熱也。大風邪入少陰。女子

爲白下赤。男子漏血。陰痿不起。引入腹痛。
人有三百六十脉。法三百六十日。三部者。寸關
尺也。尺脉爲陰。陰脉常沉而遲。寸關爲陽。陽脉
俱浮而速。氣出爲動。入爲息。故陽脉六息七息
十三投。陰脉八息七息十五投。此其常也。二十
八脉相逐上下。一脉不來。知疾所苦。尺勝治下。
寸勝治上。尺寸俱平治中。臍以上陽也。法於
天。臍以下陰也。法於地。臍爲中關。頭爲天。足爲
地。有表無裏邪之所止。得鬼病。何謂有表無裏。

寸尺爲表。關爲裏。兩頭有脉。關中絕。不至也。尺
脉上不至關。爲陰絕。寸脉下不至關。爲陽絕。陰
絕而陽微。死不治。三部脉或至或不至。冷氣在
胃中。故令脉不通也。上部有脉。下部無脉。其人
當吐。不吐者死。上部無脉。下部有脉。雖困無所
苦。所以然者。譬如人之有足。樹之有根。雖枝葉
枯槁。根本將自生。木有根本。卽自有氣。故知不
死也。寸口脉平而死者何也。然諸十二經脉者。
皆係於生氣之原。所謂生氣之原者。非謂十二

經之根本也。謂腎間動氣也。此五臟六腑之本。十二經之根。呼吸之門。三焦之原。一名守邪之神也。故氣者。人根本也。根絕。則莖枯矣。寸口脉平而死者。生氣獨絕於內也。其火便死。其脈不復。腎間動氣。謂左爲腎。右爲命門。命門者。精神之門。之所舍。原氣之所係也。一名守邪之神。以命門之神。固守邪氣。不得妄入。入則死矣。此腎氣先絕於內。其人便死。其脉不復。反得動氣也。岐伯曰。形盛脉細。少氣不足以息者。死。形瘦脉大。胸中多氣者。死。形氣相得者。生。參伍不調者。病。三部九候皆相失者。死。上下左右之脉。相應。

如參春者。病甚。上下左右相失。不可數者。死。中部之候雖獨調。與衆藏相失者。死。中部之候相減者。死。目內陷者。死。黃帝曰。冬陰夏陽。奈何。岐伯曰。九候之脉。皆沉細懸絕者。爲陰。主死。故以夜半死。盛躁喘數者。爲陽。主夏。故以日中死。是故寒熱者。平旦死。熱中及熱病者。日中死。病風者。以日夕死。病水者。以夜半死。其脉乍數乍蹠。乍遲乍疾者。以月乘四季死。形肉已脫。九候雖調。猶死。七診雖見。九候皆順者。不死。所言不死。

者風氣之病及經月之病似七診之病而非也故言不死若有七診之病其脉候亦敗者死矣其發噦噫必審問其所始病與今之所方病而后各切循其脈視其經絡浮沉以上下逆順循乏其脈疾者不病其脈遲者病脉不往來者死皮膚著者死

兩手脉結上部者濡結中部者緩結三里者豆起弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微卽陽氣不足沾熱汗出濇卽無血厥而且寒豆

二字
疑誤

黃帝問曰余欲每視色持脉獨調其尺以言其病從外知內爲之奈何岐伯對曰審其尺之緩急小大滑澀肉之堅脆而病形變定矣調之何如對曰脉急者尺之皮膚亦急脉緩者尺之皮膚亦緩脉小者尺之皮膚減而少脉大者尺之皮膚亦大脉滑者尺之皮膚亦滑脉濇者尺之皮膚亦濇凡此六變有微有甚故善調尺者不待於寸善調脉者不待於色能參合行之可爲

上工。尺膚滑以淖澤者。風也。尺內弱。解。仰安卧。
脫肉者。寒熱也。尺膚濁者。風痺也。尺膚麤如枯
魚之鱗者。水淡飲也。尺膚熟甚。脉盛躁者。病溫
也。其脉盛而滑者。汗且出。尺膚寒甚。脉小急。作
者。泄少氣。尺膚烜然。烜然甲乙作先。熱矣。人手。先熱後寒者。
寒熱也。尺膚先寒。久持之而熱者。亦寒熱也。尺
烜然熱。人迎大者。掌奪血。尺緊。人迎脉小甚。則
少氣色白。有加者。主死。肘所獨熱者。腰以上熱。
肘前獨熱者。膺前熱。肘後獨熱者。肩背熱。肘後

麤以下三四寸。腸中。有蟲。手所獨熱者。腰以上
熱。臂中獨熱者。腰腹熱。掌中熱者。腹中熱。掌中
寒者。腹中寒。魚上。白肉。有青血脉者。胃中。有寒。
諸浮。諸沉。諸滑。諸澁。諸弦。諸緊。若在寸口。膈以
上病。若在關上。胃以下病。若在尺中。腎以下病。
寸口。脉滑而遲。不沉。不浮。不長。不短。爲無病。左
右同法。

寸口太過。與不及。寸口之脉。中手短者。曰頭痛。
中手長者。曰足脛痛。中手促上擊者。曰肩背痛。

寸口脉浮而盛者。病在外。

寸口脉沉而堅者。病在中。

寸口脉沉而弱者。日寒。一二六作氣又作中及上痛瘕小腹痛

寸口脉沉而弱者。髮必墮落。

寸口脉沉而緊苦。心下有寒。時痛有積聚。

寸口脉沉胸中短氣。

寸口脉沉而喘者。寒熱。

寸口脉但實者。心勞。

寸口脉緊或浮。膈上有寒。肺下有冰氣。

脈緊而長過寸口者。注病。

脈緊上寸口者。中風。風頭痛亦如之。千金翼云亦爲傷寒

頭痛

脈弦上寸口者。宿食降者。頭痛。

脈來過寸入魚際者。遺尿。

脈出魚際逆氣喘息。

寸口脉澈澈如羹上肥陽氣微連連如蜘蛛絲。

陰氣衰。

寸口脉偏絕則臂偏不遂。其人兩手俱絕者。不

可治。

兩手前部陽絕者苦心。下寒毒喙中熱。
關上脉浮而大風在胃中。張口肩息心下澹澹
食欲嘔。

關上脉微浮積熱在胃中嘔吐蛻蟲心健忘。
關上脉滑而小大不勻。千金云是爲病方欲進
不出。一日復欲發動其人欲多飲食卽利如
利止者生不止者死。

關上脉緊而滑者蛻動。

實有伏結在脾肺氣塞實熱在胃中。澁脉與有
言者浮之澁大按之。並堅實故言有力也。

關上脉滑大而尺寸細者其火必心腹冷積
癥瘕結聚欲熱飲食。

關上脉時來時去乍大乍小乍疎乍數者胃中
寒熱羸劣不欲飲食如瘡狀。

尺脉浮者客陽在下焦。

尺脉細微溏泄下冷利。

尺脉弱寸强胃絡脉傷。

尺脉虛小者足胫寒痠脚疼。

尺脉澁下血下利多汗。素問又云。尺澁謂之多汗。

尺脉滑而疾爲血虛。

尺脉沉而滑者寸白蟲。

尺脉細而急者筋攣痺不能行。

尺脉麤常熱者謂之熱中腰脅疼小便赤熱。

尺脉偏滑疾面赤如醉外熱則病。

平雜病脉第二 九六十五條

滑爲實爲下又爲陽氣衰數爲虛爲熱浮爲風爲虛動爲痛爲驚。

沉爲水爲實又爲鬼疰弱爲虛爲悸。

遲則爲寒澀則少血緩則爲虛洪則爲氣一作熱

緊則爲寒弦數爲瘡。

瘡脉自弦弦數多熱弦遲多寒微則爲虛代散

則死弦爲痛婢一作浮爲風症偏弦爲飲雙弦則

脇下拘急而痛其人澀澀惡寒リジトスル

脉大寒熱在甲。

伏者霍亂

安卧脉盛謂之脫血

凡亡汗肺中寒飲冷水亥嗽下利冒虛冷此等其脉並緊

浮而大者風

浮而大者中風頭重鼻塞

浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉

滑而浮散者攤緩風

滑者鬼疰

澁而緊痺病

浮洪太長者風眩癲疾

大堅疾者癲病

弦而鉤脇下如刀刺狀如蓄戶至因不死

緊而急者遁戶

洪大者傷寒熱病

浮洪大者傷寒秋吉春成病

淫而滑者宿食

浮滑而疾者食不消脾不磨

短疾而滑。酒病

浮而細滑。傷飲

遲而滯。中寒。有癥結。

歎^多而緊。積聚有擊痛。

弦急。疝瘕。小腹痛。又爲癰病。一云作脾病

遲而滑者。脹。

盛而緊。曰脹。

弦小者。寒澼。

沉而弦者。懸飲。內痛。

弦數有寒。飲冬夏難治。

緊而滑者。吐逆。

小弱而濇。胃反。

遲而緩者。有寒。

微而緊者。有寒。

沉而遲。腹藏有冷病。

微弱者。有寒少氣。

實緊。胃中有寒。苦不能食。時時利者。難治。一云作時時

嘔。稽留。

難治。

滑數心中結熱盛。

滑疾胃中有寒。

緩而滑曰熱中。

浮沉一作而急病傷寒暴發虛熱。

浮而絕者氣。

辟大而滑中有短氣。

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當

剝也。

浮而數中水冬不治自愈。

短而數心痛心煩。

弦而緊腸痛藏傷有瘀血一傷有寒血

沉而滑爲下血亦爲背膂痛。

脈來細而滑按之能虛因急持直者僵仆從高墮下病在內。

微浮秋吉冬成病。

浮滑疾緊者以合百病久則愈。

陽邪來見浮洪。

陰邪來見沉細
水穀來見堅實

脈來乍大乍小乍長乍短者爲祟

脈來洪大

アラカニヤ

者社祟

脈來沉沉澤澤四肢不仁而重土祟

脉與肌肉相得久持之至者可下之

弦小緊者可下之

緊而數寒熱俱發必下乃愈

弦遲者宜溫藥

緊數者可發其汗

診五臟六腑氣絕證候第三 凡十三條

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠

視而不見人汗出如水不止

一日二日死

病人膽絕七日死何以知之眉爲之傾

病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青呼罵

不休

一日死

病人心絕一日死何以知之肩息回視立死

日

日亭亭

二日死

病人腸一曰小腸絕六日死。何以知之？髮直如乾麻，不得屈。尚有汗不止。

病人脾絕十二日死。何以知之？口冷足腫，腹熱，臍脹泄利不覺，出無時度。一日五日死

病人胃絕五六日死。何以知之？脊痛腰中重，不可反覆。平九日死

病人肉絕六日死。何以知之？耳乾舌皆腫，溺血，大便赤泄。一日足腫

病人肺絕三日死。何以知之？口張但氣出而不

還

一曰鼻口虛張短氣

病人太腸絕不治。何以知之？泄利無度，利絕則死。

病人腎絕四日死。何以知之？齒爲暴枯，面爲正黑，目中黃色，腰中欲折，自汗出如流水。一日人平七日死

病人骨絕十日死

諸浮脉無根者，皆死。已上五臟六腑爲根也

診四時相反脈證，第四

凡四條

春三月木王肝脈治當先至心脈次之肺脈次之腎脈次之此爲四時王相順脈也到六月土王脾脈當先至而反不至反得腎脈此爲腎反脾也七十日死何謂腎反脾夏火王心脈當先至肺脈次之而反得腎脈是謂腎反脾期五月

六月忌丙子

脾反肝三十日死何謂脾反肝春肝脈當先至而反不至脾脈先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙

腎反肝三歲死何謂腎反肝春肝脈當先至而反不至腎脈先至是謂腎反肝也期七月八月忌庚辛

腎反心二歲死何謂腎反心憂心脈當先至而反不至腎脈先至是謂腎反心也期六月忌戊己

臣億等按千金云此申不論脉之氣脉之氣未論指南又推五行亦頗轉倒待別求錄上診損至脉第五凡九條

脉有損至何謂也然至之脉一呼再至日平三

至曰離經。四至曰奪精。五至曰死。六至曰命盡。此至之脉也。何謂損。一呼一至曰離經。二呼一至曰奪精。三呼一至曰死。四呼一至曰命絕。此損之脉也。至脉從下上。損脈從上下也。損脈之爲病奈何。然一損。損於皮毛。皮聚而毛落。二損。損於血脉。血脉虛少。不能榮於五臟六腑也。三損。損於肌肉。肌肉消瘦。食飲不爲肌膚。四損。損於筋。筋緩不能自收持。五損。損於骨。骨痿不能起於床。反此者至之爲病也。從上下者骨痿。不

能起於床者死。從下上者皮聚而毛落者死。治損之法奈何。然損其肺者益其氣。損其心者調其榮衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其申。損其腎者益其精氣。此治損之法也。脉有二呼再至。一吸再至。一呼三至。一吸三至。一呼四至。一吸四至。一呼五至。一吸五至。一呼六至。一吸六至。一呼一至。一吸一至。再呼一至。再吸一至。呼吸再至。脉至如此。何以別知其病也。然脉來一呼再至。一吸再至。不大不小。曰平。

一呼三至。一吸三至。爲適。得其病。前大後小。卽頭痛目眩。前小後大。卽胸滿短氣。一呼四至。一吸四至。病適。欲甚。脈洪大者苦。煩滿。沉細者腹中痛滑者傷熱。濇者中霧露。一呼五至。一吸五至。其火當困。沉細卽夜加浮大。卽晝加不大小。雖困可治。其有大小者爲難治。一呼六至。一吸六至。爲十死脉也。沉細夜死。浮大晝死。一呼一至。一吸一至。名曰損人。雖能行。猶當一作着床。所以然者。血氣皆不足故也。再呼一至。再吸一

至。名曰無竈。無竈者當死也。人雖能行。名曰行尸。

扁鵲曰。脈一出一入曰平。再出一入少陰。三出一入太陰。四出一入厥陰。再入一出少陽。三入一出陽明。四入一出太陽。脉出者爲陽。入者爲陰。故人一呼而脉再動。氣行三寸。一吸而脉再動。氣行三寸。呼吸定息。脈五動。一呼一吸爲一息。氣行六寸。人十息。脈五十動。氣行六尺。二十息。脈百動爲一備之氣。以應四時。天有三百六十

十五日人有三百六十節。晝夜漏息水百刻。一備之氣脈行丈二尺。一日丁夜行於十二辰。氣行盡則週遍於身。與天道相合。故曰平平者。無病也。一陰一陽是也。脈再動爲二至。再至而緊。卽奪氣。一刻百三十五息。十刻千三百五十息。百刻萬三千五百息。二刻爲一度。一度氣行可周。身晝夜五十度。脈三至者離經。丁呼而脈三動。氣行四寸半。人一息脈七動。氣行九寸。十息脉七十動。氣行九尺。一備之氣脈百四十動。

氣行一丈八尺。一周於身。氣過百八十度。故曰離經。離經者病。一陰二陽是也。三至而緊。則奪血脉四至。則奪精。一呼而脈四動。氣行六寸。人一息脉九動。氣行尺二寸。人十息脉九十動。氣行一丈二尺。一備之氣脈百八十動。氣行二丈四尺。一周於身。氣過三百六十度。再遍於身。不及五節。一時之氣而重至。諸脉浮濶者。五臟無精。難治。一陰三陽是也。四至而緊。則奪形。脉五至者死。一呼而脉五動。氣行七十寸半。人一息脉

十十動氣行尺五寸。人十息脉百丁十動氣行丈五尺。丁備之氣脉一百二十動氣行三丈。丁周於身三百六十十五節。氣行過五百四十度。再周於身過百七十度。丁節之氣而至此氣浮濶經行血氣竭盡不守於中五臟痿消精神散亡。脈五至而緊則死。三陰二作三陽是也。雖五猶未如之何也。

脉一損一乘者。人一呼而脉一動。人一息而脉再動。氣行三十寸。十息脉二十動氣行三尺。丁備

之氣脉四十動氣行六尺。不及周身百八十節氣短不能周遍於身苦少氣身體懈惰矣。

脉再損者。人一息而脉一動。氣行一寸五分。人十息脉十動氣行尺五寸。丁備之氣脉二十動氣行三尺不及周身三百節。凝血氣盡經中不能及故曰離經。血去不在其處。大小便皆血也。

脉三損者。人一息復一呼而脉一動。十息脉七動氣行尺五分。丁備之氣脉十四動氣行二尺一寸。不及周身二百九十七節。故曰爭氣行血

留不能相與俱。微氣閉實則胸滿藏枯而爭於中。其氣不朝。血凝於中死矣。

脉四損者再息而脉一動。人十息脉五動氣行七寸半。一備之氣脉十動氣行尺五寸。不及周身三百一十五節。故曰亡血亡血者。亡失其度。身羸瘦皮裏骨故氣血俱盡五臟失神其死明矣。

脉五損者人戴息復一呼而脉一動。人十息脉四動氣行六寸。一備之氣脉八動氣行尺二十寸。

不及周身三百二十四節。故曰絕。絕者氣急不下床。口氣寒脉俱絕死矣。

岐伯曰脉失四時者爲至啓。至啓者爲損至之脉也。損之爲言少陰王骨爲重此至損也。飲食衰減肌肉消者是意損也。身安卧卧不便利耳目不明是魄損也。呼吸不相通五色不華是魂損也。四肢皆見脉爲亂是神損也。太損三十歲中損二十歲下損十歲損各以春夏秋冬平人長脉短者是大損三十歲人短脉長者是中

損二十歲手足皆細。是下損十歲失精氣者。一歲而損。男子左脈短。右脈長。是爲陽損。半歲女子右脈短。左脈長。是爲陰損。半歲春脉當得肝脈。反得脾肺之脉。損夏脉。當得心脉。反得腎肺之脉。損秋脉。當得肺脉。反得肝心之脉。損冬脉。當得腎脉。反得心脾之脉。損當審切寸口之脉。知絕不絕。前後去。爲絕掌上相擊。堅如彈石。爲上脉虛盡。下脉尚有。是爲有胃氣。上脉盡。下脉有胃氣。上下脉皆盡者死。不絕不消者皆生。是損氣。

脈也。至之爲言。言語音沉。遠視憤憤。是志之至也。身體粗大。飲食暴多。是意之至也。語言妄見手足相引。是魄之至也。龍齒華色。是魂之至也。脈微小。不相應。呼吸自大。是神之至也。是至脉之法也。死生相應。病各得其氣者。生十得其半也。黃帝曰善。

診脉動止。投數疎數死期年月第六凡三條

脈一動一止。二日死。一經云二動一止。三日死。

三動一止。四日死。或五日死。四動一止。六日死。

五動一止。五日死。或七日死。六動一止。八日死。
七動一止。九日死。八動一止。十日死。九動一止。
九日死。又云。十日死。一經云。十日死。若立春日死。
十動一止。立夏死。一經云。三十日死。十日動一止。夏至死。
一經云。立夏死。立春死。一經云。立秋死。一經云。立
經云。立秋死。十二十三動一止。立秋死。一經云。立
冬死。十四十五動一止。立冬死。一經云。立夏死。二十動一
止。一歲死。若立秋死。二十一動一止。十一歲死。二
十五動一止。立冬死。一經云。十一歲死。三十動一止。
二歲若三歲死。三十五動一止。三歲死。四十動

一止。四歲死。五十動一止。五歲死。不滿五十動。
一止。五歲死。

脈來五十投而不止者。五藏皆受氣。卽無病。金
方云五行氣畢。陰陽數同。榮衛出入。經脈流通。晝夜百刻。五德相生。脉來四十投而一止者。一藏無氣却後四歲春草生而死。脉來三十投而一止者。二藏無氣却後三歲麥熟而死。脉來二十投而一止者。三藏無氣却後二歲桑椹赤而死。脉來十投而一止者。四藏無氣歲中死。得節不動。出清明日死遠。不出穀雨矣。

脈來五動而一止者。五藏無氣却後五日死。
脈一來而久住者宿病在心主中治。脈二來而
久住者病在肝支中治。脈三來而久住者病在
脾下中治。脈四來而久住者病在腎間中治。脈
五來而久住者病在肺支中治。五脉病虛羸人
得此者死所以然者藥不得而治針不得而及
盛人可治氣全故也。

診百病死生訣第七 凡六十九條

診傷寒熱盛脈浮大者生沉小者死。

傷寒已得汗脈沉小者生浮大者死。
溫病三四日以下不得汗脈太疾者生脈細小
難得者死不治。

溫病穰穰大熱其脈細小者死千金穰穰作時行

溫病下利腹中痛甚者死不治。

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗出脈堅強
急者生虛緩者死。

溫病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脈直
而疾者八日死四五日頭痛腹滿而吐脈來細

強トシテ十二日死。八九日頭不疼身不痛目不赤色
不变而反利。脈來牒牒按之不彈手時大心下
堅十七日死。

熱病七八日脈不軟ハリ一作不散ハラフ一作當脣。脣後
三日溫汗不出者死。

熱病七八日其脈微細小便不利。加暴口燥脈
代舌焦乾黑者死。

熱病未得汗脈盛躁疾得汗者生不得汗者難

差

熱病已得汗脈靜安者生。脈躁者難治。

熱病已得汗常太熱不去者亦死。大一作專

熱病已得汗熱未去脈來躁者慎不得刺治。

熱病發熱盛者其脈陰陽皆竭慎勿刺不汗出
必下利。

診入被風不仁癰癧其脈虛者生緊急疾者死。
診癲病虛則可治實則死。

癲疾脈實堅者生。脈沉細小者死。

癲疾脈搏大滑者不久自己其脈沉小急實不

可治小堅急亦不可療。

診頭痛目痛久視無所見者死。久視一云作卒視一云

診人大心腹積聚其脉堅強急者生虛弱者死。又實强者生沉者死其脉大腹大脹四肢逆冷甚人脉形長者死腹脹滿便血脉大時絕極下血脉小疾者死。

心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死。

腸澼便血身熱則死寒則生。

腸澼下白沫脉沉則生浮上則死。

腸澼下膿血脉懸絕大則死滑大則生腸澼之屬身熱脉不懸絕滑大者生懸濇者死以藏期之。

腸澼下膿血脉沉小流通者生數疾且大有熟者死。

腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死洞洩食不化不得留下膿血脉微小連者生緊急者死。

洩注脉緩時小結者生浮大數者死。

匿蝕陰症。其脈虛小者生。緊急者死。

欬嗽脈沉緊者死。浮直者生。浮軟者生。小沉伏

匿者死。

欬嗽羸瘦脈形堅大者死。

欬嗽脫形發熱脈小堅急者死。肌瘦下脫形熱

不去者死。

欬而嘔腹脹且洩其脈絃急欲絕者死。

吐血衄血脉滑小弱者生。實大者死。

汗出若衄其脈小滑者生。大躁者死。

唾血脉緊強者死。滑者生。

吐血而欬上氣其脈數有熱不得卧者死。

上氣脈數者死。謂其形損故也。

上氣喘息低昂其脈滑手足溫者生。脈澁四肢

寒者死。

上氣固浮腫肩息其脈大不可治。加利必死。一作甚

上氣注液其脈虛寧伏匿者生。堅强者死。

寒氣上攻脉實而順滑者生。實而逆澁則死。

大素

云寒氣暴上滿實何如。日實而滑則生，實而逆者死矣。其形盡滿何如。日卒形盡滿者，脉急大，堅。尺滿而不應如是者，順則生，逆則死。何謂順者？則生，逆者死。日所謂順者，手足溫也；謂逆者，手足寒也。

膏痺脉實大。病久可治。脉懸上堅急。病久不可治。

消渴脉數大者生。細小浮短者死。

消渴脉沉小者生。實堅大者死。

水病脉洪大者可治。微細者不可治。

水病脈閉其脉浮大軟者生。沉細虛小者死。

水病腹大如鼓。脉實者生，虛者死。
卒中惡吐血數升脉沉數細者死。浮大疾快者生。

卒中惡腹大。四脉滿。脉大而緩者生。緊大而浮者死。緊細而微者亦生。

病瘡腰脊強急癰癰者皆不可治。

寒熱癰癰其脉代絕者死。

金瘡血出太多者死。其脉虛細者生。數實大者死。

金瘡出血脉沉小者生。浮大者死。

研瘡出血

一二二十石。脉來大二十日死。

不介子口口口口口或金瘡
所刺俱有病，多少血出不自止者，七日死。滑細

者生，

從高頓作內有血。腹脹滿其脈堅强者生。小弱

者死。

人為百藥所中傷。脈浮濫而疾者生。微細者死。

洪大而遲者生。千金遲

作速

人病甚而脈不調者難差。

人病甚而脈洪者易差。

人內外俱虛。身體冷而汗出。微嘔而煩擾手足厥逆。体不得安靜者死。

脈實滿。手足寒。頭熱。春秋生。冬夏死。

老人脈微。陽羸陰強者生。脈濶大加息一作如急者死者死。

陰弱陽強脉至而代。寄元一作奇者死。

尺脉濶而堅。為血實氣虛也。其發病腹痛逆滿氣上行。此為婦人胞中絕傷。有惡血久成結瘕。得病以冬時忝。赤而死。

不脉細而微者。血氣俱不足。細而來有力者。是

穀氣不充病得節輒動棗葉生而死此病秋時得之

左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至關關至尺三部之位處處動搖各異不同其人病仲夏得之此脉桃花落花一作葉而死

沉伏浮大卽太過上出魚際沉伏卽下不至關中往來無常時時復來者榆葉枯落而死葉一作莢右手尺部脉三十動一止有頃更還二十動

止乍動乍疎連連相因不與息數相應其人雖食穀猶不食繁草生而死

左手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循直木如循張弓弦絇絇然如兩人共引一索

至立冬死

千金六作至立春而死

診三部脉虛實決死生第八九二十六條三部脉調而和者生

三部脉廢者死

三部脉虛其人長病得之死虛而濶長病亦死

虛而滑亦死。虛而緩亦死。虛而弦急，癲病亦死。
三部脈實而大，長病得之死。實而滑，長病得之生。卒病得之死。實而緩亦生。實而緊亦生。實而緊急，癲癇可治。

三部脈強非稱其人病便死。

三部脈羸非其人脈一作得之死。

三部脈羸長病得之死。卒病得之生。

三部脈細而軟長病得之生。細而數亦生。微而緊亦死。

三部脈大而數長病得之死。
三部脈微而伏長病得之死。
三部脈軟濡一作長病得之不治自愈治之死。卒病得之生。

三部脈浮而結長病得之死。浮而滑長病亦死。
浮而數長病風得之生。卒病得之死。
三部脈芤長病得之生。卒病得之死。
三部脈弦而數長病得之生。卒病得之死。
三部脈革長病得之死。卒病得之生。

三部脈堅而數。如銀釗股。蟲毒病必死。數而軟蟲毒病得之生。

三部脈澈澈。如羹上肥。長病得之死。卒病得之生。

三部脈連連。如蜘蛛絲。長病得之死。卒病得之生。

三部脈如霹靂。長病得之死。三十日死。

三部脈如弓弦。長病得之死。

三部脈累累。如貫珠。長病得之死。

三部脈如水淹。然流長病不治。自愈治之反死。

云如水流者長病二十日死。

如水不流者長病不治自愈。

三部脈如屋漏。長病十日死。

千金云十日死。

三部脈如雀啄。長病七日死。

三部脈如釜中湯沸。朝得暮死。夜半得日中死。日中得夜半死。

三部脈急切。腹間病及婉轉。腹痛針上下差。

脉經卷之四終

周易卷之四

二十一

周易卷之四

