

古訓
醫傳

風寒熱病方緯篇

宇津木益夫 著

七

209
7



武 503 止 7 卷

古訓醫傳卷二十

風寒熱病方緯篇第七

尾張

宇津木益夫 述

○辨婦人妊娠病脉證并治法第二十一

サテ男子モ婦人モ同一藏府ナレバ外ノ病ニ差別ハ十ヶ
レ凡、夕、バ、コノ妊娠ト、其外經血ヨリ起ル所ノ諸病ハ、男子
ニナキ故ニ、コノ処ニ妊娠篇ヲ出シ、次ニ雜病篇ヲ奉テ以
テ示スナリ、凡ソ經血止テヨリ、三月ニ滿ザレバ、孕ト否ト
ヲ知ルヲ難シ、千金方其外諸書ニ、候孕ノ法ヲ舉ルヲ、許多
ナリトイヘ凡、一通リノ經閉ニテモ、皆其法ノ如クニナル
者ナレバ、一概ニ妊娠ト定メ難シ、故ニ余イロク工夫シテ、

古訓醫傳

卷二十 婦人妊娠篇

一

見川千載

溫知社 圖書記

小柴胡湯ニ紫蘊橘皮香附子ヲ加エテ用ルニ若シ經閉ナ
 ラバ直ニ經水來ルカ又水ニテモ下ルカ又ハ腹痛シテ腰
 脚ダルクナルカ何事ニヨラズ衰動スルナリ又真ノ妊娠
 ナラバコノ藥ニテ胸腹和シ惡阻ノ証モ退キ食氣モ進テ
 少シモ經ノ動キナク大ニ快ク覺ユル者ナリ曰テ妊娠中
 ノ養胎ニモナルベキ様ニモ思エリ三日服用スレバ疑似
 ハ分明ニ別ルナリコレ百發百中ノ方ニシテコレマデ一
 人モコノ法ニ違フタル者ナシ其外婦人ノ血ノ道ヨリ起
 リテ心中胸腹心下迄モ氣道ヲ閉テ鬱シ彼ノ産勞ナド
 云ヤウナル証ノ始ニ用テ功ヲトレリ併シ小柴胡湯ノ証
 ト紫蘊橘皮香附子ヲ以テ氣ヲ和シ血ヲ行スベキ証ナル

コヲ夕シカニ診シテ与フベシ夕バ血ノ道トノミ聞テ暗
 投セバ何ノ功カアランヨクコレヲ察スベシ又麻仁ヲ燒
 キ霜トナシ一貼ノ目方五分ヲ日ニ三貼ツ七日用ルニ
 若シ經閉ナラバ忽チ七日ノ中ニ經水來ルト云リ初産ノ者
 ニハ別シテ妙ナルヨシ紀州ノ門人谷口元長ノ傳ナリ余
 ハ未ダ試ミサレバコノニ附載ス麻仁霜ヲ大麻楷ト云ナ
 リサテ佛書ニ妊娠スル所以ヲ委ク載タリ故ニ繁文ヲ省
 ミス左ニ記シテ三十八箇七日ノ衰ヲ知ラシム

瑜伽論云尔時父母貪愛俱極最後各出一滴濃厚精血和合
 住母胎中猶熟乳凝結依阿賴耶識即此名為羯羅藍位
 寶積經云是諸衆生託胎在母腹中三十八箇七日有二十九

種業風所吹次第成就第一七日狀如酪漿第二七日狀如凝酪第三七日狀如藥杵第四七日狀如鞋撥第五七日分頭臂脛第六七日肘膝相見第七七日手足掌現第八七日二十指現第九七日九孔方現第十七日音具足第十一七日九孔開通第十二七日生腸節孔第十三七日生飢渴想第十四七日生九萬筋第十五七日生八萬脈第十六七日通出入息第十七七日食道漸寬第十八第十九七日六根具足第二十七日徧生骨節第二十一二十二二十三七日生血肉皮第二十四二十五七日長血肉皮第二十六二十七日生髮毛爪第二十七日分善惡相第二十八七日妄生八想第二十九三十七日黑白隨業第三十一至三十六七日身相具足第三十七七日

念欲出生第三十八七日滿十箇月向母產門倒卓而生法苑珠林云三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意骨節端正莫不愛敬本行惡者則起臭風不可心意吹其骨節偏邪癭曲使不端正人所不喜又云胎中經三十八七日肢分悉皆具足從此以後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿若七月六月名不圓滿或復缺減故已上大藏一覽二出ツ三十八箇七日ノ義ハ、醫書ニハ未ダ見ザル所ナリ、是ニ由テ之ヲ觀ルニ、凡ソ二百六十六日ニシテ、出生スルハ先大體ナリ、コレ九、十箇月ニハアラズ、九、九个月ニシテ、十月ニ涉ル者ナリ、九个月ノ日數、三九二百七十日ノ内、四日ハ小

盡ノ月ニシテ、二百六十六日ナリ、又衰ニ至テハ、八月ニシ
 テ出産シ、九月モアリ、又十一个月アリ、二十三十四个月
 ノ者アリ、又武藏坊辨慶ハ、六年母胎ニアリト聞キ、老子ハ、
 八十年母胎ニ在ト云リ、人々ノ宿業ニヨリテ、一概ニハ定
 ノ難シトイヘ、凡、久シク母体ニアル者ハ、決シテ聰明ナリ、
 早く出産スル者ハ、才智劣レリ、サテ男女居室ハ、祖先ヲ祭
 ルベキ、継嗣ヲ求ル為ナレバ、風雨雷鳴、甲子消長等ノ理ニ
 違ハザル様ニシ、无病ニシテ一事モ心頭ニカケズ、心ヲ平
 穩ニシ、飽食爛醉ノ時ヲ避テ、交接スベキ者ナリ、又其交會
 スルニ時アリ、病源候論ニ曰、交會當用陽時、陽時、從夜半至
 日中、是也、以此時有子、皆聰明長壽、勿用陰時、陰時、從午至亥、

有子皆頑暗、而短命、切宜、審詳之、凡、婦人月候來時、候一日至
 三日、子門開、若交會、則有子、過四日、則閉、便无子也、ト云リ、又
 或蘭家ノ説ヲ聞シニ、子宮ノ兩傍ニ子宮ヨリ連リテ、卵巢
 ト云物アリ、コノ卵巢ニハ、人ノ子種、蒲萄ノ叢生シタル如
 クニ連レリ、サテ父母交接ノ時、父精子宮ニ射入シテ、彼ノ
 卵巢ヲ彈ジテ中ル片ハ、其蒲萄ノ如キ子種落テ、子宮中ニ
 留ル、コレニテ父精ノ用ハ畢リ、ソレヨリ母血ヲ以テ、コノ
 子種ヲ培養シテ、月滿テ生ル、ナリ、若シ交接ノ時、父精子
 宮ニ射入セズシテ、傍ニ至リ、又射入シテモ、力弱クシテ、彼
 ノ卵巢ヲ彈ジテ、子種ヲシテ、母ハ子宮ニ落在セシムル
 能ハザルモアリ、又父精ノ勢力強シトイヘ、凡、子宮ノ口開

カズシテ、傍ニ流レ、或ハ病ニヨリテ、子宮上ニ居シ、又ハア
 マリ下リ過ギ、又ハ父精ノ漏ルヲ早クシテ、子宮ニ達セズ、
 又月水後ニアラザレバ、子宮開キ難キ故、交接シテモ無用
 ノ快美ノミニシテ、子種ヲ裁ルニ至ラズト云リ、又男女俱
 ニ多淫ニシテ、徒ラニ快美ノミヲ心ニ存シテ、子種ヲ種ル
 ニ心ナキ者等ハ、実ニ子ヲ得ルヲ能ハズ、タトヒ子ヲ得テ
 モ、胎動アリテ、出生ノ後、驚風胎毒、其外多病ニシテ、生長ス
 ルヲ能ハズ、故ニ前ニモ示シタル如ク、交會ヲ謹ムハ勿論、
 妊娠シタル後ニテモ、胎養ヲ大事ニシテ、賢良ノ子ヲ得べ
 キ者ナリ、胎養ノ一、千金方ニ委シク載セタレ、凡繁文ナレ
 バコ、ニ奉ズ、本書ニ就テ會得スベシ、

□師曰、婦人得平脉、陰脉小弱、其人渴不能食、无寒热、名妊娠、
 桂枝湯主之、於法六十日、當有此証、設有医治逆者、則絶之、
 千金方、惡阻論ニ曰、何以知婦人妊娠、脉平而虛者、乳子法也、
 トアリ、即チ此平脉ヲ得テ、陰脉ノ小弱ナルガ、平而虛者ナ
 リ、コレ惡阻ノ症ナレバ、内ニ血ヲ貯エテ、血熱ノ為ニ渴ヲ
 生ズルナリ、一通リノ渴ナレバ、食ハ引ベキニ、コノ渴ハ、内
 ニ貯ル所ノ血ノ所為ヨリ起ルトイヘ、凡其為ニ氣逆上衝
 シテ、皮表ニ迫ル所アリテ、水モツレテ外行シテ、裏ニメグ
 ラヌ故ニ、渴不能食ナリ、コレ内ノ血熱上行シテ、表ニ迫ル
 故ナリ、依テ邪熱ノ裏ニ伏シタルニ非ルヲ以テ、无寒热ト
 云テ、病邪ノ為ニ渴シテ不能食者ニアラズ、妊娠ニテ此ノ

如クニナルト云ヲ徴シテ、无寒熱名妊娠ト云リ、故ニ桂枝湯ヲ以テ、気逆上衝ヲ和スレバ、气和シ水下ニメグリテ、渴止ミ食モ收ルナリ、イヨク胸ニ衰ヲ生ズルニ至ルノ惡阻ハ、各其証ニ随テ、方ヲ處スベケレ、凡先妊ノ初ニ、コノ桂枝湯ヲ用ルハ大ニ妙ナリ、サテイツノ頃ヨリカ、妊娠ニハ桂枝ヲ忌ムト云テ、其証ノアル者ニモ用ヒザルノ弊アリ、コレ等ノ症ニハ、イカ、方ヲ處スルヤ、大ニ心得違ノ事ナリ、サテ以上ノ証ハ、受胎ヨリ、凡ソ六十日バカリニシテ出ル者ナリ、若コノ証ヲ内熱ニテ不食シテ、渴スル者ナリト思テ、治療ノ逆ヲナス片ハ、必ズ随胎スルナリ、故ニ設有醫治逆者、則絶之ト云リ、コノ六十日ノ頃ハ、七日ノ八ツ九ツ重

ナリタル日数ニシテ、未ダ妊娠トモ決定セザル間ナリ、産家ノ説ニモ、八十四日ヲ過ガレバ、決定シ難シト云リ、八十四日ハ、七日ヲ十二重子タル日数ナリ、コレ等ノ日数ノ互ニヨク符合スルヲハ、皆実病ニ徴シタル故ナリ、コノニ其人トアルモ、渴不能食ノ証ハ、外ノ病ニモ多ケレバナリ、前ニモ示シタル如ク、余ガ家ニテハ、妊娠ニテモ、又ハ疑似ノ間ニテモ、小柴胡湯ニ紫蘇橘皮香附子ヲ加テ用ルニ、惡阻ナド頓ニ止シテ、養胎モ其中ニアル様ニ思エリ、トクト試テ知ルベシ、サテ千金方ノ脉平而虛者ト、平脉ニシテ陰脉ノ小弱ナルト、同ジトニシテ、无病ノ脉ナル様ニハアラザレ、凡太陽中風ノ桂枝湯ノ陽浮而陰弱ニ比スレバ、表証ハ

ナキ様ニ見エテ桂枝湯ヲ服スルニハ及バザル様ニ思エ
リ故ニ誰アリテコノ証ニ桂枝湯ヲ与テトクト試ミタル
人ナシ由テ再ビコレヲ論ジテコノ証ノ十分明ナル主意
ヲ示スベシサテ平脈ニテ陰脈ノ小弱ナル所以ヲトクト
察スルニ内ニ滯ル所アリテ血分ノ行ラザル脈ナリ血分
行ラザルガ故ニ血熱ヲ生ジテ渴ヲナスコレ小弱ノ脈ノ
アラハル、所以ナリ時ニ内熱アリテ渴スル者ハ食ヲ引
ガ當リ前ナレ氏今コノ証ハ病ニ非ズ夕、妊娠シテ血下
ニ聚リ氣上行シテ来ル者ニシテ邪熱ニアラス故ニ食ヲ
引ザルナリ若邪熱アリテ不能食者ナラバ多クハ胸腹ニ
凌アリテ少陽柴胡ノ症ヲアラハス者ナレ氏コレハ妊娠

ニテ下ニ血ノ聚ルヨリ氣逆上衝スレ氏輕キ者ナレバ往
来寒熱ノ証ナシコレヲ名妊娠ト云リ右ノ如ク陰弱陽盛
ノ勢ヲ脈ニアラハシテ渴不能食ノ病状ヲニスルノミナ
レ氏コノ俦ニテ捨置バ他ノ病ヲ生ジテ種々ノ疾病ノ発
セシモ計リ難シ陰弱ノ者ハ氣必ス外行スル故ニ桂枝湯
ヲ以テ氣ノ外行ヲ和スレバ、所不能食ノ氣ニツレテ上リ
タル水カ渴スル所ノ下ノ血ニ行リテ和スルナリ故ニ桂
枝湯主之ト云リ必ス他ノ擊劑ヲ用テ逆ヲナシテ絶セヌ
様ニスベシトナリ又絶之ト云ヲ惡阻ノ症ニ桂枝湯ニテ
モ用テ吐スル者ハ休薬シテ見合スルヲナリト解シタル
説モアリ論注ノ評ニ絶之者謂止_ヲ醫治_ヲ也トアリコレ亦証

ニヨリテ斟酌スベシ、

○婦人宿有癥病、經斷未及三月、而得漏下不止、胎動在臍上者、為癥瘕、害妊娠、所以血不止者、其癥不去故也、當下其癥、桂枝茯苓丸主之、

コレハ平生ヨリ血塊ノアル婦人が、妊娠シタルナリ、故ニ宿有癥病ト云リ、宿トハ、八条目ニ所言宿ニシテ、平生ニアル持病ナリ、時ニ其婦人が受胎シテ、妊娠ニナリテ、經水ノ断テヨリ、未ダ三ヶ月ヲ過ガルニ、經水漏下シテ止ズ、故ニ流産スル者カト思フニ、左ニアラズシテ、胎ハ臍上ニアリテ動キ、月經ハ漏テ止ザル者ナリ、コレハ折角妊娠シテモ、宿ニアル所ノ癥瘕、血塊ノ為ニ支ヘラレテ、下ニ月經ノ漏

ルニツヒテ、胎ヲ安養スルヲ能ハザル故ニ、胎ハ動テ臍上ニアルナリ、コレ癥ノ為ニ漏下スル所ノ血ニシテ、妊娠ノ害ヲナス者ナレバ、先コノ癥ヲ去テ、胎ヲ安ンズベキナリ、故ニ所以血不止者、其癥不去故也、當下其癥、桂枝茯苓丸主之ト云リ、時ニ癥瘕ト云瘕ノ字ハ、久シク凝結畜積シタル血塊ト云意ナリ、此ノ如ク宿ニ久シクアル所ノ癥ガ、一應下シテ去ルベキヤ、コレ大ニ疑シキ者ナリ、若コノ癥ノ為ニ、下血ノ止ザル者ニテモ、胎動臍上ヨリ臍下ニ下ル片ハ、必ズ流産ノ患アリ、唯臍上ニ胎動シテ、下血ノ止ザル者ノミ、コノ桂枝茯苓丸ニテ下スベキナリ、然レハ癥ヲ去ニツケテ、經血モ俱ニ下ル片ハ、後ノ胞阻ノ症ニ陥ンモ計リ

難シ、忘ニヨリテハ癥ハ其俛ニシテ、早ク下血ヲ止テ、胎ヲ
 ヨク養ヒ安ンジテ、分娩ノ後ニ、其癥ヲ下ス、詎モアリ、又癥
 ハナケレ、疝、狗兒胎、俗ニ畜生孕ミト云テ、妊娠シテ五、六、个
 月迄モ、經行ノアル者アリ、コレ等ノ忘モ、永ク經行アリテ
 ハ、何レ妊娠ノ害ニナラヌト云フハ、アルマ、ジケレバ、早ク
 經ノ收ルヤウニスベシ、コノ条癥ヲ下スヲ目當トスレ、疝
 妊娠中ト云ヒ、急度下ルベキトハ云難シ、ヨク勘辨シテ、下
 シテ下ル物カ、下ルニツケテ流産セヌカ、又ハ其俛ニテ、經
 血ヲ收メテ後ニ、治ヲ施スベキ者カト云、処ヲ、ヨク診別シ
 テ、其決定ヲ以テ、コノ丸ヲ与フベキナリ、コノ詎、虛実アレ
 バ、加大黃ニシテ用ルモアリ、又加附子ニシテ用ルモアリ、

其外各詎ニ随テ加減スベシ、前条ニモ云タル如ク、妊娠ニ
 ハ桂枝ヲ忌ト世上ニハイヘ、疝、コノ篇ノ第一、第二、个条ト
 モニ、桂枝ヲ用テ主トセリ、世医コレヲ何如トカ看ル、ヨク
 く三思スベシ、サテ坊本ニハ、六月動者、前三月經水利時、胎
 下血者、後断三月不血也、ノ、二十二字アリ、シカレ、疝、脱落ニ
 テモアルカ、通ゼサル故ニ、コノ本条ニハ、削リ去タリ、又論
 註ニハ、胎ノ字ノ下ニ也ノ字アリ、不血ノ二字ヲ合シテ、血
 ニ作レリ、コレ胎ト血トヲ差別シテ、立タル説ニシテ、大ニ
 心得ニナルコトアレバ、コノ論注ヲ引テ、其理ヲ知ラシム、
 ヨク彼此相合シテ、種々ノ詎アルコトヲ察スベシ、曰、婦人宿
 有癥病、舊血積聚之邪也、忽而經断、未及三月、忽爾經血至、且

得漏下不止之志、以為胎墮乎、胎固在腹中、但動而不安、有欲
 隨之機矣、是癥之為病、而累及于胎者、如癥在臍下、邪居于下、
 可以隨血漏而癥散、止漏安胎、病去胎全矣、如癥在臍上、邪居
 于上、雖血漏不止、而癥自沈、名為癥瘕、勢必令胎中之氣血
 先隨血漏而墜、所以可決其害將及于妊娠也、此就宿血積聚
 居于胎之上下、以下血漏不止、有無碍妊娠之義也、コレ迄
 ハ本条ニ奉ル所ト同シ義ナリ、又曰、再或妊娠六月矣、胎忽
 動者、此亦宿血癥瘕所致、又當明辨其孰為正胎、孰為癥邪、而
 治之、前三月之間、經水順利、得其正道、无胎志行、則行、有胎志
 止、即止、此胎之心也、至三月以後、邪癥為患、忽而漏血不止、此
 血非關胎血、乃斷經之後、三月之間、閉而未行、于邪癥之所在、

必加添積聚、成爲血衄、所以漏下不止、而自与胎不相涉也、惟
 久々不止、方害及于胎耳、血不止而癥瘕不去、必累害于胎、故
 言當下其癥也、ト云リ、論注ノ説モ一理アリ、病ノ変化ハ、一
 定ナラザル者ナレバ、此ノ如クニ見ルモ可ナリ、評注ニ曰、
 胎与衄之辨、當于血未断之前三月、求之、前三月經水順利、則
 經断必是胎、前三月有曾經下血者、則經断必成衄、此説較前
 註之説、明暢易曉、附載于此、以質高明、ト云ルヲモ見較ベテ、
 コノ条ノ義ヲ尽スベシ、

○婦人懷娠、六七月、脉弦、發熱、其胎愈脹、腹痛、惡寒者、小腹如
 扇、所以然者、子藏閉故也、當以附子湯温其藏、

夫惡寒發熱ハ、表位ノ病状ニシテ、弦ハ表位ノ脉ニアラス、

其胎愈脹シテ、腹痛スル者ナリ、懐妊六七月ニ至リテ、此ノ如キ証ヲ発スル者ハ、コレ懐妊ニテ、下部ノ水血行ラズシテ、陽氣ノビガル故ニ、十分表位ヘ行ルヲ能ハガル者ナリ、表位ニシテ、陰血ノ証ナレバ、少陰病ノ候ナリ、サテ小腹堅ク閉テ、板ノ如クニナル証ナリ、故ニ少腹如扇ト云リ、コノ扇ハ、團扇ノ扇ニアラス、門扇ノ扇ニシテ、開闔ノ扉ヲ云ナリ、コレ陰寒閉藏シテ、少腹如扇ナル証ナレバ、発熱ハ、麻黄附子細辛湯ノ発熱、惡寒ハ、素ヨリ附子湯ノ惡寒ニシテ、陰血行ラズシテ、水氣ヲモ閉タル証ナレバ、所以然者、子藏閉故也ト云リ、コノ閉ノ字ヲ、開ノ字ニ作ルハ、傳寫ノ誤ナリ、附子湯ヲ以テ、其藏ヲ温ムベキ、陰寒虛寒ノ者ナレバ、子藏

ノ開クト云フハ、決シテアルマジキ理ナリ、故ニ閉ノ字ニ改メタリ、コレマデノ註者、開ノ字ノ傍ニテ解シタルハ、病者ヲ親驗セザル故ト見エタリ、コレ妊娠中ノ虛寒ニ涉ル証ニシテ、勞証ノ如ク、至テ疲勞ノ強キ者ナリ、方未見トアレ、氏始ヨリ少陰病ニ属スル証ナレバ、少陰篇ノ附子湯ヲ以テ、其子藏ヲ温ムベキ者ナリ、

○婦人、有漏下者、有半産後因繞下血都不絶者、有妊娠下血者、假令妊娠腹中痛、為胞阻、膠艾湯主之、

コノ条ハ、上ノ条ヲ受テ出シタルナリ、サテ子藏開ケテ、經血ノシマリヲ失フテ、漏下スル者アリ、コレハ妊娠ニアラズシテ、漏下スル者ナリ、又流産シテヨリ、繞テ血下リテ、都

テ絶ヘザル者アリ、又妊娠ニシテ血ヲ下ス者アリ、コノ三種ハ、共ニ下部ニ陽氣ノ不順ハアレ、凡主ニアラズ、タゞ下部ノ血ニシマリノナキ証ナリ、殊ニコノ妊娠ニシテ、下血スル者ハ、前々ノ証ノ如ク、癥瘕ノ為ニ、漏下ノ止ザル者ニハアラズ、タゞ下部ノ虚寒ニテ、此ノ如キ証ヲアラハス者ナレバ、第一ニ血ヲ救フテ、下部ニシマリヲツクベキナリ、妊娠ニテ此ノ如キ証ヲアラハス者ハ、大ニ心勞スル者ナリ、因テ又其候ヲ示シテ、假令妊娠ニシテ、腹中痛ミ、下血スル者ヲ、胞阻ト名クルナリ、コレ芍飯膠艾湯ノ主ル証ナリ、至テ危萬ニ及ブ証ナレバ、早ク治スベキナリ、コレ亦虚寒ニ属スル証ナレ、凡前条ト、コノ条トハ、氣ト血トノ差別ヲ

察スベシ、按スルニ病源候論、妊娠漏胞候ニ云、衝任氣虚、則胞内泄漏、不能制其經血、故月水時下、亦名胞阻、漏血、凡則人斃也ト云ルハ、全クコノ膠艾湯ノカ、ル、漏胞胞阻ノ候ニ疑ナシ、又千金方、膠艾湯、治妊娠二三月、上至七八月、其人頓仆失踞、胎動不下、傷損腰腹、痛欲死、若有所見、及胎奔上、搶心短氣トアリ、凡ソ何病ニテモ、定リタル病名ニ、定リタル藥方ノナキ者ナレバ、我知ラザル所ノ病ヨリ、知レル病ニ至ルマデ、定リナキ中ニ、定リノアル所ヲ、病名病状ニ拘ラズシテ、理ヲ考テ方ヲ處スベキナリ、コノ細注ニ、一方加干姜一兩トアリ、コレ下虚シ上益下降セザル故ニ、干姜ヲ加エタルナリ、胡氏治婦人胞動、无干姜ト云リ、コレハ干姜ヲ用

ル、七陽ノ処ニテ至ラザルナリ、胡氏ハ名ハ洽ト云人也、

○婦人、懷妊、腹中疝痛、當飯芍藥湯主之、

サテ懷妊ハ、元ヨリ水血胞内ニ集リテ、胎ヲ養フ者ナレバ、
動モスレバ其水血和セズシテ、腹中疝痛ヲナスナリ、疝痛
トハ、俗ニウ子ク痛ト云コレナリ、字典ニ、疝又作疝、音絞、說
文ニ、腹中急也トアリ、廣韻ニ、腹中急痛トアリ、方書ニ、穢氣
感觸邪熱而發之病トアリ、音膠トモアリ、音憫トモアリテ、
小痛ナリト云リ、コレ多クハ右ノ腹腹ヨリ、心胸ニ迫リ、下
ハ小腹ニ至ルマデ、水血和セズシテ、痛ム者ナリ、皆右ノ方
ヲ主トシテ用ユベシ、同ジ腹痛ニテモ、左リハ柴胡ノ力、
ル者ナリ、真中ハ建中湯ノ痛ナリ、柴胡ト、コノ當飯芍藥湯

トハ、上心胸マデニモ及ブナリ、小建中湯ハ、腹中ノミナリ、
又上ニ及ブ片ハ、轉寢ニヨリテ、大建中湯カ、又半夏瀉心湯
ノカ、ル者モアリ、コレ同ジ腹痛ニモ、左右上下ニテ、少シ
ヅ、ノ差別アルヲ察スベシ、コノ方ハ、至テ活用多クシテ、
一切ノ打撲驚動ヨリ、右ノ胸腹ヘサシコシ、心胸咽喉マデ
モ、迫リテ痛シ、息モ留ルヤウニ覺ユ、或ハ水血堅凝シテ、塊
物ヲ生ジテ、痛ム等マデ、コトクク水血ノ凝結ヲ解散シテ、
痛ヲユルメルヲ、實ニ奇妙ナリ、若シ水血ノ凝結ノ甚シキ
証ニハ、人參ヲ加ユ、又瘀血ノアル者ニハ、大黃ヲ加ユ、背部
マデモ徹シテ凝ル者ニハ、葛根ヲ加フベシ、男女共ニ、水血
ノ凝リヲ目當トシ、右ノ方ヲ主トシテ用ユベシ、左ノ方ニ

ハ少シモ功ナシ、三因方、腹痛下利治法ノ条ニ、コノ當飯芍
 藥散ヲ奉タリ、其文ニ曰、治妊娠、腹中絞痛、心下急滿、及産後、
 血暈、内壅、気乏、崩中、久痢、常服通暢血脉、不生瘡瘍、消痰養胃、
 明目益津トアリ、其方後ニ、元和紀用經云、本六気経緯圓能
 祛風補勞、養真陽、退邪熱、緩中安和心志、潤沢容色、散邪寒温
 瘴時疫、安期先生、賜李小君、久餌之藥、後仲景増減、為婦人懷
 妊腹痛、本方用芍藥四兩、沢瀉、茯苓、川芎各一兩、當飯白朮各二兩
 可以蜜為丸服ト云リ、實ニコノ方ハ、活用廣クシテ、神仙ノ
 傳方ナルヲ疑ナシ、余モコレヲテ一切腹中ニ、水血ノ凝リ
 タル証ニ用テ、毎々功ヲ得タリ、散藥丸藥ニシ用ルヨリハ、
 煎湯ノ方大ニ功アリ、故ニ當飯芍藥湯ト改ム、

○妊娠、嘔吐不止、干姜人參半夏丸主之、

コノ方ハ、惡阻ニシテ嘔吐スル者、又月ヲ重子テ、惡阻收リ
 テ後嘔吐スル者ニモ用テ功アリ、コレ胸中ニ水飲痰飲等
 アリテ、ソレガ為ニ嘔吐スル者ナリ、

○妊娠、小便難、飲食如故、當飯貝母苦參丸主之、男子加滑石半兩

凡ソ妊娠中ニハ、小便難、或ハ頻數ヲ患ル者多シ、コレ血分
 和セザルガ為ニ、夕バ小便ノ通ジ難キノミニシテ、内ニ水
 氣ヲ貯ルヲナキヲ以テ、胸中ニ水飲ノ迫ルヲナシ、故ニ飲
 食如故ナリ、コレ當飯貝母苦參丸ノ主ル症ナリ、當飯苦參
 ハ、血分ニカ、リ、貝母ハ、血ノ為ニ水ノ動カザルヲ和ス、白
 散ノ貝母ヲモ、併セ考フベシ、

○妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩葵子茯苓散主之

コノ証ハ妊娠ニシテ水氣アリテ惣身ノ皮肉ニタマル故ニ身重クナリ皮肉中ニタマリテ下降セザル故ニ小便不利ナリ其上表外ノ陽氣皮表ノ水ノ為ニメグラズシテ洒淅惡寒スルナリ洒淅ノ字ヲ入タルハ其表外ノ水氣ニテ皮表ノヒヤクスルヲ云タルナリ水氣上ナリ表ナリヘ動キ上リテ小便ノ通セザル症ナレバ起ツ片ハ水氣ナチ上ニ動テ頭眩スルナリ方中ノ葵子ハヨク血中ノ水ヲ和シテ小便ニ通ズル功アリ茯苓ト相伍シテ上行外迫スル水ヲ和シ血分ト共ニ和合セシムルナリ方後ニ小便利則愈

トアルハコノ藥ヲ用テ小便ヲ利スベシ小便サヘ利スレバ愈ルト云タルナリサテ妊娠中ニハ水氣ノアル者至テ多シ其症一ナラズ惣身滿腫シ渴ヲ帶テ小便利セザル者ニ猪苓湯ノ症アリ其上ニ血熱甚シク渴愈甚シクシテ石羔ヲ加ル症アリ又越婢加朮湯ノ証アリ又水上ニ盛ニシテ心下ニ塊物アリテ水ヲ支エテ通利セシメザル者ニ木防已湯加減ノ証アリ或ハ赤小豆高陸湯ノ証アリ又三因方ノ腎着湯ノ証アリ甘姜苓朮湯ニ杏仁ヲ加ル証アリ其外虛実一定ナラザレバ分娩スレバ七夜ノ内ニ小便ヨク通利シテ頓ニ腫ノ去ル者多シ産後ニ至リテ水氣ノ去ザル者ハ妊娠中ノ水氣トハ少シク治シ難シ血分ノ為ニ水

ヲ帶テ、大ニ腫ル者アレバ、水ヨリ先ニ通ズベキ者カ、血ヨリ先ニ和スベキ者カ、又ハ水血共ニ和スベキカノ処ヲ、ヨク診シテ、辨明スベキ者ナリ、

○婦人、妊娠、宜常服、當飯散主之、

コレ別ニ何ノ病状ヲモ示サズシテ、妊娠ノ者ニ、常ニ服スベシト、バカリニテハ、トント无差別ナルヲナリ、然レ、凡ヨクコノ藥味ヲ考ルニ、前ノ當飯芍藥湯ノ、茯苓沢瀉ヲ去テ、黄芩ヲ加エタル方ナレバ、水氣ノ衰ハ少フシテ、血分ノ不和ヲ主トシタル方ナリ、故ニ常ニ服シタラバ、ヨク血ヲ和シテ、水氣モツレテ和スベキ者ナリ、萬病回春ニハ、コノ方ヲ、安胎丸ト名ケテ用ヒタリ、コレ平生ニ服シヤスキ為ナ

ルベキカ、彼ノ後世ニ一切血分ヲ主トシテ用ル所ノ、四物湯ノ、地黄ヲ去テ、黄芩白朮ヲ加エタル所ヲ、ヨク味フテ、コノ方ノ主意ヲ知ルベシ、方後ニ、妊娠、常服、易産、胎ニ苦疾、産後百病主之トテ、コノ一方ニテ、産前後ヲ残ラズ主ルヤウニ書キタルハ、餘リナルヲナレ、凡、産前常服シテ、无病、又産モ至テ安易ナラバ、何ノ苦疾カアラン、然ラバ産後ノ種々ノ病状モアルマジク思フ、意ヲ以テ此ノ如クニ書シナラシ、ヨク意ヲ迎テ解スベシ、

○妊娠、養胎、白朮散主之、

コレモ、上ノ条ト同ク、病状ヲ出サズシテ、養胎トバカリ云リ、コレハ血分ノ方ハ少フシテ、水ノ滯ルヲ主トシテ和

スル方ナリ、殊ニ血分ノ為ニ、陽氣ノ乏シキ所ヲ温ムル、蜀椒ヲ白朮牡蠣ニ組テ、水氣ヲ和シテ、血ノ凝結セザル様トノ處ヲ主トシタルナラン、然レ凡方後ニ、水血ノ兼証ニヨリテ、各加減ヲナスヲ示シタリ、後世ニ中条流ト云産家アリ、本味ト云一方ヲ立テ、其一方ニ加減シテ、産前産後ノ諸病ヲ自由ニ取り扱フト云リ、其中条流ノ主意ノ出タル根源ハ、コノ条ナランカト思エリ、方後ノ腹痛ハ、血ノ拘攣スルヨリ来ル者カ、何レ血分ニカ、ル腹痛ト見エタリ、故ニ芍薬ヲ加ルナリ、心下毒痛トハ、ワルクク心ノ不快ナル痛ヲ云ナリ、毒ノ字ハ、瘀血ナドノ、堅ク凝リ迫ル意ヲモ含シテ見ルベシ、同ジ血ニカ、ル薬味ナレ、凡、芍窮ト、芍薬ト

ノ、差別ノアルヲ察スベシ、心煩吐痛、不能食飲トハ、今一段陽氣シマリテ、水血和セザル片ハ、陽氣心胸ニ迫リテ煩シ、水ヲ貯エテ吐シタリ、痛ダリシテ、食飲スルヲ能ハザルナリ、故ニ細辛ニテ、水血ノカラム處ヲ和シ、陽氣ヲ引ノバシ、半夏ヲ以テ、吐スル所ノ水ヲサバクナリ、醋漿水、又ハ小麦汁、大麦粥等ハ、何レ妊娠中ノヲナレバ、動モスレバ、惡阻ノ餘波アリテ、嘔吐又ハ渴ヲ生スル者多ケレバ、ヨク病人ノ受ヨク飲ム様ニトノ心得ナリ、コレ等ノ處モ、一ノ治術ナレバ、平易ニ看過スルヲ勿レ、

○婦人、傷胎、懷妊、腹滿、不得小便、從腰以下、重如有水氣狀、此心氣實、當刺瀉勞宮及關元、小便微利則愈、

コレハ妊娠中ニ高キ処ヨリ落チ、或ハ物ニ躓キテ仆レ、又ハ驚ク_テアリテ、腹ヲ動搖シ、其外何事ニヨラス、心氣ヲ勞シテ、腹中堅ク、水氣シマリテ腫レ、手足腰膝、腹背、心胸ニテモ、拘牽疼痛スル者等、皆顛仆カ、又ハ打撲ヨリ来ル者ナリ、殊ニ尻餅_ヒヲツク_テ、至テ惡シ、甚シケレバ、随胎スル者ナリ、何レ右ノ如ク、胎乍チニ驚動シテ、水氣モ俱ニ行ラザルガ故ニ、腹滿シテ、小便不利トナルナリ、或ハ心胸ニ氣凝テサシコミ、又ハ呼吸ニサハリテ痛ム者アリ、腰以下ハ氣通ゼザル故ニ、水氣ニス_ク溜リテ、重ク腫ヲ帯ルナリ、コレ實ニ水氣アリテ、腫ヲナス者アレバ、元ヨリノ水氣病ニ非ル故ニ、_{下有}水氣狀ト云リ、コレ驚動ヨリ起ル所ノ者ニシテ、殊

ニ懷身ノ者故ニ、心氣ノ迫リ強ク、腹以下并ニ胎モ動カザル様ニナリ、下部重クシテ、心氣ノ實シタル処主トナレリ、故ニ勞宮ト、関元トヲ針シ、泻法ヲ行ヒ、心氣開キ水氣行リテ、小便通ズレバ治スルナリ、微利トアレバ、其証ニヨリテ大ニ腫タルハ、大ニ利シ、少シク腫タルハ、微シク利シテ治スルナリ、按スルニ勞宮ハ、掌中ニアリ、指ヲ屈シテ之ヲ取ル、中指无名指ノ間コレナリ、心胞經ノ穴ナリ、サテ傷胎ノ者ハ、多クハ随胎スル者ニシテ、皆平生心ノ用ヒ様ノ、忽カセナル処ヨリ起ル_テナレバ、ヨク_ク慎テ、起居ヲ大事ニシ、其外入房ヲ慎テ、胎動ヲ生ズル_テ勿レト、戒メ置クベキナリ、サテ藥方ヲ處スルニ至テハ、打撲ニテ、水血ノカラミ

夕ルハ、當飯芍藥湯ノ証、又大ニ腫テ腹滿シ、心中心下共ニ
堅ク凝テ、短氣ノ者ハ、木防己湯ノカ、ル者ナリ、

以上、婦人妊娠病篇、通計十一條ヲ以テ、妊娠中ノ諸証ヲ明

ムルトイヘ、凡、惡阻ノ嘔吐ニカ、ル方ナドハ、唯一方ニシ

テ甚以テ乏シケレバ、外臺千金等ニ依テ、補フベキ者ナリ、

コ、ニコレヲ畧ス、

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

○辨婦人産後病脉證并治法第二十二

サテ臨産ニ至テハ、種々ノ変動アリテ、乍ニ死生ノ判ル、

者ナレバ、大ニ小心ヲ加フベキ者ナリ、臨産ニ危篤ニ及ブ

片ハ、大ヲ助ケ小ヲ棄ルノ意ニテ、鉄鈎ヲ以テ、小兒ヲ鈎出

シテ、母ヲノミ助ケシガ、今門人水原博ガ、母子共ニ全シテ、

分娩スルノ一術出来セリ、コレニ因テ以後天下ノ産難

ヲ救フベシ、委クハ水原ガ著セシ、探領圖訣ニアリ、ヨクク

脩練シテ、産難ヲ救フベシ、或ハ少シノ風寒ニ侵サレ、頭痛

發熱シ、又ハ咳嗽等ヲ患ル寂中ニ、分娩スル片ハ、其為ニ腹

ヲ大ニ引上ラレテ、大ニ悩ム者ナリ、故ニ少シキ外邪トイ

ヘ、凡、産前ニ早ク發散シテ、産後ノ患ヲ預メ處スベキ者ナ

リ、又産後ノ養生全カラザルハ、生涯ノ患ヲ遺ス者ナレバ、ヨク處置調攝シテ、病苦ヲ免ルベキヤウニナサシムベキナリ、

口問曰、新産婦人、有三病、一者病瘧、二者病爵冒、三者大便難、何謂也、師曰、新産血虚、多汗出、喜中風、故令病瘧、亡血復汗、寒多、故令爵冒、亡津液、胃燥、故大便難、

ソレ産後ノ諸病許多ナリトイヘ、凡先瘧ト、爵冒ト、大便難トノ、三種ヲアゲ示シテ、衰化ノ大意ヲ知ラシムルナリ、新産ノ婦人、暴カニ血下リ、努力シテ、氣逆シ、慙身汗ヲ出ス、故ニ衣被ヲ発揭シテ、度々風ニ中リ、外ヨリ抑エラル、勢ト、上部ニ迫ル所ノ氣ト相激シテ、忽ニ角弓反張スル者アリ、

又新ニ血虚シテ、上下升降セザルヨリ、上ニ衝突シテ、瘧ヲ発スルアリ、又外邪ヲ受テ、熱氣ノアル者ガ、新ニ産シテ、血下ニ虚シ、氣上ニ迫リテ、瘧ヲ発スル者アリ、其外種々ノ衰ニヨリテ、瘧ヲ発スル者ナレバ、其人々ニ就テ診別スベシ、何レ皆血虚シテ、上表ニ衰ヲ生ズルヨリ、發スル病ナリ、瘧トハ、瘧濕喝菴ニ説タル如ク、角弓反張スルヲ云、サテ又爵冒トハ、物ニテ覆蔽シタルガ如ク、氣分ヲ塞キ、言語ヲ發スルニ懶ク、甚シキニ至テハ、閉塞シテ引込ル、様ニナルナリ、瘧病ノ如ク、勢強クシテ反張スルハ、ナク、陰虚下陷シテ、精神モ内ニ引込ル、形状ナリ、コレ新産ニテ、亡血シテ血メグラズ、カ息ノ勢ニテ、汗ヲ發スル処ヨリ、一身ノ血引

シマリテ、上ヨリ物ヲ覆蔽シタルガ如クニナルナリ、又臨
 産ニ努力ヲ助ントテ、糜粥又ハ茶漬ノ類ヲ食セシメ、其飲
 食ノ消化セザル内ニ、新ニ産シテ、下ノ虚スル処ヨリ、衝氣
 其水穀ヲ心胸間ニ引シメテ、冒ヲ発スル者アリ、又其水穀
 ノ為ニ、冒ヲ発スルヲ恐レテ、飢ヲ忍ンデ産セシニ、産セシ
 ヨリ、下虚ノ氣、心胸以下ニ衝突シテ、発スル者アリ、其外頭
 暈目眩ヲ帯ル証多クアリ、寒トハ、閉塞緊約ノ意ナリ、サテ
 又新ニ産シテ、水血下ニヌケ、又ハ氣ハ上逆シテ、津液汗ニ
 出テ、胃中燥ク故ニ、大便難ヲ患ルアリ、以上ノ症ハ、皆産褥
 ニアリテ、即今ノ衰ナリ、其外脱血、暴血崩漏等ノ証、枚挙ニ
 遑アラズ、ヨク其時ニ臨ンデ處置スベシ、コレト其詳ナル

一八、水原ガ探額圖訣ニアリ、
 □産婦、蔚冒、其脉微弱、嘔不能食、大便反坚、但頭汗出、所以然者、

血虚而厥、々而必冒、々家欲解、必大汗出、以血虚下厥、孤陽上
 出、故頭汗出、所以産婦喜汗出者、亡陰血虚、陽氣獨盛、故當汗
 出、陰陽乃復、

コレ上ノ条ヲ受テ、コノ条ニ於テ、其病ノ発スル所以ヲ示
 シタルナリ、サテ産婦ノ蔚冒ハ、新ニ血虚シテ、津液ヲ亡シ、
 上逆ノ甚シキヨリ来ル故ニ、其脉力ナクシテ、微弱ナリ、又
 蔚冒シテ、水穀胸中ニ滯ル故ニ、不能食ナリ、脉微弱ニシテ、
 食スルヲ能ハザル者ハ、実証ニハアラザレ、凡、津液亡ビテ、
 胃中燥ク故ニ、大便ハ反テ坚シテ、上逆ノ勢ニテ、但頭汗出

ナリ、時ニ其由来ヲ説テ、所以然者ハ、新ニ産シテ血虚ス、血虚スレバ、一身ノ陽気モ、亦順接セズシテ厥ス、厥スレバ水血行ラズシテ、必冒ヲ発スルナリ、コレ血虚ニツレテ、一身ノ陽気モ共ニ不順ニシテ、冒ヲ発スルナリ、コノ厥ノ証ハ、寒戦ヲ発スルナリ、サテ冒家ノ証ハ、気血順接ヲ得ザレバ、解シ難シ、故ニ厥冒ノ解セント欲ル前ニハ、必寒戦シテ汗ヲ発シテ解スルナリ、故ニ冒家欲解、必大汗出ト云リ、コレ戦汗ノ出ルニツレテ、気血一身ニ順和シテ解スルナリ、コレハ血虚シテ、第一ニ下部気血ノ順接ヲ失テ厥スルヨリ、表外へ開クヲ能ハザル故ニ、孤陽ノ上出シテ、頭汗出ルナリ、孤陽トハ、血虚シテ血ノ和セザル者故ニ、気バカリ獨

リ上逆スルヲ云ナリ、産婦ノヨリク汗ノ出ルト云者ハ、陰血下ニ虚亡シテ、陽気ノ獨り盛ナル故ナリ、故ニ頭汗ノミニテハ、夕バ上逆シテ下益、虚スルニ依テ、一身共ニ戦汗出テ、陽気発越スレバ、再ビ氣逆セズシテ、陰陽相順接ヲ得テ解スルナリ、故ニ汗出陰陽乃復ト云リ、コレ陽氣引シマリテ、上逆スル証ナレバ、戦汗ニツレテ、陽氣ヲ発越スレバ、陰陽平均シテ和スルナリ、

○大便堅、嘔不能食、小柴胡湯主之、

コレ上ノ条ノ凡例ヲ受テ、コノ本条ヲ出セリ、サテ大便ノ堅キハ、己ニ前条ニ説タル如ク、胃中ノ津液ノ燥キタル者ナリ、其上、上逆ノ勢アリテ、嘔ヲ発シテ、食スルヲ能ハザル

者ハ孤陽盛ニシテ、頭汗出ニハ至ラザレバ、コレハ未ダ陰陽ノ平復セザル者ナリ、故ニ小柴胡湯ヲ以テ、心胸間ニ迫ル所ノ水血ヲ和スレバ、嘔止テ能食シ、津液胃中ニ下リテ、大便モ通ズルナリ、

○病解能食、七八日更發熱者、此為胃實、大承氣湯主之、コレ亦上ノ条ヲ受テ、上ノ痞ニ、小柴胡湯ヲ与テ、病解シ、嘔止ニ能食スルニ至リテ、津液胃中ニ下リテ、胃氣和シ、大便モヨク通ジ、七八日ノ後ニ至リテ、發熱セズシテ解スル者アレバ、コレハ病解シ能食シテモ、大便堅ノ止サルヨリ、七八日ヲ過テ、新夕ニ發熱スル者ナリ、時ニ發熱ノ勢ヲ以テ見ルニ、胃中ノ津液ヲ亡シテ、燥クカ為ニ、大便ノ堅キノミ

ナラズ、胃中ニ實熱ヲ生シテ、其勢餘リテ發熱スル者ニシテ、胃實ノ証ニ疑ナケレバ、大承氣湯主之ト云リ、コノ証、始ノ凡例二个条ニ轉変ヲ示シ、本条二个条ニ、治方ヲ示シタレバ、都合四个条ヲ通觀シテ、其變化ヲ察スベキ者ナリ、瘧ヲ發シテ、手足厥冷スル者ニモ、脈ノ緊ト微ト、又ハ絶脈ニ至ルトノ、診別ニテ、瓜蒂散ノ症ト、甘艸干姜湯トノ差別ノアルヲハ、己ニ厥陰篇ノ瓜蒂散ノ条ニテ説キ示シタリ、コノ四个条ト互ニ參觀シテ、虛實ヲ明ニスベシ、
○産後、腹中疔痛、當飯生姜羊肉湯主之、並治腹中寒疝、虛勞不足、

コノ条ト、妊娠中ノ腹中疔痛ト、病状ハ同シトナレバ、産前

ト産後トノ差別ニテ、藥方ノ異ナル所ヲ見セタルナリ、産前ハ胎ヲ養フ為ニ、集リタル水血、凝結シテ和セザル故ニ、腹中疼痛ヲナス者ニシテ、當飯芍藥湯ノ主ル証ナリ、産後ハ陽氣乏ク、内ノ血行ラズシテ亡血トナリ、寒凝シテ腹中モヒヤクシテ、疼痛スレバ、水ノ迫リハ少ナシ、夕トヒアリテモ容証ニシテ主ニアラズ、故ニ夕ニ内ノ血ノ亡ビテ、和セザルヲ行ラシ、血ニツレテ陽氣ノ凝テ、沈ムガ如キヲ、皮表マデモ達セシムル様ニスレバ、治スル証ナリ、依テ疼痛ニ、二方ノ差別アルナリ、然レバ又産後ニモ、水血カラミテ、當飯芍藥湯ノ証アリ、産前ニモ、内血澁滯シテ、コノ証アレバ、産前後ノ差別ノ中ニ、又病証ノ差別ニヨリテ、方ヲ處ス

ベキ者ナリ、コレ俱ニ血分ノ主タル証ナレバ、水ノ添ト添ザルトニ由ルナリ、又腹診ヲスルニ、右ニヨルト、真中ニアルトノ差別アリ、コレヲノ辨別ニテ、同ジ腹中疼痛ノ病状ニモ、各主トスル証アルヲ察スベシ、廿テ寒疝モ、元ヨリ虚寒ノ疝ニシテ、陽氣乏シク、血内ニ凝結シテ、疲勞シタルヨリ、起ル者ナレバ、並治腹中寒疝、虚勞不足ト云タルナリ、前ノ寒疝病篇ノ中ニモ同方アレバ、互ニ參觀スベシ、前ニモ云タル如ク、羊肉ハ、本朝ニテハ得難キ故ニ、余コレ迄コノ証ニ遇フ所ハ、當飯建中湯ヲ以テ、数人ヲ治シタリ、故ニ當飯建中湯ヲ代用ベシ、彼土ハ平生食料ニスル故ニ、得易ケレバ、我邦ニテハ、大ニ面倒ナレバ、試ズシテ今日ニ

至レリ、若折ヨク得タラバ、用ヒ試ムベシ、諸人モ試テ功アラバ、其功ヲ聞シ、コノ糞ヲ者ナリ、後ノ婦人雜病篇ニ、當飯芍藥湯ト、小建中湯トヲ並べ出シタリ、コレ亦コノ条ト參觀スベシ、

○産後、腹痛、煩滿不得卧、枳實芍藥散主之、
コノ条ハ、上ノ疼痛ヲ受テ、今一段其血ノ凝結強クシテ、氣モ水モ俱ニ凝結シタル証ナリ、コレ腹痛ニツレテ、氣モ迫リ、水モ凝リタルヲ見セテ、煩滿不得卧ト云リ、當飯芍藥湯ノ水血ノ凝結ヨリモ、一段甚シクシテ、前条ノ血ノ滋潤ナクシテ、疼痛スル所ノ羊肉ノカ、ル証ノ、一等甚シク來ル者ナリ、故ニ夫ヨリ腹痛甚シクシテ、水血マスキ凝テ、氣ヲ

シ、氣熱内ニ鬱蒸シテ、腸癰ニナル者モアリ、又下部ニ流滯シテ、疔痔痔疾等ニ轉スルモアリ、又男子トイヘ、凡腹痛、煩滿不得卧者、又ハ腸癰藏毒ノ類等、皆コノ方ノ主ル所ナリ、分量ハ異ナレ、凡腸癰ノ篇ニ説タル排膿散ハ、コレニ桔梗ヲ加エタル方ナレバ、コノ方ハ膿潰スル者ニモ用テ功アリ、故ニ方後ニ、并主癰膿、以麥粥下之トアリ、病ノ變化ノ无窮ナルヲ、ヨクク察スベシ、

○産婦、腹痛、法當以枳實芍藥散、假令不愈者、此為腹中有乾血着脐下、宜下瘀血湯主之、亦主經水不利、

コレ前条ヲ受テ、腹痛ノ二字ト、法當ノ語ヲ以テ、枳實芍藥散ノ適當ノ証ナルヲ示シテ、癰膿ニ至ル迄モ、治スベキ

者ナルヲ知ラシメタルナリ、時ニ枳実芍薬散ヲ与エテ
 毛愈ザル者アリ、コレハ上ノ如ク瘕膿ニ至ルマテ、枳実芍
 薬散ノ証ナレバ、瘕膿ニナルホドノ熱ノ鬱滯、並ニ水ノ凝
 結ナクシテ、夕、瘀血ノミ、十分滋潤ヲ失フテ、頑血トナリ、
 乾枯シテ、脐下ニ着クヨリ、来ル腹痛ナリ、故ニ此、為腹中、有
 乾血着脐下ト云リ、乾血ニナリテハ、枳実芍薬散ノ知ル所
 ニアラス、大黃桃仁蟻虫ノ力、ニアラスンバ、コノ乾血ハ去
 ルベカラズ、故ニ宜下瘀血湯主之ト云リ、並主經水不利ト
 アレバ、乾血アリテ、ソレガ為ニ、月經ノ利セザル者ノミ、コ
 ノ方ノ主ル証ナリ、月經ノ不利ニモ、虛実多端ナレバ、一概
 ニ混淆スベカラズ、サテコノ藥方、酒ヲ以テ煎シテ服セシ

ムルニ、新ニ血ノ下ル、豚肝ノ如シトテ、実ニ豚肝魚腸ノ
 如キ者、シタ、カ下ルニ愕テ、眩暈直視スル者アリ、コレ亦
 兼テ心ヲ用ユベシコノ乾血ハ、婦人ノ宿病ニカ、ル者多
 シ、夕、枳実芍薬散ノ証ノミ、轉進シテ乾血ニナルト思フ
 ベカラズ、

○産後七八日、无太陽證、少腹堅痛、此惡露不尽、不大便、煩躁
 發熱、切脈微實、再倍發熱、日晡時煩躁者、不食、々則譫語、至夜
 愈劇、宜桃枝承氣湯主之、熱在裏、結在膀胱也、

コレ亦前ノ条ヲ受テ、少腹ニ瘀血アリテ、乾血ニナラズシ
 テ、熱ヲ帯ビタルヲ示シ、枳実芍薬散ノ瘕膿トモ又異ニシ
 テ、血実ノ証ヲ出シタルナリ、サテ産後七八日ニ至リテ、上

衝モノナク、表ニ寢ナクシテ、少腹堅クナリテ、痛ム者アリ、コレハ惡露ノ尽ガル者ナレバ、若太陽表証アラバ、先表ヲ解シテ後、血ヲ下スベキ証故ニ、无太陽証ト云テ、直ニ下劑ヲカクベキヲ示シタルナリ、コレ惡露下リ尽ズシテ、小腹堅痛スル証ナレバ、不大便煩躁發熱ニ至リテハ、惡露ノ尽ガルノミナラズ、又表証ヲ帶テ來ル者ニモアラズ、故ニ无太陽証ト云ヒ、ソレニツヒテ脈ヲ切ニスルニ、微実ト云ヲ以テ見レバ、甚シキ実証ニハアラザレバ、少腹ノ惡露ノ寢ニテ、微シク実熱ヲ帶ヒタル、下劑ノ証ト見エタリ、サテ其微実ノ脈ヲアラハスニ至リテハ、發熱ノ勢、前ヨリ甚シクシテ、再倍セリ、殊更太陽証ナクシテ、裏実ノ發熱ナレバ、日

晡時ニ至リテ、煩躁モ亦再倍スル勢ノアル証ト見エタリ、此ノ如クニ日晡ト云、脈ハ微シナガラモ実ヲアラハス処ヲ見ルニ、全ク小腹ノ惡露ニ、実熱ヲ帶テ、上ハ心胸、外ハ皮表マデモ、勢ノ波及シテ、發熱煩躁スル者ニシテ、食モセザル者ナリ、若タマク食スレバ、胃中ニタマリテ、其食ノ鬱スル所ヨリ、上薰スル熱ト共ニ、心胸ニ薰シテ、謔語ヲナスナリ、其上夜ニ至レバ、血熱ノ動キ甚シフシテ、謔語モ亦劇シ、故ニ至夜愈劇ト云リ、坊本ニハ、至夜即愈トアルヲ見ルニ、コノ謔語ハ、食ト、日晡時ノ發熱トニツレテ來ル故ニ、夜分ニナレバ治スルナランカナレバ、余コレ追数人ヲ見シニ、血熱ノ謔語ハ、夜ニ至レバ皆甚シケレバ、コレハ傳写ノ誤

ナルベシ、脈經ニハ、下之即愈トアリ、コレハ大ニ尤ナル説ナリ、下ノ句ニカケテ、下スベシト云タルナリ、サテコロノ証ハ、桃枝承氣湯ノ正面目ナルニ、大承氣湯ト出シタルハ、下劑部類ヲ用ユベシト云意ナランカ、然ラハ宜ノ字ノミニテ、主之ノ字ハ无ク凡叶フベキニ、主之ノ字ノアルヲ以テ見レバ、夕シカニ桃枝承氣湯ナラデハ置難シ、故ニ桃枝承氣湯ト改メタリ、觀者、其意ヲ致スベシ、熱在裏、結在膀胱也ト出シタルハ、コレ全ク桃枝承氣湯ノ証ヲ演タルナリ、始ノ少腹堅痛ニ映シテ、血ヲ結ンテ、熱ト共ニ膀胱ニ凝結シタルヲ察スベキナリ、

○産後中風、続数十日不解、頭微痛、惡寒、時々有熱、心下悶、乾

嘔、汗出、雖久太陽證続在耳、可与桂枝湯、
 産後ノ外邪ハ、種々ニ變化シテ、一定ナラザル者ナレ、凡、一通リノ中風ニテ、外ニ証ノ无キ者ハ、夕トヒ産後夕リ凡、治療ニ於テハ、カハラヌト云意ヲ含ミタルナリ、サテ産後ニ風ヲ引タル処ガ、産後故ニ、定テ何ゾ外ノ証ヲ添タルナラント思ヒ、血分ニカ、ル藥カ、又ハ桂枝ハ、産前後トモニ忌ト心得テ、外ノ藥ニテ、邪氣ヲ拂ハントセシカ、凡、藥ト病ト相對セズシテ、三四十日ヨリ、六七十日マテモ、続テ解セザルナリ、故ニ外ノ証ニテモ添タルカト見ルニ、サヤウニモアラズ、夕、頭微痛、惡寒、時々有熱、心下悶、乾嘔、汗出ノミナリ、コレ中風ノ続テ解セザル者ニシテ、表氣ノ久シク和セ

ガルニツレテ、心下苦シクシテ悶スルナリ、産後故ニ、ナン
 ゴ裏証デモ添タル様ニ見ユレ、左ニアラズシテ、夕、表
 氣ノ為ニ、此ノ如クニナルナリ、乾嘔モ表ニ變ノアルヨリ、
 裏ノ氣ノ動テ来ル者ナリ、汗出ハ、元ヨリ桂枝湯ノ証ナリ、
 コノ証日数ヲ経タレバ、始終發熱スルニハアラズ、時々ト、
 夕、サカニ發熱スルナリ、コレヲトクト考ルニ、六七十日
 ニ及ビテモ、ヤハリ太陽表証ノアル者ナレバ、桂枝湯ニテ
 解スベキ者ナリ、故ニ可與桂枝湯ト云リ、可與トハ、夕トヒ
 外ニ裏証ノアル者ニテモ、右ノ如キ病証ニハ、先桂枝湯ヲ
 以テ和スベシト云意ナリ、若裏証アリテモ、表ノ為ニ動キ
 タル客証ナラバ、ソレニテ解スベケレ、凡、萬一表ノ和シテ

後ニ、他藥ノカ、ルベキ証ノ有レモ計リ難シ、故ニ主之ト
 ハ云ザルナリ、サテ桂枝湯ノ一名ヲ、後世ニテ陽旦湯ト云
 ヲ以テ、坊本ニハ、コノ処ニ、陽旦、證結在耳、可與陽旦湯ト云
 リ、同名ナレバ別ニ差別ハナケレ、凡、好事ノ者ノ所為ニシ
 テ、古訓ニアラズ、ヤハリコノ中風ハ、太陽中風ニシテ、桂枝
 湯ノ症ナレバ、太陽証結在耳、可與桂枝湯ト云ガ穩カナリ、
 故ニ今コレヲ改メ夕リ、コレハ次ノ条ト、同ジ中風ナレ、凡、
 裏ノ塵ヲ帯タル者ト、互ニ發明シタルナリ、次ノ条ト併セ
 考テ、表裏塵実ヲ辨別スベシ、産後ナリト思フ心ヨリ、表証
 バカリヲ發シテハ、如何アラント、多クハ疑ヲ抱ク者ナレ
 凡、コレ等ノ処ヲ、ヨク心得テ明ラムベキナリ、

○産後中風、發熱、面正赤、喘而頭痛、竹葉湯主之。
 コレ上ノ条ト、互ニ參觀發明シテ、産後ノ中風ニモ、各異ナ
 ル処アルヲ察スベシ、一通り表証アリテ、氣逆上衝スルヨ
 リ、水氣胸ニアツマリテ、喘而頭痛スルトバカリ見ル片ハ、
 桂枝加厚朴杏仁湯ノ証ニシテ、産後ニ随分沢山アル証ナ
 レ片、コノ証ハ左ニアラズ、方意ヲ以テ察スルニ、分量ハ異
 ナリトイヘ片、桂枝去芍藥加附子湯ニ、竹葉、葛根、防風、人參、
 桔梗ヲ加エタル方ナレバ、産後ニ裏血亡ビテ、陰分虚シ、内
 ニカノナキ処ヲ、外邪ニ動搖セラレテ来ル者故ニ、表ヲ和
 シ、氣逆ヲユルメ、内血ヲメグラシ、陽氣ヲ助ルノ手段ト見
 エタリ、一通りニ視テハ、何ノ事ナキ証ノ様ニ見ユル故ニ、

上ノ条ニテ、数十日解セザル所ノ、産後ノ中風ニテモ、他ノ
 瘧ヲ帯ヒザル者ハ、桂枝湯ニテ和スベキヲ示シ、コノ条ニ
 テハ、産後、風邪ニ感じテ、日数ハ経ガレ片、表ノ動搖ニツヒ
 テ、裏血亡ビ陰虚シテ、下ニカノナキ処ヨリ、忽ニ上ニ迫ル
 証ヲ出シタルナリ、右ノ如ク上ニバカリ陽氣迫ル故ニ、發
 熱ハ、中風ノ表氣ノ和セザル所ヨリ起レ片、面正赤ハ、下部
 ニ陽氣乏シフシテ、虚氣ノ上逆スルヨリ来ルナリ、コレ少
 陰篇ノ通脉四逆湯ノ条ニ、其人面赤色トアルト、同ジ理ナ
 レ片、彼条ハ方後ノ加減ニ、加葱九茎トアリ、コレハ産後ニ
 シテ、殊更外邪ニ侵サレタル者ナレバ、竹葉ノカ、ル上逆
 ニシテ、竹葉石羔湯ノ虚羸氣逆ノ証ヲ挟ミタルナリ、右ノ

如少面ノ赤色ニナル勢ニテ、水気ヲ引上テ、喘ヲ帯ル位ニ、
 上ニ迫ル故ニ、頭痛スルナリ、コノ証、一概ニ陰証、虚脱トモ
 片付ラレズ、又陰虚亡血ノ証ヲ帯タレバ、専ラ表証ノ外邪
 トモ云レズ、又表虚ノ証、凡云ベカラズ、又表虚ニアラズ、凡
 云ベカラズ、又外邪ノ動搖ニテ、裏ノ水血カチキ故、皆上
 部ニ引上テ、上ニ水血ノ滯ル所アル故ニ、竹葉並ニ桔梗ヲ
 組タリ、芍薬ノカ、ル、拘牽、急ハナケレ、凡、表ニ血凝ル故
 ニ、葛根ヲ組、内陰血凝テ、内不順ナル故ニ、人参ヲカケ、防風
 桂枝ヲ以テ、表邪ヲ驅散シ、附子ヲ以テ、陽氣ヲ入テ、水血ヲ
 和ス、其外、大枣、生姜、甘艸ト共ニ、十味ヲ以テ、表邪ヲ驅散シ、
 内ノ水血ヲ和解シ、氣逆ヲ和シテ、内ヲ救ヒ、表ヲ和スルナ

リ、前ニ云如ク、竹葉ニ、竹石ノ主意アリ、桔梗ニ、少陰篇ノ咽
 痛ノ迫リアリ、コノ喘ガ、即チ其下心ナリ、人参ヲ以テ、血ノ
 虚凝スルヲ和スル処アリ、葛根、防風ハ、表外ノ気血ニカ、
 ルナリ、何レ、凡ニ内ヲ助ケ、表邪ヲ解スルノ手段、方中ニ見
 エタリ、病状ハカリニテハ、前ニモ云シ如ク、今一段進ンデ、
 桂枝加厚朴杏仁湯ノ者ト、見ユル証ナレバ、方意ヲ以テ考
 フベシ、方後ニ頸項強者ハ、少陽柴胡ノ証ニアラス、表邪ノ
 為ニ引上ラレ、氣逆上衝シテ、面色赤ク、喘而頭痛スル者ナ
 レバ、水血イヨク上ニ和セズシテ、陽氣ノ通行ノアシキヨ
 リ来ル証ナリ、故ニ大附子一枚ヲ用ルナリ、又食物ノ水穀
 胸ニタマリテ、嘔スル者ハ、半夏半升ヲ加ルナリ、

○婦人乳中虛煩乱嘔逆安中益氣竹皮大丸主之
 コノ証ハ産後ニ限ラズ凡テ乳ヲ吞ス婦人ニ多クアル証
 ニシテ不乳ノ女子ノ知ラザル病ナリ俗ニ乳ブルヒト云
 疝ニシテ新産ノ婦人産後一兩日ヲ経テ乳ノ張ル頃ヨリ
 コノ疝ヲ患ルモアリ又三五年シテ患ルモアリ其証乳中
 ニ凝ヲ生ジテ頻ニ痛ミ夫ヨリ發熱惡寒煩躁シテ嘔逆ヲ
 發シ氣モ穩カナラズシテ狂乱ニモ至ルベキ様ニ見エ甚
 シキ者ハ其乳中ノ凝リ膿潰シテ乳癰トナリ又ハ内ニ結
 核ヲ生ジテ乳岩ノ根本トナルモアリ故ニ早クコノ竹皮
 大丸ヲ以テ發熱惡寒ヲ始メ乳中ノ痛煩乱嘔逆等ヲ和ス
 ベシコノ藥ハ至テ即功アル藥ニシテ一兩日ノ間ナレバ

速カニ治スコレニ達セザル者ハ外邪時氣ノ様ニ思フテ
 發散劑ヲ用ル内ニ發熱惡寒嘔逆等ハ少シク和シテ快キ
 様ニ思ベ氏乳ノ凝リ和セズシテ必ス再動ス夕トヒ外邪
 アリ氏少シモ障リナケレバ余ハコレ追コノ竹皮大丸ヲ
 用テ熱ト共ニ乳中ノ凝結ヲサバクニ實ニ奇驗アル方ナ
 リ又乳ノ張リテ苦シム者其外乳ヲアグルニモ乳ノ凝リ
 ヲユルムル方ナレバ用テ功アリ凡テ乳ノ事ニカ、リタ
 ル者皆コノ方ノ主ル所ナリ方中ノ白薇ハ麦芽ニ換テ用
 ヲベシ方後ニ棗肉ニテ丸ズトアレ氏ヤハリ大棗ト共ニ
 煎湯ニシテ可ナリコノ加減ハ未試猶考テ用ユベシ

○産後下痢屢極白頭翁加甘艸阿膠湯主之

コノ証ヲ一通リ下利アリテ十分虚シタル者トバカリ心得テハ真武湯ヲ始トシテ四逆湯桃花湯白通湯ノ類ノカ
 ル者ト辨別シ難シ故ニ産後ノ二字ヲ以テ元來血分ヨ
 リ来リテ彼ノ亡血ノ内ニ血熱ヲ生シテ下利虚極ニ及ビ
 タル証ト同ジナルヲ會得スベシ殊更甘艸阿膠ヲ加
 エタルハ気十分ニ縮約シテノビズ血モ亦滋潤又ケテメ
 クラザルヲ以テナリ厥陰篇ニハ夕々熱利下重トアルヲ
 見ルニ血内ニ凝テアル故ニ下利シテモ下重スルナリコ
 二ハ下重ハナケレバ十分下利虚極ニ至リテ大ニ血気
 衰乏シタル故ニ甘艸阿膠ヲ加エタリヨクク察シテ其主
 意ヲ辨スベシ

△附方千金三物黄芩湯治婦人在艸蓐自発露得風四肢苦
 煩熱頭痛者与小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

コレ千金ヲ引テ小柴胡湯ト黄芩湯トノ差別ヲ示シタル
 ナリサテ婦人産ニ臨ンデ薦ノ上ニ居ル時ニ自ラ発露ス
 ル者ナレバ其時ニ外邪ヲ得タルナリソレヨリ邪熱ヲ生
 シテ四肢モワルクホメキ邪熱逆上シテ頭痛ヲナヌ者
 ハ熱入血室ト同証ニシテ血分ニ熱ヲ引コミタルナリ故
 ニ小柴胡湯ヲ与フト云リコレ次ノ篇ノ熱入血室ノ証ナ
 リ又四肢苦煩熱ハアレバ気逆上セズシテ頭痛セザル者
 ハ血分ノミヲ風邪ニ侵サレタル者ニシテ气道ノ迫リナ
 シ風邪ニ侵サレタルニ違ハナケレバ風氣ノ方ヨリハ血

分ノ方ノ主トナリタルガ、コノ三物黄芩湯ノ証ナリ、故ニ此湯主之ト云リ、コレ葶風ヨリシテ、血バカリ鬱シテ、氣ノ迫リハ附タリノ者ナレバ、血鬱ニテ蛇虫ヲ生ズルナリ、故ニ方後ニ、多吐下虫トアリ、サテ其虫下リ尽テ後ニ、腹痛シテ脇癭ヲ生ズル者アリ、前ノ枳実芍薬散ノ条ト、參觀シテ、其所以ヲ知ルベシ、苦参ハ、和名クラ、血ノ凝結ヲ解シテ、ヨク虫ヲ殺スノ功アリ、

△千金内補當飯建中湯、治婦人産後虚羸、手足腹中刺痛不止、吸々少気、或苦少腹拘急、痛引腰背、不能食飲、

コレ亦千金方ヲ引テ、當飯建中湯ノ産後ニカ、ルヲ示シタルナリ、前ノ血痺虚羸篇ノ、黄芩建中湯ノ、千金方ノ附

録ヲモ、併セ考フベシ、サテ産後ニ血虚シテ、一身虚羸シ、陽気不順ニシテ、内外ノ運行不足シ、血分ノ和セザルヨリ、腹中針ニテ刺スガ如クニ痛ミ、吸々少気トテ、氣息モ内ヘ引コム様ニ覺エ、産後ノ故、或ハ少腹ノ血メグラズシテ拘急シ、其痛ミ腰ニ牽急シ、背ニモ引ハリテ、其苦シサノ餘リ、胸中ニ迫リテ、食モ飲物モスルヲ能ハザルヲ治スルナリ、コノ篇ノ本条ノ當飯生姜羊肉湯ノ証ニ、コノ當飯建中湯ヲ換用ルヲ説タリ、併セ觀テ其証ヲ差別スベシ、羊肉ノカ、ル処トハ、定テ差別モアルベケレバ、余未ダ當飯生姜羊肉湯ハ試ミタルヲナケレバ、當飯建中湯ヲ換用テ、毎々功ヲ得タリ、コノ方ハ世間ニ云産勞ナドニ用テ功アリ、

即チコノ糸ナド、塵羸不足トテ、産勞ノ証ニ陥リタルヤ、ウ
 ニ見ユルナリ、方後ニ、若去血過多、崩傷内衄不止、如地黄六
 両阿膠二両トアリ、コレ産ノ時ニ血ノ下リタルヲ過多ニ
 シテ、ソレヨリ下物止ズ、故ニ崩傷ト云リ、崩傷ハ、崩漏ト同
 ジ意ナリ、内衄トハ、下部へ血ノ下ルヲ云、衄ハ鼻血ナリ、其
 血内へ下ルナレバ、内衄ト云リ、コレ前篇ノ芍飯膠艾湯ノ
 証ヲ添タル者ナレバ、地黄阿膠ヲ加テ、其血ヲ和シテ崩漏
 ヲ治スルナリ、

己上、婦人産後病篇、通計十四个糸ヲ以テ、大体ヲ示ストイ
 へ、凡、此外子煩、子癩、子死腹中、逆生、横産、胞衣不出等、種々ノ
 症アリ、千金外臺、其外ノ方ニ詳ナルヲ、併セ觀テ、其証ヲ考

フベシ、妊娠中、並ニ臨産等ノ手術ヲ以テスルハ、産家專
 門アレバ、其ニ就テコレヲ学ビ、産前後ノ傷寒中風ヲ始メ、
 雜病ニ至ル迄ノ治方ヲ明ラムベシ、其手術ノ委シキハ、
 前ニ述タル、探頷圖訣ニテ、其詳ナルヲ察スベシ、故ニコハ
 ニ贅セズ、

辨婦人雜病脈證并治法第二十三
 コノ篇ハ、妊娠産後ト別ニシテ、經血ノ衰ヨリ起ル病ヲ奉
 タルヲ以テ、婦人雜病ト云テ、男子ニ別ツナリ、外邪ヲ始メ、
 其外月經ニカ、ハラザル病ハ、男子ト同様ナレバ、其処々
 ニテコレヲ發明スベシ、コレ前篇ノ終ニ説キ示シタルガ
 如シ、

○辨婦人雜病脈證并治法第二十三
 コノ篇ハ、妊娠産後ト別ニシテ、經血ノ衰ヨリ起ル病ヲ奉
 タルヲ以テ、婦人雜病ト云テ、男子ニ別ツナリ、外邪ヲ始メ、
 其外月經ニカ、ハラザル病ハ、男子ト同様ナレバ、其処々
 ニテコレヲ發明スベシ、コレ前篇ノ終ニ説キ示シタルガ
 如シ、

口婦人之病、回虚積冷、結氣、為諸經水斷絶、至有歷年、血寒積
 結胞門、寒傷經絡、凝堅在上、嘔吐涎唾、久成肺癰、形体損、分在
 中。盤結、繞臍寒疝、或兩脇疼痛、与藏相連、或結熱中痛、在關元
 脉数无瘡、肌若魚鱗、時着男子、非止女身、在下未多、經候不勻、
 冷陰掣痛、少腹惡寒、或引腰脊、下根氣衝、急痛、膝胫疼煩、

奄忽眩冒、状如厥癲、或有憂慘悲傷多嗔、此皆帶下、非有鬼神、
久則羸瘦、脉虛多寒、三十六病、千變萬端、審脉陰陽虛實緊弦、
行其針藥、治危得安、其雖同病、脉各異源、子當辨記、勿謂不然、
コレハ婦人ノ雜病ヲ舉ルニツヒテ、先ソノ根本ヲ論辨シ
テ、審カニ示シタリ、サテ婦人ノ病モ、其宿ニ於テハ、種々差
別アリトイヘ、凡、先其因ハ、虛冷ニシテ、氣ヲ結ブヨリ、經水
断絶ヲナス、コレモ一月二月ナラバ、大病ニモ至ラザレ、凡、
年ヲ經テ断絶スルニ至ルヨリ、一切ノ病ハ起ルナリ、虛ト
ハ、陽氣不順ニテ、一身ニ充實スルヲ能ハザルヲ云リ、陽氣
不順ニシテ、一身ニ充實スルヲ能ハザレバ、一身ノ内、何方
ニテモ陽氣ノ行ラザル處、水血宣通セザル故ニ、必ズヒヤ

クト冷ヲ覺ルナリ、其冷ダシク積リテ、一身ノ氣ヲ結ブヨ
リ、經水来ラズシテ、諸病ノ本トナルナリ、故ニ為諸、經水断
絶、至有、歷年ト云リ、コレ婦人萬病ノ根本ニシテ、男子ト異
ナル所以ナリ、諸ノ字ニ眼ヲ着テ見ルベシ、サテ其冷ヲ積
ミ、經水断絶シテ、年ヲ經タル者ナレバ、其血胞門ニ結ビ凝
テ、ソレヨリシテ上中下ノ部位ニ、病ヲ生ズルヲ次ニダ
シク説キ述ベタリ、其血寒子宮ニ凝積シテ、經絡ノ往来ソコ
テ、常ノ順環ヲ失フ故ニ、寒傷經絡ト云リ、經絡ノ往来ソコ
子ル片ハ、血寒何方ニテモ滯ルナリ、先上部ニ在テ凝リ堅
一リタル者ハ、嘔吐ヲナシ、涎唾ヲナシテ、年月ヲ經レバ、其
血ト、嘔吐涎唾スル所ノ水飲痰汁ト、共ニ上ニ堅凝スルニ

ツヒテ、肺癰トナリ、形体モ損ズルニ至ルナリ、コノ損ノ字
 ニ、羸瘦色沢ノナキヨリ、一身ノ大ニ疲労スル迄ヲ含メリ、
 コレ一テノ処ハ、上部ニ在テ病ヲ生ズルヲ説キタルナリ、
 サテ又分テ在中盤結トテ、血寒中部ニ分レテ、盤リ結ブ片ハ、
 脐ヲ繞テ痛ム所ノ寒疝トナリ、或ハ両ノ股腹ノ処サシ込
 タリ、又ハ拘牽シタリシテ、疼痛ヲナシ、其痛ニ藏ト相連ル
 ニ至ルナリ、コノ藏ノ字ハ、コノ篇ノ藏躁ノ藏ノ字ト同ジ
 一ニテ、子宮ヲ指ス、両股ノ痛ノ下部子宮マデモ、連リテ痛
 ヲ云タルナリ、或ハ其盤結ノ処へ、邪熱ヲ結デ、拘急シタリ、
 急痛シタリ、関元ノ部ニ在ル様ニマデ至レリ、此ノ如ク熱
 ヲ生スレバ、脈數ニナリ、其數脈、右ノ如ク瘀血ニ結ビタル

故ニ、熱ノ為ニ一身ニ瘡ノ類ニテモ發スルカト思フニ、ソ
 ノ事ハ无ク、夕々肌膚枯燥シテ、甲錯ヲナス、故ニ肌如魚鱗
 ト云リ、コノ証婦人ノミニ限ラズ、男子ニテモ、伏毒アリテ
 陽氣ノ行ラザル者ニハ、時々アリ、故ニ時着男子、非止女身
 ト云リ、又コレマデノ文ハ、中部ニ病ヲ生ズルアラマシヲ
 説キ述タルナリ、サテ其血寒下部ニアル者ハ、年月ヲ經サ
 ル者ニテモ、月經ノ候、種々ニクルフテ不勻、下部冷ヲ覺エ、
 陰中冷テ掣痛スルニ至ル、コレ在下未多トハ、年ヲ歴ザル
 者ニテモ、此ノ如キ病ヲ生ズルト云意ナリ、況ンヤ歴年ノ
 者ヲヤ、ソレヨリ腰脊ニ引痛シ、下ハ氣衝氣衝トテ、股ノ付
 根ノ穴ノ邊マデニ根ガシテ急痛シ、ダンク下部和セズシ

テ、膝脛モ疼_レ、煩トタルクナルナリ、コレ迄下部ニ病ヲ生
 ズルヲ云リ、右ノ如ク上中下ニ在テ、寢ヲナス中ニ、下ニ在
 リトテモ、上ノサツパリ和シタルニアラズ、又上ニ在リト
 テ下ノ和シタル者ニアラズ、故ニ分_テ在中ト云テ、上部ノ病
 サツパリセズシテ、分_レテ中部ニアリテモ寢ヲナシ、又下
 部ニアリテモ、惱_ミヲ生ズルト云_フヲ、分_ノ字ニテ示シタ
 ルナリ、サテ上中下轉寢定ラザル故ニ、奄忽ト夕子マ子ニ、
 眩冒シテ、其状癲癩ノ如クニ、取誥テ一身厥スル者ト、同様
 ノ証ヲナスナリ、コレ上逆シテ、クらくスルバカリノ者モ
 アリ、又打倒レテ暫ク覺エザル者モアリテ、脈モ閉塞シ、一
 身モ厥冷ニ及ブ者、婦人ノ持病ノ積氣ニ多クアル証ナリ、

或ハ左マデモ无キ事ニ、憂慘悲傷シテ、涕淚ヲ出シ、又乍チ
 ニ腹立シ、氣違ノ如クニ、喜怒哀樂、俱ニ定ラズシテ、何ゾ付
 物ニテモアルヤウニ見ユレ、凡_レ決シテツキ物ノ所為ニア
 ラズ、皆帶下ノ病ヨリシテ、此ノ如クニ轉寢定リナキ、病状
 ヲアラハスナリ、故ニ此、皆帶下、非有_レ鬼神ト云リ、此ノ如キ
 証ヲアラハスニ至リテハ、狐狸ノ類カ、又ハ生灵死靈ナド
 ノツキ物アリトテ、醫藥ヲ遠ケテ、巫祝祈禱者等ヲ頼ム者
 多ケレ、凡_レ決シテ鬼神ノ所為ニアラズ、此ノ如クニシテ久
 クナレバ、追々羸瘦シ、脈モ虛シテ、一身ノ血分ノミナラズ、
 氣水共ニ不順ニシテ、多寒ノ証トナリ、三十六病ノ中、千寢
 萬端ナル_一、定リ極ル_一ナシ、是_一於テ其脈ノ陰陽虛實緊

弦マテヲ審カニシ、針スベキ者ハ針シ、藥スベキ者ハ藥シテ、十分危篤ニ至ルトイヘ、治シテ安キヲ得セシムルガ、医者ノ本意ナリ、コノ脈ノ字ハ、診ノ字ノ意ニシテ、凡テ陰陽虛實ヨリシテ、脈ノ緊張マテヲ審カニ診察スルナリ、脈モ緊張ノミヲ舉タルハ、緊ト弦トハ、同ク引ハリタル脈状ナレ、^カ力ノアルトナキトノ差別アレバ、物ノヨク似タル中ニ、陰陽虛實ノ違ヒアルヲ、診別サスベキ為ナリ、又脈ノミナラズ、病状ハ同ジヤウニ見エテモ、各回テ起ル源異ナリ、故ニ其雖同病、脈各異源ト云リ、余ガ家ニテ、一切病者ヲ診スルニ、八条目ヲ以テスルハ、微細ノ差別迄モ、洞明セシガ為ナリ、子當辨記、勿謂不然トハ、医ヲ学ブ者ハ、コ、ニ

示ス所ヲ、ヨク辨別シ記臆シテ、己レガ理窟バカリニ泥ンテ、不然ト思フテ、診察ヲ粗忽ニスルヲ勿レト、丁寧ニ示シタルナリ、サテ三十六病トハ、千金方云、諸方說三十六疾者、十二癥、九痛、七害、五傷、三癩、不通、是也、何謂十二癥、是所下之物、一曰、状如膏、二曰、如黑血、三曰、如紫汁、四曰、如赤肉、五曰、如膿、六曰、如豆汁、七曰、如葵羹、八曰、如凝血、九曰、如清血、血似水、十曰、如米泔、十一曰、如月浣、^ナ前^ナ却、十二曰、經度不^レ定期也、何謂九痛、一曰、陰中痛傷、二曰、陰中淋瀝痛、三曰、小便^レ即痛、四曰、寒冷痛、五曰、經來、即腹中痛、六曰、氣滿痛、七曰、汁出、陰中、如有^レ喪、啞痛、八曰、股下分痛、九曰、腰膝痛、何謂七害、一曰、竅孔痛不利、二曰、中寒熱痛、三曰、少腹急堅痛、四曰、藏不仁、五曰、子

門不端引背痛六日月浣乍多乍少七日害吐何謂五傷一曰
 兩股支滿痛二曰心痛引股三曰氣結不通四曰邪思洩利五
 曰前後痼寒何謂三痼一曰羸瘦不生肌膚二曰絕產乳三曰
 經水閉塞トアリコレ皆婦人ノ血分ヨリ起ル所ノ病ニシ
 テ千金方ニ各其治方ヲ載セタリ本書ニ就テ見ルベシ
 ○婦人中風七八日結未寒熱發作有時經水適斷此為熱入
 血室其血必結故使如癰狀發作有時小柴胡湯主之
 ○婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除脉遲身涼
 和胸脹滿如結胸狀謔語者此為熱入血室也當刺期門隨其
 實而取之

○婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則謔語如見鬼狀然

此為熱入血室治之无犯胃氣及上二焦必自愈

コノ三个条ハ已ニ經篇ノ結胸類ニ編入タレバコノニ贅
 セズ彼篇ニ就テコレヲ解スベシ文字少シク出入アリ然
 レ凡同ジ文章ナレバ次ノ条ノ陽明病ヨリ熱入血室ニナ
 ル証ト連子タルナリ

○陽明病下血謔語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨
 其實而瀉之澱然汗出者愈

上ノ三个条ハ中風傷寒ノ外邪ヨリ来リテ經水ノ時節ト
 一緒ニナリテ熱入血室ニナリタル証ナリ然レ凡三个条
 共ニ少シヅト証ノ異ナルヲハ經篇ニテ委シク説キ示シ
 タルガ如シコノ条ハ陽明病ノ自發ニシテ胃熱ヲ釀ス片

ニ、經水ノ来ル者ナリ、前ノ三个条ニ於テ、適来適断ノ一ヲ云タル故ニ、コノ条ニハ、畧シテ言サレ、凡、コノ下血ハ大便ニ下ル血ニハアラス、故ニタゞ、下血譫語トバカリ云テ、陽明病ノ冒首ニテ、胃熱ト經血ト混合シテ、下血譫語スル者ナリト云一ヲ、思テ察セシムルナリ、故ニ此ヲ為熱入血室ト云リ、コレ陽明病トイヘ、凡、熱入血室ノ証ニナリテハ、少陽ノ部位ニ變ヲ生ジタルヲ明ナリ、然レ、凡、外邪ニテ抑エタルニハアラス、陽明ノ裏熱、經血ニ混合シテ、一等上外ヘ迫リテ、少陽ニ及ブ者故ニ、内ヨリ熱ノ上行スル勢ニテ、但頭汗出ルナリ、然レ、凡、主タル所ハ、熱入血室ノ少陽ノ部位ナレバ、當刺期門、隨其実、而瀉之ト云リ、經篇ニモ説タル如ク、

期門ハ乳下四寸ニアリテ、古訓ニテハ、少陽柴胡ノカ、ル部位ナレバ、其処ノ実ノ劇易ニ隨テ、瀉針ノ法ヲ行フベシトナリ、コ、ニハ針治バカリノ一ヲ示シタレ、凡、經篇ニモ云タル如ク、隨其実、而瀉之ト云中ニ、藥ヲ用ユルニモ、柴胡部類ノ方ニテ、其熱ヲ和解スルカ、又ハ攻ルカト云一ヲモ、含テ見ルベキナリ、コレ凡例ニアル、針藥ヲ行フベシト云者是ナリ、サテ瀉ノ字ハ、補ニ對シタル字ニシテ、針術ノ法ニ、補瀉迎隨トテ、入息ニ隨フテ針ヲ下シ、下シ尽レバ、出ル息ト共ニ針ヲ又クヲ、隨ト云テ、瀉針ナリ、又出ル息ヲ迎エテ針ヲ下シ、下シ已テ、入息ノ時ニ針ヲ又ク、コレヲ迎ト云テ、即チ補針ナリ、又内經ニ針治ヲ喻サシガ為ニ、南方ヲ瀉

シ、北方ヲ補フナド、云語アリテ、補瀉ノ字ハ、針術ニノミ
 用ヒ、攻救ノ字ハ、藥ニノミ用ヒタルヲナルニ、後世ニ至リ
 テ、藥ニモ補瀉ノ字ヲ用ルヲニナレリ、治術ニ於テハ左ニ
 デ害ナキヲナレ、凡文章ニ書載ルニハ、文字ノ差別アルベ
 キヲナリ、コレ等ノ事ヲモ、兼テ心得ベキナリ、
 ○婦人咽中、如有灸瘡、半夏厚朴湯主之、千金作婦人胸滿、心
 下堅、咽中帖々、如有灸肉瘡、吐之不出、吞之不下、
 婦人ノ病ハ、凡例ニモ云タル如ク、血寒ヨリ根シテ、種々ノ
 病状ヲナス者ナレバ、コレ等ノ症モ、元來血分ノ証ニテ、月
 經ノ衰ヨリ根ガシタルナラン、故ニ婦人ノ字ヲ置テ、男子
 ニ別チタルナリ、サテコノ証ハ、氣道ニ衰ヲ生ジ、氣胸中ニ

迫リテ、其氣ノ為ニ咽中ニ滯ル處出来テ、炙リ物ノ切身ノ
 如キ物アリテ、咽ニベラクトシテ、痛ムニアラズ、又痒キニ
 アラズ、吞ムヲモ吐クヲモナリ、難クシテ、何トモ快カラザ
 ル証ナリ、コレハ多クアル病ニシテ、劇証ニハアラザレ、凡
 至テ惱ミノアル者ナリ、千金方ニハ、コノ病状ヲ委シク説
 タリ、コレ氣胸中ニ迫リテ、水ヲ貯エ、血ヲ留メテ、胸滿心下
 堅ヲナシ、其勢上咽中ニ迫リテ、帖々トシテ、灸肉瘡アルガ
 如シト云リ、帖々ハ巾ノアル物ノベラクト動ク負ナリ、コ
 レ灸肉瘡ノ如キ物、咽中ニヘバリ付テ、吐テモ吞テモ出モ
 入モセヌナリ、コレニテ病状ヨリ主トシテ、迫ル處ヲ知ル
 ベシ、半夏厚朴茯苓ノ三味ハ、皆水ニカ、ル中ニ、厚朴ハ氣

ノ迫ルニツレテ、水ヲ上外へ張り出ス処ヲ、ヨク気満ヲ和シテ、下へ水ヲメグラス物ナリ、乾蘓葉ハ、ヨク気ヲ和シテ、胸中ノ鬱ヲ開キ、水血ノ滞リヲメグラス功アリ、三因方ニハ、コノ方名ヲ大七気湯ト更メテ、其病状ヲ挙ルノミナラズ、其回ヲ明カニヨク辨セリ、回テ附方トナシテ、次ニ出シタリ、コノ条ト、互ニ參觀シテ發明スベシ、

△附方、三回方、大七気湯、治喜怒不節、憂思兼并、多生悲恐、或時振驚、致藏気不平、憎寒發熱、心腹脹滿、傍衝兩脇、上塞咽喉、有如炙膏、吐噦不下、皆七气所生、

コレ即チ半夏厚朴湯ノ病回ヲ委ク説リ、故ニ附方トナシテ、本条ヲ解スルノ助トス、サテ前ノ凡例ニハ、憂慘悲傷多

嗔トアリテ、婦人ノ血寒ヨリ、轉衰スル病状ナルヲ示セリ、コ、ニハ又喜怒不節ト云リ、コレ喜ブベキヲ喜ビ、怒ルベキヲ怒ルハ、人ノ常情ナレバ、ソレニ反シテ、自身ノ得テ勝手ニ喜怒ヲナス、故ニ不節ト云リ、ソレニ就テ、イロク心配ヲナシ、屈託シテ、憂思モ兼并シ、物事ニ就テ悲ミ恐レ、ダシク迫リテ、時々ニ振ヒガ出テ、驚動ヲナス、コレ不節ノ字ヲ、喜怒憂思悲恐驚ニ、一々カケテ見ルベシ、コノ七情ノ衰ニヨリテ、藏気不平ヲ致ス、藏気トハ、陰分血分ナリ、又血室ヲモ藏ト云、其気平穩ナラズシテ、水血俱ニ擾乱シ、ソレヨリ、キビシク惡寒ヲナス、コレヲ憎寒ト云、コレハ常ノ惡寒ヨリハ甚シキ証ナリ、又發熱モアリテ、一身ノ皮表マデモ

迫り、又裏ノ水血ニ變ヲ生ジテ、心腹脹滿ヲナシ、兩ノ股腹
 へモ衝キ上リテ、彼ノ積氣ノサシコムガ如ク、ダシク上リ
 テ、咽喉マデモ塞リテ、灸膏ノ如キ物アリテ、吐テモ出ス、嚙
 テモ下ラザルニ至ルナリ、コレ皆七情ノ氣ノ變ヨリ生ズ
 ル所ノ病状ナリ、故ニ病回ヲ以テ、大七氣湯ト名ケタルナ
 リ、又三因方ニ、コノ方ニ加減シテ、タバ七氣湯ト名ケタル
 方アリ、七氣湯、治喜怒憂思悲恐驚、七氣鬱發、致五藏互相刑
 剋、陰陽反戾、揮霍凌亂、吐利交作、寒熱眩暈、痞滿咽塞、半夏五
 兩、厚朴、桂心、各三兩、茯苓、白芍藥、各四兩、紫蘇葉、橘皮、各二兩、
 人參、一兩、生姜、七片、棗、一个、右水煎トアリ、コレ半夏厚朴湯
 ヲリ轉シタル方ナリ、故ニ互ニ參觀セバ、本方ノ主意モ、辨

シ、易カルベシトテ、コノニ出シタリ、

○婦人藏躁、喜悲傷欲哭、象如神灵所作、數欠伸、甘麥大棗湯
 主之、

コノ藏躁ノ症ヲ、古ヨリ種々ニ説テ、腹中ノ躁乱トシ、陰分
 血分ノ躁動スル者トスレ、凡至當ノ説ニアラズ、又婦人藏
 ト、句ヲ切テ、子宮ノトニシタル説アリ、コノ説大ニ尤ナリ、
 妊娠病篇ノ附子湯ノ条ニ、子藏閉故也トアル、子藏ノ藏ノ
 字ト同ク、子宮ヲ指シタルナリ、故ニ婦人ノ字ヲ置テ、男子
 ト別テリ、若陰分血分、又ハ腹中ノ説ニテハ、男子ト別ツ所
 ナシ、コレ子宮ノ血ノ變ニテ、種々ニ躁乱シ、喜テ悲傷シテ、
 欲哭ニ至ルナリ、コレ子宮ノ變ニアラズ、悲傷シ欲哭者ハ、

五藏風寒積聚病篇ノ邪哭ノ証ニシテ、血氣ノ胸ニ迫ル所ノ生姜瀉心湯ノ証ナレバ、其証ニアラズシテ、悲傷哭セシト欲シテ、其象、何カ俗ニ云付キ物ノ如クニ見ユルナリ、故ニ象如_二神灵所作_一ト云リ、數、欠伸トハ、欠ビヲシ伸ビヲスルヲナリ、ソレノミナラズ、手ソボリヲナシ、種々ノ身ブリヲシテ、躍リタリ、色々ニスル者アリ、男子ニアル者ハ、癩証ナレバ、婦人ニハ、多クハコノ藏躁ノ症アリ、コノ甘麦大枣湯ハ、藏躁ノ証ニ用ヒテハ、實ニ奇妙ナレバ、男子ノ癩症ニ用ヒテハ功ナシ、故ニコ、ニ婦人ノ字アリテ、藏躁ト云テ、子宮ノ躁乱ヨリ起リテ、神灵ノ所作ノ如キ象ヲナス者ニ用ルナリ、コノ証悲傷欲哭ノミナラズ、嗔怒シテ涕泣スル者

モアリ、サテ洛医彙講ニ、鎌田碩菴ガ、甘麦大枣湯ヲ以テ、婦人ノ一奇病ヲ治シタル藏躁ノ説アリテ、本方ノ主治、并ニ藏躁ノ子宮ナルヲ證拠セリ、併セ考テ、其症ヲ察スベシ、余モ亦産後ノ癩症ト称シテ、癩狂スル者ニ、コノ方ヲ用テ功ヲ得タリ、故ニ婦人ノ癩狂ト云者ニ、挑挾承氣湯ト、抵當湯ト、コノ甘麦大枣湯トノ差別アリ、コレ等ノ疑似ヲヨク辨明スベキ者ナリ、

○問曰、婦人、年五十所、病下利、數十日不止、暮即癩熱、少腹裏急、腹滿、手掌煩熱、唇口乾燥、何也、師曰、此病属帶下、何以故、曾經半產、瘀血在少腹不去、何以知之、其証唇口乾燥、故知之、當以温經湯主之、亦主婦人少腹寒、久不受胎、兼治崩中去血、或

月水来過多、及至期不来、

コノ条ハ問答アリテ、凡例ノ書法ナレ、凡、病状ヲ始ニ云テ、問ヲ發シ、答ニテ其証ヲ説キ示サシガ為ニ、此ノ如クニ書キツ、バ、リタルナリ、サテ婦人年五十所トアルハ、其人ノ氣血ノ運行、并ニ身体ノ起居動作ニ至ルマテ、五十計ノ人ト同ジ様ナル者ガ、病ムト云意ニシテ、實ニ五十歳前後ノ者ガ、コノ証ヲ患テ、ソレヨリ年ノ違フ者ニハ、コノ証ナシト云ニハアラズ、人ニハ宿ノ強弱アル故ニ、十七八歳、廿歳、又ハ三十歳ノ人ニテモ、コノ証ヲ病ム者多シ、コレ宿虛弱ニシテ、五十歳バカリノ氣血ノ運行ナレバナリ、病下利、数十日不止トアル、下利ヲ一本ニハ下血ニ作レリ、大ニ尤ナリ、

其下血ノ者ニ、大便ノ下血アリ、月經ノ下血アリ、其中ニ大便ノ下血ノ者ハ少ナク、下利スル者ハ多ク、經血ノ下リテ、不止者ハ至テ多シ、コノ三種ノ中ニ、人々ノ宿ニヨリテ、下利モ、大便血モ、月經モ、多寡アリ、又下利ト經血トヲ兼クル証アリ、大便血ノ痣ハ、下利ト便秘トノ差別アリ、細ニ辨ズレバ、種々ニ別ル、故ニ、一々説キ難シ、サテ右ノ如ク、数十日不止ニツヒテ、暮比ヨリ發熱シテ、少腹ノ邊引ハリテ、腰マテ、牽急シ、腹滿甚シク、手掌煩熱シテ、渴ハナケレ、凡、唇口乾燥スルナリ、其外眩冒シタリ、短氣上逆ヲ帯ル者多シ、コレ何ニ由テ此ノ如クニナルヤト問ニ、師ノ答ニ、コレハ帶下ヨリ起リタル病ニシテ、其部屬ナレバ、屬帶下ト云リ、帶

下トハ、何ヲ以テノ故ゾト推スニ、曾_レ經半產、瘀血在_レ少腹、不
 去トアレ_レ氏、半產ヲ經タル者モアリ、又全ク產シテモ、瘀血
 少腹ニ在テ去ラザル者モアリ、又產ハセガレ_レ氏、經血ノ滯
 リヨリ、コノ病ヲナス者モアリテ、半產ヲ經タルノミニ限
 ラズ、又瘀血ノ所在モ、臍ノ上下左右、其人々ニテ異ナレバ、
 コレモ少腹ノミニ限ルベカラズ、故ニ產ヲ經ルト經ヌト、
 少腹トニ拘ラズ、タゞ下部ニ瘀血ノアルヲ、目當トスベキ
 ナリ、又何ヲ以テ瘀血ノアルヲ知ルト云ヘバ、コノ唇口
 ノ乾燥スルヲ以テ知ルト云リ、此証ハ下部ニ瘀血ノアル
 ヲリ、月經下テ止ズ、止ザルホド反テ其瘀血大ニナリ、終ニ
 ハ腹一パイノ塊物ニナリタルヲ、親ク見タリ、コレ新血ハ

下リテヤマズ、瘀血ハマヌク凝テ大ニナリ、堅実ノ塊トナ
 ル者ナリ、故ニ其血塊ニ熱ヲ生シテ、唇口乾燥シ、咽喉マデ
 モ乾燥スルニ至ルナリ、コレ皆瘀血ノ所為ナリ、然レ_レ氏經
 閉ノ瘀血ニアラス、新血下リテ、舊血ノ夕マリタル者ナレ
 バ、新血ヲ行ラシテ、旧血ノ和スルヤウニスレバ、塊物少シ
 ヅ、ヤセテ、月經ノ日數モ常ノ如ク、後ニハ塊モ融和シテ、
 手ニ當ラザル様ニナルナリ、コレ温經湯ノ主ル証ナリ、余
 嘗テ一婦人ヲ診セリ、其時年三十七八ナリシガ、發病ヨリ
 凡ソ十四五年ヲ經タリト云リ、其初二十三歳ノ時產ヲセ
 シニ、百日ノ内ニ、小兒死ケレバ、其病中ノ心配、并ニ死後ノ
 愁傷ヨリ、病ヲ得タリト云リ、初ハ月經七八日ヨリ、十日餘

リヅ、アリテ、左腹ノ傍ニ、血塊出来、其時ハ大サ橙ノ如ク
 ナリシガ、月ヲ踰年ヲ重子テ、月経半月モ止ズ、ソレヨリダ
 シク一月二月三月モ止ズ、後ニハ日月ノ数モ覚エガル程
 ニ及ンテ、腹部ノ血塊モ、ダシク大ニナリタリ、サテ今マデ
 薬ヲ用ルニ、二百貼ヲ限リトシテ、十年餘ノ一ナレバ、轉ジ
 タル医者ノ数、枚挙スルニ遑アラズ、実ニ病家モ医者モ、手
 ヲ束子テスベキ様ナシト云リ、余診スルニ、顔色青蒼ニシ
 テ、光沢ナク、唇モ青ク、乾燥シテ少シク黒色ヲ帶タリ、脈ハ
 滑緩數トテ、グレクシタル脈ノ内ニ、堅キ様ニ覺エテ、又ル
 ケテ數ナル負ナリ、寸口ノ方ハカ^{チカラ}アリテ、尺部ノ方ハ少シ
 弱シ、心中虚悸シテ、心下ヨリ左ノ股下ハ、臍下ニ至ル迄、一

塊物アリテ、一升入ノ徳利ノ大サナリ、經血多キ片ハ、塊大
 ニナリ、夕マク經血トバ、マリタル片ハ、小ナル様ニ思フト
 云リ、余ガ診シタル、五六十日以前ヨリ、起居力ナクシテ、塊
 ノ外ニ腹滿シテ、水氣ヲモ帶テ、形チ全ク脹滿ノ如シ、余ツ
 ラク考ルニ、コレマデコノ塊ヲ碎ントテ、イロク破血劑ヲ
 与テ、年月ヲ經テ、ダシク下部不順ニナリ、塊マシク大ニナ
 リテ、經血ノ止ガル者ナラント診定シテ、温經湯ヲ与エ、兼
 用スルニ、禹餘糧丸ヲ以テス、コレ顔色ヲ始メ、一身青黄色
 ニシテ、浮腫シタル故ナリ、コレ三月廿日頃ノ一ナリシガ、
 凡ソ四五十日用ヒシニ、經血ハ止テ、虚悸短氣モ減ジ、塊物
 ハ半ヲ減ゼリ、夫ヨリ起居モシ易ク、步行モ十町バカリハ

スル様ニナリテ、五月ニ平生ノ経行モ、七日ニシテ止ミ、其塊ダシク少クナリテ、八月頃ニ至リ、橙ノ大サノ如クナリテ、左ノ股下ニアルノミ、諸証全ク愈テ无事ナリ、時ニ経血止テ、塊モ小クナリタレバ、十五六年来、薬餌ニ飽タルノ故、休薬セント云、余以為ク経血止テ塊ハ少クナリタレバ、解散シタル瘀血、何方ニサバケタルヤト、大ニ疑ヒシカ、先其意ニ任シテ、休薬ヲ許セシニ、十一月ニ至テ、面部手足惣身、残ル処ナク頑癬ノ如キ物出テ、頻ニ痒シ、コレ亦凡ソ三十日バカリニシテ愈タリ、是ニ於テ始テ瘀血ノ散漫シテ、皮表ニ発シテ和シタルヲ知テ、疑ヲ解リ、以来凡ソ八年ノ間、无事ニシテ患ナシ、然レバ、左股ノ塊ハ、橙ノ如クニシ

テ存在セリ、四十七八人頃ニ至テ、大ニ心勞スルヲアリテ、宿疾ヲ動ジタルト見エテ、又経血下リテ止ズ、ヲリク、心胸ヘサシコミ、積聚ノ如ク取詰テ、疼痛甚シ、ソレヨリ復々彼塊物モ、ダシク大ニナリテ、腹中三分ノ二ハ、塊ニシテ、其形妊娠ノ臨月ノ如シ、経血ニ黒物ヲ下ス、凡ソ百日餘ニ至レバ、止ガルヲ以テ、復々温経湯ヲ二个月バカリ与エシニ、又全ク收リタリ、然レバ塊物ハ依然トシテ解セズ、其上水気ヲ帯テ、脚腿マデモ浮腫セリ、其頃ヨリ他医ニ轉ジテ、凡ソ半季ノ間ニ、両三医ヲ轉ジ、其中ニ蘭医モ来リテ、種々製薬等ヲ用ヒシニ皆功ナシ、夫ヨリ経血長ク絶テ、一年半バカリモナケレバ、年已ニ四十九ナレバ、自ラ止ム頃ナラン

ト云テ、サマデ驚カザル様ニ見エシニ、塊モダンク大ニナ
リ、水気モ甚シクナリテ、起居モ動作モナラズ、面部マデモ
浮腫シテ、昼夜倚息スルニ至リテ、復余ヲ招テ相談ヲナス、
余ガ曰、コノ塊今経閉シテ、真ノ脹滿トナレリ、コノ上ハ撮
州有馬ニ入湯シテ、薬用セバ、萬一功アラント思エ、先コ
ノ水気去ラザレバ、駕ニ乗ル^ルモ出来ズト云ヘバ、其夫男、
先ツ水気ヨリ治ヲ請フ、曰テ越婢加減ノ薬、又ハ木防己加
減ノ薬ヲ与エシニ、冬十月ノ末ヨリ、春二月ノ頃マデニ、水
気大ニ和シテ、起居モ自身ニナシ、二便モ自^{ミカ}ラスル様ニナ
リタリ、是ニ於テ二月半ヨリ、有馬ニ到リシニ、途中ヨリ風
邪ヲ得タレバ、着後暫ク見合シテ、後一日ニ一度ヅ、入湯

セシニ、凡ソ十五度入湯シテ後、一年半バカリモ閉テアリ
シ、経血来レリ、故ニ経血ノ為ニ廁ニ登リシニ、別ニムカツ
ク^クモナクシテ、水一升バカリヲ吐セリ、久シク廁ヲ出サ
ル故、下女来リテ尋ルニ、少シ眩暈ノ気味アリトイヘバ、下
女手ヲ執テ廁ヲ出、手水ヲ遣フ時ニ、又一升バカリ吐シタ
ルヲ見ルニ、紫赤色ノ瘀血ナリ、其倒レテ人事ヲ省セズ、
相客亭主、皆々驚キ周章テ奔走シ、急ニ抱キテ席ニ就シム
ルニ、頻リニ吐血シテ、疊ニ枚バカリニ滿セリ、傍人側ニ倚
ル^ル能ハズシテ、米糲ヲ其上ニフリカケ、薄縁ヲ其上ニ敷
テ、漸ク薬汁ヲ飲レメ、熊膽并ニ撒^サ法^フ郎^{ロウ}ナドヲ用ヒタルニ、
漸ク气豁テ、人事ヲ覚ル様ニナレリ、急ニ飛脚ヲ立テ、京都

二告来リシニ、其男夫、一医ヲ頼ミ、同道シテ下レリ、イヨク
 吐血ヤンテ、京師ニ帰ルニ及ンテ、伏見ヨリ歩行シテ、帰京
 セシ由ナリ、余往テ診スルニ、腹中ノ塊物、半分缺ケテ、其破
 レタル角形ノ全カラザル処、シカト手ニ忒セリ、ソレヨリ
 暫時快キ様ニ見ユレ、凡、其男夫、淫蕩ニシテ、頻リニ下女等
 ニ手ヲカケタリスル故ニ、ソレガ為ニ引戻サレテ、其年ノ
 内ニ、三度吐血セリ、一度ハ七升バカリ、又五升バカリ、筋ニ
 テハサミ、拳ルニ、五寸周リニ、長サ六七寸モアル瘀血ナリ、
 又ソレヨリ小ナルモアリ、又短キモアリ、馬山ノ吐血ヨリ、
 約スルニ二斗八九升三斗バカリモアリ、実ニ奇ナル大吐
 血ナリ、ソレヨリ追々医ヲ轉ジテ、次第ニ衰エ、腹ノ脹滿ハ、

かんく大ニナリテ、一丈ノ帯モ回ルバカリニテ、結ビ難キ
 様ニナリ、終ニ五十二歳ニテ、其年ノ七月ニ終レリ、コレ始
 メ橙ノ大サニナリタル時、トクト養生セザルヲ以テ、終ニ
 不治ニ陥レリ、惜ムベキノ至リナリ、又婦人ノ小腹寒テ、妊
 娠セヌ者ニ用レバ、ヨク血寒ヲ融和シテ、胎ヲ受ル様ニナ
 ル功アリ、又崩中去血トテ、大血下リテ止ズ、或ハ月水来ル
 一過多ニシテ、期ヲアヤマチ、有ルベキ時ニナクシテ、アル
 マジキ時ニ、沢山ニアル証ヲモ、兼テ治スルナリ、至期不来
 ト云ハ、トント経閉シテ来ラザルニハアラズ、来ル一過多
 ナルガ故ニ、期ノ時ニ来ラザル者ナリ、ヨク意ヲ迎ヘテ解
 スベシ、

○帶下、經水不利、少腹滿痛、經一月再見者、土瓜根散主之、陰癩腫灸主之、

コレハ上ノ温經湯ノ証ニ反シテ、元來月經ノ不利ヨリ、少腹ニ凝結シテ、滿痛ヲナシ、經ハ一月ニ兩度モアリテモ、夕ツフリト来ラザル証ナリ、又其瘀血ノ凝結滿痛ノ轉變ヨリ、陰門突出シ、子宮下リテ收ラズ、腫痛ヲナスヲ、陰癩腫ト云テ、産後ニ多クアル証ナリ、コレニモ虛実アリテ、一定ナラズ、一婦産後ニ子宮石ノ如クニナリ、陰戸一バイニ閉塞シテ收ラズ、然レモソレナリニテ、男子ト同卧シテ恬然タリ、余或家ニ至ルニ、其家男子ノ鰥居ナレバ、雇レテ常ニ同卧シテ、家事ヲ司ル、或時寒邪ヲ得タル故ニ、余當飯四逆湯

ヲ与テ、其婦ニ示シテ曰、此藥ヲ服シテ、寒邪去テ後モ、続テ用ユベシト、其婦コレヲ服セシニ、終ニ治シテ其家ノ婦トナレリ、夫妻今ニ壯健ナリ、此ノ如キ証モアレバ、ヨク考フベキナリ、

○寸口脈弦而大、弦則為減、大則為朮、減則為寒、朮則為虛、寒

虚相搏、此名曰革、婦人則半產漏下、旋復花湯主之、前ノ血痺虚勞病篇ニモ、コレト同ジ文アレバ、彼ノ処ニハ、男子則亡血失精ト云語アリ、コ、ニハ其七字ヲ去テ、旋復花湯ヲ繫キタルナリ、前ニモ説タル如ク、一通リ陽実ノ弦而大ナル脈ニアラズ、皆内虚寒ニシテ、陽氣乏シク、血不順ナル者ナレバ、為減、為朮、為寒、為虚ト云リ、コレ外側ノ之堅

クシテ、太鼓ノ革ヲ按スガ如キ脈ナリ、故ニ名ケテ曰革ト云リ、委シクハ虚勞病篇ニ説タリ、併セ考フベシ、右ノ如ク革脈ヲアテハス者ハ、婦人ナラバ、妊娠シテモ、生養スル陽氣ト、血ニカナキ故ニ半産シ、又漏下トテ、經血ドカヲリスル者ナリ、前ノ温經湯ハ、少腹ニ瘀血ノアルヨリ、經血下リテ止ザル証、前条ノ土瓜根散ハ、月經ノ不利ヨリ、少腹滿痛シ、經一月ニ再見スレバ、實ニ經血ノ和シテ利スルニアラズ、コノ条ハ虚寒ノ症ニシテ、瘀血ノ滯リモナク、又帶下ニテ經水ノ不利スルニモアラズ、夕キカラ内ニカナクシテ、半産ヲシタリ、又漏下ノ証ヲナス者ナリ、然レバ附子干姜ノカキカラル、陽脱陰虚ノ証ニモアラズ、虚弱ナガラモ、血ヲ和シテ

行ラセバ、自ラ漏下モヤンテ、平快ニ及ブ者ナリ、經篇ニモ説キタル如ク、凡ソ花類ハ、皆ヨク水ヲサバキ、大小便ヲ利スル者ナレバ、コノ旋復花ハ、同ジ水ナガラモ、血分ノ不順ヨリ、上表ニ夕キカラ水ヲサバクナリ、葱ハ下部ヲ温メテ、血氣ノ上行ヲ下降スル功アリ、新絳ハ、紅ヲ以テ染タル真紅ノ總ナリ、紅巾ヲモ用ユ、又急ナル時ハ、紅花ヲ用ルモ可ナリ、

○婦人、陷經、漏下、黑不解、膠姜湯主之、

コレハ上ノ条ヲ受テ、同ジ漏下ノ証ニテモ、下部ニ血ノシマリノナキ証ヲ出シタルナリ、陷經トハ、經血ノ下陷シテ、漏下スルヲ云リ、其漏下スル所ノ血、黒クシテイツ迄モ治

セズ故ニ黒不解ト云コレ同ジ經血ノ不順ナル証ニテモ
 温經湯下瘀血湯土瓜根散
 コノ条ハ上ノ旋復花湯ノ虛寒ノ証ヲ受テ同ジ虛寒ニ屬
 スル証ナレ氏血分ノシマリナクシテ陷經トナリテ漏下
 シ黒不解者ナリ細注ニ臣億等按諸本无膠姜湯想是妊娠
 中膠艾湯ト云リ又膠艾湯ノ条ニ干姜ヲ加ルコトアレバ膠
 姜湯ハ即チ膠艾湯ニ干姜ヲ加エタル者ナルベシ前ノ条
 ノ葱ハ下部ニカタクシテ上行スル所ニカカリコノ条ノ
 干姜ハ上行スルカタクシテタビ下ノシマリナク漏下ス
 ル者ニシテ經篇ニアル桃花湯ノ干姜ノ意ナリ温經湯ヨ
 リコノ条ニ至ルマデ四个条ハ皆下血ノ病状ニシテ各差

別ノアルヲ察スベシ
 ○婦人少腹滿如敦狀小腹微難而不渴生後者此為水与血
 俱結在血室也大黃甘遂湯主之

コレヨリ血ノ下ラサル者ヲ挙テ前ノ下血ノ反對ヲ示ス
 ナリサテ婦人少腹中ニ食籠ノ如キ者アリ故ニ如敦狀ト
 云リ敦音對トアリテ食ヲ盛テ神ニ供スル禮器ナリ三禮
 圖ニ委シク形状ヲ出シテ飯器也ト云リ何レ日本ノ食籠
 様ノ物ト見エタリコレ少腹ノ滿スル中ニシツカリト手
 ニ當ル堅塊ノアルヲ形容シタルナリ此ノ如キ証ハ微ク
 小便ノ通利アシクシテ内熱ニテモアル故カト思フニ左
 ニアラス故ニ不渴ト云リコトニ産後ト云ズシテ生後ト

云タルハ、何レ子ヲウミタル婦人ナレバ、水ト血ト血室ニ
 結ビタル証ナルヲ見セタルナリ、産後ニモ、随分アル証
 ナレバ、産後七夜ノ内ハ、子宮收縮セズシテ、コノ病状ニ似
 ル者モアレバ、急度子宮ニ水血ノ凝結シタル者トモ定メ
 難シ、若七夜過テモ、ヤハリ敦状ノ如キ者ナラバ、コノ薬ノ
 主ル者ト知ルベキナリ、凡ソコノ証ハ、出産シテ、タシク年
 月ヲ経テ後ニ、病ム者多シ、出産セザル者ニモ有ルカハ知
 ラザレバ、余ハ未ダ之ヲ見ズ、殊ニ若キ婦人ニハ少ナク、三
 十以上ヨリ、七八十ノ老婆ニ多クアリ、故ニ生後ト云テ、産
 後直ニアル証ニアラザルヲ、含ンテ書キタルナリ、コノ薬
 ヲ用ルト、小便モヨク通利シ、大便モ下リ、血室ノ血モ下リ

テ、ヲリ物モアルナリ、故ニ方後ニ其血當_下ト云リ、

○婦人、經水不利下、抵當湯主之、治男子膀胱滿急、有瘀血
 者、

コレ經水ノ不利ニ、抵當湯ノ証アルハ、經篇ニ委シク説
 タリ、又男子ニテモ、膀胱滿急シテ、瘀血ノアル者ハ、コノ抵
 當湯ノ証ナリ、皆少腹ニ瘀血アリテ、小便ノ自利スルヲ目
 當トセリ、若シ小便不利ノ者ナラバ、桃核承氣湯、又發黃ヲ
 帶タラバ、茵陳蒿湯ノ証ナリ、皆經篇ニ説キタレバ、併セ考
 テ、其差別ヲ明ニスベシ、

○婦人、經水閉不利、子藏堅癢不止、中有乾血、下白物、礬石丸
 主之、

コレハ外治ノ坐薬ナリ、服湯ハ經水不利ノ方、前々ニアリ、
証ヲ考テ用ユベシ、サテ經水閉テ利セザルヨリ、子藏ニ凝
結シ、坚癖トナリテ不止、癖ノ字ハ、軟和セズシテ、坚クサ、
ハリツ、ハリテ、コタハルヲ云、コレ子宮ニ血凝結シテ、坚
クコタハルナリ、其坚癖不止シテ、經ノ利セザルハ、子藏中
ニ乾血アル故ナリ、乾血トハ、滋潤ノヌケテ、少シモ軟柔ナ
ラザル死血ナリ、下瘀血湯ノ條ノ乾血ハ、臍下ニ着スル故
ニ、煎湯バカリナリ、コノ乾血ハ、子藏中ニアル故ニ、上ヨリ
煎湯ヲ用ヒテモ下ラズ、コレ子宮ハ上ロナキ故ニ、坐薬ヲ
以テ下ヨリサシコンデ、其乾血ヲ引下スナリ、右ノ如ク乾
血ニナリテ、少シモ水液ノ滋潤ノナキ处ヨリ、自然ト蒸セ

テ、腐爛シ、白物ニ化シテ下ルナリ、コレ乾血ノ膿ニ和シタ
ルニハアラス、乾血子宮ニアリテ、坚癖スル故ニ、其傍ノ瘀
汁、又ハ水毒等蒸セテ、白物トナリテ下ルナリ、皆コレ乾血
ノ所為ナレバ、其乾血ヲ引キ下ス手段ノ薬ナリ、サテ方後
ニ、枣核ノ大サニシテ、臟中ニ内ルト云リ、コノ臟中ヲ、陰戶
ト解スル者多ケレ、凡、陰戶ナラバ、枣核ノ大サニセズ、凡、内
ルベシ、又子藏ノ中へ内レザレバ、引下ス、中々難カルベ
シ、ヨク考フベシ、

○婦人、六十二種風、及腹中血氣刺痛、紅藍花酒主之、

コノ六十二種ノ風ハ、諸本ニ解ナケレバ、未詳存シテ以テ
後人ヲ俟ツノミ、及腹中血氣刺痛ト云リ、コレ婦人ノ字上

ニアレバ、何レ月経ヨリノ変動ト見エタリ、一通リノ血気刺痛ハ、當飯建中湯ノ証多シ、コノ条ニテモ當飯建中湯ノカ、ル者ト、紅藍花酒ノ者トアリ、ヨクク診別スベシ、紅花ハ、血ノ蒸セタルヲヨク疏通シテ、血ト水トノ運行ヲ和スルナリ、

○婦人、腹中諸疾痛、當飯芍藥散主之、

コノ証ハ、妊娠病篇ニ委ク説リ、コ、ニ婦人ノ字ヲ置タルハ、皆月経ヨリ起リタル、腹中一切ノ疾痛ナリ、コノ疾ノ字ハ、疼ノ誤リカトモ思エ、凡ヤハリコノマ、ニテ、水血不和シテ、腹中ノ痛ム処ノ諸疾ニカ、ルト云フヲ、主トシテ解スベシ、妊娠病篇ヲ併セ考フベシ、

○婦人、腹中急痛、小建中湯主之、

コレ亦婦人ノ字ハ、上ノ条ニ説キタルガ如シ、コノ条ハ水ノ衰ナクシテ、夕ビ血気ノミ不和シテ、腹中ノ急痛スル証ナリ、經篇并ニ前々ノ篇ニ、追々説キ示シタレバ、コ、ニ贅セズ、コトクク參觀スベシ、

○問曰、婦人、病飲食如故、煩熱不得卧、而反倚息者、何也、師曰、此名轉胞、不得溺也、以胞系了戾、故致此病、但利小便則愈、宜腎氣丸主之、

コノ条ハ、問答ヲ以テ、月経ノ衰ヨリ、下部ノ陽気不順ニシテ、血气和セズ、小便不利シテ、轉胞ニナリタル証ヲ示スナリ、男子ニモアル証ナレ、凡、轉胞ト云名ハ、婦人ニカギル故

二婦人ノ字ヲ以テ問ヲ發シタルナリ、飲食如故ト云ハ、心
 胸ニ迫リノナキヲ見セタルナリ、コノ証ハ下部メグラス、
 小水一滴モ通ゼザル故ニ、下部ハリコズンデソレガ為ニ
 氣熱盛ニシテ、横寐スルヲ得ズ、コレ心胸ニ水飲ハ迫ラ
 ザレ、凡物ニヨリカ、リテ、肩息ヲナス、故ニ反倚息ト、反ノ
 字ヲ入タリ、師ノ答ニ、コレヲ轉胞ト名クト云リ、コレ婦人
 ノ胞門ノ寢ニテ、血分和セズ、陽氣行ラズシテ、水氣ソレガ
 為ニ滞リ、小水一滴モ通ゼザルヲ以テ、煩熱ノ証ヲナスナ
 リ、コ、ニ胞系了戾トアルハ、外ヨリ推察シテ書キタル
 ナリ、了戾トテ、胞ノ子ヂレタルヤ、子ヂレザルヤ、一向知レ
 難キヲナレ、凡、何レ胞門子宮ノ寢ニテ、水氣ノ凝滞シタル

証ナリト思フベシコレ脚氣上入^テ少腹不仁スルト同証ニ
 シテ、八味丸ノカ、ル者ナリ、小便通利スレバ愈ユベシ、厥
 陰篇ニアル、冷結、膀胱関元ニ在ト云モ、コノ筋ノ証ナリ、大
 ニハリコズンテ、煩躁悶乱スル者ハ、膀胱ヲ按撫シテ、通ジ
 サスベシ、又ハ時ニ臨ンデ、カテ^テルヲ用ル^ルモアリ、考
 テ治ヲ施スベキナリ、

○少陰脈滑而數者、陰中即生瘡、陰中蝕瘡爛者、狼牙湯洗之、
 少陰ノ脈ハ、腎經ニシテ、手ノ尺部コレナリ、又心主ノ脈ニ
 テ、手ノ小指通リノ腕後ノ脈ヲモ云リ、コノ脈ノ鼓動スル
 ヲ、懷身ノ微トス、時ニ其部位ノ脈滑而數ナリ、コレ陰戶ヲ
 候フ部位ニシテ、滑ナルハ瘀血ノ候、數ナルハ熱ノ候ナレ

ハ陰中ニ瘡ヲ生ジタルナリ、瘀血ヨリ生ジテ、下部ニ濕熱
 ヲ貯エタル所ノ、婦人ノ瘡瘡ナレバ、狼牙湯ヲ以テ、コレヲ
 洗ヒ、煎湯ハ男子ノ下疳ト同ク、其証ニ随テ方ヲ処スベシ、
 狼牙ハ、近來追々見當リタレバ、沢山ニハ、ナキ物ナレバ、毛
 茛ヲ換エ用ルモヨシ、又アラメ昆布ヲ煎ジテ、洗フモヨシ、
 千金方ニ、男女ノ陰瘡ノ方、種々アリ、參觀シテ取用ユベシ、
 洗ヒ様ハ方後ニ云通りニテモヨシ、又腰湯ニテ洗フモ可
 ナリ、

○胃氣下泄、陰吹而心喧、此穀氣之實也、膏髮煎導之、
 コレハ穀氣ノ實ニ因テ胃氣下泄シ、前陰ニ氣ヲ出シテ、
 アル証ナリ、コレ穀氣実スル故ニ、胃氣放屁トナラズシテ、

行住坐卧共ニ、身体ヲ動ス所ハ、前陰ニ色ヲ発スルナリ、故
 ニ陰吹而心喧ト云リ、陰吹ヲ方俗ツビベト云、コレ穀氣ノ
 実ナレバ、穀氣ヲ和シテ、氣ヲ散ズル様ニスレバ治スルナ
 リ、膏髮煎、余未試、但シノビ紙ヲサシテ置内ニ、自ラ和シテ
 愈ル者多シ、医宗金鑑ニハ、雜療方ニアル、長服訶黎勒丸ヲ
 コ、ニ移シテ、コノ証ニ繫ギタリ、實地ヲ踐ミタルト見
 エザレバ、試テ其當否ヲ辨ズベシ、

○蛇床子散、温陰中坐藥、

コ、ニハ温陰中、坐藥トバカリニテ、其病状ヲ云ザレバ、千
 金方ニ、治産後陰中脱方トテ、蛇床子一升、布裹熨之、亦治
 産後陰中痛トアルヲ見ルニ、陰中ノ痛ニカ、ル方ト見エ

夕リ、卷石丸、狼牙湯ト、相通シテ、其証ヲ辨別シテ用ユベシ、
○小兒、疳虫蝕齒方、

小兒ノ治方トテ別アルニハアラザレ、氏外、臺千金ヲ始ト
シテ、諸書ニ皆部ヲ分チタレバ、其処ヲ見テ、經緯篇ノ中ニ
テ、治方ヲ覓スベキナリ、コノ処ニモ本ハ小兒ノ治法アリ
シナラン、論注ニ掛一漏百ト云リ、尤ナルナリ、サテコノ
蝕齒ニ、余ガ家ニテハ、桂枝桔梗湯、加葛根石羔ヲ用ヒ来レ
リ、コレ百發百中ニシテ、无^キ比^ヒ奇方ナリ、回テコノ方ノ代リ
ニ附録トナシテ次ニ序ス、

△桂枝桔梗湯、治牙齒疼痛、齒齦腐爛、兼治上部瘰毒上衝、項
背強急者、隨其證、加葛根石羔、

コレ追々前々篇ニ説キタレバ、コ、ニ贅セズ、ヨク活用ス
レバ、一切上部ノ毒ニカ、ル方ナリ、ヨク考テ用ユベシ、
以上婦人雜病篇、通計二十四個条ヲ以テ、一切經血ノ變ヨ
リ生ズル病状ヲ示シタリ、婦人ノ病ハ、妊娠、産後、雜病ノ三
篇ヲ以テ脩習シ、其外後世ノ書トイヘ、氏、コノ三篇ノ意ニ
當ル方アラバ、一々比較シテ取り用ユベキナリ、

以上緯篇二十三篇、四百十个条ナリ、ソノホカ新補ノ附録、
ハ、枚擧スルニ暇アラス、コノ四百十个条ト、經篇二百三十
九个条ト、通計六百四十九个条ヲ以テ、ヨク脩習シテ思ヲ
尽サバ、病情ノガル、所アランヤ、医ヲ学ブ者、先ツ經緯ノ
両篇ヲ脩得セズンバアルベカラズ、

[Blank page with vertical lines]

△雜療方第二十四

コレハ以上ノ諸篇ニ漏レタルヲ集メタルナリ、急卒ノ方
法、自縊溺喝ヲ救フノ法ヲモ載セタリ、コレ緯篇ノ附録ノ
如キ篇ナリ、

○退五藏虚熱紫胡飲子方

コノ方四時加減トアレバ、加減ハ四時ニヨラズ、何時ニテ
モ病者ノ忘ニヨリテ、ナスベキナレバ、今コレヲ削リタ
リ、藥味ハ明カナレバ、考テ用ユベキナリ、

○治傷寒、令愈不復、紫石寒食散方

コレハ古ヨリ名高キ方ニテ、晋、何晏ガ用ヒタルハ、コノ方
ナルヤ、又別ナルヤハ知ラザレバ、存シテコ、ニ挙ク、余ハ

未試

○救卒死方五方

寒鄉邊鄙ニテ急卒ナル時ニ用ユベキ方ナリ

○救卒死而壯熱者方

コレハ脚氣冲心ニ用ヒタル所ノ礬石湯ナリ併セ見ベシ

○救卒死而目閉者方

コノ騎牛臨面ト云フ何ノ意凡解セズ薤ヲ耳中ニ入レ皂

莢末ヲ鼻中ニ吹クフハ往々試ミタリ

○救卒死而張口作外瞳反折者方

手足ノ爪後ニ灸スルフハコレ亦試ミタリ五毒諸膏散方

未見紫圓ニ代ルカ備急圓カヲ用ユベシ

○救卒死而四肢不收失便者方

牛馬ノ糞ハシラズ心下ヨリ臍上臍下ノ灸ハ常ニ用テ功

ヲ得タリ

○救小兒卒死而吐利不知是何病方

已上薤汁ヲ鼻中ニ灌クヨリコ、ニ至ル迄ノ十方ハ急卒

ノ時ノ治方ナリコノ類ハ皆始ノ瘧病篇ニ就テ治ヲ施ス

ベキナリ

○尸蹙脉動而无気々閉不通故静而死也治方

コレ亦挂屑燒髮ハ急卒ニ忘ズルノミ余コレ迄コノ証ヲ

見タルニ脉モ気モ閉タレバ決シテ附子ノカヨル証ニア

ラズ皆當飯四逆加吳茱萸生姜湯ヲ以テ治シタリ厥陰篇

委少説キタレバ、コ、ニ贅セズ、扁倉傳ニアル、魏ノ太子ノ病ハ、コノ尸蹙ナリ、

△問曰、寸脈沈大而滑、沈則為實、滑則為氣、實氣相搏、血氣入臟則死、入腑即愈、此為卒厥、何謂也、師曰、唇口青、身冷、為入臟、即死、如身和、汗自出、為入腑、即愈、曰、脈脫入臟即死、入腑即愈、何謂也、師曰、非為一病、百病皆然、

コノ条ハ、始人臟腑經絡先後病篇ニアリシヲ、コ、ニ奉テ尸蹙ト同病ナルヲ示スナリ、コノ証モ死人同様ニ見ユル中ニ、脈ノアルトナキト、變化一定ナラズ、サテ寸脈沈大而滑ト云リ、沈大ハ内ニ實スル所ノ脈ナリ、滑ハ内ニ氣ノ凝ル脈ナリ、コレ邪氣内ニ實シテ、ソレガ為ニ氣凝結シテ

ノビス、其实邪ト云氣ト凝結シテ、氣血内ニ陥リ、臟ニ入レバ即死ト云リ、コノ死ハ暫ク取詰テ、人事ヲ省セザルヲ云タルナリ、乃チ卒厥、尸蹙ナリ、入腑即愈トハ、コレハ陽証ニシテ、尸蹙卒厥ノ証ニアラザルヲ云タルナリ、コノ入藏即死スルヲ、卒厥トスルハ、何ノ謂レゾト問ヲ發セシニ、師ノ答ニ、唇口青ク、身冷ヲ臟ニ入ルトシテ即死トシ、身和シ汗自ラ出ルヲ、腑ニ入ルトシテ即愈ト云リ、臟腑ハ陰陽ト云ガ如シ、又問曰、脱脈ニナリテ、手ニ忘ゼズ、入臟即死ト云ヒ、入腑即愈ハ、何ノ謂ゾト云ニ、師ノ答ニ、凡テノ病ニ、脈モ絶シ、唇口青ク、身冷ル者ハ、皆死地ニ陥リタル者ナレバ、其証ヲ辨明シテ引戻スヲ、真医トモ良医トモ云リ、入腑即愈ル

者ハ、自ラ汗出テ一身和シ、獨リト開ケル者ナリ、故ニ非為
 一病、百病皆然ト云リ、コレ一切何病ヨリ来リテモ、コノ陰
 陽藏府ノ差別ニテ、人事ヲ省セザル者ト、又自ラ開ケテ愈
 ル者トノ辨別アリ、コノ義ヲヨク脩習シ置クベキナリ、
 ○救自縊死、且至暮、雖己冷、必可治、暮至旦、小難也、恐此當言
 陰氣盛故也、然夏時、夜短於晝、又熱、猶忘可治、又云、心下若微
 温者、一日以上、猶可治之方、

コノ条以下ノ三法ハ、俱ニ急卒ノ病ナレバ、救フ者稀ナリ、
 又救フベキ法ヲ言フテモ、人多ク集ル時ハ、官ヲ畏レテ、
 手ヲ下スヲ救サズ、奈何トモシ難キナリ、サテ首ヲ少
 、リテ、朝ヨリ暮ニ至ル者ハ、夕トヒ冷アガリテ、少シモ温

氣ハナク氏、治スベシ、晚ヨリ一夜ヲ經テ、翌朝ニ至ル者ハ、
 小シク救ヒ難シ、コレ全クノ不治ニハアラザレ氏、日ノ中
 ノ如ク、心易クハ治セヌト云フナリ、恐クハ夜分ノ間ハ、陰
 氣盛ナルガ故ニト言フ意ナランカ、然ルニ夏ハ夜至テ短
 シ、故ニ夜トテモ熱スル者ナレバ、治スベシ、又心下ニ微温
 アル者ハ、一日以上ヲ過テモ、治スルト云リ、サテ其法ハ、徐
 ヲトテソロクト抱テ、繩ヲトクベシ、繩ヲ截テ、首ヲグンニ
 ヤリサスト、其佟死スルナリ、故ニツ、パリタル佟ニテ、大
 勢ニテ寐処ノ上ニ仰卧サセ、一人脚ニテ肩ヲ踏ミ、手ニテ
 頭髮ヲ挽テ、常ニ弦々トテ、弓ノ弦ヲカケタルガ如ク、ユル
 一又様ニシ、又一人ハ胸ヲ上ヨリ撫デ下シ、又一人ハ臂ヲ

屈伸シ、又一人ハ胫ヲ屈伸シ、ツヨク強バリタラバ、強ク屈伸スベシ、其胸腹ヲ按撫スル、前ノ通りニシテ、凡ソ飯ノ出来ル間程スルト、氣息口ヨリ出テ、呼吸ヲナシ、眼ヲ閉クナリ、コ、ニ於テヤハリ前ノ如ク、五六人ノ役々、引按共ニヤメヌ様ニスベシ、又挨拶等ヲシテ、苦勞ヲサス、至テアシ、須臾アリテ桂湯及ビ粥清ヲ、口カラ含ンテ飲シ、喉ヲ濡スベシ、コレハ桂湯ヨリハ、甘艸湯ノ方大ニ功アリ、ソレヨリダンク、自身ニ嚙ミ吸フニ至ルナリ、サテ又夫ヨリ前ニ、管ヲ以テ兩人一度ニ、兩ノ耳竅ヲ吹シムル、大ニヨシ、コノ法ヲ行テ、活ガル者一人モナシ、實ニ良法ナリ、

○凡中喝死、不可使得冷、得冷便死、療之方、

コレハ途中ニテ、暑邪ノ為ニ倒レタル者ヲ、救フノ術ナリ、コノ病人ハ、冷陰ノ処ニ移シテ、冷ス、甚アシ、冷ヲ得レバ、即チ死スルナリ、之ヲ療スルニハ、艸ヲ縮テ、喝人ノ臍ヲ繞ラシ、三兩人ヲシテ、其中へ小便ヲサスナリ、コレ臍ヲ温ムルノ手段ナリ、又熱シタル泥土ヲ以テ、艸ト一緒ニ臍ノグルリヲ圍ムカ、又ハ茶碗ノ底ヲ又キ、又ハ車ノ真木ノ穴ヲ以テ、臍ニ當テ、小便ノ流レヌ様ニスベシ、コレハ途中ニテ急ナル時ハ、湯ナキ故、多クノ人ニ溺セシムルナリ、コレタゞ、臍ヲ温ムルバカリノ、ナリ、若白湯アラバ、直ニ飲シムベシ、コノ泥并ニ車缸モ、冷ナルハアシ、喝病ハ何レ暑中ノ、ナレバ、途中ニテ熱シタル泥、并ニ煖ナル車缸

モ随分得テ用ヒラルベシトナリ、
○救溺死方、取甕中灰兩石餘、以埋人、從頭至足、水出七孔、即活。

水ニ溺レタル人ヲ救フニハ、灶中ノ灰ヲ以テ、其人ヲ埋メ
バ、水七孔ヨリ出テ活ルナリ、コレタゞ水ヲ吐サスノ手段
ナリ、急ニ水ヲ吐サセサヘスレバヨキナレバ、カノアル
人ヲ頼ミ、足首ヲ兩ノ肩ニカケ、腹ヲ背ニアテ、頭ヲ下ニム
ケ、脊負テ四五町モ往來スレバ、水ヲ吐シテ活スルナリ、又
馬ノ脊ニ横ニ伏卧サセ、馬ヲ走ラシムレバ、亦水ヲ吐シテ
治スルナリ、

右療自縊溺喝之法、並出自張仲景、為之其意殊絶、殆非常情

所及、本艸所能関、救人之大術、傷寒家、數有喝病、非此遇熱之

喝、見外臺
肘後

コレハ上ノ三法ヲ歎羨シタル語ニシテ、外臺肘後ニ出タ
ルヲ、コヽニ引タルナリ、サテ傷寒家、數有喝病ト云ハ、暑中
ニ傷寒同様ノ熱病アリト云意ナリ、暑邪ニテモ、外ヨリ中
リテ、内外通徹スル邪氣ハ、皆傷寒ト同ジナリ、數ノ字ハ、
一人ヤ二人ニアラズ、多クアルヲ云タルナリ、然レハ傷寒
家ニ多クアル喝病ハ、一通リ暑ニ中ラレタル者ニシテ、前
ニ舉タル如ク、途中ニテ暑熱ヲ受テ、卒倒シタル者ニハア
ラズト云意ナリ、コレ始ニ瘧濕喝ノ本篇アリテ、治方ヲ舉
タル故ニ、此ノ如クニ肘後外臺ニ云ル語ヲモ、コヽニ引キ

タルナリ、

○治馬墜及一切筋骨損方、

コノ方ハ、一切ノ打撲ニ用ルニ妙ニ忘ゼリ、数試テ功アリ、
敗蒲席ヲ煎ジテ浴サスルニ、痛ヲ和スルノ奇妙ナリ、少シ
ノ打身ハ、コノガマムシロノ煎汁ニテ浴スルバカリニテ
モ、治スルナリ、

已上十四个条ハ、一切急卒ノ病ニ忘ズル為ニ示シタルナ
リ、元備急丸、還魂湯ノ二个条アリシヲ、前ノ痙病篇ニ移シ
タリ、其意ヲ知テ、急卒病ハ、痙病ノ部類ナルヲ察スベシ、
坊本ニハ、コノ次ニ禽獸魚虫禁忌治法、果実菜穀禁忌治法
ノ二篇アレバ、別ニ和解スルニ及バズ、コレハ一切ノ食毒

又ハ食合セ等ニテ、病患スル者ヲ救フノ法ナリ、回テ次ニ
凡例一个条ヲ挙テ、其大意ヲ示スナリ、

口凡飲食滋味、以養於生、食之有妨、反能為害、自非服藥煉液、
焉能不飲食乎、切見時人不開調攝、疾疢競起、莫不回食而生、
苟全其生、須知切忌者矣、所食之味、有与病相宜、有与身為害、
若得宜、則益体、害則成疾、以此致危、例皆難療、凡煮藥飲汁、以
解毒者、雖云救急、不可熱飲、諸毒病、得熱更甚、宜冷飲之、

サテ食物ハ、生ヲ養フ為ナレバ、食ヘバ妨アルトテ、サツパ
リ絶食モナリ難シ、仙人ノ如キ服藥煉液ノ者ハ知ラズ、平
生ノ人々ハ、飲食ナクテハ叶ハズ、然レ凡天壽ヲ保ント欲
スレバ、急度禁忌ヲ守リテ、妄リニ飲食スヘカラザル者ナ

ルニ世人ハ養生ニ閑ハズシテ、口ノ為ニ一切ノ疾疫競ヒ
 起リ、身ヲ煩フ者多シ、又一切ノ飲食ニモ、病ヲ治スル助ケ
 ニナル物アリ、又身ノ害ヲナス物アリ、宜キ物ハ体ノ益ニ
 ナレバ、害アル物ハ病ヲナスナリ、飲食ヨリ出来タル病ニ
 テ、危キ処ニテ致シタル者ハ、先通例ニテハ治療ノ届キカ
 ヌル者ナリ、又解毒劑ヲ用ルニハ、急ナル時ニテモ、熱飲ス
 ルハアシ、コレ一切ノ毒ハ、熱ヲ得レバ勢ノ盛ニナル者
 ナレバ、冷飲スベシト云リ、コノ二篇ハ、別ニ解ヲ示サレ
 氏、一々読テ其意ヲ察シ、平生ニ用心スベキナリ、余飲食
 ノ禁忌ニ就テ、見聞セシコトアリ、左ニ示ス、關東ヨリ、紅花并
 ニ縮糸ヲ仕入テ、上ル豪家アリ、至テ虛弱ニシテ、服餌養生

十分ニスレバ功ナシ、年方ニ五十ナリ、自謂ラク今悴二十
 歳ニナレリ、トテモコノ大賣買覺束ナシ、何卒六十歳ニ至
 ラバ、悴モ亦三十ナルベシトテ、諸医、其外種々ノ人ニ相談
 シテ、誰モ六十歳ヲ請合フ者ナシ、或、禅僧ニ遇テ尋子シニ、
 僧ノ曰、天命ハ如何トモシ難ケレバ、養生ニヨリテ命ヲ延
 シコトアリ、汝今ヨリシテ三ヲ断ズベシ、何ヲカ三ト謂フ、曰
 ク生冷油ナリ、凡ソ平生食スルニ、生ニテ火熟ヲセヌ物、又
 火熟シテモ、冷ニナリタル物、又一切鳥獸魚肉野菜ニ至ル
 ニテ、油気ノアル物、コノ三ヲ断ズベシト云リ、夫ヨリシテ、
 遠方往来ニ、真鍮ノ鍋ヲ腰ニ付、旅店晝仕度ニ至ルマデ、生
 ナル物ハ、其鍋ニテ煮熟シ、冷ナルハ温メテ食スルコト、凡ソ

三年、馬ニ乗り駕ニノリタルモイツシカ歩行シ、眼鏡モイ
 ラヌヤウニナリ、六十歳ニ至レバ、益、壯健ニシテ、少シノ病
 苦モナシ、然レバ六十歳マデト、心ニ誓フタレバ、其年ヨリ
 隱居シテ、悴ニ世ヲ讓リシニ、壯健ナレバ、悴ノ手代ニナリ
 テ、諸國往來シテ、八十四歳マデ長壽セシトナリ、余コノ事
 ヲ聞テ、多病ナリシニ、三十七歳ヨリ、四十七歳マデ、三年精
 進シ、十年禁酒セリ、宿疾サツパリ愈テ、魂氣モ前ニ倍セリ、
 夫ヨリ五十六歳ニテ、肺癆ヲ患テ、己ニ危篤ニ及ビシニ、又
 二年ノ間、禁酒精進シテ、全快ニ及ビタリ、今六十歳ニ向シ
 トスレバ、サシタル病苦モナシ、實ニ養生ハスベキヲナリ、
 コノ事ヲ、或、高貴ノ御法中ニ申シ上タリシニ、御承知ア

リテ、御養生アリシニ、御幼少ヨリ十五歳マデ、一日トシテ、
 御快キヲナカリシニ、此生冷油ノ三ヲ御断アリシヨリ、御
 病氣サツパリ解シテ、今五六年モ、少シノ御所勞モナシ、其
 外病家ニ告テ、養生ヲサセシニ、用ヒタル者ハ、无病トナリ、
 用ヒザル者ハ、病苦タエズ、或ハ死シタルモ多シ、慎テ世上
 ニ告ク、何卒コノ事ヲ心ニ得テ、天命ヲ保ツ片ハ、必ズ長壽
 スルヲ疑ヒナシ、勿論入房等ハ、慎ムベキヲ言ズシテ知ル
 ベシ、

己上緯篇七卷、治術ノ大概ヲ示スノミ、前々ヨリ説ガ如ク、
 精密ニ至テハ、言語筆頭ノ及ブ所ニ非ズ、各熟練シテ、古医
 ノ方術ヲ自得スベシ、

昆臺益夫謹識

古訓醫傳卷二十

明治十六年八月十七日出版御届
明治十六年九月十日出版

金貳圓拾錢

著者

故

宇津木益夫

京都府士族

宇津木貞夫

東京神田区小川町四十七番地

出板人

發

内外兵事新聞局

同京橋区元数寄屋町三丁目四番地

兌

鳴屋利助

日本橋区馬喰町三丁目五番地

