

31

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2m 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JAPAN



武門  
卷五  
516  
8

赤水玄珠第二卷目錄

暑門

注夏

解体

湿門

赤水玄珠第二卷

新安生生子孫一奎著

暑門

明暑篇

五運六化篇曰相火之化暑主於夏夏之為言大也與午同意炎暑乃行有中冸有傷有暑風乃三之氣也

內經曰因於暑汗煩則喘渴靜則多言體若燔炭汗出而散光夏至日發者為病溫後夏至日發

方水經卷二十一  
二十一  
為病暑暑當與汗皆出勿止

脉虛身熱得之傷暑

難經曰傷暑得之為正邪火自病也當惡其病

身熱而煩心痛其脉浮大而散

潔古曰靜而得之為中暑動而得之為中熱中暑者陰症中熱者陽症

東垣曰暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂太廈得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚火熱無汗為房

室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越多以大順散熱藥主之是也若行人農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發熱惡熱捫之肌膚太熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷肺氣葛木白虎湯涼劑主之劉宗厚曰按此論中暑即仲景所謂中暍是也此只作暑熱分之可見有陰陽二症受病不同然夏月受病有陰寒所遏使周身陽氣不得伸越以大順散主之者為中暑蓋當暑月名之猶冬

月發熱為傷寒也但中熱治例雖云用葛木白虎湯而又處清暑益氣之法况大順散一方是仲景太陽例藥然東垣施用諒不如叫必有若益氣湯証例發揮曠者惜乎無傳故使後人不能無疑也詳後所論矧中暑証亦有於勞役動而得者中熱証亦有於避暑靜而得之者太抵因人元氣虛實不同故所受亦異為治豈得而無變法哉

陳無擇曰暑熱喜歸心心中之使火噎悶昏不知

入入肝則眩暉頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痰甓入腎則消渴凡中渴者死治之切不得用冷惟宜溫養得冷則死道途中無湯即以熟土熨腋中仍以熱溺沃之槩可見矣凡覺中暑急嚼生姜一大塊水送下如已迷悶嚼大蒜一下大瓣水送下如不能嚼水研灌之立醒治暑之法清心利小便甚好若自汗甚者不可利小便宜白虎湯清解之次分表裡治之如在裏頭疼惡寒雙解散加香薷及二香散香薷飲之

類解之如在半表半裡泄瀉煩渴飲水吐逆者  
五苓散治之熱甚煩渴者益元散清之若表解  
裏熱甚宜半夏解毒湯下神芎丸酒蒸黃連丸  
等或人平素弱及老人冒暑脉微下利渴而喜  
溫或厥冷不省人事宜竹葉石膏湯加葛根附半  
箇冷飲次以來復丹五苓散治之凡夏暑証不  
可服諸熱燥劑致班毒發黃小水不通悶亂而  
死矣

盛夏發熱有傷寒冒暑二誌右熱有進退則為冒

暑一向熱不正則為傷寒  
林氏曰中暑之証面垢悶倒昏不知人冷汗自出  
手足微冷或吐或瀉或喘或滿其脉浮虛名曰  
暑風慎不可用冷水及純太寒之劑即以蘿合  
香圓姜湯調灌或研蒜水灌之醒後用清暑之  
藥調理又有因暑氣入於心包絡而鼓激痰塞  
心竅卒倒不語者急宜吐出痰涎隨用導痰湯  
合黃連香薷飲加竹瀝姜汁

丹溪云暑乃夏月炎暑也盛熱之氣著人也有冒

有傷有中三者有輕重之分虛實之辨或腹痛水瀉者脾與太腸受之恶心者胃口有痰飲也此二者冒暑也可用黃連香薷飲清暑益氣湯。蓋黃連退暑熱香薷消蓄水或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此為熱傷在分肉也當以解毒白虎湯加柴胡氣虛者加入參或咳嗽發寒熱盜汗出不正脉數者熱在肺經用清肺湯柴胡天水散之類急治則可遲則不救火乘金此為中暑凡治病須要明白辨別慎勿滾。

同施治春秋間亦或有之切莫執一隨病處方為妙

按傷暑與傷寒身皆發熱不可不辨明施治。蓋寒傷形熱傷氣傷寒則外惡寒而脉浮緊經曰脉盛身寒浮之傷寒脉虛身熱得之傷暑傷暑則不惡寒而脉虛為異也故從小柴胡湯渴加知母石膏或人參白虎湯或清暑益氣湯

人參白虎湯治暑熱發渴脉虛

人參半一錢知母二錢石膏五錢甘草一錢  
粳米一合水煎服

竹葉石膏湯

石膏一兩半夏二錢甘草 人參錢二 麦門冬  
五錢竹葉十片

每服一兩生姜三片水煎服

十味香薷飲 治暑熱身倦神昏頭重吐利

香薷一兩 人參 陳皮 白朮 茯苓

黃耆 木瓜 厚朴 白扁豆

甘草各五錢

每服一兩水煎服

一方無參芪陳皮加紫蘿蔔藿香檀香各等分名

消暑十全飲 除暑渴霍亂吐瀉

益元散 治熱而煩悶小便赤澁

滑石 六兩甘草一兩

五苓散  
白朮 茯苓 猪苓各半澤瀉二兩桂一兩  
右為末每服二錢或三錢冷水調下燙心湯  
亦可 热盛加辰砂 欲發汗用葱白湯調

右為末每服二三錢熱湯調下

加辰砂名辰砂五苓散

縮脾飲 除暑渴止吐瀉

砂仁

草果

烏梅肉

甘草

炙各四兩

扁豆

乾葛各二兩

每服六錢水煎冷服

大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水谷不分氣逆霍亂嘔吐

甘草

乾姜

杏仁去皮

桂

右先將甘草用白砂炒黃次入姜却下杏仁以不作聲為度篩去砂入桂為末每服二三錢水煎溫服 如煩躁井花水調服以沸湯點眼亦得

來復丹

治伏暑泄瀉身熱脉弱

硝石

一兩  
柳條同硫黃火上微炒

研末太陰玄精石

一兩

研末大劑

研末

硫黃

一兩

青皮

五靈脂

去沙陳皮各二兩

右為末好醋糊為丸菉豆大空心米飲下二

大黃三十九

大黃龍丸 中暑昏暈身熱惡寒頭痛或往來寒熱煩渴吐瀉

舶上硫黃 硝石各一推黃 滑石  
白礬 鐳五寒食麵四兩

右為末滴水丸如梧子大每服五丸至七丸漸加至四十九丸

劉宗厚曰此藥通利三焦分理陰陽溫胃開結治揮霍變亂神志昏憒元氣下陷者甚捷然病因實火溫熱者勿用

子和桂苓甘露飲 伏暑發渴脉虛

桂枝 人參 薤香各半 茯苓

白朮 甘艸 葛根 泽瀉

石膏 寒水石各一錢

為末白湯調三錢

宣明桂苓甘露飲

茯苓 澤瀉各一石膏 寒水石各二兩

滑石四兩 白朮 桂枝 各半兩

為末溫湯調下二三錢

生脉散

人參 五味子 麦門冬 各二錢

水煎服

丁方加黃芪 甘草

却暑散

治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐瀉痢煩渴

背寒面垢

赤茯苓

甘草 酸寒食麵

生姜 各一斤

右為末 每服二錢 白湯下

冷香飲子

治傷暑鳴霍亂腹痛

躁脈沉微或

伏

黃連解毒湯

治傷暑鳴霍亂腹痛

躁脈沉微或

草果附子 陳皮 酸寒食麵 生姜 各一斤

每服一兩

水煎入姜 冷服

黃連解毒湯

方在火門

二氣丹 伏暑傷方二氣交錯中脘痞悶或頭痛  
惡心並治

硝石

硫黃各等分

右為末 銀器內文武火炒令黃色 再研細  
用粳米煮粥為丸如桐子大 每服四十九粒  
汲水下

香薷丸 大人小兒傷暑伏熱燥渴脅悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並治

香薷去根兩

木瓜

紫蘿葉

藿香洗

茯神各半兩

甘草

冬

檀香

丁香各二錢半

右為末煉蜜和丸鷄頭子大每服一丸至二丸細嚼溫湯下或新汲水化下

春澤湯 伏暑發熱煩渴引飲小便不利兼治傷寒陰陽不分疑似之間最宜服此

澤瀉三錢猪苓

茯苓

白朮各二錢

桂心

紫胡蘗 一人參

麥門冬各一錢

渴甚太極加五味子黃連各二錢

柏子仁

大人小兒伏暑吐瀉虛煩悶亂

甘草冬

紫蘿

澤瀉

香薷

半夏麯

白扁豆

木瓜

厚朴姜制各

錢

姜三片棗一枚水煎服

清暑六和湯 心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔

吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胃脘痞滿頭自昏  
痛肢體浮腫嗜卧倦怠小便赤澁并傷寒陰陽  
不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食  
砂仁 半夏泡 杏仁去皮人參

藿香 扁豆 香薷 赤茯苓

厚朴姜制木爪鑠

一甘草炙五分

姜五片棗一枚水煎服

消暑十全散 伏暑胃氣不和心腹滿痛並

香薷 扁豆

厚朴姜制甘艸炙

紫蘿 白术 茯苓 蕃香

木爪

檀香各一錢

姜三片水煎服

黃龍丸和劑方治伏暑發熱嘔吐惡心並

黃連

淨三十兩好酒五升煮乾研為細末麵糊丸

梧子大每服五十九白湯下

枇杷葉散治暑毒攻心衄血嘔血或吐瀉作渴

香薷

二錢厚朴姜炒一錢半甘草錢半麥門冬

木爪

茅根錢一枇杷葉陳皮

丁香各半錢

每服三五錢姜水煎服

○注夏

子和曰痀之<sub>也</sub>皆五月六月七月之時午者少陰君火之位未者湿土庚金伏火之地申者少陽相火之分故痀發此三月之內為熱也故病痀之人其脈浮大

丹溪云注夏屬陰虛元氣不足補中益氣中去柴升加炒黃柏挾痰者加南星

東垣曰刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也痀論曰有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎者水藏也今水不能勝火則骨枯而髓虛足不任身發為骨痀故下經曰骨痀者生於大熱也此濕熱成痀令人骨乏無力故治痀獨取於陽明時當長夏濕熱太勝蒸人而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩心下脹痞小便黃而數大便溏而頻或

病出黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食  
自汗身重或汗少者血先病而氣不病也其脉  
中得洪緩若濕氣相搏必加之以遲病雖互換  
少差其天暑溫令則一也宜呂清燥之劑治之  
內經曰陽氣者衛外而為固也熱則氣泄今暑  
邪干衛故身熱自汗以黃芪甘溫補之為君人  
參陳皮當歸甘草甘微溫補中益氣為臣蒼朮  
白术澤瀉滲利而除湿升麻葛根苦甘平善解  
肌熱又㕮咀勝濕也濕勝則食不消而作痞滿

故炒麵甘辛青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食  
辛以潤之故以黃柏苦寒借甘味潤熱補水虛  
者滋其化涼㕮咀人參五味子麥門冬酸甘微寒  
救天暑之傷於庚金為佐名曰清暑益氣湯  
黃芪一錢汗少減五人参 澤瀉

白术

神麴

陳皮各五

甘草炙

葛根

黃柏

酒浸麥冬

歸身各三分

升麻

蒼朮

葛根一五味子九

青皮三分半

作一大服水二大盞煎至一大盞去渣食遠溫服

劑之多少臨時斟酌此病皆由飲食勞倦傷其脾胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉猪苓茯苓心通草木通淡味滲利小便之類皆逆時令之旺氣以泄脾胃之客邪而補金水之不及也此正方已是逆權而立之若其時病濕熱脾旺之症或小便已數腎肝不受邪者誤用之必大漏真陰竭絕腎水先損其兩目也復立變症加減法於後如心火乘脾乃血受火邪而不歸升發陽氣伏於地中

地者人之脾也必用當歸和血少用黃柏以益真陰如脾胃不足之證須少用升麻乃是陽明太陰引經之藥也使行陽道自脾胃中右遷少陽行春令生萬物之根蒂也更少加柴胡使諸經左轉生發阴阳之氣以滋春升之和氣也如脾虛緣火亢極而乘其土也其次肺氣受邪為熱所傷必須多用黃芩甘草次之人参又次之三者皆甘溫之陽藥也脾始虛肺氣先絕故用黃芩之甘溫以

益皮毛之氣而閉腠理，不令自汗，而損元氣也。上喘氣短懶語，須用人參以補之。心火乘脾，須用炙甘草以瀉火熱而補胃脾中元氣。甘草最少，恐滯也。若脾胃之急痛，并脾胃太虛，腹中急縮，腹皮急縮者，却宜多用經曰急者緩之，唉甚者去人參，如口乾嗌乾者加乾葛。如脾胃既虛，不能升浮為陰火傷其生發之氣，榮血大虧，榮氣伏於地中，陰火熾盛，日漸煎熬，血氣虧少，且心包與心主血，血減

則心無所養，致使心亂而煩，病名曰寃。寃者心惑而煩悶，不安也。是由清氣不升，濁氣不降，清濁相干，亂於胸中，使周身血氣逆行，而亂經。云從下上者，引而去之，故當加辛溫甘溫之劑，生陽陽生，而陰長也。已有甘溫三味之論，或曰甘溫何能生血？又非血藥也。曰仲景之法，血虛以人參補之，陽旺則能生陰血也。更加當帰和血，又宜少加黃柏以救腎水，蓋甘寒瀉火，火減則心氣得平而安也。如

神農本草經 卷二  
煩亂猶不能止少加黃連以去之蓋將補腎水使腎水旺而心火自降扶持地中陽氣也如氣浮心亂則以硃砂安神丸鎮固之煩一減勿再服以防濱陽氣之反陷也如心下痞亦少加黃連氣亂於胸為清濁相干故以陳皮理之能助陽氣之升而散滯氣又助諸甘辛為用故長夏濕土客邪火旺可後權加蒼术白朮澤瀉上下分消其溫熱之氣濕氣大勝主食不消化故食減不知穀味加炒麵以

消之復加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣助秋損也此三伏中長夏正旺之時藥也

脾胃虛弱隨時為病隨病制方夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏暑氣熱甚損傷元氣怠惰嗜卧四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物暎々無所見小便頻數大使秘結胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍下周圍如繩束之

急甚則如刀刺腹難舒伸，胸中閉塞時，溫嘔噦或有痰嗽口沃白沫，舌強腰背腹皆痛，頭痛時作食不下或食入即飽全不思食，自汗尤甚。若陰氣覆在皮毛之上，皆天氣之熱助本病也。乃庚大腸辛肺氣為熱所乘而作，當先助元氣治，庶之不足，黃芪人參湯主之。

黃芪一錢如鉗汗過人參

白术各五分

陳皮

甘草

當歸

黃柏以救腎水之源

麥冬各二錢

神曲炒三錢

五味子

拗升麻

六分

葛根五分無汗一錢右俱作一服水二盞煎至一盞稍熱食遠或空心服之。忌酒濕麵大料物之類及過食冷物○如心下痞悶加黃連二三分○如胃脘當心痛，咸太寒藥加草豆蔻仁五分○如脇下痛或縮急加柴胡二三分○如頭痛目中溜火加黃連二三分川芎三分○如頭目不清利上壅上熱加蔓荆子三分藁本二分細辛一分川芎三分生地黃二分○如氣短精神少或夢寐間困乏無力加五味子九粒○如大便澀滯隔

一二十日不見者致食少，食不下，血少，血中伏火，而不浮潤也。加當歸身生地黃各五分，桃仁三個，麻子仁研泥五分。○如太便通行，所加之藥勿再服。○如大便又不快利，勿用別藥，少加木黃根五分。○如不利者，非血結血秘，而不通，是熱則生風，其病人必顯風症，單血藥不可復加。止常服人參黃芪湯煎，只用羌活五錢，防風五錢，二味㕮咀，以水四盞煎至一盞，大查空心服之。太便必大走也。一服便止。○如胸中氣滯，加青皮橘紅各三分。

倍之去其邪氣。此病本元氣不足，惟當補元氣，不當瀉之。○如氣滯太甚，或補藥太過，或心下有憂鬱之事，更加木香三分，或砂仁二分，或白豆蔻仁二分，與正藥同煎服。○如腹痛，不惡寒者，加白芍藥五分，黃芩二分，咸五味子。

夫脾胃虛弱，至六七月間，河漲霖雨，諸物皆潤，人汗沾衣，身重短氣，甚則四肢痿軟，行步不正，脚欹，眼黑，欲倒者，此腎水與膀胱俱竭之狀也。當急救之，滋肺氣以補水之上源，又使庚太陽不受邪熱。

不令汗大泄也。汗泄甚則亡津液。亡津液則七神無所依。經云：津液相成，神乃自生。津者，肝、大腸所主。三伏之義為庚金受囚也。若亡津液，汗大泄，溫令亢盛，則清肅之氣亡。燥金受囚，風木無可以制故。風溫相搏，骨節煩疼，丁身盡痛。亢則害，承乃制是也。孫思邈曰：五月常服五味子，是瀉丙火，補庚金。大腸益五臟之元氣。玉膀胱之寒已絕於巳亥，腎水已絕於午。今更逢溫旺，助熱為邪。西方北方之寒，消絕矣。聖人立法，夏月宜補者，補天元之真。

氣非補，熱火也。令人夏食寒，是也。為熱傷元氣。口人參麦門冬、五味子，生脉脉者，元氣也。人參之甘，補元氣；瀉熱火也。麥門冬之苦寒，補水之源，而清肅燥金也。五味子之酸，以瀉火。補庚，大腸與肺金也。當此之時，無病之人，亦或有二症。况虛損脾胃，有宿疾之人，遇此天暑，將理失所，違時伐耗，必困乏無力，懶語，氣短，氣促似喘，非喘，骨乏無力，其形如夢寐朦朧，如烟霧中不知身所在也。必大汗泄，若風犯汗眼，皮膚必搐，項筋皮枯，毛焦身體。

皆重，肢節時有煩疼，或一身盡疼，或渴或不渴，或小便黃溢，此風溫相搏也。頭痛或頭重，上熱壅盛，口鼻氣短，氣促，身心煩亂，有不樂生之意，情思慳悽，此陰勝陽之極也。病甚則傳腎肝，為瘡厥。厥者四肢如在火中者，為熱厥；四肢寒冷者，為寒厥。厥則腹中有寒熱厥，腹中有熱為脾主，四肢故也。若肌肉濡潰痺而不仁，傳為鬲瘡證。中皆有肺疾，用藥之人當以此調之。氣上衝胸，皆厥證也。瘡者四肢痿軟而無力也。其心煩冤不正者，是心神擾亂。

厥者氣逆也，甚則大逆，故曰厥。逢其厥，癥瘕多相湏也。於前已立黃芪人參五味子麥門冬湯中，每加白茯苓二分，澤瀉四分，猪苓白朮各二分。如小便快利，不黃溢者，只加澤瀉二分，鷄子朮上下分消其濕，如行步不正，脚膝痿弱，兩足欹側，已中瘡邪者，加酒洗黃柏知母三分，或令兩足湧出力氣，如汗大泄者，津脫也，急止之。加五味子五粒，炒黃柏五分，炒知母三分，不全妨其食，當以意斟酌。若妨食，則止候食進，再服取三里氣街，以三棱針出血。

若汗不正不減者於三里穴下三寸上薦穴出血禁酒溫麴去痰者溫熱乘於腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭盡而成軟癱必腰下不能動心煩冤而不正也若身重或氣不短小便如常及溫熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子澤瀉猪苓茯苓黃柏知母葛朮白朮之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黃柏二分或三六七月之間溫令大行子能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚太陽故用寒涼以救之燥金受濕熱

之未絕寒水生化之源源絕則腎虧瘓厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動矣步行不正兩足欹側以清燥湯主之

黃芪一錢黃連一錢  
陳皮一錢  
白茯苓一錢  
升麻各三分  
麥冬一錢  
黃柏酒製甘草各二分

每服半兩水二盞煎至一盞稍熱空心服

丹溪治宋某勞傷發熱當作注夏治之

黃柏炒

升麻各三

黃芩 人參

木通

白芍各五

白朮一錢陳皮

甘草淡格

婦人患注夏手足痠軟而熱

白朮

黃柏炒

白芍

陳皮

當歸各一

菟絲子

甘草五分

○解你音亦

生生子曰平人氣象論篇云尺脉緩濶謂之解你

王注曰尺者陰部也腹腎主之緩為熱中濶為無血故解你也  
解你之證憊倦困弱寒不甚寒熱不甚熱心見入見之心惕然或熱多而汗出肢體百骸散解痿弱而不勝任特少氣而不欲言左右停不可以名其狀故謂之解你注夏之証殆相似亦虛類也其治大生脈湯足以主之加木瓜苡仁停者能困弱也

大生脈湯治注夏脉倦嗜卧百凡懶動動則喘

之方出養門

又方

又甘枸杞子  
北五味子

研碎貯瓶內滾水泡封口少刻取服之可泡  
三次每服六錢久服為妙

○濕門  
明湿篇  
生生子曰六氣之中濕為四之氣土之所司脾為  
之主五運六化篇曰土之化曰溫曰雨主於長  
夏長夏謂六月也土生於火長在夏中既長而  
旺土潤溽暑溫化行也蓋燥則土生乾則土死  
泉出地中溫化信矣經曰地氣上為雲天氣下  
為雨雨出地氣雲出天氣則土雨之化見也經  
曰溫勝則濡洩人每夏月洩瀉多以胃苓湯益

元散五苓散，取效者實治濕令之勝也。

生生子曰：內經云：諸溫腫滿皆屬脾土。溫勝則濡瀉，地之濕氣感，則害人皮肉筋脉。又曰：因於溫首如裹。蓋首者諸陽之會，至高至清。若濕氣薰蒸而沉重，似有物以蒙之也。失而不治，則鬱為熱、傷血，不能養筋，故太筋緩短而為拘挛。濕傷筋，不能束骨，故小筋弛長而為萎弱。矣，濕之為邪，有自內得者，有自外得者。陰雨濕地，皆外所因。飲食湯飲醕酪，皆內所因。有濕寒者，有濕

熱者。丹溪曰：六氣之中，湿熯為病，十居八九。湿在上，宜微汗之，不欲大汗。湿在下，宜利小便。此淡滲治濕也。溫雖有內外，一曰自然治法，太抵要實脾土為主。緣脾惡濕，苟脾土不燥，則失其健運之常。病易乘之。內溫多，則泄瀉生痰，流於經絡肢節，則腫痛。外溫多，則跗腫，而肌肉濡潰。原病式曰：諸瘡彈直，積飲痞膈中，滿霍亂吐下，躰重，跗腫，肉如泥。按之不起，皆屬於溫。是以蒼白二木為必用之藥，加入二陳湯用之，如溫在肌

表及上焦加羌活防風之類，取風能勝濕之意。  
如下焦腰足跗腫及泄瀉輕者，加入五苓散重  
者，加羌活防風升麻以升提之。此無上妙法也。  
賈真孫曰：溫為土氣火熱，生濕土，故夏熱則萬  
物溫潤，秋涼則萬物乾燥。濕病本不自生，因熱  
而怫鬱，不能宣行水道，故停滯而生溫也。况脾  
土脆弱之人，易為感冒，豈必待不流而後為溫  
哉？人只知風寒之威嚴，不知暑溫之炎烈，感人  
於冥冥之中也。病式云：諸症強直積飲等症，皆

屬於溫，或附腫躄寒而有水氣裏必小便赤少  
不通，或渴是蓄熱入裏極深，非病寒也。太抵治  
法宜實脾清熱利小便為主，故治溫不利小便  
非其治也。宜桂苓甘露木香葶藶木通治之。守  
真師曰：葶藶木香散下神芎丸，此藥下水溫消  
腫脹利小便理脾胃，無出乎此也。腹脹脚腫甚  
者，舟車丸下之。濕熱內鬱發黃，茵陳湯下之。或  
佐以防己黃芪，一身盡腫痛，或無汗，是濕流閼  
節邪氣在裏，宜五苓散加官桂蒼朮微汗之。不

可大汗。若自出汗多，熱燥津液內竭，小水不利。  
切勿利之，重損津液也。宜防風白朮甘草湯主之。  
其濕症有二：濕熱症，多濕寒症。少當以脉症明辨之。如脉滑數，小便赤澁，引飲為濕熱症；若小便自利，清白太便，鴻利身疼，自汗為濕寒症。治之宜五苓散加生附子、蒼朮、木瓜，主之。出王機微義  
金匱防已黃芪湯 治風濕脉浮身重，汗出惡風或疼。

防已

黃芪各一 甘草錢五 白朮七錢

右每服一兩，入姜棗煎。喘者加麻黃、胃氣不和加芍藥，氣上衝加桂枝，下有寒加細辛。

按溫勝身重，陽微中風，則汗出惡風，故用黃芪灸甘艸實表，防已白朮勝溫也。

桂枝附子湯 治風溫相搏，身體痛煩，不眠轉側，不嘔，不渴，脉浮虛而濇者，此湯主之。

桂枝八錢，生姜六錢，附子三錢，炙甘草四錢。

右作三次，入裏煎服。小便自利者，去桂加白朮，湯主之。服後其人如冒狀，乃藥加使然也。

勿怪

甘草附子湯 治風溫相搏，骨節痛，掣痛，不得屈伸。近之則痛劇，汗出短氣，小便不利。惡風，不欲去衣，或身微腫，痛者。

甘草炙 白术各四 附子三錢 桂八錢

水煎服

金匱方減桂枝加生姜大棗名白

术附子湯

麻黃加术湯 治溫勝，身煩，痛

麻黃六錢 桂枝四錢 甘草錢二 杏仁二十五枚

水煎服

白术八錢水煎取微汗，金匱減桂术加薏苡仁，名麻黃薏苡杏仁甘草湯。治溫勝，身疼，日晡所劇者。

元戎加味五苓散 治溫勝，身疼，小便不利，財重，發渴。本方加羌活，此乃太陽滌利之劑。治風溫寒濕之藥也。

局方五積散 治外感風寒，冒寒溫，身躰重，痛海藏云：麻黃桂芍甘草，即麻黃桂枝各半湯也。荳木甘草陳皮厚朴，即平胃散也。枳壳桔梗陳

皮菝苓半夏即桔梗半夏等湯也又川芎當歸治血，蕙乾姜厚朴散氣此數藥相合為解表溫中，泄濕之劑去痰消痞調經之方雖為內寒外感表裏之分之所製實非仲景表裡麻黃桂枝姜附之的方也。至於積冷嘔泄時疫項背拘急加荅白豆豉厥逆加吳茱萸寒熱欬逆加薑婦人難產加醋始知用之非一途也。惟知活法者其擇之。此方一兩加生姜五片水煎入射香每煎二沸治中溫而致癱瘓與中風相似。立效

局方滲溫湯 治寒溫所傷身重腰冷如坐水中小便或澁大便溏瀉皆半臥湿地或陰雨所襲乏也  
乾姜 茯苓略二陳皮 甘草略一  
每服四錢入棗煎服  
茵陳五苓散 湿熱勝發熱黃疸  
茵陳蒿一兩五苓散五錢 水煎服  
大橘皮湯 治溫熱內甚心腹脹滿小便不利太便滑泄

橘紅一兩木香一錢滑石六兩檳榔三錢

茯苓一兩猪苓

澤瀉

白朮

桂枝錢五甘草二錢

每服七錢入姜水煎服

葶苈木香散

治湿熱

內外餘熱水腫腹脹小便

赤瀉大使瀉

猪苓

白朮

一錢

木香五分澤瀉

木通

甘草

桂枝錢五滑石三兩

右為細末每服三五錢白湯調下

劉河間曰若小便不得通利而反轉泄者乃濕熱痞悶極深而攻之不開是脉反為注泄此正氣已衰而多難救慎不可與以也然當滋其化

源

東垣清燥湯表裡有濕熱壅瘀癱瘍不能行步或足踝膝上皆腫痛口乾渴病

方在注夏

吐劑

爪蒂散治中寒溫頭痛面黃鼻塞煩而脉大

李

瓜蒂一味為末以少許吹入鼻中黃水自出  
按濕盛致痰液畱膈上肩背重痛麻痺者宜此  
吐之

東垣 攻下之割

宣明三花神祐丸 治一切水溫腫病大腹實脹  
喘滿

舟車丸

大黃二兩甘遂 大戟 芫花  
青皮 陳皮各一牽牛 木香各半

濟川散 為末滴水丸如梧子大每服六七十丸白湯

大黃

煨頭末四兩

郁李仁蜜甘遂一兩芒硝半兩

牽牛

四兩

右為末姜湯調下空心臨卧隨症加減服  
導水丸 溫熱內鬱胸膈痞滿軀體口舌生瘡喉  
喉不利牙疳齒蝕口臭或遍身生湿瘡乾疥睡  
語咬牙驚惕怔忡大小便滯滯風熱酒毒蘊熱  
芽症

大黃 黃芩 酵二 牽牛頭末 滑石各四

為末水丸如梧子大每服五十丸白湯下臨

時隨症加減

除湿丹 諸濕相搏腰膝重痛足腫浮腫筋脈緊急津液凝滯便溺不利

檳榔

甘遂

威靈仙

赤芍

澤鴻

葶苈各二

乳香

沒藥一

牽牛五錢

大戟炒三

陳皮四兩

右為末糊丸梧子大每服五七十丸溫水下

劉宗厚曰按此出太陽例藥諸濕鬱滯於表裡重痛沉著非此不能除但中病即止虛弱者當慎

東垣海金沙散 脾溫太過遍身腫滿喘不得卧及腹脹如鼓

牽牛微炒丙半一甘遂五錢白朮一两海金沙三錢

右為末每服二錢煎逆流水調下得利止後服

聖靈丹 脾肺有濕喘滿腫盛小便赤澁

苦草蘆炒四兩

漢防已

木香

茯苓寒餚麵

木通

人參各二錢半

右為末，棗肉為丸，梧子大，每服三十丸，桑白

皮湯下。

續隨子丸 肺經有溫，通身虛腫滿悶，不快，或逆，或喘。

人參

防已

赤茯苓

梗上檳榔

木香鉛五錢

荳歷炒四兩

續隨子

一海金沙

半兩

為末，棗肉為丸，梧子大，每三十丸，桑白

皮湯下。

導滯通經湯 治脾胃有餘氣不宣通，面目浮足  
腫脹悶而痛，即五苓散減，猪苓桂加陳皮木香，  
對金飲子 治脾胃受溫，腹脹，米穀不化，飲食不  
進，身體沉重，肢節酸疼，皮膚微腫。  
平胃散 桑白皮一錢，為末，每服二三錢，入姜，  
煎服。

除濕湯

半夏曲

厚朴

蒼木鉛二錢，藿香葉

橘紅

白朮

白朮芩錢各一錢，甘草七分

姜三片水煎服

白术酒

治中温口噤不知人

白术一兩酒二鐘煎至一鐘

不拘時服不飲酒

以水煎

撫芎湯

溫流關節臂痛手重或自汗頭眩痰逆

恶心

撫芎

白术 橘紅各一錢甘草五錢

每服五錢姜七片水煎服

黃芪湯

風濕相搏脉沉而絃客在皮膚四肢少

力關節疼痛

黃芪

五兩橘紅二兩甘草

兩白茯苓一兩

防風四兩

東坡右每服六錢姜三片棗一枚水煎服  
羌活勝濕湯

羌活

獨活礬一錢本

防風

甘草

炙川芎各五分蔓荆子三分

水煎空心溫服

如身重腰沉然加酒洗防已五分輕者附子

五分重者川烏五分

清熱滲溫湯

黃連

茯苓

澤瀉

錢一黃柏鹽水炒

蒼朮

白朮

錢半

甘草五分

水煎服

如單用

滲溫去連柏加陳皮乾姜

東垣參术湯

潔古云起卧不眠謂之溫身重是

也此方主之治脾胃虛弱元氣不足榮養心肺

四肢沉重食後昏悶

黃芪二錢人參

陳皮

青皮各五分

升麻

柴胡各三

甘草

錢四分

酒黃柏三分

神曲七分蒼朮一錢當歸二分

水煎食前帶熱服

大宮詹少溪吳馭閣校

終

天官鳳之舞六鳳闕林

三十五

中興二年  
樂府二卷  
樂府各三  
替草大四  
陳詩三

