



30
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20

3
2
1

0

Kodak
LICENSED PRODUCT

M

KODAK Gray Scale

門
武9
516
4

赤水玄珠第三卷目錄

燥門

寒門

中寒

惡寒

頭痛門

附頭風

眉稜眶痛

雷頭風

大頭病

風屑

頭重

赤水玄珠第三卷

新安生生子孫一奎著輯

燥門

○明燥篇

生生子曰諸書視燥為風熱為血少是固然矣予謂諸書僅言病機耳而令氣則未之及也夫燥是亦氣中五之氣也運氣六化篇已明言之其論曰在地成形在天為氣行有五而氣有六以分君火相火之化六氣化者謂寒溫暑燥風火也乃天之

元氣然後三陰三陽上奉之謂之標六氣皆有化舉
太既也而難經亦曰辛商也丙之柔則金之化明矣觀
運氣以郊酉為阳明燥金司天者又豈無所本哉夫金
者西方之氣在人主肺運氣所以不言肺而言陽明
者緣肺為華蓋雖陰臟居膈上處陽之部位必待
陽而後發故屬陽明也金之化清與燥主於秋為五
之氣主秋分后六十日有奇自斗建酉正至亥之中天
度至盡清氣乃行萬物皆燥也一年之間有此必然
之勢亦有此必然之理也何以然金屬庚辛辛為丙

婦帶火之氣故燥予故曰素問言燥者指金氣
也諸書云燥者指病機也燥之胎自丙中來故
古人有云莫治風莫治燥治得火時風燥了此
深得夫燥之旨者同志者詳之

內經病機云諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥

○燥本風熱論

原病式云經曰風熱火同陽也寒燥濕同陰也又
燥濕小異也然燥雖屬秋陰而異於寒濕故反
同其風熱也故火熱盛金衰而風生則風勝

溫熱能耗液而反燥陽實陰虛則風熱勝於水
濕而為燥也凡人風病多因熱甚而成燥者為
其兼化以熱為其主也然陽實陰虛而風熱太
甚以勝水溫因而成燥肝主於筋而風氣自甚
又燥熱加之液還聚於胸膈故為病筋脉勁強緊急而
主於收斂勁切緊澀故為病筋脉勁強緊急而
口噤也或病燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴者
或風熱燥甚怫鬱在表而裏氣不舒善伸數欠
筋脉拘急或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而絃

也風熱燥并鬱甚於裡故煩滿而或悶結也及
風癇之發作者由熱甚而風燥為兼化涎溢胸
膈而瘞癰昏冒僵仆也凡此諸症皆由熱甚而
生風燥各有異者由風熱燥各微甚不爭故也
所謂中風或筋緩者因其風熱勝溫而為燥乃
燥之甚也然筋緩不收而瘞癰及諸臍鬱病瘻
皆屬金肺乃燥之化也如秋深燥甚草木瘞落
而不收病之象也是以手得血而能握足得血
而能步夫燥之為病者血液衰少也而又氣血

不能通暢故病然也

論結燥病本不同

東垣曰金匱真言論云北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若飢飽勞逸損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液衰少故大便結燥然結燥之病不一有熱燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結者治法云腎惡

燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得太便以辛潤之太陰不得太便以苦瀉之陽結者散之陰結者熱之仲景云太便硬小便利不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿食不化腹响然不能太便者以苦藥瀉之太抵津液耗少而燥者以辛潤之有物而結者當下之若不究其源一槩用巴豆牽牛之類下之損其津液燥結愈甚有復下復結極則以至引導於下而不能通者遂成不救之症可不慎哉

赤水玄珠 卷三
劉宗厚曰按此只是論結燥言裏証也河間所論則兼表裡而言

醫經統旨曰燥是陽明之化雖因於風熱所成然究其原皆本於血虛津液不足所至者為多何也蓋陰血虛則不能榮運乎百脉津液衰則無以滋養乎三焦由是邪熱怫鬱而燥變多端或燥於外數則皮膚皴結或燥於內數則精血枯涸燥於上咽鼻焦乾燥於下便溺閉結治之者外以滋益之內以培養之在上清解之在下通

潤之務使水液自生而燥熱不容於不退矣張子和治一婦人大便燥結小便淋澁半生不娠惟常服疎導之藥則大便通利暫廢藥則結滯忽得孕至四五月間醫者禁疎導之劑大便依常為難臨圊則努力為之胎墜者三又孕已經三四月弦均前後溲溺結澁其分胎墮乃訪戴人戴人診其兩手脉俱滑大雖滑大以其且孕不敢陡攻遂以食療之用花碱煮菠蘿葵菜以車前子苗作茹雜猪羊血作羹食之半載居然

生子，其婦燥病方愈。

戴人曰：予見孕婦利膿血，下迫極努，損胎但同前法，治之愈者莫知其數也。為医拘常禁，不能變通，非醫也，非學也。識医者鮮，是難說也。

又治一男子，年六十餘病，腰尻脊膝皆痛，數載不愈，晝夜躁大痛，往來屢求，自盡十年，旦夕則痛作，必令人以手搘擊至四五更，鷄鳴則漸減，向曙則痛止。左右及病者皆作鬼神陰譴白虎齧，朝禱暮祝，覩巫僧道禁師至，則其痛似減，又

楚鬼神戰，聞山川神廟無不祭者，淹延歲月，肉瘦皮枯，飲食減少，暴怒日增，惟候一死。有書生曰：既云鬼神虎齧，陰譴之禍如此，禱祈何無？應聞陳郡有張戴人，精於醫，可以問其鬼神白虎與病乎？彼若術窮，可以委命其家後之。戴人診其兩手脉，皆沉滯堅勁力，如張組，謂之曰：病雖瘦，難於食，然腰尻脊膝皆痛者，必大便堅燥，其左右曰有，五七日或八九日，見燥糞一兩塊，如彈丸結硬，不可言，曾令入剝取之，僅下一兩。

塊渾身燥痒皮膚皴揭枯澁如麸片戴人既得病之虛實隨用大承氣湯以姜棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑蓋病者聞煖則悅聞寒則惧說補則從說瀉則逆此弊非一日也而况一齊人傳之衆楚人咻之乎及煎成使稍熱驗之從少至多累至三日天且晚臍脈下泄五行約半盆臍燈視之皆燥糞燥痺及瘀血雜臟穢不可近湏更痛減九分昏睡鼻息調如常人睡至明日將夕始覺飢而索粥溫涼與之又

困睡一二日其痛盡去次令飲食調養日服導
飲丸甘露飲滑利便溺之藥四十餘日乃復鳴呼世傳三十六虎書三十六黃経及小兒三十
六吊誰為之耶始作漏者其無後乎古人以醫為重故医之道行今之人巨醫為輕故医之道廢學者自局於術藝病者亦不擇精粗一槩待之常見官醫迎送長吏馬前折腰真可羞也由是博古通今者少而師傳遂絕靈樞經謂刺與汗雖久猶可拔而雪結與閉雖久猶可解而決

去腰脊膀胱痛者足太陽膀胱經也膀痛足少陽
膽經之所過也難經曰諸痛為實內經曰諸痛
痒瘡瘍皆屬心火注曰心寂則痛微心躁則痛
甚人見平覲僧道禁師至則病稍去者心寂也
然去其後來者終不去其本也古之稱痛隨利
減不利則痛何由去病者既痊乃壽八十九歲故

凡燥症皆三陽病也

內經燥治法燥淫於內治以苦溫佐以甘寒潤
之以苦下之

治風之劑

機要大秦艽湯 治血弱陰虛不勝養筋燥而

手足不耐運動揩爪乾枯屬風熱甚者

秦艽

石膏略二

甘草

川芎

當歸

芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白芷

生地黃

熟地

白朮

茯苓略一

細辛五錢

春夏加知母一兩

右剉每服一兩水煎服天陰雨加生姜七片

麻仁丸

郁李仁 麻仁 酸大 檳榔 五錢 大黃 二兩半 炒五錢

山藥

防風

枳殼 鐵半 番活

木香 鐵半

右為末，煉蜜為丸，如梧子大，每服二三十丸，溫湯下。

東垣潤腸丸

治脾胃中伏火，太便秘滯或乾燥閉塞，不通全不思食，乃風結秘血結秘皆令閉塞也，以潤燥和血疏風，自然通矣。

麻子仁一
兩

番活

歸尾

大黃
煨

阜角仁

秦艽 鐵五
克

杏仁一
兩去皮尖

右除二

仁另研餘為末

煉蜜為丸，如梧桐子大

每服三五十丸，食前白湯下。

又有潤燥丸，一方於本方加郁李仁防風，東垣導滯通幽湯，治大便難，幽門不通，上沖吸門不開，噎塞不便，燥閉氣不得下，治在幽門以辛潤之。

當歸

升麻

桃仁一
錢

另研各三分紅花三分

生地黃 熟地各五 甘草分三

石水煎 調梔榔末五分

加大黃名當歸潤燥湯

脾約丸

麻仁錢半二枳實

芍藥各二大黃蒸四兩

杏仁去皮尖炒一兩二錢

為末煉蜜丸如梧子大每二十三十九溫水下

潤肺丸

郁李仁 大黃 桂心 黑丑

當歸

黃柏各五錢 軒粉少許

右為末水丸梧子大每服三四十九溫水下

滋燥養榮湯

治皮膚皴揭筋燥爪枯

當歸酒洗

生地黃 熟地黃 白芍

秦艽

黃芩各一錢 防風一錢 甘草五分

水煎服

大補地黃丸

治精血枯涸燥熱

黃柏鹽酒炒

知母鹽酒炒 四兩

山茱萸三兩

山茱萸 白芍各二 生地黃二兩半

當歸三兩玄參

肉蓯蓉一酒浸各半

右為末，煉蜜丸如桐子大，每服十六十九丸，空心淡鹽湯送下。

清涼飲子

治上焦積熱，口舌咽喉乾燥。

黃芩

黃連錢二薄荷

玄參

川歸

芍藥錢半甘草一錢

水二鐘煎，不拘時服。太便祕結，加大黃、東垣清燥湯。治溫熱成瘡，以燥金受溫熱之邪，是絕寒水生化之源。一絕則腎衰，瘡厥之病大

作腰以下痙軟癱瘓，不能動。方在注夏半硫丸。治冷秘風秘，結老人秘。

透明硫黃研半夏洗七次

各等分，為末。生姜糊為丸，梧子大。每服二十丸，姜湯下。或用發白一條，姜三片，煎入阿膠二片，溶化食前空心送下。

寒門

○明寒篇

生生子曰寒冬之令氣也六之終氣也水之所司
腎為之主運氣六化篇曰冬之為言終也素問
天元紀大論篇鬼臾區曰道生智玄生神神在
天為風在地為木在天為熱在地為火在天為
溫在地為土在天為燥在地為金在天為寒在
地為水又五行大論篇曰北方生寒寒生水水
生鹹鹹生腎在體為骨在氣為堅在臟為腎其

性為寢其德為寒其用為闔其色為黑其化為
肅故造化非嚴凜殺厲以固閉之則無以藏蓄
微陽為春生之本故曰冬令嚴寒萬類潛藏君
子固密啓玄子曰冬三月此謂閉藏水冰地坼
無復平陽夜卧晏起必待日光示人隨時調攝
也設令防閑少踈彼軀虛者觸冒之傷太陽寒
水之經而為外感之証即時而病頭項痛腰脊
強脉浮而緊名曰傷寒其症浩大傳變多端愚
故採諸家傷寒另為一卷以統治之茲特以病

機屬於內因者條列於斯所以別内外口見先
賢用心有定宗又使後習調劑有定向也故首
著中寒而以雜症屬寒者亦隸焉

○中寒

雜症附

丹溪曰中寒非傷寒可比傷寒乃外感寒邪必大
發熱循經而入以漸而深熱雖甚不免中寒乃
君卒感受其病即發而畢此胃氣之大虧也若
不急治去生甚速當溫補

生生子曰寒乃天地眾凝殺厲之氣惟軀虛乃易

感之其症面青口噤四肢強直卒急疼痛甚則昏迷不省人事脉多遲緊急宜以姜附湯溫之或理中湯加附子治之雜症亦有寒者非若中寒之猛而急也又或炎天避暑者乘風取涼或口食生冷皆有寒症

劉守真病機曰諸病上下所屬水液澄澈清冷下痢清白吐痢腥穢食已不飢堅痞腹滿急痛癥瘕癩疝屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒內經曰陰氣有餘為多汗身寒又曰陰盛則自寒

汗出身常清數懶而寒寒則厥受寒甚者手足厥冷腹中絞痛唇青氣冷可急於臍下三寸丹田穴上灸之或三五十壯或百壯俟手足溫煖為度或用熨法亦可

姜附湯治中寒口噤四肢強直失音不語忽厥倒口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩躁熱陰症傷寒太便利而發熱者

乾姜五錢熟附子三錢

水二鍾煎八分作二次服

或慮此方太燥即以附子理中湯相繼服姜附本治傷寒絳下后又復發汗內外俱虛身無大熱晝則煩躁夜則安靜不渴六脉沉伏並宜服此不知脉者更宜審之兼治中脘虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆

理中湯治五臟中寒口噤朱音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛

人參 乾姜炮 甘草 白朮各二錢
水二鐘煎至一鐘不拘時服

加附子名附子理中湯

沉附湯治虛寒無陽胃弱乾嘔

附子炮

乾姜炮各沉香

白朮錢半

甘草

右分二服每服加生姜五片水二鐘煎八分食遠服

生料五積散

治感冒寒邪頭痛身疼項強拘急

惡逆吐達腹痛又治傷寒發熱頭痛惡風無謂內傷生冷外感風寒及寒濕客於經絡腰腳痠

痛及婦人經血不調或難產並治之

白芷 七分

半夏

厚朴

川芎

甘草

枳壳 炒

茯苓

當歸

桔梗

乾姜 炮

芍藥

肉桂 各八分

麻黃

陳皮 鎔一錢

木香二錢

作一帖

生姜三片 茴白三莖 水二鐘煎一鐘

不拘時服

正氣散

治傷寒陰症增寒惡風，正氣逐寒

方見霍亂門

理氣治中湯

治寒氣攻心嘔逆，心腹絞痛，或泄

瀉四肢厥冷，或疝氣攻築，小腹疼痛，並宜服之

青皮

陳皮

人参

白朮 炒

炮姜

甘艸一錢

木香七分

生姜三片水煎服

肉桂散

治傷寒服冷藥過多，心腹滿脹，四肢厥冷，昏沉，不省人事，變為陰毒惡症。

肉桂

白朮

木香

厚朴

良姜 鎔三

白芍

人參

陳皮

前胡

當歸

附子

炮各吳茱萸五錢

每服五錢姜三片紅棗三枚水煎不拘時服
溫中湯 脉沉遲乃胃中寒也及胸膈滿悶身熱
拘急手足逆冷急宜溫之

丁皮

厚朴略一乾姜炮

白朮

陳皮

丁香鑠二

右俱末每服二錢葱白湯調下

木附理中丸

治中寒急心腹痛

人參

附子炮

炮姜

白朮

炙甘草

木香

丁香

各等分為末煉蜜為丸如梧子大每服六七十

十九白湯食前送下

沉香桂附丸

治中寒心腹冷痛霍亂轉筋等症

沉香

附子炮

炮姜

良姜炒

官桂

茴香炒

川烏皮

去附子吳茱萸湯浸洗

各等分為末醋煮麵糊為丸梧子大每服五

七十九米飲下空心食前二次忌生冷

熨法

治三陰中寒一切虛冷厥逆嘔噦陰盛陽

虛及陰毒傷寒四肢厥冷臍腹痛咽喉疼嘔吐
下利身背強自汗脉沉細唇青面黑諸虛冷証
皆治

肥葱剉細
麥麸皮各三升
食鹽二兩

用水一大盞同和拌勻濕遍分作二次入鍋
同炒極熟用重絹縫作二包先將一包熟鬱
臍上冷則易之麩包既冷再加鹽水拌濕炒
集依前熨之再炒再熨至燥爛不用別另取
新麩麥麸皮入鹽日夜不往手相續至身幹

溫熱陽氣復回脉起為度

參耆歸、沙参、沙参、厚朴、半夏曲、錢各二錢、人參

茯苓
草果
藿香
錢密
陳皮
金

姜三片烏梅半個水煎服

不
良
錢
半
桂
心

半夏麴
炙甘草
錢

姜五片 紅棗三枚水煎服

東垣謂陰氣上溢於陽分則晝寒陰血自旺於陰

分則夜寒氣分寒桂枝加附子湯 桂枝加芍

藥人參湯 血分寒巴戟丸神珠丸

桂枝加附子湯 治太陽病發汗遂漏不止惡風

小便難四肢微急難以屈伸

桂枝 芍藥各一兩半 甘草一兩 杖一附子炮半個

每服五錢姜四片棗一枚水一鍾半煎七分

桂枝加芍藥生姜人參湯 治發汗後身痛脉沉

桂枝 人參略一兩 芍藥二兩 甘草炙一兩

煎法如上

巴戟丸 治肝腎俱虛收領精氣補真陽健羣飲食 白朮 五味 巴戟
覆盆子 茴香 熟地 人參
苁容 兔絲子 牡礪 益智仁
骨碎補 白龍骨各等分
為末煉蜜丸梧子大每服三十丸食前米飲

下日三服

神珠丸 治下焦元氣虛弱小腹冷痛皮膚燥澀
小水自利足跗寒而逆 又名離珠丹
杜仲炒三 詞子炮五 菖蒲二兩 龍骨一兩
破故帛 胡桃去皮砂砂另研一 砂仁半兩
為末酒糊為丸梧子大砂砂為衣每服三十
丸空心酒下 見衛生寶鑑

王海藏治三隻寒用藥大例

上焦寒 陳皮 厚朴 蕤香 皆可治之

中焦寒太小便不通 白术乾姜丁香皆可治之
下焦寒 肉桂 附子 沉香

上焦寒

鐵刷湯 治積寒痰飲嘔吐不止胸膈不快飲食
不下 半夏四錢 草蔻仁 丁香
乾姜 詞子炮各生姜一兩
大吐不正加附子三錢生姜半兩分二服水煎
桂附丸 治寒邪冷氣入乘絳絡令人卒心痛或

引背齧

赤水玄珠 卷三
川烏 黑附各炮姜 赤石脂

川椒微炮桂心各二两

右為朱蜜丸梧子大每服三十丸不_止加至五十丸温水吞

胡椒理中丸 治脾胃虛寒咳嗽喘嘔痰水
胡椒 甘草 敖花 菖蒲

良姜 細辛 陳皮 乾姜各四

白术五两

為朱蜜丸梧子大每三十丸至五十丸温水

或酒住下

中焦寒

附子理中丸 治脾胃冷弱心腹病痛嘔吐瀉利霍亂轉筋體冷微汗滿悶腹鳴飲食不進

即前理中湯加附子為朱用煉蜜丸梧子大每

服三十丸温水下

二氣丹 助陽退陰治裡寒心腹刺痛泄利嘔吐自汗厥冷小便不禁霍亂轉筋久下冷利
硫黃 桂心各一炮姜二錢黑附子炮半兩

硃砂二錢

為末，麵糊丸，梧子大，每服三十丸，空心煎服，湯入盞送下。

大建中湯 治內虛少氣厥冷，大小腹弦急，不勝食，起則微汗，陰縮，口唇乾燥，精滑自出，或手足乍寒乍熱，而煩寢發痛，不能久立，常多夢遺。

黃芪

當歸

桂心

芍藥一錢

人參

甘艸一錢半夏

黑附子一錢半炮

每服五錢，姜三片，棗二枚，水煎服。

下焦寒

張仲景八味丸 補腎之不足

還少丹 大補心腎脾胃，治一切虛損肢節倦怠。

小便混濁

山藥

牛膝

遠志

巴戟

山茱萸

杜仲

茯苓

楮實子

五味子

蕤蓉

石菖蒲

茴香略一

枸杞

熟地各二兩

為末，棗膏搗為丸，梧子大，空心食前，溫酒薑湯任下。三十五丸日三，○有熟地加山梔一兩。

○心氣不寧加麥冬一兩○精神少，再加五味子一兩○陽弱加續斷一兩

天真丹 治下焦陽虛

沉香 茴香 草薢酒浸巴戟酒浸去心
破故帛炒葫蘆巴炒杜仲燉水黑牽牛各一兩
琥珀 桂心各五

右為末，漫酒打糊，為丸，梧子大，空心酒下五

十九

通治三焦甚寒之氣

大已寒丸 治臟腑虛冷心腹疼痛泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化手足厥冷

草朮 桂心各六炮姜 良姜各十兩

右為末，麵糊丸梧子大，每服二十九食前米飲下

四逆湯 傷寒自利，不渴，嘔噦不止，或吐利俱發，小便或澁或利，或多汗厥冷，脉微欲絕。

炙甘草二炮姜半兩附子半兩

每服三四錢水一鍾半煎，七分溫服

海藏治下焦寒，四逆湯例乾姜味苦止而不行。附子味辛行而不守泄，小便不通。二藥皆陽氣化能作小便。若姜附木三味內加茯苓四分利之為佳。附生用而不炮，則無火力。熱則行而不正，兼用水多煎少，則味厚而直入下焦。

治五臟寒方

肝寒雙和散

心寒定志丸菖蒲丸

脾寒益黃丸

肺寒小青龍湯

腎寒八味丸

細辛、桂枝、芍藥、甘草、大棗、半夏、白朮、甘草各半錢

東垣獲和散 补血益氣治虛勞少勞

黃芪 熟地

當歸

川芎一錢

官桂

甘草一錢

白芍一錢

姜六片 太棗六枚 分二服 水煎服無時。東垣曰：此方予每治傷寒、瘡疾中暑太病之後，虛勞氣乏者，以此調治，極驗。不熱不冷溫而有補，建中四物二方化而為一也。

益黃散

陳皮一兩 青皮

詞子肉

炙甘草各半兩

丁香二錢

右為末每服二三錢水煎服。海藏云以燥濕割漏加麻黃白朮人參甘草芽分名附子麻黃湯治中寒湿昏暈緩弱腰脊強急口眼渴斜語声渾濁胸腹脹氣上喘急不能轉動兼宜審而用之

代灸膏治老人衰弱元氣虛冷臟腑虛滑腰脚冷痛沉重減食手足逆冷不勝忍者用此代灸其効不能盡述

大附子炮一枝吳茱萸 桂皮 木香各半兩

蛇床子研一馬蘭草研一

為細末每用藥半匙生姜汁半盞白麵半匙同煎成膏攤於帛上臨臥貼腰以油帛覆其上綿衣繫之自夜至明乃去每宿如此其腰腹如灸能除寒積若腰痛貼腰眼

麝靈散乃正治溫散之劑

附子一枚炮熟取出用冷灰竈之良久取出研末入真鴈茶一大錢同和分二服每服水一大盞

煎六分臨熟入蜜半匙放溫服之

○寒中

東垣曰夫脾胃之症始則熱中終傳寒中經云陰盛生內寒厥氣上逆寒積於胸中是腎水反乘侮土此謂所勝者妄行或作中滿腹脹或作涎涕或足下痛不能任負履地骨之無力喜睡兩丸多冷時作陰而痛或妄見鬼狀夜夢亡人腰脊背甲俱痛而不渴不渴此濕氣去而寒獨存血絡凝泣故其脉盛大以濇名曰寒中以白

术附子湯治之

白术附子湯治寒中諸症

白术

附子

炮陳皮

蒼朮炒

夏朴

半夏

茯苓

澤瀉各一兩

猪苓

半兩桂心

四錢

背寒

仲景云心下有留飲其人背惡寒冷如冰治法
茯苓丸之類是也即千金化痰丸

每服五錢生姜三片水煎服量虛實加減

身前寒

經云胃足陽明之脉氣虛則身以前皆寒慄冷法宜鍼補三里穴是也

掌中寒者腹中寒魚上白肉有青血脉者是胃中有寒也理中湯之類

○惡寒

丹溪曰久病惡寒當用解鬱○溫痰積中抑遏陽氣不得外泄身必惡寒○惡寒非寒明是熱症進士周年近四十得惡寒症服附子數百帖而病

甚脉絃而緩遂以江茶入生姜汁香油少調飲之吐痰一升許減大半入與通聖散去麻黃大黃芒硝加當歸地黃百帖而安女子惡寒用苦參赤小豆各一錢為末薑水調飲之吐痰甚多繼用後藥調理

川芎 南星 蒼朮 黃芩
酒打麴糊丸服

上焦不通則陽氣抑遏而皮膚分肉無以溫之故寒慄東垣升陽益胃湯用升發之劑開發上

焦以伸陽明之氣出於表而溫之也丹溪吐出
濕痰亦開發上焦使陽氣隨吐伸發出外而溫
之也故寒慄皆愈二者乃治陽虛表寒之要
王海藏治一婦先病惡寒手足冷全不發熱脉八
至兩脇微痛治者便作少陽治之陽在內伏於
骨髓陰在外致使發寒治當不從內外從乎中
治也宜以小柴胡調之倍加姜棗

丹溪治一婦年近六十六月內常覺惡寒戰慄喜
烈火擲綿汗時如雨形肥肌厚已服附子十餘

帖渾身痒甚兩手脉沉濶重取稍大知其熱甚
而血虛也以四物去川芎倍地黃加白朮黃芩
炒黃柏生甘草人參每服一兩重始煎一帖飲
之腹大泄目無視口無言知其病勢深而藥無
反佐之過也仍以前藥熟炒與之蓋借火力為
向導一帖利止四帖精神回十貼病全安

文蔣氏婦年三十餘形瘦面黑六月喜熱惡寒兩
手脉沉而濶重取則數以三黃丸下之以姜湯
每服三十丸二十帖微汗而安又云三補丸亦

頭痛

生生子曰頭為諸陽之首至清至高之處也苟外無風寒、霧露之觸內無痰火濕熱之薰必無痛也既存內外之因當循內外之治

凡頭痛當分三陰三陽，諸虛頭痛當歸川芎主之。諸氣虛頭痛，人參黃芪主之，兼見何症以佐使之藥濟之，此立法之大法也。血氣俱

虛於調中益氣湯加川芎蔓荆子細辛其効如神，溫厥頭痛清空膏主之。諸厥逆頭痛，羌活附子湯主之。溫熱在頭者以苦咷之。世有真頭痛旦發夕死，夕發旦死，原其受病乃氣血虛極以致風寒暑湿之氣得以犯之，名曰厥頭痛，痛引腦真陷於泥丸宮中非藥所能愈，蓋其根本先絕也。丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火也，有可吐者亦有可下者。東垣曰經云東風生於春，病在肝，俞在頸項，故春氣者病在

頭又諸陽會於頭面。如足太陽經之脉起於目內眞上額交翼直入絡腦還出別下項病衝痛又足少陽之脉起於目锐眞上抵頭角病則頭角額痛。夫風從上受之風寒傷上邪從外入客于經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池頸有調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也。如氣上不下頭痛冀疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也。有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓以

腦為主。腦逆故令頭痛齒亦痛。有心煩頭痛者病在膈中。過在手巨陽少陰乃溫熱頭痛也。凡頭痛皆以風藥治之者。據其太體言之也。高嶺之上惟風可到。或味之薄者陰也之陽自地升天者也然亦有三陰三陽之異。太陽經頭痛惡風寒脉浮緊川芎獨活之類主之。少陽經頭痛脉弦細往来寒熱柴胡黃芩主之。陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷主之。太陰經頭痛必有

痰體重或腹痛為痰癆。脉沉緩者，蒼朮半夏南星主之。少陰經頭痛三陰三陽經不流行，而足寒氣逆為寒厥。其脉沉細，麻黃附子細辛湯主之。厥陰經頭疼項痛或吐痰沫，冷厥其脉浮緩，吳茱萸湯主之。

丹溪云：勞役下虛之人似傷寒發熱，汗出兩太陽作痛，宜補中益氣湯，多加川歸川芎甚者，加知母蔓荆子。又云自魚尾上攻而痛，屬血虛，川芎川歸酒黃柏諸經氣滯，亦能作痛。

王節齋曰：久頭痛，病畧感風寒，便發寒，月湏重綿厚帕包裹者，此屬鬱熱本熱，而標寒，世人不識，率用辛溫解散之藥，暫時得効，誤認為寒，殊不知因其本有鬱熱，毛竅常疎，故風寒易入，外寒束其內熱，閉逆而為痛，辛熱之藥雖能開通閉逆，散其標之寒邪，然以熱濟熱，病本益深，惡寒愈甚矣。唯當瀉火涼血為主，而佐以辛溫散表之劑，以從其標，則病可愈而根可除也。

郭茂恂之婦產，七日不食，始言頭痛，頭痛已，又心

時痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無
瞬息間每頭痛甚欲取大石壓之良久漸定心
痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又
以兩手自剝取之如是十日不已衆醫無計進
黑丹半粒疾少間中夜再服之服即下瞑目
寢如平昔至平旦下行約三升許如蟬垂子
三疾減半已刻又行如前則頓愈矣

○頭重

東垣紅草散治頭重極佳

方見雷頭風門

秘方茶調散 風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛
不可忍

片芩

二兩酒拌炒

三小川芎一

細芽茶

三錢

白芷

五錢

薄荷

三錢

荆芥穗

四錢

頭蘋及腦痛

加細辛藁本蔓荆子

各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

○頭風

丹溪云屬痰者多有熱有風有血虛 在左屬風
薄荷荆芥血虛川芎當歸 在右屬痰蒼朮半

赤水經珠

卷之三

夏熱則酒芩為主

冲和膏 偏正頭風腫痛并眼痛者塗上立止如
神 紫荆皮炒五兩 獨活去節炒三兩 赤芍炒二兩 白芷
一菖蒲 右為末葱頭煎濃湯調金藥到痛止

又方 酒芩一錢 苍术半錢 羌活各一錢 防風各五錢 細辛二錢
甘草生 酒黃連各一錢半 半夏麵三錢

均茶湯盪起服之

又方 酒芩五錢 苍术二錢 羌活各一錢 川芎

甘草生

酒黃連各一錢半

半夏麵三錢

均茶湯盪起服之

右為末服法同前

頭痒風屑髮黃大黃 用大黃酒浸炒為末茶調服

川芎散 偏頭痛頭風神妙

甘菊 石膏 川芎各三錢

為末每服一錢茶

清調下上方有白姜蚕六錢生用

經驗方 頭風頭痛

藿香 防風各二兩 辰砂

薄荷各一兩

天麻

白术 白附子

白芷各一兩

右為末糊丸梧子大每服三十丸白湯下

菊花茶調散 諸風頭目昏重偏正頭風鼻塞

菊花

川芎

荆芥穗

羌活

甘草

白芷

各二兩

細辛

一錢 防風

一兩 洗淨

蟬蠅

姜蚕

薄荷

各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下
有一婦人患偏頭痛，一邊鼻塞不聞香臭，常流清涕，或作臭氣一陣服遍治頭痛藥，如芎藭皆不能人無識此病者，或曰腦癱偶有善醫云，但服局方芎犀丸，不十數服忽作嚏涕，突出一錠，稍膿其疾自愈，方見鼻渊。

秘方

頭風熱痛

大黃

朴硝

各等分

右為末并底塊和捏作餅貼兩太陽穴神妙，否則防壞目。

祛風清上丸 風熱上攻眉棱骨痛，
芎辛導痰湯 痰厥頭痛。

川芎 細辛 南星各一半夏二錢陳皮 茶芩
片芩 酒炒各一枳實一錢甘草五分如挾風熱甚

者加石羔三錢菊花一錢水二鐘姜三片煎至八分食後服

清空膏 偏正頭痛年深及療風濕熱痛上壅損目及腦痛年深不止

羌活

防風各一

柴胡七

川芎五

甘草錢一

黃連炒

一黃芩三

兩一半酒製

右為細末

每服

二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨卧服如苦頭痛每服中加細辛二錢如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛加羌活

防風川芎甘草又加半夏一兩半如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一兩加柴胡一倍如發熱惡熱而渴正陽明頭痛只與白虎湯加白芷

小清空膏 諸般頭痛惟血虛頭痛不治用片芩細切酒拌晒乾為末茶清調下酒亦可

補氣湯

服前藥之後服此藥

黃耆八
細辛許
甘草炙當歸身各二
麻黃炒苦香各五
水煎服

安神湯 頭旋眼黑頭痛

羌活

一兩防風半錢

柴胡

五錢酒黃柏一錢

酒知母

酒生地

升麻各一錢

黃蓍

二兩甘草半錢

熟甘草

半生半熟四錢

右咀咬每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荆子五分川芎三分再煎至一盞臨卧時去渣熱服

右東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒柏加風劑也

川芎散 頭風偏正頭風昏眩

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草

炙香附

石羔

炙各五錢

荆芥

薄荷

菊花

防風

茵陳

石羔散

各一兩

右為細末

每服二錢食後茶清調下

日服三錢

麻黃

去根節兩

石羔

各一兩

何首烏

五分

葛根

七錢半

右為細末

每服三錢生姜三片水煎稍熱服

又方亦名

石羔散

頭痛

川芎

石羔

白芷

各等分

右為細末

每服四錢熱茶清調下

荆芥散 治頭風

王太醫方

荆芥 石羔

煅各分等子

右為細末，每服二錢。姜三片，葱白三寸，連鬚使水一盞煎，七分食後服。

王真丸 寒濕為多，腎氣不足，氣逆上行，頭疼，不可忍，謂之腎厥。其脉舉之則弦，按之則堅。

硫黃

二兩

石膏

半夏湯洗

硝研各二兩

俱為細末，研勻。生姜糊為丸，梧子大。陰乾，每服二十九粒，姜湯或米飲下。更多，加元百壯良方中黃丸子亦佳。虛寒甚者，去石羔，用鍾乳

粉一兩

王壺丸 風濕頭痛亦作痰患

半夏

南星

天麻

為末

白麵丸

服二錢

姜蚕散

偏正頭痛併夾腦風，連兩太陽頭痛

白姜蚕為末，用葱茶調服。

乳香盛落散 男子婦人偏正頭痛，不可忍，大有神効。此風盛疎散，而痛宜酸以收之。

御米殼

去蒂四兩

陳皮

甘草

炙桔梗

去芦四兩

柴胡

各一升

右為細末，每服二錢。水一盞，入燈心十茎，長

四指同煎，七分温眼。

治時氣頭痛不正。用朴硝二兩為末，生油調塗於項上。

治頭內如虫蛀，響名天白蟻。用茶子細末吹鼻中，如聖散。眼目偏痛頭風。

麻黃燒及半兩 盆硝二錢 射香

全蝎

大狗分

腦子

各少許

右為細末，搗之神效。

治頭風餅子 五倍子 全蝎

大狗分

右為末，醋糊作如錢大餅子，發時耳用醋潤。

透貼太陽穴上，炙熱貼之，驗甚。仍用帕子縛之，啜濃茶，睡覺則愈。

一奇散。產後頭痛。用當歸川芎為細末，每服

二錢水一盞煎，七分溫眼。

治產後身熱頭痛，肚痛。

陳皮 白朮 白芍各二錢 黃芩二錢 川芎一錢

乾姜 牡丹皮

甘草各一錢 荆芥五分

分四帖，煎服。

芎附散。產後敗血作梗，頭痛，諸藥不效。

太附子一枚釀醋一碗用火四畔炙透蘸醋令
盡去皮臍加川芎一兩並為細末每服一錢茶
清調下

東垣曰濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之若用上
項搐鼻藥而涎少者必薰吐法治之

邪在胃而頭痛者必下之其症必薰膈痞或動作

則痛甚或右手脈滑盛者是也

新沐宁風為首風頭面多汗惡風當先風一日則
病甚至其風日則少愈大川芎丸主之

風氣循風府而上則為腦風項背怯寒腦戶極冷
神聖散主之

大川芎丸首風旋暉弦急外合陽氣風寒相搏
胃膈痰飲偏正頭疼身體拘倦

川芎一兩天麻四兩為末煉蜜丸每兩作十丸
每服一丸細嚼茶酒下食後服

神聖散 腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭痛不可忍者

麻黃去節細辛去苗乾葛生一半藿香葉各等分

右為末，每服二錢，煮荆芥、薄荷，調下。茶亦得併治血風症。

大全黑龍丹 產後寒凝血滯或胞衣不下或污血奔心危急惡疾垂死者但灌藥入口便活妙通神聖 當歸 五靈脂 川芎 良姜 熟

地各三

兩

錢

錢

錢

右研末入罐，蓋泥固濟，混口炭十粒，煑令通赤，冷定取開，者成黑糟色，細研入後藥百草霜五錢，硫黃一錢，乳香各一錢，花蕊石一錢，琥珀各三錢。

右五味為末，并前和勻丸如芡實大，每服一丸。

○雷頭風

俗名非舌也

張子和曰：雷頭風者，結核塊於頭上而作痛者是也可用茶調散吐之，次用神芎丸下之，然後服烏荳丸及愈風餅子之類，消風散熱是其治也，如涼膈散之類。

又云雷頭風是頭上有赤腫結核或如酸枣狀，可用排針出血則愈矣。

生生子曰：所謂雷頭風者必是痰結核塊或先暗有於頭上，然後隨遇而發，或勞後或酒色或食

傅多動風發毒之物，感而發之，或紅或腫而痛，作矣急則治其標，針而血出，風散火滅，痛可減去，或有之也。若先無結塊，瘻核卒然發寒熱，而腫痛者，乃風毒也，不可不察。

茶調散

又名仙散

瓜蒂

茶葉

為末，每服二錢，葷汁調服，乃取吐藥也。

神芳散

黃芩各二

牽牛

各等分活石酪四

大黃

白芷

牽牛

各等分活石酪四

細辛

天麻

羌活

各等分荆芥

甘草

各等分

各等分薄荷

防風

細嚼茶酒送下，不拘時候。

服加十九丸，以利為度，日三服。

愈風餅子

川烏 川芎 甘菊 白芷 薄荷 防風
細辛 天麻 羌活 荆芥 甘草 各等分

為細末，水浸蒸餅，為劑，捏作餅子，每服三五餅。

保命集云：夫治雷頭風，諸藥不効者，為與症不相對也。蓋雷頭風者，震卦主之震，仰孟故予製藥，內加荷葉者，象震之形，其色又青，乃述類象形。

當煎局方中升麻湯主之治頭面疙瘩增寒拘急發熱狀如傷寒升麻蒼朮薄荷

為細末每服五錢水一鍾煎十分溫服食後或燒全荷葉一個研細調藥服之

生生子曰按二公方論俱以結核疙瘩而用風藥論治且指震為雷為譬固美矣恐猶未盡善也夫此病未有不由於痰火者蓋痰生熱生風故也核塊疙瘩皆有形可徵痰火上升壅於氣道薰於風化則自然有聲輕則或如蟬之鳴重

則或如雷之響故以聲如雷而為名也或以其發如雷之迅速也設如前論盡作風熱治之恐謬標而忘其本也予故附痰火一方于後以俟明哲評之白姜蚕粉草半夏牙皂姜汁連翹片芩酒炒陳皮去白桔梗各五錢薄荷葉三錢白芷二錢天麻五錢青礞石二錢茶吞二錢以痰利為度然後用清痰降火煎藥調理

紅荳散 頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根 炒苦丁香各五錢 紅豆粒 十粒 羌活燒連翹各一錢 右五味為細末鼻內搐之

頭風脅肝經風盛也 大便實瀉青丸主之虛則消風散主之

消風散 諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩痛肌肉蠕動目眩旋運耳聵蟬鳴眼澁好眠鼻塞多嚏皮膚頑麻燥痒癰疹又治婦人血風頭皮腫痒骨骨疼旋欹倒痰逆恶心

川芎 羌活 人參 茯苓 白姜桑 蕤香
荆芥 甘草 蟬殼去上二兩各 厚朴姜製陳皮白各五錢
防風 右為細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每自三服便竒輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛身重寒熱倦疼用荆芥茶清調下半盞不拘服之小兒虛風目澁昏倦及急慢驚風用乳香荆芥湯治風脅極燥痒無時此乃氣虛風邪侵於皮表用藜蘆不拘多少為末先干無風處洗頭候將乾時用末摻之湏用入髮至皮

乃繫縛之一日一夜次日即不燥痒如尚有些少可再用一次立効

頭上白屑極多山萸根油浸塗或以乳汁調又方白芷零陵香各等分爲末如前法用之

候三五日竈去敷二三次終始不生

大頭病

頭痛腫大如斗是天行時疫病也

泰和年東垣以監納濟源稅時長夏多疫癘初覺增寒體重次傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問

如染之多不救張縣丞亦得此症至五六日醫以承氣湯加板藍根下之稍緩翼日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可以請治遂命診視具說其由曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻頭而為腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其病所為故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱以為君橘紅玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補

氣以為臣，連喬鳳粘子薄荷葉苦辛平板監根
味甘寒、馬屁勃白姜蚕味苦平散腫消毒定喘
以為佐，新舟麻柴胡苦平行少陽陽明二經不
得神，桔梗味辛溫為舟楫不令下行共為細末
用湯調時時服之，拌蜜為丸噙化之服盡良愈。
因歎曰：往者不可追來者猶可及凡他所有是
病者皆畫方以貼之全治甚衆。

普濟消毒飲

黃芩 黃連各五錢 人參三錢 橘紅 玄參各二錢

連喬 凤粘子 板藍根 馬屁勃各一錢 甘草
生柴胡 桔梗各二錢 白姜蚕 炒升麻各一錢
為細末服如前法或加防風薄荷當歸身川芎
每服五錢水煎食後時時熱服如太便硬加潤
煨木黃一錢以利之腫熱甚者宜砭刺之
生生子曰：觀消毒飲以普濟二字為命名之首書
告四方使人人得躋壽域者君子之存心也乃
今時之醫偶獲一未穩之方就括囊緘口自秘
終身為徼利之計視此普濟消毒飲寧不自愧

於心乎

太頭病者雖在身半以上熱伏于經以感天地四時非邪瘟疫之氣所着以成至干潰裂膿出而又染他之所以謂之疫癘也大抵是陽明甚則逆傳視其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱為腫火盛為痛此邪發於首多在兩耳前後所先見出者為主為根治之宜早藥不宜速恐過其病所謂上熱未除中寒已作有傷人命矣此疾是自內而之外者是為血病况頭部分受邪

見於無形之處至高之分當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分既着無形所傳無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病矣雖用緩藥若又急服之或食前或頓服或失緩體則藥不能除病矣當徐漬無形之邪或藥性氣味形體擬象服餌皆須不離緩體及寒藥或酒炒浸之類是也後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去反損陰也此却為客邪當急去之

是治客以急且治主當緩者謂陽邪在上陰邪
在下各為本家病也若急治之不惟不能解其
紛而反致其亂矣此所以治主當緩也治客當
急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陰分受
陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者當急去之
此治客以急也假令少陽之明之為病少陽者
諸邪出於耳前後也陽明者首面大腫也先以
黃芩黃連甘草通炒過剉煎少一不往服呷之
或服畢再用大黃或酒浸或煨又以臘粘子新

瓦上炒香咬咀煎去渣內芒硝各等分亦細細
呷之當食後用徐得微利又邪氣已只服前藥
如不已再服後藥依前次第用之取大便利邪
已則止如陽明渴者加石羔少陽渴者加瓜萎
根陽明行經加升麻葛根芍藥之類太陽行經
加羌活防風荆芥之類選而加之並與上藥均
合不可獨用散也

黑白散 大頭病 妥神

烏黑蛇

酒

浸

白花蛇

去頭尾

雄黃

二兩

大黃

錢

五

為細末每服一二錢白湯調下

治疫毒頭重者甘桔湯加鳳粘子大黃芒硝
大頭天行病、羌活 酒芩 酒蒸大黃

大頭風用井底泥調大黃芒硝塗之

又方治大頭疫如神 貫衆葛根二錢甘草一錢半
白姜蚕炒一錢水煎服極佳加黑荳三錢丸妙

大宮詹少溪吳馭閣校

終

