

Kodak  
LICENSED PRODUCT

M

G Y

KODAK Gray Scale



30

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

JAPAN

10

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2m

門  
城  
516  
6

赤水玄珠第五卷目錄

腹痛門 腹痛 水鳴 小腹痛  
脇痛門 脇痛  
心痛門 心痛 胸滿 胸痛 胸痺 蠶痛  
嘔吐噦門 嘔吐噦 胃風 惡心 嘔苦水  
嘔沫 嘔膿 嘔長虫 酒嘔 嘔清水  
腰痛門 腰痛

赤水玄珠第五卷

新安生生子孫一奎著

腹痛門

附水鳴  
小腹痛

生生子曰腹痛極要體認真功庶投劑有功有寒  
熱脉沉而遲者寒有虛實脉散大而無力者虛  
脉浮而數者熱有痰延脉滑者痰有積聚脉沉弦而伏者聚有  
虫痛脉多沉滑或有死血脉沉而濁  
寒痛者綿々而痛無增減也以姜桂附子之屬溫  
之

司人方略  
卷五  
熱痛者時痛而或時止也得熱物而痛止者蓋辛  
熱能冲開鬱結氣道疎通暫得少愈而陰血日  
虧燥火愈熾不復發遷延歲月此為積熱輕  
者以山梔黃連白芍香附之類重者調胃承氣  
湯下之

虛痛者以手重按至痛處而止者是也宜參木白  
芍加溫煖藥

實痛者手不可近按之愈痛或消或下詳症施治  
飲食所傷作痛者宜溫脾行氣以消導之蓋飲食

得寒則滯得熱則化若痛漸下及日久不愈者  
宜推蕩之詳見內傷飲食門

痰痛者必小便不利痰隔中焦氣閉下焦上下不  
相流通故痛治當導痰開鬱又伏飲作痛者  
或吐或下視形氣何如當與痰飲門相參治  
虫痛者面上有白斑點唇舌痛後便能食時  
作時止詳見虫門

食積死血痛者痛有常處而不移動者是也宜尋  
治

○腹中水鳴

丹溪曰腹中水鳴乃火擊動其水也蓋水欲下火欲上相觸而然用二陳湯加芩連施子亦有臟寒而水聲汨者宜分三陰部分而治中脘太陰當脅少陰小腹厥陰各從其宜溫之

又有腸胃空虛而鳴者宜參术之類補之

腹中水鳴而痛亦有因于火因于鬱者生生子曰觀丹溪治腹痛無定方蓋欲使人認病自擇且方者隅也隅于一則不能圓活而貫通

是以後人有守死方之謂凡躰下痛而人中黑者多死

○感暑而痛或泄痢併作其脉必虛宜十味香薷飲或六和湯

感溫而痛大便溏泄小便不利其脉必濡宜胃苓湯

食積痛常欲大便去後而痛減者是也宜溫宜消久者遇仙丹神芎丸等擇而下之當與傷食氣滯而痛其脉必沉宜木香順氣散

死血痛，有常處宜桃仁承氣湯。  
痛而欲得熱手按及熱物熨者是寒宜香砂理中

湯或五積散。

痛而熱手熱物熨不止者是熱宜黃連解毒之類  
實則以硝黃下之

絞腸沙痛極是急速先與鹽湯探吐或委中并十  
指出血藿香正氣散正氣天香散

酒積痛 酒傷則發宜泄其積痛自止也

多年敗白螺殼煅存性加三倍于木香檳榔丸

中更加山茵陳等分衆藥中其効甚速

禦痛湯 治火痛

黃連蜜汁山梔仁炒絡橘紅 茯苓絡半

草蔻仁分半夏錢甘草四

姜三片食前服

星半安中湯 痰積作痛

南星 半夏

絡半滑石 香附 枳殼 青皮

木香 山梔仁炒蒼朮 砂仁

茯苓 橘紅

絡一甘草分

生姜四片煎服

氣攻痛者去南星滑石加厚朴玄胡索絡一

痰甚者加白螺壳燒灰一錢，臨服調下。  
木香順氣散 氣滯腹痛。

木香 香附 檳榔 青皮 陳皮 厚朴  
蒼朮 枳壳 炒砂仁 銻甘草 分五分 姜三片煎服。  
香砂理中湯 即理中湯加蒼朮砂仁。

○小腹痛

傷寒家蓄血在下焦，宜用當桃仁承氣之類。若因氣鬱而痛，以青皮主之。寒者以桂枝吳茱萸溫之。若因疝奔豚癥聚者，又當循各門施治。

苦練丸 治奔豚小腹痛寒也。

苦練 苗香 大附子 三味酒煮焙乾，末之每兩入玄胡末半兩，全蝎炒丁香各十八箇，為末，酒糊丸梧子大，每食前溫酒下五十丸。酒煮當歸丸 治小腹下痛及疝。

當歸一兩 苗香半兩 附子七錢 良姜七錢 百倍 加後藥 盐炒丁香略半 全蝎二錢

柴胡 升麻 木香 銻一錢 苦練分五分 甘草分五分 玄胡索四錢 為末，酒煮糊丸梧子大，每二十粒，白湯下。

小腸癰作痛者其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀  
腹常痛或逆脣生瘡急宜下之或以雲母膏大  
乙膏為丸服之自愈

○ 腸痛門

有風寒脉浮弦而數者是也。有食積脉沉弦而數者是也。有痰飲或滑或結或促有死血脉濇有虛脉弦而細數有氣鬱脉沉有火脉洪濶而數當分條類析明別左右施治。

經曰左右者陰陽之道路氣之所終始也又曰肝木氣實則脇痛肝氣實則怒夫謂實者指邪氣而言經曰邪氣盛則實是也

脇痛屬肝木及胆火木氣實者以柴胡川芎青皮蒼术疎之肝火盛者以當歸龍骨丸瀉之死血

積者以桃仁紅花香附川芎破之痰飲流注者  
以南星半夏菖蒲川芎豁之鬱宜開鬱寒宜散  
寒以大法也

兩脇走痛是痰實者可用控涎丹方見痰  
飲門左脇痛為肝經受邪宜枳芍散或柴胡陳肝散  
右脇痛為肝經移病于肺宜推氣散  
食積痛凡痛有一條扛起者是也當于積塊門  
氣弱人脇痛脉細緊或弦多從勞役怒氣得者入  
物湯加木香青皮

肥白人氣虛發寒熱而脇下痛用參芪補氣紫胡  
黃芩退熱木香青皮調氣

瘦人發寒熱脇痛多怒者必有瘀血宜桃仁紅花

柴胡青皮大黃滑石

去滯氣必用青皮乃肝胆二經之藥若二經血不足者先當補血少加青皮可也  
脇痛發寒熱似覺有積塊必從飲食太飽勞力所致必用龍會丸

痰飲停伏脇痛宜導痰湯

腸下痛而大便秘結者，木香檳榔丸或龍會丸亦有虛寒而作痛者，一人脇痛連膈服氣藥不效，後用辛熱補劑下黑鉛丹而愈。

鮮痛外以琥珀膏貼之，或以白芥子水研敷之，或吳茱萸醋研敷之，韭菜炒熨亦佳。

當歸龍會丸 肝木實火兩脇痛之要藥

當歸 龍胆草各酒洗 山梔 黃連 黃芩各酒洗 二半  
蘆薈 大黃酒煨各五錢 木香一錢 黃柏一錢 青皮兩

柴胡

射香

右末

神曲糊

丸梧

子大每姜湯

許

右末

神曲糊

丸梧

子大每姜湯

枳芍散 左脇痛

枳實

炒川芎

錢五

甘草

錢一

為末，每二三錢，姜棗湯或酒調下。

推氣散 右脇痛

片姜黃

枳壳

錢桂心

錢五

甘草

錢三

為末，每服二錢，姜湯調下。

鷄鳴散 跌踰損傷瘀血停積脇內，日久作痛，復元活血湯從高墜下，惡血流于脇下，疼痛不休可忍。二方見跌踰門。

柴胡瀉肝湯 鬱怒傷肝左脇痛

柴胡一錢甘草分青皮 茄藥各一黃連炒

山梔炒龍膽草各八川歸二錢

水煎服

死血作痛瘦人多怒者常患此

桃仁九個紅花

川芎

柴胡

青皮

芍藥

香附錢乙歸尾半錢

水煎服

治脇下氣痛神方

小茴香炒兩枳殼炮五錢為末每二錢鹽湯調下

心痛門

真心痛者手足青至節旦發夕死夕發旦死寒邪  
傷其君主也今之治例皆非真心痛也以其在  
心之部位而名或心之脉絡或手心主之脉絡  
或胃脘或胸膈或食傷或寒傷或氣逆或痰飲  
或死血或虫或鬱火皆致痛也

鍼經曰足太陽之脉其支者復從胃別上膈注心  
中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫  
心下急痛胃病者腹脹脹胃脘當心而痛上

支兩脇咽鬲不通。脉經曰：憂愁思慮則傷心。傷心則若驚喜忘善怒心傷者，其人勞倦即頭面赤而下重，心中痛徹背，其脉弦此心臟傷所致也。諸中痛者，如心腹痛，懊惓發作腫聚，來上下行痛有休，作心腹中熱，善渴，涎出，面色乍青乍白，赤嘔吐清水者，衄也。

病機機要曰：有大實而心中痛者，因氣而食卒然發痛，太便或秘，久而心胸高起，按之至痛，不能飲食，急以煮黃丸利之，利之後以藁本湯去其邪。

也有寒厥心痛者，手足逆而通身冷汗出，便清利或太便利而不渴，氣微力弱，急以本附湯溫之，寒厥暴痛非久病也，朝發暮死，急當救之，是知久病無寒，暴病非熱也。

陳無擇云：若諸經心痛，心與背相引，心痛徹背，背痛徹心，若諸府心痛難以俛仰，小腹上冲，卒不知入，嘔吐泄瀉，此皆外感內淫，則其氣閉塞鬱于中焦，氣與爭發為疼痛，又曰九種心痛曰：飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰痰曰疰曰，去來痛。

者除風熱冷屬外所因餘皆不內外更婦人惡血入心脾經發作疼痛尤甚于諸痛更有卒中客忤鬼擊尸疰使人心痛亦屬不內外因在人

以意推充施治

丹溪云凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口食寒物而病于初得之時當用溫散或溫利之藥若其病得之稍久則成鬱矣鬱則蒸撻熱久必生火原病式中備言之矣若欲行溫散溫利寧無助火添病耶由是古方多以山梔為君

加熱藥為嚮導則邪易伏病易退然向安之後若縱恣口味病必復作凡治此病必要先問平日起居何如假如心痛有因平日喜食熟物以致死血蓄于胃口作痛者用桃仁承氣湯下之

治寒之劑

金匱赤石脂丸 心痛徹背痛徹心此寒厥痛  
烏頭炮三錢附子炮五錢蜀椒 乾姜 赤石脂各  
右末蜜丸梧子大食後白湯下一丸日三服

木附湯 寒厥暴痛脉微氣弱

卷之三

五

三

甘草一  
白术四  
附子一  
焰半  
每三錢姜棗煎

立應散

寒痛氣痛腹痛皆効

良姜 香附各炒 為末 白湯調下二錢

二姜丸 養脾溫胃去冷消痰治心脾痛寬胸下氣進飲食一切冷物所傷並皆治之

乾姜炮 良姜 等分為末 驥糊丸 橘子大每服

十五丸至二十丸 食後陳皮湯下 婕娘婦人

不宜服此皆溫中之藥也

○散寒之劑

麻黃桂枝湯 外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不得轉側 麻黃 桂心 茯苓 細辛

乾姜 甘草 錄格七半夏 香附錢五 每服五

錢姜五水煎食前服大便秘入大黃量虛實

人心痛諸藥不效服此而愈

檳榔 桂心 葛根 甘草半錢細辛同半夏

桔梗 枳殼 川芎 防風 等分水煎服

草豆蔻丸 客寒犯胃

草豆蔻半錢吳茱萸炮 益智仁 甘姜桑炒當歸

身青皮分六神曲 姜黃各四 甘草分桃仁個半夏一錢 泡澤瀉一錢小便 麥芽錢半錢甘草分柴胡四分少許詳利尿減半分與之入參 黃芪 陳皮

右除桃仁另研如泥外為極細末同研匀湯浸蒸餅為丸梧子大每三十丸熱湯下食遠

治心痛

荔枝核燒存性為末醋湯下二錢

○內傷飲食之劑

葛黃丸 治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣

瘀血刺痛

椎黃研一兩 巴豆五錢去皮入白麵二兩同研滴水丸梧子大滾水煮十二丸瀝入冷水內令沉冷每用時用浸藥冷水下二丸一日十二時盡十二丸以利為度不必盡剉

葛黃

研如泥

水煎溫服

葛本湯 治太實心痛大便已利宜以此徹其病越之如爪蒂散之類

○氣痛之劑

正氣天香散 但忍氣則發

七氣湯

蘿子降氣湯

見氣門

○治痰飲痛劑

丹溪方 痰飲停積胃脘作痛

螺鈿殼 墻上久者 滑石 炒蒼朮

南星 駁枳殼 青皮 木香 半夏 砂仁

各一錢

右末半姜汁浸餅為丸 豆蔻大每三四十  
丸 姜湯下春加川芎 夏加黃連 冬加吳茱萸

又方 治痰心痛

半夏油炒為末每服二錢姜湯下 痛甚者太

陷胸湯或為丸亦可

○治死血痛劑

丹溪方 治死血胃脘痛者

玄胡索 半兩 桂 滑石 紅花

紅麯 錢五

桃仁 三十個 右末湯浸餅糊為丸

桃仁承氣湯 方見傷寒門

斗門方 血氣攻心痛不可忍

蓼根剉酒浸服之瘥

○治火鬱之劑

丹溪方

治火痛

黃連 山梔炒各二錢 陳皮 茯苓錢半 乾夏一錢

草豆蔻分甘草四分 姜三片水煎食前服

又方 治火痛

山梔仁姜汁炒水煎磨木香三分或加川芎八錢

雜方 牡礪煅為末每二錢酒調十錢

失笑散 有人心痛百藥不効用此而愈

五靈脂 捕黃 等分為極細末以醋調二錢

熬成膏入水丁盞食前溫服有瘀血作痛加

玄胡沒藥螺殼殼陳年日久者治心痛

為末熱酒調下一錢半

乾漆丸 九種心痛腹脇積聚滯氣

乾漆二兩搗碎炒去烟細研醋煮麵糊丸梧子

大每服十五丸至十七丸熱酒下醋湯亦好

不拘時日進二服

桑沙散 男婦心氣痛不可忍

晚桑砂不拘多少為末用滾水泡過濾淨取清水服

慰法 治心腹俱痛以包川椒薄注腹上火尉冷

椒汗出良

梅疏丸 酸熱以收散寒。凡服辛劑，及其甚者，改服  
冰梅一箇，生疏黃，為末，相和搗勻，以可丸為  
度，作一丸，白湯下，立愈。病不再作。

濟世方 治心痛

稀蓀草搗汁，醋汁相和服，立效。昔有入服此，吐  
虫二條，終身不發。

綠礬止痛方 綠礬七八分，好酒化下，再不發。  
衍義方 治心痛

銅青丁味淡醋湯，此小服之。

○治蟲之劑 可與虫部參治

化虫丸

雀虱

檳榔

胡粉

炒苦練根

去厚皮各五十兩

白礬

飛

二兩

為末，麵糊丸，桐子大，小兒，疾病多

有諸虫，或因臟腑虛弱而動，或因食甘肥而動，即腹中疼痛，往来上下，攻心，則哭不休，合眼，仰身，撲手，心神悶亂，嘔噦，涎沫，或吐清水，四肢羸困，面青黃色，飲食雖進，不生肌肉，或寒，或熱，沉默，不明知病處，一歲五

丸溫水下入香油一二點打勾下之其味亦得  
生生子曰已上論寒熱痰氣痛火食等痛治法  
皆已備矣但病久正氣虛損及稟賦素弱之人  
或被峻利伐太過以致羸弱而痛不愈者皆虛  
痛也當從補養氣血此根本之治不可全恃攻  
克以致虛之禍予嘗治干病壞之後

黃芪達中湯隨症加減治虛弱及被克伐藥傷  
局方蘿合丸治疰忤鬼氣卒心痛甚妙  
山梔并刲藥些之不効者玄明粉一服立止

○胸滿胸痛胸痺

肝虛則胸痛引背脇實則胸痛不能轉側喜太息

仲景曰肝中寒者兩臂不舉古本燥喜太息胸  
中痛不得轉側食則吐而出汗也肝著其人常  
欲跼其胸上先未苦時但欲飲熱旋覆花湯姜  
素問曰陽明所謂胸痛少氣者水氣在臟腑也水  
者陰氣也陰氣在內故胸痛少氣也  
仲景治胸痺之病喘息咳嗽胸背短氣寸口脉沉  
而遲關上小緊數者宜以瓜萎薤白白酒湯桂枝

大爪萎搗碎一個薤白半斤白酒七升

三味同煮取二升分溫再服

一婦人患胃中痞急不得喘息按之則痛脉數且濇此胸痺也因與小陷胸湯二劑而愈  
支飲胸滿者枳朴大黃湯主之

厚朴一大黃六枳實一兩

水五升煮取二升分溫再服

斗門方 治胃腹壅滯去痰開胃

半夏泡淨焙乾為末生姜自然汁和為餅子用

溫紙包于慢火中煖令香熟水一盞用餅子一塊如彈子大入鹽半錢煎取一盞溫服大能去胸膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功效大矣

一人年二十三歲膈有一點相引痛吸氣皮覺急此有汚血也 滑石一桃仁五錢黃連五錢枳殼兩甘草二錢為末每服一錢半以蘆薈自然汁煎熟飲之二日五六服

一人因服溫補藥又妄自學吐納以致氣亂血熱

嗽血消瘦膈間有一點氣梗痛似有一條系垂  
映在腰與小腹皆痛大率偏在左邊此肝部有  
惡血也 滑石一升殼炒各黃丹炒三黃連  
紫胡鎗五紅花錢一桃仁二甘草生二為細末每  
服錢半以蘿蔔汁煎沸服之有寒邪干干胸  
中者宜發散之如紫蘿前胡杏仁防風桂枝  
葛根之類

茯苓杏仁甘草湯 治胸痺胃中氣塞短氣

茯苓兩杏仁十五甘草一

水一斗煮五升溫服一升一日三服  
橘枳姜湯 治同上

陳皮一斤枳實二生姜半斤水五升煮二升分溫服

千金方 治胸痺氣滿壅心膈不利  
枳實二麸炒為末清米飲下二錢

仲景薏苡附子湯 治胸痺緩急  
苡仁十五大附子炮個為末每服方寸匕日三

旋覆花湯 治胸中嘈雜汪洋常覺冷涎泛上  
元欲吐飽悶

赤水玄珠

卷五

七

七

旋覆花 橘紅 半夏 茯苓 甘草

厚朴 芍藥 細辛 姜三片水煎服

○虫痛

虫本溫熱所生，臟腑虛則侵蝕。

療寸白蟲，錫灰蕪荑檳榔極佳。宜和中一人，每覺心中多嘈雜，意欲作飲，又疑蟲漫依此方，翌日下長蟲二條，一長二尺五寸頭圓潤尾尖銳，每寸作二節，班如錦紋一條，皆寸斷矣。

千金方云：勞則生熱，熱則生蟲，心蟲曰蛔，脾蟲曰

寸白蟲，如刀截絲縷，肝蟲如爛杏，肺蟲如蚕，皆能殺人。惟肺蟲為急，居肺葉內，蝕人肺系，故成瘵疾，咯血聲嘶，藥所不到，治之為難。道藏中載諸蟲頭皆向下行，惟自初一至初五日以前，頭上行，故服藥多取月出以前，蓋為此也。

取寸白蟲方

錫灰一木鱉子，蘆會二十黃丹十輕粉十

文

為末，猪膏油丸，桐子大，先一日食素，晚莫喫

飯，次早五更溫水調下，分二服。

每二服用

又方 畫粉 蜜佗僧 各半分為末，每二錢用

麻油調服，空心下，頸刺成涎，取下。

蟲蠶之生由飲食過節，傷飢過飽，喜啖腥膾，多食生冷，酷嗜麴蘖，爰食肥甘，臟腑虛弱，濕熱內滯，則生虫積也。

三虫者謂長虫、赤虫、蛲虫也。乃有九種而蛲人多病，之寸白虫從食牛肉飲白酒所成，相連一尺，則殺入服藥下之，畫出乃佳。蛲虫多小兒患之，大人亦有，令人口吐清汁，心痛煩躁，乍作乍止。

其餘各種總不利于人，胃中若有者，宜化虫丸速除之。

腹內熱，腸胃虛，虫行求食，上唇有瘡曰惑虫，食其臟，下唇有瘡曰狐虫，食其肛，得此疾者，十無一生也。

寸白虫上半月，虫頭向上，易治；下半月，向下難治，先以肉汁或糖蜜引虫頭向上，然後用藥。

集効丸

木香 鶴虱炒 檳榔 訶子 麵包 慄 蕃蕷炒

附子炮去乾姜各七錢半大黃一兩烏梅十四個

右末煉蜜丸麻子大每三四十丸陳皮湯或淡醋湯下

秘方萬應丸太小兒腹內有蟲及積氣塊痛

小兒疳病三稜莪术各一錢醋陳皮炒橘紅

史君子肉麥蘖麵炒神曲炒雷丸乾漆

盡各一錢檳榔一兩蕷朮二錢鶴虱炒胡黃連炒甘草

炙各三錢木香良姜陳壁砂仁各二錢右末醋米糊

為丸菉豆大每三五十丸空心淡姜湯下

靈礬散治小兒食咬心痛欲絕

五靈脂末二錢白礬枯五錢

每服二錢水煎服不拘時虫出即愈

安虫散凡虫不可盡去宜安之

檳榔胡粉勸川練子桂皮鶴虱炒各枯礬二半右末每服一錢米飲調下

川練丸上中二焦虛或胃寒虫動作痛

乾漆炒烟盡雄黃分巴豆霜錢

右末麵糊丸黍米大者大小與服取東向石

榴根煎湯下痛者苦練根湯或蕷朮湯下

蕪萬散 治諸蟲作痛臨發時服

白蕪萬去扇乾漆炒烟各等分為末每一錢米飲

化虫丸 治小兒宿虫五心煩熱

蕪萬 黃連 神曲炒麥蘖炒各等分

右末麵糊丸黍米大空心米飲下

制虫制勞悅肌膚去勞熱

檳榔一兩龍膽草兩乾漆鐵五為末煉蜜丸梧桐子大廿每十九至十五丸滾水下

木香三棱散 腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑丑半生半熟大腹子炙檳榔 雷丸 錫灰炒醋  
三棱煨蓬术煨木香 大黃各一

為極細末每三錢空心蜜水調下或砂糖水  
下須先將燒肉一片口中嚼之休嚥下吐出  
口中肉汁後服藥

丹溪治蛔虫吐清水氣口刺痛取生艾汁隔夜勿  
食次早五更以肥香脯方寸匕先喫令盡聞香  
隨即飲汁一升必下蛔虫九胸喉中覺有虫上  
下偏喜聞葱豉油食之香者兩三日不食開口

而卧將豉煎葱油令香放口邊蟲當自出引而去之但隨喜所物用之亦可

古有一人忽患一疾，恶心則吐血數條後乃頗作累治不効。每用殺蟲藥則吐蟲愈多。招孫尚先生診之曰：六脉皆細非蟲也。今雖吐蟲乃臘寒而蟲不安居上膈，因而吐出復用殺蟲藥，蟲為藥所苦不能自安，所以蟲吐愈多也。硫黃附子各一兩為末，粳米糊丸，每服三十九飲下之，五服後再不吐蟲而痛亦止。

仲景曰：凡腹中痛，其脉當沉弦，今反洪大，故有蟲熱則生虫，故脉洪大。

○嘔吐噦門

生生子曰：機要云：有聲有物謂之嘔，無聲有物謂之吐。空濁惡而聲長謂之噦。要知噦屬陽而吐屬陰也。無形者肺有形者胃以胃兼氣血言也。又云上焦吐者為氣中焦吐者為食積，下焦吐者為寒，內經云食不得入是有火也。食入復出是無火也有飽後逢怒或傷力跌撲以致瘀

血積于胃脘者有膽虛及風痰作吐者有胃虛而虫行求食者有中氣虛弱者有風寒外襲者有鬱火作痛而吐者有傷酒而嘔吐者有腳氣發而吐者惟細心體認治之無不愈矣

東垣云大便閉者通利之陰虛邪氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不通也正當用生地黃當歸桃仁紅花之類和血潤燥兼用甘草以補其氣微加木黃芩硝以通其閉大便利邪氣去則氣降嘔噦自不見矣復有胃中虛熱穀氣大虛

發而為嘔噦者但得五穀之陰以和之則嘔噦自止五穀皆屬陰或食或飲白湯或喜涼水皆能止嘔噦不必用藥也治嘔吐生姜半夏橘皮必用之聖藥但只治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實以辛藥瀉之

東垣嘔吐噦分為辛陽經云嘔吐噦者皆属于胃胃者總司也以其氣血多少為異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病

仲景云嘔多雖有陽明症慎不可下

孫真人云嘔家多服生姜乃嘔吐之聖藥也氣逆者必散之故以生姜為主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以陳皮去白主之噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以姜製半夏為主故朱奉謙治嘔吐噦以生姜半夏陳皮之類究其三者之源皆因其脾虛弱或因寒氣飲食所傷而致也宜丁香藿香半夏茯苓陳皮之

類若但只內傷宜察其虛實使內消之痰飲者下之當分何經對症用藥不可亂也

○嘔吐膈氣總論

潔古云吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃戶上通天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從于氣者天之陽也其脉浮而洪食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中

中焦吐者皆從于積。有陰有陽食與氣相假為  
積而痛。其脉浮而弦。其症或先痛而後吐。或先  
吐而後痛。治法當以小毒藥去其積。檳榔木香  
和其氣。下焦吐者皆從于地道也。其脉大而遲。  
其症朝食暮吐。暮食朝吐。小便清利大便秘而不  
通。治法宜毒藥通其閉。溫其寒氣。大便漸通。  
以中焦藥和之。不令大便閉結而自安也。

右繫古論三焦吐蓋本黃帝所謂氣為上膈食  
飲入而還出為下膈。時乃反出之其上焦

食已暴出者今世謂之嘔吐也。中下二焦朝食  
暮吐暮食朝吐者今世謂之膈氣反胃也。今分  
嘔吐膈食為二門。

仲景云諸嘔吐穀不得下小半夏湯主之。

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲  
故也小半夏湯主之。

卒嘔吐心下痞脇閉有水眩悸者小半夏加茯  
苓湯主之。胃反嘔吐者大半夏湯主之。服前小  
半夏湯諸湯不愈者此胃虛當以甘益之立愈。

○治氣之劑

仲景陳皮湯 乾嘔手足厥者治宜辛散

橘紅四兩生姜八兩水七升煎三升溫服一升即愈

木香散

木香 檳榔 等分為細末以後桔梗湯調下  
索古桔梗湯 上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮洪  
宜先降氣和中

桔梗 白朮各一兩半夏麴二兩橘紅 枳實炒  
茯苓 厚朴各一兩水煎調木香散二

錢隔夜空腹服之三服後氣漸下吐漸去然後去木香散加芍藥黃芩一兩半同煎服之病愈則止如大腑燥結食不盡下以大承氣湯去朴硝微下之少利為度耳眼前藥補之如太便復結又依前微下之

檳榔橘紅散

治嘔吐

白檳榔一枚橘紅半錢 水煎服

○治寒之劑

加減二陳湯 痰火為患嘔噦頭眩心悸中脘不

快發寒熱或食生冷，脾胃不和益治。

丁香一兩半夏陳皮各一兩茯苓二兩甘草半兩

每服四五錢姜三片烏梅一枚水煎熟服

治瘧疾加草草蔻半兩

藿香安胃散 脾胃虛弱不飲食嘔吐不時

藿香半錢丁香一錢人參各二兩紅錢

每服二錢姜三片水煎服

東垣丁香吳茱萸湯 治嘔吐噦胃寒所致

丁香 甘艸 茯苓 柴胡 半夏 乾姜各五分

分吳茱萸 草豆仁 蒼朮 黃芩 人參各

錢升麻七分當歸半錢

每服五錢姜三片水煎食前熟服忌生冷

藿香平胃散 治嘔吐不正

藿香 厚朴各一兩半夏 甘草二兩炙朮三分

陳皮去白每服五錢姜三片棗三枚水煎溫服

羅太無紅豆丸 諸嘔吐逆膈氣反胃亦治寒溫

丁香 胡椒 砂仁 紅豆各二分右末姜汁糊為丸每十九以太囊

一枚去核填蕊，裹燒麵熟去麵，細嚼白湯，下食前進三服，效。

丁香附子散 暖氣吐食及下焦寒而奔豚上冲，黑附子皮（炮去）丁香錢五枚，榔榔枝一大碗，黃砂胡椒錢二右先將四味為末，次入硫黃再研匀，每服二錢，用蠅蝠一箇去翅足，腸肚填藥在內，用溫紙五七重裹定，置慢火內燒熟，取出細嚼，用溫酒送下，一日三服米飲送下亦可。

仲景吳茱萸湯 治嘔而胃滿者。

吳茱萸湯 泡一入參分生姜半兩，大棗枝水煎。

○治火之劑

蘆根湯 热而嘔吐不止及治惡阻。

蘆根取半中新白者半斤，水二碗煎，一碗熟服。

竹茹湯 治胃熱而嘔。

乾葛 半夏各三錢，甘草二錢。

每服五錢，姜片竹茹半錢，棗一枚水煎，溫服。

昔有人病傷寒，得汗後數日，忽嘔吐，藥食俱不得，下醫皆進丁香薑香滑石等藥，下咽即吐，後以

此竹茹湯與之即愈

枇杷散

治嘔吐利膈氣止嘔啶又治卒嘔吐不

食單煮

枇杷葉汁飲之此物味苦平下氣

枇杷

葉人參半夏各一錢

大黃一錢

茅根二

姜七片

水煎磨檳榔末五分和勻服之

丹溪治膈上有熱胃中有痰二陳湯加炒旋子黃連半姜主之嘔而發熱者小柴胡湯主之溫膽湯治嘔吐不下飲食極妙

仲景青鎮丸

治寒熱往來脉弦嘔吐頭痛即小

柴胡湯

加青黛以姜汁打糊為丸白湯下

劉河間治暴吐上焦氣熱所沖經曰諸嘔吐酸暮注下迫皆属于火脉浮而洪者荆黃湯主之

荆芥

一人參五錢甘草二錢

大黃二

檳榔散

檳榔二錢木香乙錢輕粉少許

右水煎

調檳榔散二錢空心服

右為細末同前煎藥下如欲作丸子用蒸餅

糊為丸小豆大每丁十九食後服

香靈治瘀血之劑

香靈丸

又名六丁丸

治嘔吐如神及產後嘔不止者

丁香

辰砂

六錢

五靈脂

一兩

右三脂先研末後

入砂再研勻用狗膽汁或猪膽汁

各一錢為丸鷄頭

子大每服丁丸生姜陳皮湯磨下

治療血獨以五靈脂狗膽汁

各一錢為丸鷄頭子大每服

一丸生姜湯磨下及生姜酒送下極熱服

草靈丹

五靈脂

姜汁

甘草

燒酒透

焙乾為末每服五分置掌中用舌舐下此方

治膈氣反胃嘔吐梅核氣及胃脘疼痛効

丹溪云久病嘔者胃虛不納穀也

生姜 人參 黃芪 白朮 香附

之類治之

李澤治反胃嘔吐無常粥飯入口即吐困倦無力

垂死者以人參三兩作一服水煮帶熱頓服愈

理中湯 治脾胃虛寒嘔吐不食

調中湯 治脾胃虛弱嘔吐

治中湯

治霍亂吐瀉

即理中湯加橘紅青皮各一兩是也

六君子加砂仁治脾胃虛弱惡心欲吐及

生食或不思食

○治積氣之劑

遇仙丹 木香枳榔丸 枳實導滯丸 七聖丸  
皆可選用

○治風痰之劑

金花丸 吐食而脉弦肝乘脾也由脾胃之虛宜  
治風安胃 半夏湯泡一兩 檳榔二錢 雄黃一錢  
右末姜汁浸餅糊為丸桐子大小兒另丸  
姜湯下得少至多漸次服之以吐止為度風  
痰羈絆於脾故飲食不下也

○治水飲之劑

小半夏湯 治嘔吐穀不得下者

半夏一斤 生姜半斤 水七升煮取一升半分溫再服

小半夏加茯苓湯 治卒嘔吐心下痞腸閉有水

眩悸者即前方加茯苓四兩

大半夏湯 治胃反嘔吐服前小半夏湯諸藥不  
愈者此胃虛宜以甘益之服此立愈

半夏二斤 人參三兩 白蜜一斤 水一斗三升和蜜搗  
之二百四十遍煮藥取三升 從服一升 稱分再服

赤水玄珠

猪苓湯 治嘔吐而病在膈上後思水解急與之  
患水者此湯主之 猪苓 桑芩 白朮各等分  
為末飲調方寸匕日三

○胃風

胃風之症治嘔愈嘔者是也用川烏一兩洗淨去  
皮臍不去尖以水一碗煮乾每枚切作二片  
復用漿水一碗煮盡更切作四片每細嚼一片  
以少溫水下少頃嘔遂止此皆好食甘甜之物  
膏粱之味積久成熟因而生風非一朝一夕之  
故也

雜方碧霞丸

治嘔逆立効

黃丹四兩篩過用好米醋半斤用藥入鍋內煎  
乾却用炭火三斤就鍋內煖透紅冷取出研細  
末用粟米飯搗為丸梧子大煎湯下十七丸効  
木瓜湯 主嘔逆風氣又吐而轉筋者煮木瓜汁  
飲之甚良此酸收之劑欲吐不吐者是也

○惡心

丹溪云惡心有熱有痰皆用生姜隨症用藥  
仲景生姜半夏湯治胸中似喘不喘但嘔不嘔

似嘔不嘔徹心中憒然無柰者

半夏半生姜一斤

右二味以水三升煮半夏

取二升

內生姜汁同

煮二升半少冷

分四服

日三夜一

如病止大後藥

此溫痰症也

東垣茯苓半夏湯

胃風虛弱身重有痰惡心欲吐

是邪氣羈絆于脾胃之間當先實其脾胃

炒麵錢大麥芽炒黃陳皮

天麻各二

白术

茯苓半夏各一

每五錢姜五片煎熟服

柴胡半夏湯

治舊有風症不敢見風眼澁眼黑

胸中有痰惡心兀欲吐但遇風覺皮肉緊手足難舉動重如石若在暖室少出微汗其症隨減再遇風病復如是方見痰門

。嘔苦水

丹溪治一婦人清早嘔苦水脉濇而微起轉鬻常此胃弱而上脘有溫

黃芩七錢滑石

蒼朮炒陳皮

山楂

半夏各

桔梗五錢飛礬

兩姜水煎服

二陳湯加山梔子一倍黃連減半香附撫芎白芷

仁煎服或臨服時磨檳榔末少許治齶火惡心

嘔沫及胃症沫大者多死予日擊數人判

仲景治乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾姜散主之

半夏

乾姜各等分

二味為末

取方寸匕漿水

一升煎七合頓服之

嘔膿

予一族嫂中年患此半載亥熟嘔膿血後竟無事此亦肺癰症也膿盡即愈

仲景云嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

○嘔長虫

丹溪治吐虫用黑錫灰檳榔末米飲調下

仲景治嘔厥當吐嘔今病靜而復時煩此為臟寒  
嘔上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者聞  
食臭出其人當自吐嘔

嘔厥者烏梅丸主之又主痢 方在厥證門

○傷酒嘔吐

東垣葛花解醒湯 方見傷飲門

益元散姜汁為丸治酒熱嘔惡殊驗

乾姜丸治酒癖成飲吐酸水

乾姜葛根枳殼橘紅前胡錢各五半夏

赤水經卷  
五  
七

麵 白术 酸乙 吴茱萸 甘草 各二  
兩 半錢

右末煉蜜丸 桐子大 每三十丸米飲下

○嘔吐清水

許學士神木丸 治嘔吐清水如神

荳木一斤去皮切片為末用白芷蘇半兩水二盞研濾取汁太棗十五枚煮爛去皮核以芝蘇汁研勻成稀膏搜和入臼搗熟丸如桐子大每空心溫湯下五十丸加至百丸忌桃李雀鳥初服時膈上微燥且以荳木製覺燥甚

再進山梔子散一服久之不覺燥也

山梔散 山梔一味乾之為末沸湯點服

仲景茯苓散 治心胸中有停痰宿水自呴出水

後心胸間虛氣滿不能食消痰氣能飲食

人參 白术 茯苓各三 枳實二陳皮五生姜

丹溪治兩手脉弦飲後嘔清水

神麵 荳木 香附各五 益元散一半夏七錢

右末姜汁浸餅為丸

丹溪治一人年四十因灸艾火太多病腸內下血  
糞肚痛今痛自止善嘔清水食不下宜清胃口  
之熱，黃芩 甘草 茯苓各五分 陳皮 地黃  
各一錢 白朮 連翹各一錢半 姜三片水煎服  
仲景治渴欲飲水水入則吐名水逆 五苓散主之  
千金方治痰飲吐水無時節者其原因令飲過度  
遂令脾胃氣羸不能消于飲食飲食入胃則皆  
變成冷水反吐不停皆用赤石脂散主之  
赤石脂一斤研細末每服方寸匕酒飲調下時

稍加至三七服盡一斤終身不吐痰水又不  
下痢補五臟令人肥健有痰飲服藥不愈  
用此方愈經云諸病水液澄澈清冷皆屬子  
白朮散 治胃中寒作吐及作痛者  
白朮仁二錢為末酒送下

○噎膈

內經陰陽別論篇曰三陽結謂之膈結謂熱結也  
三陽者小腸膀胱也小腸熱結并脾則血脉燥膀胱  
熱結則津液涸故隔塞而不便焉其始也或由

飲食不節，痰飲停滯，或因七情過用，脾胃內虛而作。或者不察，悉指為寒，例用香熱之藥治之，反動七情之火，脾胃之陰反有所耗。是以病日益深。今治此疾，或見咽嗌閉塞，胸膈痞悶，似屬氣滯。然有服耗氣藥過多，中氣不運，而致者當補氣而自運。有大便燥結，如羊屎者，似屬血熱，然有服通利藥過多，致血耗竭，而愈結者，補血潤血，而自行。有因火逆冲上，食不得入，其脉洪大，有力而數者，有痰飲阻滯，而脉結濇者，當清。

痰泄，熟其火，自降。又有脾胃陽火衰弱，其脉沉細而微者，當以辛香之藥溫其氣，仍以益陰養胃為之輔可也。太槩又有寒熱之辨，若食已即吐者，火也。食久始吐者，寒也。王註曰：「食不得入，是有火也。食入復出，是無火也。」按內經王註曰：明二陽也，太陽三陽也，一陽膽與三焦，二陽肝陽，腸與胃三陽也，小腸膀胱也，并大腸而言，不知後何所據耶？」傷寒論云：「食入反吐，穀不得前者，腎水乾也。」王冰曰：「病嘔而吐，食久反出，是無水也。」此與內經病

能篇註異

氣厥論云膈中陽氣與寒相薄故陽食而陽氣不  
通此論亦云陽與寒相薄未嘗專主于寒也  
丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰血虛者脉必數而  
無力氣虛者脉必緩而無力有痰者脉必沉或  
伏而大又有氣滯結者寸閏沉而濁又有擊趺  
內積瘀血忽然嘔吐食不能納者其脉必芤  
張鷄峰曰噎當是神思間病惟內觀自養庶或可  
安又曰噎生于血乾血陰也陰主靜內外兩靜

則臟腑之火不起而金水二臟有養陰血自以  
腸胃津液傳化合宜何噎之有

古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰乾  
姜以養血粟米以實胃蜜以潤燥姜以去噦有  
氣結者用開導之劑有陰火上炎者作陰虛治  
有積血者當消息去之

糞如羊屎者不治五十以上者不治口中多出  
白沫者不治

治法大槩用童便韭汁姜汁竹瀝牛羊乳氣虛入

四君子湯血虛入四物湯切不可驟用辛燥之藥宜薄滋味宜用乾蒸餅等物少用湯粥六節藏象云人迎四倍以上為格陽蓋陽上之極故格拒而食不得入

金匱云病人脉數為熱當消穀引飲而反吐者以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數為客熱不能消穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變為胃反寒在于上醫反下之今脉反弦故名曰虛

趺陽脉浮而濡浮則為虛濶為傷脾傷則不朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而濡其病難治

氣虛胃反右手脉無力者

四君子湯加蘆根以伏龍肝浸長流水澄清煎之臨服入童便韭汁牛羊乳入黑駝尿和人服以防其生虫不除取其水煎服

參苓白术散 錢氏白术散皆治中氣虛弱胃反血虛胃反左手脉無力者以四物湯加童便或再

加桃仁紅花有酒積加甘蔗汁

二陳湯合平胃散

治有痰而胃及者

人參利膈丸 治胸中不利痰嗽喘滿而膈

木香

枳實各一錢半

人參

川歸

藿香

甘草

枳實各一兩

大黃

酒

厚朴各二兩

右末滴水丸梧子大溫水送下

千葉白朮槿花陰乾為末陳皮湯調下三升五口不

轉丹服

奇方

未出毛啄木鳥 蟬蝠

小鮀鴨魚

三味入

新丸內鹽泥固濟煅存性為末外用狗寶為  
末和勻每服五十分漸至一錢姜湯下

又方

陳觀殼燒灰米飲下

老牛涎如棗核大水中飲之終身不復噎

又方 芦根 茅根各二水四鍾煮二鍾頓服之良  
姜附散 脾氣不通胸膈間結塊大如拳堅如石

嘔吐惡心飲食不下

香附子一生姜三搗取汁浸香附丁宿晒乾再  
研細浸再晒以姜汁盡為度為末每二十錢米飲下

病機紫沉丸 治中焦吐食，由食積與寒氣相格  
故吐而痛 半夏麴 代赭石 砂仁各三錢  
杏仁 沉香 木香 白术各一錢 烏梅仁  
丁香 檳榔各二錢 陳皮五錢 巴豆霜研肉果分各五  
右末，醋糊丸，大半錢，每五十九粒，巴豆霜湯下，共愈  
東垣厚朴丸 主反胃吐逆，飲食噎塞，氣上冲腹  
中諸疾，藥味即與萬病紫斂丸同。

厚朴 蜀椒去目微炒，一兩半 川烏炮去皮，各一兩半 紫苑 吳茱萸  
萸 柴胡 菖蒲 桔梗 茯苓 官桂

皂角去皮，弦去乾姜炮，各二錢 人參各二兩 黃連二兩 巴豆霜  
右蜜丸五錢 桐子大，每服三丸，漸加至五十七丸。  
以利為度，姜湯下，食後而卧此丸治効與局  
方溫白丸同。及治處暑已後，秋冬下痢，大効。  
加減法 春夏加黃連二兩 秋冬再加厚朴二兩  
如治風，於春秋加黃連厚朴外，更加菖蒲、  
蘇芩各一兩半，如治風痛不愈者，依春秋  
加藥外，更加入參菖蒲、蘇芩各一兩半，如  
心之積，加菖蒲、茯苓為輔。如肝之積，加柴

胡蜀柳，如肺積加黃連人參，如脾積加

茱萸乾姜，秋冬久瀉不止加黃連茯苓，脾胃氣弱食不消化，嘔逆反胃湯飲不下用粟米半升，為粉水丸，梧子大煮令熟點少益空心和汁吞下。

本事云，駢尿極治反胃，外臺載昔幼牛絳患此疾，每食餅及羹粥，須臾吐出，貞觀中許奉御兄弟及紫荊寺時稱名醫，奉勑令治醫竭其術竟不能療，漸至羸憊死在旦夕，忽有士云曰，駢尿極驗。

旦服二合，後食唯啖下半，晡時又服二合，人定時食粥，吐則便定，後奏知大內，中五六人患反胃同服一時俱瘥，此藥稍有毒，服時不可過多，盛取熱服二合，病深者日服之，良驗。本草云，駢尿治癩痕，反胃，又云性冷味甘，服之不生虫。

濟世方 駢尿調平胃散亦効。

新瓦散 治反胃，用多年瓦一片燒紅入駢尿，內淬二十一次研末，倉米飯焦為末，三分飯末十分瓦末，蠟精和飯丸以駢尿和平胃散服之。

丹溪番胃方

黃連

姜汁炒  
三錢

山楂肉

一錢保和末  
六錢

右粥丸桐

子大

以人參湯入竹瀝再煎沸熱下

六十九

丸

本事大黃湯

治冷涎番胃其症欲發時先流冷

涎

次則吐食此乃勞証治不早死在旦夕用大

黃一兩生姜

自然汁半茶盞炙太黃金燥又淬

入姜汁內如此淬汁盡切焙為末

每服二錢陳

米一撮葱白二莖水一大盞煎七分先食葱白

次

服藥不十日即除根

羅太無云玄明粉硝提八九次入犀礮煅過淨硝一斤入甘草末一兩和勻名曰玄明粉

每用一二錢桃花湯或葱白湯調下治膈上氣壅滯五臟秘結邪熱忌魚及鷄

丹溪治番胃積飲通用益元散生姜自然汁澄清

白腳丸小丸子時服治番胃用吳茱萸貝母瓜萎根牛膝草

本事治積聚停飲痰水生虫久成反胃及反胃癰其說在靈樞及巢氏病源芫花丸

芫花 醋炙

一兩

牛膝

狼牙根

桔梗 炒

藜蘆 炒

檳榔各 錢五

巴豆 大粒  
炒黑

右末

醋糊丸如赤豆大

每服二三丸加至五七丸食前姜湯下

此方常服化痰消堅殺蟲予患飲癖二十一年暮年常是多雜痰飲來潮遲即吐有時飲半杯酒即止蓋合此症也因讀巢氏病源論酒癥云飲酒多而食穀少積久漸瘦其病常欲思酒不得酒則吐多睡不復能食是胃中有一虫使然名為酒癥此方治之要之須痛禁酒

則易治不禁無益也

羅太無桂香散

治膈氣反胃諸藥難瘥朝食暮

吐甚者食已輒出其効神速此重劑也

水銀 黑錫各三

錢

硫黃五

錢

右三味銚內用榔木

搗碎研微火上細研為灰取出後用丁香末

二錢桂末二錢生姜末三錢都一處研令匀

每服三錢米飲調下一服效甚者再服神效

又云男婦小兒遠近番胃吐食或有污血停蓄胸膈者方用五靈脂一味為末以黃狗膽汁為丸

亦人本草 卷之五

七

龍眼大每服一丸好酒半盞溫服不止

耳服即效

丹溪治東陽王仲延咽膈間常覺有物悶<sub>々</sub>每食  
物必屈曲自膈而下且梗濁作微痛食亦減<sub>ス</sub>他  
無所苦予脉之右甚濁而閔甚沉左却和<sub>スカ</sub>予曰  
汚血在胃脘之口氣因而鬱為痰此必食物所  
致明以告我彼不自覺予又曰汝去冬好食何  
物為多曰我每日早必單飲點梨酒兩三杯逼  
寒氣為製<sub>ノ</sub>下方用生韭汁半盞令細哩之<sub>ノ</sub>日  
三服盡韭二斤而安

濟世方 治噎食

鷄腹內穀袋不拘多少不可失包內物一粒用  
泥固滯火煅存性用姜汁炒香附末半兩配穀  
袋一箇為末神麴糊為丸姜湯送下  
治氣噎不下飲

枇杷葉去毛蜜炙青皮 陳皮白

右等分每服三錢生姜五片水煎服

金匱玉函 五噎心膈氣滯煩悶吐逆不食  
蘆根五兩剉水三木盞煮二盞溫服

求微中有僧惟則病噎不能食罵諸弟子曰吾死後便可開吾曾喉視有何物自經而卒弟子果開喉胸中得一物形似魚而有兩頭遍體皆肉鱗弟子置碗中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中盛藍作漬適有一僧以漬置碗中此虫遂逸碗而走須臾化為水此乃魚瘕非噎比因此後人多以藍治噎悞矣

秘方潤腸膏 治膈噎大便燥結飲食良久復出及朝食暮吐暮食朝吐其功甚捷

新取歲靈仙四兩生姜四兩真麻油二两白沙蜜一两右四味同入銀石器內慢火熬成膏時以匙挑食之良驗

雄黃二豆丸

治脾胃噎食神驗

大烏梅

二十枚水

硝砂

雄黃各二錢

乳香一錢

真百草霜

黑豆

菉豆

各四十粒

右五味為細末烏梅肉搗丸彈子大每服一丸噙化待一炷香時藥力方行烙白麵餅丁放清熱湯泡開吃之無碍為妙設仍有微碍

一二日後再服十九，三五丸除根。

紫蘿子飲  
欬逆上氣噎膈因怒氣呴噦未定便  
挾氣進飲食或飲食甫畢便用性恚怒以致食  
與氣相逆氣不得下或咳嗽不透心氣逆惡心

蘿子炒 詞子煨去核 蘿蔔子微炒 杏仁去皮尖

人參

木香各一錢半

甘草炙各三錢

右分二服生姜三片水煎服

太倉丸

脾胃虛弱不思飲食番胃不食亦宜服

砂仁

白豆仁各二錢

陳倉米

一升用朝東向陽壁土炒去土不用

右末生姜自然汁九桐子大每服百丸淡生  
姜湯下

體仁彙編曰硫一結成砂子呴逆立痊方用嚴氏

青金丹治一切呴逆

水銀八錢 生硫黃一錢 為末入銚內慢火化開以

柳木棍攪炒或有烟焰以醋沃之結成砂子  
再研為末用棕尖杵丸菉豆大每服三十  
丸生姜陳皮煎湯送下

青囊治反胃久築不效及小兒呴不止者硫黃丸

錢為末，入水銀二錢半同研，無星為度。每服二錢，先取生姜汁酒一盞煎熟，調藥空心服。調時逐漸著酒，緩調令匀，服訖以被蓋出汗安。

又曰：人參治番胃之良。用人參二兩拍破，每服一兩水一盞半煎，四分熱服。兼以人參汁煮粥吃，愈有入患番胃諸方不瘥，只服人參而愈。若卒嘔吐，遂丸粥飲入口即吐，困弱為丸眼良。

劉宗厚曰：按古治番胃諸方悉是香燥太熱之藥，皆不足為法。今姑採一二方以備用耳。至于

丹溪所言補血益陰潤燥和胃調中等藥，雖無其方，自宜隨証設施觀其立論，則思過半矣。

治噎禁方

皂角黃三分每春夏雨後樹上生如菌樣 蘆根浮露水上者三錢 橘紅

七分 烏藥一錢 桔梗二錢 枳實八分

水二盞煎一盞，先

服一酒杯，漸加之，渣再煎。

生生子曰：噎膈之病，氣鬱居多，然亦有陰血不足者。少壯之人日以酒色，是耽胃中之火，沸騰則上焦肺金先受邪矣。金主降令者也，火凌于肺，

赤水玄珠

五卷

三

津液成濁况又下竭腎水將何攝伏其火以下行耶經曰大便者腎之所主陰血既虧則太便燥結<sub>李子</sub>則下焦閉而氣反上冲經曰幽門不通上冲吸門又曰肺出氣腎納氣虛則失司乃職是有陽而無陰有升而無降也故守真子和丹溪皆以火熱而言戒用剛燥其意深矣然用藥必假滋陰潤燥為主陰血生則大便潤<sub>李子</sub>則下焦開<sub>李子</sub>則氣降腎司職而病尋愈矣噫用藥之法固為詳悉然人不能鉄石其心<sub>李子</sub>斷酒色則雖

日飲瓊漿亦莫能以致其生也予特附于篇末俾病者自加珍重孰非愈病之藥石耶

○腰痛門

腰痛有腎虛有濕熱有痰有氣滯有跌撲瘀血脉大而無力為虛弦為陰虛濁為死血沉滑為痰沉細為氣濡弱為溫緊數為風

東垣曰太抵寒濕多而風熱少然有房室勞傷腎虛腰痛者是陽氣虛弱不能運動故也經曰腰者腎之腑轉搖不能腎將敗矣宜腎氣丸茴香

丸之類以補陽之不足也。膏梁之人久服易醉，以入房損其真氣，則腎氣熱而腰脊痛，不能舉，久則髓減骨枯，發為骨痿，宜六味地黃丸滋

腎丸、鳳髓丹之類以補陰之不足也。

丹溪曰：久痛必用官桂以開之，方止。腹脇痛亦然。煨腎丸 肝腎脾損，穀不化，治宜益精緩中消穀

腰不起者，神効。

川草薢 杜仲姜汁炒 牛膝 破故紙 芦芭

兔絲子

肉蓯蓉

沙苑蒺藜

各一

桂心半兩

右酒煮猪腰子為丸，桐子大，每服五七十丸，空心鹽酒送下。

金剛丸 腎損骨痿，不能起坐。

川萆薢 杜仲炒 照前法丸服。

麋茸丸 腎虛腰痛，不能轉側。

麋茸丸一兩鹿茸亦可用 兔絲子一兩 舶上硫黃五錢

右末，以羊腎二對，酒煮爛去膜研如泥，和丸梧子大，陰乾如羊腎，不敷入酒糊，佐之，每服三五十丸，溫酒或鹽湯送下。

鹿角散 新角刮去黑皮取白者炒黃為末酒服

一錢日進三服禁生魚餘不禁陳者不用角中

心黃亦

不用此方治腰痛神妙

東垣曰鹿角能去惡血

羊腎散 羊腎為末酒服

一錢日進三服本草云

羊腎補腎氣益精髓

腎氣丸 苜香丸 青娥丸

已上皆補陽之不足也

八味丸 治虛勞小腹拘急小便不利此則陰陽兼補也

六味地黃丸 虎潛丸 滋腎丸 大補丸  
已上皆補陰之不足也  
治陰虛脉大者

杜仲 龜板 黃柏 知母 枸杞子 五味子

等分為末以猪脊髓為丸每服五七十丸

空心益酒送下

補腎丸 治腎虛腰痛効

烏藥葉本草云烏藥嫩葉補中益氣

側柏葉

石酒蒸晒乾為末粥丸梧子大照前服

腰腿湿痛方

龜板酒炙

黃柏酒炙青皮三錢甘草生一錢半

右末研姜一大片次入藥末一錢研細以蒼耳汁煎令沸服

治陰虛性急腰痛者

龜板

黃柏

知母

側柏

右為末地黃膏為丸

治溫熱腰腿疼痛

龜板酒炙

黃柏酒炙

蒼术

蒼耳子

各一錢

側柏

內

外

內

外

內

外

內

外

丹歲靈仙酒浸

右以牛膝膏為丸以黑豆汁薦

又方

治腰腿疼痛

龜板酒炙

黃柏

白芍藥

各酒炒

陳皮

知母

四物湯加陳皮生甘草生姜一片煎吞下

龜板酒炙

楮皮炒

蒼术

滑石

各半

芍藥酒

東垣蒼术湯

治濕熱

腰痛太便濁

龜板酒炙

楮皮炒

蒼术

滑石

各半

芍藥酒

香附各四錢

為末

粥丸如

內傷

白朮山楂湯

各半

丹歲靈仙

蒼术

蒼耳子

各半

蜜丸服

治濕熱腰腿疼痛

丹歲靈仙

蒼术

滑石

各半

芍藥酒

丹歲靈仙

蒼术三錢去湿止痛紫胡二錢行經絡防風黃柏各一錢

水煎空心服

陳無擇牛膝酒 治傷風毒攻刺腰痛不可忍

牛膝 川芎 羌活 地骨皮 甘草 蒼朮  
仁各兩 海桐皮二兩 生地黃十兩 假以絹袋盛入

好酒二斗浸二十日夏三十五日每服一杯一日三四服常令酒氣不絕為佳一法入桂仲治疼痛全以二陳湯加天南星川柏蒼朮歲靈仙之丹溪治老人因跌撲腰痛

蘆木錢歸身頭一錢陳皮各一人參錢黃芪

木香 木通各五分 桃仁九枚

煎湯送下自然銅末子五分

脉濶者有瘀血也用熟大黃湯治墮墮明剉腰痛

不能屈伸大黃剉如生姜切片各半兩

二味炒令焦黃以水一升浸一宿五更去渣

服天明取下如鷄肝者即惡血也

治食積腰腿痛

龜板

酒側柏葉

酒香附

五錢

白芥子

麥

首花一錢

半右酒糊丸以四物湯加陳皮甘草山楂莪朶

青皮煎湯下

痰積食積指下有力或沉滑有力皆宜下之

治腰痛用歲靈仙此治痛之要藥為細末每服二錢以豬腰子一枚批開脊葉在內濕紙煨熟五更細嚼熱酒下

牛金方用歲靈仙一錢溫酒送下逐日以微利為度病人稍虛者禁用

治腰痛不可忍

牽牛不以多少研取頭末去渣取大蒜每十瓣切開入巴豆一粒在內外用濕紙包完火煨令蒜熟去巴豆將蒜細研和牽牛末為丸梧子大每服五丸醋湯或茶空心送下量虛實服

藥棋子 治腰痛氣滯者

黑牽牛不拘多少以新瓦火燒赤便以牽牛倒在瓦上自然一半生一半熟不得攪動取頭末一兩入硫黃一分同研勻分三服每用白麵丁匙水和捏如棋子樣五更初用水一盞煮熟送

下痛住即止未住明白五更再服

許學士曰予嘗有此疾每發只一服痛立止

按此二方皆濕熱痰氣壅滯不能流通故痛猛而用藥峻也此樣方法亦不可無但看病虛實用之

獨活寄生湯 治腎虛弱臥冷濕地腰腿拘急筋骨攣痛或當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛

獨活 杜仲 牛膝 細辛 薤白 秦艽 茶芩

桂心 防風 川芎 人參 甘草 朮寄生  
各一  
兩半 當歸 熟地各二  
一加續斷三兩

每服三錢姜五片水煎食前服

王海藏防風湯 治傷寒後腰痛或皮肉痺及腿膝疼痛行步艱難不能俛仰

防風 川芎 附子 炮當歸 芍藥 羌活  
續斷各一  
加皮 丹參各五  
麻黃去桂枝皮杜仲炒各七錢牛膝五  
錢每五錢姜二錢煎食前服

此二方皆治寒溫之劑也

卷之三

三

三

東垣川芎肉桂湯 臥寒溫之地腰痛不能轉側  
兩脇擗急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆為足大陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二症屬少陽膽經外絡病皆宜去血絡之凝乃愈  
羌活一錢半各一錢 柴胡 肉桂 蒼朮 歸梢甘草炙  
川芎一錢半另研 獨活 麴炒各防風 防已各三分五箇去皮水酒煎食遠熱服  
陳無揮曰小續命湯加炒桃仁治風腰痛最妙  
五積散加桃仁 治寒溫腰痛

卷之三

三

三

東垣羌活勝濕湯 治脊痛項強腰似折項似拔此足太陽經不行也

羌活 獨活

藁本

防風各一錢

蔓荆子三分

川芎二分 甘草五分

水二錢煎溫服

若身重沉然乃經中有湿熱也此方加黃柏一錢大附子五分蒼朮二錢予嘗治一人腰下溫中宮有痰腰痛而小便白濁身重如山乃以二陳湯合五苓散以蒼朮換白朮加羌活服之 方有熟再加黃柏木通

陳無擇桃仁酒 腎虛風勞所傷毒腫掣痛牽引  
小腹連腰痛 桃仁麸皮炒去皮尖研細每服一  
錢熟酒調下出汗即愈

東垣地龍湯 腰脊痛或打撲傷損後高墜下惡  
血在太陽經中令人腰膝痛或脛腨臂膊中痛  
不可忍鼻壅塞不通

中桂四分桃仁六錢羌活二錢獨活 甘草 黃柏各兩  
麻黃五分地龍四分僵蠶木六錢歸尾一錢

每服五錢水煎食遠熱服

橘核酒 治打撲腰痛瘀血積蓄痛不可忍  
用橘核炒去皮研細每服二錢酒調下或用猪  
腰子一枚去筋膜破開入藥同葱白茴香益以  
濕紙包煨熟爵下溫酒送之已上二方皆該入  
摩腰丹 治老人腰痛及婦人白帶

附子尖

烏頭尖

天南星

各一硃砂

樟腦

丁香各一錢半乾姜一錢半射香三分雄黃半錢

為末煉蜜

丸如圓眼大臨用以生姜汁化開如厚糊樣  
火上烘熱抹掌上擦腰中候藥盡貼腰上即

烘綿衣縛之俟腰熱如火隔二日用一丸

皂角膏

治諸腰痛脚痛

用皂角一斤去皮弦搗碎好酒二大碗熬去一半濾去渣再用前汁入磁瓶內熬為膏子隨痛

處貼之

如神湯 治男婦腰痛

玄胡索

當歸

桂心

杜仲

各半錢分

為末酒調下三錢甚者不過數服

橘核散

治腰痛諸般滯氣

橘核 乳香各五錢破故紙兩山楂 玄胡索  
蕎藺 没藥 五加皮 紅麴各一

為末酒調下

丹溪治瘧疾初安因沖風又發腰痛兼又白濁已  
與人參白朮檳榔半夏等補藥又教以煅牡蠣  
一錢木通五分炒柏三分入前藥同煎服

痢後腰痛兩脚無力

陳皮 半夏 白芍一錢芩 蒼朮 寶歸

黃芩 酒炒白朮二錢甘草半錢

卷五  
姜三片煎食前服

大宮詹少溪吳馭閣校

中風口瘡不復能言者此方最良又知難而退以保其身也

杏仁酥脂可

參頭 大棗 丘頭肉 球岐子一  
副料 檉香各五錢 姜皮二山楂 茯苓一

