



門  
武  
卷  
八

赤水玄珠第七卷目錄

吐酸門

論吐酸屬熱

論酸不同

論雜病吐酸與病机外  
不同

辨素問東垣

論酸不同

停飲

痰飲門

怔忡驚悸門

心澹澹動門

怒門

善太息

善恐

善悲

附婦人姪姪善悲

赤水玄珠第七卷

新安生生子孫一奎著

吐酸門

論吐酸屬熱

內經曰諸嘔吐酸皆屬于熱又云少陽之勝嘔酸夫酸者肝木之味也內火勝制金不能平木木自甚故為酸也如飲食熱則易于酸矣是以所熟則口酸或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吞酸故俗主于和脾胃豈知人之傷于寒

也則為病熱。蓋寒傷皮毛，則腠理閉密，陽氣怫鬱，而為熱故。傷寒熱在表，以麻黃湯發散，使腠理開通，汗泄，熱退而愈也。凡內傷冷物者，或積陰勝陽，而為病寒；或寒熱相搏，而致腸中陽氣拂鬱，而為熱。亦有內傷冷物，而反病熱，得汗泄，身涼而愈也。或微而止，為中酸，俗謂之醋心法。宜溫藥散之，亦猶解表之義。若久喜酸，不已，則不宜溫之。宜以寒藥下之，後以涼藥調之。結散熟去，則氣和也。所以中酸，不宜食粘滑油膩者。

謂能令氣鬱，不通暢也。宜羈食菜蔬，使氣通利，則酸自不作矣。

論雜病吐酸與病機外邪不同。發明云：病機吐酸皆属于熱。此上焦受外来客邪，也胃氣不受外邪，故嘔。仲景以生姜半夏治之，以雜病論之，嘔吐酸水者甚，則酸水浸其心，在其苦其次，則吐出酸水，令上下牙酸澁，不能相對。以太辛熱藥療之，必減吐酸，是吐出酸水也。酸味者收氣也。西方肺金旺也，寒水乃金之。

子子能令每實故用太鹹熱之劑瀉其子以辛  
熱為之佐而瀉肺之實以病機作熟攻之悞矣  
蓋雜病醋心濁氣不降欲為中滿寒藥豈能治  
乏乎

○辯素問東垣論酸不同

丹溪云或曰吐酸素問明以為熱東垣又言為寒  
何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水  
如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之  
久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其

有鬱積之火不能自湧而出伏于肺胃之間口  
不得上無不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而  
酸味刺心肌表溫煖腠理開發或得香熱湯丸  
津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱者言  
其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外  
得風寒而作收氣立說欲瀉金之實又謂寒藥  
不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香  
且無治鬱結濕熱之法為未合經意予常治吞  
酸用黃連茱萸各炒隨時令迭其佐使蒼朮茯

苓為輔佐湯浸炊餅為小丸吞之仍教糲食蔬  
菜自養則病易安

劉宗厚曰謹按呑酸一證以病機言之則屬於熱  
以臟腑論之則脾胃受病以內邪言之則痰飲  
宿食之所為故治法熱者寒之脾惡溫以苦燥  
之有痰飲者清之分利之有宿食者消之導之  
驅逐之局方不察斯故以噫醋呑酸醋心呑酸  
水之證並入于氣門中率用溫熱之藥豈呑酸  
專主于寒而無他證也故此一門以叙河間東

垣丹溪之論其病源治法無餘蘊矣

○停飲門

許學士云余苦有二疾一下血二膈中停飲下血  
有時而止停飲則無時始因年少時夜坐作文  
左向伏几案是以飲食多墜左邊半夜以後稍  
困乏必飲酒二三盞仍向左邊側睡半盛時殊  
不覺病三五年後覺酒止從左邊下瀉有聲  
脇痛飲食減十數日必嘔數升酸水暑月止是  
右體有汗熱常潤左邊痛處絕燥遍訪名醫

及海上方服之少驗間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石其利如犀牛角遂太戰備嘗之矣予揣度之已成癰囊如潦水之有科臼不盈不行必盈科而行也清者可行濁者依前停蓄盖下無路以出之也是以積之五七日必嘔而出稍寬數日復作脾土惡溫而水則流濕莫若燥脾以勝溫崇土以填科臼則疾當去矣于是悉屏諸藥止服蒼朮三月而除自此後不復發嘔胸膈寬飲啖如故暑月汗周體而身

涼飲亦從中下前此飲漬其肝目亦多眩眩其後燈下能書細字皆蒼朮之力也故名其方曰神木丸其蒼朮一觔去皮切末用之白芝麻半兩水二盞研濾取汁大棗十五枚煮爛去皮核研以蘇杵成稀膏和入搜白杵熟丸如梧子大每百粒心白湯吞五七十九一百服二三十次忌桃李雀鵠初服時膈間必微燥且以蒼朮製之覺燥甚耳進山枝子散一服久之自不燥也子服半年以後止用燥烈味極辛者削去皮不浸

極有力亦自然不燥山梔散用山梔一味乾之為末沸湯點服故知久坐不可伏向一邊時宜運動亦調息之法

脈經云胃脉虛主胃中冷苦吞酸頭痛寸口脉遲上焦有寒心痛嘔酸吐酸水宜服附子湯生姜湯茱萸丸關脉沉心下有冷氣痞滿吞酸者據此亦有胃冷吞酸者

張子和治張風村一甲叟嘔酸水十餘年乃留飲証也醫皆以燥劑治之不効更以艾火燔針刺

之中脘脅脇瘡未嘗合予以苦劑越之出其涎如膠者二三升談笑而愈

意腐啜酸或每晨吐酸水數口或膈間常如酸漬皆飲食傷胃所致平胃散加神曲麥芽半夏  
茯苓芩滑石半夏不宜純用涼藥亦有胃寒而然者理中湯主之食薺有痰二陳加南星黃芩香附之類治酸必用吳茱萸者乃順其性而折之戴元禮云湿熱在胃口上飲食入胃被濕熱薺遏

其食不得傳化故作酸也如穀肉在器則易也

○治寒酸溫胃之劑

東垣藿香安胃散

治脾胃虛弱不進飲食嘔吐

不待腐熟

藿香

丁香

人參各半陳皮五錢

右為末每服二錢生姜湯下

加減二陳湯

治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因

食生冷脾胃不和

丁香一半夏

陳皮各五錢

茯苓三兩甘草半兩

每服五六錢入生姜煎服

三因麵木丸

治中脘宿食留飲酸黃心痛口吐

清水 神麴炒三蒼朮米泔浸三宿洗淨陳皮  
一方有砂仁兩右為末生姜汁打神麴糊為  
丸姜湯下

加味平胃散 治吞酸食鬱所致

平胃散 加炒神麴麥芽姜茱煎服

治吞酸因傷冷物所致 治食後吐酸水同

乾姜炒二吳茱萸炒二為末酒服方寸七十二服

治噫酢咽方 吳茱萸半斤生姜三人參二束板十二

水六升煮二升分三次食前服

治吐酸清水方

蒼术陳臂土炒白朮 茯苓 滑石

陳皮各等分

水煎服

聖惠方乾姜丸

治酒癖停飲吐酸水

乾姜 葛根 枳殼 橘紅 前胡

錢各五白朮

半夏麵各一兩

吳茱萸

甘草各二錢半

三生丸

治中風痰涎眩暝嘔吐酸水頭疼惡心

半夏兩南星

白附子各一兩

右並生為末滴水丸梧子大以生麵裹為衣

陰乾每服十九至二十九生姜湯下

○治熱之劑

丹溪方

一方加炒山梔仁三錢

吳茱萸去枝梗

陳皮

黃芩

陳皮炒各五錢

黃連陳皮炒一兩

蒼朮半錢

一方有桔梗茯苓各一

黃連清化丸

黃連兩吳茱萸一錢桃仁廿四枚

陳皮錢半夏半一兩

右並生為末神麴糊丸菉豆大

每服百丸姜湯下

參茱丸 治濕而帶氣者，濕熱甚者用之。為向導。

上可治吞酸，下可治自痢。

六一散料 吳茱萸製一兩 為末飯丸。

丹溪又云：噫氣吞酸，此係食鬱有熱火氣冲上。

黃芩為君，南星半夏陳皮為佐，熟加青黛。

○解表之劑

丹溪治一人，因外感涼氣，與宿食相搏，心下酸咸。

嘔清水後，有紅

青皮

枳殼

紫蘇

木通

甘草各三錢

黃芩

桔梗

錢半人參

麻黃五分

○加姜水煎服

○寬中攻下之劑

透膈湯 治脾胃不和，中脘氣滯，胸膈滿悶，噎塞，不通。噫氣吞酸，脇肋刺脹，嘔逆痰涎，飲食不下。

木香 砂仁 檳榔 枳殼 厚朴 白荳仁

半夏

青皮

陳皮

甘草

大黃

朴硝

各等分，每服一兩，生姜三片，棗一枚，煎至一盞熱服。

○痰飲膠固稠粘者，痰也。清而稀薄者，飲也。

痰飲為病所感不同有因氣脉鬱塞而得之者有  
因脾胃虛弱不能運行水穀而得之者有因痛  
飲飽食停滯胃中而得之者有因風寒暑濕之  
氣入脾相搏而成之者有因七情失節藏氣不  
行鬱而成之者所感不同病變甚多或為喘為  
欬為嘔為泄眩暈嘈煩悸忪惺惻寒熱疼痛腫  
滿癰癖瘡閉痞膈如風如癲皆痰飲之所致也  
飲有六曰懸飲溢飲支飲痰飲留飲伏飲懸飲  
者飲水流于脇咳嗽引痛溢飲者飲水流于四

肢當汗不汗身體疼重支飲效逆倚息短氣不  
得卧其形如腫痰飲者其人素盛今瘦腸間漉  
漉有聲留飲者其人背寒如手大或短氣而渴  
四肢歷節痛肠下痛引缺盆效數則轉甚休飲  
者膈滿喘欬嘔吐發寒熱腰背痛目疾出其  
人振振惡寒身瞞悶

東垣謂痰飲皆溫熱相乘如溫在心經為熱痰結  
而為膠其色紅溫在肝經為風痰其色青如沫  
湿在脾經為濕痰溫久為熱其色黃湿在肺經

為氣痰，其色白，咯出如米粒，湿在腎經，為寒痰，其色如唾。

王隱君云：痰清白者，為寒；黃濁者，為熱；熱鬱之甚，或至帶血。血敗則黑口，吐白血者，不治；白血者，桃花色也。

子和云：入肺，則多嗽；入大腸，則為泄；入腎，則為溺；水水在上，則面浮；在下，則胘腫；在中，則為痞膈，痰迷。

人之停飲，留于胃脘，皆由胃氣虛弱，飲水飲酒不

能傳化，結為痰飲，行疾而滯滯，有聲者，自有癰囊在胃內，飲水則滲入，停蓄于其間，其狀若胞囊，不可速去，然亦不能為速害。若見變証百端，在上焦，須以瓜蒂散吐之；在胃脘，宜十東湯下之；然後以溫藥溫胃氣，丁香茯苓半夏以蕩散水飲，仍宜丁香半夏湯以拔其根。

熱痰則多煩熱，風痰多成癱瘓奇症，冷痰多成骨痺，濕痰多成倦怠軟弱，驚痰多成心痛癲疾，飲痰多成脹痛臂痛，食積痰多成癥塊，痞滿。

或心下如停水雪，心氣冷痛，或脊上每日一條如線之冷起，或渾身習習如車行，或胷腹間如有二氣之交紐，又或如烟火衝頭目，烘熱或風毒脚氣，或嘔冷涎綠水黑汁甚為癆瘵肺癰腸毒種種不一，皆痰飲之所為也。

嚴氏云：人之氣道貴乎順，順則津液流通，決無痰飲之患。自潤下從小便中出矣。又有病人元有痰積，其氣因痰而結滯者，則又必先逐去痰結，滯氣自行，豈可執一

王隱君云：津液既凝為痰，不復周潤，三焦故口燥咽乾，大使祕，面如枯骨，毛髮焦槁。婦人則因此月水不通。若能逐去敗痰，自然服藥有効。脾土上應于天，亦屬溫化，所以水穀津液不行，即停聚而為痰飲。夫人之病，痰火者十居八九。老人不宜速降其火，虛人不宜盡去其痰，攻之太甚，則病轉劇而致危殆，須以固元氣為本。有病喜吐痰喫服八味丸，而作効者，叔和云：腎寒多睡，蓋腎為水之官，腎能攝水，腎氣溫和，則水

液潤下，腎氣虛寒，則邪水溢上，故用八味丸以溫利之。

活人書云：中脫有痰，亦令人增寒發熱，惡風自汗。胸膈痞滿，有類傷寒，但頭不痛，項不強，為異。丹溪云：風痰多見奇症。凡風痰病，必用風痰藥。白附子、天麻、雄黃、牛黃、僵蚕、阜角之類。濕痰多見倦怠軟弱，濕痰宜用蒼白二术，又用油炒半夏。熱痰多挾風，外症為多，用青黛、黃連、天花粉、大快膈上熱痰。痰因火盛逆上者，治

死為先。白术、黃芩、石膏之類。中氣不足，加參术。食積殘神，麵來羹山查，欲吐食積痰，用蘿蔔子，油炒為末，漿水調下，探而呴之。食積痰必用攻。若氣虛者，用補氣藥送。老痰海石半夏、瓜萎香附五倍子佐他藥大治。頑痰、鬱痰、僵蚕杏仁、瓜萎、阿子貝母五倍子。痰而脾虛者，清中氣二陳湯加白术之類，煎用升提藥。內傷挾痰，必用參木芪之類，多用薑汁傳送，或加半夏之類，虛甚加竹瀝。眩運嘈雜，乃火動其

痰用二陳湯加桔子芩連之類，噫氣吞酸此  
係食鬱有熱火氣上動以黃芩為君，南星半夏  
橘紅為臣，熱多加青黛，喉中如有物咯不出咽  
不下此老痰也重者吐之用瓜蒂散氣實用荆  
瀝仲景飴半升  
姜、洽、之、神、驗 痰結核在咽喉中燥不能出  
入化痰藥內加鹹藥軟堅之味瓜萎仁杏仁海  
石桔梗連翹少佐以硝薑蜜丸噙化凡  
人身上中下有塊是痰問其平日好食何物，吐  
下後方用藥，痰之為物隨氣升降無處不到

痰在腸胃間可下而愈，痰在經絡中非吐  
不可，出肺中就有發散意，痰在膈上必用吐之，  
瀉亦不出。痰膠固及脉浮者俱用吐法，痰  
在膀胱非白芥子不能達。痰在皮裏膜外以  
姜汁竹瀝導之。痰在四肢非竹瀝不能開。  
二陳湯善治一身之痰，如在下加引藥在上  
加上引藥潤下丸降痰最妙。青礞石丸重  
在風化硝。小胃丹能逐胃，胃痰積然不宜多  
服荅 荸朮治痰飲成窠囊者極効。海粉能治

熱痰降溫痰軟結痰消頑痰最妙可入丸子不可入煎藥枳實瀉痰能衝牆歸竹瀉能治膈間有痰或癲狂或健忘或風痰最妙又能養血荆瀉治痰稍重用此二味効速且穩當子瀝治痰結在皮裏膜外及經絡必佐以姜汁華汁治血滯不行中焦有飲取自然汁冷飮三四盞以覺胸中煩躁不寧後自愈氣實熱痰吐難得出或成塊或吐咯不出及兼氣鬱者難治中焦有痰胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡

則虛矣凡治痰用利藥過多致脾氣下虛則痰反易生而多矣

舟溪云痰之為病方論少有細述者近惟三因醫言亦無加減法夫痰之源不一有因痰而生熱者有因熱而生痰者有因氣而生者有因風而生者有因驚而生者有積飲而生者有多食而成者有因暑而生者有傷冷物而成者有脾虛而成者有飲酒而成者其為病也驚痰則成心包痛顛疾熱痰則煩躁頭風爛眼燥結怔忡懊

懷驚眩，風痰成癰，瘡大風眩暈，風悶亂飲痰。  
成脇痛，四肢不舉。每日嘔吐，食痰成癰，痢口出  
臭氣，冷痰骨痺，四肢不舉。氣刺痛，酒痰飲酒不  
消。但得酒，次日又吐。脾虛生痰，食不美，反胃嘔  
吐，氣痰攻注走刺不定。婦人于驚痰最多，蓋因  
產內交接，月事方行，其驚因虛而入，結成塊者，  
為驚痰，必有一塊在腹，發則如身孕轉動跳躍，  
痛不可忍。凡人手臂或動不得，或骨節遍身痛，  
坐卧不能，此痰入骨也。有人脚氣久不治，骨

筋痛與腳氣藥不効，此痰病也。凡傷寒病後，  
嘔吐藥不得入，亦因初病，肺中有涎痰也。或因  
下之太早，而遂議其非痰，未為確論。傷寒發  
黃，亦是痰病，蓋因熱搏而成，尤大便秘者，亦是  
痰結。

左右關脉滑大者，膈中，有痰也可，吐之怕，吐者，消  
息下之，凡人每日背上一條如線，而寒起者，宜  
吐下之，凡病百藥不効，其關上脈伏，而大者，痰  
也，用妙應丸加減法，方見走注疼痛即控涎丹

洞虛子論痰之為病成偏頭風成雷頭風成太陽  
頭痛眩運如坐舟車精神恍惚或口眼瞶動或  
眉稜耳輪俱痒或領腮四肢遊風腫硬似疼非  
疼或渾身燥痒搔之則隱疹隨生皮毛烘熱色  
如錦班或齒頰似痒似痛而疼無定所滿口牙  
浮痛痒不一或噯氣吞酸鼻聞焦臭喉間草腥  
氣心煩鼻塞咽嗌不利咯之不出咽之不下或  
因噴嚏而出或因舉動而唾其痰如墨又如破  
絮或如桃膠或如蠟肉或心下如停水鐵閉滯

妨悶喚嘵連聲狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵  
戰或夢入人家四壁圍竄轉得一竇百計得出  
則不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨  
焦氣撲鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨  
淚而寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金  
光數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼  
痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊鼓乍起乍  
止並無常所或不時手痺麻疼狀如風濕或卧  
如芒刺不安或如毛虫所螫或四肢不舉或手

足重滯或眼如姜黃膠粘痒澁開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結或齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞼肉惕惟洞虛子備此疾若述甚詳悉乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐噎塞煩欬有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間湧起凜然毛堅噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍只片時或春秋乍

涼之時多加衣衾亦得暫緩或頃飲冰水而定或痛飲一醉而終不能逐去病根乃得神秘沉香丸方屢獲大効愈入數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之詩曰旣裏翻身甲帶金于今頭戴草堂深相逢二八求斤正硝煅青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸梧子意須斟驅除怪病安心志水鴻雙肩却不任

大黃蒸八黃芩八青礞石一兩硝煅沉香半兩右爲末水丸如梧子大白湯食後空心服

卷之五  
治飲之劑

心下有痰飲胸脇支滿目眩。茯苓桂木甘草湯主之。

茯苓

錢四

桂枝

白术各三

甘草二

水煎服

小便自利短氣有微飲當從小便去之亦前病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也。甘草半夏湯主之。

甘遂

去心麵裹煮令透

半夏十二

枚製芍藥五

甘草一枚

如指大者三枚

如指大

以水二升煮取半升去粗

以蜜半升和

藥汁煎取八合

頓服之

懸飲十枣湯主之

芫花

洗净醋拌經宿炒令黑勿焦

甘遂

同前製大戟

去皮流水煮

大戟一時洗淨日乾

各等分

為末

以水一升五合先煮肥大東十

枚取八合去渣納藥末強盛人五分平旦服

之不下更加五分下後以糜粥調之

溢飲者當發其汗大小青龍湯主之大青龍湯

麻黃

去節六錢

桂枝去皮二錢

甘草二錢

杏仁四枚去皮火

石膏研碎生姜二錢

大東二枚水三碗半煎去粗

溫服取微汗汗多者溫粉撲之

小青龍湯

麻黃去節三錢五味子

半夏各二錢乾姜

甘草炙

細辛

桂枝去皮各三錢

水七碗煮麻

黃至六碗去沫內諸藥煮取二碗

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉  
緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之  
虛者即愈實者三日復發復愈不愈者宜防已

湯去石膏加茯苓芒硝湯主之微利則愈

木防已

石膏各三錢桂枝

人參四錢

水三碗煎二碗溫服

加茯苓四錢

芒硝三錢

去石膏名防已芩硝湯

心下有支飲其人善冒眩澤瀉湯主之

澤瀉五錢白朮二錢水碗半煎一碗溫再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

厚朴三錢大黃六錢枳實五錢水煎溫服

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之

葶藶炒令黃色搗大棗十個先以水三升煮

東至二升去東內葶藶煮取一升頓服

嘔家本渴者為欲解今反不渴心下有支飲哉

也 小半夏湯主之 方在嘔吐門

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已椒蘋黃丸主之

防已 柘目 莖蘆炒大黃各一

右為末蜜丸如梧子大先服一丸日三服稍

增<sub>共</sub>口中有津液渴者加芒硝五錢

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯

主之 方見嘔吐門

假令瘦人臍下有悸<sub>口</sub>涎沫而癲眩此水也五苓

散主之 白术 茯苓 猪苓<sub>各三</sub>澤鴻<sub>一錢</sub>

桂錢右為末白飲服方寸土日三服飲暖水<sub>出愈</sub>  
水氣去後心胸間虛氣滿不能食茯苓飲消痰氣  
能令食 茯苓 人參 白术<sub>各三</sub>陳皮<sub>半錢</sub>  
枳實 生姜<sub>各四</sub>水煎連進三服每一服後如  
人行八九里復進

效逆倚息不得卧小青龍湯主之青龍湯服後多  
唾<sub>半</sub>口燥寸脉沉尺脉微手足厥逆氣從少腹上  
衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰  
股小便難時復冒者與茯苓五味甘草湯主之

茯苓

桂枝

錢四

甘草

錢三

五味子

錢五

作三服

衝氣即降而反更發胸滿者苓甘五味姜辛湯主

乏

茯苓

錢四

五味子

錢五

甘草

乾姜

錢三

細辛

水三鐘煎一鐘日三服

效滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾姜爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲者法當胃胃者必區區者復納半夏以去其

水苓甘五味姜辛夏湯主之

茯苓

五味子

半夏

錢各四

甘草

細辛

干姜

錢二

水煎日三服

水去嘔止其人形腫者加杏仁去之其症應小黃以其人遂癰故不納之若逆而納之者必厥所以然者以其血虛麻黃發其陽故也若面熱如醉此爲胃熱上衝熏其面前方加大黃三錢以利之先渴後嘔爲水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之半夏錢茯苓半錢甘草美片十水煎服

五飲湯治五飲最效

卷之三

七

三

旋覆花

人參

橘紅

枳實

白朮

茯苓

厚朴

製

半夏

梨澤鴻

猪苓

前胡

桂心

白芍藥

甘草

等分

每兩分

二服

姜十片

水

治心腹中脫痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多寒  
口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛  
冷所致其脉沉弦細遲旋覆花湯

細辛

陳皮

桂心

人參

甘草

桔梗

芍藥

半夏

旋覆花

各半兩

赤茯苓

每服四錢姜七片煎去渣溫服

木香半夏丸

治痰涎上湧心胸不利常服消痰

寬膈

半夏

一兩

木香

陳皮

茯苓

姜屑

人參

白附子

草蔻

各五錢

右為末

麯糊丸

食後生姜湯

下

五十九

降痰丸

治三焦氣滯下痰飲消食利膈痞滿效

唾稠粘面熱目赤

支體倦怠不思飲食常服

並

降滯氣消化痰涎

木香

檳榔

青皮

蘇冰散

七

七

陳皮

枳殼

大黃

半夏

京三稜

黑

牛各一右為末麵糊丸食後薑湯下

吐劑

治嘔嗽妙方

砒霜

麵

海螵蛸各一錢

為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服一字用井花水作一呷服良久吐出為度小兒減半忌食熱物凡吐寒痰藜芦爪蒂吐不透者用附子尖炮

爪蒂散

赤小豆

爪蒂炒等

右末香豉丁合

水二盞煮作稀粥去渣取三之一和末一錢頓服之不吐少加得快吐乃止

三聖散

防風

爪蒂

黎蘆去苗及心或一兩或半兩

右為各粗末每服約半兩以盞汁三碗先用二碗前三五沸去蘆汁次入二碗煎至三沸却將原二盞同下一處煎二沸去渣放溫徐徐

服之不必盡劑以吐為度

稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去皮熬綠礬半黎蘆一兩久用之

白礬半

右為末每服一錢溫水下

○治溫和中之劑

枳木湯 枳實半白木二兩 水煎作三服

桔梗半夏湯 桔梗

半夏

陳皮

生姜

水煎服

導痰湯 治一切痰涎壅盛胞膈留飲痞塞不通

二陳湯 加枳實南星改白茯苓用赤茯苓

此方加桔梗一兩木香一兩沉香半兩名二香

導痰湯 又方無二香加入參瓜蒌仁

神木丸 治痰飲 方在吐酸停飲門

茯苓澤瀉湯 小半夏加茯苓湯並見前

○治風痰之劑

玉壺丸 治痰飲 方在頭痛門

水煮金花丸 治風痰頭眩嘔吐咳嗽

南星 半夏各生用兩 寒水石二白麵三天麻五錢

雄黃一滴水丸菉豆大每服五七十丸日乾煎

漿水沸下藥煮浮為度漉出淡漿水浸另用

姜湯下通聖加半夏亦可服

○熱痰之劑

小陷胸湯 半夏 黃連 瓜萎仁 水煎服

赤水玄珠

卷之三

半夏丸

爪萎仁

半夏  
一兩 製各

姜汁打糊丸

小黃丸

人參

黃芩

南星

半夏

生姜

姜汁糊丸

○寒痰之劑

消飲丸 兼治宿酒停飲胸滿嘔逆目視暎暎腹

中水聲痛不思飲食

白朮

五兩

茯苓

二兩

實

七錢

乾姜

一兩

右末蜜丸

菉豆大

每服溫水

下三十丸

化痰丸

半夏

兩

陳皮

乾姜

白朮各一兩

姜汁糊丸 姜湯下二十九丸

溫中化痰丸 青皮 陳皮 乾姜 良姜  
倍朮丸 治五飲

乾姜

肉桂各半斤

白朮一斤

為末蜜丸

小薑大

每服二三十丸米飲下

丁香半夏丸 檳榔一兩 丁香 半夏各一兩 細辛

乾姜

人參

各半兩

姜汁糊丸

服三十九丸姜湯

姜桂丸 南星 半夏

官桂

各一兩

○理氣之劑

糊丸

菉豆大

姜湯

下五十七十九丸

卷之五  
七  
四七湯 治全六合

半夏五兩 茯苓四兩 蘇葉 厚朴各三兩 姜東煎 三仙丸 南星 半夏各五兩 香附五兩

糊丸姜湯下四十丸

蘇子降氣湯 前胡 厚朴 陳皮 甘草 川歸 桂各二兩 蘇子 半夏各五兩 姜東煎 六合湯 治七情氣鬱結成痰涎狀如破絮或如梅核咯不出 吐不下嘔迷惡心 陳皮 半夏 茯苓 厚朴 香附 紫蘇莖

等分每服四錢生姜三片水煎服

加味化痰丸

人參 白朮 半夏製茯苓

桔梗各二 枳實

香附 前胡

甘草半兩

右為細末用半夏末姜汁糊丸每服五十丸

白姜湯下

二生湯 治胃冷有痰

附子生去皮鹽半夏等分

每服四錢水二盞生姜十片煎至七分溫服

加木香少許尤佳

水玉湯 治眉棱骨痛不可忽此痰厥也

半夏製每服三錢姜十片煎八分食後溫服

又須服溫膽湯

仲景茯苓飲

治胸停水飲吐水氣滿不飲食

白术 茯苓

各一  
半人參七錢陳皮 枳實錢五

每服水二鐘生姜一錢煎七分服

又方

治痰飲吐水無時節者其源以飲冷過度

遂令脾胃氣弱食不消化飲食入胃則皆變冷  
水反吐不停 赤石脂一觔搗篩服方寸匕酒

飲任服稍稍加至三錢七服盡一觔終身不吐

冷水又不下利補五臟令人肥健有入痰飲服  
諸藥不効服此即痊

二賢散 此消痰飲之要藥也

陳皮 甘草

各半

為末每服二錢沸湯下

治一切痰方 陳皮一觔去穰取紅淨外以甘草  
鹽各四兩水五碗慢火煮乾焙為末白湯點服  
清健丸 治一切痰飲

枳實 白术 陳皮 半夏 南星 山楂

各一  
兩

白芥子 黃芩 蒼术 川連 川歸

各半

川連 川歸

砂仁錢各五右為末用神曲五兩為粉取竹瀝二碗姜汁半盞煮糊丸梧子大每服八十九丸白湯送下

竹瀝達痰丸 半夏滾姜湯泡透去皮白茯苓  
去皮二兩陳皮去白二兩大黃乾酒浸透晒二兩白木 黃芩酒炒各一兩  
各二兩甘草炙人參一兩青礞石硝一兩搗碎如金色沉香五錢右為細末用竹瀝一大碗半生姜汁二盞和勻入鍋內火熬一刻許令熟將前藥和搗為稀醬樣磁器盛晒乾仍以竹瀝姜汁如

前法搗勻和晒乾如此三次仍前竹瀝姜汁和丸如小豆大每服一百食遠白米湯下能運痰從太便出不損元氣神妙神妙

半夏利膈丸 治風痰頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心脣脛引痛腹內有聲 半夏湯泡三兩白附子生用二兩天南星生用一兩白术 茯苓去皮一兩白礬 人參去滑石各一兩貝母一兩右為末麵糊丸梧子大每服三十丸食後姜湯下八味丸 治脾虛不得克制腎水多吐痰唾而不

八咳者附子炮去皮臍桂心各一

山茱萸肉山藥

兩

白茯苓澤瀉牡丹皮各三懷熟地黃

兩

右為末蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯葉氏分涎湯治風痰留滯膈間喘滿惡心涎唾

不利

橘紅

人參

桔梗

枳實

半夏

湯洗

七次令軟每個切四片用姜汁浸一夕

天南星去外皮火煨香熟取出各

等分姜十片每服三錢水一盞煎食後服

指迷茯苓丸治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足

不得轉移

半夏二茯苓一枳殼炒五錢風化

水飛一半入藥

硝半錢右為末姜汁麵糊丸梧桐子大每服三十丸姜湯下

辰砂祛痰丸

治酒食過多酸鹹作成瘀飲聚于胸中疑則嘔逆惡心流則臂痛頭

目昏眩腰脚疼痛深則瘓淺則蹶然倒地此藥神功殊砂一兩水飛

一半半夏四兩生姜四兩與半夏陳皮白礬生

荆芥各一為末姜汁糊丸梧桐子大每食後服

五十丸姜湯吞下忌動風動氣物

檳榔散治胸膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔逆杏仁去皮旋覆花梗半夏湯洗

七枚

欖榔 桔梗 姜 芦 白术 乾姜 炮橘 紅各一  
甘草 炙人參各半

吳仙丹百一選方治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩

吳茱萸湯 泡白茯苓各等分

辰砂化痰丸 治風化痰安神定志利咽膈清頭目

白礬枯辰砂飛各五錢

天南星炮

一半夏洗三

右為末以姜汁麵糊丸梧子大辰砂為衣每

服二十丸姜湯下

防風丸 治風痰上攻頭痛恶心項急目眩旋暉  
痰涎壅滯昏憒 天麻酒浸一夜  
甘草 炙川芎各一  
防風各一硃砂五錢 右為末  
每服一錢荆芥湯下

控涎丹一名妙應丸 凡人忽冒背手脚頸項腰  
脛隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐卧不寧時  
時走易不定俗醫不曉謂之走注使用風藥及  
針灸皆無益又疑是風毒結聚欲作癰疽亂治  
亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變疾狀或

金人頭痛不可舉或神思昏倦多睡或飲食無味來唾稠粘夜間喉中如鋸聲口流唾涎手脚重腿冷痺氣不通誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但用是藥不過數服其疾如失

甘遂去心紫大戟去皮真白芥子各一兩

右為末煮糊丸梧子大晒乾臨卧淡姜湯或滾水下五七丸至十九痰猛氣實加丸數不妨其効如神加減法

脚氣加明松脂一錢檳榔木瓜各一兩卷柏半

兩先以鹽水煎半日次日白水煮半日同前藥為丸每服二十丸加至四五十丸再服下惡物立効驚瘧加硃砂全蝎各二錢每用八九丸常與之三五服去盡酒瘧加雄黃全蝎各二錢每服十丸走注腰痛加核桃三箇燒灰每服三十丸加至五十丸溫酒下脚氣走注于前方內加吳茱萸驚氣成塊者加川山甲炒鹽甲燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五十丸加至七十丸以利為度腎痺痛加木鱉子去

穀研一兩桂半兩熟痰加益硝等分每服三

兩丸寒痰加胡椒丁香蝎桂各等分每服二

十五丸

茯苓半夏湯治胃氣虛弱身重有痰恶心欲吐風邪羈絆于脾胃之間當先實脾胃方在嘔門

御愛紫宸湯解宿酒嘔噦惡心痰唾進飲食

木香半兩

檀香俱不

藿香砂仁葛花

茯苓官桂

陳皮乾葛良姜丁香

火不見

炙甘草各二每服四錢水煎不拘時服

柴胡半夏湯治寒症不敢見風眼澁頭痛有痰  
眼黑惡心尤尤欲吐風寒覺皮肉緊手足重難  
舉居煖處有微汗便減如見風即復作名補  
柴胡蒼朮鑠一半夏仁錢茯苓錢神曲炒  
藁本錢一升麻分姜五片水煎食遠服

枇杷葉散

治痰迷此藥溫胃思食

青皮炒

稊草豆蔻各半前胡

枇杷葉

人參

半夏湯泡

茯苓去皮大腹皮

白朮

厚朴粗去

各一兩

皮姜汁炒姜三片每服四錢水煎不拘時熟服

清氣化痰丸 治上焦痰火壅盛或嗽或喘煩熱

口乾胃膈痞悶 天南星兩半夏湯泡黃連

黃芩各五錢芩  
陳皮 枳實麸炒各六兩甘草兩右為末  
桔梗仁去殼杏仁去皮大

糊丸梧子大每服七十丸食後姜湯下

清氣化痰丸 治利胃膈順氣化痰寬中健脾消

導飲食治痰之聖藥也 半夏半夏片南星兩桔梗

黃連 紫蘇子炒蘿蔔子炒枳實橘紅

茯苓 山楂各四兩乾姜生 香附子炒甘草各

黃芩兩二右將南星切作十字塊半夏每箇切作二塊皂莢六兩白礬三兩多用水煎南星半夏皂莢白礬一處浸三宿煮南星透煎度只將南星半夏晒乾同衆藥為末水糊丸梧子大每服七八十九加至百丸食遠或茶清下

○怔忡驚悸門

生生子曰：怔忡者心中惕惕然動不自安也。驚者從外而入或耳聞異聲目擊異物驚而懼也。悸者中心畏怯動而怕驚也。怔忡止于心不自

安悸則心既動而又恐恐然畏惧如人將捕之驚而駭也治怔忡之法惟當益其心血壯其神氣治驚悸則有諸經之証當分別治之

治驚之法內經曰驚者平之平常也使平日常見常聞則何驚之有張子和治衛德新之妻被盜而驚乃以平法治之良愈

黃帝曰足陽明病惡火與火聞木音則惕然而驚鍾鼓不為動聞木音而動何也岐伯曰陽明者胃也胃者土也土惡木故驚也又曰東方青

色入通于肝其病發驚駭脾移熱于肝則為驚駭卧而驚者屬肝卧則血歸于肝今血不靜血不歸肝故驚悸于卧也

仲景曰食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣飲水多必五飲停蓄閉于中脘最使人驚悸

心下悸

痰飲驚悸皆屬於脾土

東垣云六脉俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣盛後而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜氣浮以甘辛溫微苦峻

補其血熟地生地此胡升麻白芍丹皮川芎黃蓍之類以防血溢上竭甘草鎮墜之劑謂丹砂之類

丹溪云怔忡大槩屬血虛與痰有慮便動者屬虛時作時止痰因火動瘦人多是血虛肥人多是痰飲真覺心跳者是血少宜四物安神之類又曰病自驚而得者驚則神不守舍空得液則成痰也血氣入舍則痰拒其神不得歸焉控涎丹加辰砂速志

猪心血丸治勞後心跳大虛症



歸身 白芍 側柏 川芎 鎮五 陳皮 甘草

黃連 銘二 砂一

右用猪心血為丸

溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽囉氣鬱生涎涎與氣搏變生諸症或短氣悸乏或自汗此膽虛不能致脾半夏 橘紅 竹茹 枳實炒各一兩甘草炙一兩

白茯苓半兩每服五錢薑五片枣一枚水一盞

煎七分食前服

仲景平夏麻黃丸治心下悸

半夏

卷之三

卷之三

大飲

服元

真心丸

治驚

卷之三

油用浸黃松  
竹

節龍齒用苗

醋遠  
黃志

右只取瓦砂龍齒等

分為末生

精心血為

卷之三

實大無朋。丸以麥門冬葉裹更火心。白蜜水煎。荳熟為度。臨卧湯下。小兒磨化半丸。量歲數與之。

竈竹僧散及大蛇

治驚氣

入心絡不

能語者

昔有為狼

蜜作僧研極細末茶調下錢七服即愈

4

寒水石散 治因驚心氣不行鬱而生涎結為飲  
遂為大疾 怯悸少遇驚則發尤宜服之  
寒水石 灰滑石 飛生甘草各等為末每服二錢  
熟<sup>サク</sup>則新汲水下怯寒則姜棗湯下<sup>スロア</sup>加龍腦少許丸佳  
定志丸 心氣不足驚悸恐怯  
石菖蒲炒遠志去心茯苓各二 人參一辰砂五錢  
為末蜜丸梧子大每服五十丸米湯下<sup>ス</sup>  
安神鎮心丸 治驚悸消風痰  
石菖蒲 半兩 人參 一錢 辰砂 五錢  
山藥 一錢

石菖蒲

卷之三

川上

山藥

麥門冬

鐵粉

天麻

半夏

南星

茯苓

各一細辛

辰砂

各五錢

右為末

生薑

五兩取汁

入水煮糊

為丸

大另以硃砂為衣

每服二

十五丸夜卧生薑湯下半

茯苓丸

治驚悸

方在癩門

東垣羌活勝溫湯

治

而多驚悸

多驚冒邪

在

少陽厥陰

也加柴胡五分

如淋加澤瀉五分

此下焦風寒二經令病也經曰肝腎之病同丁治

為俱在下焦非風藥行經不可也

羌活

獨活 防風

藁本

各一錢

蔓荆子

三分

川芎

二分

甘草

五分

水

二錢煎服

秦垣硃砂安神丸

治外物所驚宜鎮平之

黃連

半錢

甘草

炙

當歸

生地

各五分

硃砂

一錢

右為細末浸蒸餅為丸黍米大硃砂為衣每服十五丸食後津唾嚥下一方當歸地黃各一錢

心澹澹動

綱目云澹澹因痰動也心澹澹動者謂不怕驚而心自動也驚恐亦曰心中澹澹恐謂怕驚而心

亦動也

其澹澹自動之病屬二經一屬厥陰心主經曰心主手厥陰之脉是動則病心中澹澹大動而赤目黃喜笑不休視盛虛寒熱陷下取之是刺灸之法也又曰太陽司夫寒淫所勝病心澹澹大動胸脇胃脘不安治以甘熱是運氣之寒傷心主也其二屬少陽病經云一陽發病少氣善歎善噫其傳為心掣是也

●怒

怒在陰陽為陰退而不得伸也經云陰出之陽則怒又云血并于上氣并于下心煩冤善怒東垣云多怒者風熱陷下于地是也

怒屬肝膽經云在臟為肝在志為怒又云肝藏血血有餘則怒又云膽為怒

丹溪治怒方 香附末六兩 甘草末一兩  
右和勻每服五錢白湯調下

運氣怒皆屬木太過內經曰陽氣者太怒則形氣絕而血菀于上使人薄厥又云暴怒傷陽怒則

氣逆甚則嘔血及食泄是也

生生子曰面青善怒亦是肝氣太過當益肺金以制之毋徒平木此五行勝復之理用藥之法亦當要識此意不然必不能杜根也

○善太息

運氣善太息皆屬燥邪傷膽經云陽明在泉燥淫所勝病善太息又云陽明之勝太息嘔苦又云少陰司天地乃燥淒愴數至脇痛善太息是也內經善太息皆取心膽二經岐伯曰思憂則心系

急心系急則氣道約約則不利故太息以出之又曰膽病者善太息口苦嘔宿汗視足少陽脉之陷下者灸之

徐仲子士偉曰家君肄業過勞瘍星累此志堅不懈吐衄盈盆虛羸骨立夜卧含睫則夢爭鬪轉聞轉負恐畏之態無可名狀呼號之聲轟然若雷而不能騰出于口家人侍睡者莫不縮首伸舌如是者十年所矣每五七夜必一發過勞則連發疾尤猛歷訪師友多作心血不足治惟補

心安神補心安神藥投之漠如也終莫識為何  
症，捫心苦思思每達且更幾寒暑矣。一日偶觀  
素問藏氣法時篇論有曰：肝病令人善怒虛則  
目睭眇無所見耳無所聞善恐如人將捕之恍  
然警悟乃知為魂遊症也。何言之夫夜卧屬氣  
于肝，肝主藏血，藏者作文既苦，衄血過度則  
魂失養，惟是交睫若魘則夢，爭闘肝虛則膽怯，  
故多負多恐也。非峻補不奏功，又思草木之劑  
不堪任重，乃以鹿角膠三錢，侵晨酒溶服五日

而睡卧安，半月而肌肉生，一月而神氣完，始能  
出戶，厥後每見血症虛憊者，崩中眩暉者，投前  
劑莫不响应。夫人徒知鹿角膠補虛之功，勝于  
參蓍而不知鹿角膠可以峻補肝血，蓋血盛而  
寃自安也。

○恐

生生子曰：恐與驚悸相似，實非驚悸也。張子和云：  
驚者為自不知，恐者為自知故也。蓋驚者聞聲即驚，恐者心中恍恍然自知，如入井捕之狀，及

不能獨自坐卧必須人為伴侶方不恐惧或夜必用燈照無燈燭亦恐懼者是也

臟腑恐有四

一曰腎經云在臟為腎在志為恐又云精氣并于腎則恐是也

二曰肝膽經云肝藏血不足則恐戴人曰膽者敢也驚怕則膽傷矣蓋肝膽實則怒而勇敢肝膽虛則善怒而不敢也

三曰胃經云胃為恐

四曰心經云心怵惕思慮則傷神傷神則恐惧生周本心年六十歲形氣俱實因大恐正月間染病心不自安如人將捕之狀夜卧亦不安兩年後欲飲以人參白朮當歸身為君陳皮為佐加鹽炒黃柏炙玄參各少許煎服月餘而安  
經云恐傷腎丹溪用鹽炒黃柏炙玄參引參歸等藥入補腎足少陰絡也

治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕之狀頭目痛人參 枳殼 桂心 甘菊 妙神 五味子山茱萸 木枸杞子各三柏子仁 熟地黃各一

右為末每服二錢溫酒調服

治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中悶

茯神一枳殼半遠志防風細辛白朮

人參前胡桂心甘菊熟地黃各三分

右為末每服三錢水一盞姜三片煎六分溫

服不拘老幼皆可服

治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩冒五色所障夢見

被人爭訟恐懼面色變者補膽防風湯

防風錢細辛川芎茯苓甘草獨活

前胡八人參七束二枚水煎食前服  
運氣善恐皆屬肝木虛經云木不及曰委和委和之紀其病湍動注恐是也

生生子曰經云恐傷腎予在苕見丁友人與一女子私合正值陽敗之際為人驚破恐惧走歸精流不止而斃又觀六十家小說載一女子與一少年亦如上故事特揭附此以為好色傷生者之戒

○善悲

內經云在臟為肺在志為悲又云精氣并于肺則悲是也肺虛不補母仲景云婦人臟躁喜悲傷欲哭象如鬼神所附數欠伸甘麥大棗湯主之

甘草

兩

小麥升

大棗

水六升煮

三升分

三服

脾氣亦補

許學士治一婦人數次無故悲泣不正或謂之有祟祈禳請禱備至終不應予忽憶金櫃有一硯云婦人臟躁悲傷欲哭象如鬼神靈數欠伸者宜甘麥大棗湯子急令治藥盡劑而愈古人識

病制方種、絕妙如此

運氣云悲證皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明休明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天寒氣下臨心氣上從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也

姪娠善悲

綱目述管先生治一姪娠四五箇月臟躁悲傷遇晝則慘感淚下數欠象若神靈如有所憑醫與

巫皆無益與神景大東湯一名投而愈

大宮詹少溪吳馭閼校

終

