


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JAPAN



赤水珠

十四




中武
門
516
卷

赤水玄珠第十四卷目錄

鬱證門
瘻證門
脚氣門
白濁門

赤水玄珠第十四卷

新安生生子孫一奎著輯



○鬱證門

鬱脉多沉伏鬱在上則見于寸鬱在中則見于關
鬱在下則見于尺左右皆然○鬱脉或促或結
或澁滑伯仁云氣血食積痰飲一有留滯于其
間則脉必因之而止澁矣但當求其有神所謂
神者胃氣也夫鬱者結滯而不通暢之謂當升
而不得升當降而不得降當變化而不得變化

所以為鬱氣血冲和百病不生。一有怫鬱諸病
生焉。丹溪云：病之屬鬱者十常八九，但病有因，
別藏所乘而為鬱者有之，不因別藏所乘而本氣
自鬱者此五鬱也。又有氣鬱、血鬱、痰鬱、鬱食鬱火
鬱濕鬱六者此六鬱也。蒼朮香附子川芎總解
諸鬱故製越鞠丸通治之隨証加入諸藥按蒼
朮氣味雄壯辛烈開發水穀之氣乃足陽明太
陰之藥香附子下氣最速乃陰血中快氣之藥
一升一降足以解散其鬱川芎直達三焦俾生

發之氣上行頭目下行血海通陰陽氣血之使
也。况蒼朮尤能徑入諸經陳泄陽明之溫故諸
鬱用之多効。

王汝言云：丹溪治病不出乎氣血痰三者，故用藥
之要有三氣用，四君子湯血用四物湯痰用二
陳湯。外病屬鬱故立治鬱之方曰越鞠丸，蓋氣
血痰三病多有兼鬱者，或悞藥雜亂而成鬱，故
用三方治病時以鬱法參之。氣病兼鬱用四君
子加開鬱藥血病瘀病亦然。

五臟本氣自鬱証心鬱者神氣昏昧心胸微悶主事健忘治宜肉桂黃連石菖蒲肝鬱者兩脇微膨愛氣連連有聲治宜青皮川芎吳茱萸脾鬱者中脘微滿生涎少食四肢無力治宜陳皮半夏蒼术肺鬱者皮毛燥而不潤欲嗽而無痰治宜桔梗麻黃豆豉腎鬱者小腹微硬精髓乏少或濁或淋不能久立治宜肉桂茯苓小茴香又有膽鬱者口苦身微潮熱往来惕惕然如人將捕之治宜柴胡竹茹乾姜

氣鬱者其狀胸滿脇痛脉沉而澀宜二陳湯加蒼术川芎香附子或分心氣飲木香分氣飲七氣湯之類血鬱者其狀四肢無力能食便血脉沉澀而芤宜四物湯加桃仁紅花川芎牡丹皮香附子或越鞠丸瘀鬱者其狀動則喘寸口脉沉而滑宜二陳湯加南星海石枳殼香附子瓜蒌仁或化瘀丸食鬱者其狀嗳酸胸滿腹脹不能食或嘔酸水惡聞食氣宜二陳湯加蒼术神曲麥芽山楂香附子或保和丸火鬱者其狀瞀悶

赤瀉方
小使赤瀉脉沉而數骨髓中熱肌痺熱捫之烙手宜二陳湯加黃連青黛貝母香附子川芎蒼朮山梔子或火鬱湯濕鬱者其狀周身腫痛或關節痛陰雨則發身重頭重痛脈沉而細宜白芷二木梔芩川芎香附子或升陽除濕湯

又有素虛之人一旦事不如意頭目眩暈精神短少筋痿氣急有似虛證先當開鬱順氣其病自愈宜交感丹不効用歸脾湯

分心氣飲 木通 青皮 半夏 陳皮 茯苓

甘草

桂桑白皮

大腹皮

羌活

紫蘇

生姜

燈草

大棗

水煎服

交感丹

香附子

童便浸七日

晒乾醋炒黃一斤

茯神去皮心人乳浸日晒

嚼一丸

開鬱湯

香附子

蒼朮

川芎

貝母 神曲

山梔子

陳皮

半夏

茯苓

甘草

生姜水煎服

氣加木香枳殼枳榔紫蘇

血加桃仁紅花牡丹皮

痰加南星

食加

山楂麥芽砂仁 熟加黃連黃芩柴胡 湿

加羌活倍蒼术

嚴用和云人之氣道貴乎順順則百脉流通
氣鬱者胸腹痛脉沉澁○濕鬱者周身走疼或關
節痛遇陰寒則發脉沉細○痰鬱者動則喘咳
寸口脉沉滑○熱鬱者脅悶小便赤脉沉數○
血鬱者四肢無力能食便紅脉沉數○食鬱者
嗳酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊盛
蒼术撫芎搗解諸鬱隨症加入諸藥凡鬱皆在中

焦以蒼术撫芎開提其氣以升之假如食在氣
上提其氣則食自降餘倣此

氣鬱

香附童便 蒼术米泔 撫芎

溫鬱

白芷 蒼术 川芎 茴苓

痰鬱

海石 香附 南星姜製 瓜萎

熱鬱

山梔炒 青黛 香附 蒼术 撫芎

血鬱

桃仁去皮 紅花 青黛 川芎 香附

食鬱

蒼术 香附 山楂 神曲 鈎砂醋製

春加川芎 夏加苦參 秋冬加吳茱萸

越鞠丸又名芎藭丸

總解諸鬱

蒼朮 香附 撫芎

神曲 槐子炒

為末滴水為丸，菉豆大

○ 瘦證門 瘦

瘦謂瘦弱無力以運動

帝曰五臟使人痩何也岐伯曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨骼故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生瘦蹙也王注肺熱則腎受熱氣故足痺蹙不得伸以行也心氣熱則下脉厥而上上則下脉虛虛則生脉瘦樞折

挈脛縱而不任地也肝氣熱則膽泄口告筋膜乾則筋急而牽發為筋痠脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痠腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿曰何以得之曰肺者臟之長也為心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦肺藏氣志若不利則氣鬱氣鬱不利故喘息有聲而肺熱葉焦故曰五臟因肺熱葉焦發為瘦蹙此之謂也悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰本病古經萬名也大經大經脉也以

經空虛發為肌痺傳為脉痺思想無窮所願不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫也故下經曰筋痿者生于肝使內也經下古稱名使內謂勞役筋內費竭精氣也此則謂害肉也有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣所留居處相濕肌肉濡漬痺而不仁發為肉痺故下經曰肉痺者得之湿地也地之濕氣感則害人皮肉筋脉內伐謂伐腹中之陰氣也此則謂內伐則熟舍於腎腎者水臟也

今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者生于太熱也曰何以別之曰肺熱者色白而毛敗心熱者色赤而絡脉溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉濡動腎熱者色黑而齒槁曰如夫子言可矣論言治痿者獨取陽明何也曰陽明五臟六腑之海主閨宗筋宗筋主束膏而利機關也宗筋謂陰毛脣兩側之堅筋也上絡胞膈下貫髓尻又經于背腹頭項故云宗筋主束骨利機關然腰者腎之大關節所司衝脉者經脉之海也屈伸故曰機關屈伸之海

主滲灌谿谷與陽明合于宗筋陰陽總宗筋之會會于氣街而陽明為之長皆属于帶脉而絡于督脈故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也曰治之柰何曰各補其榮而通其輸調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月則病已矣時受月謂受氣時月如肝王甲子之心王丙子之類也痿論

素問帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆稟氣于胃而不得至經必因于脾乃得稟也今脾病不能為胃行其津液四肢不得稟水穀氣

氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉曰脾與胃以膜相連耳而能為之行其津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脉貫胃屬脾絡嗌故太陰為之行氣于三陰手足三陽之經也陽者表也五臟六腑之海也亦為之行氣于三陽手足三陽臟腑各因其經而受氣于陽明故為胃行其津液四肢不得稟水穀氣以益衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉太陰陽明劉河間曰四肢不舉俗曰癱緩故經所謂

脾太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜
阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏粱之疾其治則渴令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則脾陷卑下也陷坑也故脾病四肢不舉四肢皆稟氣于胃而不能至經必因于脾乃能受稟今脾病不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可十全散

加減四物去邪留正

脾實病痿○經云脾病者肉痿足不收又云脾脉太過則令人四肢不舉又云其犯兩溫之地則

為痿者是也夫所謂實謂太過者皆

今採補通榮俞穴法于左

肺熱葉焦則肺喘鳴生瘡疕色白而毛敗者補其榮魚際通其俞大淵至秋病已心熱生脉痿數溲血樞不相提挈脛縱不能任用於地色赤而絡脉溢者補其榮勞宮通其

俞太陵至夏病已

肝熟生筋痿下白澀口苦筋急攣色蒼而爪枯者

補其榮行間通其俞太衝至春病已

腎熟生骨痿足不任身腰脊不舉骨枯髓減色黑而齒槁者

補其榮然谷通其俞太溪至冬

病已

脾熟生肉痿乾渴肌肉不仁色黃而瞞動者

補其榮太都通其俞太白至長夏病已

又痿躄足不收取之少陽陽明之別

經云足少

陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰虛則痿
蹠坐不能起取之所別也又云淫滌胜痿不能久立治少陽之維在外踝上五寸又云足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其病虛則足不收脛枯取之所別者是也

骨痿懈惰取足少陰髓海經云少氣身潔潔也言吸吸也骨痿懈惰不能動補足少陰又云腦為髓之海其俞上在于其蓋下在風腑髓海不足則腦轉耳鳴脛痿懈怠安卧審其俞而調其

虛實者是也百節弛縱取脾手太陽之絡經云
脾之太絡名曰大包出淵腋下腋三寸布胸脇
虛則百節盡皆縱此脉若羅絡之血者取之脾
之太絡也又云手太陽之別名曰支正上腕五
寸實則節弛肘廢取之所別者是也

甲乙經曰瘻不相知太白主之云耳重骨足下
緩失履衝陽主之足緩不收瘻不能行不能言
手足瘻蹙不能行地倉主之

腎脉微滑為骨痿坐不能起起則目無所見

陳無擇曰人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成
其形內則有肝心脾肺腎以主之若隨情妄用
喜怒勞佚致內藏精血虛耗使皮血筋骨肉痿
弱無力以運動故致瘻蹙狀與柔風脚氣相類
柔風脚氣皆外因瘻則內臟不足所致也

論治瘻獨取陽明之旨

生生子曰內經治瘻獨取陽明之法乃治瘻之大
槩也原其病皆自肺中來在於方萌之時故獨
治陽明使宗筋閏能束骨而利機關之意是證

其源而流自清之謂也設五痿之疾既痼而陽明虛宗筋縱帶脉不引足痿不用之時而獨治陽明斯亦晚矣當即其五痿之所主者而參治之庶得以盡其用也按內經陽明虛帶脉不引之後帝曰治之柰何岐伯曰各補其榮而通其輸調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月則病已矣此雖兼針刺而言實治痿之綱領也

林氏曰考之內經皮肉肌骨脉五痿分屬五臟如

無擇所云者似又當分治之可也治陽明之法只可治脾胃若失肝之筋痿心之脉痿腎之骨痿其受病又自不同豈可只取陽明而治之乎故治筋痿宜養其肝脉痿宜益其心骨痿宜滋其腎不可執一而論也經亦曰各補其榮而通其輸調其虛實云云此可以見治法之不專于陽明也

東垣清燥湯治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生化之源源絕則腎涸痿厥之病大

作腰以下痠軟癱瘓不能運動方在暑門注夏類

健步丸 治膝中無力屈伸不得腰背腿脚沉重

行步艱難

羌活 紫胡 滑石 甘草炙防風 瓜萎根

酒洗各五分 潤瀉三 酒防已 川烏 酒苦參各一錢

肉桂五分 右為末酒糊丸桐子大每服七十丸

空心煎愈風湯送下愈風湯方在中風門

三因加味四斤丸 治肝腎虛弱熱滯于內致筋骨痿弱不能勝持

○蕤蓉金浸鹿茸酒切酥炙五味

子酒洗兔絲子酒煮透熟地黃牛膝 木瓜
天麻各二兩 右為末煉蜜丸桐子大溫酒或米飲
下五十丸劉宗厚曰按此熱滯于內而用溫補何也然陰血衰弱血不養筋筋緩不能自持陽燥熱滯于內故用此養陽滋陰陰實則水升火降矣

藿香養胃湯 胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虛宗筋失養之故也

藿香 人參 茯苓各二錢 白朮二半夏曲 苍朮

仁山藥各八草澄茄 砂仁 神曲 曲陳皮

各六 甘草炙四

分 姜三片枣二枚水煎服

大防風湯 氣血兩虛風濕相挾麻痺痿弱或久病癆後脚弱緩痛不能行履或兩脚腫痛足腫枯腊名鶴膝風症其効如神

川歸 熟地 白芍 杜仲

姜炒汁

黃芪 白朮

各一 錢一人參 防風 川芎 牛膝

各七分

羌活

附子 甘草炙各四分

姜三片枣二枚水煎服

鹿角膠丸

治血氣虛弱兩足痿軟久臥床褥神

效常服補腎益精壯筋骨

鹿角膠一斤鹿角霜 熟地黃各半當帰

四兩牛膝

兔系子 人參 茯苓 白朮 杜仲

製各二兩龜

板酥虎脰骨

酥炙各一兩半

右為末將鹿角膠用無灰

酒熔化為丸桐子大每服百丸空心淡鹽湯送

丹溪云有湿熱有痰有血虛有氣弱亦有死血者
有食積妨碍不降者上文論痰起于肺熱實瘡此云然者蓋以其發而為病所因所挾或有不同而主治亦各當著其所重也

東垣取黃柏蒼术為下部要藥丹溪即此意以治

痙攣痛風取効甚多。

濕熱 東垣健步丸加燥濕降火之劑黃柏黃芩

蒼朮○濕痰 二陳湯加蒼白朮黃芩黃柏之

類入竹瀝姜汁

血虛 四物加蒼朮黃柏下補陰丸

氣虛

四君子湯加蒼朮黃芩黃柏

已上方一法雖所主有不同而降火清氣

金所謂治法之大要而無不同也

虎潛丸 補腎丸皆治骨瘦之劑也○肉瘦當以

清燥湯治之

五加皮酒 治筋痠拘攣疼痛不便屈伸

五加皮半斤蒼耳子 大 枸杞子 茯仁 各四

生地

黃柏二兩木香五錢

以好酒一升

太 塏

將藥用囊盛懸

埕中浸七日取出焙乾為末

煉蜜丸桐子大空

心酒吞八十九丸其酒聽飲但常使酒氣頻相

接為妙

大生脉湯 治心熱脉痠脹縱不任地

人參 麥冬 五味子 天冬 黃柏 川歸

牛膝 紅花 柏子仁 生地 水煎服

有

汗加黃芪

王啟玄傳玄珠赤苗丹三方序曰張長沙戒人妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝尅流變則真病生焉猶憫苗不長而揠之者也若稟血不強令服此而不服是不耘苗者也故名赤苗丹丹養五臟補不足秘固真元均調二氣和暢赤衛保神守中五味子半巴戟去遠志去枸杞子山藥茯苓肉荳蔻酒浸百部宿酒浸一杜仲炒蛇床子柏子仁菟絲子酒浸另研防風

各二右為朱蜜丸桐子大食前溫酒鹽湯任下
三十丸春乾東湯下夏加五味子四兩
秋加枸杞子六兩四季月加肉荳蔻六兩
衛生湯補虛勞強五臟除煩熱養真元退邪熱
順血脉○黃芪八兩當帰白芍各四甘草各一
年老加酒半盞同水煎
何首烏酒治骨軟風腰膝痛行匱不得遍身搔
痒何首烏大而有花者同牛膝各一斤以好酒
一升浸七宿焙乾于木臼搗末蜜丸每日空心

食前酒下三五十九

蕭炳丹參酒方 治風軟脚弱可逐奔馬故曰奔
馬草驅効 丹參不拘多少酒浸服下
本事治筋骨諸疾手足不遂行動不得遍身風瘡
左經丸 草烏白大者去皮睛木鱉壳去白膠香 五靈
脂各二兩半班猫足翅醋炒 右為末用黑豆去皮
生為末一升醋糊同前藥共和勻為丸鷄豆子
大每服一丸溫酒磨下○治筋骨疾但未曾
經針傷損者三五服立効 此藥曾醫一人

軟風不能行不十日見功 專治心腎肝三
經通小便除淋瀝通常衛活經絡 此方因
淨聖寺僧得之大有奇功所治乃溫瘡
酒血為病
又方 治丈夫酒色過度下焦虛憊足膝軟之
便滑數外腎溫痒 五味子酒浸透
研炒 兔系子酒浸透
山藥 石蓮肉 齒香各二兩 白茯苓一兩 右糊丸
梧子大每五十克 温酒或鹽湯下空心服如
脚氣及膝無力者木瓜酒空心下六十丸下
午再服妙

龍虎丹 治癆

瑣陽七錢敗龜板 虎骨 黃柏俱酒 乾姜一錢
半金箔十片神曲 如懶言語 加山藥七錢
右梗米粉糊為丸空心白湯吞下

丹溪補益丸 治癆

白术二兩 龜板 瑣陽各酒 生地 歸身 牛膝
白芍各一兩 酒浸俱陳皮 乾姜各七錢半 黃柏炒酒 虎骨酒
茯苓各五錢 五味子二錢 甘草各一錢 兔絲子酒蒸研入
餘藥未晒乾 右以新鮮紫河車為丸如無紫河車用

猪骨髓為丸亦可

神龜滋陰丸 治足癆

龜板酒炙 黃柏 知母各酒炒 枸杞子 五味子
瑣陽各一兩 乾姜半兩 煉蜜丸 梧子 大牢心 益湯
下七十丸 與龍虎丹相兼服妙

丹溪治痢後脚弱漸細

蒼朮一兩 白芍 龜板酒炙二兩半 黃柏五錢酒炒
右粥丸 以四物湯加陳皮甘草煎湯吞
劉河間十全散者蓋治氣血俱虛而四肢不_元用也

治男守婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色瘦黃脚膝無力喘嗽中滿脾胃氣弱五心煩悶並治

人参

黃芪

白朮

茯苓

甘草

肉桂

當歸

川芎

熟地

白芍藥

各等

右為粗末每服二錢生姜三片枣二枚

水

一盞煎十分不拘時溫服

桂芍藥甘草

小建中湯也

加黃耆

即黃耆建中湯也

人參

木茯苓甘草四君子湯也當歸川芎地黃芍

藥四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱法天

地之成數故名曰十全散

壯元丸

治下元陽氣大虛及脾有寒溫足膝痠

弱大便不實溫動生痰面色黃白惡風懶語一切倦弱及陰痿不起飲食不思虛弱等症○

方得遂州仙茅或漢中仙茅為君妙不可言履驗昔在吳下治行人公孫質庵老先生患瘧不愈者三年用此收功仕至江右憲副使

山茱萸肉

杜仲

鹽水炒

破故紙

炒鹽水

龜板酒

各三

鹿茸

酒

兔糸子

酒浸透

遠志

去芦甘草煮

兩

研炒

頭二

卷之三
金匱要略
蚕沙炒入參各二
茯苓一兩
大附子半
童便煮
俱製淨藥以乾山藥粉四兩打糊為丸梧桐
子大空心淡鹽湯或酒送下五六十九下午
再服右方服後湏痛斷房失以培其根勿
恃此藥壯陽而助其春興自取其憊也叮之
戒之

金剛丸 治腎損骨痿不能起牀益精補腎
萆薢 杜仲炒 茶蕊酒浸 兔絲子酒浸等分
右末酒煮猪腰子為丸桐子大每服五七十

丸空心酒下

脚氣門

脚氣

內經曰諸溫腫滿皆屬脾土又曰傷于溫者下先受之蓋脾主四肢足居下而多受其溫溫鬱成熟溫熱相搏其痛作矣古無脚氣之說內經名厥兩漢間名緩風宋齊之後謂之脚氣有從外感而得者有從內傷而致者其為溫熱之患則一而已北方高燥多飲醴酪肉食及醉酒湿

赤水經
卷之四
熱之物下流足腔所致。南方卑下溫氣迷滿山澤。血氣虛弱之人或遇房失及負重遠行衝冒雨雪寒溫乘虛而襲遂成此症。大抵風寒暑溫之氣中于諸陽病在外其診多在足。外踝及足背宜散之而愈。中于諸陰病在裏其診多在足內踝及膝內宜溫利之外症自汗走注為風勝無汗疼痛攣急為寒勝。腫滿重着為溫勝。煩渴熱煩為暑勝。如四氣兼有但推其多者為勝。寒則溫之。熱則寒之。在表則散在裏則下。若大虛

氣乏間作亦湯隨病冷熱而用之不可拘執不得服補藥。說上

太抵麻者為風痛者為寒腫者為溫。

痺論云寒勝則風熱勝則緩。如風行之狀。嚴氏曰脚氣南北所感雖有内外之殊然皆由腎虛而生婦人病與者亦由血海虛而得之。發明曰南方自外而入者止于下脰腫痛。北方自內而致者乃或至于手節也。○治法初用解散次必推蕩大便以導其邪氣。

又曰脚氣濕熱勝者成水泡瘡或成赤腫丹毒或如疝氣攻上引下

脉法浮為風緊為寒緩細為溫洪數為熱又沉而弦者亦為風沉而緊者為寒沉細為溫沉數為熱

又曰脉弦者風濡弱者溫洪數者熱遲者寒微者虛牢堅者實結則因氣散則因憂緊則因怒細則因悲入心則謬妄嘔吐食不入睡不安左寸脉乍大乍小乍有乍無者死

入腎則腰脚腫小便不通呻吟目與額皆黑氣冲胸而喘左尺脉絕者死

千金翼云外臺總錄所錄皆謂南方卑溫露霧之地其民腠理疎陽氣不能外固因而復之則清溫築虛病起于下身因血虛氣弱受清溫之邪氣與血并行于膚腠邪氣盛正氣少故血氣濇濇則痺虛則弱故令痺弱也後人名曰脚氣針經云有道以來有道以去治之多以灸焫為佳以導引溫氣外出及飲醪醴以通經散邪所製

之方寒藥少，熱藥多。用麻黃、川烏、姜附之屬。內經云：溫淫于外，以苦發之。麻黃苦溫，發之者也。川烏辛熱，走而不守，通乎經絡。姜附辛甘大熱，助陽退陰，亦能散清溫之邪。又察足之三陰三陽，是何經絡所起？以引用藥為主治，復審六氣中何氣當之。擇其佐使，孫真人云：醫者意也。隨時增損，初無定方。真知言哉！

東垣曰：異法方宜論云：北方者，其地高陵居風寒，冷冽其俗飲，醕酪而肉食。凡飲，醕酪以飲，多飲

速者，為能經。云因，而大飲則氣逆。又云食入于陰，長氣于陽。今乃反行陽道，是為逆也。夫乳酪、醇酒、濕熟之屬，加以奉養太過，亦滋其濕水性。潤下氣不能煦，故下庄于足腎，積久而作腫痛矣。飲食下流之所致也。通評虛實論云：穀入多，而氣少，濕居下也。况醕酪、醇酒之溫熱，甚于穀者也。至真要大論云：太陰之勝火氣內鬱，流散于外，足胫跗腫。飲發于中，跗腫于下，此之謂也。若飲自倍，脾胃乃傷，胃氣不能施化，脾氣不能

四布故下流乘其肝腎之位，症于足胫加之房事不節邪氣乘虛遂成痼疾。孫真人云：古人少有此疾，自永嘉南渡衣纓士人多有之，亦以意也。

活人云：脚氣屬冷者，小續命湯煎成入生姜自然汁服之最快。

丹溪曰：脚氣須用升提藥隨氣血用。當歸拈痛湯治溫熱為病，肢節煩痛，肩背沉重，胸膈不利，遍身疼痛，流注手足，痛不可忍。

羌活 甘草 多黃芩 酒炒茵陳 酒炒各一錢當帰身
苦參酒洗 人參 升麻 葛根 蒼朮各二錢 猪苓

澤鴻

知母 防風各三錢

白朮一錢半

每用一兩水煎，不拘時服。

羅太無治中書粘年，四旬躰魁梧丙辰春從征揚州，腳氣忽作，遍身肢體微腫，其痛手不可近足，胫尤甚，屢不任穿，跣以騎馬，空兩鐙而以竹器盛之，以因急來告予，思內經有云：飲發于中附腫于下，又云諸痛為實，血實者宜決之，以三棱

針數刺其腫上，血突出高二尺餘漸漸好線流于地，約半升許其色黑紫頃時腫消痛減以當歸拈痛湯一兩半服之其夜得睡明白再服愈。

蒼朮丸

治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行。

蒼朮米

泔浸四兩

乳香

沒藥各二兩

青鹽

牛膝

各五錢

熟艾

川烏

全蝎

炒二錢

右為細末共研藥和勻以木瓜一個大者切下一頭留作蓋去穰入上件藥子內蓋之安木瓜于黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成

膏却入生蒼朮末拌勻丸如桐子大每服五十丸空心木瓜湯下以溫鹽酒送亦可日三服

忌血與蒜

丹溪腳氣腫痛方

黃柏

酒炒

蒼朮

炒鹽

川芎

生地

白术

甘草梢

黃連

犀角

防風

木通

枳榔

熟地黃

芩

痰共

加竹

滲姜汁

時令熟

加石膏

大

便祕

共

加桃仁

小便澀

加牛膝

食積流注者

蒼术 黃柏 防已 南星 白芷 牛角

檳榔

川芎

血虛

加牛膝

龜板

如尋常腫

者專主溫熱肥人加藜藥

丁婦入足腫

牛膝酒洗龍胆草

南星

牛膝

白芍藥

黃柏炒知母炒

龜板酒炙各一兩

甘草炙五錢

酒糊為丸

便溺阻滯心下痞滿者宜微下之

東垣曰楊太受云

脚氣之疾自古皆用疎下

大黃

白芍藥

黃柏炒知母炒

甘草炙五錢

羌活導滯湯

羌活

獨活各五錢

川歸

防已各三錢

便溺阻隔先以此導之後用當歸拈痛湯

大黃酒炒

羌活

獨活各五錢

川歸

防已各三錢

枳實麸炒

每服七錢水煎服取微利則已量

虛實加減

開結導飲丸不飲食不消心下痞悶

陳皮 白术 茯苓 澤瀉 麥孽 酒麴

半夏各一

枳實

青皮

乾姜各五

如有積塊者加巴豆霜一錢

右為末餅糊丸梧子大每服五十丸渴下
又方 治濕熱并諸湿邪腿膝重痛足胫浮腫
甘遂 歲靈仙 莘靡 桑榔 赤芍 澤瀉

乳香各二

沒藥一

牽牛 大戟炒

三

陳皮

四兩

梧子大

每服五十丸加至

七十丸食前溫水送下得更衣止後服忌酒

二日又忌麵及甘草三兩日食溫淡粥以補
胃氣

乙巳春廉平章年三十八身躰充肥脚氣始發頭
面渾身肢節微腫皆赤色足胫腫痛不可忍不敢扶策手着皮膚其痛轉甚起而復卧而復
起晝夜告楚難以名狀求予治之平章以北土
高寒故多飲酒積久傷脾不能運化飲食下流
之所致投以當歸拈痛湯一兩二錢其痛減半
再服腫痛悉除只右手脂末微赤腫以三稜針

刺于爪申端多出黑血赤腫全失不數日因食

濕麵肢脉覺疼再以大黃枳實湯治之

大黃

酒煨三錢

羌活半錢

當歸一錢

枳實五

夫脚氣之疾皆水濕之為也麵滋其湿血壅而

不行故肢節煩疼內經曰風能勝湿羌活辛溫

透關節去湿故以為君主血留而不行則當歸

之辛溫散壅止痛枳實之苦寒治痞消食以為

臣太黃苦寒以導麵之濕熱併治諸老血留結

取其峻駁以為使也右呂作一服水一盞半

煎八分空心食前服利下兩行痛止

控涎丹

方見瘧門

治脚氣加胭脂

一錢

檳榔

木瓜各

一兩卷柏五錢先以鹽水煮半日次日白水煮

半日同前藥為丸每服三十丸加至四五十丸

取下惡物立効

衍義云有人嗜酒日湏五七十盃後患脚氣甚危
或教以巴戟半兩梗米同炒去米不用太黃一
兩剉炒同為末煉蜜為丸梧子大溫水下五七
十丸仍戒酒遂愈

本事方治風氣積滯成脚氣常覺微腫發則或痛

茵芋丸

茵芋

炒苡仁各五錢

郁李仁一兩

牽牛三生

兩取頭末兩半

右為末

煉蜜丸梧子大

每服三十丸

姜枣湯下未利再加十丸日三服以快利為

度白粥補之

三因千金丹

治脚氣上攻

心腎相擊足心隱痛

小腹不仕煩渴小便短

或利閨節

皮疼痛神

効肉蔻蓉

石斛酒浸

狗脊去毛草薢

茯苓

牛膝酒洗

地仙子遠志去心炒

杜仲去皮各一兩

炒熟地各三溫酒鹽湯任下

本事療丈夫腰腳痺緩急行履不穩者以草薢二
十四分合杜仲八分為末每日溫酒和服三錢
七增至五錢忌牛肉

活人苡仁酒治腳痺

苡仁

牛膝各二兩

海桐皮

五加皮

獨活

防風

杜仲各一兩

熟地半

白术五錢

右為粗末入絹袋內用好酒五升浸春秋冬

二十七日夏月，十日分作數服逐帖浸酒空心。
每服一盞或半盞日三四服常令酒氣醺人。
不絕久服覺皮膚下如數百條，亟行即是風
濕氣散。

丹溪治一婦人血少，多氣大使後脚痛而麻。
當歸半錢芍藥各二錢白朮各二錢陳皮一錢青皮各一錢
地黃半錢川芎五分甘草二分桃仁十八枚

右分二帖水煎服。

韓彥正暴得疾，手足不舉，諸醫皆以為風針手足。

亦不知痛，召孫尚證之，尚曰：此脚氣耳。用檳榔末三錢，生姜三片，乾紫蘿七葉，陳皮三錢，水煎服數帖而安。

檳榔散 治脚腫

陳皮一錢蒼朮炒半錢水一大碗酒半盞同煎去

渣調檳榔末二錢。

聖惠方 治脚氣及風寒湿四肢牽急，脚疼不可
眠，地紫蘇六兩搗碎水三升研取汁，以蘇子汁，
煮粳米粥二合和葱豉椒姜食之即止。

濟世方 治一切脚氣神奇

川山申前兩足者燒存性研細入射少許多少隨人斟酌要服此藥湏去他事在晚不可進飲食候至夜深腹空時調服坐卧隨意及鷄鳴又一服痛立止過二十日便能步履如常極妙如神

千金方

治脚氣十二風痺不能行

松葉酒

松葉六十斤剉細以水四石煮取四斗九升以釀米五斗如常法另煮松葉汁以漬米并饋飯

釀封頭七日後澄飲之取醉得此酒力者甚衆
濟世方 諸般脚氣一服除根

防風

羌活

蟬退

各

三

薄荷

五

分

紫蘇

四

分

木

蘇

二

右為末每服五錢以無灰酒半碗熟服訖服至一時久即煎後藥湯傾桶內披厚衣于桶上坐勿令走氣將脚腿薰之當自下而上汗出直至頂門其出如水盡為度

薰洗用

紫蘇半

斤

忍冬花

四

木

餳頭

七

蘇木

兩

右為粗末以水一鍾數沸桶盛分三度添

用尺一下次洗完永除根

東垣曰活人云凡脚氣服補藥及用湯渫洗皆醫之太禁也為南方外感溫氣乘虛襲入為腫痛而言非為北方內受溫氣注下腫痛而言也蓋溫氣不能外達宜淋渫開導泄越其邪名曰導氣除濕湯

歲靈仙 防風 荆芥穗 當歸 地骨皮

升麻

白芍

蒴藋葉各等分

水二斗煮取一斗五升乘熟淋洗

五味敗毒散 治三陽經脚氣流注脚踝上熱腫寒熱如瘡自汗或無汗

羌活

獨活

前胡

紫胡

枳殼

桔梗

甘草

人参

茯苓

川芎

大黃

蒼朮等分

每服四錢姜三片薄荷頭一個水鍾半煎一鍾熟服皮肌癩痒加蟬退

八味丸 治少陰腎經脚氣腰脊疼小指之下連足心循內踝入跟中肺內膈中內臟皆疼上冲胸咽嘔吐自汗小腹不仁善恐火症最急以腎

乘心水克火死不旋踵 方在虛怯門

紫蘿散 治風毒脚氣腹內痰惡脚重虛腫

紫蘿 木通 桑白皮 面香各一 枳殼二兩

羌活 獨活 荆芥穗 木瓜 青皮 甘草

各半 大腹子箇 每服三錢姜三片葱白一莖水

煎服

桑白皮散 治腳氣盛發浮腫 小便赤澁腹滿氣急

桑白皮 郁李仁各一 赤芍芩二 木香

正防已 大腹子箇 各半 紫蘿子 木通 柴柳

青皮各七錢半 每服三錢姜水煎

薏苡散 治腳氣弱痺腫滿心下急大使澁

薏苡仁 防風 川芎 防已 猪苓 郁李

仁 火麻仁 檉榔 羚羊角屑各一 枳實七錢

甘草五錢 桑白皮二兩 為末 每服三錢熟水調下

紫蘇子湯 通治腳氣中滿喘急嘔吐自汗

紫蘇子炒前 胡 半夏 厚朴 甘草炙 川歸

黃芩各二 桂心 桔梗各三 虛懶者加炮附子二兩

每服六錢姜七片枣二枚水煎食後服

赤竹齋

四四

三三

四

茱萸丸 治脚氣入腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸 洗木瓜去穰切片乾

右酒糊為丸梧子大每服五十丸至百丸酒或米湯下或以木瓜蒸爛研膏為丸尤妙
卷柏散 治遠年脚氣難治此方特効虛人減半服 卷柏隨用先以鹽水煮半日次用冷水
黑牽牛 取頭末 桃榔 甘遂

右各為末不得相雜每服各一錢惟桃榔末二錢五更初濃煎葱白湯下至巳時取下惡

後方

物如魚凍隨吃淡粥病安更宜服後藥

大腹子三兩 木瓜二兩 蘿蔔子炒 檳榔 荆芥穗
烏藥 陳皮 蘿蔔葉各一錢 萝卜子炒五錢 沉香三錢
桑白皮炒 枳殼麸炒各兩半 每服三錢姜五片煎

服

檳榔湯 治腳氣順氣防壅

檳榔 香附子 陳皮 蘿蔔子 木瓜 五加皮 粉草各一兩 每服四錢姜五片煎服 婦人

赤竹齋

四四

三三

脚氣多由血虛加川歸半兩。室女多因血
實加赤芍藥一兩半，大便秘結虛弱者加枳
實_{大半}盛者_{六分}加大黃_{二分}。丁方治脚氣沖心大便
秘宜服_{大半}三黃散加_{三分}烏藥_{一分}春夏常服妙。

木瓜茱萸湯 治脚氣入腹困悶欲死腹脹喘急
木瓜 檳榔各二吳茱萸_{湯洗七次}炒一兩

每服四錢水煎食前服大木瓜二枚吳茱萸
五兩半味併用水四碗煎一碗分二服如人
行十里外再進一服或汗或吐或瀉即瘥不

狗時服

三將軍丸

治脚氣入腹沖心大便不通

吳茱萸

木瓜

大黃各半

分

太黃或隨其病加

減

右米糊丸

如菉豆大每五十丸粳米枳

殼湯

下未應加丸數再服以通為度

杉木節湯

治腳氣冲心或心脇有塊毒勝痰逆

痞滿喘急汗流搐搦昏悶上視咬齒甚至垂絕

不知人

杉木節一大橘葉一升無葉

升

用皮亦可

大腹子

七个連皮剉碎

右以童子小便三升煎一升半分二

分二

赤水玄珠

卷之五

論理

服若一服得快利停後服

木通散 治脚氣服熱藥太過小便不通膝下脹

川歸 桑子 赤芍 赤茯苓 甘草各一

水木每服三錢水煎

蒼术散 治一切脚氣

蒼术米泔浸一日
便益炒過黃柏去皮酒浸一日
夜炙焦

每服四錢水鍾半煎一鍾日進三四服

烏藥酒 治一切脚氣發動

牛烏藥用粗皮揩淨以瓦片刮下屑收于磁器

內以好酒一升浸一宿次日空心去藥只將磁器內所浸藥酒熱湯上坐溫入生射香少許丸妙一服即安無射香則多服之後溏泄病去

升麻散 治脚氣

升麻 獨活 蒼术 牡丹皮 等分

右每服半兩酒煎空心服如痛甚者加射香

治六經脚氣發起赤腫者

五苓散一帖內
桂枝 蘿木 生薑
用桂枝 蘿木 多數
生薑 搗一
膏

水二鍾煎一鍾空心連進三服至午時即
不痛矣

治久患脚氣下躰虛冷者

五積散

一帖水二錘半煎

一龍骨

虎骨

乳香 没藥

五冬脂

各一錢

為末

右空心連進三服見下肢節漸緩即愈

輕脚丸 逐風去濕消腫行血止痛

地膚子

桃仁

各一兩

白术

赤茯苓

亦芍

藥 紫蘿葉

茴香

各半

右煉蜜丸

梧子大

每三五

內丸

空心紫蘿葉湯下漸加至百丸神妙

枳實 胡芦巴

猪苓

澤鴻

檳榔

甘草

大

次

塗法

猪牙皂角

不蛀

大皂角

不蛀

南木香

各

右為末醋濃調先于腫上不腫處用藥圍塗

之闊三寸若圈然截斷毒氣不使冲上次

塗下面腫只留脚尖不塗仍剪脚申出毒氣

時時用醋潤之

凡用小續命湯活絡湯湏兩料候通身得汗如續

命湯香疾乃去

躰

活絡湯 治寒濕脚氣及一切疼痛諸疾

白朮 杜仲各六錢

牛膝附子炮各五錢

甘草

五錢

人參 官桂 各二錢半 川姜 炮七錢半 川歸 一兩

每五錢水煎，病在上食後病在下食前服

椒囊法

川椒二三斤實于疎布囊中置火踏

上跣足踏椒囊久之全愈

一方加切片檳榔并熟艾各三之一尤妙

治脚氣止痛

草烏為末同酒糟搗爛貼

姜汁調草烏貼亦可

姜汁調赤小豆南星末

塗時吃熟蘿蔔令飽以下氣

治腳氣止痛

用牛皮膠一塊剉碎同麥麸炒成

珠研細末每用酒調下一錢其痛立止如太便
秋結者服搜風順氣丸亦可

●脚氣冲心為厥逆

丹溪云脚氣衝心宜四物湯加炒柏子宜湧泉穴
用附子末津唾調傅上以艾灸泄其熱下行
脚氣衝心用白梔榔一箇如鷄心大者為末用童
便生姜汁溫酒共半盞調作二服

廣利方不用姜汁酒但用童便五合，
調服再服治心悶亂不知人。

三脫散 治脚氣冲心腹氣飽悶太便秘澀者最

良 獨活 白术 木瓜 培乾 大腹皮黃
紫蘿各一錢 沉香 木香 川芎 檳榔麵裹煨
錢半甘草炙半橘紅三分 每二錢水煎分三服取
便利為效

大腹子散 治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶
大腹皮 桑白皮 赤芍藥 木通 紫蘿
羌活 獨活 木瓜 荆芥 青皮各
兩每服四錢姜五片葱白七寸水煎空心溫
服

常安方療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急
息者以郁李仁十二分搗碎水研取汁薏苡仁
搗碎如粟米取三合以米作粥空腹食之佳
凡腳氣之病始起甚微多不令人識也飲嬉戲
氣力如故惟卒起脚屈弱不能動此為異耳○
凡腳氣之候見食嘔吐憎聞食氣或有腹痛下
利或大小便閉滯不通或胸中衝悸不欲見光
明或精神昏憮或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭
痛或身熱極冷痛煩或覺轉筋或腫或不腫或

背腿頑痺或時緩繼不隨或復百節掣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也○脚氣有腫者有不腫者其小腹頑痺不仁者多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕○其人黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白人不耐風濕瘦人肉硬肥人肉軟則受病難愈○凡脚氣覺病候有異決然氣急即湏太言使其恐懼而氣下行為妙治之稍緩則氣上入胸膈逆滿氣上肩息急

者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但見心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數呕吐不止者死

治腎臟風毒積腰膝沉重歲靈仙未蜜和丸梧桐子大初服酒下八十丸平明微利惡物如青膿桃膠即是風毒積滯也如未動夜再服丁百丸取下後吃粥補之一月仍當服溫補藥

治腎臟風攻注脚膝方

連珠甘遂

一木鱉子一雌雄
去壳

右為朱猿猪腰子二箇批開用藥末一錢摻勻溫紙裹數重火煨熟放溫五更初細嚼米飲下積水多則利多少則利少宜軟飯將息若患一腳湏看左右如左脚用左邊腰子右脚用右邊腰子藥未止許一錢半予年在昆陵有姓馬鬻酒者宿患腎臟風今一足發腫如瓠自腰以下巨絰通為一律痛不可忍欲轉側面人挾持方可動或者欲以鍼力決之予曰不可吾有藥如上法服之辰已間下體

水數升即時痛止腫退一月後尚拄拐而行予再以赤烏散全塗貼其膝方愈後十年至金陵率其子列拜以謝云向脚疾至今不復作雖積年腎臟風併已失去今健步自若矣本草云有入重病足不履地者十年良醫殚技莫能治所親置之道傷以求救者遇一遊僧見之告曰此疾一藥可治但不知此土有否因為之入山求索果得歲靈仙也使服之數日能步復其後山人鄧思濟知之遂著其法云採得陰乾

月餘搗篩溫清酒和二錢七空心服之如人本性殺藥可加及六錢七利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麵湯以甘草梔子代飲

○白濁門

生生子曰白濁乃小病令人亦有一二十年不愈者皆是用藥無分今將吃緊要處次第條陳庶初學者有取則焉大抵屬濕熱為多緣中官不清痰濁下流滲入膀胱治當審小便痛與不痛若

小便將行而痛者氣之滯也行後而痛者氣之滯也若小便頻數而痛者名淋濁治以二陳湯加木通山梔升麻紫胡之類若只濁而不痛宜加燥中宮之溫二陳湯加蒼白木桔梗升麻之類提之即愈若久濁而不痛為虛宜補中益氣湯陰虛下脫者加牡蠣山茱萸滋之久而陰虛腰膝痠疼六味地黃丸挾熱者加黃柏知母挾寒者加桂心菟絲子川巴戟之類虛甚者加鹿茸○有心脾二經不足但經思慮其濁愈甚者宜定

志先善飲酒人溫熱下流用白螺螺壳火煅醋淬為末三錢用乾葛青蒿苦參酒各三錢煎湯

調下

治法以二陳湯加白朮 蒼朮 黃柏

升麻 柴胡 木通 石菖蒲

加生姜三片 灯心二十根食前服

前方加白葵花三五朵極妙白雞冠花亦佳

凡治淋濁二症先當用此以清中宮溫熱瘀氣即易愈丹溪云二陳湯加升提之法能使大便

潤而小便長此端本澄源之意服二三帖然後看氣血孰虛乃用對症之藥此最萬全法也時醫好用滲利之藥殊不知久濁不愈者多陰虛而滲利在所當忌又不可先用補劑及止瀉之藥蓋此症始未有不因于溫熱下流者補瀉太早反閉其邪濁愈甚矣由是有積年累月不効者皆治法失先後次第故也

丹溪加減珍珠丸治便濁極妙丸治便濁先時兼服其丸甚速○蛤粉青黛氣下味主胃中濁入膀胱皮

大燥 滑石 黃柏 乾姜
濕熱 蒜水 炒褐色味辛飲

右等分炒神麴糊為丸梧子大空心下三十五

十九

秘傳二奇湯 治便濁疼痛 神妙兼治偏墜
升麻 烏藥 煎湯食前服 若小便前痛者
以烏藥三錢升麻減半 加小茴香五分黃柏
五分木通五分龍胆草五分漢防已三分
若小便後痛者用升麻三錢烏藥減半仍加
黃柏五分紫胡五分

若眼前藥頭覺作運此陰虛因升動其火故也
急以六味地黃丸料加黃柏知母麥門冬治之
一服而愈○若服前藥胸中飽悶此必中宮有
痰宜二陳湯加香附白朮炒麴消乏
茯苓丸 治心氣不足思慮太過腎經虛損其陽
不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄
菟絲子 酒浸研 石蓮子 去壳 白茯苓 去皮
右酒糊丸梧子大每三十丸蓋湯下常服亦
能補虛

金箔丸 治下焦虛小便白濁白淫夜多異夢遺
泄 补骨脂 炒薤菜子 炒脫蚕蛾 肉蓴客
山茱萸 來螵蛸 兔系子 酒浸牛膝酒浸
龍骨 各一兩 為細末 煉蜜丸梧桐子大金箔為衣
每服三十丸空心溫酒下

萆薢分清飲 治白濁小便凝如脂油光彩不定
凝脚如糊

益智仁 川萆薢 石菖蒲 烏藥
各等分每四五錢水煎臨服入鹽少許

丁方加茯苓甘草
定志丸 治心氣不足脾弱不能攝精心腎不交
小便白濁
遠志 去心芦淨以甘草湯煮 石菖蒲 白茯苓 人參
山藥打糊為丸食遠白湯送下 五六十丸

大宮詹少溪吳馭閔校

終

大宮氣更篤異變而生

此藥治癰疽瘻瘍及癰癧癰癧癰癰癰癰癰癰

白頭

武志大

天仙茶

