


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



赤水式
十五



正武
516
16

赤水玄珠第十五卷目錄

痘遺門

汗門

附頭汗 手足汗
無汗

消癰門

口燥咽乾

赤水玄珠第十五卷

新安生生子孫一奎著輯

○夢遺門

附精滑不禁

丹溪曰：夢遺，上熱精滑，主濕熱。許學士曰：治夢遺有數種。有下元虛憊，精元不禁者；有年壯氣盛，久曠經絡壅滯者；有情慾淫動，所顧不遂者。各

曰白淫虛憊不禁者宜補澁壅滯者宜清心以
決其壅所顧不遂者宜清痰熱以猪苓丸治之
正如瓶中煎湯氣盛盈溢者如瓶中湯沸而溢
慾動心邪者如瓶傾側而出虛憊不禁者如瓶
中有罅而漏不可一槩用藥也

內經云主閉藏者腎也又云腎藏精腎衰則不能
骨攝故妄行而出精不時也又曰思想無窮所
顧不得意淫于外入房太甚宗筋弛緩發為白
淫夢遺等症先賢治法有五○用辰砂磁石龍

骨之類鎮墜神之浮遊是其一也○其二思想
結成痰飲迷于心竅而遺者許學士以猪苓丸
導利其痰是也○其三思想傷陰者繫古以珍
珠粉丸降火補陰是也○其四思想傷陽者羅
謙甫以鹿茸蕤容丸等補陽之藥是也○
其五陰陽俱虛者丹溪治一人形瘦便濁夢遺
作心虛治用珍珠粉丸定志丸內傷氣血不能
固守以致夢遺精滑便濁不禁者當補以八珍
湯加減吞樗根皮丸予嘗治一少年夢遺無度

且精滑甚，玉革絕舉。其精即流目見，婦人精即注下。未婦之私皆廢，背心痛如被椎。兩耳皆聰，腰疫膝軟，此大虛症也。用補夫丸加止瀉之藥，鹿茸沙苑，蒺藜白蟬之類服之。一月精固，二月耳聰而背心痛止。次年育女。

仲景云：夫失精家少腹弦急，陰頭寒冷，目眩鬚落，脉極芤虛遲，為清穀亡血失精。脉得諸芤動微緊，男子失精女子夢交，以桂枝龍骨牡蠣湯主乏。

桂枝 白芍藥 生姜 牡蠣 煅龍骨 各
甘草 二兩 大棗 十枚 作八帖水煎服

猪苓丸

半夏一兩剉，猪苓末二兩。先將一半炒半夏色黃，不令焦出火毒，取半夏為末糊丸桐子大，候乾更用前一半猪苓末子同炒微烈，入砂瓶內，卷之空心溫酒鹽湯下三四十九常服。于申未間溫酒下。○蕭氏云：此古方也。今盛行于時，而人多莫測其用。蓋半夏有利性而

猪參道水綠腎司閉藏久用瀉藥及有鬱滯
用之使氣通而鬱散予醫囊中嘗貯此藥緩
急與人三五服皆隨手而驗又云詳治夢遺
方屬鬱滯者居大半庸醫不知其鬱但用龍
骨牡蠣等瀉劑固脫殊不知愈瀉愈鬱其病
反甚常治一壯年夢遺白濁少腹有氣冲上
每日腰熱卵作酉涼腰熱作則手足冷前陰
無氣腰熱退則前陰氣耕手足溫平且多泄
屁暮多噫時振隔一旬二旬必遺脉朝弦滑

而大午後洪大子知其有鬱滯也先用沉香
和中丸大下之次用四物湯吞滋腎丸百粒
若稍與蛤粉等瀉藥則遺與濁反甚或一夜
二遺遂改用導赤散大劑前湯服之遺濁皆
止漸安又一中年夢遺醫或與瀉藥反甚連
遺數夜愚先與神勞丸大下之却再製此猪
苓丸服之皆得全安又丹溪先生治鎮中萬
戶蕭伯善便濁精滑不禁百藥不効試倒倉
法而安于此見夢遺屬鬱者多矣

嘗治丁氏，一友壯年，体肥而色蒼善飲酒，常兼人之食，每五日則夢遺一度。准_二如此，醫近一年，因効。季冬就子治，診左弦數右，三部皆滑數知其酒多，濕熱重，况厚味生痰，但清其溫熱或可愈也。乃製一方，名曰端本丸。

苦參

二兩本草苦參解酒毒補陰氣清溫熱補陰最捷

川黃柏 二兩

牡蠣

蛤粉

白螺螄殼

煅各一兩

此三味燥濕熱

清痰

葛根

一兩解酒熱而引清氣上升

青蒿

一兩清熱而利小便是上

下分消其溫也

以神麃糊為丸，梧子大空心及食前

白湯吞下，七十丸服至第五夜竟不遺，至十九夜又被酒過醉，其夜又遺，乃令却酒一月。

未終劑而精固矣。次年生子。

之百發百中

潔古珍珠粉丸 治白濶夢遺精滑不收。

年壯節慈精溢

者降火補陰為主

黃柏

一斤新丸

真蛤粉 一斤

滴水丸如梧子大，每服一百丸，空心溫酒送

下法曰陽盛故精泄也。黃柏降火，蛤粉鹹而

補腎陰

丹溪云精滑不禁用。蛤粉青黛香附黃柏知母之

類

大鳳髓丹 治心火太盛，陽狂不已，又補腎水真陰，虛損心有所欲，速于感動，應之于腎疾。于施泄此方，固真元，降心火，益腎水，大有神效。

黃柏

炒二兩

縮砂

一兩

甘草

半兩

半夏

炒二兩

猪苓

茯苓

蓮蓋

益智仁

各三錢五分

右神麴糊丸，梧子大，每服七十九

若只用黃柏甘草縮砂三味，名正鳳髓丹。若

只用黃柏甘草二味，名小鳳髓丹。古人云：鴻

心者非也，乃濁心包絡相火，益腎水之割。
許學士清心丸 治經絡熱，夢遺心忪恍惚，膈熱。
黃柏丙研為末，加生腦子一錢，同研極細，煉蜜丸，梧子大，每服十九至十五丸，濃煎，來門冬湯下。

大智禪師云：夢遺不可全作虛冷治，亦有經絡熱而得之者。嘗治一男子，至夜脊心熱，夢遺，用珍珠粉丸，猪苓丸，遺止，終服，紫雪，脊熱始除。又下男子脉洪腰熱，遺精沉香和中丸，下之導赤散。

治其火而愈由此知身有熱而夢遺者皆熱遺也

治夢遺之藥若清之不止者為虛寒愚壯年得夢遺忘每四五夜必一遺累用鳳髓丹秘真丸雖少効終不能除根後改用石菖蒲遠志華子桑螵蛸益智酸棗仁牡蠣龍骨瓊陽等劑為丸服良愈又一中年男子夢遺以珍珠粉丸等藥與服了無効亦以遠志菖蒲等劑服之隨手而愈矣

河間秘真丸 治白濤小便不止精氣不固及有餘瀝或夢寐多泄

龍骨

一兩另研硃砂一分研細留

大訶子皮

五枚縮砂

五錢

右麵糊為丸菉豆大每服一二十九空心

溫酒白湯下不可多服恐太秘也

思想外淫者宜鎮心導

滯補虛火方得之矣

五苓丸 治虛而泄精脉弦大累與加減八物湯吞秘真丸及珍珠粉丸精泄不止後用五倍子滌脫之功敏於龍骨蛤粉矣

海藏烏金散 治夢泄精滑不禁。九肋鱉甲每用二枚以清酒一碗童便三盞葱白七寸同煎。十分服之日進二次。以亦補陰意也。本草云主心腹癥瘕積聚。

東垣治男子夢與鬼交心神恍惚刮鹿角屑為末。

三錢酒調下日進二服。

本草云鹿角逐惡氣惡血然亦是補劑否則何能治此

婦人良方鎖精丸 治下元虛弱小便白濁白澀

白帶淋漓小便頻數。

破故帛炒五味子炒白茯苓青鹽各等

各等

右酒糊丸梧子大每三十丸鹽酒或鹽湯下固精丸 治胞冷虛寒小便白濁白澀夢遺等症。免系子酒浸蒸炒五味子炒白茯苓乘螵蛸牡蠣 龍骨各韭子炒白石脂各等酒糊丸梧子大每七十丸空心益湯送下。

○汗門

附頭汗無汗手足汗

治汗之法有數種各列治於後。

陽虛自汗者宜嚴氏著附湯黃耆建中湯。陰虛盜汗者當歸六黃湯熟地盜汗者正氣湯。

卷之三

溫勝自汗者表虛不任風寒者周衛湯 痰熱者涼膈散或滾痰丸 飲食飽甚汗出于胃宜消其食詳所飽何物以枳實山楂之類治之
薰而奪精汗出於心宜紫石英小草龍骨酸枣仁人參之類搖鈿勞若汗出於脾宜歸脾湯或當帰補血湯 疾走恐懼汗出于肝宜龍齒酸棗仁當帰枸杞山茱萸之類 持重遠行汗出于腎以山藥山茱萸熟地黃鹿角膠羊脊髓之類 東垣治汗春夏用黃蓍秋冬用桂枝此亦是治自汗法也

夏月汗多口渴氣喘促者及陰虛注夏脉熱自汗或盜汗者急以生脉散加黃蓍治之 六味地黃丸加知母龍骨牡蠣治勞損盜汗殊妙
著附湯 治陽氣大虛汗出不止肢軟倦急

黃蓍去節

大附子

炮去皮睛各等分

舟溪治陽虛汗多者人參黃蓍少佐桂枝湯甚者附子亦可用按此即東垣黃蓍建中湯意也
東垣當歸六黃湯 治陰虛盜汗之聖藥也

東當歸 黃連 黃芩 黃柏 黃蓍 生地黃
熟地黃各等 每服七錢水煎服

東垣正氣湯 治熱在陰分盜汗火上

黃柏炒二錢 知母三錢甘草一錢 水煎食遠服

許學士人參丸 通治諸虛補精氣止肝邪平補
五臟虛羸六腑怯弱充肌膚進飲食止虛汗火上

人參 白朮 疦苓 山藥 石斛 五味子

黃蓍取頭末

各一兩為細末蜜丸梧子大每服

三十九空心食前米飲下久服不熱尤宜少

東垣周衛湯 治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不
狂風寒

黃蓍 麻黃根各一錢 生甘草 當歸梢
生黃芩 半夏各五分 猪苓 羌活各七分 麥門冬
生地黃各三分 五味子七粒 紅花 蘭木各一分
水煎溫熱服中風症必自汗汗多不得重發
汗故禁用麻黃而用根節也

羌活勝濕湯 治濕勝自汗惡寒重添厚衣心胸

悶躁頭目昏憒壅塞飲食減溫熱大盛汗出不休以風藥去其濕以甘草漏其熱

甘草

錢三

黃蓍

七分

生甘草

五分

生黃芩

酒黃芩

防風

各三分

人參

三錢以取氣益胃

獨活

二分

川芎

藁本各三分

升麻

薄荷各五分

羌活

一分已上

蔓荊子

三分已上

細辛

三錢

葛根

一分已上

胡風

藥勝其濕

右水二鍾煎鍾半線入後四味細辛等藥再

煎至一鍾熟服一服而止諸症悉去

涼膈散

方見熱火門

滾痰丸

方見痰門

附雜方

陳無擇牡蠣散

治諸虛不足及新病暴虛津液

不固

牡蠣常自汗

許學士云亦治盜汗不止

黃蓍

麻黃根

牡蠣煅研各二錢

右水煎入浮小麥一百粒不拘時服

河間白术散

治飲酒中風汗多不可單衣食則

汗出

如洗久不治必成消渴症

牡蠣

煅二錢

白术

一兩防風二兩

為末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍

防風白朮湯如多汗面腫倍牡蠣

丹溪白朮湯 治盜汗

白朮

四兩分份四製○一兩黃芪同炒○一兩石斛同炒○一兩牡蠣同炒○一兩桂皮

炒各味炒黃色餘藥不用只用白朮研末每服

三錢用粟米煎湯送下藥盡為效

濟世良方 治盜汗

山藥為末臨卧酒調下三錢

衍義云椒自治盜汗尤切將椒自微炒搗細末用

五錢以生猪上膾煎湯丁合調勻臨卧服無有

不効蓋椒自能行水治水盛尤勝

治盜汗桑葉為末茶服之

治藥不應者累驗出二說

豆豉能治久盜汗以一升微炒令香清酒二升漬

兩三日取汁任人服之不瘥更作三兩劑即止

愚謂此方出綱目必是傷風表中之風邪以致毛腠不閉豆豉原能發汗散邪而腠理

閉也今取其能治久盜汗豈豆

豉亦能補陰平錄此以備參考

衍義以煅過牡蠣麻黃根等分同研細末治盜汗

及陰汗

王城頭汗

頭汗

王海藏云頭汗出剗頸而還血痣也額上偏多何謂也曰首者六陽之所會也熱薰蒸則汗出也額上偏多以部分左頰屬肝右頰屬肺鼻屬中州頤屬腎額屬心三焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入于心之分故發為頭汗而額上偏多者屬心之部而為血痣也至于雜忘陰火迫腎水上行入於心為盜汗或自汗傳而為頭汗出者或心下痞者俱同血痣例治之無問傷寒雜病酒積下之而心下痞者皆血痣也可參宿門同治

生生子曰頭汗亦非止血之丁字可盡予族伯每飲食入腹則登時頭面汗出如雨剗頸而還稍頃自收此胃中有熱陽氣虛甚而然何則頭面屬陽明為多飲食入胃冲動其熱如霧露之升騰越出而為汗經謂雲出天氣兩出地氣是也觀海藏以痞痣為對俱同血痣例治之緣其以下多亡陰謂亡陰而陽失依附故飛越也今益脾土而以血藥兼之可謂得治法之本矣

手足汗

手足汗乃脾胃濕熱內鬱所致脾胃主四肢亦有
腸胃中有實熱者仲景承氣忘謂手足濶然
汗出乃腸胃熱甚而偏連四肢也

東垣安胃湯 治因飲食汗出日久心中虛風虛
邪久則令人半身不遂見偏風瘓痺之病先除
其汗慄惶之氣按而收之

黃連 五味子 烏梅去核 生甘草各一錢 甘
草六分 升麻四分 水二鍾煎一鍒食遠溫服忌
濕麵五辛大料發熱之物

治脚汗

白礬 乾葛等分每用五六錢水三碗煎十數
沸洗逐日洗一次繩三五日自然無汗

無汗

丹溪曰盛夏浴食無汗為表實一人脉濶而短重
取而弱此久受濕傷且多年無汗遇勞身熱倦
急如沙病狀

蒼朮 白朮 芳藥 甘草 紅花各五錢 陳皮
六分 當歸身二兩 分六帖姜三片煎服

治夏月無汗成久嗽病半蘿散

半夏

紫蘿葉

二味為末入蛤粉神麴覬蔻

灰等分為末以桃仁泥五錢瓜蒌穰一枚為

丸先服三拗湯三帖却服此丸臨卧白湯送

下七十丸

治虛勞自汗不正芍藥黃耆湯

黃耆

二兩

白芍藥

白朮

各二兩半

甘草

一兩

每服五錢煨姜三片束一枚水煎服

參朮散

治同前陽虛甚者加附子

人參

半一兩

白朮

二兩半

桂心

七錢

每服五錢水煎服

○消癰門

啟玄子註癰為消熱病也

渴而多飲為上消 消穀善飢為中消 渴而便數有脂膏為下消

東垣曰上消者舌上赤裂太渴引飲經曰心移熱於肺傳為膈消是也以白虎湯加入參主之索古曰上消者上焦受病又謂之膈消多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦治宜

流濕以潤其燥

上消者經謂之膈消渴而多飲是也

治上中下三消水火圖

上消

熬猪肚湯

羊臍冬瓜湯

上消手太陰太陽不正

麥門冬飲子

人參化水舟不正卦少陽

中消

調胃承氣湯

痺成消中而數小便

消中足陽明

胃熱消穀善飢

易老順氣散

下消

益火之源以消陰翳則便溺有節

腎氣丸

地黃丸

腎消足少陰飲少溲多小便如膏

內化丸

鳳髓丹

壯水之主以制陽光則渴飲不思

東垣論消渴未傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹聖濟總錄皆為必死不治之

症惟潔古分而治之能食而渴者白虎加人參湯主之不能食而渴者錢氏白术散倍加葛根主之上中既平不復傳下消矣前人用藥厥有旨教或曰未傳瘡疽者何也此火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也經曰有形而不痛者陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得强者生失强者死未傳中滿者何也以寒治熱雖方士不能廢繩墨而更其道也然臟腑有遠近心肺位近宜制小其服腎肝位遠宜制

大其服皆適其至所為故知過與不及皆誅罰無過之地也如膈消中消制之太急速過病所久而成中滿之疾正謂上熱未除中寒復生非藥之罪失其緩急之宜也處方之際宜加審焉總錄論消渴有三種一曰渴而飲水多小便數有脂似麸片而酣者消渴病也二者吃食多不甚渴小便少有似油而數者消中病也三者雖渴飲水不能多腿脚瘦小瘦弱小便數此腎消也特忌房勞千金方云消渴病宜慎者有三一忌

酒二忌房勞三忌鹹食及麵能慎此三者雖不服藥亦可自愈消渴之人愈與未愈嘗嘔瀉慮患太瘡必於骨節間忽發瘡疽而卒

內經云熱中消中不可服膏粱芳草石藥石藥發瘡芳草發狂芳草之氣羨石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者東垣謂滑石治渴本為竅不利而用之以燥能亡津液也天令濕氣太過者當用之若無濕而用之是犯禁也自利而渴知內有燥也濕宜泄之

燥宜潤之

內經云，脉實大病久可治，脉懸小堅病久不可治。又脉經曰，消渴脉數大者生，細小浮短者死。

上消治例（渴而多飲為上消）

丹溪云，治消渴，卷氣降火生血為主。瓜萎根治消渴之神藥，心移熱于肺，傳為膈消。

人參石膏湯 治膈消上焦煩渴，不欲多食。

人參五錢

石膏一兩

知母七錢

甘草四錢

每五錢水煎，食後溫服。

黎古治能食而渴者，白虎倍加入參湯主之。
王海藏治脾胃虛弱大渴不止，而食少，小便不利，大便不調，精神短少，腹窪挾如繩束。

白茯苓

橘紅各一錢

生姜五錢

右煉蜜丸，彈子大，每二丸空心白湯化服，忌生冷硬物。怒發思慮過度，如脉弦或腹中急

甚者加甘草三錢。

易老門冬飲子 治老弱虛人大渴。

人參

枸杞子

白茯苓

甘草各三

五味子

麥門冬

各五錢

加蜜水煎服之

羅太無門冬飲子 治膈消胸滿心煩精神短少

多為消渴

知母

甘草

瓜蒌仁

五味子

人參

葛根

茯神

生地

麥門冬

一兩

每五錢加竹葉十四片同煎服

火府丹 治消渴

本事方云一卒病渴日飲水三斗不食者三月

心中煩悶時孟冬予謂心中有伏熱與此丹數服每服五十丸溫水下越二日來謝云當日三服渴止又次日三服飲食如故此方本治淋用以治渴得効信乎藥要互通易能執一丹溪治消渴泄瀉先用白芍藥白朮各炒為末調服後隨症用稟

錢氏加減地骨皮散 治上消

知母 茄胡 甘草 半夏 地骨皮 赤朮

芩 黃芪 石膏 黃芩 桔梗 白芍藥

每三錢姜五片水煎食遠服

東垣止渴潤燥湯 治消渴大便乾燥喜溫飲陰
頭縮舌上白燥唇裂口乾眼澁難開及於黑處

如見浮雲

升麻一錢
半
紫胡七分
甘草五分
紅花少許
杏仁箇六
升麻一錢
研桃仁研麻仁研防風歸身荆芥穗

桔梗
麻仁
防風
白芍
葛根
荆芥穗
細辛
川椒
熟地
石膏
知母
黃柏

辛谷 分一水煎食遠熱服

化水丹 治手足少陰渴飲不止或心痛者本草
治飲

冷水十馬瞬大者四十五粒。灸一上鴉生用合分

冷水川烏柏大者四
多者川烏柏枝炮去皮甘草兩
用厚者為細末一牡蠣生用蛤粉
炮六兩為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新

炮六兩為紅末。酢浸米飯蒸九粒。每月十五丸。新
水下心痛者。醋湯下立愈。飲水一石者。一服

愈王海藏此藥能化停水

甘草石膏湯 治渴病全愈再剷舌白滑微腫咽
喉嚨_少唾覺痛嗌腫時渴飲冷白沫如膠飲冷乃
大

口噤口啞覺瘡噬脰眼渴飲冷自沫如膠飲冷乃
止今升麻一錢紫胡七分甘草梢五分石膏六分

黃柏 桃仁 防風 荆芥穗 生地 知母

當歸身錢各一
杏仁六枚熟地黃連各三分
細辛一分

紅花少川椒粒

水煎食後熟服

丹溪云消渴病退後而燥渴不解此有餘熱在肺經可用參苓甘草少許生姜汁冷服虛者可用

人參湯

東垣六經渴治例

太陽經渴其脉浮無汗者五苓散滑石之類主乏陽明經渴其脉長有汗者白虎湯涼膈散之類主之少陽經渴其脉弦而嘔者小柴胡湯加瓜萎之類主之太陰經渴其脉細不欲飲縱

飲思湯不思水者四君子湯理中湯之類主之○少陰經渴其脉沉細自利者猪苓湯三黃丸之類主之○厥陰經渴其脉微引飲者宜少少與之

聖濟治時氣煩渴用生藕片一盞入蜜一合和勻分為三服

○中消治例消穀善飢為中消癰成為消中胃中熱則消穀善飢東垣曰消渴中消自古只治燥止渴悞矣殊不知內經云三陽

結謂之消三陽者足太陽也又手陽明太陽主津液所生病熱則目黃口乾是津液不足也足陽明主血所生病熱則消穀善飢血中伏火是血不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石藥其氣悍烈能助熱燥也越人云邪在六府則陽脉不和陽脉不知則氣留之氣留之則陽脉盛矣陽脉太虛則陰氣不得榮也故飲肉皮膚

而消削也

素問有病口甘者病名為何何以得之岐伯曰此五氣之溢也名曰脾瘅夫五味入口藏于胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥羨之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人多熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也

潔古治胃熱善消水穀以甘辛降火之劑治之用黃連末生地白蘿各自然汁牛乳各一升熬成

膏和黃連末一斤丸如桐子大每服三十九白

湯下日進十服

河間猪肚丸 治消渴

猪肚

一具

黃連

兩

天花粉

四

麥門冬

兩

知母

一兩

為細末

納豬肚中線縫置瓶中蒸極

爛乘熟于石臼中杵可丸為度如硬加蜜丸

如桐子大每服三十九漸加至四十九渴則

進之

○

三因方多梁米杜仲本草云猪肚能

補中益氣止渴

調胃承氣湯 治消中渴而飲多食

宜服之

三黃丸 治三焦熱渴

易老順利散 治中熱在胃而能食小便赤黃微

利至不欲食為効不可多服

厚朴 枳實各一
大黃

四兩

每服五錢水煎食遠服

大腸移熱于胃善食而瘦又謂之食慶

食慶者謂過不生肌膚亦易飢也東垣云善食而瘦者胃代火邪于氣分則能食脾虛則肌肉削也

胃移熱于胆亦曰食慶

河間參蒲丸 治食傷胃中結熱消穀善飢不生

肌肉

人參 葛蒲 赤茯苓 遠志

地骨皮

牛膝酒浸各一兩

右煉蜜丸每服二十

丸米飲下

○下消治例渴而小便數有膏為下消

羅太無治張芸夫四十五歲病消渴舌上赤裂飲水無度小便數多先師以此方治之良愈消渴多傳瘡瘍為不救之疾既効後亦無患享年十五而終名之曰生津甘露飲子治消渴上口

齒麻舌硬赤爛腫痛食不下腹時脹滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善噫善怒健忘醫肉腰背疼兩九冷甚

生津甘露飲子

一方石膏用一兩二錢

石膏

一錢二分

人參

甘草

生山梔

白豆蔻

白芷

連翹

草澄茄

黃連

姜黃

藿香

炙甘草

杏仁

木香

各一錢

白葵

麥冬

當帰身

蘭香

枳胡

各五錢

黃柏

酒炒一錢

升麻

根 知母

酒炒各二錢

桔梗

三錢

全蝎

二枚去毒

右為末湯浸蒸餅和勻捏作餅子晒乾杵碎如黃米大每服二錢桃子掌內以舌舐之津液送下或白湯食後服之神妙凡消渴為病燥熱之氣勝也內經云熟澆所勝佐以甘苦以甘澆之熱則傷氣氣傷則無潤折熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏之甘寒為君啟玄子曰壯水之主以鎮陽光故以柏連梔子知母之性寒澆熟補水為臣以當歸杏仁麥門冬全蝎連翹白芍蘭香甘草甘寒和潤燥為佐紫胡升麻苦平行陽明少陽二經草澄茄白芷蔻木香藿香反佐以取之又用桔梗為舟楫使浮而不下也

東垣和血養氣湯 治口渴舌乾小便數舌上赤

裂此藥生津除燥生肌又名地黃飲子

黃連

酒炒

生地

各十

紅花

少許

黃柏

酒炒一錢

升麻

甘草

炙防已

三分酒洗

各桃仁

六枚當帰

四分知母

酒煮

羌活

各五分

麻黃根

三分

口渴舌乾再加杏仁

六枚

生甘草三分 小便數加石膏六分

右作一服水煎稍熱服忌酒麵房失

清涼飲子治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結小便數

羌活梢

枳胡梢

甘草梢

知母酒製黃芪

黃芩

酒炒一錢

升麻梢四分

防風梢

防已

生地

酒洗各五分

當歸

大分

石膏

龍胆草

黃柏各一錢

紅花少許

桃仁

杏仁各五枚

甘草炙一錢

水二鍾酒一小盞煎服

甘露膏

治消渴飲水極多善食而瘦大便結燥小便頻數又名蘭香飲子

石膏

二錢知母一錢

甘草生防風各一錢

甘草

人參

半夏

蘭香

白豆蔻

升麻

桔梗

連翹

各五分

右浸蒸餅為丸或捏作餅子晒乾

碎如米大

每用淡姜湯下二錢

黃連末

治消渴

要藥

加入天花粉末入乳牛地黃汁

生藕汁二物為膏入山藥末搜和以姜汁和煉

蜜為膏

徐二

挑于舌上以白湯少許送下亦可

能食而渴者加石膏

治消渴以天花粉為末用入乳汁生韭汁煎膏丸如菉豆大每服百丸食後白湯下
肘後方治消渴小便多者煮瓜蒌根汁飲之良濟世方云治消渴無方可治者用天花粉木鳥頭炒等分為細末蒸餅丸每服百丸黑豆湯下已上四方皆以天花粉為君本草主消渴止小便通月水乳汁夫既能止小便又能通月水知其流濕潤燥治消渴之要藥也

千金地黃丸 治腎渴

黃連

四兩
為末

生地

半斤
連木和匀

蜜

一斤
乾用

黃

為細末煉蜜為丸食後來門冬湯下五六十

丸

麥門冬湯

治消渴日夜飲水無度飲下即渴

麥門冬

黃連

冬瓜

各二
兩

每服五錢水煎去渣溫服若無乾冬瓜用新冬瓜肉三片去穰分作十二片為十二服每服用一片擘破水煎日三服

冬瓜飲子 治消渴能食而飲水多小便如脂棼
片日夜無度

冬瓜一枚黃連一兩為細末 在內却用頂蓋定于熟灰中煨熟去皮切細爛研絞汁每服一盞至二盞日三服夜一服

三消丸 用好黃連為細末不拘多少切冬瓜肉研取自然汁和成餅陰乾再為細末用汁浸和加七次即用為末仍以瓜汁為丸煎大麥仁湯

送下尋常渴疾只一服効 已上五分黃連冬
冬為君丹溪云冬瓜性走而急火病與陰虛者
忌之又有黃連為佐用者尤當裁酌
治消渴飲水不止小便數次用田螺五升水一斗浸
一宿渴則飲之每日一度易水換螺為妙
又方以水煮取汁飲之螺亦聽食
愚按已上諸方列于下消之例觀其用藥在
上中為多亦是端本澄源之意上中既平不
復傳下消矣故于真陰虛腎消之病而又自

水經注

卷三十六

有補下焦之藥也用藥者宜審焉
張子和治飲水百杯尚猶未足小便如沙或如杏
色此方三五日小便毒大生下十日除根此方

自云此重劑水銀四錢錫二錢熔化同水壯蠟炒成砂子和

知母
蜜佗僧
紫苑
苦参
貝母各兩

天花粉
黃丹
僵蠅
僵蠅細末用雄猪肚婦人用貴者生一具內盛千刃久禾泉逢二日

人用猪狗用一具系藥于內以麻繩綴之用
新瓦二片繩縛一二遭別用米一升天花粉
末半升于新水內煮熟取出放冷不用米及

天花粉只將豬肚併肚中藥爛搗和為丸如
硬加蜜食前米湯下三四十九三因方無

河間胡粉散 治大渴百方不痊者亦治腎消
黃丹 胡粉 潤瀉 石膏 赤石脂 白石
脂錢各五 天花粉二兩半 甘草一兩 蜜三為丸菉豆大
每服十五丸至二十丸止多則腹痛日進二
服

葛根湯 治消渴消腎目飲石水者

赤水

十五

三
平

葛根 三兩

瓜萎根

黃丹 各二兩

大附子 炮去皮一兩

蜜丸 桐子大

每十九日進三服春夏去附子

六味地黃丸 治腎消効

經驗方 治消不止下元虛者用牛膝五兩細剉

為末生地黃汁五升晝夜浸以汁置為度蜜丸空心溫酒下三十九久服壯筋骨駐顏色黑

鬚髮生津液

仲景治消渴小便反多如飲水一斗腎氣丸主之
張子和治腎消以腎氣丸本方加山藥一味外桂

附從四時加減冬用一兩春煖用三錢夏用二
錢 又法腎氣丸去附子加五味子一兩半
張子和治諸虛不足胸中煩憊時常消渴唇口乾
燥或先渴而欲發瘡或病瘡疽而後渴宜用黃
蓍湯多服 方見瘡疽門

凡消渴而小便反多有脂者皆腎氣不營補津液
也宜多服黃蓍黃蓍乃補氣之要藥

外臺秘要 治消腎小便數鹿角一具炙焦搗為
極細末酒服方寸匕漸漸加之

心移寒于肺消者飲上瀉二不治腎臟消燥氣無所攝故飲上瀉二也

口燥咽乾

此尋常口乾都非前消渴症也

本事方以黃蓍湯治心煩躁不生津液不思飲食
黃蓍 人參 五味子 麥門冬 熟地
甘草 白芍藥各三 白茯苓一 天門冬五 錢
每服三錢姜東烏梅同煎食後服

燥熱咽乾忌南星半夏 又渴者不得利小便是

以五苓散在所當禁也 太宮唐少溪吳馭閣校終

