


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



赤水玄珠

十六



明中  
卷  
九  
六  
七

赤水玄珠第十六卷目錄

痛痺 附鼻額夾車痛 肩背痛 臂痛

著痺 附麻木 口舌麻木

鶴膝風

攣

一身盡痛 產後身痛

赤水玄珠第十六卷

○痺門

生生子曰按內經靈樞所云痺證有臟腑營衛筋脉肌皮骨及俞合刺法論甚廣而世之認痺証者絕少丹溪擬名痛風編門論治是從內經寒氣多者為痛痺論得其一也其有不痛及各臟腑俞合等証世皆不詳載者意其以風寒濕三氣為病之本散寓于各証之下隨各証而分

治之如胞。痺寓淋、腸、痺，寓食泄。心、痺，寓噫氣。肺、痺，寓喘滿之類，皆是然。則痺之不名也，又矣。宜乎其有認為痰，認為風，認為脚氣，同治者，此不務研經旨，而惟務求同俗也。可慨夫！予今列經旨於篇首，以全軒岐舊意。以痛風復痛痺，以昭中古諸賢証治得痺之一俾合前後，而考之庶可因名而循其實也。設不復之，則痛者固可以為風，而于不痛者獨不可以為風乎？抑凡見筋骨作痛，而亦有血虛有陰火，有痰涎者，又皆可

以風名之乎？在丹溪諸公必自能融會體認其如因名迷實之弊，流害已久。名不正則言不順，予故不能無容言也。後之明哲幸鑒予心。

黃帝問曰：「痺之安生？」岐伯對曰：「風寒、溫、三氣雜至，合而為痺也。」其風氣勝者為行痺。行痺者，行而為走注疼痛，及歷節風之類是也。寒氣勝者為痛痺。痛痺者，寒稱為痛風，及白虎。濕氣勝者為著痺。著痺者，著飛尸之類是也。是啓玄子註曰：「受之溫，則皮肉筋骨受之；故為道路者，而麻者得矣；或痛者，始終不移者，是也。」

痺著而不去也故乃痺  
從風寒溫之所生也

帝曰其有五者何也岐伯曰以冬遇此者為骨痺  
以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺以至  
陰遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺此皆以之時所客之處命名非行痺痛痺著痺之外又別有此五痺也以時令配五臟所合而言也  
帝曰內舍五臟六腑何氣使然故玄子註曰皮膚一臟何以致之居岐伯曰五臟皆有合病又而內筋脉骨痺以四  
不去者內舍於其合也故骨痺不已復感於邪  
內舍於腎筋痺不已復感於邪內舍於肺脉痺

不已復感於邪內舍於心肌痺不已復感於邪  
內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺所謂  
痺者各以其時重感於風寒溫之氣也亢痺之  
客五臟者肺痺者煩滿喘而嘔心痺者脉不通  
煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾善厥氣上則恐  
肝痺者夜卧則驚多飲數小便上為引如懷孕  
腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭脾痺者四肢解  
墮發欬嘔汁上為大塞腸痺者數飲而出不得  
中氣喘爭時飧泄胞痺者少腹膀胱按之內痛

若沃以湯澑於小便上為清涕陰氣者靜則神  
藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷淫氣喘息痺  
聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺溺痺聚在  
腎淫氣乏竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾諸  
淫氣謂氣之妄行者各隨藏之所主而入為痺也諸痺不已亦益丙其  
風氣勝者其人易已也帝曰痺其時有死者或  
疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者  
死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已  
帝曰其客於六腑者何也岐伯曰此亦其飲食

居處為其病本也六腑亦各有俞風寒濕氣中  
其俞而飲食應之循俞而入各舍其腑也帝曰  
以鍼治之柰何岐伯曰五臟有俞六腑有合循  
脉之分各有所發各隨其故則病瘳也甲乙經  
以隨為帝曰營衛之氣亦令人痺乎岐伯曰營者水  
穀之精氣也和調於五臟洒陳於六腑乃能入  
於脉也故循脈上下貫五臟絡六腑也衛者水  
穀之悍氣也其氣剽疾滑利不能入於脉也故  
循皮膚之中分肉之間熏於肓膜散於胷腹逆

其氣則病從其氣則愈不與風寒溫氣合故不為痺也帝曰善痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者痛久入深營衛之行濇經絡時踈故不通甲乙經作痛皮膚不營故為不仁其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽遭陰故為痺熱其多汗而濡者此其逢溫甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也帝曰夫痺之為病

不痛何也岐伯曰痺在於骨則重在於脉則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之類逢寒則急逢熱則緩帝曰善

○刺痺穴法

冬感風寒溫者為骨痺久不已則內入於腎病腎脹足攣尻以代踵身蹠脊以代頭取太溪春感風寒溫者為筋痺久不已則內入於肝病目則驚多飲數小便取太衝陽陵泉

夏感風寒溫者為脉痺久不已則內入於心病心下滿暴喘嗌乾善噫恐俱 取太陵少海 長夏感風寒溫者為肉痺久不已則內入於脾病解墮發欬嘔汗 取太白三里

秋感風寒溫者為皮痺久不已則內入於肺病煩滿喘嘔 取太淵合谷

靈樞黃帝問於岐伯曰周痺之在身也上下移隨脈其上下左右相應間不容空愿聞此痛在血肉之中邪將在分肉之間乎何以致是其痛之

移也間不及下鍼其搐痛之時不及定治而痛已止矣何道使然願聞其故岐伯答曰此衆痺也非周痺也黃帝曰願聞衆痺岐伯曰此各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右非能周也更發更休也帝曰善此痛安在何因而有名岐伯曰風寒濕氣客於外分肉之間迫切而為沫得寒則聚則排分肉而分裂也分裂則痛之則神歸之神歸之則熱之則痛解痛解則厥之則他痺發之則如是此內則不在

臟而外未發于皮獨居分肉之間真氣不能周故命曰衆痺

仲景金櫃要略論血痺乃尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之但以脉自微濇在寸口閨上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈血痺陰陽俱微寸口閨上微尽中小緊外証身體不仁如風痺狀黃耆桂枝五物湯主之

嚴用和曰痺証因體虛腠理空疎受之而成逢寒

則急逢熱則緩隨所受邪氣而生証也診其脉大而濇為痺脉來急亦為痺脉濇而緊者亦為痺又有風血痺陰邪入于血經故也

劉宗厚曰人之感三氣而為痺者以其形虛血虛耳但有在肌皮血脉淺深之異故入藏者死緣痺之為証有筋挛不伸肌肉不仁者與風証絕相似故世俗類於風痺痺証通治此千古之弊也大抵固當分其所因風則陽受之痺感風寒濕之氣則陰受之為病多重痛沉著患者難易

得去如錢仲陽為宋之丁代明醫自患周痺止能移于手足為之偏廢不能盡去可見其為難治也况今世俗多類于風誑通治宜乎不能得其病情也

統言曰風痺者遊行上下隨其虛邪與血氣相搏聚于關節筋脉弛縱而不收也宜防風湯

寒痺者四肢寒痛關節浮腫宜五積散

濕痺者留而不移汗多四肢緩弱皮膚不仁精神昏塞者宜茯苓川芎湯

熱痺者臟腑移熱復遇外邪客搏經絡留而不行陽遭其陰故瘡痺煩然而悶肌肉熱極體上如馬走之狀唇口反裂皮膚色變宜升麻湯

三氣合而為痺則皮膚頑厚或肌肉痠痛此為邪中周身搏於血脉積年不已則成癰疹風瘡搔之不痛頭髮脫落治宜疎風涼血

腸痺者數飲而小便不通中氣喘急時作飧泄宜五苓散加桑白皮木通麥門冬或吳茱萸散木

香丸

胞痺者少腹膀胱按之内痛若沃以湯瀆於小便上為清涕宜腎著湯腎瀆湯方見淋閉門血痺者邪入於陰血之分其身體常如被風所以骨弱勞瘦汗出卧則不能搖動亦當歸湯周痺者在血脉之中上下遊行周身俱痛宜觸痺湯大豆孽湯

支飲者手足麻痺臂痛不舉多睡眩冒忍氣不便  
腠冷成痺也宜蒸芩湯

東垣云身體沉重走注疼痛濕熱相搏而風熱鬱

不得伸附著於有形也宜蒼朮黃柏之類  
行痺治劑 即走注疼痛

仲景桂枝芍藥知母湯 治諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣不欲吐痛風神効  
桂枝 知母 防風 各四 芍藥 甘草  
麻黃 附子 炮各 二两 生姜 白朮 各五 水七  
升煮取二升溫服一日三服

烏頭湯 歷節風不可屈伸疼痛 麻黃 芍藥  
黃蓍 各三 甘草 一两 川烏 五枚 各一两  
升煎取一升即服

烏永三升煎，一升去渣，納蜜再煎，七合不時服之。

河間防風湯 治行癥走注無定 痛風神効

防風 當歸 赤茯苓

杏仁去皮尖炒各一錢

桂洛五黃芩

秦艽

葛根各二分

麻黃去節五分

水酒各二盞，東三枚姜五片煎，一盞去渣溫服。

本事方薏苡仁散

治溫傷腎不能生肝自

生風遂成風濕流注

四肢筋骨或入左肩頸肌肉疼痛漸入左指

薏苡兩當歸

芍藥

乾姜 甘草 官桂 川烏 防風 白木

茵芋

即山

麻黃

獨活各五錢

右末每服一

錢空心臨卧酒調下，一日三服。

麝香丸

治白虎歷節風疼痛遊走無定狀如魚

齒

晝夜劇及一切足疼痛

川烏

大者三分

全蝎

二十一箇生用

黑豆

二十一箇生用

地龍

五錢

右末

入射香半字同研勻糯米糊為丸，菉豆大每服七丸甚者十九夜卧令膈空溫酒下微出冷汗，一身便瘥。予得此方，凡歷節及不測，瘧痛一二服便瘥。在歙州日有一貴家婦人

遍身走注疼痛至夜則發如蟲齒其肌多作鬼  
邪治予曰此正歷節風病也三服愈

丹溪龍虎丹 治走注疼痛或麻木不遂半身疼  
痛各 蒼朮 草烏 白芷各 右朱水拌待  
發熱過火入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊  
為丸彈子大酒化下

無擇附子八物湯 治歷節風四肢疼痛如鉗鑛  
不可忍 附子炮去皮脐 乾姜炮 芍藥 茯苓  
半夏 桂心各 三 白朮四 人參三  
兩 正 兩 正 三

每服五六錢水煎

加味二妙散

痛風走注疼痛

黃柏酒

蒼朮

酒炒各

水煎調酒洗歲靈仙末羚羊角灰

臣

二錢

蒼朮佐

白朮

使

生姜一片入藥末一錢擂

碎以前藥再溫服

東垣和血散痛湯 治兩手十指一指疼了十指  
疼疼後又腫骨頭裏痛膝痛左膝痛了右膝痛  
發時多則五白少則三日晝輕夜重痛時覺熱  
行則痛輕腫却重註云先血後氣乃先痛後腫

形傷氣也 羌活 升麻 麻黃 去節各一錢半 桃仁

酒炒各半錢 黄連  
妙 简十 柴胡 防風 黃柏 知母 酒炒各半錢 黄連

甘草 分二 紅花 分一分 二服 水煎食前熱服

羅太無治真定府張大素好嗜酒五月間病手指節腫痛屈伸不利膝膿亦然心下痞滿身體沉重不欲飲食食既欲吐面色痿黃精神減少至六月間求予治之診其脉沉而緩緩者脾也內經云諸湿脾滿皆屬脾土仲景云濕流關節肢

體煩痛此之謂也宜以大羌活湯主之

升麻各一 獨活分四 蒼朮 防風 甘草

歲靈仙 桂枝 當歸 澤鴻各五 分二帖

水煎食前一服食後一服忌酒麵生冷硬物

牛蒡子湯治風熱成歷節手指赤腫麻木甚則攻

肩背兩腋遇暑熱或太便閉牛蒡子 新豆

豉炒 卷活各三 生地二兩 黃蓍半兩

為末湯調二錢空心食前日三服此病胸

膈生痰火則赤腫附着肢節久不退遂成

卷之三

卷六

卷之二

屬風此孫真人預戒也宜早治之

河間大荳孽散

臟晉滯胃中結

間大荳孽散 治周痺走注五臟晉滯胃中結  
聚益氣出毒潤澤皮毛補腎 大荳孽一升炒  
末每服五分溫酒調下空心服加至一錢日三  
服 本草云大荳消淤血破婦人惡血治癆  
痺筋痙脇痛古人多用酒沃豆孽取汗蓋奉

犀角湯 治熱毒流入四肢歷節腫痛  
犀角二兩 羚羊角一兩 黃芩 桔子 射干 大黃 升

羚羊角兩一

黃  
學

施子

射干

大

升

麻

兩各四

鼓  
升

水每二十七八個錢水半鍾煎服

張子和治一稅官風寒濕痺腰脚沉重浮腫夜則  
痛甚兩足惡寒經五六月間猶綿纏靴足膝皮  
膚少有跣露則冷氣襲之流入經絡其病轉劇  
走注上下往來無定其痛極處便率急而腫起  
肉色不變腠理如虫行每遇風冷病必轉增食  
減肌體瘦乏起須人扶所服者烏附姜桂種種  
燥熱燔針看炙莫知其數前後三年不愈一日  
予脉之其兩手皆沉滑有力先以導水丸通經

散各一服是夜瀉三十餘行痛減半漸服赤茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺方是也日三服煎七八錢熱熱然汗出余欲作玲瓏竈法薰蒸血熱必增極諸汗法古方中多有之惟以吐法者世罕知之

丹溪控涎散 治身及脇走痛痰挾死血加桃仁泥丸治走注疼痛 岐靈仙 桔子炒 蒼朮當歸各一 川芎分生姜片水二盞煎半乾入童便半盞竹

分五

甘草

川芎分

肉桂分

桃仁箇

蒼朮

瀝半盞熱服忌肉雞麵  
定痛方 治一切風濕痺痛 乳香 没藥  
地龍 木鱉子肉 金星石 五靈脂等分  
蜜丸彈子大每十丸臨卧酒下  
升麻湯 治熱痺肌肉熱極體上如剝走唇口反縱皮毛黑魚治諸風 升麻分 茯神 人參  
防風 犀角 鎏 羚羊角 犀角各一官桂五錢  
每服五六錢生姜十塊搗碎竹瀝少許同煎至一盞溫服

八珍丸 治痛風走注脚氣頭風 乳香 没藥  
代赭石 穿山甲生用各三錢 羌活 草烏生用各五錢

全蝎箇炒二十 川烏生用不去皮尖一兩 右朱醋糊丸梧

子大每服十十九

四妙散 治痛風走注 蔡靈仙酒浸白芥子一錢五分又五錢 右朱每服  
蒼耳子一錢五分又云是蒼木 羊角灰錢 右朱每服  
下錢姜丁大片搗汁入湯調服 千妙散同

調丸妙

濟生丸活湯 治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛

發作不定 羌活二兩 附子炮去皮脐秦艽桂心  
甘草炙 木香 牛膝酒浸 桃仁 骨碎補  
川芎 當歸 防風各一兩 姜五片每服五六

錢水煎

○痛痺

丹溪編為痛風門今改  
芝以復舊從經旨也

丹溪痛風論曰痛風者四肢骨節走痛也他方謂之白虎歷節風夫氣行脉外血行脉內晝行陽二十五度夜行陰二十五度此平人之造化也得寒則行遲而不及得熱則行速而太過內傷

于七情外傷於六氣則氣之運或遲或速而疾作矣彼痛風者大率因血受熱已自沸騰或耳涉冷受濕取涼或坐卧當風熱血得寒汚濁凝滯所以作痛夜痛甚者行於陰也治當以辛熱之劑疏散寒溫開發腠理則血行氣和而愈然亦有數種治法不能無少異也因溫痰濁血流注為病以其在下焦道路遠非焉附氣壯者不能行故用為引經若以為主治非惟無益而有殺人之毒此病必行氣流溫舒風導滯血補新

赤水珠  
卷十一  
血墜陽升陰治有先後須明腫與不腫可也也可食肉屬火大能動火素有火盛者小水不能制若食肉厚味下有遺溺不已上有痞悶之甚雖魚麵醬醋酒皆斷之先以二陳湯加酒浸白芍藥少佐以黃連降心火看作何應而區處生生子曰按丹溪不以腫分門而以痛風分門謂血先受熱而後受冷溫乃所以為痛夜痛甚行於陰也及戒人不可徒以烏附為主斯言不惟補前人之餘蘊而猶有深意存焉者實懲時俗

與脚氣癆証混治之悞而另立癆門脚氣門分治之而又另分麻木為一門者此尤有見也麻木固亦有濕有痰所致者而氣血不足居多分而治之良有特識設下槩而作風寒湿治則虛虛之禍無有窮已不獨麻木為然而行痛著三痺其中未能無虛者或又作風寒湿治用躁風剛燥之劑太過而氣血為之暗損或氣血先虛而後受邪經曰邪之所湊其氣必虛此皆不可以不慎也陳無擇謂有支飲作痺此均有補

于經文者誠以今之患痛痺者歷之每如丹溪無擇所論治驗數條猶其精工故畢錄之以太法用蒼术南星川芎白芷當歸黃芩在上者加羌活桂枝桔梗威靈仙在下者加牛膝防己木通黃柏治痛風取薄桂者以其味淡獨此能通行手臂領南星蒼术等藥至痛處上方四物湯加桃仁牛膝陳皮茯苓甘草白芷龍膽草在上屬風在下屬溫加藥同俱倍之桂等分無桔梗氣虛者加蒼术龜板炭加南星血虛加芎歸佐以桃仁紅花

因痰者二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮  
周身走痛者或關節間痛而有濕鬱之遇陰寒即發當作溫鬱治

因溫者蒼朮之類佐以竹瀝及行氣藥

或曰有

因於風者小續命湯極驗

因血虛者芎歸之類佐以桃仁紅花

肥人多是湿與痰飲流注經絡

瘦人多是血虛與熱

下部有濕腫痛防已龍膽草黃柏知母固是捷藥

若肥人病此宜蒼朮白朮南星滑石茯苓之類

瘦人宜當歸紅花桃仁牛膝檳榔等同用  
上中下痛風黃柏酒炒蒼朮米泔浸各二  
炒合芳各一 龍膽草分 南星兩 神麴  
錢歲靈仙酒洗桂枝羌活各三 紅花酒洗一  
右為末麵糊丸食前下百丸歲靈仙治上體  
肢節腫痛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動于經絡之中溫熱流注肢節之間而無已也用麻黃去根赤芍藥各一防風荆芥羌活獨活白芷蒼朮歲靈仙片芩枳實桔梗乾葛川芎各五甘草

歸尾升麻各三分 下焦加酒炒黃柏婦人加酒炒紅花腫多加檳榔大腹皮澤瀉更加淡藥一錢定痛丸妙下云脉濇數者有瘀血宜桃仁紅花芳歸及大黃微利之

氣血兩虛有寒濁陰火痛風入參山藥海石南星炭礊陽錢五各一白木熟地黃柏炒黑龜板酒各二兩乾姜炒蒼朮米泔浸右為末酒糊丸

二妙散 治筋骨疼痛因溫熱者有氣加氣藥血虛加血藥痛甚者加生姜汁熱辣服之炒黃柏

妙蒼朮米泔浸右為末沸湯入姜汁調服

二物皆有雄壯之氣表實者加酒少許佐之若痰帶熱者先以舟車丸或導水丸神功丸下伐後以趨痛散服之一法二妙為君如陳皮芍藥各一錢酒炒歲靈仙半錢服之

趨痛散 乳香 没藥 桃仁 紅花 當歸羌活 地龍酒牛膝酒甘草 五靈脂酒香附童便右為末每服二錢酒調或加酒炒芩柏

潛行散 黃柏酒浸為末入湯藥調服治酒濕痰痛風黃柏酒炒歲靈仙酒炒各蒼朮

卷活

甘草三錢

陳皮

芍藥各一錢

右為末

每服一錢或二錢

沸湯入姜汁調服

治氣實表實骨節痛方

滑石飛六錢

甘草一錢

香附

片芩各三錢

右為末姜汁糊丸梧子大

每服五

七十九白湯吞下

治食積肩腿痛

龜板

酒浸炙一兩

酒柏葉

香附五錢

辣芥子

凌霄花一錢半

右末

酒糊

為丸桐子

大煎

四物湯加陳皮甘草湯

上下

丹溪治一男子家貧多勞秋涼忽渾身發熱兩臂

脢及腕兩足并跨皆疼痛如燶晝輕夜劇醫曰  
風藥則增痛與血藥則不効惟待斂而已脉之  
兩手俱濡而數右甚于左飲食則如平時形瘦  
削益大痛而瘦非病也用蒼朮酒黃柏各一錢  
生附子一片生甘草三分麻黃五分研桃仁五  
箇作一帖煎入姜汁少令辣服至四帖後去  
附子加牛膝一錢至八帖後來告急云氣上喘  
促不得睡痛似微減意其血虛因服麻黃過劑  
陽虛被發動而上奔當與補血鎮墜及酸劑收

之遂以四物湯加川芎芍藥人參二錢五味子十二粒與二十帖服之喘隨定是夜遂安三日脉之數減太半滙脈如舊問其痛則曰不減然呻吟之聲却無察其起居則疲弱無力病人却自謂不弱遂以四物湯加牛膝白朮人參桃仁陳皮甘草檳榔入姜三片煎服如此藥與五十帖而安一月後因負重擔復痛作飲食亦減再與此藥加黃芪三分又二十帖全愈

一人年踰六十性急作勞患兩腿痛動作則痛甚

視之曰此兼虛証當補血則病自安遂與四物加桃仁陳皮牛膝生甘草前入姜研潛行散熱飲三四十帖而安

何縣長年四十餘形瘦性急因作勞背痛臂疼骨節疼足心發熱可與四物湯帶熱下大補丸保和丸共六十粒食前服

一婦人脚疼怕冷夜劇日輕 生地 白芍 归尾  
各五錢 黃柏 炒黃芩 白朮 右分四帖水煎

子帶熱服

鮑子年二十餘因患血痢用滋藥取効後患痛風  
喊叫撼隣里予視之曰此惡血入經絡證血受  
濕熱久為凝濁所下未盡留滯隧道所以作痛  
經久不治恐成枯細遂與四物湯桃仁紅花牛  
膝黃芩陳皮甘草煎生姜汁研潛行散入少酒  
飲之數十帖又與刺委中出黑血近三合而安  
朱闡內年三十味厚性急患痛風卒縮數月醫不  
應予視之曰此挾痰與氣症當和血疎瘀草氣  
病自安遂以潛行散入生甘草牛膝枳殼通草

陳皮桃仁姜汁煎飲半年而安  
陸郎左腿久骨舊痛小便赤澀此積憂痰涎所為  
白木 枳殼 赤芍錢一條芩 連翹 通草  
甘草稍三分 右剉水煎服  
丁婦脚久骨痛 蒼朮 白木 陳皮 柴藥分  
木通錢 甘草五分 分二服送大補丸五十  
粒 右丹溪治痛風法主於血熱血虛血污或  
挾痰皆不離四物潛行牛膝甘草桃仁陳皮  
蒼朮姜汁而隨症加減發前人之餘蘊留世

俗之所不能醫其有功於後人也大矣

九痛在胃之脉絡者宜解食毒

許學士醫檢正患鼻額間痛或麻痺不仁如是數年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不開口言語飲食皆妨在額與頰上常如糊手觸之則痛予作足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而不行故有此症或者以排風小續命透髓丹之類與之皆不効製此星角升麻湯贈之數日愈

星角一錢

升麻

防風

羌活

各三

川芎

白附子

白芷

黃芩各五錢

甘草一分

右用四大錢水煎服食後臨卧各一服一日共服四次夫足陽明胃也經云腸胃為市又云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不納如市廛無所不有也以其腐熟飲食之毒聚於胃此方以星角為主解飲食之毒也陽明經絡環唇挾舌起于鼻合頰中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱今所患皆丁經絡也故以升麻佐之餘藥皆滌降風熱升

麻黃芩專入胃經稍通者自能曉。

海蔵四物蒼术各半湯 治肢腫不能舉動。

四物湯蒼术各半兩各煎服効與活血丹相表裏。

活血丹 治遍身骨節疼痛如神。

與蒼术四物各半湯相表裏。

熟地黃三兩

當歸

白朮

白芍

續斷

人參各一兩

右朱酒糊丸如桐子大。

東垣蒼术復煎散 治寒溫相合腦戶痛惡寒項脊強背胛卯痛膝臍痛無方能步行能食身沉重其脉沉緩洪上急。多

蒼术四兩水二碗煎至二大盞去渣入下

羌活錢

升麻

柴胡

藁本

澤鴻

白

术各五分

黃柏三分

紅花一分

右用

蒼术二至三盞

煎至一太盞空心

溫服微汗

為効忌酒麵

緩筋湯

治目如火腫痛兩足及伏菟骨筋痛膝

少力身重腰痛夜惡寒痰嗽項頸筋骨背急痛

目多眵淚食不下

羌活

獨活各二錢

藁本

麻黃

草寇

黃柏

黃芩

歸身

生地

柴胡各三分

生甘草二升麻分

炙甘草

熟

地黃各二錢

蘇木分

蒼木五分

水二千鐘煎熱服

羅太無活血應痛丸 治風溫客於腎經血脉  
滯腰背腫痛，不能轉側。皮膚不仁，遍身麻木，上  
攻頭目，虛腫耳目，常鳴。下注膝，重痛少行，履  
艱難，項背拘急，不得舒暢。常服和血脉，壯筋骨。  
使氣脉宣通。金毛狗脊去毛 大兩 蒼朮米泔浸 十兩  
香附炒 十二兩 陳皮九 没藥一錢 草烏炮 二兩  
歲靈仙三 右朱酒糊為丸，桐子大。每服十五  
丸，不拘時，溫酒或熱湯送下。忌食桃李雀鵝  
諸血物。

烏靈丸 父患風寒，痛風及麻木，行步艱難。  
五靈脂二 川烏一兩 去皮，炮。右朱酒糊為丸，桐  
子大。每服十九丸，加至五十丸。空心溫酒下。忌  
冷物。

史丞相遇仙方 諸般痛風，手足艱難，筋骨疼痛。  
口眼喎斜，言語蹇澁。附子炮去皮 肺。川烏製同。當歸、川芎、肉蓯蓉、酒浸。杜仲、姜炭、羌活、  
黃芪、人參、白术、白芍藥、牛膝、酒浸。防風、天麻、白蒺藜、狗脊炒去毛、草薢。

續断 獨活 肉桂

赤芍藥各二兩

虎脰骨炙酥

二兩

右以生絹袋盛之用無灰酒浸密封瓶

五錢

口春三日夏二日秋七日冬十日取出晒枯

乾為末酒糊丸桐子大用浸藥酒一盞空心

送下五十丸忌生冷油膩草腐麵食發風物

五加皮酒

治風溫遍身疼痛俗名痛風或腫或

癱或脚氣不能復動者

五加皮不拘多少入

白麵內同釀白酒飲之效

丹溪治環跳痛不已防生附骨疽方以蒼朮佐黃

柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加黃芩體虛加  
杜仲牛膝以甘草為使木料煎入酒深者恐木  
柏桂枝十數帖發不動合水以少黃連一二帖又不  
動者恐毒將成掘地成坑以火煅紅沃以小便  
赤體坐其上以被席圍包下體使熟蒸膝理開  
血氣暢而愈

仲景治婦人六十二種風及腹中血氣刺痛以紅  
藍花酒主之紅花一味以酒一大碗煎減半  
服一半頃之再服

虎骨丸

治經絡凝滯骨節疼痛筋脉掣急遇陰

寒愈痛

乳香

沒藥研各另

赤芍藥

熟地

當歸

虎脰骨

酥炙血竭五錢

右末用木瓜一

枚切破去核

入乳香未在內

以麻線繩定勿

令透氣

好酒六升煮酒盡

取木瓜去皮研如

泥更入熟蜜少許杵和為丸

桐子大每服五

十九看病三下眼

麒麟散

治寒溫傳於經絡疼痛不可忍

血竭

乳香

沒藥

白芍當歸各六錢

水蛭

杵碎炒令

射香

各三錢

虎脰骨

酥炙黃五錢

右為末和勻每

服二三錢食前溫酒調下

統言云痛痺五積散佳四肢牽痛關節浮腫殊妙

治白虎歷節風及腫痛者以釀醋五升熱煎三四

沸切葱白二三升煮丁沸瀝出布帛包裹患處

熨之以瘥為度

嚴氏蠲痺湯

治身體煩疼四肢項背拘急或疼

或痛重舉動艱難手足冷痺腰腿沉重筋脉無

力當歸芍藥黃芪羌活

片子姜黃

各一兩 甘草 炙五錢 每服六七錢姜棗煎服  
獨活寄生湯 治肝腎虛弱感風濕致痺兩脛緩  
緩痺弱不仁 入方 方出脚氣門  
河間茯苓湯 寒氣勝者為痛痺宜通氣溫經丸  
治四肢疼痛拘倦浮腫 赤茯苓 桑白皮 各二錢  
丙 防風 官桂 川芎 芍藥 麻黃 去節各一兩半  
每服六七錢枣一枚水煎服繼以姜粥投之  
汗出愈

脚跟痛有血熱有痰血熱者四物加黃柏知母牛

膝之類疾用二陳加南星黃柏附子

○肩背痛 附臂痛

肩背痛不可面顧者此太陽氣鬱而不行或脊痛  
項強腰似折項似折者此足太陽經不通二者俱宜通氣防風湯有因濕熱肩背沉重而痛者當歸拈痛湯有因汗出小便數而久者風熱乘脾脾氣鬱而肩背痛也當瀉風熱則愈宜升麻柴胡湯有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯有腎氣不循故道氣逆挾背而上致肩背

作痛宜和氣飲加鹽炒小茴香少許有勞力或  
看書著棋久坐而致脊背疼者補中益氣湯或  
八物湯加黃芪背者胸之府肺主氣居胸中肺  
氣滯則血脉泣肺氣虛則不能運行陽道肺中  
有痰流注肩背皆能作脹疼

肩背痛乃肺分野之病經云西風生于秋病在肺  
俞在肩背故秋氣者病在肩背太過為病在外  
則令人逆氣背痛悶然也

臂痛

臂為風寒濕所搏或痰流氣滯或因提擎

重物皆致臂痛有腫者有不腫者因于風寒  
五積散加羌活因于濕蠲痺湯多加蒼朮因於  
痰導痰湯因於氣烏藥順氣散因提重傷筋用  
刲勞散或和氣飲加姜黃蓋姜黃能入臂故也  
有久坐卧為風溫所襲但遇外有寒邪所侵即  
痛者宜羌活散有飲酒太過濕痰流注者用二  
陳加南星蒼朮桔梗枳殼桂枝酒芩有血不榮  
于筋者用四物加姜黃秦艽羌活有氣血凝滯  
經絡不行所致者舒筋湯

控涎散 治肩背臂痛如神 方在行痺

控涎丹 加去油木鱉子一桂五錢治臂痛每服二十丸加至三十九妙

丹溪治臂痛 南星 半夏 白术 香附

酒芩各一

蒼朮二錢

陳皮

茯苓各五

歲靈

仙三分

甘草少許

花麫散

治臂痛

紅花

炒神麫炒為末酒調下

姜黃散

治臂痛非風非痰

姜黃

甘草羌活各一

白朮二兩

腰已下痛者

加海桐皮當歸芍藥各一

東垣治臂痛分六道經絡者痛在何經絡之間以行本經藥通其氣血氣通則愈矣若表上諸痛若便擬下之則不可當詳細辨之

右東垣云認經絡用藥蓋以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定之則其臂膿之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之後廉痛者屬太陽經以藁本羌活行之外廉痛者屬少陽以柴胡行之内廉痛者屬太陰以升麻白芷胡青皮行之内前廉痛者屬太陰以升麻白芷

葱白行之內後廉痛者屬少陰以細辛獨活行之并用灸法視其何經而取之也

通氣防風湯 肩背痛不可回顧者此太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛項強腰似折項似拔者此足太陽經不通也 羌活 獨活 各一 藁本 防風 甘草各五錢 川芎 蔓荆子各三

水煎服

當歸拈痛湯 湿熱為病肢節煩痛肩背沉重胃膈不利及遍身疼痛下注于足胫痛腫不可忍

加減當歸飲子 治肩背急痛，當歸 防風  
柴胡 生地 大黃各二錢半芍藥 黃芩 人參  
各一兩 黄連五錢滑石六錢 甘草一兩  
每服六七錢水煎

人參益肺散 治肩背痛汗出小便數而少者風熱乘肺肺氣鬱甚也當漏風熱則愈 升麻  
柴胡 黃芩各一錢 防風 羌活 人參 甘草  
陳皮各五分 藁本三分 青皮 黃芩 白荳蔻各三分

水煎服如面色白脫色氣短者勿服充

舒筋湯  
臂痛不能舉有久常左臂痛或以為飲  
以為風以為溫諸藥悉試繼以針艾俱不効得  
此方服之而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致  
非風非飲非濕腰以下食前服腰以上食後服  
又名通氣飲子

兩各一

赤芍藥

片子姜黃嫩莪术代之

海桐皮去外皮

白朮

甘草炙

當歸各二

甘草炙

羌活

甘草炙

羌活

白朮

當歸各一

治背痛各一

姜黃四

甘草炙

羌活

白朮

當歸各二

羌活

白朮

每服一两水煎

防風飲子

治項筋急痛諸藥不効者各一

黃芪

附子

甘草

蒼朮

陳皮

羌活

防風

桔梗

等分

每服五錢姜一片水煎

丹溪治一男子忽患背胛縫有一線痛起上肩跨至脅前側脇而止其痛晝夜不歇不可忍脉絃而數重取豁大左大于右夫背胛小腸經也必思慮傷心臟未病而肺小腸先病故從背胛起及慮不能決又歸之於膽故痛至脅而

止乃小腸火乘膽木子來乘母是為實邪詢之  
果因謀事不遂所致故用人參四分木通二分  
煎湯吞龍膽丸數服而愈

○著痺治劑

麻木同

經謂濕氣勝者為著痺河間曰著者留著其處而不去或四肢麻木拘牽也經又曰其不痛不仁者病久入深營衛之行澁經絡時踈故不痛皮膚不榮故為不仁夫所謂不仁者或周身或四肢澑然麻木不知痛痒如繩札縛初解之狀

古方名為麻痺者是也靈樞曰衛氣不行則為麻木丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中分而為二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感溫麻木證作者又有因虛而感風寒濕三氣乘之故周身掣痛麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也當以類而推治

丹溪云十指麻木乃胃中有濕痰死血宜二陳湯加蒼朮白朮桃仁紅花附子

脉法 脉沉而濡屬氣虛。閑前得之，麻在上體。閑後得之，麻在下體也。脉浮而緩者，屬濕為麻。痺，脈緊而緩屬寒，為痛痺。脉濶而芤屬死血，為木不知痛痒。

東垣神効黃芪湯 治渾身麻木不仁或左或右半身麻木或面或頭或手臂或脚腿麻木不仁並皆治之。又治兩目緊急縮小羞明畏日，隱澁難開，或視物無方，睛痛昏花，手不得近，或目少睛光，或目熱如火，服五六帖，神効。 黃芪

蔓荆子各二錢 人參一錢 甘草炙一錢 白芍藥各一錢 陳皮五錢  
每服五六錢，如小便淋澁，加澤瀉五分。如有太熱症，加黃柏三錢，酒炒四次。如麻木不仁，雖有熱，不加黃柏，再加黃芪一兩。如眼縮去赤，忌酒醋，濕麵，葱韭，蒜大料等物，及淡滲生冷硬物，麻木重甚者，加芍藥一兩，木通一兩。芍藥補氣湯 治皮膚間有麻木，此肺氣不行也。黃蓍一錢，橘紅一錢，甘草炙一兩，白芍藥一兩，澤瀉五錢。每服一兩水煎，如肌肉麻，必待瀉營氣而

愈。如濕熱相合，四肢沉痛，當瀉濕熱。四瀉古立  
一効神方  
東垣治杜彥遠患左手右腿麻木，木指次指亦嘗麻木，至腕已三四年矣。諸醫不効，脉之曰：麻者氣之虛也。真氣弱，不能流通，填塞經絡，四肢俱虛，故生麻木不仁。與一藥，決三日，効遂製人參益氣湯服二日，便覺手心熱，手指中間如氣滿脹，至三日後，又覺兩手指中間皮肉如不敢觸者，似痺痛滿脹之意。知其氣已遍至，乃於兩手指甲傍各以三稜針一刺之，微見血如黍粒許。

則痺自息矣。又為處第二第二方，服之全安。  
人參益氣湯 治五六月間兩手麻木，四肢倦怠，惰嗜卧。不正乃濕熱傷元氣也。黃芪錢 人參  
甘草生各 五錢 升麻各三 柴胡二錢 五味子一百二十粒 甘草錢二 每六七錢水煎，空心服，後令少睡，於麻痺處按摩屈伸，少時午飯前一服，日二服。  
第二次藥煎服如前 黃芪錢 紅花五 陳皮  
一 錢 澤瀉錢

第三次服藥

黃芪六錢

黃柏三分

橘紅三錢

白芍藥五錢

升麻

澤瀉各二錢

黃芩八錢

五味

子粒百粒

甘草生一分

分四帖

煎服如前

秋涼去五味子

冬月去黃芩

分四服

水煎熱服

除濕補氣湯

黃芪八錢

升麻梢

柴胡

陳皮一錢

草稍六錢

當歸

澤瀉二錢

青皮四錢

陳皮一錢

五味子百粒

紅花半錢

分四服

水煎熱服

治趙節使年七旬病體熱麻股膝無力飲食有汗

妄喜笑善飢痰涎不利舌強難言聲啞不鳴身重如山診得左脉洪大有力是邪客於經絡兩臂外有數癥遂問其故對以燃香所致予曰君之病皆此也夫人之十二經灌溉周身終而復始蓋手之三陽從手至表上行至頭加之以火邪並於陽勢甚熾焉故邪熱毒行散于周身而熱麻經云胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下熱傷元氣而沉重無力飲食入胃慄悍之氣不循常度故多汗心火盛則妄

喜笑，脾胃熱則消穀善飢，肺金衰則聲啞，不鳴。  
仲景云：微數之脉慎不可灸。焦枯傷筋血難復也。  
君奉養以膏梁之味無故加以火毒熱傷于經絡而為此病，明矣。乃製清陽補氣湯服之，不旬日而愈。

清陽補氣湯

荅术四錢

藁本

知母酒浸

當歸

甘草生各二錢

柴胡

黃柏酒浸

黃芪錢三升水煎空心服

麻

陳皮六錢半

五味子

一錢半

每七錢水煎空心服

治李正夫人病，診得六脉中俱弦洪緩相合，按之

合目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為風雖三尺之童皆以為然細核之則非如久坐而起亦有麻木假如繩縛繫之人釋之覺麻木作而不敢動久則自己以此驗之非有風邪乃氣不行也不須治風當補其肺中之氣則麻木自去矣知其經絡陰火乘其陽分火動于中為麻木也當兼去陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外溫在上作也當實其皮毛以溫劑身重脉緩者濕氣伏匿而作也時見

躁作當升陽助氣益血微漏陰火去溫通行經脈調其陰陽則非五臟六腑之本有邪也補氣升陽和中湯主之

補氣升陽和中湯 黃芪

錢

人參

白芍

各三錢

甘草

炙

佛耳草

各四錢

陳皮

白朮

歸身

甘草

生去

黃柏

酒浸除

白茯苓

除湿

澤鴻

同升麻行陽明經

柴胡

草荳蔻

益陽退寒

每服三五錢水煎稍熱服八帖愈

溫經除溫湯 李夫人冬寒霜時病作四肢無力

乃痿厥溫熱在下焦也。醋心者是濁氣不降欲滿也。合眼麻木者陽道不行也。開眼不麻木者目開助陽道故陰寒之氣少退也。頭旋眩運者風氣下陷于血分不伸越而作也。羌活分獨活當歸麻黃去節黃柏各三白芍三錢柴胡黃連黃芪草豆蔻神曲木香  
各二陳皮蒼朮各二錢人參甘草炙白朮  
猪苓澤鴻各一錢升麻五分分二服水煎熟服治肢節沉重疼痛無力之聖藥也。

濕氣風症不退眩運麻木不已除風溫羌活湯主之。  
羌活防風各二錢柴胡獨活甘草炙  
藁本陳皮黃柏川芎各三錢蒼朮  
黃芩各一錢猪苓澤鴻各二錢茯苓二錢黃連一分  
升麻每服五六錢水煎熟服量虛實用之如不盡症候依加減法用之。  
濟世茯苓湯治停飲支飲手足麻痺多睡眩冒  
赤茯苓半夏陳皮各一兩枳實炒桔梗  
甘草炙各半兩每服五六錢姜三片水煎入

宣明茯苓川芎湯 治着痺濕地水氣甚重著而  
不妄多汗而濡者著痺留注不去四肢麻木拘  
挛浮腫赤 赤茯苓 防風 川芎 麻黃  
芍藥 桑白皮 甘草炙 官桂 當歸 各五  
東三枚水煎服如欲出汗以粥投之

五痺湯 風寒濕之氣客留肌體手足緩弱麻頑  
不仁正 片子姜黃一 羌活 白朮 防己各二  
兩 甘草炙五錢 每五六錢姜三片水煎服

續斷丸本事 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

川續斷 當歸 草薢 天麻 防風 大附  
子各一 川芎七錢半 乳香 没藥各五分  
煉蜜為丸梧子大每四十丸溫酒米飲任下  
又增減續斷丸 治寒溫之氣痺滯關節麻木疼痛  
人參 防風 鹿角膠 白朮各二 黃芪  
續斷 茯苓 山茱萸 白茯苓 麥門冬 地  
黃 桂心 山茱萸 白茯苓 石斛各二  
蜜丸桐子大 每服六七十丸空心酒下  
三痺湯 治血氣滯地手足拘挛風痺等疾

川續斷 杜仲錢半两 防風 桂心 人參  
當歸 白茯苓 白芍藥 甘草 黃芪 牛  
膝 細辛各一两 川獨活 川芎 秦艽 生  
地各五錢 每服六七錢 姜三片 杳一枚 水煎  
濟生黃芪酒 治風濕疼痛筋脉痺急身體頑麻  
黃芪 當歸 白术 虎骨 華辭 雲母粉  
木香 防風 官桂 天麻 石斛 茵芋葉  
仙靈脾 川續斷 白芍藥 甘草炙各一两  
用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七

冬十日每服一盞溫飲之常令酒氣相續為佳  
宣明防風天麻散 治風麻痺走注肢節疼痛中  
風偏枯或暴瘡難語內外風熱壅塞 天麻  
甘草 羌活 防風 白芷 川芎 歸尾  
草烏頭 白附子 荆芥穗各五錢 滑石二两  
右末熟酒化蜜少許調半錢加至一錢大熱酒化下  
力運行微麻為度煉蜜丸彈子大熱酒化下  
半丸或十九細嚼白湯下

衍義方

治風冷氣血閉手足體疼痛冷麻

五靈脂二兩

沒藥一兩

川烏頭炮去皮一兩半

乳香錢五錢

右末水丸三錢

彈子大每十丸生姜酒磨服

河間前胡散

治榮虛衛實肌肉不仁致令瘡重

名曰肉芍

前胡

白芷

細辛

官桂

白术

川芎各二兩

附子炮

吳茱萸

當歸

川椒

云子并閉口者生用各二兩

以茶酒三升拌勻同審

丁宿以煉成猪脂膏五斤入藥煎候白芷黃  
宣種紫色瀘其渣成膏病在處摩之凡癥瘕瘡瘍  
皆治併去諸風瘡痒痛傷折墜損凡

摩內背可用之

吳茱萸散 吳茱萸 肉豆蔻煨 麴  
草炙 神曲炒 砂仁各一兩 白术 厚朴  
陳皮各二錢 為末每服二錢空心米飲調下  
腎瀝湯 麥門冬 五加皮 星角各一錢半 杜仲  
桔梗 赤芍藥 木通各一錢 桑螵蛸一錢半  
水二鍾入羊腎少許煎至八分食前服  
加味五痔湯 治五臟痔症 人參 茯苓  
當歸 白芍 川芎各一錢 肝心 五味子十五粒  
細辛七分 白术一錢 脾倍之 甘草五分 姜一片水煎

食遠服ス 肝痺アキ 加酸東アシ 仁柴胡アシハ 心痺ハリ 加遠志アツシ 茯神麥アツシモク 冬尾角アツモク 脾痺ハラ 加厚朴アツモク 枳實砂仁アツモク 加獨活官桂杜仲牛膝黃芪草薢アツモク

活絡丹アツモクダン 治手足寒拳筋脉不舒皆風邪濕毒留滯經絡渾身走注疼痛アツモク 南星アツモク 川芎アツモク 草烏アツモク

地龍アツモク 乳香アツモク 没藥アツモク 各二為末酒糊丸桐子アツモク 大每服五七十丸空心酒下アツモク

青京潤燥湯アツモク 治風熱血燥麻木アツモク 當歸アツモク 生地アツモク

各一錢半 黃連アツモク 黃芩アツモク 芍藥アツモク 川芎アツモク 各一錢半  
防風アツモク 羌活アツモク 荆芥アツモク 各八分 細辛アツモク 六分 甘草アツモク 五分  
水煎服アツモク 麻甚者アツモク 加川烏アツモク 炮過アツモク 以行經絡アツモク  
止麻清痰飲アツモク 治口舌麻木延及口角頭面者アツモク  
黃連アツモク 一分 茱母アツモク 瓜萎仁アツモク 黃芩アツモク 茯苓アツモク  
桔梗アツモク 枳殼アツモク 橘紅アツモク 南星アツモク 用白丸アツモク 角生姜アツモク  
天麻アツモク 甘草アツモク 細辛アツモク 各五分 血虛アツモク 加當歸アツモク 一錢  
煎入姜汁一匙竹瀝三四匙食遠服アツモク  
經驗三妙丸アツモク 治溫熱下流兩脚麻木如火熱アツモク

蒼术六兩

黃柏四兩酒炒

川牛膝酒浸二兩

麵糊丸

桐子大

每服

五七十丸空心淡鹽湯下

仲景治血癥桂枝五物湯 血癥陰陽俱微外証

身體不仁如風癆狀

桂枝

芍藥

各三

生姜六兩

大棗十二枚

水六升煮取二升溫

服七合日三服

木香丸

腸痺腹痛時發食泄氣不消化小便

秘澁

木香

白朮

官桂

蕪荑

良姜

阿魏各一

附子

炮

厚朴

肉蔻

乾姜

甘草五錢半

為末神麵糊丸桐子大每

二十九空心姜湯吞下

○鶴膝風

羅太無

蚯蚓丸

蚯蚓用頭尾全

桃仁

生白附子

阿魏

桂心

安息

桃仁

同研

白芷

各一

乳香

沒藥

炒熟各三分

童便酒浸

北漏蘆

當歸

白芍

牛膝

羌活

地骨皮

歲靈仙

各一

蜜為

瓦彈子

大空心酒化

下一丸昔有久病風瘻

手足指節皆如桃李痛不可忍服之悉愈

宣明方安息用  
胡兆穰全研

丹溪治一人年七十患膝腫痛此血虛而挾溫熱也生地當歸頭白芍蒼朮黃柏炒  
錢川芎桂錢木通一錢分四帖水煎服半  
又一人年近三十厚味多怒秋間髀樞左右一點發痛延及膝晝靜夜劇痛劇惡寒口或渴或不渴或痞或不痞醫多用風藥兼用補血至次年春其膝漸腫痛愈甚食愈減形瘦至春末膝腫大不可屈伸其脉左弦大頬實寸濶甚大率皆

數知其小便必數而短乃作飲食痰積在太陽陽明治之炒柏丁兩生甘草梢犀角屑蒼朮鹽炒各三錢川芎二錢陳皮牛膝木通芍藥各五錢遇暄熱加條芩三錢為細末每三錢與生姜汁同研多少以水盪起煎令沸帶熱食前飲之一日夜四次至半月後數脉漸減痛漸輕去犀角加牛膝龜板半兩當歸半兩如前服又半月腫漸減食漸進不惡寒惟脚膝痠軟未能久立又行去蒼朮黃芩時當夏熱加炒黃柏至一兩

半依本方內加牛膝，春夏用莖葉，冬用根杆取汗，用之効尤速。須新酒肉溫，麵胡椒當，神夏加生地半兩，冬加茱萸桂枝。

接骨丹 治諸風及鶴膝風 防風 牛膝  
當歸 虎骨酥炙各一两 杞子二两半 羌活  
獨活 龜板 秦艽 草薢 松節 二蚕沙  
各一两 茄根二两 蒼朮四两 酒糊丸空心服  
脚筋急痛 淡酒煮木瓜令爛作粥樣用裹痛處  
冷則易丁宿三五度便瘥

○攣

經云肝氣熱，則筋膜乾，筋膜乾，則筋急而攣。又曰：濕熱不攘，太筋緩短，小筋弛長，緩短為拘，弛長為丹溪曰：大筋緩短者，熱傷血也；不能養筋，故為拘；攣小筋弛長者，濕傷筋，不能束骨，故為瘦弱。牽皆屬於肝，主筋故也。

丹溪治王秀濕熱大作，脚痛後手筋拘挛，足乏力，生地當歸川芎白朮各二錢 蒼朮一錢 木通甘草分三錢煎湯下，大補丸三十丸。

木其大補丸炒煖用

薏苡仁散 治筋脉拘挛又風濕痺 薏苡仁一  
斗搗散以水二升取末數匙作粥空腹食之衍  
義云筋急拘挛有兩等內經大筋受熱則縮而  
短故攣急不伸則可用薏苡仁若因寒筋急則  
不可用也

有寒攣 經曰寒多則筋掣骨痛

本事云張德操內子昔患筋掣脚不得伸屈逾年  
動則令抱持求醫于泗水楊吉老曰此筋病下

三方一年而愈 治筋極養血地黃丸春夏服之  
熟地 蔓荆各分山茱萸五錢狗脊 地膚子 白朮 乾漆  
鱉膏炒 天雄 車前子各三分 草薢 山芋即  
藥澤瀉 牛膝各一 為末煉蜜丸桐子大每  
服七十丸酒下 治筋痺肢節東痛羚羊湯秋服之羚羊角 肉桂  
附子 獨活各一兩半 白芍藥 防風 芳薷各一  
兩 每服五七錢水煎姜三片一日三服

治寒冷溫漚留于筋脉縮不能轉側烏頭湯冬用之  
大烏頭 細辛 川椒 甘草 秦艽 附子  
官桂 白芍各一兩 分 乾姜 防風 當歸 白茯苓各二兩

獨活錢半兩 三每服三錢東二枚

水煎空心服入

千金薏苡湯 治筋挛不可屈伸 故仁 白欽芍藥 桂心 乾姜 酸枣仁 甘草 牛膝

各一兩 附子一枚

醇酒二斗 清一宿微火煎三

沸每十升日三服扶杖起行不耐酒服五合

活血通經湯 董監軍鵝雪初霽因事到真定忽

覺風氣暴作六脉俱弦甚按之洪實有力其症手挛急大便閉澁面赤熱此風寒始加于身也四肢者脾也風寒傷之則挛痺乃風濕未疾而寒在外也內經云寒則筋挛正此謂也平素多酒實熱乘於腸胃之間內則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急搐用黃柏之苦寒以濁實熱而潤燥急救腎水用升麻乾葛以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熟入手陽

明之經為引用潤燥復以芍藥甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加入參以補元氣為之輔佐加當歸身去裏急而和血潤燥名之曰活血通經湯 升麻 葛根當歸 人參 甘草炙各一錢桂枝 黃柏酒炒各二錢白芍藥分五 水煎熟服令暖房中近火摩搓其手乃愈

虛擣 經所謂虛邪搏於筋則為筋掣又云脉弗榮則筋急 仲景云血虛則筋急此皆血脉弗

兼于筋而筋成掣故丹溪治掣用四物加減本事方治筋急極用養血地黃丸蓋本乎此也丹溪治一村夫背僵後而足掌已成廢人脉之兩手皆沉弦而濡遂以戴人煨腎散與之上吐下瀉過月餘又吐瀉交作如此凡三帖然後平復煨腎散 甘遂末三錢煅猪腰子細批破益椒淹透摻藥末在內荷葉包裹火內燒熟溫酒嚼下蒼耳湯 治風濕痺四肢拘掣 蒼耳子三搗末水一升半煎七合服 木瓜粥裹筋痛處佳

方見鶴膝

○丁身盡痛

綱目云丁身盡痛其病暴似傷寒屬濕痺並見傷寒太陽症門其留連難已者於此求之寒而一身痛者甘草附子湯熱而痛者當歸拈痛湯甘草附子湯治風濕相搏骨節頑疼掣痛不能屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不能發去衣或身微腫者甘草白朮各一桂枝丙附子炮一分四帖水煎服活人書云

身腫者加防風一兩，悸氣小便不利者加白茯苓一兩半

東垣當歸拈痛湯治濕熱相搏肩背沉重疼痛上熱胃膈不利及遍身疼痛方見脚氣門東垣麻黃桂枝升麻湯李夫人患渾身麻木睡癰則少減開目久則全已閉目則麻復至此症用藥已全去又因家事不和心中煩惱遍身骨骼疼身體沉重飲食減少腹中氣不轉運

麻黃 人参 升麻 黃芪 各五 桂枝 甘草

白木 茯苓 澤瀉 各三 陳皮 半夏 草  
荳蔻 厚朴 黃柏 附子 各二 木香 生姜  
各一分 水煎熟服

本事方 治遍身皆痛如勞者若傷寒身躰痛者  
不可服但少年虛損冷憊老人諸疾皆治之  
人參 黃芪 附子 炙甘草 木香 羌活  
知母 芍藥 川芎 前胡 枳殼 桔梗  
白术 當歸 茯苓 半夏 各五 柴胡 鱉甲  
醋炙各一丙 酸棗仁 桂心各三分 杏仁炒五分 每服

二錢姜片烏梅箇葱白寸同煎空心服

○產後身痛

薤曰 趁痛散 產後氣弱血滯遍身疼痛身熱頭  
疼 當歸 牛膝 桂心 白木 黃芪 獨  
活 生姜 各五 甘草 薤白 各三分  
每服五六錢水煎

五積散加酒煎 治感寒頭疼身痛 方見傷寒  
與四物湯各半服之治一身痛甚穩加桃仁治  
腰痛逐敗血去風濕

大全牛膝散 產後遍身青腫疼痛及衆疾

牛膝 大麥芽為細末以新瓦罐子中填一層

麥芽一層牛膝如此填滿用鹽泥固濟火煅赤

放冷研末但是產後諸疾熱酒調下二錢

金東丹

治一切風疾等症 川烏

生皮用去

兩頭

尖 防風 白芷 獨活

蔓荆子 荆芥

各四

丙 白木

羌活

細辛

錢

全蝎

姜桑

天麻

歲靈仙

丙

雄黃

木香

乳香

各

荳木

川芎

丙

何首烏

八錢

沒藥

草

烏各一 藜本二兩當歸三兩  
右末糯米糊丸  
兩半

東樣大金箔為衣每服一錠傷風流涕好酒化下 中風不語生姜湯下左癱右瘓好酒調下 白虎歷節風遍身走痛生姜湯或好酒下 破傷風昏倒在地牙關緊急好酒調服仍磨敷患處 雷頭風并乾癬麻痺溫酒調服洗頭酒服 偏正頭風及夾腦風研末吹鼻中吐涎再用生姜斗調藥全兩太陽穴仍用茶清調服 風狗咬傷噙水洗淨敷

之 螨蛇傷咬噙水洗過敷之 蛇傷入白礬少許敷患處就以津唾調搽亦可 蟑咬唾調搽 痘漏口漱漿水洗過敷之 多年惡瘡口不合者口漱鹽水洗過敷之徐收 嘴漱桑白皮湯調服 紅絲魚眼褲脚腦疽發背疔瘡裡外癰瘡用自己小便洗過井水調敷薄紙貼上再用裏外搽之 丹瘤井花水調藥蛾毛掃二三次 不發灸瘡噙水洗過貼上三三次起發方止 大宮瘡少溪吳馭閣校終

