

30

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0

武9
516
191

赤水珠

十八



門十武
卷19
116

赤水玄珠第十八目錄

癲狂瘡門

顫振

癲癇

瘡症門

不得卧 附多卧

煩躁

健忘

卷之三

厥臥

不寐

目眩

氣逆

目眩

寒熱

目眩

赤水玄珠第十八卷

新安生生子孫一奎著輯

○癲狂癇門

此三證太旨已於醫旨緒餘中詳言之矣當參看

生生子曰靈樞云癲癇癲癩不知所苦兩蹻之下

男陽女陰

後入以癲癇為之又曰暴擊癇眩足不

○明癲症

書云多喜為癲多怒為狂難經謂重陰者癲重陽者狂

素問厥論篇曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見而妄言長刺節論篇曰病之初也歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病又通評虛實論篇曰癲疾厥狂久逆之所生也脉搏大滑久自己小堅急死不治虛可治實則死

靈樞癲狂篇曰癲疾始生先不藥頭重痛視舉目赤甚則極已而煩心喘呼喘悸先反僵因而脊痛又有骨癲筋癲脉癲嘔多沫氣下泄者不

治又曰癲疾者疾發如狂者死不治據此言疾死不治可見癲狂非一病也

素問奇病論篇黃帝曰人生而有病癲疾者病名何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾啓玄子注曰癲謂之子發頭首也

綱目曰以其病在頭顱故曰顱疾治之者或吐痰而鉗高越之或鎮墜痰而從高擗之或內消其痰邪使氣不逆或隨風寒暑溫之法用幹劑發

散上焦或針灸頭中脉絡而導其氣皆可使頭
巔脉道流通孔竅開發而不致昏眩也是失癲
癲之癲與厥成癲疾眩冒癲疾之癲一疾也王
註悞分癲為二疾獨孫真人始能一之今特別
此氣亂頭癲等經文於癲癇篇首使以知疾有
所歸而治有所據也

王機微義曰按內經言癲而不言癇古方以癲癇
或併言或言風癇或言風癲或言癲狂所指不
一蓋癲病歸于五臟癲病屬之於心故今以風

癲另立一門而癲狂合為下門也

生生子曰按此以風癇另立一門則其不與癲狂
相類則是之矣而云癲狂合為一門今終集考
之並無癲狂門目豈未之補歟

孫兆治相國寺僧克忽患癲疾半年名醫皆不効
乃孫療之孫曰但有醜物燶與食之但待夜渴
可來取藥今夜睡着明日便愈也至夜僧果渴
孫乃與酒一角調藥一服與之有頃再索酒與
之半角其僧遂眠兩晝夜乃覺人事如故僧謝

之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此乃羣方中殊砂酸棗仁乳香散也人不能用耳

辰砂散 治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目，

魂魄不守醫藥無驗

辰砂

光明有牆
壁者一兩

酸棗仁

微炒半兩

乳香

半兩

各為末右量患人能飲酒幾何先令恣飲但勿令吐至靜室中以前藥都作一帖溫酒調

下作二盞調之令頓飲如飲酒素少者但隨量取醉服藥訖便安置床枕令卧病淺者半日至一日病深者二三日令人同之鼻息匀調但勿喚覺亦不可驚觸使覺須待其自醒則神魄定矣萬一驚寤不可復治正肅吳公少時心病服此一劑五白方竊遂瘥。經云悲哀動中則傷魂東傷則狂妄不精不精則不正此悲哀傷竟而狂當用溫藥補魂之陽仲景方以地黃湯本事驚氣丸之類即

是也

經云喜樂無極則傷魄，魄傷則狂。狂者意不存入此，喜樂傷魄而狂，當用涼藥補魄之陰，辰砂鬱金白礬之類是也。

濟世方 治失心

鬱金七兩 須四川
蟬肚者乃真

明礬三兩

為末薄糊為丸，桐子大，每六十九湯水，任下。昔有婦人癲狂數年不愈，後遇至人授此方。

初服覺心胸中有物脫去，神氣酒然，再服頓

甦至人云此病憂驚得之，痰聚心竅，此藥能去鬱痰。

○明狂症

靈樞癲狂篇曰：「狂之始生也，先自悲也。」喜忘善怒，善忘，得之憂飢及狂之發，少卧不飢，自高賢也。自辨智也。自貴倨也。善罵詈，日夜不休，狂言驚善笑，好歌舞，妄行不休者，得之大恐，目妄見耳妄聞，善呼多食，善見鬼神，善笑而不發于外者，得之有所大喜，

林億公曰狂為痰火盛實癲為心血不足狂病咀大吐下

生生子曰據此言心血不足者乃醫治攻尅太過以致中氣餒弱而神志不定非癲病一起初便有此不足症也

丹溪曰神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熟當清心除熱如痰逆心竅當去痰寧心大率多因痰結於心胸間治當鎮心神開痰結亦有中邪而成此疾者太寒是熱又曰狂病宜大吐

下則除之

素問云陽厥強怒飲以鉄落狂怒出于肝肝屬木之意予曾用數次果效考本草能治鬼打鬼注安心神治驚邪主癲癇鎮心熱狂走除胃膈中熱氣痰涎

病能篇帝曰有病狂怒者此病安生岐伯曰生于陽也帝曰陽何以使入狂岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾其候也曰治之柰何曰奪其食即已夫食入

於陰長氣于陽故奪其食即已使之服以生鉢落為飲生鉢落者下氣疾也

夫狂之為病少_レ卧少_{タマス}則衛獨行陽不行陰故陽盛陰虛令昏其神得睡則衛得入於陰而陰得衛填則不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣

王海藏治許氏病陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六脉舉按無力身寒如冰后發則呻呼聲高內經云奪其食即已因不與之食乃以大承氣湯

下之得臟腑積穢數升狂稍寧數日復發下如此五十次行太便數斗疾瘥身溫脉生良愈此內經奪食法也

保命當歸承氣湯

當歸

大黃各一

芒硝七兩

甘草五錢

右每半兩水一大碗姜五片末十枚煎至半溫服若陽狂奔走罵詈不知親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加姜棗者胃屬土此引入胃

也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以
大利為度微緩以瓜蒂散入防風末藜蘆末
吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散
解毒湯等調之安

明癥症

生生子曰癥瘍火所致前人有稱為風癥者劉河
間謂由熱甚而風燥為其兼化涎溢胸膈而癥
痰脅胃僵仆也

東垣曰病癥者涎沫出于口冷汗出干身清涕出

于鼻皆陽蹻陰蹻督衝四脉之邪上行腎不竝
煎熬沸騰上行為之也此奇邪為病不係五行
陰陽十二經所拘當從督衝二蹻四穴奇邪之
法治之

癥症亦從衝任督三脉氣逆而發者當尋此三脉
治之○督脈尋長強據骨間灸之○任脈尋氣
海陰交衝脈附足少陰脉上行去中行各五分
陰交穴乃任脉陰衝之會

潔古曰晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻各二七壯陽蹻

卷之九
九十一
起於跟中循外踝上行入風池申脉穴也陰躋亦起于跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉照海穴也

劉宗厚曰癲癇與痓畧相類而實不同其病發身軟時醒者謂之癲身強直反張如弓不時醒者謂之痓病隨其痰之潮作故有時而醒痓病比癲為甚而有挾虛者故因其昏冒而遂致亡者多矣

綱目曰癲癇即頭眩痰在膈間則眩微不补痰溢

膈上則眩甚仆倒于地而不知人名之曰癲癇徐嗣伯云大人曰癲小兒曰癇其實一疾也然與中風中寒中暑尺厥等仆倒不同凡癲癇仆時口中作聲將省時吐涎沫省後又復發時作時止而不休息中風中寒中暑尺厥之類則仆時無聲省時無涎沫後不復發間有發者亦非如癲癇常發狀也

千金方云病先身熱掣瘲驚啼叫喚而後發癲脉浮者為陽癲病在六腑外在肌膚猶易治也病

先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沉者為陰
癇病在五臟內在骨髓為難治也劉宗厚謂此
論癇之陰陽後世有認為寒熱者悞也蓋此疾
皆以痰熱所作而得在裏而淺為陽故云易治
入裏而深為陰故曰難治乃表裏淺深之謂非
寒熱之謂也

張子和曰夫癇病不至目瞪如愚者用三聖散投
之更用火盆于煖室中令汗吐下三法並行次
服通聖散百餘日則愈矣至于目瞪愚者不可

治內經曰神不守謂神亂也大凡此疾乃肝經
有熱吐後可服瀉青丸下之劉宗厚謂多由風
痰膠固胸膈上下故大法先宜吐之吐後可用
清熱之藥如東垣安神丸守真龍會丸之類皆
可服不獨通聖散也痰實在裏不解宜導痰清
熱亦不獨瀉青丸也

劉宗厚曰按癇病古方或云風或云驚癇或云癲
癇由此疾與中風顛狂急慢驚相類故命名不
同也原其所以或在母腹中受驚或因聞大驚

而得蓋小兒神氣尚弱驚則神不守舍空則
痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲以
致痰迷心竅而作者治法必當尋穴尋痰而論
前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清
痰若有頑痰膠固者此藥未易驅逐在上者必
先用吐後方宜服此更有痰實在裏者亦須
下之隨病輕重而用也或曰癇有陰陽何也予
曰此與急慢驚者可同論也陽癇不因吐下由
其有痰有熱客于心胸之間因聞大驚而作若

盛熱雖不聞驚亦自作也宜用寒藥以政治之
陰癇亦本于痰熱所作醫以寒涼攻下太過損
傷脾胃而形成陰宜用溫平補胃燥痰之藥治
之若曰不因壞症而有陰陽之分則是指痰熱
所客表裏臟腑淺深而言癇病豈本自有陰寒
者哉

丹溪曰癇屬驚與痰不必分五等大率行痰為主
黃芩黃連瓜蒌半夏南星隨痰火多少治之無
有不愈有熱以涼藥清其心此症必用吐

吐後用平肝之藥青代柴胡川芎之類

素問大奇論篇云心脉滿大癟痹筋掣肝脉小急

癟痹筋掣

凡多癟必湏先下之乃可灸不然則氣不通能殺入針則不拘鳩尾穴必高手乃可下針但宜灸亦不可多壯壯多則令人健忘

心癟面赤心下熱短氣喘息灸巨缺三壯

肝癟面青反視手足搖動灸丘墟三壯

脾癟面黃腹大善利胃脘并脫傍一寸各三壯衝

陽隱白

肺癟面白口吐沫灸肺俞少商少陽各三壯

腎癟面黑正直視身不搖如尸厥金戶少海至陰

湧泉各三壯刺一分

治癟之劑始治多用攻痰法繼以養心壯神補劑收功

礬丹丸治五癟五癟無拘隂陽冷熱

虢丹 晉礬各一右用磚鑿一窠可容二兩

許先安丹在下次安礬在上以炭五斤煅令

炭盡取出研細以不經水猪心血為丸如棗

豆大每服十九至二十丸橘皮湯下

元戎二白丸 治癲與癇

白礬一兩以湿麵包蒸熟去麵入輕粉三五分量虛實加減丸如桐子大每服二三十丸生姜湯下小兒丸小些

鷗頭丸

皂角五條
酥炙

鷗頭

一枚燒

號丹

五錢

研細

右末糯米糊為丸

菉豆大

每服十五丸

加至

二十九丸米飲下

神應丸 治風癲久服其痰隨糞而下

生明礬一兩

臘茶

五錢

右末蜜丸桐子大每服三十丸臘茶下

乳硃丹

乳香

硃砂

飛

右用乳香熔化拌和硃砂丸如龍眼大每服

丁丸以側柏葉浸酒磨化溫服

天冬散 治風癲脇痛耳鳴吐逆

天門冬去心皮乾為末酒調下二錢

寶鑑龍腦安神丸 治男婦五種癲癇無問遠近
發作無時 地骨皮 麥門冬 桑白皮

甘草 人參各二 茯神三 馬牙硝二
兩 金箔大者

射香 水片錢各三 牛黃五 烏犀一
兩

硃砂二

金箔五帖

右細末煉蜜丸彈子大金箔為衣如風癇病
冬月溫水化下夏月涼水化下不拘時二三十
歲者日進二服小兒十九分作二服虛勞
發熟咳嗽新汲水化下

茯苓丸 常服治心疾良驗

人參

石菖蒲

遠志

茯神

茯苓

辰砂

飛

南星

半夏麴

真鐵粉

各等分

右末姜汁打糊丸桐子大另用辰砂為衣每

服十九丸加至三十九夜卧姜湯下

養心湯 治心虛血少驚惕癲疾

黃蓍

茯苓

茯神

半夏

川歸

川芎

各五

錢

酸棗仁

柏子仁

五味子

人參

遠志

桂心

各二

錢半

甘草

錢四

加姜枣水煎服

加赤茯苓檳榔治停水怔悸

星黃湯 治心風及邪祟

南星 大黃 等分水煎服 吐痰

蓋珠丸 治心恙及邪祟

猪心血

硃砂一

乾青龍花一匙

先將猪心血同靛花研勻入硃砂末和丸桐子大每二十丸茶酒任下甚者不過三服

治癩癪

經驗方一宗四方先服此一劑伐邪

竹茹錢一

半夏麵八分

枳實 橘紅

甘草各一錢

水煎服

五分

山梔炒黑一錢半

玄明粉

燈草各三

加姜末

第十二次服方可服

三劑又服前方一劑又再服此

方三劑

人參一錢

黃芪五分

歸身錢一百合二錢

酸棗仁生三分

熟酸棗仁四分

貝母

小草各一錢

麥門冬生五分

白芍藥吳茱萸炒過八分各二錢

姜片三

東枝

茯神

酒紅花各二錢

甘草梢各三錢

紫淮車一具洗淨砂鍋煮爛入鹽少許與服後

半月勿服藥覺少減又服前方一劑第二方三
劑又再服下項九藥仍將前二藥間服

丸藥方

牛膽南星八錢、真牛黃四錢、辰砂三錢、真射香三分
煮甘草膏為丸、芡實大金箔為衣、薄荷湯下半斤
清神湯 治痰迷包絡心熱癲癇半錢
茯神 黃連各二錢、酸棗仁炒、石菖蒲、柏子
仁肉 遠志各二錢、甘草五分、水煎服
痰盛者加南星半夏橘紅瓜萎竹瀝姜汁半錢

海藏治癲癇狂邪不欲眠自賢自智妄行不休
方能安五臟下心氣
白雄鷄一隻煮熟五味調和你羹粥食之
仲景防已地黃湯 治病如狂狀妄行獨語不休
無寒熱其脉浮夢 防已一錢、桂枝、防風各三錢
甘草二錢右以酒一杯漬一宿絞取汁生地黃二
斤蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地
黃汁和勻分三服効
一醉膏 治心急無灰酒二碗香油四兩和勻

用楊柳枝二十條逐條攬丁二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒時或吐下即安矣

治狂之劑

漏心湯 治心受積熱譏語發狂踰牆上屋

大黃 黃芩 黃連

每四錢水煎服漏數行然後用安神藥調理苦參丸 治狂發無時披髮大叫殺人不避水火

苦參為末蜜丸梧子大每服十五丸薄荷湯下

調胃承氣湯 治狂方在火熱門

大承氣湯

治陽明大實發狂 方在傷寒門

抱膽丸

治癲狂不定非輕剝所能愈者

水銀二

黑鉛一

辰砂

乳香各一

右將鉛入銚內熔化離火畧冷入水銀攬硬研碎入辰砂乳香乘熟用柳木槌搗勻丸如芥實大每服一丸灯心湯下病者得睡切莫驚動嘗采即安再進一丸又方以猪心血為丸井水吞下用治狂言妄語

牛黃瀉心湯 治心經邪熱狂言妄語心神不寧

牛黃 水片 硃砂各一錢半

大黃生一兩

右末每服三錢生姜蜜水調下

六神散 治發狂

此二方皆禁火

寒水石 黃連童便炒各一兩

丹皮三錢

青礞石過煅

龍膽草各五錢

水片二分

右末童便

調下

鎮心丹

治驚悸自汗心煩短氣喜怒悲惡不自

知忘魂失魄

狀若神靈所憑及男子遺泄女子

帶下

辰砂飛白礬

枯

右末水丸鷄豆大每十九個參湯下

婦人熱入血室發狂不認人以保命集牛黃膏妙

牛黃

二錢半

硃砂

麝金

丹皮各三錢

甘草

冰片

各一錢半

右末

煉蜜丸

東子大新汲水化下

本事方寧志膏

治狂不睡

人參

酸棗仁

各一兩

辰砂五錢

乳香

二錢半

右末

煉蜜丸

彈子大每十九薄荷湯化下

予族弟緣兵火失心

與此方服二十丸良愈

親舊多傳去服之皆驗

治癇之劑

碧霞丹 治五種癇疾時作搐掣痰涎壅塞牙關緊急心神迷悶目睛上視

石碌

研九度
飛一兩

附子尖

七枚

烏頭尖

七枚

鷄梢

一枚

右末麵糊丸

芡實大每用薄荷湯化下

十九

更以酒半合溫服之湏臾吐出痰涎然後隨症治之口噤者斡開灌之

仲景風引湯 陰熱治癲癇又治大人風引小小驚癇癲癆日數十發醫所不療又治脚風

大黃 龍骨 乾姜各四桂枝三甘草 牡蠣
名二寒水石
兩 赤石脂 白石脂 滑石

膏

紫石英各六

右粗末

以韋囊盛之

取三指

撮井花水三升煮

三沸溫服一升

治風熱癲癆

無不效

勿用渣

犀角丸 治風癲癇發作有時揚手擗足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末

錢五

赤石脂

兩三

朴硝

兩二

白姜茶

兩一

薄荷葉

兩一

右末麵糊丸

梧子大每服二十丸

至三十九溫水下日三服不拘時如覺痰多即減數忌油膩燙矣

楊氏家藏五癇丸 治癲癇不問新久並宜服之
南星 泡烏蛇肉 酒浸一宿去皮骨焙乾兩
半全蝎 尾炒去頭 半夏酒洗焙二兩 雄黃一錢
足炙 姜蚕炒兩 半白附子炮半射香三錢
蜈蚣 条右先將皂角搗碎水半升搗汁與白礬同熬
乾為末入各藥末以姜汁打麵糊丸桐子大
每服三十丸姜湯下

丹溪金丸丸 治諸癇

明礬 醒金 防風 牙皂角各一

川芎二兩

蜈蚣一條

右末蒸餅糊丸梧子大空心茶下十

五丸一日除根

錢氏五色丸 治五癇

辰砂五錢水銀半錢雄黃飛珍珠一鉛三兩同水

右朱蜜丸麻子大每四五丸金銀薄荷湯下

三因六珍丹 治風癇失性顛倒欲死或作五畜

等聲掣縱吐沫久而方甦

上

丹砂五錢 水銀一兩 鉛二兩與水 硫黃 雌黃
珍珠各兩

一右細末，煉蜜丸梧子大。每服三五丸。

姜束湯下丸共一錢 此藥須要搗二三萬杵。不然丸難

嚴氏控涎丸

治諸癇久不愈，頑涎聚散無時。

生川烏

半夏

姜參

不炒以生姜自然汁浸一夕各五錢全蝎

去尾七枚

鐵粉三錢

甘遂半錢

右生姜自然汁打薄糊為丸，菉豆大硃砂為衣。每服十五丸，食後姜湯下。忌甘草。此下痰劑也。

千金龍膽湯

治嬰兒血脉盛實，四肢驚掣，發熱

并諸驚癇。

龍膽草

鈎藤

柴胡

黃芩

桂枝

芍藥

茯苓

甘草各六錢

蟬娘

二枚

大黃一兩

右水一升煮取五合服之。

本事人參散

治諸癇并慢脾風，神昏痰盛。

人參五錢

南星

一兩切片以生姜汁并漿水浸煮過性晒乾為末

斷癇丹

治因驚成癇者。

黃芪

鈎藤

細辛

半夏

南星

菖蒲各三錢

赤水玄珠

卷之六

七

錢 蟬退 甘草 桂心 遠志 防風 露蜂

房各二錢 杏仁二錢 煉蜜丸 荟豆大用硃砂麝少

許為衣每服二十丸束湯下日二服夜一服
甘遂丸 甘遂不姓者三錢為細末將猪心剖開
入甘遂以線縛定用紙裹數層慢火煨熟不可
令焦取甘遂乘潤入辰砂末一錢搗勻作四丸
每服一丸猪心煮湯下

蛇黃丸 蛇黃小者二十枚以猪膽汁拌勻入火
煅通紅取出地上出火毒研極細 右用狗膽

一枚取汁和粟米飯丸菉豆大每服十五丸
溫酒下吐涎乃効

蛇黃丹 治諸瘡及小兒急驚風

蛇黃四枚磁盞內煅紅以 猪胆汁一碗淬乾 白附子 南星 辰

砂

另研

麝香

各五錢

右末

稭米糊丸

桐子大

每服量

太小或一二丸或三五丸溫酒米湯任下

當歸龍膽丸 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸
癇搐 即龍會丸 方在脇痛門

補胃燥痰丸 治陰癇服涼藥太過損傷脾胃

上

白术二錢 蒼术一錢 陳皮 半夏 南星 茯苓 各半

木香一錢

藿香七分

甘草四分

甚者加附子五分

姜五斤水煎服

寶鑑沉香天麻丸 治小兒四歲因長老摩頂受記生人念呪恐懼發搐痰涎有聲目多白睛強項背一時許方醒後每見皂衣人即發多服犀角腦射鎮墜之藥已四年餘無功又添行步動作神思如痴脉沉弦而急針經云心脉滿大癇癆筋挛病以氣弱多服鎮墜寒涼之劑復損

正氣故添動作如痴先灸兩蹻各二七壯次服此藥

又肝脉小急蓋小兒神氣尚弱因而被驚神思無依又動于肝肝主筋故癇癆筋挛

沉香 益智 川烏各二錢 天麻 防風 半夏

附子炮各三錢 巷活五錢 甘草 當歸 姜桑各一錢半

獨活四錢 紏經云恐則氣下精氣怯而上焦閉以

巷活獨活苦溫引氣上行又入太陽為引用以爲君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫

以補氣血之不足，養胃氣以為臣，附子、川烏、益智、大辛溫行陽退陰，又治客寒傷胃腎，主五液入脾為涎，以生姜半夏燥濕化痰，沉香辛溫肺重氣清去怯，安神故以為使。每服五錢生姜三片水煎去渣，溫服食前三劑愈。

劉宗厚曰：按癇症本從熱治，然亦有壞症而成陰者，如錢仲陽所治王氏子吐瀉諸醫藥下之至虛，變慢驚，手足癱瘓而身冷，醫復與八正散，錢氏曰不能食而胃中虛，若利太小便，即死，久則

脾腎俱虛，當身冷而閉，自必用益黃散，史君子丸補脾，遂能飲食後，又不語。錢氏以地黃丸補腎，一月而安，皆此意也。此方用大熱之藥，乃得權以救前治之失，非常治之道也。

審佗僧 治暗風癇癪，以開痰迷心竅

審佗僧成塊者，纏以鐵線，又用鐵線掛火中煅紅，用酒醋一升淬盡，出火毒為極細末，每服一錢，射香湯調下。

許學士驚氣丸 發則牙關緊急，涎潮昏塞，醒則

精神君知

附子 木香 姜桑 白花蛇 橘紅 天麻
麻黃 乾蝎 天南星姜汁浸一
夜各五錢 蘿子一
兩
硃砂二錢半
為末

右為末加冰射少許煉蜜丸如龍眼大每服
丁丸金銀薄荷湯化下溫酒亦可此予家秘
方也一軍人犯法臨刑得釋縛精神頓失
病與丁丸服訖而寐及覺病已失矣丁婦因
避盜失心數年授此方不終刺而愈又丁婦

狂歟者十年諸治不驗予授此方去附子加鐵
落亦不終刺而愈鐵粉非祖化痰鎮心至如摧
抑肝邪特異若多恚怒肝邪太盛鐵粉能制伏
之此金制木之意也

顫振門

生生子曰顫振者非寒禁鼓慄乃木火上盛腎陰
不充下虛上實實為痰火虛則腎虧法則清上
補下

新寒馬叟年五十九因秋久稅官杖六十得驚氣

成風槁已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺口目張瞪唇舌嚼爛抖擗之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜卧發熟衣被盡褰遍身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能繩傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若降暑時不過十涌耳湧奪則愈矣今已秋寒可三之始更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服漏劑則痰一二升至銳又下五七

行其疾小愈待五日耳一涌出痰三四升如鷄黃成塊狀如湯熟叟以手顫不能自探妻與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約十二時許稍省又下數行立覺足輕顫減熟亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筋殊至三涌病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退蓋太疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑溫之恐反成他病也

生生子曰據戴人此治非真知其為疾火盛實者

莫敢如此療也木之有餘由金之衰弱病既久恐亦有始同而終異者况吐汗下之後謂絕不必補養得乎病之輕者或可用補金平木清痰調氣之法在人自斟酌之

摧肝丸 鎮火平肝消痰定顫

膽星 鈎簾 黃連酒炒 滑石飛 鐵華粉各一
青黛三錢 姜蚕炒五錢 天麻酒洗二兩 辰砂飛五錢 大甘草
右末以竹瀝丁碗姜汁少許打糊丸 蒸豆大
食後及夜茶下丁錢五分忌鷄羊

本事鈎藤散 治肝厥頭搖眩運能清頭目
鈎藤 陳皮 半夏 麥冬 蓼芩各七分 人參
甘菊勿悞用野菊花 防風各五分 石膏一錢 甘草三分

姜二片水煎服

參术湯 氣虛顫掉

人參 白朮 黃芪各二錢 茯苓 甘草 陳皮
各一錢甚者加附子水煎服
統旨秘方補心丸 心虛手振
當歸 生地各二兩半 川芎 甘草 人參各一

柏子仁 酸棗仁各三
遠志去心二
辰砂飛

膽星各五
金箔二十片
麝香一錢琥珀錢
石菖蒲六錢

茯神去皮心七錢
為末飪餅糊丸

菉豆大辰砂為衣

每七八十九丸津嚥下或姜湯下

統旨秘方定心丸 老人戰動風氣所致及血虛而振

天麻熟

秦艽去頭

全蝎尾

細辛各一

熟地 生地 川芎 川芎 茯苓酒洗

黃芪各兩

歲靈仙酒洗

防風

荆芥各七錢
白术

黃芪各兩

歲靈仙酒洗

防風

為末酒糊丸梧子大每服七八十九丸食遠白

湯或酒送下

癥瘕門

生生子曰癥縮也癰伸也伸縮不止手如拽鋸搘之類也汗多不正為虛無汗能食為實內經曰心脉急甚者為癥瘕此心經虛寒治宜補心牛黃散之類又曰心脉滿大癟癰筋挛此心火實熱也治宜瀉心火涼驚丸主之又曰肝脉小急亦癟癰筋挛此肝虛也宜續斷丸

又主之。若肝脉盛，宜救脾，加減建中湯，內經謂脾脉急甚，亦為癆痰。此脾虛，肝乘之而癆也。故宜實生瀉木之劑，建中湯是也。

劉河間曰：諸熟督癆皆屬於火。熟勝風搏，并于經絡，風主動而不寧，風火相乘，是以督癆生矣。治以祛風除熱之劑，折其火熱，督癆立愈。若妄加

灼艾，或飲以發表之劑，則死不旋踵矣。

東垣人參益氣湯 熟傷元氣，四肢困倦，手指麻木時，癆痰。

黃芪二錢，甘草一錢，升麻各五分，柴胡

分六，五味子三粒，甘草生五分，人參一分，白芍一分，水煎服。

獨活湯 風虛昏曠，不自知覺，手足癆痰，或為熱血虛，不能服發汗藥，及中風自汗，尤宜服之。
獨活羌活 人參，防風，川歸，細辛，茯神，遠志，半夏，桂心，白薇，菖蒲，川芎，芍藥各五錢，甘草錢二錢半，每十兩姜五片煎，溫服。

胃風飲 虛風症，能食，麻木，牙閔緊急，手足癆痰，目肉瞞瞞，胃中有風面腫。

白芷一錢 升麻二錢 葛根 荸朮 蔘荆子

川歸身錢各一

甘草

柴胡

藁本

羌活

草豆仁

黃柏

麻黃

不去絲各五分

姜三片枣二枚水煎溫服

千金薯蕷丸

腎氣虛弱風氣百疾頭眩驚悸癆瘻

薯蕷廿八錢

當歸

桂心

神曲

炒熟地黃

人參

川芎

芍藥

白术

麥冬

杏仁

甘草各六分

柴胡

桔梗

茯苓

鹿角

膠七分

乾姜

白斂

防風

黃芩

大豆

續斷丸

肝勞虛寒脇痛脹滿眼昏不食

李縮瘻

右末和東膏加煉蜜丸

續斷酒

川芎

半夏

橘紅

乾

姜

炮各一兩

桂心

甘草

炙各五錢

右末煉蜜丸桐子大每百丸白湯下

牛黃散 心虛風筋脉痙攣搐神昏語澁

牛黃

冰片

硃砂

射

錢各一

蟬退

烏蛇肉

各一全蝎

炒姜參炒桑螵蛸

羚羊角

天麻

各兩

全蝎

炒姜參炒

桑螵蛸

羚羊角

天麻

阿膠 防風 甘菊 桂心 細辛 蔓荆子

側子去皮 獨活 犀角各五錢 麻黃七錢半

右為末和勻再研每服一錢草淋酒下
續命煮散 風氣畱滯心中昏曇四肢無力口眼
瞶動或時搐搦或渴或自汗至

防風 獨活 當歸 人參 細辛 葛根

熟地黃 茯苓 川芎 甘草 遠志 荆芥
半夏各五錢 官桂七錢半 每十兩姜三片煎汗多者
加牡蠣一錢半至

獨活散治風熱化痰 細辛 石膏 甘草各五錢
獨活 防風 藜本 旋覆花 川芎 蔓荆
子各兩 右每服三錢姜三片水煎服

瘡門 附防風

生生子曰內經云肺移熱于腎傳為柔瘡古云
瘡勁功之謂也仲景諸公傷寒書皆以為太陽
風濕所致亦有兼陽明經者仲景謂汗下過多
及瘡家發汗過度皆成瘡此指外感之邪原係
傷寒家法也陳無擇張子和諸公云亦有風火

痰熱之內因者謂此病多由亡血筋無所營故邪得以所襲丹溪謂比癰為虛此皆指內傷之症也觀剛柔二字則亦當有虛實之別太抵剛者多從外感柔者多從內傷故治斯疾者但明知從外感而來則用傷寒家法若從雜症而來則用陳無擇丹溪劉宗厚張子和諸家之法庶表裏詳盡始無遺此失彼之患矣

內經云諸瘡項強皆属于溫王注太陽復濕又云諸暴強直皆属于風王注陽內營而陰行于外劉宗厚云按內經言

瘡肺腎太陽督脈與夫六氣皆能為之太抵皆主于溫

仲景云太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘡成無己曰瘡者瘡也強也千金曰太陽中風重感寒溫則變瘡太陽病發熱無汗為表實則不當惡寒今反惡寒者則太陽中風重感于寒為瘡病也以表實感寒故曰剛瘡

太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔瘡成無己曰太陽病發熱汗出為表虛則當惡寒

其不惡寒者為陽明病今發熱汗出而不惡寒者非陽明証則是太陽中風重感于溫為柔痓也表虛感溫故曰柔痓

太陽病發熱脉沉而細者名曰痓

成無己曰太陽主表太陽病發熱為表病脉當浮大今脉反沉細既不愈則太陽中風重感于溫而為痓也金匱要略曰太陽病其証備身體強不不然脉反沉細此為痓括萎桂枝湯主之

太陽病發汗太多因致痓

成無己曰太陽病發汗太多則亡陽內經曰陽氣者精則養神柔則養筋陽微不能養筋則筋脉緊急而成痓也

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤見脉赤獨搖頭卒口噤背反張者痓病也

成無己曰太陽中風為純中風也太陽中寒為純傷寒也皆不作痓惟是太陽中風重感寒溫乃變為痓也身熱足寒者寒溫傷下也時頭熱面赤見脉赤風傷于上也頭搖風主動也獨頭

搖者頭為諸陽之會風傷陽也若純傷風者身亦為動搖手足為之搐搦此皆內扶寒溫故頭搖也口噤者寒主急也卒口噤者不常噤也有時而緩若風寒相搏則口噤而不時開此皆加之風溫故卒口噤也足太陽之脉起于目內眎上額交顴上其支別者從顴入絡腦還出別下頸循肩膊內夾脊抵腰中下貫臀以下至足風寒客于經中則筋脉拘急故頸項強急而背反張也

風病下之則痓復發汗必拘急

瘡家雖身疼痛不可發汗出則痓

劉宗厚曰按此謂汗下而致痓則不專于風寒溫之外傳矣是又因壞證而成也發汗下之太過皆亡津液損血之所由也

劉宗厚曰按痓症屬風寒溫所傷有汗者脉必浮緩無汗者脉必浮緊若其脉沉細者溫所傷也堅直上下行皆緊之象也發汗已其脉如蛇去津液而無胃氣之象也

子和云呂君玉妻年三十病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癇治之以南星雄黃烏附用之不効戴人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直搖動風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝木茂而自病因湧風痰二三升次以寒刺下十餘斤又以排針刺百會穴出益一杯愈

劉宗厚曰按風搐本與痓症不同而痓症屬溫土極必兼風木動搖之化風搐屬木木極必見金

燥緊皴之形要之亦可同論故取此一條以證痓病不專風寒濕之外至亦有風火熱之內作者三因方云夫人之筋各隨經絡結束于身血氣內虛外為風寒濕熱之所中則痓以風散氣故有汗而不惡寒曰柔痓寒泣益無汗而惡寒曰剛痓原其所以多亡血筋無所營故邪得以襲乏之所以傷寒汗下過多與夫病瘡人及瘞後致于斯疾者累可見矣診其脉皆沉伏絃緊但陽緩陰急則冬久拘挛陰緩陽急則反張強直二

證各異不可不別

丹溪曰：痓切不可作風治，兼用風藥，大率與癇相似。比癇為甚，為虛宜補，多具氣虛，有火有痰，宜用人參竹瀝之類。一男子二十餘歲患瘡瘍，屬謝後，忽患口噤，不開四肢，強直不能屈伸，時或迷謶，腹痛一陣，則冷汗如雨，痛定則汗止。時作時休，其脉絃緊而急，如真弦狀，向知此子極勤，妄意其因勞倦傷濕，山居多風寒乘虛而感，又因瘡瘍其血愈虛，當用辛溫養益，辛涼

散風，遂以當歸芍藥為君，川芎青皮釣藤五臣白术陳皮甘草為佐，桂枝木香黃連為使，更加紅花少許，服二十帖而安。

王海藏云：發汗太過，多因致痓，身熱、足寒、項強、惡寒、頭熱、面腫、目赤、頭搖、口噤、背反張者，太陽痓也。若頭低視下，手足牽引，肘膝相攜，陽明痓也。若一目或左右邪視，一手足搐搦者，少陽痓也。汗之止之，和之下之，各隨其經可使必已。在裏無汗，宜汗之，在汗宜止之，陽明痓屬

裏宜下之少陽症半表半裏宜和之所謂各隨其經也

劉宗厚曰謹按傷寒，瘡病活人以太陽中風又感寒濕而致則專于外邪所傷然仲景亦有汗下過多之戒則又出于壞証所成矣蓋外邪所傷者通宜解散仲景言剛柔活人分陰陽誰知論經絡等諸方詳矣至于治壞証補虛救失之法諸方則亡也又千金謂溫病熱入腎中亦為症小兒病癟熱盛亦為症若此治法誤未覓之也

况此二者之外又有血氣本虛之人如摩後汙出多而變症者或因七情怒氣而發症者或因濕熱內盛痰涎壅遏經絡而作症者治各不同也大抵傷寒有外邪之可解宜用風藥發散風寒又風藥亦能勝溫耳至于和熱入腎亦非風藥之所能療也其內證作症本無外邪前人豈可仍用風藥處治惟宜補血降火敦土平木清痰去湿隨證而用不可不察也
海藏云若汙後不解下靜下躁目直視口噤伴來

寒熱脈弦者少陽風症宜柴胡防風湯

柴胡

防風

各一

人參

黃芩

各五錢

半夏

六錢

生姜

甘草

各六錢

半東枝

每服一

兩水煎

服

若發汗過多發熱頭面搥卒口噤背反張者太陽

兼陽明也宜去風養血

防風

當歸

川芎

地黃

每服一

兩水煎

神木湯 治剛症解利無汗

白朮

三錢

防風

二錢

甘草

一錢

姜葱水煎服

白朮湯 加桂心黃芪治柔症解利有汗

白朮

三兩

防風

二兩

甘草

一兩

每服五錢姜三片

水煎服

一日二服漸

汗止為解

仲景葛根湯 太陽無汗而小便少氣上衝胸口

噤不得語欲作剛症者

葛根

四兩

麻黃

生姜

各三兩

桂枝

芍藥

甘

草

各二兩

大棗

十二枚

每服五錢煎服取微汗

若發熱無汗惡寒名曰剛症宜麻黃加獨活防風

湯

麻黃

桂枝

各二兩

芍藥

三兩

甘草

五錢

獨活

防風

各一兩

每服一

兩水煎溫服

瓜萎桂枝湯 太陽病其証備身體強不兀然脉
反沉遲此為柔症

瓜萎根 甘草 芳藥各二 桂枝 生姜各三
大東枝十枚 水丸升煎取三升分三服取微汗
汗不出啜粥發之

海藏 治發汗自汗而不惡寒者名柔症宜桂
枝加川芎防風湯

桂枝 茯苓 生姜各一 甘草 防風 川芎
各二 大東枝六枚 每服一兩水煎服

凡剛柔二症皆可與水續命湯但要識加減法
若柔症自汗者去麻黃夏間及病有熟者減桂
枝一半冬及初春去黃芩

千金續命湯 卒中半身不遂手足拘急不得屈
伸身體冷或智或痴或身強直不語或生或死
狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食
太小便不利皆療之

人參 桂心 川歸 獨活 黃芩 甘草炙
乾姜炮各七錢半 石膏一兩 杏仁四十粒 以水九升煮

取三升分溫三服日二服無汗者加麻黃
若汗後不解乍靜乍躁目直視口噤待來寒熱脉
弦者少陽風症宜柴胡加防風湯

柴胡 防風各一
兩

一人參

黃芩各五錢

半夏六錢

生

姜 甘草各六

錢半兩

束枝

每服一兩水煎

倉公當歸湯 賊風口噤角弓反張瘡証

川歸

防風

各七

獨活

一兩

附子一枚

細辛

五錢

麻

黃一兩

酒五升煮取

三升服

一升口

不開者

格口

納之

一服當蘇

二服小汗

三服大汗

活人八物白朮散 險症一二日面腫手足厥冷
筋脉拘急汗不出恐陰氣內傷

麻黃

白朮

枳椇

五味子

羌活

各五錢

心

附子各三

良姜

每四錢

姜五片

水煎服

附子散

隴症手足厥逆

筋脉拘急

汗出不正頭

項強直頭搖

口噤

桂心

川芎各三

附子炮

白朮各一

獨活

五錢

每三錢束一枚

水煎服

桂心白朮湯

隴症手足厥冷

筋脉拘急

汗出不正

頭

項強直頭搖

口噤

正白术 防風 茯苓 桂心 川芎

附子 每五錢姜五片束二枚水煎溫服

丹溪治虛婦因怒手足強直十指如束右手脉弦虛左手脉弦大而強稍堅此風木攻脾土宜速

鴟肝氣助肺金補脾土之陰

黃連錢南星

白术 人參

黃芩 天麻

青皮

各五錢

甘草

一分

川芎 木通 陳皮 水煎入姜汁辣服

肘後方 中風體強直不得屈伸反覆刮柏樹皮

細切一升以酒二升浸一宿每日溫服半升酒盡再作即枳實樹皮去風濕効

千金方 治口噤手足不隨而手体強直

伏龍肝五升以水七升燒匀取汁飲之

瘡瘍辨

生生子曰丹溪云瘡當在瘡傳寫之誤耳攷之諸書亦未有能辯之詳註之確者惟郭雍氏云瘡與瘡當是二病謂昔劉寅氏有言病以時發者謂之瘡不以時發者謂之瘡似亦未能詳悉厥

後以其所歷見及治之効與不効者反覆考檄
二症之名二字之義其用心可謂至熟至懇者
矣然終未能照著允若故後之人疑其為二症
者不亦宜乎愚按靈素仲景以下諸書云痺云
瘡字雖兩般治多雷同殆亦不必犁而為三也
苦辨之則愈支离膚見謂痺乃病之名痺乃病
之狀原其有剛柔二種以病發之時而經筋脉
絡僵勁角弓反張故曰痺痺是勁急也是以其
病發之狀象而名之也不然河歷代諸公或以

治瘡之方治痺或以治瘡之方治痺諸皆能効
治既同而不殊則症當一而不二也焉用分

勞風即痺

丹溪云痺比瘡為虛蓋因勞汗遇風內挾太陽寒
溫之邪治亦與瘡同法但當視其所勞則知虛
在何臟如房勞則腎虛汗出腠理開風入皮腠
得寒則閉風不能出與水俱行其人當目下腫
如卧蚕之狀戴人云腎主水其經至于目下故
也不禁房室則死明其虛在腎也所以關於木

陽何也太陽主寒其經最在外腠理得寒則開故太陽先受邪也治宜八物白术散君公當湯

黃芪湯 汗多氣虛發症

黃芪蜜炙

人參 白术

茯苓 白芍

炒各一錢

甘草

炙八分

桂枝

五分

水煎服

當歸散

血虛及去血過多發症

當歸

酒洗二錢

川芎

熟地

防風

黃芪

各一錢

芍藥

半錢

甘草

四分

水煎服

理氣平肝散

七情所傷發症

烏藥

香附各半錢

青皮 枳殼

芍藥 川芎

柴胡

木香各半錢

甘草

姜三片水煎服

木香磨水二匙加入

清痰湯 痰火攻作頑強

口噤角張反癇

枳殼

貝母 香附各半錢

甘草

五分

去濕青熱散

白术

錢二分

澤瀉

茯苓

天花粉

山

梔各

一毫活分

甘草

水煎服

芋枳丸

治勞風強上冥視肺熱上壅唾稠

川芎

枳殼等分

為末蜜丸桐子大每服三五

十丸食後溫水下日三服

祛風清金散 肺熱壅盛痰唾如膿

防風

括萎根 桔梗 枳殼 旋覆花

芎各一

山梔

黃芩

貝母

爪萎仁

炒茯苓

川

天門冬

麥門冬 橘紅各八

五味子

十五粒

甘草四分

水煎服

生生子曰按內經評熱病論篇帝曰勞風之病何
如岐伯曰勞風發在肺下其為病也使人強上
冥視唾出若涕惡風而振寒此為勞風之病帝
曰治之柰何岐伯曰以救俛仰巨陽引精者三
日中年者五日不精者七日欬出清黃涕其狀
如膿大如彈丸從口中若鼻中出不出則傷肺
傷肺則死也

引精謂角中之精明
引動能辨人與物也

啓玄子註曰勞風者從勞風生故曰勞風勞謂腎

卷之十一
勞也。腎脈者，從腎上實肝膈入肺中，故腎勞風生，上居肺下也。強上好仰也。冥視謂令眼視不明也。腎精不足，外吸膀胱，膀胱氣不能上營故使人頭項強而視不明也。肺被風薄，勞氣上薰，故令唾出若鼻涕狀，腎氣不足，陽氣內攻，勞熱相合，故惡風而振寒。肺傷則營衛散解，魄不內治，故苑林氏謂強上者似角弓反張也。冥視者目開不見物也。凡瘡病皆同，不識人或反視斜視也。治法當與瘡同。千金方冥視作目眩。

不得卧

靈樞曰：病而不得眠者，何氣使然？岐伯曰：衛氣不得入于陰，常留于陽。晉于陽則陽氣滿，陽氣滿則陽蹻盛，不得入于陰，則陰氣虛，故目不瞑矣。
大惑論

黃帝問于伯高曰：夫邪氣之客人也，或令人目不瞑，不卧出者，何氣使然？伯高曰：五穀入於胃也，其糟粕津液宗氣分為三隧，故宗氣積于胸中，出於喉嚨以貫心脉而行呼吸焉。嘗氣者必其

津液注之於脉化以為血以榮四末內注五腑六腑以應刺數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而先行于四末分肉皮膚之間而不休者也晝日行于陽夜行于陰常從足少陰之分間行于平臟六腑今厥氣客于五臟六腑則衛氣獨衛其外行于陽不得入於陰行于陽則陽氣盛陽氣盛則陽躉陷不得入于陰陰虛故目不瞑黃帝曰善治之柰何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑

陰陽已通其卧立至黃帝曰善此所謂決竇壅塞經絡大通陰陽和得者也頭聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八升搘之萬遍取其清者五升煮之炊以葦薪大沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭為一升半去其滓飲汁一小杯日三稍益以知為度故其病新發者覆杯則卧汗出則已矣久者此去穀也三飲而已矣帝曰人之不能偃卧者內經曰胃不和則卧不安帝曰人之不能偃卧者何也岐伯曰肺者臟之蓋也肺氣盛則肺大肺

大則不能復卧

王海藏云：膽虛，不眠寒也。聖惠左酸棗仁炒為末，以竹葉湯調服之。
張子和治一富家婦人，因思慮過甚，二年不得寐，無藥可療。其夫求治脈之，兩手俱緩，此脾受邪也。脾主思故也。乃與其夫議以怒激之，多取其財，飲酒數日，不處一法而去。其婦大怒，汗出，是夜困眠，如狂者八九日，不寤。自是食其脉得平。

此怒勝也。

水腫病令人不得卧，則驚，則欬甚。此水氣凌肺也。

溫膽湯治太病後虛煩，不得眠，或則驚悸極効。丹溪治煩，不得眠，益元散加牛黃服之。有心血不足而不寐者，用益榮湯。

仲景酸棗湯治虛煩，不得眠。

酸棗仁升甘草一知母 茯苓 川芎各二

水八升煮酸棗仁得六升，內諸藥煎，取三升，分溫三服。一方加生姜二兩。

本事蠶甲丸治虛煩，不得眠，四肢無力。

酸棗仁 蠶甲 羌活 牛膝 黃芪 人參

五味子

各等分

蜜丸

大桂子大每四五十丸溫酒下

聖惠酸棗地黃湯

骨蒸勞煩心不得眠

酸棗仁

兩

水一

大碗半研綾取汁下米二合煮

粥熟再入地黃汁一合更煮過

不計時服之

六物湯治

振悸不寧眠

四君子加酸棗仁

生姜煎服

許學士珍珠母丸

肝虛內受風邪

卧則寬散而不收

狀若驚悸

珍珠母

另研末三錢

當歸熟地

各一兩半

人參茯苓

酸棗仁

柏子仁犀角

各一錢沉香龍齒

兩

對射香一錢

錢為末蜜丸梧子大辰砂為衣每四五十丸金銀薄荷湯下日午及夜服一方多虎睛一錢對射香一錢

獨活湯

治同前相兼服

獨活羌活

人參前胡細辛半夏

酸棗仁沙參茯苓甘草五味子

各等分

每七錢姜三片烏梅一箇不拘時煎服

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每卧則竄飛揚覺身在牀而神竄離体驚悸多

魘通夕無寐更醫不効予為診視詢之曰醫作

何病治董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魄者也遊魂為变平入肝不受邪卧則魄歸于肝神靜而得寐今肝有邪魄不得歸是以卧則魄飛揚若離体也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前四未之聞雖未服藥已覺沉疴去體矣願求治之予曰公且持此說與衆醫議所治之方而徐質之閤旬日復至云醫徧議古今方無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除

赤水珠朱
卷一
此方用真珠母為君龍齒佐之真珠母入肝經為第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以為鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魄西方白虎金也屬肺而藏魄龍能变化故魄遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魄飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

益榮湯 血不足不寐及怔忡驚悸

當歸 黃芪 遠志 酸棗仁 炒茯神 柏子
仁 麥冬 白芍 人參 紫石英 各一木香
甘草五分 姜三片 東二枚 水煎服

多臥

黃帝曰人之多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃
大而皮膚溫而分肉不解焉腸胃大則衛氣留
久皮膚溫則分肉不解其行遲夫胃氣者晝常
行于陽夜行于陰故陽氣盡則寐陰氣盡則寤
故腸胃大則衛氣行留久皮膚溫分肉不解則

行遲留于陰也久其氣不精則目瞑故多臥矣
其腸胃小皮膚滑以緩分肉解則衛氣留于陽
也久故少瞑焉黃帝曰其非常經也卒然多臥
者何氣使然岐伯曰邪氣留于上焦上焦閉而
不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒
然多臥焉大惑

海藏曰膽實多瞶熟也

生東湯 治膽熱多瞶

又生酸東丸為末茶姜汁調服

又方 生酸棗仁一兩 贈茶二兩 以生姜汁一塗炙

微焦為末每服二錢水七分煎六分溫服

醒睡湯

酸棗仁 沙參各一錢半 麥冬一錢 神曲一錢

草分五

姜一片水煎服

煩躁門

仲景云煩屬肺躁屬腎火入於肺則煩入於腎則躁太抵煩躁皆心火為病火旺則金燶而水虧也惟火獨存故肺腎合而為煩躁又脾經絡于心中心經起于脾中二經相搏湿熱生煩夫煩

者擾擾心亂不尤欲吐悽憊不安成無已曰煩為擾亂而煩躁為憤怒而躁合而言之煩躁為熱也析而言之煩陽也躁陰也煩為熱之輕者躁為熱之甚者陳無擇曰內熱為煩外熱為躁又曰虛煩身不覺熟頭目昏疼口乾咽燥不渴清々不寐皆虛也婁英曰先賢治煩躁齊作有屬熱者有屬寒者獨煩而不躁者多屬熱惟悸而煩者為虛寒躁不煩者多屬寒惟火者為熱蓋煩者心中煩或

胸中煩皆內熱也。躁者身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲坐井中為外熱也。內熱者有本之熱故多屬熱外熱者多是無根之火故屬寒生生子曰仲景成無己二公所論煩躁皆為太熱是祖內經夫熱病皆傷寒之類也乃傷寒家語言其邪自外而入至于煩躁皆為熱候予謂躁有陰陽煩有虛實陶節庵曰先煩而悸者為實先悸而煩者為虛又曰煩漸生躁有陰陽虛實之別心熱則煩陽實陰虛腎熱則躁陰實陽虛

煩為熱輕躁為熱重此亦傷寒家語也雜症之煩躁又各有虛寢寒熱不同須當分別而治虛煩者心中擾亂精神不能住持似脹不脹悒悒飲食不甘美睡卧不安寧者是也治以養心血鎮火安神之劑如安神丸之類實煩者或心火燔盛或水飲痰涎停于胸膈壅悶不安者是也治以消痰逐飲散邪之劑如梔子豆豉湯蠲飲湯五苓散之類陽躁者煩渴欲飲噴激躁怒二便不利經云諸躁狂越皆属于火者是也

赤水玄珠 卷之三

治如丹溪用妙香丸之類，陰躁者渴不欲飲，極其躁擾，或上熱下寒，此為陰盛格陽，為陽氣虛，不能深入，欲坐井中者是也。治以理中湯，四逆湯之類，太抵煩症多屬于虛。經曰：夏脉者心也，其不及，令人煩心。又云：肝腎脾虛皆令人体重煩冤，迹是知煩多由于虛也。當尋傷寒法外之治，今錄治方于左，以備採用。

內外俱虛，身冷而汗出微嘔，而煩擾，手足厥逆，不得安静者死。熟病十八日，其脉微細，小便不利，法數用有効。

利加暴口燥，脉代舌黑，焦乾者死。
保命集云：起卧不安，睡不穩，謂之煩，宜梔豉湯竹葉石膏湯。

活人書云：但獨熱者虛煩也，諸虛煩熱與傷寒相似，但不惡寒，身不疼痛，故知非傷寒也，不可發汗，頭不痛，脉不緊，數故知非裏寢也，不可下病。耳者，內外皆不可攻之，必遂煩渴，當與竹葉湯，若嘔者與陳皮湯，一劑不愈，再與之，孫真人云此法數用有效。

陳皮湯 陳皮一兩 甘草炙各半 人参一錢

每服七錢 姜三片 束二枚 水煎服

淡竹茹湯 心虛悶頭疼短氣內熱不解 心中悶亂及產婦心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬去心半夏湯洗各二兩 小麦兩半 甘草炙各二兩 一人參 疙苓各二兩

每服四錢 姜七片 束二枚 淡竹茹一塊 水煎服

東垣硃砂安神丸 心亂煩熱怔忡心神轉倒不能欲吐 胸中氣亂而熱 有似懊惱之狀 皆膈上

丹溪治一女子年二十餘歲 在室素強健六月間

仲景下痢後更煩按之心下濡者為虛煩也極致發煩悶 困倦不食發時欲入井六脉皆沉細而弱數兩日後微渴衆以為病暑治不効四五日加嘔而入瘦 手心極熱喜在陰處漸成伏脉時

妾語予急製局方妙香丸如桐子大以井水下
一丸半日許大便藥已出病無退減遂以射香
水洗藥以針穿三竅次日以涼水送下半日許
太便下稠痰數升是夜得眠困頓伏枕旬日而
愈因記金匱云昔肥而今瘦者痰也遂作此藥
治之

妙香丸丹溪云疏決腸胃制伏木火藥也

辰砂飛五兩牛黃 龍腦 脣粉 射巴豆研各一兩
三百五十粒去金箔九片右研勻煉黃蠟六兩

入好蜜三分同煉令勻為丸每兩作三十九
如要此藥速行針刺一眼睛冷水浸少時服
効更速小兒百病丸如蒙豆大

遠志湯 治心虛煩熱夜卧不寧及病後虛煩

遠志去心炒各一分黃芪 當歸 麦冬 原斛 酸棗仁

人參 袁神各七分甘草五分

水煎服

煩甚者加竹葉知母

竹葉湯 傷寒太病後及霍亂吐瀉後心虛煩悶
內熱不解 竹葉 麥冬 人參 袁芩 小

麥半夏各一
小草湯虛勞憂思過度，遺精白濁虛煩，不安。
小草黃芪川歸麥冬石斛酸棗仁
各一
人參甘草各五
錢每六錢姜五片水煎服

煎服

地仙散傷寒後伏暑後煩熱，不安及虛勞不安。
地骨皮防風各一
甘草錢每六錢姜五
片水煎服

竹茹麥冬湯太病後表裏俱虛，內無津液煩渴。

心躁及諸虛煩熱與傷寒相似，但不惡寒，身不痛不可汗下者。淡竹葉麥門冬等分每錢水煎。

酸棗仁湯霍亂吐下後增劇，虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠，或發寒熱，頭疼暈悶。

酸棗仁一兩七人參桂心各二
知母錢半
茯苓錢各三
后膏錢甘草錢每七錢姜東煎服

人參竹茹湯胃口有熱嘔吐效，遂虛煩，不安。

人參錢半夏一兩分二帖加姜七片陳皮二

人錢半竹茹一錢水煎服

竹茹石膏湯 太病後餘熱煩悶

溫膽湯 太病後虛煩不得眠及驚悸

五苓散 水停心下作驚悸煩悶

清心蓮子飲 方見癥閉門

梔子豆豉湯 治邪在上焦

四逆湯

理中湯

健忘門

戴元禮曰健忘者熟事有始無終言談不知首尾此以為病之名非比生成之愚頑也

靈樞經曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心氣虛則榮衛留于下久之不以時上故善忘也

丹溪心法曰此証皆由憂患過度損其心胸以致神舍不清遇事多忘病在心脾凡思傷脾以故令人轉睛遺忘治之以歸脾湯須兼理心脾神寧意定其証自除也

歸脾湯

思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白术

茯神

黄芪

酸枣仁

各一

人参

木

香

錢

甘草

錢半

每六錢姜三片東二枚圓

眼肉五枚水煎服

定志丸

心氣不定恍惚多忘

遠志

石菖蒲

各二

人參一

白茯苓

三

右末

煉蜜丸

梧子大

硃砂

為衣每服三十丸

米飲下

丁方加茯神

加味茯苓湯

痰迷心竅健忘失事

二陳湯加益智仁香附人參姜水煎服

讀書九和健忘服之日記千萬言

石菖蒲

各一

人參

遠志

兩

地骨皮

二

生地

五味子

川芎

各一

為末薄糊丸

梧子大

每服

二丹七八十九臨卧

白湯下

孔子大聖枕中湯

常服令人聰明

龜甲

龍骨

遠志

菖蒲

各等分

為末酒

服方寸七日

三服

聖惠千金翼同

補心虛治健忘

令人耳目聰明

朱本草

卷之六

七

以戊子日服之開心不忘

菖蒲遠志各等分為末每服方寸匕常服
令人耳目聰明從外見裏給人長生去三百
病毒不能為害

二丹丸 安神定志和血治健忘

熟地黃 天門冬 丹參各一兩半 茶荳 甘草各一錢
遠志 人參各五錢 麦門冬一兩 右末煉蜜丸 檀子大硃砂五錢為衣每服五十丸白湯下
又讀書方

菖蒲遠志桂甘草 地骨人參巴戟夫
倍煮茯苓糊丸服 讀書日記萬千言

狀元丸 教子第十分

菖蒲去毛 遠志甘草水煮去心各一兩 白茯神去木巴戟
天心水煮去皮 人參 地骨皮去心各五錢
右末用白茯苓去皮二兩糯米二兩共為粉
用原菖蒲三錢煎濃湯去渣打糊為丸每食
後午時臨睡各服三五十九

大官詹少溪吳馭閔校

終

大雪口通志卷之三

卷之三



