



A vertical color bar chart titled "KODAK Gray Scale". The chart features a central vertical axis with a series of horizontal color swatches arranged in a grid pattern. Each swatch is divided into two equal halves by a vertical line. The colors transition through various hues including black, gray, purple, blue, green, yellow, orange, pink, white, and brown. To the left of the chart, there is a vertical strip containing the letters "KODAK" in large white font, followed by "LICENCED PRODUCT" in smaller white font, and a small circular logo with a stylized letter "M".

武門  
卷 516  
21

亦水玄珠第二十卷目錄

遺溺門

小便不禁門

溺赤

脫肛門附截腸病

前陰諸疾門

疝門

赤水玄珠第二十卷

新安生生子孫一奎著輯

遺溺門

生生子曰按遺溺遺失也睡夢中遺失醒而後覺童稚多有此大人少有也夫童稚陽氣尚微不甚約束好動而魂遊故夜多遺失也古方多用煖藥乃溫養陽氣之意經謂虛則遺溺又曰不約為遺溺從可知矣曾見數人二三十歲仍遺失不正後皆無子得非下元虛寒所致欤東垣曰小便遺失者肺金虛也宜安卧養氣禁勞

卷之二十一  
後編  
以黃芪人參之類補之不愈當責有熟加黃柏生地又曰立夏前悞用白虎湯過多致遺溺者宜溫藥升陽以解之

甲乙經云肺脉不足以息卒遺失無度原病式云遺尿不禁者是熱甚客于腎部干於足厥陰之經廷孔鬱結極甚而氣不能宣通則痿痺而神無所用故液滲入膀胱而旋漏遺失不能收禁也

丹溪嘗治一男子遺溺不覺脉洪大盛以黃柏知

母杜牛膝為君青皮甘草為臣木香為佐桂心小為反佐服數帖大効此法與千金翼白薇散皆治熱甚廷孔鬱結神無所用不能收禁之意生生子曰按劉河間丹溪千金翼方有認為熟者必以脈症相參看治庶無偏熟偏寒之弊予前論寒者以太槩而言也諸病皆有寒熱虛實多有始同終異故治法不能執一而無權也

桑螵蛸散 治遺溺

桑螵蛸酒炒為末姜湯調下二錢

鷄內金散

治溺尿失禁

鷄肫腎一具即鷄肫內黃皮并腸洗淨燒存性  
男用雌女用雄研為末每二錢酒服妙

大人遺溺不知善徵根細研酒下

雞腸草湯 治小便不禁或睡中遺出不覺

雞腸草

兩一牡蠣粉三錢龍骨

麥冬白茯苓

桑螵蛸錢各五

每服三錢東一枚去核煎服

一方 治同上

補骨脂炒為末黃柏煎湯調下

又方 治同上

桂皮末 雄雞肝

等分搗丸如小豆大溫水

治小兒夢中遺尿

薏苡仁一合去心不去殼敲碎入鹽一小撮同

炒黃色水煎空心服之効

縮泉丸

治小兒遺尿脾氣不足小便頻多

烏藥

益智仁去壳盐水炮

等分為末酒煮山藥

糊為丸空心鹽湯下二錢

又方 治同上

烏藥 益智仁 各一錢 桑螵蛸 一兩  
為末空心鹽湯調下二錢効

治遺尿方

白茯苓 牡蠣殼 雜酒 各五錢  
桑螵蛸 各一錢 龍骨 桂枝 各一錢  
為末以雞腸一具燒存性為末和匀空心

白湯調下一錢

禁方 治遺漏

阿膠炒 牡蠣殼 鹿茸酒 各等分  
桑螵蛸 各一錢 龍骨 桂枝 各一錢  
為末粳米為丸梧子大每五十丸空心酒下

治遺漏淋瀝

桑螵蛸 焦

龍骨 等分

為末每二錢空心鹽湯

千金翼白薇散

治尿出不知時

白薇

白芍藥

等分

為末溫酒下方寸匕日三服

濟世方神功導水丸

治遺尿有實熱者每百丸

空心白湯下若一服得大便利止後服

此謂濕氣遺漏脾聚在腎脾謂氣不宣通也

雞腸散

腎與膀胱虛冷不能約制故遺尿失禁

或睡自出

肉桂

龍骨 各一錢 白茯苓 桑螵蛸

赤水經珠

卷之三

十一

白外客

分二帖水煎姜三片東二枚掌心溫服

小便不禁

生生子曰不禁謂無禁約小便多而頻不計遍數按經云水泉不止者是膀胱不藏也有溫熱有下元虛憊數而少為熟數而多為虛老人多有此蓋陽氣泉微不能約束歷見數人卒皆不救由其不能攝養而神氣耗散故也古人有謂不通為熱不禁為寒乃心腎氣弱陽道衰冷而傳

化失度法當溫補溫存以養其神藥石以堅其腎神完腎固膀胱氣充自可約束然必調治及阜庶或十全三五

王節齋曰小便不禁或頻數古方多以為寒而用溫滋之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數來也故年老人多類此是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉太陽為主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱萸五味子之類不可用溫藥也病本屬熱故

蛸牡蠣粉各三雞腸一錢

宜瀉火因水不足故火動而致小便多小便既多水益虛矣故宜補血瀉火治其本也收之瀉之治其標也

按此乃本之於原病式熟齋廷孔之說也

生生子曰按鄭齋此論亦是以太聚言也老人下元虛慘氣弱不能乘載其水膀胱停濕浸淫皮瀉不能收持故頻數不禁必如河間鄭齋所云然則癃閉已主於熱矣而不禁又主於熱是無虛寒之症也何古方有溫補之法經有寒虛之

文耶不若以小便頻而清白長者為虛寒頻而少黃赤澁者為熱及脉洪數有力無力或滑或濡參驗之始無差悞凡熱夫小便少寒月小便多寒熱之理亦易見爾

太便秘結而小便頻多屬脾約症以脾約丸治之茯苓丸心腎俱虛神志不守小便淋瀨不禁赤茯苓白茯苓等分為末新汲水接洗澄去新沫控乾別取熟地黃片與好酒同於銀二尺石器內熬成膏為丸彈子大空心益酒嚼下丸

二氣丹 治內虛寒，嘯膀胱積冷，陽氣漸微，小便不禁。生附子一枚大者炮去皮，臍為末，五錢。

附子

一枚大者炮去皮，臍為末，五錢。

右糊丸梧子大每五十丸鹽湯下。

姜附赤石脂丸 小便數而不禁，怔忡多忘夢魘不已。

附子

生乾姜各五錢。赤石脂一兩，硫砂二錢，火

兩者一

酒糊丸菉豆大每十五丸至三十丸。

大便

有病米飲下。王海藏云：此方妙在硃砂伏火上。

論載王機

微義甚詳

王海藏云：此方妙在硃砂伏火上。

論載王機

微義甚詳

御藥院秘元丹 治內虛寒，自汗時出小便不禁。

白龍骨

三兩

訶子

一枚

砂仁

靈砂各一錢

右稜米糊

丸梧子大每五十丸空心鹽湯下。

兔系子丸

治小便多或致失禁。

兔系子

肉蓯客

酒浸各二兩

牡蠣殼附子

炮

五味

子

鹿茸

酒炙各一兩

雞膵胫乾

桑螵蛸

酒炙各五錢

三因家韭子丸

下元虛冷，小便不禁或成白濁。

家韭子

炒六兩

鹿茸

酥炙四兩

肉蓯客

酒浸牛膝熟地

黃當歸各二巴戟去心兔藥子一酒浸各半杜仲

石斛桂心官姜一兩

桑螵蛸散治小便頻數或如米泔稠濁上  
桑螵蛸益水遠志后菖蒲鹽

茯神當歸鱉甲醋炙各半分為末每二十錢臨卧

五子丸治小便頻數時有白濁

人參湯調服丁方用龜甲

菟系子酒家韭子炒益智茴香炒蛇床子

丹溪鹿茸丸治久虛冷小便白濁滑數不禁  
各半分去皮炒

丹溪鹿茸丸治久虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸川椒去子取頭未桂心附子牡蠣

斛沉香補骨脂肉蓯客雞胫脛各一

桑螵蛸右酒糊為丸梧子大食前酒下三十

又方治汚血淋澀

鹿角眉炒黃為末溫酒下二錢妙本草云鹿角

惡血方治污血淋澀

水芝丸治下焦真氣虛弱小便頻多日夜無度

赤水玄珠

蓮子去皮

先以好酒浸一宿用猪肚一具入

蓮子在內水煮熟取出蓮子切片晒乾為末

醋糊丸如雞頭子大每五十九溫酒送下

一方 治羸賦虛弱小便頻數不禁

五味子四兩

肉蓯容半斤肉地六兩

兔系子六兩

酒煮炒乾二兩

右酒煮山藥糊為丸梧子大每五十九空心鹽湯或酒送下

萆薢丸 治小便頻數

川萆薢

不拘多少為末酒糊丸如梧子大每

五十丸空心鹽湯送下

一方 治夜多小便老人虛人多有此症

白芷一兩

稊米五錢炒

右稊米糊丸梧子大

餛飩煎湯空心下五十九

玄菟丹 治小便多

兔系子酒浸焙

五味子酒浸研

白茯苓末七兩

三兩蓮肉

兩為末乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊丸搗千杵丸梧子大每五十九空心

小麥米飲下

小鬼系丸

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦急夜

夢遺精

石蓮子肉

二兩

鬼系子酒浸研

白茯苓

一兩

山藥

二兩

打糊丸

梧子大

每五七十

五錢

山藥

七錢

打糊丸

梧子大

每五七十

丸空心溫酒或葷湯送下

一方

生山藥半斤刮去皮先用酒熬沸入山藥不得攬動待熟加鹽葱白更添酒空腹下

三盞妙

益智散

治小便多

益智

三十

為末

水一盞煎

八分入鹽

五分

臨臥

溫服

本事方衛真湯

治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯

弱真陰不固

三焦

不知上盛下虛夜夢鬼交覺

來盜汗

面色

精彩唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛背

倦心氣虛乏

精神不寧

驚悸健忘飲食無味日漸瘦瘠外腎溫痒夜多小便腫重冷痛牽引小

腹足膝緩弱

步行難

婦人血海冬冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白帶下漏分五

色子官感寒久不成孕並皆治之

此藥大能

生氣血遇夜半子時腎水旺極之時補腎實

臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制之使不復為梗

川歸

酒浸一夜

丁香

青皮

去白各一兩

熟地黃

白朮

芩

木香

肉菓

山藥

各二兩半

生地

川牛膝

各二兩

半盞

童便煮一夜

人參半

石斛

各二兩半

五兩

為末

每三大盞

酒調下

盞湯

亦得寧心食前服婦人諸病童便同酒調空心服

辰砂妙香散

方在婦人門

本草溺赤

諸病水液渾濁皆属于熱小便黃者少腹中有熱也治小便黃無如黃柏知母効

脈經云足脾逆冷小便赤宜服附子四逆湯

綱目載小便黃有四

一屬肝熱經云肝熱病者小便先黃是也

二屬胃實經云胃足陽明之脉氣盛則身巨前皆熱其有餘于胃則消谷善飢溺色黃者是也

三屬肺虛經云肺手太陰之脉氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變故耳

四屬腎虛經云冬脉者腎脉也冬脉不及則今  
眇清脊痛小便變是也

脫肛門附截腸病

生生子曰脫肛之症多由腸內有積而清氣不升  
如痢疾裏急後重而下脫也治當從滯下門先  
推出積滯然後升補積滯去而清氣自升不復  
脫下其或因下血及痢疾之後脫而不收者為  
虛升補之藥看氣血孰重脫之已久當以健劑  
收之腸胃有風脫而下血者以風藥舉之脫久

亦有虛寒者當溫藥微洗內服大補之劑

丹溪曰有氣虛氣熱血虛血熱

氣熱者條芩六兩升麻一兩為末麵糊為丸服  
之其証肛脫紅腫者是也

氣虛者參耆歸升麻或加白朮訶子有熟加  
條芩其証多於勞倦房慾而發者是也  
血熱者四物湯加炒黃柏其証多於好酒及  
辛辣之物而發及便血也

血虛者用四物湯加升麻荆芥其証下血過

多面色痿黃者是也

下痢脫肛

痢門參治

截腸病 其訖太腸頭出痛苦軟又落々又出腸  
盡則死初出寸餘時治之以茱麻油丁盡以醫  
坐之飲大麻子汁數升愈

脫肛之證前人以為肺氣虛寒蓋肺與太腸為表  
裏肺臟蘊熱則閉結虛寒則脫婦人有此疾者  
多由產育用力過多小兒有此疾皆因久痢太  
腸虛冷所為也有腸頭作痒者此係腸中有虫

黃桂峰云親見一人裏急後重肛脫紅腫百藥皆  
試乃有蟲在肛故也

濟世方 治男女脫肛用五倍子小便濃煎洗之  
聖惠方 治脫肛不收蠅牛燒灰猪脂調敷之

砂仁湯

治太腸虛脫肛挾熟紅腫者

砂仁 黃連 木賊等分 為末每服二錢米飯  
水蛤散 太腸虛寒肛門脫出不收或用力太過  
及小兒叫呼久痢後重者  
五倍子為末水煎汁浸洗更入白芷蛇床子尤

佳後用赤石脂爲末少許，掺在巴蕉葉上，頻用托入。或有脫出尺許者，亦用此湯溫浸，頻換藥水，以縮為度。

倍榆散 治小兒脫肛

五倍子 地榆等分爲末，每五分或一錢米飲調

治老人脫肛

防風蘆 蒼朮 黃柏 五倍子 煎湯薰洗

內服清涼大腸之藥而愈

治脫肛下血

韭菜丁太握擂碎瓦罐煎熟，再用生韭菜汁沖在湯內，將肛門坐在瓶口薰十二次，神效。

槐角丸 五種腸風下血痔漏脫肛並治

槐角

三地榆 黃芩 當歸 防風 枳殼炒

各二兩，右酒糊丸，梧子大，每七十丸，空心米飲下。

涼血清腸散

生地 當歸 茜草各一錢，防風 升麻 刑  
芥各一錢，黃芩炒黃連 香附炒川芎各八錢，甘草五分，水煎服。

三因方香刑散 大人小兒肛門脫出並治

香附 荆芥穗各等分 一方加砂仁

右為末每服三匙水一大碗煎數沸乘熱洗

秦艽湯

去芦酒洗 七錢水煎空心服後安卧時渣再煎

補中益氣湯 治勞倦脫肛妙

一方 五倍子為末每用三錢入白礬一塊水煎

洗或以五倍子用紙襯之托上

一方 木賊燒存性為末擦肛上按入即收

二靈散

治久痢腸胃俱虛肛門脫下

龍骨

煅五錢

木賊

燒存性二錢半

為末擦上托之

治男女脫肛

五倍子荆芥小便濃煎洗之

本事方

腸風下血及脫肛不收

皂角

三莖搗碎水一大碗搗令皂角消盡用絹

二層濾取清汁將肛浸在汁中自收並不待手  
托如大腸收了即用湯盞其肛門上十令皂角  
氣行則不再作盞年三次全愈

集驗方

治脫肛歷年不愈

生鐵三斤水一斗煮取半升以汁浸洗

一方用刀漿水洗亦効

肘後方 治腸頭脫肝出轉久不可收入

生搘姜汁浸之猪肉汁中洗隨以掌按之

令燙自收

濟世方治脫肛

荆芥

龍腦

薄荷

朴硝

右煎湯一日洗數次自入

本事方治腸風脫肛及有益

蛇床子炒為末貼肝上立收

蟬皮散 治肝門或因洞泄或因用力脫出不收

)

蟬皮

一枚燒存性

礞石

煅五錢

桂心

五錢

此寒而脫肛也

右為末

米飲服方寸七忌持重及房室

肘後方治女人陰脫前方加蟬頭一枚燒存性

研入

黃丹少許同研

凡有上件疾即先用白

黑聖散

治漏多時脫肛疼痛

太蜘蛛一枚瓠葉重裹線扎定合于內燒存性

研入

上件同研

凡有上件疾即先用白

千金方

治脫肛歷年不愈

蟬頭一枚燒令烟盡為末付上手按接之

涼水煎末

肘後方

心

卷

八

丹溪方 治脫肛 葫蘆燒烟薰之主入

海上方

諸般痔脫肛

死蛇一條如指大溫者掘地坑燒之以有孔板  
子蓋之坐其上以肛受烟薰之烟盡為止大効

濟世方 治肛出

皂角薰次用蜒蚰一條入蜜浸去蟻洗肛溫柔  
牛硃付上即入

丁女子脫肛用糯米丁勺濃煎飲去米洗肛溫柔  
先以磚一片火燒通紅用醋沃濕以青布鋪磚

上坐 肛於青布上如太熱加布令厚其肛  
又方 蓬房殼荆芥枳殼槐花黃柏防風獨活前  
湯洗之 或以木賊灰或又蛤末付上立收  
治肛門腫痛 本別子去殼取油四五枚研如泥  
入水盆中以滾湯泡之乘熟洗另用少許付上  
肛門腫痒 杏仁搗膏敷上 亦治穀道痛蝕  
外臺秘要治下部蟲癧 桃葉一斛蒸之令極熱  
納小口器中以下部坐上受薰其虫盡死  
脉經云患蝕陰脫其脉虛小者生緊急者死

一人脫肚裏急後重百方莫能收。僧教以取猪

肚丁具刮下垢膩入花椒末拌勻塗肚上以清

綿布袋裝之

耳以溫湯入袋內坐其上薰之少

耳不

復發

○前陰諸疾

前陰所遇之脉有二一曰肝脉二曰督脉經云肝足厥陰之脉入毛中達陰器抵小腹是肝脉所遇也又云督脉者起于小腹以下骨中央女子入繫廷孔循陰器男子循萃中至纂與女子等

王是督脉所遇也

○陰縮陰縱

陰縮謂前陰受寒縮入腹內也陰縱謂前陰受熱  
挺長不收也經曰足厥陰之筋傷于寒則陰縮  
入傷熟縱挺不收治在行水清陰氣是也

丹溪治鮑兄年二十平莖挺長腫而痿皮塌常潤  
磨股不能行兩脇氣上手足倦弱先以小柴胡  
加黃連太劑行其溫熱畧加黃柏降其逆上之  
氣其挺腫漸收漸減及半但莖中有堅塊未消

遂以青皮一味為君佐以散風之劑未服外以絲瓜汁調五倍子末敷而愈

平江王氏子年三十忽陰挺長腫而痛脉數而實用朴硝荆芥湯浸洗又用三乙承氣湯大下之內經曰陰縮而死者皆屬肝傷又云悲哀動中則傷魂魄傷則狂妄不精不精則不正當陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色夭死于秋又云厥陰終者喜溺舌卷卯上縮是也

王莖腫前陰腫是也其症不一有通身水氣癩腔

俱腫者此屬水腫以治水之法治之其腎風搔搔成瘡以致腫者以治瘡毒之法治之有始精餓瘡腫毒以乾瘡之藥治之此緣姤精蘊結毒氣未散而成腫痛也有服金店秘澁之藥精氣雍遏不能宣揚或試緊爐之方取一時之快熟毒內蘊俱能為腫有血氣凝滯癩間竅道閉塞致使莖腫或由忍溺致氣結不行而成腫凡此諸症並以灯心湯調五分散服之以荆芥木通煎湯淋洗此條出鈎玄

○陰痿陰汗陰冷陰臭

陰痿皆耗散過度傷於肝筋所致經云足厥陰之

經其病傷于內則不起是也

東垣陰痿陰汗陰臭論 丁富者前陰間嘗聞臊  
臭又因連白飲酒腹中不知求予治之予應之  
曰夫前陰者足厥陰之脉絡陰器出其挺末臭  
者心之所主散入於五方為臭入肝為臊臭此  
其一也當於肝中瀉行間是治其本後於心經  
瀉少冲以治其標如惡針當用藥除之治法當

求其本連自飲酒夫酒者氣味俱能生湿熱是  
風溫熱合於下焦為邪故經云下焦如瀆又云  
在下引而竭之酒者是溫熱之水亦宜決前陰  
以去之是合下焦二法治之龍膽瀉肝湯是也  
龍膽瀉肝湯 治陰部時發濕痒有臊臭

紫胡梢 濚瀉各一車前子 木通各五當歸  
尾 龍膽草 生地黃各三分 水煎空心飢時熟  
服便以羨膳壓之柴胡入肝為引用瀉瀉車  
前子水遍其淡滲之味利小便亦除臊臭是

名，在下者，引而竭之。生地黃、龍膽草之苦寒，  
濁酒溫熱，更兼車前子之類，以徹肝中邪氣。  
肝主血，用當歸以滋肝中血不足也。

固真湯 治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水，小便後  
有餘瀝，躁氣尻脣并前陰冷惡寒，而喜熱膝亦  
冷。<sup>升麻</sup>一錢半，<sup>柴胡</sup>一錢，<sup>羌活</sup>一錢，<sup>甘草</sup>一錢，<sup>澤瀉</sup>一錢，<sup>龍膽草</sup>二錢。  
<sup>升麻</sup>水煎空心服，以美膳，<sup>升麻</sup>之。

溫腎湯 面色瘦黃身黃，腳軟陰汗，陰莖有天色

麻黃<sup>大分</sup>防風根 蒼朮<sup>各一錢半</sup>白术 猪苓 白  
茯苓 升麻 黃柏<sup>酒炒各一錢</sup>澤瀉<sup>二錢</sup>柴胡梢<sup>六分</sup>  
水煎食前服之，候一時辰許方食。

補肝湯 前陰如冰冷，并冷汗，兩脚痿弱無力。  
黃芪<sup>七分</sup> 人參 葛根<sup>各三分</sup> 甘草<sup>久煮各五分</sup> 蒼朮<sup>各五分</sup>  
升麻 猪苓<sup>各四分</sup> 知母 柴胡 羌活 當歸  
身 陳皮 黃柏<sup>炒</sup>防風 白茯苓 澤瀉  
神龜<sup>連翹各二分</sup> 水煎食前熟服，忌酒麵。

清震湯 合瀉黃、臊臭淋瀝兩丸，如水陰汗浸，兩

股髀頭亦冷，正值十子月，天寒凜冽，寒之極矣。  
澤瀉 升麻 蒼朮 黃芩各五分 柴胡 當歸  
身 甘草炙各二分 巷活 黃柏酒炒各一錢 防風 麻  
黃根 藁本 猪苓各三分 紅花一分 水煎服酒  
柴胡勝濕湯 兩外腎冷，兩髀樞陰汗，前陰痿弱。  
陰囊濕痒臊氣 柴胡 甘草生各三錢 升麻 巷  
活 泽瀉錢半 當歸 麻黃 龍膽草 漢防  
已各一錢 黃柏酒炒二錢 五味子二十粒 紅花少許 白茯苓  
錢一 水煎熟服，忌酒麵房事。

仲景八味丸 治陰痿不振，今依前方，夏減桂附，  
一半，春秋減三之一。病去全減桂附。  
椒粉散 治前陰兩丸，溫痒，秋冬尤甚。  
麻黃錢一 狗脊 蛇床子各五分 斑蝥二分 當歸梢  
猪苓 小茴各三分 肉桂二分 輻粉 紅花各少許  
為細末，掺上避風寒，溫冷處，坐卧。  
又方 治腎囊濕痒，先以吳茱萸湯洗過，後用  
吳茱萸半兩，水石三錢，黃柏二錢，半樟腦，蛇  
床子各五錢，輕粉一錢，白礬三錢，硫黃二錢，檳

柳三錢早正三錢為末捲之

千金方云有人陰冷漸冷氣入陰囊腫滿恐死  
日夜痛悶不得眠取生柏擣之洗淨以布帛裹  
着丸囊令厚半寸須臾熟氣大通日再易之取  
本事云曾有人陰冷漸次冷氣入陰囊腫滿晝夜  
疼痛不得眠煮太薊汁服立瘥

○陰腫陰痛陰吹

婦人陰腫腎痛枳實半切碎炒熟布包熨之冷易  
交接勞復陰卯痛是勞復陰陽易

仲景云胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏  
髮煎道之其方猪膏半斤亂髮如鷄子大三枚  
以髮入膏中煎至髮盡分再服病自從小便中  
出能治諸瘕症殊效

雄黃散 陰腫大如斗核痛人所不能治者

雄黃

一兩

礬

二兩

甘草

生半兩

以水五升煎洗

荆芥散

治腎腫

荆芥穗

朴硝

二兩

蘿蔔

葱前湯洗

男子陰腫大如升罩痛甚搗馬鞭草塗之

和劑三白散 治小兒膀胱蘊熱風濕相兼陰囊

腫脹大小便不利

白牽牛一兩桑白皮 木通

白术 橘紅各五錢

為末姜湯調二錢

○癩風俗名腎臍風

癩風之症起於下部虛熱或行路體倦及夏月久坐冷地為風濕所襲乃發為疾其症囊濕皮厚生水泡瘡疥作痒古方用蛇床子一味煎湯淋洗痒甚者以姜汁入香油數滴攪勻塗上自愈沐浴長春散 治下元陰寒久冷陰囊夜痒抓之

則喜手住則痛成瘡流水為患甚苦及治婦人下部陰濕子胞久冷並効

牡蠣

蛇床子

破故紙

紫梢花

官桂

薄荷葉 各等分每用一兩半入葱白數莖水

煎一小鍋先薰後洗再用津調散搽之全安

津調散

治姤精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

款冬花

射香少許

為末先洗過或以地骨皮蛇床子煎湯洗帛拭乾津調敷忌生冷生湯洗丁方無射

又方 治外腎及兩腿風濕瘡

全蝎

檳榔

蛇床子

硫黃各一錢

為末麻油調入手心擦熟吸三口用手抱囊

一噴次擦藥兩腿上

疝氣門

內經四氣刺逆從篇曰厥陰脉滑則病少陽脈滑則病肺風疝太陰脉滑則病脾風疝陽明脉滑則病心風疝太陽脉滑則病腎風疝少陽脉滑則病肝風疝又骨空篇曰任脉為病男

子內結七疝女子帶下瘕聚大奇論篇曰腎脉大急沉為腎疝肝脉大急沉為肝疝心脉搏滑急為心疝肺脉沉搏為肺疝三陽急為瘕三陰急為脾疝三阴脾脉也

脉經曰寸口脉弦而緊絃緊相搏則為寒疝生生子曰內經以六經脉滑為風疝又以大急沉為五歲疝按此六經五臟皆有疝也而以風字加之於六經之疝者何也意者無乃以風字作氣字者看耶或以異為風則木之氣肝之所主

也又成疝之地乃肝部也夫滑脉主疾飲食積是言各經之疾飲食積流傳于肝之部也乃成疝也因肝主風故以風字加之也又夫急者緊急之謂也緊主病為寒沉亦為寒為氣大亦為氣是亦言五臟寒氣流於下部發為疝也蓋寒喜傷下腎肝俱在下而肝之絡環繞陰器故以疝屬肝也據任脈起于胞門循腹裏與衝脈厥陰會故男為七疝女為瘕聚也其病極為難治而諸書所言亦不一惟張載人一主于肝蒐輯

甚博且曰非靈素銅人之論法皆不取要之欲窮其原耳故其歷舉經義俞穴及七疝症圖殊為詳悉但用治諸方多是渠生平所長之三法人或病其峻抑不知有是病用是藥醫而不善用此是無術也則未免有過時失機之悔顧其症積滯根固凋萎偏僻非峻劑曷能以達第不可孟浪亂投法所當用又何畏縮在設施者消息經權務求其當可也劉守真言此症亦有熟者丹溪亦主于肝且又言有湿熱死血及痰積

因寒鬱而發間亦有虛者此亦沃鑒前人純擬于寒而一以刮燥為劑也今以諸賢之意述列於後以便參治

劉守真曰癩疝小腹按卯腫急絞痛也寒主拘縮故也寒極而土化制之故腫滿也經言丈夫癩疝謂陰器連小腹急痛也故言婦人少腹腫皆厥陰肝之脉也經注曰寒氣聚而為疝也又按經言五臟皆主疝征脉急也注言脉急者寒之象也然寒則脉當短小而遲今言急者非急數

而洪也由緊脉主痛急為痛甚病寒雖急亦短小也所以有痛而脉緊急者脉為心之所養也凡六氣為病則心神不寧而緊急不得舒緩故脉亦從之而見也欲知何氣為其病者遁其緊急相兼之脉而可知也如緊急洪數則為熱痛之類也又經言脾傳之腎病名疝瘕小腹冤熱而痛出白蟲注言小腹痛溲出白液也一作客熟內結銷鑠肌灼如蟲之食故名白蟲也然經復言熟為疝瘕則亦不可止言為寒痛以脉症

弘之

丹溪曰疝主肝經與腎經絕無相干而痛之甚者  
暍丸連小腹急痛也或有形或無形或有聲或  
無聲自素問以下皆以為寒蓋經絡得寒收引  
不行所以作痛世有得寒而無疝者又又有說  
以通之可也予屢踢水徒涉不曾病耳以予素  
無熱也因而思此病始于濕熱在經鬱遏至久  
又感外寒溫熱收鬱而作痛若只以寒論恐為  
未備或曰此症多客厥陰一經溫熱之積何由

而致予曰大勞則火起于筋醉飽則火起于胃  
房勞則火起于腎大怒則火起于肝失鬱之久  
濕氣便盛濁液凝聚并入血隧流于厥陰肝屬  
木性速急火性暴為寒束宜其痛甚而暴也愚  
見古方以烏頭梔子等分作湯用之其効亦速  
後因此方隨形症加減無不應又須分溫熱  
多寡而治之但腫多為濕癩是也却有水氣而  
腫又有挾虛而發者當以參木為君而佐以踈  
道診其脉沉緊而豁大者是也若不以補劑而

行決裂之法，禍不旋踵。

許學士曰：「太抵此疾因虛得之，不可以虛而驟補。經云邪之所湊，其氣必虛。番而不去，其病必實。故必先滌所畜之熱，然後補。是以諸方多借巴豆氣者，蓋謂此也。」

張戴人曰：「疝本肝經，宜通勿塞。疝有七，前人論者甚多。非靈樞素問，銅人之論，余皆不敢非。余好異也。但要窮其原耳。七疝者，何？寒水筋血氣孤癩是也。俗工不識，目為膀胱，又為腎冷，又或為

小腸氣。小兒曰：偏氣，立名既謬，併喪其實。何哉？蓋醫者既斷為膀胱腎冷，小腸氣又曰虛寒，所致其藥之用也不鹿茸巴戟，則杜仲、菟絲子不附子烏頭，則乾姜、官桂不練寶茴香，則金鈴、補骨脂朝夕暮餌，曾無殊効。三二十年牢不可去，間因微病，稍似開通，執此微芒，浸成大錯。標既不除，本必歸，甚處相傳，曾無覺者。豈知諸疝皆歸肝經，其柰庸流歸之？小腸脬囊，夫膀胱水府專司滲泄，小腸水道專主通流，腎為少陰總統。

二水入之小溲自胃入小腸滲入膀胱膀胱者  
脬囊也氣化則水出莖端此常道也及其為疝  
乃是厥陰肝經蓋環陰器而上入小腹者足厥  
陰肝經也夫腎肝皆属于下衝任督相附然靈  
樞經言足厥陰肝經病則有遺溺癃閉狐疝主  
腎與小腸膀胱三經則不言疝是受疝之處乃  
肝之部分也且內經男子宗筋為束骨之會也  
而肝主筋睪者囊中之丸雖主外腎非厥陰環  
而引之與玉莖無由伸縮在女子則為篡戶其

內外為三其一曰廷孔其二曰竊漏此足厥陰  
與衝任督之所會也靈樞言足厥陰之經筋聚  
于陰器其病傷于寒則陰縮入傷於熱則縱挺  
不收治在行水清陰氣故陽明與太陰厥陰之  
筋皆會於陰器惟厥陰主筋故為疝者必本之  
厥陰靈樞又言足厥陰之別名曰蠡溝去內踝  
五十步別走少陽循胫上畢結于莖其病氣逆  
腫卒疝實則挺長虛則暴痒取之所別矣豈非  
厥陰為受病之處耶靈樞又言邪在小腸連卑

系屬于腎。貫肝絡肺。系心氣盛厥逆。上衝腸胃。  
重肝散於肓。結於脾。故取之肓原以散之。刺太  
陰以平之。取厥陰以下之。取巨虛下廉以去之。  
按其所過之經以調之。此其初雖言邪在小腸。  
至其治法必曰取厥陰以下之乃知諸疝屬於  
厥陰可以無疑。以脉考之。素問云。厥陰滑為疝。  
風疝少陰滑為肺風疝。太陰滑為脾風疝。云  
凡此六疝雖見于他脉中。皆言風疝者。足厥陰  
肝經之氣也。靈樞亦曰心脉微滑為心疝。肝脉

滑甚為癆。瘡腎脉滑甚為癆。瘡。凡此三臟脉之  
疝亦以滑為疝也。素問又云。脉太急皆為疝。少  
脈滑傳為心疝。肺脉沉傳為肺疝。三陰急為疝。  
三陽急為瘕。王太僕云。太陽受寒血凝為瘕。太  
陰受寒氣聚為疝。此言太陰受寒傳之肝經也。  
可以溫藥逐之。不可以溫藥補之。若補之者。是  
欲病去而強挽留之也。歷考素問三陽為病。發  
寒熱其傳為癆。疝亦言膀胱非受病之處。必  
傳于厥陰部分。然後為疝也。又言病在少腹。

痛不得大小便病名曰疝得之寒言脉急者曰  
疝瘕少腹痛凡言少腹者豈非厥陰之部分耶  
又言脾氣傳胃名曰疝瘕此謂非肝木不能為  
風氣名曰厥疝蓋脾土虛而不能制水又為肝  
木所凌也又言督脈為衝疝蓋厥陰與衝任督  
俱會于前陰也豈不明哉至于運氣中又言歲  
太陽在泉寒淫所勝民病少腹控睾蓋寒客于  
小腸膀胱則肝木縮而不得伸行毋傳之子也  
陽明司天燥淫所勝丈夫癩疝婦人小腹痛此

言肝氣不得上行為金所抑鬼賊故也又言太  
陰在泉主勝則寒氣逆滿食飲不下甚則為疝  
與亦言寒客太陰濕土不能勝水傳之肝  
經也又嘗遍閱銅人俞穴亦相表裏如背上十  
三椎俞肝經言寒疝腹部中行惟陰交丁穴言  
寒疝任脉之所發也闔元丁穴言暴疝小腸之  
募足三陰任脉之會也曲骨丁穴言癰疝任脉  
足厥陰之會也其腹部第二行肓俞二穴言寒  
疝衝脉足少陰之會也四病上穴言疝瘕衝任

脉足少陰腎之會也其腹部第三行太巨二穴言瀆疝足陽明脈氣之所發也氣衝二穴言癩疝中痛兩丸寒痛亦足陽明脈氣之所發也其腹部四行府合二穴言疝痛足六陰厥陰維之交會也亦太陰部三陰陽明支別也衝門二穴言陰疝足太陰厥陰之會也其在側脇者五樞二穴言寒疝陰邪上入少腹帶脉下三十也其在足少陰者足厥陰穴十名言疝者七謂太敦行間太衝中封蠡溝中都曲泉足少陽穴

十四名言疝者一謂丘墟穴也足太陰穴十一名言疝者一謂陰陵泉也足陽明穴十五名言疝者一謂陰市穴也足少陰穴十五名言疝者五謂然谷大谿照海交信築賓也足太陽穴十八名言疝者二謂金門合陽也由是言之惟厥陰言疝獨多為疝之主也其各經穴雖亦治疝終非受疝之地但與足厥陰相連耳或存泉寒勝木氣攣縮禁于此經或司夫燥勝木氣抑鬱于此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結于此經或藥

淋外固閉尾縮精壅于少經其病差別如此不知世間之藥多熟補從誰而受其方也信其方則素問靈樞銅人皆非也信素問靈樞銅人則俗方亦皆非也不知後之君子以孰為是嗚呼余立于醫四十餘歲使世俗之方人可療余莫知敢廢也諳練日久因經識病然後不惑且夫遺溺閉癃陰痿胞痺精滑白淫皆男子之症也不可妄歸之腎令血涸不日月罷腰膝上熱足甓嗑乾癥閉少腹有塊或竈或移前陰突出

後陰痔核皆女子之症也但女子不謂之症而謂之瘕若年少而得之不計男子婦人皆無子故隱蔽委曲之事了不干脾腎小腸之事乃足厥陰肝經之職也柰俗方只言脾胃小腸殊不言肝木一句惑人甚矣且肝經乙木也木屬東方為心火之母也凡疝者非肝木邪則肝木自甚也不可便言虛而補之難經所謂東方實西方虛瀉南方補北方此言瀉火木自平金自清水自旺矣昔審言為蔡之參軍也因坐湿地疝

痛不可堪諸藥莫救余急以導水丸禹功散瀉三十餘行腫立消痛立減又頃閑一男子病卒疝暴痛不任倒於街衢人莫能動呼余救之余引經証之邪氣客於足厥陰之絡令人卒疝故病陰丸痛也余急瀉太敦二穴太痛立已夫太敦穴者乃是厥陰之干穴也殄寇鎮一夫病瘡癰發渴痛飲蜜漿劇傷水水醫者真知瀉去其溫反雜進姜附溫為燥熱所壅三焦閉溢水道不行陰道不興陰囊腫墜大於升斗余先以導

水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水一斗遂失痛之所在近頸尾一夫病卒疝赤腫大痛數日不止諸藥如水投石余以導水一伯五十丸令三次咽之繼以通經散三錢掌腹淡酒調下五更下臍腑壅積之物數行痛腫皆去不三日平復如舊內經曰木鬱則達之達謂吐也令條達肝之積本當吐者然觀其病之上下以順為貴仲景所謂上宜吐下宜瀉者此也敢列七疝圖於左以示後之君子庶幾有所憑藉

者鳥

寒疝其狀囊冷結硬如石陰莖不舉或控睾丸而痛得於卑下濕地或寒月涉水或置兩雪或卧坐碑石或風冷處使內過勞宜以溫劑下之久而無子

水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫而狀如水晶或囊痒而燥出黃水或少腹中按之作水声得于飲水酒醉使內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多令人為卒疝宜以逐水之

劑下之有漏針去水者人多不得其法筋疝其狀陰莖腫脹或噴或膿或痛而裏急筋縮或莖中痛極則痒或挺縱不收或白如精隨溲而下得于房失勞傷及邪術所使宜以降心之劑下之

血疝其狀如黃瓜在少腹兩傍橫骨兩端約中俗云便瘡得于重感春夏太燠勞動使內氣血流溢滲入膀囊留而不去結成瘡腫膿少血多宜以和血之劑下之

氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之而脹怒止號罷則氣散者是也有一治法以針出氣而愈者然針有得失宜以散氣之藥下之或小兒亦有此疾俗曰偏氣得于父年已老或少年多病陰痿精快強力入房因而有子胎中病也此疝不治惟築賓一穴言之

狐疝其狀如瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊中狐則晝出穴而溺夜則入穴而不溺此疝出入上下往来正與狐相類也亦與氣疝大同小

異今人帶鈎鉛是也宜以逐氣流經之藥下之癩疝其狀陰囊腫絰如升如斗不痒不痛者是也得之地氣卑溫所生故江淮之間湫塘之處多感此疾宜以去溫之藥下之女子陰戶突坐雖亦此類乃熱則不禁固也不可便謂虛寒而澁之燥之補之本名曰瘕宜以苦下之以苦堅之王冰云陽氣下墜陰氣上爭上爭則寒多下墜則筋緩故舉垂緩緩因作癩疝也已上七疝下去其病之後可調則調可補則補各量病勢

勿拘俗法。經所謂陰盛而腹脹不通者癩疝也。不可不下。

統旨曰。或問。疝氣古方有以為小腸氣者。有以為膀胱氣者。惟戴人丹溪專主肝經。其說不同。何以辨之。予曰。小腸氣。小腸之病。膀胱氣。膀胱之病。疝氣。肝經之病。三者自是不一。昔人以小腸膀胱氣為疝者誤也。殊不知足厥陰之經環陰器。抵小腹入之病也。者發則舉丸脹痛。而連及小腹。則疝氣之係于肝經也可知矣。且小腸氣

俗謂之橫絃堅絃。繞脅走注。少腹攻刺。而膀胱氣則在毛際之上。小腹之分。作痛與疝氣之有形如爪。有声如蛙。或上於腹。或下於囊者。不同也。但小腸膀胱因經絡並於厥陰之經。所以受病。連及于肝。則亦下控引睾丸為痛。然只是二經之病。不可以為疝也。學者惟考張朱二公之說。則庶乎其不惑矣。

生生子曰。按統旨此論。只可以言狐疝。不足以盡經義。然素問六經皆有疝。故後之言疝者。或名

小腸氣或名膀胱氣或名腎冷氣張戴人朱丹溪乃獨屬之肝經要之各有所本而肝腎居多爾按靈樞經云邪在小腸連繩系屬腎貫肝絡肺系心氣盛厥氣上衝也大亢邪氣亂於人之經也隨各經而名之亂於腎為腎氣亂於膀胱為膀胱氣亂於小腸為小腸氣腎與膀胱相為表裏其氣通于外腎系於華丸此三經與厥陰互相聯絡而又俱在下部與衝任督諸脉會也戴人亦曰腎之穴十而言疝者五丹溪乃言與

腎絕無相干絕之一字未細考爾實相須也凡久立過內則傷腎勞力遠行則傷筋腎傷則膀胱虛筋傷則肝氣弱有所傷風寒濕邪乘虛而襲入於腎則腰囊腫小腹痛而足冷舌本強此腎經受病之候入於肝則先從陰器冷痛上抵肤脣唇青足厥甚則舌卷囊縮此肝經受病之候也膀胱乃胞之室素問骨空論篇曰任脉起於中極之下以上毛際循腹裏上關元自胞上過帶脈貫陰而上故任脉為病男子內結七

病或指膀胱氣者以此也又衝脈為病逆氣裏急督脈起少腹以下骨中央女子入系廷孔其孔澁孔之端也其絡繞陰器合篡間繞篡後別繞臂至少陰其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫肺中央上貫心此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝注曰衝任督皆奇經一源而三岐都與腎肝會也由是考之各有所本匪謬也惟肝腎居多腎不淳無相干肝不得獨主疝從可知矣揣戴人之意若獨屬之

肝則東方實為有餘有餘者鴻之庶可以行生平所長之技也師者誠能體認不謬則通塞一適其宜丹溪戴人不多讓矣

挾虛者當用參术為君佐以陳導之藥其脉豁大按之無力者虛也又按之不定者亦屬虛必用桂枝山梔過烏頭細切炒過為末以姜汁糊為丸每服三四十九姜湯下大能劫痛食積與死血成痛者梔子桃仁山楂實吳茱萸並炒以生姜汁順流水煎湯調服

一方 加茴香附子

戴元禮曰木腎者心火下降則腎水不患乎不溫真陽下行則腎水不患乎不知安有所謂木強者哉夫惟嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯脹大作痛頑痺結硬不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪氣內消榮衛流轉益如寒谷春回蓋有不疾而速不行而至之妙矣

橘核散 单止痛此蓋溫熟因寒鬱而發用梔子

仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱况二藥皆下行之藥而烏頭又為梔子所引其行尤速不使胃中停留也 橘核 梶仁 梔子 川烏

吳茱萸 水煎服

又方 切痛 烏頭細切炒 梔子仁炒等分 為末或加或減白湯丸服亦可

積疝方 山楂炒一兩 茴香炒 茄胡炒各三錢 牡丹皮一錢 酒糊丸如梧子大 盐湯下六十丸

又方 治疝痛

赤水玄珠 卷之三  
山楂炒四兩 枳殼炒 面香炒 山梔仁炒各二兩 牡丹皮  
紫胡炒 桃仁炒 大茴炒各一兩 吴茱萸五錢  
酒糊丸益酒吞下五十丸

又方 治疝痛

蒼术益炒 香附益炒 黃柏酒炒 青皮青皮 玄胡索  
益智為臣 桃仁為臣 面香為佐 大附子益甘草  
水煎服一痛過更不再作矣  
丁人有疝腹內有塊每塊痛作疝痛止疝痛作塊  
痛止 三稜 茴朮醋煮 神曲炒 姜黃南星 各一  
治小腸氣及木腎偏墮

兩山楂炒去菜梗用 木香 沉香 香附各三錢 黃連吳茱萸同  
炒去菜梗用 净黃連五錢 桃仁 蘿卜子 山梔仁 枳  
棟炒各五錢 姜汁餌餅糊為丸  
黑丑一斤用猪尿胞裝滿以線縫口好酒米醋  
各一碗於砂鍋內煮乾為度取出黑丑用青紅  
娘子各十九枚於銖鍋內炒燥去青紅娘子將  
黑丑研取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二  
兩醋糊為丸梧子大每服三十丸空心鹽酒送

卷之三

三

四

下不可多服，多服令人頭眩。如頭眩可服黑丹，元戎加味五苓散。治疝氣卒痛，小便澁。

本方加川練子一分。

局方三白散 治膀胱蘊熱，濕熱乘陰，囊腫痛，太小便不利。方見前陰門。

復元通氣散

舶上茴香 川山甲 蛤粉炒各二兩 陳皮 玄胡  
索 黑丑 炒末 甘草炒各一兩 木香半錢  
為末，每一大錢食前熟酒調服。

寶鑑控引寧丸 小腸病結，而不下痛，引心脰。  
茴香炒 川練子炒 食茱萸 陳皮 馬闇花醋炒  
各一兩 芫花醋炒 五錢 醋糊為丸，梧子大，每十九丸至  
二十九丸，空心溫酒下。

三因大烏頭桂枝湯 治風寒疝氣，腹中刺痛，手足不仁，身體拘急，不得轉側，或致陰縮。  
大烏頭五枚去皮尖蜜煎過，洗切 桂心 白芍各三錢 甘草一錢  
每服四錢，姜棗煎服。

局方奪命丹 遠年近日，小腸疝氣偏墜，擗痛，脅

下搃痛悶亂外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒搔

成瘡

吳茱萸

淨一斤

四兩

用酒醋湯

潭瀉

二兩

童便各浸一宿燒乾

酒糊

二兩

酒糊為丸梧子大

每五十九字

心鹽湯

下

葫蘆巴丸

小腸氣

蟠腸氣

奔豚疝氣

偏墜陰腫

小腹有形如卵上下来去痛不可忍或絞結繞

脣改刺嘔吐者

葫蘆巴

炒一斤

川烏

炮去皮

茴香

炒二斤

吳茱萸

湯洗七次

酒糊為丸梧子大

每二十九字

心酒下

戴人禹功散

黑丑

頭末四兩

茴香炒

一兩

一為末以生姜自然汁調

丁二錢臨睡服或加白朮一兩

茴香練實丸

治陰症痛

不可忍及小腸氣痛

川練子炒茴香

炒青皮

陳皮

芫花

醋炒

山茱萸食茱萸

吳茱萸

馬闇花

各等分

醋糊丸梧子大溫酒下三十丸

天台烏藥散治小腸疝氣牽引脅腹疼痛

烏藥木香茴香炒青皮良姜

各等分

五錢

檳榔

二枚

川練子

巴豆

七十粒

右先以巴豆微打破同川練麸皮炒黑去巴豆麸皮不用外餘藥同為末每用一錢酒調下甚者姜湯下亦可

濟生葵子湯 膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥  
赤茯苓 猪苓 姜子 枳實 罂麥  
車前子 木通 黃芩 滑石 甘草  
每五錢入姜煎空心服

局方蟠葱散

治寒疝氣疝衝心疼痛

玄胡索

蒼术

甘草

合半斤

茯苓

蓬术

三稜 青皮 各大  
乾姜 各二  
金櫃當歸生姜羊肉湯 寒疝腹中痛及腸痛裏急  
當歸 三 生姜 五 羊肉 一  
水八升煮三升溫服七合日三服如寒多加  
生姜 嘴者 加陳皮二兩白朮一兩  
知鈎散 治陰狐疝氣偏有太小時上上下  
知鈎散 十四 放燉  
肉桂 五錢一  
為末取八分米飲調服或蜜丸服亦可

王海藏丸用以黑大者去頭足  
研如膏入藥中乃妙炒黑不妙

東垣丁香練實丸 男子七疝痛不可忍婦人瘕  
聚帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病故治  
法同 當歸 附子 炮川練子 茴香 炒各  
二兩

好酒三升同煮盡為度焙乾作細末每十兩  
入丁香木香玄胡末各五錢全蝎十三枚後  
四味未入在前藥末內和匀酒糊丸梧子大  
每三十丸加至百丸空心溫酒下

熨法 盐半斤炒極熟以舊綿包熨臍腹痛處

又方 葱白研碎一握置臍中上用熨斗熨之或  
以艾於上灸之尤妙

海藻瀆堅丸 治木腎如斗結硬如石

海藻 昆布 川練肉 吳茱萸湯泡各木香  
青皮 小茴 荔枝核炒 玄胡索炒 肉桂各五  
錢  
海帶 橘核炒 桃仁炒去皮各一兩 木通七錢  
酒糊為丸梧子大每六十丸空心鹽酒任下  
癩疝大如升斗者是也惟大不痛丹溪謂非癩新  
房事厚味不可用藥惟促其壽若蒼朮神麯白

立半夏山查枳實皆要藥人視其為淺鄙以啓，慢心又不能斷慾以愛護其根者非徒無益而反被其害者多矣且其藥宜隨時令寒溫更按君臣佐使加減大抵癩屬溫多。

蒼木 神麴 白芷散水 山查 川芎 枳實  
南星 半夏 神麴糊為丸有熱加山梔一兩堅硬加朴硝五錢秋冬加吳茱萸二錢半，

又方 治癩疝

南星 山查 蒼术各二 白芷 半夏 枳枝

神麴各一 海藻水 昆布各五 玄明粉 吳茱萸

錢各二 酒糊丸

治木腎不痛方 南星 半夏 黃柏酒 蒼术洗 盐  
枳實 山查 白芷 神麴炒 滑石炒 吳茱萸

昆布 酒糊丸 宜心 蘭湯下一方 加枸杞子，

治偏墮初生

川山甲 尚香 為末酒送下乾物壓之

繫古海蛤丸 治癩疝從小便中利出惡物

海蛤醋淬 三次海金沙 脂粉 破砂 川歸各一錢

海藻

粉霜各五

水蛭

丹條沙一青黛滑石乳

香

各一

硃砂二

地龍二十

水洗去泥一條鹽

右用鹽煮麵糊為丸小豆大硃砂為衣每十丸燈心湯空心服之小便下冷膿惡物乃効却以黃連紫河車板藍根各二錢煎湯漱口以固牙一方去板籃根加貫衆

王海藏地黃膏子

男子婦人臍下奔豚氣塊小

腹疼痛陰腫控睾而痛上衝心腹不可忍者

血竭

沉香木香

人參

廣歲炮玄胡索

蛤蚧

川歸川芎續斷白朮

川練子

炒金蝎

茴香炒柴胡

沒藥

吳茱萸

已上分兩隨症加減用之氣多者加青皮，血多者加肉桂，為末地黃膏子為丸梧子大空心溫酒下二十丸日加一丸至三十丸本事方念珠丸膀胱疝氣外腎腫痛不可忍昔有入貨此藥治疝如神一日貨數十九十一國醫多與金而得之用果良驗

乳香

硝砂飛各三

黃蠟

一熔化分作一百單

卷之四  
金丸以線穿之露一宿次日用蛤粉為衣旋  
取用乳香湯送下

丹溪治鄭子敬酒後飲水及水菓腎偏大時作鮮  
声或作痛炒枳實一兩益炒茴香炒槐子各三  
錢研煎湯送下保和丸又一人膀胱氣下墜  
如鵠糞臭橘核炒十枚桃仁二十九枚蘿卜汁下  
保和圓七十丸

丁人年三十左右，腎核腫痛，此飲食中濕墜下，成熟以良橘核五枚，桃仁七枚，細研順流水一盞煎。

沸湯熱下保和丸

丹溪治木腎以水晶浦桃桑

野紫蘿葉

蒼耳

丁方治水癩偏大上半不定疼痛不止  
牡蠣不拘多少鹽泥固濟炭三斤煅令火盡冷  
取出二兩加乾姜一兩焙為細末二味和勻以  
冷水調塗病處小便大利而愈

又方 玄胡索炒鹽全蝎為末每二錢溫酒調下  
雄礬散 治陰腫大如斗，挾痛

椎黃一兩白朮二兩甘草五錢水煎先薰後洗効治偏墜一入挾腫痛甚二字不分大如升偏醫不効以此治除根松江甚神此方

牡丹皮二兩蒼朮米泔浸三日鹽水拌炒大錢荔枝核炒一錢山楂一兩橘核炒七錢山梔仁去皮以吳茱萸炒三兩

鮮鉗丸

治小腸氣及膀胱氣橫絃堅絃木腎偏

陞下部諸疝氣痛

木鱉子

二兩淨去油用木通二兩茴香二兩用班鴟

二兩用班鴟

神麴糊丸

梧子大字心白湯下五十丸

黑丑

同炒熟去班鴟黑丑

二兩用班鴟

半夏

二兩用班鴟研碎同炒熟去班鴟

二兩用班鴟

木鱉子

二兩淨去油用木通二兩茴香二兩用班鴟

二兩用班鴟

五妙丸

治一切下部氣速効如神

姜鹽燈心酒

下牛後臨聳各一服

黑丑

補骨脂川練肉各一兩用地龍一兩

半夏

一兩用猪苓一兩茴香一兩用班鴟十四

丁香

二分用土狗子同炒去班鴟一兩

酒糊丸梧子大每服十九丸加至十五丸空心

赤水玄珠

卷二十一

五十二

終

# 太官詹少溪吳馭閱校

又方 治諸疝痛及心痛臨發時服  
海后 香附 為末姜汁調下  
一人患疝因服熟藥多以致小便不通後用五參  
散分三帖每加連鬚葱丁根射香少許益五分  
煎服連進三服其夜下黑汁二升廝下遂寬續  
用調砂丸數日全愈

鹽酒送下

乳姜湯 治寒疝氣上衝中脘築痛

乳香末二錢生姜自然汁二錢水一大盞同前三五

沸通口服一服効

香木丸 寒溫成疝腎腫疼痛

蒼术

半斤米泔水浸一夜晒乾用生姜半斤  
葱白四兩搗炒蒼术乾去葱姜不用

茴香

半斤用生姜汁四兩浸一夜宿後用鹽炒乾

吳茱萸

四兩湯炮炒

右末搗葱白成膏為丸梧子大每五十丸空心溫酒或蓋湯下

大德藏書

文忠公集卷之二十一

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

二

一

十

九

八

七

六

五

四

三

