




赤水珠

婦人門

廿七



中西
卷 28

赤水玄珠婦人門第二十七卷目錄

煩

- 妊娠煩躁口乾 風瘻子癟 妊娠瘦癰
妊娠鬼胎 妊娠不語 傷寒熱病防損胎
妊娠傷寒 妊娠時氣 過時熱病
熱病胎死腹中 妊娠瘡疾 妊娠泄瀉
下痢黃水 大小便不通 小便不通轉脬
孕淋 妊娠遺尿 妊娠尿血
胎水腫滿 腹內鐘鳴 孕癰

藏躁悲傷 滑胎方法 十產論

產難方論 交骨不開產門不閉

下死胎方 大小產難生死脉訣

胞衣不出 朝中 產後血暈

產後顛狂

狂言譖語

產後不語

狂言不語

終

婦人全書卷之三

新安生生子孫一奎著輯

。妊娠煩躁口乾

足太陰脾之經其氣通於口手少陰心之經其氣
通於舌若臟腑不調氣血不和以致內熱乘於
心脾津液消燬故心煩口乾也與子煩大同小
異宜用益母丸即前一味知母丸是也

一妊娠煩熱咽疼用知母散加山梔清肺而愈后
又內熱咳嗽小便自遺用補中益氣加麥門冬

山枝以補肺氣滋腎水而痊

知母散 治煩躁悶亂口乾

知母

麥冬

黃芪

子芩

赤茯苓

錢各一

甘草

水煎

入竹瀝一合再煎

人參黃蓍散

治身熱煩躁口乾

人參

黃蓍

炒葛根

秦艽

赤茯苓

人參

知母

甘草各五分

右姜三片竹葉十四片水煎服

。妊娠風症子癟

妊娠體虛受風而傷足太陽經遇風寒相搏則口

噤背強甚則腰反張名之曰痙湥更自醒良久

復作又名曰子冒又類子癟

生生子曰風症乃外邪從足太陽而入有副系之

分當從仲景法於傷寒門中求治子癟乃痰涎

所致是內臟所生治當分別

薛氏曰若心經風熱用釣藤湯肝脾血虛加味逍

遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣迷痰滯紫蘇飲

肝火風熱釣藤散脾鬱痰滯二陳姜汁竹瀝若

兼症相雜看所兼重輕分治

一妊娠出汗口噤腰背反張時作時止此怒動肝
火也用加味逍遙散漸愈又用釣藤散而止更
以四君加釣藤山梔柴胡而安

一妊娠婦因怒忽仆地良久而甦吐痰發搐口噤項
強用羚羊角散漸愈更用釣藤散始痊只用歸
脾湯全安

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張及子癇子胃

風痙等症

羚羊角 獨活

酸棗仁 炒

五加皮

防

川芎

苡仁 炒

川歸洗

杏仁 去皮尖

茯神各五分

炙甘草

木香各二分

右姜水煎服

釣藤湯

方見胎動不安卷

雲箕子葛根湯

妊娠臨月因發風痙忽悶憤不

識入吐逆眩倒併治子癇

葛根

貝母

丹皮

防風

川歸

川芎

茯苓

桂心

澤鴉

甘草各一

獨活

石羔 人參各三兩 右以水九升煮取三升 分作三服 ○ 貝母 令人易產未臨月升麻代之 此症多由風寒溫乘虛而感皆從太陽經治

活人獨活防風湯 治太陽有汗名柔症

桂枝 獨活 防風各一 芍藥三 甘草半

右每服乙兩水煎溫服

防風葛根湯 治太陽無汗名曰剝瘡

葛根四 麻黃三 芍藥 防風各二 桂枝一兩

每服一兩先煮麻沸去上沫入餘藥同煎溫服

○妊娠懊癓

瘦者筋脈急而縮也 癢者筋脈緩而伸也 一縮一伸手足相引搐搦不已 太抵與嬰孩發搐相似此症多屬風 主搖動駱龍吉云心主脉肝主筋心屬火 肝屬木 主風 火相熾則為瘓癓也 ○ 治法若因風熱用鈎藤湯加柴胡山梔黃芩白朮以平肝木降心火 卷血氣若風痰上壅加竹瀝南星半夏若風邪急搐加全蝎姜桑氣血虧損用八珍湯倍加鈎藤山梔若抽搐無力

戴眼反折汗出如珠者，肝氣絕也，皆不治。

薛氏治一姪婦四肢不能伸服，祛風燥溫之劑遺
尿痰甚，四肢抽搐，乃肝火血燥，用八珍湯，停加
炒黑黃芩佐以釣藤湯而安。後因怒前症復作，
小便下血寒熱，少寐飲食少，思用釣藤散加山
枝柴胡而血止，續用加味逍遙散，寒熱退而得
寐，用六君子湯加芍藥，釣藤，欲食進而漸安。

釣藤散

治肝厥頭暉

釣藤鈎

陳皮炒

半夏

麥冬

茯苓

茯神 人參 甘菊 防風各一錢 無甘草分
石膏 煅二錢 姜三片水煎服

○姪鬼胎

人由臟府失調，血氣不充，營衛虛損，則精神衰弱
而鬼魅之類得以乘之，亦如懷姪之狀，故名曰

鬼胎也

薛氏曰：一婦經閉八月，肚腹漸大，面色或青或黃，
用胎症之藥不應。薛診視之，曰：面青，脈濇，寒熱
往來，肝經血病也。面黃，腹大，食少，體倦，脾經血

病也此鬱怒傷肝脾之症非胎也不信仍用胎
劑無功乃與加味歸脾湯逍遙散各二十餘劑
諸症稍愈彼欲速効別服通經丸一服下血昏
潰自汗惡寒手足俱冷令嘔逆不食用一个參炮姜
二劑漸愈又用十全大補湯五十餘劑而安

治此症太抵要看虛實者可改涉虛者必於補

中兼消而佐以雄黃丸之類行而散之

雄黃丸 治鬼胎癆血腹痛

雄黃 鬼臼 去毛 莪草 丹砂 巴霜

獺肝炙黃各半兩 鮑鰐一枚炙 鳕鰐一條炙

右為末蜜丸梧子大每服二丸空心溫酒下日
二服或下蛇鱉之類

治鬼胎及血氣痛不可忽

班猪去頭趨足
用糯米炒 延胡索 炒等分

為末溫酒下五分以去穢物為度空心眼

斬邪丹 治鬼胎大如抱甕

吳茱萸 川烏 秦艽 柴胡 姜奮

茺蔚醋炒 巴戟 巴仁 各一兩

卷之三
七
為末，蜜丸梧子大，每服十九丸，蜜酒下，取下恶物。

姪娠不語此名曰瘡

黃帝曰：人有重身九月而瘡，此為何也？岐伯對曰：胞之脉絡絕也。帝曰：何以言之？岐伯曰：胞絡者，繫於腎少陰之脈，貫腎繫舌本，故不能言。帝曰：治之柰何？岐伯曰：無治也。當十月復。

此至入穷理之言，患此者當靜以養之，不必驚惶而亂投劑。十月分娩後當自語也。

○姪娠傷寒熱病防損胎

良方曰：非節之氣傷於姪娠，毒侵損胞胎，若不

早治，多致墮胎漏血，則子母之命亦不能全矣。薛氏曰：此亦當分六經為主，相參而治。

○姪娠傷寒，身痛壯熱

葱白一升，前胡、葛根、石膏各二兩，青代一兩，水煎分三服。

升麻二兩

梔子十二枚

知母

黃芩、茯苓、生姜各二兩

水煎分三服

○姪娠傷寒，太小便閉結

前胡二兩

大黃

石膏各五兩

山梔一枚

知母

水煎分三服

○姪娠傷寒，發斑忽黑，小便如血，其胎欲落

卷之三
八

山梔 升麻 各四 青代 二
兩 生地 四 石膏 八 兩

葱白 一升 黃芩 三
兩 水煎 分三服

又用井中泥塗心下乾則易

妊娠熟病先宜白术散以安其胎傷寒亦然

白术

黃芩 炒各

加姜棗水煎服

若四肢厥逆阴症也不可服

○妊娠傷寒

生生子曰妊娠傷寒所干甚大治之不早及治不知法多傷胎損母古人以四物加入引經散邪

之前可選而用之然亦不能尽其變茲錄以補之

阿膠散 治時氣傷寒先服此以安胎却以主藥

相間服

阿膠 炒 白术 炒 桑寄生 人参 茯苓

右為末每服一錢糯米飲調下日三服

前胡湯 治傷寒頭痛壯熱肢節煩痛

石膏 錢 前胡 甜竹茹 枝子 炒 黃芩 炒

大青 知母 各五 加葱白水煎服

卷之三
九
蘆木湯 傷寒時行酒漸寒振或煎啜者

赤芍 橘紅 黃芩 炒黃連 炒甘草 蘆木

各五分水煎服汗出即瘥如胎不安更服阿膠散黃龍湯 妊娠寒熱頭疼不食腹痛嘔痰及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘡或經水適來及勞復熱不解散者

柴胡錢 黃芩炒 人參 甘草各一水煎服柴胡石膏湯 頭疼惡寒身熱拘急口乾

柴胡錢 甘草錢 石膏錢 姜水煎服

若氣虛加人參

枳實散 傷寒四五六日腹脹少食腰疼躰重

枳實

炒三陳皮錢

麥冬錢

姜葱水煎服

旋粟花湯

傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋粟花 赤芍

甘草各五

前胡

石膏各一

麻黃

去根

白朮 人參

黃芩

各三分姜水煎服

麥門冬湯

傷寒壯熱嘔逆頭疼胎氣不安

人參

石膏各一

前胡

黃芩各五葛根

麥冬錢

一加姜東竹茹水煎服

梔子大青湯 發斑變黑尿便血

升麻 梔子 木青 杏仁 黃芩 各一錢
加葱白三寸水煎服

白朮湯 傷寒煩熱頭痛胎動或時吐逆不食
白朮 橘紅 麥冬 人參 前胡 川芎
甘草 半夏 赤茯苓各五 姜竹茹水煎服

芎蘿散 治外感風寒壯熱頭疼心胸煩悶

紫蘇葉

川芎

白朮

白芍

麥門冬

陳皮

乾葛各五

甘草炙三

右姜葱白水煎服

參蘿飲 治症同上

○妊娠時行病

四季之間反常如春寒夏冷秋熱冬煖乃非其時
而有其氣者謂時行不正之氣也感之者少長
三五相似甚至沿門闔境相類妊娠患之重者
多致損胎○亦當與傷寒熱病參治

秦艽散

治時氣五六日不得汗口渴飲水狂言

嘔逆

秦艽 柴胡各五 石膏一錢 扁角 赤伏苓

前胡

甘草

葛根

升麻

黃芩各四

加淡竹茹水煎服

葛根飲子 時氣煩熱口乾頭疼

乾葛

麻黃

根節各半兩

石膏一兩

豆豉一合

白米

升半枝子

十四粒

葱白二莖

水煎分三服 汗出為効

消熱飲子

治時氣六七日大小便不利

芒硝

細研一兩

葵子二

水煎分三次

以利為効

人參敗毒散

治四時傷風頭痛發熱咳嗽

此方即金匱湯減陳倉米是也

○過時熱病

冬時觸冐嚴寒即病曰傷寒不即病而毒藏於肌骨之間至春發為溫病至夏發為熱病也妊娠患之多致墮胎熱病與暑病相似但熱病脉實

暑病脉虛治當審察

治妊娠熱病頭痛嘔吐煩悶

人參

一方竹茹

葛根各一

芦根二

知母二

兩

知母三

麥冬一兩

半 每服五錢葱白三寸水煎服

枝子仁飲

治病發斑黑色小便如血氣喘急胎

飲

梔子 升麻 石膏 生地

各二兩 黃芩一兩

大青八錢

每服五錢葱白七寸豉九粒水煎服

大黃飲

治熱病六七日大小便秘滯

大黃微炒石膏各一兩

知母 前胡 赤茯苓各七錢半

梔子 甘草 黃芩各五錢

生地黃半兩

入梔子每服七錢水煎服

芦根湯

治熱病頭痛心煩嘔吐

知母四兩

竹茹三兩

每服五錢生芦根一握同

糯米一撮水煎服

梔子五物湯

治妊娠傷寒壯熱頭痛

梔子 前胡 知母各二兩

黃芩一兩

石膏四兩

升麻

梔子各二兩

大青

杏仁

黃芩各一兩

升麻六物湯

治傷寒斑黑湯血

升麻 梔子各二兩

大青

杏仁

黃芩各一兩

每服五錢葱白五寸水煎服

又方

伏龍肝為末每服一錢水調下外用木調塗脐

又方

芦根煮汁時服一盞

○熱病胎死腹中

良方曰熱病以致胎死腹中不能出者但服黑神散胎自下矣

陳無擇先生曰當視其產母若面赤舌青其子已死石面青舌赤母死子生唇青吐沫子母俱死若

双胞或一死一活用黑神散

薛氏曰竊謂前症宜補助產母使其胎自下黑神散恐大熱不宜輕用果胎已死者用平胃散加朴硝水銀下之宜為穩當庶不併傷生者生生子曰前症姪母既因熱傷其胎矣必其母衝任熱極營衛枯槁其胎乃死猶之藤枯而瓜焦也仍以熱藥下之寧不重傷姪母乎薛公詳之當也而良方每謂姪婦致疾多起於寒按其逐月所著奉胎之方籍熟藥為主是亦一偏也

其間豈無挾熱者乎故丹溪曰虛曰熱謂涼血
則血循經而胎得以滋養血熱則沸騰也今此
症始既曰熱病胎死腹中矣又復以熱藥下之
意者恐以死胎不下為急而不暇顧其母耶不
然必為寒涼治熱太過而中氣虛寒熱劑為
不得已用之也否則何陳無擇之高哲寧肯從
而主之

黑神散 又名烏金散

桂心 當歸 芍藥 甘草 亂姜

生地 各一兩 黑豆 二兩 大附子 炮半兩
為末每服二錢溫酒下

又方 治胎死腹中

紅荳 酒煮汁濃飲之二三碗効

又方

伏龍肝為末溫酒下二錢白湯下亦可

朴硝為末童便和熟酒調下一二錢立下

○妊娠癰疾

姪娠病癟乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽感則熱陰感太則寒陰陽相離寒熱俱作姪娠而作多傷於胎少當於瘡症門尋治

薛氏曰若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥乃參三陰三陽經而治之

即瘡症門仲景方劉守真分經治療法也清脾散 小柴胡湯 遊遇散 補中益氣湯選而用之極為穩當 黃芩白朮陳皮三味煎湯服亦佳

○姪娠泄瀉

良方論曰姪娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞瀉水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃颗粒湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脉沉緊數用戊己丸和之喫腐不食胃脉沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如草汁用胃氣湯寒冷脐下陰冷理中湯治中湯休暑心煩渴瀉水用四苓散傷溫泄瀉小便自利

用不換金正氣散胃苓湯此四症之大略也仍參泄瀉門互治

生生子曰前症予見之屡矣人皆以為小疾忽而不治及生子率多虛弱予姪婦每懷姪必瀉治亦不愈分娩後又自止也其生子也脆而白無血色得非胎虛之故欤予因思之妊娠則月水蓄之以養胎血亦濕類也以停濕故瀉經曰溫勝則濡泄是也治宜健脾燥湿后孕以白术半夏等為丸與之而安

薛氏曰按前症若米食所傷用六君加穀蘖麵食所傷六君加麥蘖面食所傷六君加山楂若兼寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六君加柴胡生姜薑兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土太君加姜桂不應用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔不食腹痛泄寒乃中焦虛寒用六君加木香姜桂若瀉在五更侵晨飲食少恩乃脾胃虛弱五更服四神

左日間服白术散如不應或愈而復發或飲食少思急用八味丸補右腎以培脾土為善

厚朴丸 治洞泄寒中

乾姜炮 厚朴製等分

草果散 治虛寒泄瀉腹痛無度
厚朴姜制二兩 肉果麵煨十枚 草豆蔻煨十枚

每服三錢水煎服

○妊娠下痢黃水

妊娠痢疾宜搜痢疾門參治而痢黃水乃脾土虧損真氣下陷也當升補中氣看所兼何症而治之在臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類也

產寶方 治妊娠痢黃水

厚朴姜汁炒二兩 黃連各二 肉果五枚

右水煎徐服以効為度

又方 治熱痢

黃連一升 黃柏一升 槐子二十枚

又方 每服五錢水煎如嘔者加橘紅生姜

又方 姜姪下痢痛

糯米一合 當歸炒 黃芪各一 水煎分四服

臨產下痢用梔子炒為末每服二錢白湯調甚効
○姪姪大小便不通

大小便不通由臟府之熱所致若太腸熱則大便
不通小腸熱則小便不通大腸俱熱更推其
因而藥之

當歸散 姜姪因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作
喘大便難小便澁產門腫

當歸

五分

赤茯苓

枳壳

麸炒

白芍

川芎

白姜

炮

木香

甘草

各三分

姜

一片

水煎

若氣弱者枳壳減半大便枳加蜜同煎服

姪姪大小便不通腹脹痞悶不思飲食

大黃

炒

木通

枳榔

各一分

枳壳

麸炒三

詞子

四枚去核半生半熟用

大腹子

三分枚

共為末童便一盞葱白七莖煎六分調服

錢

治姪姪小便不利氣急服猪苓散不瘥用甘遂為
末蜜和服豆許微利之未利再服利後仍服猪

苓散

猪苓散

治姪娠小便澁痛及胎水

猪苓去皮

為末白湯調下一錢加至二錢日三

服夜二服

又方

車前子一兩

大黃炒半兩

共為末每服三錢蜜湯調下

○姪娠小便不通名曰轉脬

姪娠小便不通為小腸有熱傳於脬而不通耳若

兼心肺氣滯則致喘急陳無擇云姪娠胎滿道胞多致小便不利若心腎氣虛清濁相干而為諸淋若胞系了戾小便不通名曰轉脬若胎滿尿出名曰遺尿

薛氏曰按丹溪云轉脬小便閉多因胎婦虛弱憂悶性躁博多厚味古方用滑利疎導藥鮮効若脬為胎所壓而不通但當升舉其胎俾胞系疎鬆而小便自行若脐腹作脹而小便淋閉此脾胃氣虛胎壓尿胞四物二陳參术空心服後探

吐數次自安竊謂前症亦有脾肺氣虛不能下輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦

有金為火燥脾土濕熱甚而不利者更當詳審

施治

一婦患此小腹腫脹絕至於殆用八味丸一服小便淋瀝再以八味丸料加車前子一劑即利小腹頓定而安

八味丸 治姪婦飲食如故煩熱不得卧反側倚息因脬系了戾不得溺名轉脬但利小便則

愈內二分有茯苓故也緩則不救

其方即六味地黃丸加附子桂心

古今錄驗治姪姪小便難飲食如故

當歸 貝母去心炒各三

滑石半兩

為末蜜丸小豆大每服三十九米飲下

治姪姪小便不通腑下妨悶心神煩亂

葵子研

榆白皮

各一錢

七莖水煎

分二服

古今錄驗姪姪不得小便者

杏仁

去皮尖

炒黃

搗丸

豆大

燈心湯吞下七丸

又用滑石末水和金脐下

又方

車前草汁調滑石末金脐周围四寸熱易之

又方

杏仁 滑石末等分飯丸豆大每白湯下廿丸

又方

紫苑為末井花水調下二錢

葵子散 嫩娘小便不利身重惡寒眩暉水腫

葵子 赤茯苓各五

為末每服二錢米飲下

生生子曰予嘗以補中益氣湯加桔梗治婦皆効但用滲利藥而不得通者必須升提氣升則水自降氣虛者非太補則提亦無功

○子淋

妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊娠胞繫于腎之間虛熱而成斯症甚者心煩悶亂名曰子淋也

薛氏曰前症若頸項筋挛語濇痰甚用羚羊角散若小便澀少淋瀝用安榮散若肝經濕熱用寵

胆瀉肝湯若肝經虛熱用加味逍遙散腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛膝黃柏知母五味麥冬玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥冬若陰挺痿痺而頻數用六味丸若熱結膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲若膀胱阴虛陽無所生用滋腎丸若膀胱阳虛阴無所化用六味丸地膚大黃湯治子淋

大黃炒 地膚草各三 知母 黃芩炒 猪苓
通草 赤芍藥 枳實炒 升麻 甘草各二
每服五錢水煎服

安榮散 治子淋甚妙
麥冬 通草 滑石 川歸 灯心 甘草
人參 細辛各五 水煎服
治小便淋痛心煩悶亂
瞿麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 蕤子
黃芩炒 車前子炒 芍藥 枳壳各五
錢

右水煎服

治子淋小便澀痛

冬葵子

滑石

木通

各等分

每服六錢葱白七寸水煎服

猪苓散

方見太小便不通卷

○妊娠遺尿

良方曰妊娠尿出不知用白薇芍藥為末酒調下或白藜牡蠣為末酒調下二錢或鷄毛灰末酒服丁七或炙桑螵蛸益智仁為末米飲下

薛氏曰若脬中有熱宜加味逍遙散若脾肺氣虛宜補中益氣加益智若肝腎陰虛宜六味丸
丁姪婦遺尿內熱肝脉洪數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹以為肝火血虛用加味逍遙散六味地黃丸尋愈后又寒熱或發熱或恚怒前症仍作用八珍散逍遙散兼服以清肝火養肝血而痊

○妊娠尿血本著丁脈五十五卷
妊娠尿血良方謂內熱乘於血分以致血熱流滯

杖脣名曰血淋用桑子一升研水五升煮二升分三服或生地一斤酒四升煮二升分三服亦治墮胎後下血

薛氏曰因怒動火者宜小柴胡加山梔因勞動火者補中益氣湯因厚味積熱宜加味清胃散若因肝經血熱宜加味逍遙散因脾氣下陷補中益氣湯若因脾虛血熱宜加味逍遙散下妊娠因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作

脹飲食少思肝脉弦弱此肝經血虛而熱也加味道逍遙散六味丸煎服漸愈又用八珍湯加柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治姪娠下血及尿血

當歸

生地各一

續斷半兩

赤芍半兩

為末每服二錢空心葱白湯調下

治姪娠尿血

阿膠炒

熟地各四

同搗為丸每服八十九空

入心未飲下

又方

四苓散 加炒阿膠車前子茅草根水煎服

又方

白茅根 濃煎湯吞酒蒸黃連丸

加味清胃散 方見

○姪娘脂水腫滿

產乳集云姪娘三月足腫至腿出水飲食不甘似水腫謂之子氣至分娩方消者此脾胃氣虛或衝經有血風亦有脾虛水氣流溢或因鴻臚臟

府虛寒或因瘡疾飲水脾虛濕漬或因水漬於胞不能分利皆致腿足腫肚腹腫也

薛氏曰若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛弱佐以四君子若而自虛浮肢体如水氣用全生白朮散如未應用六君子湯脾虛濕熱下部作腫補中益氣湯加茯苓若飲食失宜嘔吐泄濶六君子湯腿足發腫喘悶不安或指縫出水天仙藤散脾胃虛弱煎四君子湯如未應補中益氣湯若脾肺氣滯加味歸脾湯佐

卷之三
以加味道遙散

一姪婦每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此肺脾氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈○凡治姪婦母泥月數但見其經症即用本藥為善

天仙藤散

婦人有水氣而成胎以致而腿足浮腫

天仙藤

畧洗香附子炒陳皮烏藥軟白棘者

甘草

各五分

右每服五錢生姜木瓜蘿蔔各三

片水煎日三服

澤鴻散 婕娘遍身浮腫上氣喘急大使不通小便赤澁

澤鴻

木通 枳壳炒 赤茯苓

枳殼各五

右姜水煎服

防己散

脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防己

桑皮 紫蘿蔔葉 赤茯苓各五錢三分

木香

右姜水煎服

千金鯉魚湯 婕娘腹大胎間有水氣

白朮

五兩 茯苓 四兩 當歸 芍藥各三兩

右咬咀先以小鯉魚一尾如食法煮取汁三盞入藥五錢姜七片橘皮少許煎七分空心

服

腎著湯 治姪娘腰腳腫

茯苓

白朮各八分干姜炮

甘草各一錢

杏仁

五分

右水煎服

五皮散 治胎水腫滿

大腹皮

桑白皮炒

生姜皮

茯苓皮

橘皮

各一錢木香二分右水煎服

全生自术散 姦娘面自浮腫四肢脹如水氣名曰胎氣又名胎腫
白朮一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮 白茯
苓各五錢為末每服二錢米飲下
治姪娘脚浮腫因脾衰血化成水以生料平胃散
姜枣水煎服或為末紫蘇葉湯調下二錢日二
服以腫退為度

○腹內鐘鳴

良方曰孕婦腹內鳴用鼠兜中土為末入射香酒

調服二錢，五愈或黃連煎濃汁常飲之。

薛氏曰：兒在腹中哭產寶方亦用。空房中氣穴土或黃連煎濃汁飲之即止。又云：脐帶上疙瘩兒含口中，因產婦登高舉臂脫出兒口，以此作聲。令姪婦曲腰就地如拾物狀，仍復原入兒口，即止。然黃連性寒，麝香開竅，當斟酌用之。

○龔彥德孕瘤方

治孕瘤用烏藥五錢水一鍾煎，七分入牛皮膠一兩，煎化溫服。或薏苡仁煮汁飲之。

薛氏曰：按孕瘤即是腹內患瘤，如前法治之，應宜用牡舟皮散或薏苡仁湯。

薏苡仁湯又名瓜子仁湯

治腸瘤腹中疼痛煩毒不安或脹滿不食小便澀，婦人產后虛熱多有此病，縱非瘤但疑似間，便可服。

茺仁二錢一方用冬瓜子仁無冬瓜子以桔萎代之。姚氏去茺仁用杏仁瞿氏加芒硝，薏苡仁、桔萎仁各三錢，牡丹皮二錢

意右作一劑水煎服

牡丹皮散

治腸瘻冷症腹瀉而痛時

利腰

丹皮

人參

天麻

白茯

黃芩炒

白芷

苡仁

菟仁失皮

當歸洗

川芎各一錢

炙甘草

官桂分各五

木香三分

右水煎服

○臟躁悲傷

許學士云一婦無故數次悲泣是為臟躁用太東湯而愈又程虎卿內姪娘五月慘感悲傷亦接

太東湯而痊

薛氏曰或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察
一婦無故自悲用太東湯二劑而痊後又復患用
前湯佐以四君子加山梔而安
一姪婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自欷悲
耳用淡竹茹湯為主佐以介珍湯而安

大棗湯

甘草三兩

小麥三兩

大棗十枚

淡竹茹湯 姦娘心虛驚悸臟躁悲傷或作虛煩
麥冬 小麥 半夏一錢炮各一錢半
人参 白茯各一錢

大棗湯

甘草三兩

小麥三兩

大棗十枚

甘草五分 加姜東竹茹水煎服

又方 治臟躁悲哭

紅棗燒存性為末米飲調下二錢

○姪娘十月宜服滑胎湯藥

滑胎枳壳散

主每產累日不下南山道人進此方

枳壳炒熟 炙甘草 一两

右為末每服二錢空心沸湯調下日三服

凡孕六七月宜服之溫隱居當歸木香等

治同上

兼治諸疾下氣寬膈

枳壳炒熟

甘草一两

香附子炒熟

三

右為末每服二錢白湯調下

又方 易產滑胎

車前子為末或酒或米飲調下一錢

神寢丸 臨月服之神妙

通明乳香半两

另末 枳壳炒熟

右蜜丸梧子大

每空心酒服三十丸

榆白皮散 滑胎易生

甘草五分 加姜東竹茹水煎服

又方 治臟躁悲哭

紅棗燒存性為末米飲調下二錢

○姪娘十月宜服滑胎湯藥

滑胎枳壳散

主每產累日不下南山道人進此方

枳壳炒熟 炙甘草 一两

右為末每服二錢空心沸湯調下日三服

凡孕六七月宜服之溫隱居當歸木香等

治同上

兼治諸疾下氣寬膈

枳壳炒熟

甘草一两

香附子炒熟

三

右為末每服二錢白湯調下

又方 易產滑胎

車前子為末或酒或米飲調下一錢

神寢丸 臨月服之神妙

通明乳香半两

另末 枳壳炒熟

右蜜丸梧子大

每空心酒服三十丸

榆白皮散 滑胎易生

榆白皮

甘草

各二兩

葵子

一兩

右為末，每以五錢水煎服。

保氣散

寬氣進食瘦胎易產，或居處失宜，頓作

胎動。

若胎痛胎漏，兼服佛手散。

香附

木香

各四兩

山藥

二兩

砂仁

粉草

各一兩

益智

蘇葉

各半兩

為末，每服二錢白湯調下。

薛氏云：神寢丸枳壳散併此方，八月宜常服。

保產無憂散：妊娠身居安逸，口厭甘肥，憂樂不

堪，食物不節，致胞胎肥厚，根蒂堅牢，入月服。

之易生。

當歸

川芎

白芍

枳壳

炒

乳香

各三錢

木香

甘草

血餘

即髮灰以讚猪心血和之，各一錢半。

右為末，每服三錢水煎，日二服。

神効。

妊娠臨育，以猪肚一具煮爛，徐徐食之，食盡令易產。

○一產論

一曰正產：懷胎十月滿足，忽腰腹作陣，疼痛相次，胎氣頓陷，至於脇腹痛極，乃至腰間重痛，谷道挺逆，繼之漿破血出，兒乃遂生。此名正產。

二三曰傷產 懷胎未產一十月已前忽然脅腹疼痛
有似欲產仍却無事是名試月非正產也又名
曰未痛凡產母未有正產之候切不可令人抱
腰亦不可令產母妄亂用力若兒身未順纏方
轉動便教產母空亂用力使子錯路忽橫忽倒
不能正生皆由產母用力於未當用力之所致
也直待兒身順適逼臨產戶始可用力丁送令
免趁力生下

細目曰右傷產一法最為切要勿輕忽也凡十

月未足臨產腹痛或作或止或痛不甚者名曰
未痛非正產之候或腹雖痛甚而腰不甚者非
正產之候胎高未陷下者非正產之候轂道未
挺逆者非正產之候水漿未破血未出者非正
產之候漿血雜出而腹不痛非正產之候凡未
有正產之候且令扶行耐忍如不能行或凭物
坐之或安臨之或且服安胎藥一二帖即安得
安即止慎勿妄服催生藥又勿惶惶致令產母
憂恐而挫其志務要產母寬心存養調停令老

誠練達穩母先說諭之如覈心中煩悶可取白
蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先因之其
母直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道摸
逆方是正產候也此時始可用力并服催生藥
也予男婦于未產一月已前腰腹俱痛全似
產其痛至甚但遇已時稍止如此十餘日計無
所出因閱此條遂與安胎藥加參木數服間與
肉味卷之由是平復不痛又二十餘日始產一
男設若此際亂動亂用力并服催生藥則立

見其危矣

三曰催生 若婦欲產衆破血下已見是為正產
之候但未生即可服催生藥催生之忽有經及
數日產母困苦亦可服藥以助產母之正氣令
兒速生也

四曰凍產 凡冬月天冷產母經血得冷則凝以
致兒子不能生下此害最深但冬月產者下身
不可脫去綿衣尤不可坐卧寒處當滿房蓋火
常有暖氣令產母背身向火令膝下腿膝間常

五曰熟產 九盛夏之月產婦要溫涼得一不可恣意取涼傷損胎氣亦不可房中人多熟過襲產母使產安血沸而有發熱頭痛面赤昏眩如醉乃至不知人事此名熟產

六曰橫產 凡兒先或露手或先露臂此乃產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰卧後令看生之人先推其手令入直上漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須

是產母仰卧然後推兒徐之正之候其身正前催生藥一盞飲之方可用力令送兒下此名橫產

七曰倒產 凡產母胎氣不足閼鍵不牢用力太早致令兒子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰卧令看生之人推其足入不可令產母用力分毫力亦不得驚恐使兒自順去

八曰偏產 兒身未正產母用力一逼令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱丁畔不

能生下當令產母仰卧次令看生之人輕々推兒近上以手正其頭令兒頭項端正然後令產母用力一下送即便生下若是小兒頭腦後骨偏桂殼道尺露其額當令看生之人以綿衣炙溫裹手於殼道外方輕々推兒頭令正便令產母用力送兒生也此名偏產

九曰凝產兒身已順而露正項不能生下蓋因兒身迴轉肚帶攀其肩以此露正項而不能生下當令產母仰卧令看生之人輕々推兒近上

徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一下送使兒生下此名凝產

右橫產倒產偏產凝產四法若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以悞人命也按倒產者令時往隨其倒足生下並無後患子母双全不必依推定復正之法亦可又凝產者往往有肚帶纏在兒頂上而兒頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶

從兒頭項過而正之者又有肚帶纏在項上
一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必

以此礙產法復入產門內撥下也

十曰坐產 臨產時高處繫手巾令產母以手攀之輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也

此名坐產

十一曰盤腸產 趙都運恭人每產則太腸先出
然後產子既產之後其腸不收甚以為苦名曰
盤腸產醫不能料偶在建昌得一坐婆施丁法

而收之其法以醋半盞新汲水七分和勺喂

母面每噀一縮三噀收尽此良法也

丹溪治產後腸不收香油五斤煎熱盆俟溫令

產母坐油盆中約下頓食時以皂角末吹入鼻

中隨作立上

又方 草麻子十粒去壳研如膏貼產母頭項
心上其腸止即揩去

又方 腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之即
收

○催生

催生杵水飲子

難產或胎爛腹中腹悶神效

生柞木

一尺剉

甘草

大者五寸

右水三鍾封罐口煎

十鍾半候

胎順

產門

徐

溫服即時分娩更無諸苦

催生如神散

治橫生逆產其功甚大

百草霜

白芷

不見尖
芽分

右為末每服三錢至胎順產門以童便米醋和

漏血胎胞滌產併進三服即產

如無癰

用子半合末之溫酒服尤妙○若打撲胎死

得黑即止此藥大能固血而斂血乾其妙
如聖散黃蜀葵花焙為末熱酒調下二錢○若
漏血胎胞滌產併進三服即產

如無癰
用子半合末之溫酒服尤妙○若打撲胎死

紅花酒調下

順生丹治同上

兔腦髓

去皮膜研膏

明乳香

一兩另末

母丁香

二兩

麝香

一錢

右以兔腦子丸鷄頭子大陰丸每服一丸溫水
下

又方 透明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用
冷水醋少許調服扶立令兩手握木石磨二
枚口念醫靈藥聖三遍行數步用坐產法便
生更無痛楚神効薛氏曰其法士人祝之似迂然用之者收驗甚

治逆產

蛇退

完全者一條順下

蚕退

張一

右共入新瓦罐內蓋泥固濟煅存性為末煎

榆白皮湯下一錢三服竚痛便生

又方 伏龍肝研末每服一錢酒調下兒戴土而下

又方 魚膠

一尺許

新瓦上煅灰陳醋調服立下

胞漿先乾胎澁不下急服大料四物湯滋其血氣
并濃煎葱湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却
服前藥

神妙乳砂丹 明乳香為末以猪心血丸梧桐
子大硃砂為衣陰乾每服二丸嚼碎冷酒下良
久未生再服或以蓮葉蒂七個水煎化服二丸
尤妙良久未生再服

○交骨不開產門不閉
交骨不開產門不閉皆由元氣素弱胎前失於調

交攝以致血氣不能運達而然交骨不開陰氣虛也用加味芎歸湯補中益氣湯產門不閉氣血俱虛也用十全大補湯

一婦交骨不開兩日未生服加味芎歸湯一劑即時而產彼後以此方傳與人服應手而効

一婦生平分娩最易至四十歲妊娠下血甚多產門不閉與前湯一劑又以無憂散斤許煎熟時

時飲之以助其血而生

一產婦王門不閉發熱惡寒十全大補加五味子

數劑而寒熱退又以補中益氣加五味子數劑而玉門歟○若初產腫脹或煥痛而不閉者用加味逍遙散若腫既消而不閉者用補中益氣湯切忌寒涼之劑

一婦脾胃素弱兼有肝火產後玉戶腫痛寒熱作渴嘔吐不食敷大黃芩藥服驅利之劑腫及於臂虛症蜂起此真氣虛也先用六君子以固脾胃乃以補中益氣湯升舉而消

一產婦失治腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒

一暮熱自汗盜汗半年矣予用補中益氣加芩苓半夏以健脾胃，膿水漸少，飲食漸進，用歸脾湯以解脾鬱，共五十餘劑，元氣復而瘡亦愈矣。

丁產婦玉門不閉，小便淋瀝，腹中一物致動，膀胱或脹或痛，用加味逍遙散加車前子而安。

丁產婦子宮腫大二日方收，損落一片，殊頗，猪肝面黃，体倦，飲食無味，內熱晡熱，自汗盜汗，用十六大補湯二十餘劑，諸症悉愈，仍復生育。

味芎歸湯 治交骨不開，不能生產。

川芎 川歸各一錢，板角一個，婦人頭髮燒，右為散，每服一兩水煎服，約步行五里，即生，縱死胎亦下。

○產難方論

郭稽中曰：產難者，因兒轉，將兒枕血塊破碎，與胞中敗血壅滯，兒身不能便利，是以難產急，以勝金散消敗其血，使兒易生，陳無擇云：多因兒未轉順，坐草太早，或努力太過，以致胞衣破，而血水乾，產路滯而難下，宜先服催生如神散，以

固其血設或逆生橫產當按法施治

勝金散

催生如神

麝香錢

豆豉兩

為末秤鎋燒赤淬酒下

○下死胎方

一穩婆之女勤苦負重姪娘腹中陰冷重墜口中甚織子意其胎已死全視其舌青黑與朴硝一

兩許服之化下穢水而安

一婦胎死腹中服朴硝下穢水肢體倦急氣息奄奄用四君子為主佐以四物姜桂調補而安

又方 以利斧燒紅置酒中待溫飲之其胎便下
又方 錫粉 水銀各一束肉為丸豆許大水吞立下

又方 平胃散五錢酒水各一盞煎至一盞投朴硝五錢再煎三五沸溫服其胎即化水而去
寶慶方云允欲斷脇帶先以繫物墜下後可斷之否則胞衣上即冲心而死

○產生死脉訣

欲產之婦脉離經沉細而滑也同名夜半竟痛應

分誕來日下午定知生身重體熱寒又頰舌之脉黑復青反舌上冷定知死腹中湏遣子婦面赤舌青細尋著母活子死定應准唇口俱青沫冬出子母俱死總高判面青舌青沫出頰母死子活是知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛新產之脉緩活吉實大弦急死來侵若得沉重小者吉忽若堅牢命不停

寸口澁疾不調死沉細附骨不絕生審看此候分

明記告長須念此向心經

○胞衣不出

郭楷中曰胎衣不下者因氣疲憊不能努出或血入衣中脹大而不能下以致心胸脹痛喘急速服奪命丹血散脹消其衣自下牛膝散亦効一婦胎衣不出胸腹脹痛手不敢近用滾酒下失笑散一帖恐露胞衣並下
一婦胞衣不出腹痛手按之稍緩此氣虛不能送
出也用無憂散而下○前症常詢諸穩婆云宜
服益母丸或就以產婦頭髮入口作嘔其衣自

九全清
不出者必死然前法甚効

奪命丹

大附子炮半兩牡丹皮一兩乾漆炒一錢烟尽

大黃一兩

為末醋煎大黃成膏丸梧子大溫酒

吞七丸

花益石散

治產後敗血不尽血迷血暈胎衣不下至死心頭煖者急用一服即化水而出其効

如神

花益石一斤

上色硫黃四兩

古和勑以紙泥封固瓦罐內炭火煅赤次日取出細研每服一錢童便熟酒下

牛膝散 治胎衣不出腹中脹痛急服此藥虛而下緩則不效

川芎

朴硝

牛膝

蒲黃各三兩

川歸一兩半

桂心五錢

右每服五錢姜三片生地一錢水煎服

又方 紅花一兩酒煮濃汁服

又方 鹿角鏹三錢為末葱湯調服

又方 取產母鞋底烘熱熨小腹上下二七次

○產後血暈

良方曰產後血暈乃血入肝經甚至眼花昏悶用

黑神散主之下血過多用清魂散補之或以醋
湯細飲或預燒秤鎚以醋沃之或釀醋塗口鼻
或燒漆器薰之使產母鼻吸其氣庶無此患
薛氏曰若惡露上行用失笑散血下過多芎歸湯
若過勞所傷補中益氣湯血虛極用清魂散大
允產後口眼喎斜等症當大補氣血為主而兼
以治痰若脾胃虛弱用六君子湯苟於七月之
前服安胎飲至八九月間加大腹皮黃楊頭元
子氣虛弱八珍湯臨產用無憂散則無前患

一婦八月胎下墜或動面黃肢倦飲食少思此脾
氣虛弱用補中益氣湯倍白朮加蘇梗三十餘
劑而安產後眩暉胸滿咳嗽用四物加茯苓半
夏桔梗而愈

一婦因飲酒惡露甚多患血暉口出酒氣此血得
酒熱而妄行虛而作暉也以佛手散加煨甘葛
二錢一劑而痊酒性剽悍入月及產後不宜飲
恐致前症

奪命丹治血暉腹痛沒藥血竭為末半

資分每服二錢熱童便冲酒下

清魂散 產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以致心神昏亂口噤眼花甚至悶絕而甦

澤蘭葉

人參各一錢

荆芥三錢

川芎一錢

右各

另為末每服一二錢熱湯和酒調灌之

一方 五靈脂

半生炒

為末每服二錢溫酒灌入

即甦

一方 荆芥為末童便調服

一方 神曲末每服二錢熱水調服

一方 蕎菜切入瓶內注熟醋以瓶口對鼻童便
一方 半夏為末丸大如梧桐入鼻中即醒亦治
佛手散 治產後去血眩暈欲絕又治血崩不止
又能治胎痛安生胎而落死胎神效

川芎

酒

當歸

酒浸各五錢

酒水各一錘煎至一錘服

○產後頭狂

產後頭狂乃敗血上冲用大聖澤蘭散加砂仁末三分煎酸棗仁湯調下或砂砂為末二錢乳汁

調和入紫項活地龍一條，滾半沸去之入酒

再用重湯煮溫分三服。

薛氏曰：乃血虛神不守舍，非補養元氣不可。

一產婦患前症，或用大聖澤蘭湯而愈後，又怔忡妄言，其痰甚多，用茯苓散補其心虛，頓愈。又用

八珍湯加遠志、茯神，卷其氣血而瘥。

一產婦亦患此，用化痰安神等藥，病益甚，神思消爍，余以為心脾血氣不足，用太和參末、菖歸茶、神酸棗仁四斤餘，而安乃以歸脾湯五十餘劑。

而愈。

茯苓散 治產後心虛，惛惓，言語錯亂，健忘少睡

或自汗盜汗。

人參 炙甘草 茯苓炒 當歸 生姜各八

遠志 茯苓各一桂心六

麥冬五

大棗二

水煎，溫服。

抱膽丸 治產後遇驚發狂，或遇經行發狂。

水銀

黑鉛一兩

硃砂五錢

乳香

各一

右將黑鉛入銚內火熔化，俟稍冷，下水銀擾成

砂子再入乳香硃砂，乘熱用柳木槌研勻，丸
鷄頭子大，每服一丸，薄荷湯下。得睡勿驚，竟
來即安。○妙香散亦善。

此症屬火者多，不可槩視。為瘀血及虛治也。童
便極好，或冲入涼血藥中用之屢見効。

○產後狂言譖語

產後狂言譖語，乃心血虛也。用硃砂末酒調下。龍
虎丹參丸琥珀地黃丸亦可。如驚悸歌哭顛狂
等症，當參治之。

一、產婦形体甚倦時發譖語，用柏子仁散，稍愈又
用加味歸脾湯而愈。又因怒仍狂言脇痛，小便
下血，用加味逍遙散以清肝火，養肝血，預瘥。又
佐以加味歸脾湯而安。

治敗血上衝，發熱狂走肺虛大者，

乾荷葉

生地

丹皮各等分

濃煎湯調生薑

黃二錢服之即止。

妙香散 治產後語言錯亂，用生地當歸煎湯調
服立效。

炙甘草 人參 桔梗各五錢 茯苓 茶神
山藥姜汁炒 黃芪 遠志各一兩 辰砂三錢 射香二錢

木香半錢

右為末，每服二錢，溫酒調服。

○又能治心氣不足，精神恍惚，虛煩少睡，盜汗

夢與鬼交，等症。

○產後不語

產後不語，因心氣虛而不能通津於舌，則舌強不能言語者，宜服七珍散，餘當推其所因而治之。
可也

七珍散

人參

石菖蒲

生地

川芎

各一錢

細辛一錢

防風

辰砂

另研

各五錢

為末，每一錢薄荷湯調服。

胡氏孤鳳散

治產後閉目不語

用之即効。

牛白礬

為末，每服一錢，熱酒調下。

產後不語。

人參

石蓮肉

石菖蒲芽分

每以五錢水煎服。

大宮詹少溪吳馭閱校

終

