

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



門
武
稀
卷
316
309

赤水玄珠婦人門第二十九卷目錄



耳

雜方

結核方論

赤白遊風

婦人瘡疾

鶴膝風

婦人足跟瘡腫

肺癰

婦人全書卷之五

新安生生子孫一奎著輯

立齋曰耳瘡屬手少陽三焦及足厥陰肝經血虛
風熱或怒動肝火而致若發熱焮痛屬三焦厥
陰風熱用宋胡清肝散若寒熱作痛或作嘔吐
乃肝火傷脾用益脾清肝散若口乾足熱為肝
腎明虛用益陰腎氣丸若月經先期為血熱用
加味逍遙散過期為血虛用八珍湯食少寐倦

卷之三

乳癰乳岩

為蕭火加味歸脾湯惡寒發熱肢體倦怠為氣血俱虛用十全大補湯慎不可專治其外復傷氣血也

一婦耳內外腫痛胸膈不利寒熱往來小便不調此肝火傷血先用龍胆瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味逍遙散而痊又因怒復作用柴胡而安

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間

結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味逍遙散調補肝脾而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山

梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

小柴胡湯治肝膽經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉痢啖嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之

柴胡二錢

黃芩炒一錢

人參

半夏各七分

炙甘草五分

姜三片水煎服

加味小柴胡湯 治肝胆經風熱前後脰痛或
結核癰痛或寒熱晡熱或經候不調等症

即前小柴胡湯加山梔丹皮

益脾清肝散

治肝經之症寒熱脢痛脾胃虛

弱

人參

白朮炒

茯苓各一錢

黃蓍各一錢

柴胡各五錢

川芎

川歸

丹皮七分

水煎服

梔子清肝散

治三焦及肝膽經風熱耳內作

痺或生瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往来

梔子

山梔炒

丹皮

各一錢

茯苓

川芎

芍藥

當帰

牛旁子

炒各七分

白朮炒

甘草各五錢

水煎服

柴胡清肝散

治肝膽三焦風熱怒火以致項
胸作痛或頭目不清或耳前後腫痛或寒熱脢

痛

梔子

黃芩炒

甘草各五錢

人參

山梔炒

川芎各一錢

連翹

桔梗各分

水煎服

犀角地黃湯

治上焦有熱口舌生瘡發熱或血妄行或吐衄或下血

犀角

生地

白芍藥

黃芩炒

牡丹皮

黃連炒各一錢

水煎服

因怒而患者

加柴胡山梔

犀角升麻湯

治陽明經風熱牙疼或唇頰腫痛或手足少陰經風熱連耳作痛

犀角

升麻

防風

羌活

各一分

白附子五分川芎

白芷

黃芩

炒各七分

甘草五分

水煎服

當歸川芎散

治手足少陽經血虛瘡症或風

熱耳內痺痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或經水不調胸膈不利腹脇痞痛小便不調

當歸

川芎

柴胡

白朮

炒芍藥

炒各一錢

山梔二分

丹皮

茯苓各八分

蔓荆子

甘草各五分

水煎服

雜方

加味地黃丸

治肝腎陰虛諸症或耳內痺痛

出水或眼昏痰喘或熱渴便澁等症

乾山藥

山茱萸

牡丹皮

澤瀉

柴胡

白茯苓

熟地黃

生地

五味子

各等分
為末

右將棟蜜為丸梧子大每服百丸空心白湯
下如不應用加減八味丸

人參養榮湯

治潰瘍寒熱四肢倦怠體瘦少
食面黃氣短不能收斂太瘡愈後多服之庶不

變他症也

白芍藥

一錢

人參

陳皮

黃蓍炒

桂心

川歸

白朮

炒

炙甘草

錢一
錢炒

熟地

五味炒

茯苓

各七分

遠志去心炒

入姜棗水煎服

鴻青丸

治肝經實火膀胱作痛或惡寒發熱

太便祕結

川帰

龍胆草

炒焦

川芎

山梔炒

大黃

炒

羌活

防風各等分

右為末蜜丸梧子大每服三四丸白湯下○若
陰血不足肝火血燥用四物加山梔柴胡或逍

卷之三
十一
遙散加丹皮山梔○若腎水虧損不能生肝木而筋牽結核或肢節牽攏或似中風癓疾上湧用六味丸料煎眼

生地黃凡治師尼寡婦室女乍寒乍熱或頸間結核肝脉弦長直出魚際

生地

秦艽

黃芩

硬柴胡各五分

赤芍藥一兩

右煉蜜為丸梧子大每服三十

丸烏梅湯下入

連翹飲子

治肝胆經氣滯癰瘡結核或乳內

連翹

川芎

瓜萎仁

橘柟

皂角刺炒

青皮

甘草節

桃仁各一錢

水煎眼

白芍

散腫潰堅湯

治癩瘡堅硬氣血無虧者

升麻

連翹

川歸尾

白芍

葛根

三棱酒拌微炒

廣木各三分

龍胆草

桔梗炒

昆布

知母酒炒

瓜萎仁各五分

柴胡四分

黃芩酒炒五分

炙甘草二分

右水煎服

必効散

治瘻瘧未成者消已潰者欵湏元氣

無劇者可用孕婦勿服

南蓬砂二錢

射香五分

輕粉一錢

班猫足四十枚去頭

同梗米炒

去米

白枳榔一枚

右為末每服一錢五更用滾湯調下如小水瀦滯或微疼此癰毒欬下也進益元散一服即下此方班猫巴豆似為峻厉然用巴豆乃解斑貓巴豆用者勿畏也

益元散

滑石飄六

甘草

各為末每服一二錢白湯調下

琥珀膏

治頸項或腋下初結小核漸如連珠

潰而膿水不絕或漏症者

琥珀一兩

丁香

桂心

硃砂

木香

松香俱為末

白芷

防風

當帰

木通

木別子肉各五錢

麻油二斤

將后五味入油煎熬藥去渣徐徐入黃丹

再熬軟硬得所入前末藥即成膏矣

針頭散

治一切頑瘡內有瘀肉或癰核不化

瘡口不合宜此藥腐之

赤石脂五錢

乳香

白丁香

砒霜生用

黃丹各一錢

輕粉

射香各五錢

蜈蚣一條

為末搽肉上其肉自化若瘡口小用糊和作細条陰乾紙之凡瘡久不合者內有膿管必須用之

結核方論

婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾或因胎產經行失於調護或因暴怒觸動肝火若結於項側耳前

後或胸脇腫痛或發寒熱屬胆經風熱怒火宜用柴胡清肝散加鈎藤山梔以養血氣清肝火若結于肉理其色不变晡熱內熱屬肝火血虛宜加味逍遙散加龍胆草以養肝血清肝火或結于肢節或累及如貫珠其色不变亦肝火血燥而筋挛宜用柴芍參苓散加鈎藤以養血氣佐以六味丸以生腎水若時消時作此氣滯而痰結也用歸脾六君二湯以調和脾胃之氣並佐以海藻丸若潰而核不腐或肉不生或膿水

清稀肌寒肉冷自汗盜汗寒熱內熱面色痿黃
食少躰倦便利不調者五臟皆虛也但用補中
益氣加味六君子湯調補脾胃以滋諸臟則
各症自退故經云形傷則痛氣傷則腫慎不可
輕用行氣破血而復傷也

一婦項結核寒熱頭痛脇脹乳痛內熱口苦小便
頻數屬肝火血虛用加味四物而愈又用加味
逍遙散調補肝脾而安

一婦耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不

調此肝胆經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮
及六味丸而愈

一婦項患五核時常寒熱肝脉弦長而出寸口此
血盛無偶之症也用小柴胡湯加生地烏梅而
愈

加味道逍遙散 治肝脾血虛有熱遍身搔癩或
口燥咽乾發熱盜汗食少嗜臥小便澀滯等症
又治瘰疬流注虛熱等瘡

灸甘草

當歸炒

芍藥酒炒

茯苓

白术炒各一錢

柴胡

牡丹皮

山梔炒分五

水煎服

逍遙散

即前方減丹皮山梔

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧少食或憂憇傷脾血虛發熱或肢躰作痛大便不調或經渙不準晡熱或癰瘡流注不能消散潰歎

人參

白术炒

黃蓍炒

茯苓

當帰

遠志

酸棗仁炒各一錢

木香

炙甘草各五

龍眼肉三分

姜棗

水煎服

加味歸脾湯

即前方加山梔柴胡

柴胡參芩湯

治肝火血熱遍身搔痒或起赤

翬或筋挛結核

白术

人參

茯苓各一錢

柴胡

川芎

山梔炒各八

水煎服

柴芍參芩散

治肝胆經部分結核癰瘡瘍瘍

等症或肝血燥脾氣虛弱發熱少食

柴胡 芍藥 炒 入參 茯苓 白朮 炒

山梔 炒 陳皮 當歸 錢 各一 丹皮 甘草
各五 分

姜枣水煎服

清肝益榮湯 治肝膽經風熱血燥筋挛結核

或作癩子

柴胡 大黃 意苡仁 茯苓

山梔

龍胆草

木瓜 熟地 錢 各一

川芎

川帰

芍藥 錢 各

白朮 炒 各 五 分

甘草 三分

水煎服

木香

柴胡

大黃

芍藥

甘草

甘草

三分

水煎服

木香

柴胡

大黃

芍藥

甘草

清熱涼血飲

治風熱血燥丹毒等症大便秘

結 生地 錢 各一

川芎

大黃 炒

芍藥 炒

神効開核散

消癰塊甚効

沉香 木香 錢 各二

橘紅 四兩

珍珠 四十九粒

桂入罐

封固根
赤存性出火毒

猪鬚子 四十九枚

項間如枣子大

為末每服一錢臨卧酒調徐嚥下輕者三

五眼重者十服可愈

忌酸鹹油走滯氣之物須用除白于靜室修合

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

上

海藻散堅丸

治肝經癰瘍

海藻

昆布各二兩

小麦四兩醋煮晒乾

柴胡二兩

龍胆

酒拌炒焦二兩

為末蜜丸梧子大每服三十

丸臨臥

白湯送下噙化

之尤妙○凡患癰

瘻

調治之藥未應宜佐以前二藥

益氣養榮湯

懷抱抑鬱癰瘻流注或四肢患

腫肉色不变

或日晡發熱或潰而不收

人參

茯苓

陳皮

貝母

香附

川歸

川芎

黃蓍

鹽水熟地

芍藥

木香餅

治氣滯結腫閉胸風寒所傷作痛

木香

為末五錢

生地一兩

搗地黃膏和勻量惠

大小作餅子置患處以熱熨半炷之腫痛悉

退

當帰飲

治熱血癰疹痛膿水淋漓發熱等

症

當帰

白芍藥

川芎生地

白芨蓼炒

黃耆各一錢

防風

荆芥

何首

烏息鉢

甘草各五

水煎服

赤白遊風

婦人赤白遊風屬肝經鬱火血燥生風或脾經鬱
結血虛生熱或腠理不密風邪外襲其症或疮
瘡癰痒或膿水淋漓白屬氣而赤屬血因得風
而遊行也若肝經血燥用柴胡清肝散肝經怒
火用梔子清肝散肝經血熱用加味四物湯肝
火血虛六味丸脾經鬱熱加味歸脾湯肝脾血
虛風熱加味逍遙散若因風邪鬱熱所致用荆

防敗毒散或專用祛風之劑肝血愈燥則血隨
火化反為敗症矣

丁婦身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暉晡時益

甚用加味逍遙散而愈

丁女赤暉如霞作痒發熱用加味小柴胡加生地
連翹丹皮而愈○大凡女子未發未至婦人月

經不調受驚着惱多有此症

消風散

治風寒癰瘍癰痛以膿水淋漓頭皮

腫癰

荆芥穗

炙甘草

陳皮

人參

茯苓

白姜
炒

防風

芎窮

霍香

羌活

蟬蛻
各一錢

厚朴
姜制五分

水煎服

大連翹飲

治風熱熱毒赤白遊風表裏皆受

患者

連翹

瞿麥

荆芥

木通

蟬蛻

甘草

赤芍

防風

柴胡

滑石

山梔
炒

黃芩
炒

川歸
一錢

水煎服

婦人癥瘕

一名便瘡
俗名痞子

一名便毒

婦人，痃疾，或肝經濕熱下注，或鬱怒傷損，脾肝，其外症，或拘小腹腫痛，或玉門焮腫，作痛，或寒熱往來，增寒壯熱，其內症，或小便澁滯，或腹內急痛，或小腹痞悶，或上攻兩脇，或晡熱重墜，若兩拘小腹腫痛，肝經濕熱壅滯，也用龍胆瀉肝湯，玉門腫脹，肝火血虛也，用加味逍遙散及龍膽瀉肝湯，加木香，若陰挺散血攻毒之劑，則誤甚矣。

丁婦人拘中赤腫脹痛，此膿內作用，托裏消毒散

加此數劑，潰而膿清，寒熱乃氣血淺虛，用托裏散而寒熱止。用十全大補湯，百餘劑而歟。

丁婦人腹拘腫痛，寒熱口苦，或時帶下，此肝經溫熱不利也。用龍胆瀉肝湯，而腫痛消。用加味逍遙散，而寒熱退。

丁婦人腹拘腫痛，小水不利時，或胸乳作痛，脇腹作脹，此肝火氣滯，用四物柴胡青皮玄胡木香而愈。

丁婦人兩拘腫痛，腹內丁塊不時上攻，月經不調。

小便不利，余以為肝脾氣滯，而血傷，以四君子加芍藥，歸柴胡，山梔，而愈。後因鬱怒，前症復作，兼胸滿，腹脹，盜汗，此肝木甚，而傷脾土也。用加味歸脾湯，下蘆薈丸，而痊。

丁婦人陰中如梗，兩拘腫痛，寒熱不食，小便頻數，小腹重墜，余以為肝脾鬱怒所致。先以補中益氣加茯苓，山梔，車前子，青皮，以清肝火，升脾氣，更以加味歸脾湯，調理，脾鬱而愈。

龍膽瀉肝湯 治肝經溫熱，兩拘腫痛，或腹中

頭疼痛或小水滯滯等症

龍胆草酒拌炒黃 淨瀉錢各一 車前子炒

生地黃

木通酒拌 山梔炒 黃芩各五分

右水煎服

九味柴胡湯 治肝經溫熱下注，便毒腫痛或小腹脇肋結核。凡肝膽經部分一切瘡瘍或風熱結於癰癧。

柴胡

黃芩炒名一錢

人參

山梔炒半夏

龍胆草炒焦一錢

川歸

芍藥炒

甘草各五分

右水煎服

蘆薈丸

治肝氣不和，剋侮脾胃，而患諸症，或

三焦肝胆經風熱目生雲翳，或疳熱癰癧，耳內生瘡，寒熱作痛，肌膚消瘦發熱，作渴，飲食少，思

肚腹不調，或牙齦齦落，頰腮腐爛，下部生瘡等

志

蘆薈五錢炒

胡黃連

當帰

芍藥

木香

甘草三錢炒各

右為末，用米糊丸，麻子大，每服五十九滾湯

下卷

鶴膝風

婦人鶴膝風，忘曰胎產經行失調，或鬱怒虧損肝脾而為外邪所傷，或先腿腳痺痛，或先肢筋弛懈，既而膝漸大，腿漸細，如鶴膝之狀，而名之也。若高腫赤痛者易治，若漫腫不赤痛者難治。二三月潰而膿稠者易治，半載後潰而膿清者難治。治以先攻伐虧損元氣，尤為難治也。太要當固元氣為主，而佐以大防風湯。若食少，脉倦者，六

君子湯為主，晡熱內熱者逍遙散為主，寒熱往來者八珍湯，發熱惡寒者十全大補湯，不寐而驚悸者歸脾湯，月經過期者補中益氣為主，月經先期者加味逍遙散為主，凡潰後當大補，脾胃若膿出反痛，或寒熱煩渴等症，皆屬氣血虧損，一切主于補培庶保終吉。

丁婦患鶴膝，兩抑中腿股筋牽作痛，內熱寒熱，肝火氣滯之症，先用加味小柴胡湯四劑，後以加味逍遙為主，佐以大防風湯，而消，又患痢，後

兩膝腫痛寒熱往來用十全大補湯為主佐以太防風湯而全消

大防風湯 治陰虛邪襲腿膝腫痛等症
防風 附子 炮牛膝 白朮 炒羌活 人參
芍藥 炒杜仲 姜制各一錢 川芎 五分熟地半錢
桂心 黃蓍 炒各一錢 甘草 五分熟地半錢

水煎服

黑丸子 一名和風 治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫或外感風寒肢體作痛若沉注膝風初

結服之自消若潰而膿清與補氣血藥自歛孕婦勿服

百草霜 白芍各一兩 南星 川烏各炮

白芍 赤小豆各二兩 白芨 川歸

骨碎補 炒各八錢

牛膝 六錢

右為末酒糊丸桐子大每服三十九鹽湯溫

酒任下

聖愈湯

治血虛心煩睡卧不寧或五心發熱

熟地黃

生地黃

黃蓍 炒

人參 川芎

川歸錢各一

水煎服

八味丸 治火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化或臍腹疼痛夜多旋溺益火之原以消陰翳即此方也

熟地黃

白製乃佳八兩

山茱萸肉

山藥

四兩

茯苓

牡丹皮

澤瀉

各三兩

桂心

去粗皮能

虛火下行歸原一兩

大附子

用一兩五錢重者切四塊用童便浸數日火煨切者無白臯為度

右為末蜜丸桐子大每服七八十九滾湯下

婦人足跟瘡腫

足跟足指腫痛足心發熱者皆因胎產經行失于調攝虧損足三陰經虛熱所致若腫痛或出膿用六味丸為主佐以八珍湯胃虛憊食佐以六君子湯寒熱內熱佐以逍遙散晡熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生瘡亦用前二藥以滋化涼大凡發熱內熱晡熱自汗盜汗等症皆因虛假熱也故丹溪謂火起九泉陰虛之極也蓋足跟乃督脈發涼之所腎一

經所過之地。若不求其屬而泛用寒涼，則悞甚矣。然俗謂為兔齒瘡者，蓋獵人被兔咬足跟，而不歛氣血，滲盡其人必死。男子酒色過度者亦多患此症。

一婦兩足發熱，足跟作痛，日晡熱甚，心腎肝血虛

用逍遙散六味丸五十餘劑，諸恙悉退。

六味丸
火壯水制火之劑。治腎虛發熱，作渴，小便淋，夜寐壅，失寐，嘔噦，吐血，頭目暉眩，眩眼花，耳聾，咽喉燥痛，口舌瘡裂，齒不堅固，腰腿痠軟。

五臟虧損，自汗盜汗，便益諸血，允肝經不足之症，尤當用之。蓋水能生木，故也。此水泛為痰之聖藥，血虛發熱之神劑。又治肝腎精血不足，虛熱不能起床。即仲景八味丸去附子桂心。

肺瘡

如人肺瘡，因外內蘊熱，或七情鬱火，誤行汗下，重亡津液，以致肺氣受傷，而惡風咳嗽，鼻塞，頭強，胸脇脹滿，呼吸不利，吐痰臭濁，膿血腥穢，若咳，嗽喘急，寒邪在表也。小青龍湯，咳嗽胸脹，寒邪

內壅也。葶藶大棗瀉肺湯，脇脹咳嗽腥臭，膿已成也。桔梗湯，喘短氣或小便短少，肺氣虛也。佐以參薯補肺湯，牀櫈少食或喘嗽短氣，肺虛也。佐以參木補脾湯，作渴飲冷，午前嗽甚，胃火盛也。竹葉石膏湯，作渴內熱，午後嗽甚，陰血虛也。六味丸四物湯，口乾飲湯，牀櫈少食，胃氣虛也。補中益氣湯，加五味麥冬，口乾內熱，咳嗽痰涎，腎水虛也。六味丸益氣湯，黃昏熱，或嗽甚，陰火熾也。六味丸四物湯，加五味麥冬，五更嗽

或痰甚，肺脾虛也。六君子湯，嗽而不得眠，及而脇疼，肝火血虛也。六味丸益氣湯，大亢前忘，因外淫所侵，當祛邪而實上，因心火太過，當伐木而補金。若肺氣虛弱，當補脾土而生肺金。若陰火上炎，當補肺脾，以滋腎水。然而發熱喘嗽，咳唾膿血，飲食不入，皆脾土不能生肺金。肺金不能生腎水，之敗症，苟能純補脾土，而生諸臟多有復生者。若用寒涼脾胃，復傷則肺金失養，腎水益涸，虛火上炎，薰蒸于肺，吾未見其能生之。

者其唾膿血脉浮大面色赤者俱難治若陰火妄動或勞嗽吐膿血者尤難治若膿自止脉浮短濶及始萌者易治

一婦素血氣發熱咳嗽服寒火之劑後吐膿血面赤脈數其勢甚危此膿成而氣血虛也用八珍湯補元氣桔梗湯治肺癰而愈

青龍湯

肺受風邪咳嗽喘急

半夏

乾姜

細辛

麻黃

去根

炙甘草

各一錢

五味子

炒五分

肉桂

芍藥

炙甘草

各一錢

五味子

炒五分

大附子

炮五分

水煎服

葶藶大枣鴻肺湯

治肺癰

胸膈脹滿

上氣喘

急或身面浮腫鼻塞聲重用葶藶炒黃研末每

服三錢先用東十枚水煎入藥再煎食後服

桔梗湯

治肺癰咳

而胸膈隱痛

胸次腫滿咽

乾口燥煩悶作渴濁唾腥臭

桔梗

枳壳

以仁

桑皮

各炒

當帰

貝母

瓜萎仁

甘草節

防已

去皮各一錢黃耆

鹽水炒

百合

蒸各半錢

五味子

炒

甜葶藶炒

地骨皮 知母 炒 杏仁 各五分 姜水煎服

人參補肺湯 治肺癰腎水不足虛火上炎喉嚨

垂膿血發熱作渴小便不調

人參

黃芪

白朮

茯苓

陳皮

川帰

各一錢

山茱萸

山藥

各二錢

五味子

麥冬

灸甘草

各七分

丹皮

一錢

熟地

半錢

姜水煎服

參芪補脾湯 治肺症因脾氣虛弱咳嗽膿漿

人参

白朮

各二錢

黃芪

各二錢

茯苓

川帰

各一錢

山茱萸

山藥

各二錢

五味子

麥冬

川帰

陳皮

各一錢

升麻

三分

五味子

分四

炙甘草

姜水煎服

人參平肺散 治心火犯肺金患肺痿咳嗽喘

人參

各一錢

升麻

三分

五味子

分四

嘔瘉

治壅盛胸膈痞滿咽盜不利

方見喉門

各一錢

升麻

三分

五味子

分四

婦人腸癰因經行產後瘀血或七情飲食所致其

証小便如淋發熱惡風身皮甲錯腹皮腫急按

之軟如腫狀或腹脹大轉側有水聲或繞脇生

瘡或大便出膿其脉遲緊者膿未成用活命飲

各一錢

升麻

三分

五味子

分四

升麻

三分

婦人腸癰因經行產後瘀血或七情飲食所致其

証小便如淋發熱惡風身皮甲錯腹皮腫急按

之軟如腫狀或腹脹大轉側有水聲或繞脇生

瘡或大便出膿其脉遲緊者膿未成用活命飲

各一錢

升麻

三分

五味子

分四

升麻

三分

五味子

分四

升麻

以解其毒。脉滑數者，膿已成，用雲母膏以下。其膿若二生間，遍身微腫，大便與脣出，膿以息積之症也。多致不救。內經云：腸癌為病，不可驚。法則腸斷而死。其半卧轉側宜徐緩時，常少飲稀粥，靜養，調理庶可保生。

一婦人小腹腫痛，小便如淋，此毒結于內，用神效瓜萎散，一劑少愈，又以薏仁湯二劑，乃痊。

一婦小腹痛而有塊，脉芤而濡，此瘀血為患，以四物加玄胡索、紅花、赤芍、牛膝、木香二劑，血下而

愈。

一婦小腹脹痛，大便秘滯，轉側有水聲，脈洪數，用薏苡梅仁湯一帖，下去瘀血，諸症頓退，以薏苡仁湯二帖而癒。

一婦小腹脹痛，小便不利，脉滑數，此膿已成，服太乙膏五錢，膿大下，脹痛悉退，以瓜萎散蠟丸九帖而瘳，又用加味逍遙散數劑而經調。

一婦因經水多，服藥止之，致腹作痛，以失笑散二帖而瘳，又用加味逍遙散數劑而經調。

一產婦惡露停滯，小腹作痛，服瓜仁湯，下瘀血，而
一產凡瘀血停滯急宜行之，緩則腐化為膿，最為
難治。若流注關節，則患骨疽，多為敗症。

瓜子仁湯 治惡露未尽或經行瘀血停滯，小
腹作疼，或成腸瘻等症。方在孕瘻卷

敗醬散

治

瘀

數身無熱腹無積聚

按之軟濡

此為腸瘻乃久積陰冷所成。

以仁半

兩

附子

炮半

敗醬草

錢半

每服四錢水煎服，以小便利為度。

牡丹湯即牡丹皮

治腸瘻腹軟而痛時下膿

血

方在孕瘻卷

千金大黃牡丹湯

治腸瘻小腹堅腫，按之則

痛，肉色如故，或微腫，小便頻數，汗多，增寒

脈遲緊，未成瘻者宜服之。

梅仁湯

治腸瘻壅痛，大使秘澀。

二方在外

神仙蠅礬丸

最解毒止痛。

方在瘻疽門

失笑散

治產後心腹絞痛或血迷心竅，不知

人事及尋常腹內瘀血積血作痛。

鼎人全書

五卷

三

五灵脂 炒 蒲黄 分等

為末每服二錢酒調下

乳瘡乳岩

經云乳頭屬足厥陰肝經。乳房屬足太陽胃經。若乳房忽壅腫痛。結核色赤。數日之外。焮痛張潰。稠膿湧出。膿尽而愈。此屬脾胃熱毒氣血壅滯。名曰乳瘡。為易治。若杓起內結小核。或如鷄棋子。不赤不痛。積之歲月漸大。瘞岩崩破。如熟榴或內潰深洞。血水滴滲。此屬肝脾鬱怒氣血虧。

損名曰乳岩。為難療。治法焮痛寒熱。宜發表散邪。腫焮痛甚。宜鍼。肝清胃或不作膿成。不潰宜用托裏。或肌肉不生。膿水清稀。宜補脾胃。或膿出。反痛惡寒。發熱宜補。宜補氣血。或腫焮作痛。補熱內熱。宜補陰血。或飲食少。思時作嘔吐。宜補胃氣。或飲食難化。泄瀉腹痛。宜補脾氣。或勞傷。腫痛宜補氣血。怒氣痛腫。宜養肝血。甚不可用。壯伐之劑。復傷脾胃也。乳岩杓患。用益氣養榮湯。加味逍遙加味歸脾。可以內消。若用行氣破血。

之劑則速其亡

一婦內熱脇脹兩乳不時作痛口內不時辛辣若

卧而起急則臍下疼痛此帶脉病也小柴胡加

青皮黃連山梔二劑而安

一婦先熱渴至夜尤甚後兩乳忽腫肝脉洪數乃

熱入血分用加味小柴胡湯而愈

一婦膿清腫硬面黃少食內熱晡熱自汗盜汗月經不行此肝脾氣血俱虛也用十全大補加遠志貝母及補中益氣各三十餘劑外用葱熨法

而消

一婦久鬱左乳內結核如杏三月不消心脉濶脾脈大按之無力此肝脾氣血虧損以八珍加貝母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘帖而消

一婦右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不甘此肝脾氣血虧損內服益氣養榮湯外以木香餅熨之年餘血氣復而消

一婦乳內結核年餘晡熱食少此血氣不足故用益氣養榮湯彼欲効速另服行破之劑潰出清

膿而熯

一婦乳內結核如粟亦服前藥大如覆碗堅硬如石出血水而效

神妙瓜蒌散 治乳瘡及一切瘡疽初起腫痛即消膿成即潰膿出則愈

瓜蒌

一箇爛研

生粉草

當帰

酒洗各半兩

乳香

沒藥

各一錢

用酒煎服良久再服

若肝經血虛結核久而不消佐以四物柴胡升麻

白芍茯苓甘草若肝脾氣血虛弱佐以四君草

湯

帰柴胡升麻君憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸脾

玉露散 治產後乳脈不行或身肢壯熱頭目皆痛大便滯滯等症

人參

桔梗

炒

川芎

白芷

當帰

芍藥各一錢

甘草

五分

右水煎服

乳瘡初發

果母為末每服二錢熟酒下即以二十手裹擦

卓上每二乳向_下良久自通

大宮詹少溪吳馭閣校

卷之五

