



赤水玄珠

痘疹門

世四

武
5/6
959



門武
卷 5/6
卷 35

小兒金鏡痘疹心印卷之五上

新安生生子孫一奎著輯



○異痘須知

夫痘有似凶而吉有似吉而凶者不可不知

天根痘諸痘不起壯而天庭或曉星起灌者乃精氣外生故曰天根十有九生

天空痘諸痘不灌頂也故曰天空十無一生

明朗痘諸痘不起而太陽獨起者吉日為明太陽之謂也

明蝕痘諸痘起壯而太陽不起者凶

海溢痘諸痘不起而耳後方員一寸獨起者名曰宿海溢是腎經旺也可治

小兒金鏡

卷五上

海枯痘

諸痘起而耳後方員一寸獨不起

又云

頭面遍身四肢耳上俱已起灌膿惟

有根痘

凡痘出頭面多四肢密者十分危險若

無根痘

或灰白不起者腎水絕也不治

抱鼻痘

面部俱稀而鼻深左右密如蚕種者此

單瑣口

面部俱稀而口角有一粒黑痘較

雙瑣口

若口角兩邊各有一粒者

瓊項托

痘出遍身稀疎惟項下稠密一片以

猪頭痘

出而頭項窩太多者急用山豆根玄參

逆痘

身少下身多者名

兩頭痘

初標時看身而身上身臍而下俱有而

鬼捏痘

傷痕一痕故名鬼捏不治

鬼痘

痘標既定手足背俱多而頭面全無

則難救矣

救之出七日

朴紫草防風木通再加黃耆三十粒水煎

參歸芪湯去桂加蘼朮桔梗山查白芷厚

朴紫草防風木通再加黃耆三十粒水煎

救之出七日

則難救矣

傷痕一痕故名鬼捏不治

痘標既定手足背俱多而頭面全無

賊痘

蛇皮痘

藥患痘

救五日之外難救蓋氣血下行不能上
升急用升麻川芎白芷黃葉前胡甘草
桔梗防風當歸第失姜水煎服如不治
曲池生毒下凡見骨而死若身上四肢
稀少者不可

遂作鬼痘者
痘初出便如綠莖過一二日便如黃莖大
再一日又便如員眼大名曰賊痘其痘根
窠與頂全無血色形雖起脹按至虛軟
至四五日上不出血而死但此諸痘
獨大其大甚速者就是

不必大如員眼也
頭面遍身無地干塌而色白者俗
名蛇皮以此必乾枯不能作漿至十一二
日必死

初標紅潤至四五日忽變陷伏不起將
至裏虛以名為藥患急用扶表裏為上

九焦痘

伏陰痘

空倉痘

石白痘

菜萸痘

虫痘

當額地閣顛骨背耳後手足皆有
二箇黑陷者名曰九焦痘不治

痘不貫膿而瀉膿血
故名伏陰急宜溫裏

痘雖肥滿而內實乾枯全無血水
乃空倉也決死之症

痘中有凹而四孩特起明亮好看內實
漿板不化以手摸之其硬如石因形似
石白故名之以此

痘不甚起而中亦有凹四孩皆有縐紋
以其形似菜萸故名之也若得根窠紅
活者服內托散去防風白芷頂中發黑
點者保元湯加芫桂身壯熱者入酒炒
黃

痘瘡痒甚者不必夏月中蠅蛆雖寒
月亦有用簪挑去而愈或謂用柳條鋪

疔瘡

下令兒卧於上則蛆自出與蓋毒留於皮膚延綿日久臍腐熱腐故耳疔之腐草為螢朽木生

血疱瘡

血疱瘡者血協熱毒而自漿也刺血血統紅者尚可治急與犀角地黃湯加白芍以制血解毒血黑者不治身熱者小數胡湯加生地血漿不能收醫者紫草煎湯調下

血醫瘡

膿也出稀少四五日腫如碗豆六七日血醫瘡乾亦似丹砂九日而落以氣血充足毒少故隨出隨落不及膿

白漿瘡

膿也初起發瘡頭便帶白漿者以疫癘瘡也但有以便不可治主七日死

四圍瘡

本瘡或發似粟米不待養漿即加搔癢

漏瘡瘡

瘡出頭有孔膿水漏出堆聚乾結其色如天疱瘡及癩頭之形者或清水非膿無事自破水去而乾黑者以皆屬氣所為傳染相似以俗名漏瘡未有能治者矣起腫時瘡上有小孔不黑不白名曰蚌瘡皆膿理不密而有是瘡大泄元氣急用保元湯加丁香肉桂

蛀瘡

其孔一密而瘡自起矣

隱血斑

其形如豆壳灰白全無血色擦破而後血出亦無膿血故曰隱血斑也不治

赤萍瘡

瘡已出齊或末齊如赤萍微高起若爬出有血急以解毒升發藥救之如成爛瘡則無妨矣

紫萍瘡

瘡已出齊紫色不起不灌漿如浮萍貼在肉上者不治

白萍瘡

同上

草尾珠

其痘遍身俱陷惟腕骨一團飽滿如珠以症可治補托灌膿即痊矣

黑痘

盧廉夫曰黑痘多屬血熱黑痘本為惡証世醫恒棄而不治然形狀多端猶可解救須當辨而治之但血不活者則難救矣

一痘紫黑或黑點子隱在皮膚之間者無此散或人牙散用猪尾血三五滴酒調下元小

三分大人五分

一初出便是黑點急用紫草茸二三錢醇酒半盞煎至三分瀝查與服為妙

雲翼一其形如痣皮膚發青紫紋者服透肌散或

加防風荆芥

一形如牽牛而色瘀敗又黑痕併黑靨者並用蟬退二十五箇紫草茸一錢水煎服

一痘黑如煤炭血不紅活者用活血散一錢

煎血酒煎紫草湯下

一痘黑而皮膚皆黑成片者化毒湯加蟬退

地骨皮酒炒黃芩

一痘黑大而軟者氣弱而熱毒盛也用保元

加紫草一而一痘焦黑潮熱煩躁者小無比散井水磨一屏

角調下一錢一

氣血兩敗痘

近看猶如水蓼花一遠望胭脂一臨漿清水不成膿一古聖神農一無治法一

復出痘

先見標一一二點于面部或口唇上下如一常起脹貫漿收靨不知者以為痘本稀一故也然以火照之紅點隱隱然藏于一皮膚之內急用內托解散則痘復出一然順下決發一毒不急散一其毒而發其痘即死一

雲翼子二十八般異痘姑錄于后以備參者

一彤雲繞頂

遍身痘好但頭頂一片紅赤者一乃熱毒盛于膀胱也須清利之一遍身痘好但頭頂款乾陷伏不一起者不治一

一紫雲灌頂

其症必咽喉啞塞鼻氣大粗乃一血衰氣敗而无陽脫也不治一用保元湯加天樞一

一烏紗覆頂

用保元湯加天樞一

一梨花漫頂

遍身磊落光澤惟額上一片血一流或可救一遍身磊落者乃心家客熱甚也急一服之一

一雲掩天庭

遍身磊落者乃心家客熱甚也急一服之一

一紫萍鋪額

其症熱甚咽悶亂發狂用小一無比散加玄參升麻犀角一

一烏紗落額

不治一

一灰撲印堂

其症心家少血也若兼腹脹咽一乾用保元湯加白芍涼血解毒一

一楊花撲面

好湯用內托散加天雄

一赤珠繞唇

此乃脾經極熱也用此散加雄黃

一烏飯沾唇

此証必聲啞神昏目精不轉四肢厥冷喉响如鋸三朝七日乃死期

一霞錦穿胃

此因火毒滯盛不治之症

一紫雲佈胃

此症血枯氣滯毒來攻胃也其症必咬牙戰掉口唇焦裂頃刻

一黑棋排胃

舍傾矣三朝決死

一柳絮飛膏

此乃血氣枯弱也保元湯加芎歸附主之

一桃花映背

此症清火解毒可生

一紫萍浮背

不治

一黑砂落背

不治

一雪鋪魚背

此血已枯盡也不治

一赤鱗穿腹

此症必大便秘小便淋瀝乃胃家熱甚也用五苓甘露以和鮮

一黑段纏腹

此症必肚內膨脹声音

一白梨墮腹

氣血衰敗也半月之間發驚而死

一葡萄落地

膺間紅紫一片若葡萄者兩日命終

小兒金鑑

卷之三

一 爛栗居臀

通身俱好惟臀上一片如栗壳臭爛者托補下元可轉

一 榴花散野

諸痘俱好惟四肢紅赤而唇口崩裂者乃心脾肺三經熱也須涼血清

一 黑珠遍躰

四肢枯黑如火燒狀頭口中涎出氣冷朝夕死矣

一 楊花墮枝

手足獨灰白者氣凝血滯也八珍湯加附子治之

○ 婦女痘

童女出痘與童男相同無以議也但天癸通者則治法不能不異且夫發熱之初適遇經水如期而至則熱隨血解痘出亦輕不須服藥若過三

四日而熱不止痘不出者以熱入血室血必妄行為內動中虛之患宜涼血地黄湯加人參治之

一 非經行之期於發熱之際而經忽至者此毒火

內熾逼血妄行之故必痘多而毒盛急用涼血

解毒湯倍加連翹牛蒡使熱得清毒得解痘得

出經得止始無他變遲則內虛痘必陷矣柳花

散佳

一 正當起發灌漿之時適遇經行過三日不止痘

應起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌
或灰白或黑陷以為經血去多陰血虧耗必為
陷伏壞症矣急以八物湯去地黃加黃耆木香
熟附子以調元氣或葫荈酒噴之使痘起發灌
漿或出增痘者為舌若寒戰咬牙喘急腫滿手
足厥冷者為內脫不治之症矣

一起發灌漿之時經水適來忽口瘡而不能言者
乃血入少陰不能上榮於口也宜先以當歸養
心湯主之俟其能言後以太補湯治之或猪心

血調服亦可

一經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神思昏沉
言語狂妄如見鬼神尋衣撮空以行經之後血
室空虛天行邪熱乘虛而入犯於衝脉蓋肝藏
血開竅於目神思昏者魂亂也目妄見者視亂
也妄言者肝移熱于心也宜瀉肝散或小柴胡
湯加生地丹皮

一正直崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘以必
不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯八物

湯加木香黃芪官桂主之使裏氣充足毒無留
一停更能飲食則可保全否則倒塌不治矣
一向來經閉不通血海乾涸遠逢出痘毒氣拂鬱
於衝任之間二陽之併發其熱必甚若攻擊之
則血妄行不止痘亦不出為喘急為腫脹為陷
伏矣須調其心脾使毒得發洩庶可以保其生
以歸脾湯逍遙散治之脾和食進然亦方可收
功
一痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如

常若當以時忽然行經者人但知厭穢以觸正
痘殊不知此乃本身之血不為之厭但恐血去
裏虛防生陷伏之變急宜救裏解毒大補湯主
之
一妊婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則血氣衰敗
痘必不能起發灌漿命其危矣故孕婦出痘深
為可慮蓋痘之用藥多主溫補如半夏肉桂之
類皆妊婦所忌而烏附又非痘家所宜凡遇此
症者不問輕重悉以清熱安胎為主不可觸動

其胎宜安胎散加黃芩芍藥主之血動者四物湯加芩連治之及單胎散佐之身熱足冷腹脹者八物湯加木香脾氣虛不進飲食毒發不出者四君子湯加木香糯米紫草胎動不安者安胎散加砂仁痘出稠密者參芪肉托散加紫草芍藥當歸單身熱有外邪無內疔者參蘓飲加木香更以如聖散為主隨疔加減如初發熱加升麻葛根連翹痘出太甚加酒炒黃芩大力子山查連翹不起發加大力子白芍藥口渴加麥

冬知母天花粉痰多加半夏所謂可擾而擾似乎無擾故雖有胎不忌半夏也

一痘正在起發灌漿之時忽遇坐草分娩之期此氣血俱虛之候宜大補湯加熟附子主之以補氣血固表裏若產後小腹急痛者此血未盡也黑神散畧與行之不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者以脾胃內虛外作假熱也木補湯加熟附一二劑更用四君子湯加黃芪當歸陳皮木香多服止者吉不止者凶

一疹後十日或半月之間適逢出痘以無胎孕繫累只以大補氣血為主以大補湯或八物湯去芍藥痘出多加連翹大力子大便自利者加肉苳蔻只照常一貼用藥施治不必妄為而多疑之反致誤事

一痘疹要訣曰妊婦出痘收靨之時胎落者多無事若發熱初出之時胎落者猶或可救若時當起脹灌膿而有犯此者多死蓋血氣衰敗無以逐其毒也

一痘已出未出不起不發隱在皮膚并治麻症斑症用梅花一兩桃仁二錢絲瓜五錢辰砂二錢甘草二錢為末每服五分參補湯下

一痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢州山甲一兩仙靈脾五錢射香一錢為末每服三五分咬牙寒戰加人牙二三厘內托散送下

快斑散
貫衆赤芍藥各一甘草升麻枳殼各
右為末每服一錢水一盞竹葉七片煎至五

小兒金鑑 卷之三 痘疹

分溫服看大小與之按貫衆主腹中諸熱邪
毒其性微寒凡痘瘡煩渴咽燥喘急大便秘
小便赤澁目赤皆裏熱也急宜服之

西來甘露飲

清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不
退痘色紅紫口渴大便結燥服之即能紅潤
亦治疹家煩熱口乾咳嗽疹色枯燥或譫語喘
急睡卧不安

絲瓜藤 霜降後三日近根二尺剪斷將根頭

一節倒挿入新瓦瓶中上以物掩之勿使灰塵
飛入次日以好新罈一隻將瓶中之汁傾在罈
中仍將藤照前挿入瓶內三日後汁收盡將罈
封固收藏所後取用○若發熱煩躁口渴未見
紅點將茜根一兩水煎濃汁二酒盃搗絲瓜藤
汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕○若已見
標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯沖服便
見紅潤○若夾斑者犀角紫草茜根煎湯沖服
寒月用酒煎沖服○蓋此汁極能解毒清熱尤

治天行時疫每以生姜汁少許加蜂蜜調勻服之有神功

渾元汁 即紫河車不拘男女初胎者尤妙入新瓦罐內封固其口上以碗覆埋於土中久則化而為水是也

專治氣虛血熱痘色紅紫乾枯黑陷等症以此汁清而補之其效立見氣虛甚者人參紫草煎濃湯沖入服之已上三方有力之家可多收貯愈久愈佳臨症極便勝如積金寶造浮屠也

李氏敗毒散 治初熱壯盛等症

即前敗毒散加升麻荆芥牛旁子蟬退山查地骨皮薄荷紫蘓紫草 減獨活紫胡茯苓人參 右姜一片水煎臨服加葱白汁五茶匙 如熱甚加紫胡黃芩 夏加香薷 冬加麻黃

瀉加猪苓澤瀉

蘓解散 治痘初壯熱頭疼腰痛腹疼作脹一切熱毒甚者

紫蘓 葛根 防風 荆芥 白芷 蟬退 紫草 升麻 白牛子 木通 甘草 各等分

加灯心葱白各七根水煎熱服

升麻葛根湯 治初熱壯盛疑似未明服此或痘

已出而表熱甚不退 李氏加紫蘇五分笋尖

山查牛子各一錢冬月加麻黃一錢令痘易出

易歛

和鮮湯

鮮表和中

升麻 乾葛 各一錢半 白芍 一錢 人參 防風 各七

川芎 八分 甘草 五分 姜 一片水煎服

鮮毒疎痘湯 預服鮮熱去毒已出鮮熱毒斑疹

防風 荆芥 羌活 枳胡 川芎 白芷

當歸 連翹 黃芩 黃連 麻黃 紫草

蟬退 右姜葱水煎服

加味葛根湯 治痘失表發熱譫語

升麻 葛根 赤芍 甘草 桔梗 枳胡

荆芥 防風 連翹 牛旁子 木通

右水煎服

大灵丹黃治壯熱顛狂驚搐譫語紅紫斑焦乾陷

一切惡症

白滑石 飛過 三兩 雄黃 飛過 犀角 各三錢 辰砂 飛過 三錢

半牛黃 水片 各一錢 射香 五分

右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷灯草

牛子紅花紫草黃連各三錢水二碗煎至半

碗細絹瀝去渣加蜜四兩同熬滴水成珠和

前藥丸如小龍眼大金箔為衣每用一九灯

心湯下暑月冷水化下

無比散 初熱服之甚能稀痘 又治痘夾黑點

子及黑陷黑痘等症

辰砂 錢一 水片 射香 牛黃 各五分如無牛

代之 膩粉 錢二 一方有蟾酥

大右研細末一歲兒服一字大者五分刺猪尾

血三兩點新汲水調和送下取下惡毒如爛

魚腸葡萄穗狀即愈

小無比散 治痘壯熱口渴小水澀大便秘口氣

熱煩躁不寧或焦紫或紅斑自發熱至起壯時

有熱者皆可用痘後餘熱亦可用

桂府滑石 飛過 六兩 石膏 飛過 一兩 粉草 寒水石

各五錢蟬肚小者甘草湯

勻每五歲者服二錢大人再加冬月灯心

湯下夏月井水調下熱甚不解者井水

磨犀角汁調下若紅紫頂陷不起加川山

甲末一分射香半分紫草煎湯加酒一二匙

調下即起

大無比散 治熱毒大甚驚狂譫語引飲痘瘡紅

紫黑陷

桂府滑石飛過六兩粉草一兩辰砂飛三錢雄黃飛一錢

右末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之初用敗毒散調下亦能稀痘若報痘後用灯心湯下

退火回生散 治痘熱甚發渴紅紫黑陷

滑石錢一辰砂分一水片厘三右末冷水調下

得睡少時神安氣靜痘轉紅活

龍腦膏 痘毒出不透心煩狂亂如見鬼神或已

出未出番伏黑惡毒等症

冰片研末新宰猪心血和丸員眼核大小

兒服半丸 大人服一丸 凡狂妄煩躁者
心經毒盛也 紫草湯下 昏瞶不醒者 伏熱
在心經也 井花水下 血疱漿不回者 紫草
湯下 漿坐疱陷者 溫酒化下

天真膏 治黑陷乾枯紅紫及斑不退用此救之

十全四五

初生小兒解下黑糞用磁確收貯加水銀二兩
射香一錢黃蠟封口埋於土中愈久愈妙久
則化而為水每遇前症看見大小熱毒盛者

量與二三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之
立時紅潤活澤真秘方也較之天靈蓋枯臭
無益之物萬矣綠以糞原係母之真血所
化蓋以血補血且入土日久又得陰氣多故
能解毒 百日內小兒熱而煩躁啼哭不止
用少許點入眼角二三次便能神安氣和而
睡蓋又能清心熱也

猪尾膏 治全龍腦膏但此二方俱以龍腦為劑
虛寒者不可用惟實熱則有功

小兒痘疹 下五卷 卅

凡痘過服熱藥昏臥不知人事者取猪尾血以龍腦和為丸鼻眼核大溫酒化下按猪尾乃動物取其血用

之使毒活動化漿而達於外也

一凡痘倒靨心神不安者片腦五分辰砂一錢猪尾血爛研膏用木香磨湯化下

一凡痘不化漿倒靨者片腦一分猪尾血一錢同研新汲水調下

歲靈龍腦散 治痘黑陷

歲靈仙一錢炒為末 片腦一分 右用溫水調下取下

瘡癩為効

獨聖散 痘不起頂或紫黑陷倒靨服以即時紅

活起發有起死回生之功又名奪命丹

川山甲酒炒成珠 錢取 麝香一分

右末每小兒三分大者五分用木香煎湯入少酒調下 熱甚者紫草湯下

宋杏庄方內加炒紅麴川烏炒焦各五分名曰一

七金葱湯下

大成散 治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切

大不起發之症俱可用之

川山甲酒炒 甘草末錢二

雄黃

硃砂各一錢半

紫草三錢 射香二分

右每五歲兒用二分冷症熱

酒調下

熱症紫草湯下

寒者加入治中

散內用

熱症加入小無比散內

人牙散

治痘不起發黑陷或紅紫黑斑咬牙寒

戰

人牙自落者不拘多少火煨存性入 菜汁內大牙三次小牙二次研極細

未入射香一分 或加紅麴二分

右用雞冠血調成膏好酒半

盞入乳半盞入葱白一撮煎湯送下

凡服牙齒不可過多每服止三分多則陽氣盡出

於表恐痘斑爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡

泄急以四君子加芎歸服之

無憂散 治臨危痘症寒戰咬牙

人牙

如上製

雄黃

珍珠各五分

一方有牛黃五

分 右末每服三五分多則一錢荔枝煎湯下

無價散

治黑陷欲死者

一方加射香米片許少

用無病小兒糞臘月將傾銀確二箇上下合定

鹽泥固濟火煨通紅取出為末蜜水調服一錢

小兒金匱

卷五

七

烏金膏 治發熱至七日已前或因風寒痘不起
發或紅紫或驚搐俱可用

姜蚕 洗酒 全蝎 去足尾 甘草 紫草 白附子

味苦內白 麻黃 各五 川山甲 炒末二 蟬退 去頭

者真 洗淨 右為末將紅花紫草各一兩好酒二鍾

二錢 熬去大半去渣入蜜五兩慢火同熬滴水成

珠為度丸如龍眼核大每服一丸灯心湯化

紫金散 治出不快及倒靨 亦治遠年不愈惡

瘡 紫草 蛇退 牛旁子 炒各

右為細末每服一錢水半鍾煎減半溫服

連翹升麻湯 治痘一發密如針頭形勢重者當

輕其表而涼其內 連翹 升麻 黃荅

葛根 各一 麥門冬 去心 右水煎服

清地退火湯 治痘帶熱而出名為火裏苗急用

候之 地骨皮 地膚子 牛旁子 紫草

葛根 各八 連翹 六 當歸 五 木通 三 蟬退 二

右加姜一片水煎服 如熱不退再服一劑

或為末灯心湯服

紫草透肌湯 治痘熱而出不快及頂陷者

紫草錢一升麻分五牛子分五防風分五荆芥分五黃耆各八

甘草分三木香分五右姜水煎服 如色紫腹

痛加蟬退一錢

化毒湯 治痘已出而熱毒未解宜清熱涼血毒

一解不致黑陷血一涼不致紅紫

紫草 升麻 甘草 蟬退 地骨皮 黃耆

酒炒木通 各等分水煎服

解毒散 治毒先發腫者名為痘母後發者十有

九死先發者吉 金銀花兩五 甘草兩一 木通

防風 荆芥 連翹 牛子各三錢

右用酒水各一鍾煎服 如泄加訶子藟藟

痘紅者加炒黃芩芍藥 瘡痒者加歸身生

地或加何首烏尤佳 疼痛者加赤藥

透骨解毒湯 治寒戰咬牙

紫草 甘草 當歸 防風 陳皮 赤芍 右等分水煎服

消毒飲 痘已出上焦熱胸膈不快及痘後癩毒

麻疹熱毒 荆芥 牛子各二錢 甘草一錢

右姜二片水煎服

如聖湯 痘已出身熱如火

紫草 升麻 葛根 白芍 甘草 木通

猴梨 各等分加姜一片葱白三莖水煎熱服

心煩加麥冬赤茯苓煩渴加生脉散 七八

九白身如火者加酒炒黃芩地骨皮

四聖散 黑陷倒靨不起發不紅活小便不利

內紫草 黃耆 甘草 木通 右水煎服 熱

甚色紫倍加紫草芥連紅花大便秘加枳壳

如常加糯米

加味四聖散 痘出不快及變陷倒靨小便赤身

熱未退或復冒風者

紫草 黃耆 人參 甘草 川芎 蟬退

木通 木香 大便秘加枳殼 不秘加糯米

百粒水煎服

涼血解毒湯

痘出熱不退紅不分地或痘苗乾枯黑陷急用此方可起杜灌漿

紫草錢一 生地 紫胡各八分 牡丹皮七分 赤芍

蘇木 防風 荆芥 黃連 木通各三分 牛子

分四天麻 紅花 甘草各二分 姜一片 灯心二十

根糯米百粒水煎服

惺惺散 治痘頭痛壯熱喘急以攻毒散熱之劑

人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗 細辛

川芎各五分 薄荷 一方無川芎加天花粉

姜三片 枣一枚 水煎服

內托散 痘不起發根窠不紅或灰白色 咬牙寒戰等症

人參 黃耆 甘草 川芎 當歸 防風

白芷 桔梗 白芍 厚朴 木香 肉桂

西右姜一片 枣一枚 水煎服 色紅者去肉

大桂木香加紫草 蟬退 漿不滿水酒各半煎

服 色淡白者去防風 白芷加糯米 大便

眼燥加人乳

蟬退膏

蟬退酒洗去頭足 當歸 防風 甘草 川芎

荆芥穗 升麻 白芍各等分 右為末煉蜜丸

朱實大每服一丸薄苛湯化下

粉紅丸 又名溫驚丸 治痘後癩癩症

牛膽南星 辰砂 天竺黃 水片

胆脂玉 右為末牛膽汁和為丸雞葶子大

每服一丸小者半丸沙糖溫水化下

大保元湯 治頂陷根窠雖紅而皮軟薄血有餘

而氣不足 黃芪 甘草 川芎

官桂 加姜枣水煎服 如氣不行加木

香減去桂 若不食加人乳半鍾 又方加

白何首烏黑豈蒸過用

生脉健脾湯

治漿既成皮軟色白乃氣不足也 氣不足當補氣血不足宜養脾脾

黃芪 人參 炙甘草 官

桂 當歸 川芎 白芍 白朮 茯苓

加酒洗紅花三分 姜一片紅棗一枚糯米五十粒或

通天散 治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參 陳皮 桂枝 川芎 熟地 芍藥

當歸 芫草 紅花 木香 甘草

六分知母八分荔枝殼十箇右用鷄汁一鍾東三枚糯米一撮煎服初服到頸再服到臍三服到脚神効

升天散 即灌膿起頂散治痘灰白或紅紫黑陷乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

人參六分黃芪六分山查八分白朮五分當歸五分川芎五分橘紅各五分甘草三分淫羊藿五分川山甲各二分肉桂三厘木香二分姜一片東一枚水煎服或為末服亦可如嘔吐生姜湯

下瀉米飲下 肚痛神麩煎湯下 煩躁

麥門冬湯下 渴用麥冬五味煎湯下 吐瀉藿香陳皮湯下 痘不成漿多服數帖無効

補漿湯 痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿三分多人參八分川山甲三分黃芪一分枸杞子錢一川芎五分當歸八分甘草五分木香一分白朮六分山查八分陳皮五分官桂三厘黃荳三十粒笋尖三箇加姜枣糯米水煎服

方有白芷防風

補元湯 治痘頂充滿而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而血不足也

川芎 當歸 白芍 熟地 各一 紫草 紅花 各酒洗 陳皮 甘草 各三 白朮 錢半

酒水各半盞糯米五十粒束二枚煎服

活血散 治痘色淡白

當歸 赤芍 酒 紫草 川芎 紅花 各五 血竭 錢一 木香 錢二 右為末每五歲者服一錢

十歲已上者服二錢好酒調下 熱極血焦

不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散 治氣血俱虛灰白色不灌膿面漿者

紫河車 一具 煨 龜板 酥炙 一方有鹿茸五錢

右末每服五七分或一錢氣虛者保元湯下

血虛等歸紫草煎湯下

渾元散 治全上

紫河車 一具 分作 用白糯米三合水淘淨入

無油銚內同炒以米黃色為度同為末每用

五七分見天者一錢極補氣血能助灌漿如神緣糯米性溫得穀河車之氣純化為河車故其補功最速譬之造酒米從麴化意也極妙絕

異功散 此方調順陰陽充實表裏凡痘灰白痒漏寒戰泄瀉腹脹並宜服之非虛寒者不可輕用 人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮 半夏 厚朴姜制 木香 丁香 肉果 大附子 官桂 右姜枣水煎服

內助丹

黃耆酒炒 人參酒炒 白朮 茯苓 陳皮 半夏 厚朴 肉桂 山查 姜三片 枣一枚 糯米五十粒水煎服 如不食加人乳一盃 痒甚加大附子 寒戰不止加附子防風 渴加麥冬 瀉加澤瀉猪苓不止加訶子肉果

助陽丹

痒塌不起根窠不紅 黃耆 人參 白朮 各酒炒 甘草 三川芎

當歸各一錢 紅花五分 陳皮八分 官桂二分 姜東水煎

服如食少加山查厚朴各五分餘加全煎

回生起死丹 治痘灰白寒氣逆上不食腹脹嘔

吐肚痛泄瀉清水手足俱冷

丁香九枚 乾姜一錢 水煎熱服被蓋片時令脾胃

溫煖陰退陽回痘自紅活

治中散 虛寒瀉利不進飲食

黃芪 人參 茯苓 白朮 川芎 當歸

肉桂各五錢 肉果麵包煨熟 丁香一錢 木香三錢

右末每五歲用五分好熱酒調下衣被蓋煖少頃痘變紅活而起

和中湯 虛吐不止即鎮胃止吐湯加人參

人參 茯苓 甘草各五分 白朮 半夏各八分

陳皮 藿香 砂仁各一錢 生姜水煎服

藿香正氣散 治初熱乾嘔

藿香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗 甘草

茯苓 半夏 厚朴 白芷

右姜東煎服

定痛散 傷寒肚痛及冷氣痛

神麴 香附各錢 山查二錢 良姜 當歸

甘草各五分 姜三束二水煎服 手足逆冷加

大附子二分

桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝 炙甘草各一錢 白芍藥酒炒二錢 姜三片束

二枚水煎服

黃連湯 治熱毒在胃腹痛時或欲吐此藥能升

降陰陽 黃連 炙甘草 乾姜 桂枝各二錢

半夏 人參各八分 棗二枚水煎服

益黃散 胃冷嘔吐而利

陳皮 青皮各二錢 丁香五分 木香三分 訶子七分

右水煎服 一方無木香有荳蔻一錢

聖腸湯 治痘泄瀉不止

黃芪 白朮 肉果炮去油各一錢 山查七分 川芎

陳皮各五分 升麻三分

不加牙東三枚水煎服

豆蔻丸 治痘灰白泄瀉清水不止 又方止用

龍骨訶子肉蔻三味治同

木香 砂仁 龍骨 訶子肉 肉果麩煨各五錢

赤石脂 枯礬各七錢半 右末麵糊丸黍米大每

服三十九米飲下

加味犀角飲 痘已出不勻心煩壯熱口舌生瘡

犀角 牛子 荊芥 甘草 防風 升麻

桔梗 麥冬 水煎服

犀角地黄湯 治諸吐血

犀角磨汁入 赤芍藥 生地 丹皮 各等分水

煎服

二寶散 治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴亂

語 犀角 玳瑁 二味磨汁頓服即愈

斬關散 痘紫發熱鼻紅不止

地黃 丹皮 黃芩各五分 升麻三分 藕節

茅根各一錢 葦苳四十粒 水煎服

梔子仁湯 煩躁譫語驚狂發斑

梔仁 黃芩 石膏各二錢 知母 杏仁各一錢半

大青 紫胡 葦苳 赤芍各一錢 升麻八分

甘草分五水煎服

人參白虎湯 暑盛煩渴痘出不快又解麻痘斑

痘等熱毒 人參分五石膏錢四知母半一錢炙甘

草分三加粳米一撮水煎服

竹葉石膏湯 治痘不惡寒壯熱煩渴小水赤澀

石膏 知母 甘草 麥冬 竹葉

右水煎服

麥門冬湯 治斑疹煩渴吐瀉及痲後餘熱

麥冬 人參 甘菊 赤芍 赤茯苓 升麻

各一錢 甘草分五 石膏錢三 水煎服

生脉散 止煩渴首尾通用

人參 五味子 麥冬 水煎當茶飲

參苓白朮散 治痘已痲未痲身熱不退煩渴不

正以藥極能清神生津乃治脾虛之聖藥也

人參 白朮 茯苓 甘草 乾葛 木香

麥冬 藿香 各等分水煎服

柴胡麥門冬湯 治痘壯熱經日不退

柴胡 麥門冬 甘草 人參 玄參 龍胆

草水煎服熱退即止 一方無人參

涼膈散 上高積熱口舌生瘡煩渴

連翹 薄荷 黃芩 梔子 甘草 大黃

朴硝 各等分水煎服 如痰火嗽加桔梗竹

葉蜜一匙

四順飲 治大便秘

大黃 當歸 芍藥 甘草 各等分水煎服

通幽湯 大便秘結

當歸 紅花 生地 熟地 桃仁 升麻

甘草 火麻子 水煎服

通腸散 大便秘結

枳殼 當歸 大黃 錢各二 芝麻 錢三 牛膝 分五

水煎服

葱白湯 治頭疼

連鬚葱白 生姜不拘多少水煎帶溫服

當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 黃芪 黃芩 黃連 黃柏 生地

熟地 各等分水煎服

小引

卷之三

三

甘露飲 治牙根腫痛腐爛口臭牙疳出血喉舌

生瘡 天冬 麥冬 生地 熟地 黃芩

枳殼 石斛 茵陳 枇杷葉炙去毛 甘草

各等分水煎服

吹口丹 治口疳

黃連 青黛 孩兒茶 冰片 為末吹之

赴筵散 口瘡神效

薄荷 黃栢 等分為末入青黛少許搽之

牙疳方 痘後餘毒攻牙根疳腐內宜服甘露飲

人中白錢三 枯礬錢二 鹽梅七箇 射香一

白礬子灰錢一 五穀虫焙乾 為細末先將葱

茶洗去腐肉須見鮮血然後搽藥

釣藤湯 痘後口噤僵直透臍腹痛

釣藤 紅花 木香 川芎 當歸 白芍

甘草 白木 青皮 黃連 官桂 生姜

各等分水煎不拘時服

消風散 治痰盛驚搐譫語狂急口張目作上視

羌活 獨活 姜蚕 藿香 枳壳 防風

天麻 地骨皮 蝉退各八分 前胡半一錢 柴胡

黃芩 天花粉 桔梗 茯苓 荆芥 紫草

牛子各一錢 人參 川芎各七分 甘草四分

姜東水煎服

瓜蒌散 治痘熱極生風發搐

瓜蒌根二錢 白姜一錢 慢火全炒老黃色為

末每服二三分薄奇湯下

保命丹 一切驚風發熱

天麻 白鬱金 全蝎去尾各五錢 防風 甘草三錢

青黛三錢 白附子炒 姜蚕姜汁炒 薄荷五錢 大半夏

炒滾湯浸晒乾又用 南星製全上一兩 辰砂飛五錢

射香五分 鈎藤 牛黃二錢 蝉退 茯神

桔梗各五錢 右朱煉蜜為丸 芡實大每服一丸

灯心湯下

蝉花散 治痘發熱發痒抓破

蝉退 地骨皮各一兩 為末每服二三匙白酒

服二三次

回漿散 治痘不收漿結痂 入冬甘草 白木

何首烏 白芍 黃耆 人參 甘草 白朮

白茯苓 姜水煎服

象牙散 治同上

人參 黃芪 白朮 甘草 七分 茯苓 一錢

何首烏 右加糯米二錢 束二枚 水煎調下

象牙末 一錢

玄參升麻湯 治溫毒發斑

玄參 升麻 甘草 水煎服

陽毒升麻湯 面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮

喉痛 升麻 犀角 射干 黃芩 人參

甘草 各二錢半 右水煎服

陰毒升麻湯 治陰斑

升麻 當歸 川椒 鱉甲 椎黃 甘草

右水煎服

四聖膏 治瘡疔挑破以點之

七粒珍珠火上燒 碗蓋七七鍋內炒 男髮

不拘灰多少 加入胭脂真箇好

二聖散 治同上

雄黃^{錢二} 紫草^{錢三} 右研末用油胭脂調下
 敷方 痂後痘疔潰爛成坑內見筋骨以敷之
 赤石脂 膩粉 黃栢 杭粉^炒 血竭^{各錢}
 飛丹^炒 髮灰^五 乳香 沒藥^{各三} 冰片^三
 伏龍肝^{錢一} 蜜陀僧^{飛過} 有臭氣加阿魏^三
 四分^{右為細末綿帛篩過敷之外用膏藥貼}
 內服^{人參敗毒散加川山申蟬退連翹}
 人參敗毒散 治餘毒癰腫
 人參 赤茯苓 羌活 獨活 前胡 薄荷

柴胡 枳殼 川芎 桔梗^{各等} 甘草^半
 牛旁子 防風 荆芥 連翹 金銀花^{即荆}
 散^毒 頭上加白芷升麻^上 身倍加桔梗^{防敗}
 手加薄桂^腰 加杜仲^{腿足} 加牛膝木瓜
 金花散 痘後肥疔疥癬等瘡以能收水解毒
 黃丹 黃栢 黃芪 黃連 大黃 輕粉
 射香 右為細末濕瘡乾搽燥用臘猪油熬化
 調敷
 必勝膏 治腫毒

馬齒莧搗汁 猪脂膏 石蜜 三味熬膏塗之即消

三莖散

痘後癩毒初起紅腫 黑豆 赤莖 菖莖用

醋浸研漿時時以鷲翎刷上隨手可消

敗草散 治斑爛不止

爛茅草 不拘多少用夏年蓋墻屋者經露風

霜年久感天地陰陽之氣善解瘡毒其功不

能盡述取來晒乾或焙乾為極細末敷瘡上

或攤在蓆上令兒土卧於上即愈

又方 荔枝殼微燒存性 草紙燒灰存性 多

年敗茅 三味共為細末或搽或搽自能收水

結痂

又方 黃莖壳燒白灰為末搽之 如痘風癩以

莖殼煎湯洗

綿繭散 治爛瘡 治身及肢節疔蝕瘡膿水不

絕 繭子不拘多少將生明礬末裝入滿火上

燒令汁乾枯為末搽之

秘傳茶葉方

痘爛遍身無皮膿水流粘粘衣

被茶葉要多揀去粗梗入滾水一漂即撈起

再揀去梗濕鋪床上用草帛隔一層令兒睡

正一夜則膿皆乾

乳香韶粉散 痂欲落不落用以薄塗當滅癩痕

又治熱痘瘋遍身膿水不絕

乳香錢三 韶粉兩一 輕粉錢一 右末猪油拌鵝

翎敷上

地黃散 痘毒入眼腫痛赤縷或白膜遮睛

熟地 當歸 防風 蝉退 羌活 白芍

刺炒去 穀精草 木賊各一錢 玄參五分 犀角末錢一

黃連 大黃 炙甘草 木通各一錢半 為細末

小兒每服一字大人二字羊肝湯食後調服

日三夜一忌口將息

蜜蒙花散 治痘入目翳膜遮睛

蜜蒙花 菊花 石決明 白蒺藜 木賊

羌活 右末每服二三錢茶清調下

兔糞散 治痘入眼黃亦可煉蜜為丸酒送下三

五十九 兔糞炒黃為末用蟬退木通甘草煎

湯頓服

兔糞丸 治痘入眼或生翳障

兔糞炒四兩 石決明煨 草決明 木賊去節

白芍 防風各一兩 當歸五錢 穀精草二錢

右末蜜丸菜豆大每服三五十九丸荆芥湯送

下

吹耳丹

輕粉 飛丹 為細末左眼翳吹右耳右眼吹

左耳只吹一二次

又方 加雄黃射香少許 外用石燕子一對煨

即一對二味磨水常服

單胎散 治妊婦出痘 下方有陳皮枳殼太熱

加鬱金

川芎 川歸 芍藥 人參 白朮 茯苓

甘草 柴胡 條芩 防風 荆芥 白芷

葛根 砂仁 紫草 阿膠 桔梗 糯米

連翹水煎服

安胎散

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 白朮
甘草 條芩 陳皮 紫蘇 砂仁炒 阿膠炒
香附 艾葉 紫草

各等分加姜枣水煎服

安胎飲

大腹皮洗酒 人參 陳皮 白朮 白芍
紫蘇 砂仁 香附 甘草 加糯米水煎服
胎漏加阿膠百草霜

柳花散 室女發熱經行

柳花五錢 紫草一兩 升麻九錢 歸身七錢
右末每服七錢葡萄酒煎湯調下

鐵箍散 治痘後瘰癧

鳳凰退燒灰醋調圍四畔番頭出毒氣甚佳

蕎麥粉法 痘瘡破者用此敷之潰爛者以此遍

撲之極佳 蕎麥粉以絹袋盛撲於瘡上或以

取糲於床褥上

溫粉撲法 治汗出不止

黃連 牡礪粉 貝母 各末五錢 粳米粉 一和勻

絹袋盛周身撲之

蟬花散 治爛痘生疽虫及夏月諸虫咬傷臭惡

不可近者服之虫皆化而為水蒼蠅亦不敢近

蟬退 洗淨焙 青黛 澄去灰土各五錢 北細辛 二錢 蛇退 一

性燒存 右為細末每服三錢酒調下仍以生寒

水石細末摻之

青黛散 治痘未作膿痛甚心隔煩躁睡卧不安

並宜服之 真青黛如東核大水調服之即安

樺皮散 治痘瘡及乳癰并一切腫毒

樺皮木剉煎温服以藥味苦平無毒 若治乳

癰取樺皮燒存性為末酒調服之立消

獨勝散 治早晨微熱晚發大熱目黃脇動身熱

手冷發甚如驚者又名牛旁姜蚕散

牛旁子 錢五 白姜蚕 錢二 紫草 十 水煎服速

進三四服其痘便出蓋姜蚕治遍身癰疹疼

痛牛旁發痘透肌紫草利竅要知痘疹無虛

寒証者服以痘立出也

小兒金匱 卷之五
蘿葡湯 治痘疹出不快者

右用開花蘿葡煎汁時時飲之蓋痘疹氣勻即出快蘿葡治嗽定喘下氣消脹解毒

紫河車散 治小兒痘瘡毒氣不解上攻咽喉

音不出舌頰生瘡過逆煩悶潮熱面赤

紫河車 即金線 重樓 茜根 貫衆 各三錢 白芍藥

甘草 炙各五錢 右每服三錢生姜一片水煎服

一方有牛旁子

野通散 治痘瘡出不快及傷寒不語

乾野人糞 即彌猴糞 火燒存性 冰片 真麝香 各等分

右為細末每服五分看大小用新汲水入蜜

調下十歲以上者服一錢 按野人糞治蜘蛛

咬瘡以治痘出不快大効蓋蜘蛛咬瘡久

而不愈其絲生皮膚延蔓遍身不愈者加雄

黃青黛水調以蜘蛛試之立化為水屢驗蓋

此三味是治瘡疹當用之藥取山中者若人

家所養之猴食物味雜即不効失其本真也

南金散 治痘已出而復擷其勢甚危諸藥不効

者萬無一失本家印貼此方施人全活甚衆

紫背荷葉

霜後搭水
紫背者

白姜蚕

洗去糸
炒乾

右為末等分每服看大小大者一錢小者五分研芫荽汁和酒下米飲亦可治此症多有用龍腦人牙者李難措辦惟以無毒而効且速但紫背者甚難得可於鹽舖內尋之

橄欖飲

治倒靨

橄欖從中截斷水服少許服之立發

乳香猪血膏

治痘不起發

乳香

末研

猪心血搗為丸櫻桃大每服一丸水

磨化下

鈎藤紫草散

治痘疹不快

鈎藤鈎子

紫草茸

等分為細末每服三五

五分溫酒調下蓋紫草滑竅利小便散十二經

毒氣鈎藤治小兒寒熱十二驚癇綠驚癇出

於心肝癩疹亦心所主也

鴉片散治痘當起脹灌膿時泄瀉不止諸藥不

効者如神

真鴉片

蓮肉

炒錢

右每服半分或一分米飲調下立止

葛根黃芩湯 治喘有汗發熱咳嗽

乾葛 黃芩 各二錢 黃連 芍藥 石膏 各一錢

五味子 粒十一分 甘草 分五 水煎服

五味子湯 治喘促而厥

五味子 半錢 人參 錢一 麥冬 杏仁 各二錢

右姜三片 枣三枚 水煎服

清肺飲 治咽乾声啞

麻黃 半錢 麥冬 錢二 知母 天花粉 荆芥

各一錢 訶子 葛蒲 各八分 桔梗 錢二

水煎入竹瀝姜汁服

天花散 治痘後失音

天花粉 桔梗 茯苓 訶子 石菖蒲

甘草 各等分 竹葉七片 黃荊一寸 水煎服

補肺散 治痘未出声啞

阿膠 蛤粉炒成珠 牛子 炒三分 杏仁 去皮尖 三粒

甘草 二分 馬兜鈴 黃芪 各五分 糯米 炒一錢

水煎食後時時嚥之

利咽解毒湯 治痘咽喉痛首尾皆可用

山荳根 麥冬各一錢 牛子炒 玄參 桔梗各

分 甘草分二 防風分五 菴荳分四

右水煎服

三黃熟艾湯 痘後咽塞喉痺

黃連 黃芩 黃柏 艾葉 各等分水煎服

玉鎖匙 咽喉腫痛或帝鍾拖下不收及喉舌強

硬 硼砂錢一 朴硝分五 姜蚕條一 冰片分半

為末吹入

羌活當歸湯 治腰背痛初發熱時便宜服之

羌活 當歸 獨活各一錢 羌胡分五 桂枝分七

防風 川芎 黃柏各一錢 桃仁 紅花各八分

酒水各半煎服 又方治腰痛有蒼朮漢防

如神湯 治腰痛

當歸 桂皮 玄胡索 各等分為末酒下

中三錢

活血解毒湯 治餘毒

防風 荆芥 生地 赤芍 當歸 連翹

牛子 黃連 紫草 甘草 蒼朮 薄荷

川芎 木通 各等分水煎服

胎元散 痘不起發不紅潤是血氣俱虛

胎元焙乾為末加射香少許酒調服三五分

水楊湯 治痘乾尅不起者

水楊柳 春冬用枝秋夏用枝兼生水邊細葉經梗枝上有圓葉滿葉有白鬚散出俗名

梅水楊 右以枝葉切碎水煎七八沸先將一分

置盆內手拭不寒不熱令痘兒先服內托之

劑然後浴洗漸漸添湯不致太冷浴洗久許

乃以帛撚火照之疊然有起勢起處竟有

暈暈有系乃漿影也如漿不滿再浴若弱者

只浴頭面手足可也既不赤腫不厭多洗灯

照如無起勢乃氣血敗無生意矣

溫膽湯 治痘血寒顏色灰慘血凝不活腹脇脹

滿面青筋縮嘔清水或瀉青菜色

白茯苓 橘紅 半夏 甘草 枳實炒

各等分竹茹一錢姜棗水煎服

陳氏木香散 治痘氣寒鼻流清涕咳嗽惡風自

汗身軀寒戰瘡色慘白

木香臨時磨服 大腹皮黑豈汁洗淨 人參各三錢 赤茯苓

前胡 青皮去穰炒 半夏炮七次 丁香 訶子肉

炙甘草各二錢半 灯心一錢 每服三錢姜枣水

煎服者大小加減

中和湯 治全上

人參 黃耆 厚朴姜汁炒 白芷 川芎

當歸 粉草 桔梗 白芍酒炒 肉桂去粗皮

防風 藿香 各等分酒水各半姜枣煎服

瀉肺散 治痘氣熱鼻乾燥皮毛枯槁咳嗽瘡色

焦紫即瀉白散

桑白皮蜜炙 地骨皮 甘草 各等分加竹葉二

十片灯心水煎服

清肺飲 治症全前

麥冬 桔梗各二錢 知母 荆芥 天花粉各一

錢石菖蒲 訶子肉各八分 水煎服

清金湯 治口氣臭

小兒

小兒金... 五...

知母 黃芩 石膏 桔梗 甘草 天門冬
麥冬 馬兜鈴 木通 山梔 天花粉 各
等分水煎服

解毒托裏散 治痘稠密

桔梗 牛旁子 人中黃 防風 荆芥穗

酒紅花 歸尾 蟬退 升麻 乾葛 赤芍

連翹去心 各等分水煎入燒人尿調服

四物快斑湯 治痘火盛乾燥

當歸 川芎 赤芍 生地 荆芥穗 牛子

升麻 葛根 連翹 紫草 地骨皮 水煎

入燒人尿服

四君快斑湯 治痘氣虛滯濕

人參 黃耆 白朮土炒 茯苓 甘草 桂心

白芷 荆芥穗 防風 陳皮 白芍酒炒

各等分水煎服

大補保命湯 治痘皮嫩易破者

人參 黃耆 當歸 生地 川芎 赤芍

甘草 牛旁子 防風 荆芥穗 連翹

小兒金... 五...

官桂 水煎入燒人屎服

清金導赤飲 治痘熱乘肺金當痂不痂作喘煩

躁謔語小水不利垂危

當歸 白芍 陳皮 貝母 軟石膏 白茯苓

甘草 黃芩 黃連 杏仁 桑白

皮 枳殼 木通 滑石 麥冬 車前子

人參 玄參 各等分水煎服

人參固肌湯 治痘表發太過致肌肉不密痘痂

粘肉久不落者

人參 黃耆 甘草 當歸 蟬退

各等分入糯米一撮水煎服

人參清神湯 治痘痂不落昏迷沉睡者

人參 黃耆 甘草 當歸 白朮 麥冬

陳皮 酸棗仁 黃連 茯苓 各等分加

束糯米水煎服

馬齒莧散 治痘痂不落成斑痕者

馬齒莧 搗汁猪脂膏石蜜共熬膏塗腫處

當歸桂枝湯 治痘後手足不能屈伸

當歸 川芎 黃耆 甘草 薄桂 黃柏

蒼木炒 各等分水煎 如氣虛少加川烏以

行經加人參為主 如感風寒以致骨節疼

痛加羌活防風

玄參化毒湯 治痘後赤遊丹毒

玄參 歸尾 紅花 連翹 軟石膏 赤芍

防風 地骨皮 木通 荆芥穗

各等分加竹葉水煎服

蚕退散 敷牙疳 草 當歸 荆芥

枯礬 塗即采桶中垢也 五倍子各二錢 蚕退存

性一 為細末先以米泔水用蟬蟪虫翻轉蘸

水洗净瘀血以藥敷之

黃連陰隱丸 治狐惑瘡

黃連二錢 芩會 乾蟾煨各一錢二分 史君子肉二錢

半 蕪荑一錢五分 川棟子肉一錢

右末烏梅洗净去核搗膏和丸米飲下

蜆子湯 治痘後發癢

蜆子不拘多少活者以水養五七日旋取其水

洗之蜆衣煮湯亦佳

十三味敗毒散 治瘰癧毒

當歸 白芷 川山甲炒土 金銀花 防風

乳香製 甘草 陳皮 赤芍 皂角刺

貝母 沒藥製 天花粉 各等分酒水各半

煎服

涼肝明目散 痘後羞明

當歸 龍胆草 密蒙花 川芎 羌胡

防風 酒連 各等分雄猪肝煮湯煎服

望月沙散 痘後暗室中不能開者

穀精草 密蒙花 酒洗 蟬退去翅足 望月沙兩一

右為末雄猪肝一兩竹力批破用藥一錢兩一 入肝內水煮熟飲汁食肝効

羊髓骨髓 治痘痧欲落不落癩痕

羊髓骨髓兩一 煉入輕粉一錢研成膏塗之

小靈丹 解毒發痘之聖藥治紅斑黑陷不起

切危惡如服此而不見効者决無可生之理矣

硃砂 雄黃各二錢 乳香 沒藥各製一錢半

大蟾蜍

取心肝尾上焙乾五錢

射香

三分

為細末取猪心

血雞冠血丸皂子大每服一丸身無大熱

生酒化下熱甚不飲酒紫草灯心湯下即

時紅活而起

神功散 治痘作渴

人參 黃芪 甘草 牛旁子 紅花 生地

前胡 紫草 白芍 水煎服

紅花湯 治全上

紅花或子隨意煎湯飲其渴即止紙口中如烟

飲之即止

加牛旁子尤妙

加味胤粘子 治咽中有瘡作嘔

桔梗 射干 山荳根 防風 乾葛 陳皮

荊芥 連翹 水煎細細呷之

灯心竹葉湯 治乾嘔

竹葉片三十 灯心根三十 水煎服

潤腸湯 治虛秘

歸梢 甘草 生地 火麻仁 桃仁泥

水煎服

拔毒膏 治瘡疔

雄黃_研 胭脂重浸水_{令濃} 調雄黃_點 疔瘡_上 立時紅活_{亦神法也} 蓋雄黃能拔毒 胭脂能活血也

涼血地黄湯 室女出痘遇經不止 熱入血室 當歸 川芎 白芍 生地 白朮 升麻 黃連 甘草 人參 山梔仁 玄參 水煎服

涼血解毒湯 治女人出痘非經期於發熱時而

血忽至

當歸_{一錢二分} 白芷_{五分} 升麻_{四分} 紫草_{一錢半}

紅花_{一分} 赤芍_{一錢} 桔梗_{八分} 連翹_{三分}

灯心二十根 水煎服

當歸養心湯 治女人出血口瘡不能言者

人參 當歸 麥冬 甘草 升麻 生地

各等分 加灯心 水煎服

瀉肝散 女人經水不斷 適逢出痘 發熱昏沉 言

語狂妄 羌活 川芎 防風_{各八分} 當歸_{一錢}

山梔仁

龍胆草各五分

大黃

酒蒸三次一錢

水煎服

一方有木通柴胡黃芩

歸脾湯

女人經閉不通血海乾涸適逢出痘以

妄調其心脾不使血妄行加柴胡山梔名加味

歸脾湯

人參 白朮 茯神 黃耆 遠志

地骨皮

各一錢二分 甘草 三分 木香 五分 酸棗仁 一錢

姜東煎服

逍遙散

女人出痘寒熱不時經水不調服以其

血不致妄動 白朮 茯苓 當歸 芍藥

甘草

柴胡

各等分加東一枚水煎服

加

丹皮山梔名加味逍遙散

如聖散

妊婦出痘安胎

白朮

黃芩

當歸

枳殼

黑芷

大腹皮

砂仁

甘草

桑上羊兒藤即桑寄生

各等

分水煎服

黑神散

婦人出痘分脫後血作痛

當歸

川芎

熟地

炮姜

桂心

蒲黃

香附童便炒

木香

青皮

黑芷

酒水各半

煎服

原疹

生生子曰麻疹漸地呼為瘡子又曰沙子吳地呼為疹子新安呼為麻總由有生初之滯火伏於命門之間命門具太極之理而陰陽五行繫焉臟腑之所由生也蓋五行一陰陽陰陽一太極也天之與人咸相感通由其通故天寒而人身寒天熱而人身熱也天之瀉氣一動則所稟之毒隨感而發陽感之則疹出焉陰感之則痘出焉

焉陽浮而淺故疹易出易斂陰凝而深故痘難出難斂陰陽二劫之毒盡出則向安矣余故曰人之出疹出痘猶蚕之一眠二眠三眠也痘雖出於陰而實成於陽以氣為之固也疹雖出於陽而實藉於陰以血為之資也何見之痘非氣行則血不附安得結痂疹非血濟則氣失依焉能收斂斯陰陽升降之理一開必一闔血之附氣氣之依血陰根於陽陽根於陰陰陽互為其根也前人謂痘出於臟不知指何臟疹出於腑

不知指何腑而云之也又謂疹出心肺故鼻涕而咳嗽余謂此皆臆度套詞而非有真知一定之見也既曰疹出於肺心肺獨非臟乎按內經鼻為肺之門戶通天氣陽毒上發熱毒薰蒸蓋心肺位尊鬲上又肺主毛竅毒從竅出是干於肺而非出於肺也要知痘之與疹皆出於命門之陰陽也 右釋麻疹

發熱之初多似傷寒惟疹則咳嗽噴嚏鼻流清涕眼泡腫其淚汪汪面浮腮赤惡心乾嘔為異

耳但見此候便宜謹避風寒戒葷腥厚味急表散之使皮膚通暢腠理開豁而疹毒易出也
一疹痘之發雖曰胎毒未有不由天行疔氣故用藥必先明歲氣兼之時令如溫煖時月以辛涼發之如防風解毒湯暄熱時月以辛寒發之黃連解毒湯太寒月以辛溫熱劑發之桂枝解毒湯時寒時煖以辛平之藥發之升麻葛根湯以因時投劑不可悞作傷寒妄施汗下而伐天和也又須看人虛實如大便秘結煩熱甚而發不

出者以酒大黃微利之吐利不止以參芍之類補之

一用前藥發散而疹隨見為美若發不出再加發之如加味麻黃散之類外以芫荽酒糟蒸熱擦之看其疹自頭至足為之出齊頭面愈多為佳若遲延日久而不出則腹脹氣喘昏眩悶亂煩躁而死矣

一看疹之法及於耳後項上腰腿先見其頂尖而不長其形小而均淨淡紅為吉若色紅甚兼火

化也化斑湯主之今參白虎湯佐之如色白者此血不足也養榮湯如色紫赤乾燥暗晦乃火盛毒熾宜六一散解之四物湯加柴胡黃芩乾葛紅花牛蒡子連翹之類滋陰涼血而熱自除所謂養陰退陽之義也此亦五死一生之病外大青湯玄參解毒湯皆可選而用之若黑色者則熱毒尤甚為十死一生之病須明察之勿妄施治

一表後看疹隱隱然見於肌膚成片切忌風寒生

小兒金鑑 卷之五
一冷如_レ一犯_レ之則皮膚閉塞毒氣壅滯遂變為渾身青紫而毒反內攻煩躁腹痛氣喘悶亂諸症作矣欲出不出危亡立至
一疹已出而忽沒者乃風寒加逼而然也若不早治毒成內攻必致瘵癩而死急用消毒飲合升麻湯熱服則復出而安矣
一發熱之時遍身汗出者以毒從汗散玄府開疹易出也有鼻中血出者以毒從血解也俱不可遽止之若汗出太多血出不止者以火甚逼

迫太過致液妄流妄行矣急宜當歸六黃湯加浮小麥以止汗芫花湯加玄參百草霜以止血遲則汗出多而元氣虛血出多而精神散為不治之症矣
一發熱之時或嘔吐或自利或滯下者此火邪內逼毒氣上行則吐下行則利毒甚則裏急後重而為滯下也吐者竹茹石膏湯利者升麻澤瀉湯滯下黃芩芍藥湯加黃連生地木通人參枳殼或少加大黃微下之

一發熱之時未有不口渴者但宜以藜蘆灯心炒
米湯飲之入參白虎湯佐之取生津解毒而已
若恣飲冷水恐生水畜之疴故水入於肺為喘
為咳宜用葶蘇子以洩肺中之水水入於脾為
腫為脹為自利水入於胃為嘔為利宜用猪苓
澤瀉茯苓以瀉脾胃之水水入於心為悸為驚
宜赤茯苓灯心湯以洩心下之水水入於肝為
脇痛用芫花以洩之水入腎與膀胱為小便不
利為陰囊腫用車前子木通以洩之皆當隨症

而治

一疹出之時咽喉腫痛不能飲食者以毒火拂鬱
上薰也宜甘桔湯加玄參牛旁連翹更以十全
散玉鎖匙吹之不可妄用鍼出血也
一疹出之際咳嗽口渴心煩者以毒在心肺發未
及也瀉白散加天花粉連翹玄參黃連以瀉之
或黃連杏仁湯
一疹出之時自利不止或瀉稀水頻數者有吉有
凶但要審其疹若遍身稠密太盛或紫色或紅

色以則為吉蓋毒在大腸非瀉則毒不解惟用
平胃散加葛根連翹以解之而已疹一發透依
期而收瀉自止也若疹已收而瀉尤未止者驗
其熱必未及再用前藥加連翹黃連牛旁
木通澤瀉以分利之六一散亦妙絕若用訶子
肉果等滯滯之劑則變喘急腹滿痞脹不治之
症矣若疹色淡而熱不熱口不渴大小便利飲
食少進此為凶乃虛寒之症方可溫補或兼收
瀉

一疹出常以六時辰即收為率如子時為陽午後
收午後為陰子後即收乃陽生陰成陰生陽成
造化自然之妙也故漸出而漸收者其勢輕可
若一出之後熱不退連綿三四日而不收者此
毒火太盛外發未及內有餘邪所致須以化班
湯三味消毒飲加玄參石膏桔梗為治
一疹出後自然熱退若遍身既出而猶拂拂煩熱
頻作嘔吐者以毒尚未盡留連於肺胃之間宜
化班湯如大便秘少加大黃微利之

一疹出之時曾作瀉痢未經清解至疹退之後變為休息痢不問赤白裏急後重日夜無度以餘毒在大腸也須分虛實治之實者三黃丸利之或香連丸和之後用黃芩湯虛者從補

一疹退之後微咳咳嗽者以餘毒未盡也用清肺飲加消毒飲主之若咳甚氣喘連聲不住名為頓嗽甚至飲食湯水俱噎出或咳出血者以熱毒乘肺而然也宜多服麥門清肺飲加連翹若見胸高如龜背作喘血從口鼻出搖首搯頭面

色或白或青或紅或枯黯者乃不治之症然亦有肺氣為毒所遏而發喘連聲不已但無嗽咳血出噎食之症者宜用清肺飲倍加人參治之尤不可拘於肺熱之一端而純用清肺解毒之藥

一疹退之餘聲啞不出或咳或喘或身熱不退以致日久而不愈者以熱毒未盡肺金受剋故也宜清金降火湯加竹瀝姜汁主之一疹退之後飲食如常動止如故而卒然心腹絞

痛遍身汗出如水者，此因元氣虛弱，失於補養。外雖無病，裏實虛損，偶然為惡氣所中，謂之中惡。以朝發夕死之疔間，有用蘓合香丸而甦者。一疹退之後，有餘熱未盡，或發癩毒，肢節疼痛者，以羌活散微汗微利。一疹退之後，有餘熱未盡，或熱甚而失血者，犀角地黄湯合解毒湯，或四物湯加茵陳、木通、犀角之類，以利小便，使熱氣下行而愈。一疹收之後，餘熱未盡，日夜煩躁，譫語狂亂者，辰

砂益元散、灯心湯下，或辰砂五苓散加苓連治之。若初起煩躁譫語者，升麻葛根湯調辰砂益元散主之。

一麻疹一疔比之，出痘似輕，然調治失宜，其禍反不旋踵。蓋痘由胎毒而發，其形勢多少，輕重吉凶，自可預斷。至疹之出，則雖由感受邪氣而發，然其輕者可重，重者可輕，皆在於調治有方。故其飲食禁忌，比痘尤甚。若誤食雞魚，則終身皮膚粟起，如雞皮之狀。但遇天行出疹之時，又令

重出誤食猪肉則每歲出疹之月必然下痢膿血誤食鹽醋致令咳嗽則每臨出疹之月必復咳嗽誤食五辛之物則生驚熱不時必待四十九日或百日後方無禁忌也

一孕婦麻疹但當以四物湯倍加白朮條芩艾葉安胎清熱為主使胎無震而疹易沒也如胎氣上衝急用苧麻根艾葉煎湯磨檳榔并服之更多服上藥為妙

一熱毒薰胎胎受傷而母實無恙也蓋疹與痘

不同痘宜內實故胎落而母亡疹宜內虛故胎下而母安雖與其胎去而母存孰若子母而全之為愈也

麻疹輕重不治三症要訣

或熱或退五六日而後出輕發透三日而暫沒者輕頭面多而勻淨色澤者輕頭面不出者重紅紫暗燥者重咽喉腫痛不食者重鼻風沒早者重移熱大腸交痢者重黑暗乾枯一出即沒者不治鼻扇口張目無神者

不治 鼻清糞黑者不治 心前吸氣喘者不治

水痘症

夫水痘亦類傷寒之狀身熱二三日而出或咳嗽面赤眼光如或噴嚏或唾涕與正痘不同易出易靨不宜燥濕苟或燥之恐結痂多變成瘡之症

麥湯散 古本只此一方或作湯服亦可

地骨皮 活石 甘草各五分 甜葶藶 麻黃

大黃 知母 羌活 人參各一錢 右為末每服

五分用小麥七粒煎湯調下

防風葛根湯治痘發癰疹及疹麻發熱

防風 葛根 升麻 赤芍 甘草

各等分水煎服

防風解毒湯 治麻痘初發熱如時令温煖用此辛涼之藥發之

防風 薄荷 荆芥 石膏 知母 桔梗
牛子 甘草 連翹 木通 枳殼 竹葉

灯心各等分水煎服

黄連解毒湯 治麻痘初發熱如時令暄熱用以
辛寒之劑發之

黃連 黃芩 黃柏 山梔 牛旁子 甘草

防風 荆芥 知母 石膏 桔梗 玄參

木通 姜三片水煎服

桂枝解毒湯 治麻痘初熱如時令大寒用以
溫熱之劑發之

桂枝 麻黃 赤芍 防風 荆芥 羌活

甘草 桔梗 人參 川芎 牛子

升麻解毒湯 治麻痘初熱如時
平之劑發之

升麻 葛根 羌活 人參 柴胡 前胡

甘草 桔梗 防風 荆芥 牛旁子 赤芍

連翹 竹葉 水煎服

加味麻黃散 麻痘發不出以以發之

升麻 酒洗 麻黃 酒炒 人中黃 牛旁子 蟬退

各等分水煎服

化斑湯 治麻痘色紅

人參 知母 石膏 甘草 牛旁子 連翹

升麻 地骨皮 竹葉 糯米 水煎服

養榮湯 治麻痘色白

人參 當歸 紅花 赤芍 桂水 甘草

水煎服

大青湯 治麻痘熱赤暗晦乾燥

玄參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻

石膏 木通 梔子仁 水煎入燒人屎服

如大便秘加酒大黃

茅花湯 治麻痘鼻衄

茅花 歸頭 丹皮 生地 甘草 各等分

水煎服

竹茹石膏湯 治麻痘嘔吐

橘紅 半夏 石膏 白茯苓 竹茹 甘草

右水煎服

升麻澤瀉湯 治麻痘自利

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草 黃連

炒酒 升麻 各等分水煎服

黃芩芍藥湯 治麻痘滯下

條芩錢三 白芍 升麻各二錢 甘草一錢

水煎服

卜全散 麻疔咽喉腫痛

黃芩 黃連 黃栢 苦參各酒炒 玄胡索

分三 硼砂 乳香製各二分 孩兒茶 雄黃各五分

共為細末每用少許吹入

升會肥兒丸 麻後發熱日夜不退肌肉消瘦骨

蒸癆瘵

升會 龍胆草 木香 蚘皮 人參 麦芽

炒 使君子肉各二錢 枳椇 黃連酒炒 白蕪荑

各三錢 胡黃連五錢

右末猪胆汁糊為丸黍米大每服五六十丸

米飲下

文蛤散 麻毒入胃牙肉黑爛出血走馬疔疔

雄黃五錢 五倍子二錢 枯凡五分 蚕退帛燒存一

錢 右細末米泔水洗淨以藥搽之

雄黃散 治全上

雄黃錢一 黃柏錢二 射香分一 先用艾湯淨洗

後搽藥

麥冬清肺飲 麻後咳嗽出血或噎湯水

知母 貝母 天門冬 桔梗 甘草 杏仁

牛旁 石膏煨 馬兜鈴炒 糯米 右水

煎服

清火降火湯 麻後熱乘肺金声啞不出或咳或

喘 當歸 白芍 生地 陳皮 貝母

瓜蒌仁 甘草 白苓 桔苓酒炒 山梔炒

玄參 天冬 麥冬 杏仁 葉白皮 石膏

紫蘊梗 酒連 右各等分姜一片水煎服

生生子曰麻疹咳嗽喘急每用痘門中大小無比

散每服五七分大者一錢即刻喘定而睡醒後

神安氣和而愈屢用屢驗乃熱毒從小便出也

加減四味升麻湯此升發之劑但一二帖則止

不可過表 升麻 葛根 赤芍 甘草

防風 桔梗 紫蘊 蒼朮 陳皮 枳殼

柴胡 姜朮煎服

水痘赤痘即此，一服而愈，不必他方雜治。

大宮 詹少溪吳馭閱校

天冬 麥冬 杏仁 蘇白朮

人參 甘草 白朮 茯苓 山蘇

當歸 白芍 熟地 鹿角 貝母

終

庚寅十月十一日一過 十月十六日一過 十一月十七日一過

